





إِدْوَارُ غَالِبِ الْمَوْسُوعَةِ فِي عُلُومِ الطَّبِيعَةِ

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ ضلقة
٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوسعة ملونة

تَبْحَثُ فِي الزَّرَاعَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ وَالْجَيُولُوجِيَا



دارالمشرق بيروت



Bibliotheca Alexandrina
0133991

الموسوعة في علوم الطبيعة

مَشْهُورَاتُ
دَارِ الْمَشْرِقِ ش.م.م
ص.ب: ٩٤٦ - بَیروت، لُبْنَان



السُّتُورُ
المَكْتَبَةُ الشَّرْقِيَّة - سَاعَةُ الْجَمْعَةِ
ص.ب: ١٩٨٦ - بَیروت، لُبْنَان



الرسوم :

جورج ديب

جورج غنتوس

جان فرطباري

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثالث : ISBN 2-7214-2151-4

يحتوي هذا المجلد من

الرسوم :

١٠١٠٤ مواد

٢٠٧٧ رسماً

٨ لوحات ملونة

الأوزان غالباً

مهندس زدايجي


الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور
وأجلاشيم والأمرض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطبيعة والحقوق
وتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، اليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثالث

من القاف إلى الياء



ق

٢١٣٧٠ - قابِل الإِنْفِلَاق Fissile, Fissile (F).
Fissile (E).

تعت تعريفني يطلق عل ما كان يحمل في تكوينه ميزة الانفلاق .

٢١٣٧١ - قابِل الانهضام Digestible (F).
ما كان هضمه هيناً كاملاً .

٢١٣٧٢ - قابِل التمثيل Assimilable (F).
هو السائغ من الغذاء .

٢١٣٧٣ - قابِل القسمة Divisible (F).
هو ما كان مقدور القسمة .

٢١٣٧٤ - قابِلِيَّة ، اسْتَعْدَاد Aptitude (F).
Taste (E). ميل طبيعي او آفتابي نحو شيء معين .

٢١٣٧٥ - قابِلِيَّة الإِنْطِلال ، بَطْلان Annulabilité, Nullité (F). Nullity (E).

هو انتقاص عقد بسبب فقدانه أحد الشروط الجوهرية او الشكلية اللازمة لصحته .

٢١٣٧٦ - قابِلِيَّة الاغْتِذَاك Faculté nutritive (F).
Nutritive faculty (E). هي المقدور الغذائي .

٢١٣٧٧ - قابِلِيَّة الإِنْتِاش ، خاصِيَّة الإِنْتِاش Faculté germinative (F). Germinal faculty (E).
هي المقدار النسبي ال ما ينتش من عدد بزور معين . فإذا
نثشت سبعون برة من اصل مائة برة يقال ان قابلية
الانتاش في تلك البزور هي سبعون من المئة .

٢١٣٦١ - قَاب ، قَيْب Rayon (F). Radius (E).
نصف قطر الدائرة .

٢١٣٦٢ - قَابَ Troisième année (F).
القاب اسم السنة الثالثة بعد الحاضرة . يقال انك لا تستغل
ارضك لا العام ولا القابل ولا القاب .

٢١٣٦٣ - قَابِة Couvi (F).
القابة والقالية : بيضة الطير المحفوظة .

٢١٣٦٤ - قَابِس Récepteur (F). Receiving (E).
كل جهاز قابل أو آخذ كما في التلفزيون .

٢١٣٦٥ - قَابِض ، عَقِص Astringent
القابض من الطوم ما يتقبض اللسان منه . والقابض من
الادوية ما يحبس الفضلات المنثقة من المعدة .

٢١٣٦٦ - قَابِض ، مُقَلِّص Contractif (F).
Contractive (E). ما يجمع اجزاء العضو ويكثفه .

٢١٣٦٧ - قَابِض ، مُكْسَم Accipiens (F).
هو من يقبض المفقود عليه أو الملكية .

٢١٣٦٨ - قَابِعَات الأَسْتَن Pleurodonte (F).
Pleurodotes (E).

نعت تعريفني توصف به العظام من ذوات الاسنان القابية
المرتزة في الحالة الداخلية من الفك . يقابلها شارقات
الاسنان .

٢١٣٦٩ - قَابِل An prochain (F). Next year (E).
اسم لعام المقبل بعد العام الحاضر .

Rémige primaire, Flèche (F). **٢١٣٩٢ - قادمة**
Wing primary (E).
ريشة من أرياش مقدم الجناح. ج. قوام. والأشعار
والمواسر. ب. القوام.

Trémie (F), Hopper (E). **٢١٣٩٣ - قاذوس**
هو عين الطاحون. ثقب أو فرجة أو شق يلقى الحب
الذي يمر به شيئاً فثيقاً.

Albastro **٢١٣٩٤ - قاذوس**
طائر بحري كبير القد مشهور باسم قطرس، أظله.

Asphalte (F), Asphalt (E). **٢١٣٩٥ - قار**
هو الزفت أو الأسفلت، نوع من الحجر المتدنج الأسود
الجامع. يستعمل في ترصيف الطرقات.

Carya (S), Caryer (F), Hickory (E). **٢١٣٩٦ - قار**
جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة الحوريات.
أنواعه عديدة أعطتها البلاد الحارة. جميعها كبيرة القد،
دائمة. أوراقها مركبة، حابطة. أزهارها الذكورية أبوية
الارتكاز، سنبلية التجميع، دقيقة متدلية. أزهارها
الانثوية طرفية الارتكاز، ثلاثية التجميع. ثمارها جزوية،
جامدة الغلاف، رباعية الفلق || أحرف أنوعه
وأشهرها ما يتبع.

Carya aquatica (S). **٢١٣٩٧ - قارة المتابع ***
Caryer des marais (F), Swamp hickory (E), Sum-
phickorybaum (D), Carla palustre (I).
نوع من القار ثمرته كبيرة القد فارشة تملو من ٢٥ إلى
٣٠ سم. وريقاتها كبيرة القد وريّة التجميع براوح
مدعها بين ٩ و ١٣. نصلها أعليسي الشكل ذات الزام
الايخر وهو بارز المروق سنن الحافة || ثمارها بيضية
مقلوبة عادمة الجناح.

٢١٣٩٨ - قارة بيضاء، قارة بيضية
Carya alba, C. ovata (S), Caryer blanc (F), White
hickory (E).
نوع من القار ثمرته سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم.
براعمها متراكبة الحراشف الجزوية اللون. أوراقها كبيرة
القد. وريقاتها سنانية النصل تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض
نحو ٨ سم. || ثمارها بيضية، لونها صغير القد،
مستحب الطعم.

٢١٣٩٩ - قارة زيتونية *
Carya pican, C. olivaeformis (S), Caryer pacanier,
Noyer pican (F), Pecan-nut tree (E), Pekanbaum (D),
Carla (I).
نوع من القار ثمرته كبيرة القد فارشة تملو من ٢٥ إلى
٥٠ سم. براعمها حادة الحراشف. أوراقها كبيرة القد.
وريقاتها وريّة التجميع براوح مدعها بين ١١ و ١٧
سم. ويعرض من ٣ إلى ٦ سم. وهو سنن الحافة
مزخرف المروق. ثمارها بيضية الشكل مقلوبة العقب
تطول من ٣ إلى ٤ سم. قشرة الثمرة تنفلق عند الإدراك
عن ٤ لوزات زيتونية الشكل لباها أبيض اللون مستحب
الطعم والتكهة.

٢١٣٩٨ - قابلية التصرف، قابلية التملك
Allénabilité (F), Allenability (E).
صفة قانونية عائدة بمال يمكن نقل ملكيته بموئ أو بلا
عوض.

٢١٣٩٩ - قابلية التسل، قابلية العزل
Amoribilité (F), Removability (E).
تقال عن موطن يجوز نقله أو استبدال وظيفته أو حرز
بقرار.

٢١٣٩٠ - قابلية الانهزام
Digestibilité (F).
مقدور الشيء على الانهزام. وهو ما يسبب فوارق
الانهزام في الأغذية.

٢١٣٩١ - قابلي
Kapoquier (F).
هو الكايك، أظله.

٢١٣٩٢ - قات *، شاي العرب، حرأبيّة، حاكولة
Catha edulis, Célastrus edulis (S), Célastré com-
estible, Cathé comestible, Gat (F), Cafca, Khâc, Kâc,
Arabian tea plant (E), Kasplanze (D), Catha (I).
نوع من الحرايبة يعي جنبه بريّة وزراعية من فصيلة
القائيات. ساقها فريدا تملو نحو ٣ أمتار. أوراقها معتقة،
متقابلة، أعليجية النصل، يقال أنها طيبة. أزهارها
صفوية، طرفية الارتكاز، غصراء اللون، صفراء المويج،
خاصية الفسل والبلبات والاسدية. ثمارها دقيقة مستديرة
حائرة الطعم حاكولة || تزور في اليمن وألحبية حيث
يمضون أوراقها المنبة المنهضة ويستخرجون من تقطير
ثمارها مشروب كحولي شديد الوقع على الأعصاب.

٢١٣٩٣ - قاتل أبيه
Arbousier (F).
هو القنطاب، أظله.

٢١٣٩٤ - قاتل أخيه
Orchis (F).
هو السحلب، أظله.

٢١٣٩٥ - قاتل البق *
Climaire (F).
هو الأبق المنقودية، أظله.

٢١٣٩٦ - قاتل البقر
Cigu des marais (F).
هو الشوكران السام، أظله.

٢١٣٩٧ - قاتل الحشرات، حاشوشه
Insecticide
كل مادة تصلح للقضاء على الحشرات.

٢١٣٩٨ - قاتل الكتكب
Colchique d'automne (F).
هو سورجان الحريف، أظله.

٢١٣٩٩ - قاتل التير
Aconit napal (F).
هو الاكوينت أهرسي، أظله.

٢١٣٩٠ - قابليات
Celastraceae (S).
Célastracées (F), Célastracées (E).
هي الحرايبات فصيلة نباتية من ذوات الفلقنتين. أشهر
اجناسها الحرايبة وبها القات.

٢١٣٩١ - قاحل
Asperme (F), Asperous (E).
القاحل من النبات العادم البذور.



قات



.....



قارة زيتونية (الباز)

اسطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك سطح اليم والمداشب الهيدرافية || جسما وشبي الشكل، يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ويزن من ٤ الى ١٢ كيلو. ثوبها الى الصهبة الفضية يسمر عند الظهر ويملو تبقيج مستدير اسود في الظهر وفي الانجانب. رأسها مستدل الجرم، غروطي العظم. ذنبها رحب الانفراج. فكاهما متعادلان. اسنانها صغيرة، ذرية. صيادها كيرتان، جاسطتان. زعانفها الظهرية الى الحصرة، الصدرية صفراء اللون والخصوية كذلك. زعنفتها الشرجية حمراء. اما الذيلية فسوداء وعلاية التعجير || لحمها فاخر الصنف، مرغوب فيه.

٢١٤١٠ - قارون Acore (F).
نبات جلمودي عطر يقال له حود الوج. اطلبه.

٢١٤١١ - قاري، كوتوكي Continental
هو ما يمت الى قارة. كوتوك منخ قاري او كودي.

٢١٤١٢ - قاريه Rollier (F).
هي الشقراق. قال فيها الجاحظ والكسائي: طائر اخضر الظهر، اسود للثقل الطويل، قصير الرجلين، اخضر من الخلفات. ج. قواري.

٢١٤١٣ - قاريه Graine de tamarin (F).
حب التمر الهندي.

٢١٤١٤ - قارب، برماني Amphibie (F).
Amphibious, Amphibian (E).
كل حيوان مسكنه الماء لكنه يستطيع الخروج منه بعض الوقت كالقطة وفرس البحر والتساحل الخ.

٢١٤١٥ - قاس، قدر، متور، ذرع، مسح، صاع، كمال
Mesurer (F). To measure (E).

اغذ قياس مختلف ويؤد الشيء لمعرة مقداره. كقياس الطول والعرض لمعرة المساحة وقياس الطول والعرض والارتفاع لمعرة الحجم.

٢١٤١٦ - قاسح Exertile
لعت تعريفي يوصف به الفضو القابل للانتشار ان في الحيوان او في النبات.

٢١٤١٧ - قاسم، مقسوم عليه Diviseur (F).
Divisor (E).

٢١٤١٨ - قاسم مشترك Diviseur commun (F).
Common divisor (E).

٢١٤١٩ - قاسيات الجلد Sclérodermes (F).
قاسيات الجلد أو متصلبات الجلد. مرتبة في الاسماك للمصنوعات الفركية.

٢١٤٢٠ - قاشرة Oculée (F).
نعت تعريفي توصف به اللطخة الشبيهة بالعين.

٢١٤٢١ - قاصير Mineur (F). Minor (E).
هو الذي لم يبلغ الحادية والبشرين من عمره فهو حديم اهلية الاداء الا في حالات فيها القانون.

٢١٤٢٢ - قاصوصة Siève (F). Hamper (E).
جوة من القصب او القصب.

٢١٤٠٠ - قارة قطنيّة Carya tomentosa (S).
Caryer cotonneux (F).

نوع من القار شجرته تملو من ٢٠ الى ٢٥ م. براعمها متراكبة الحراشف الجهورية اللون. اوراقها متوسطة الكبر. وريقاتها سباحية او تساحية التركيب، جميعها لاطئة، نصلها لخل الصغمة السفلى. ثمارها صغيرة القد، لوزها سكري العظم المستحب.

٢١٤٠١ - قارة مرّة، قارة قطنيّة Carya cordiformis, C. amara (S). Caryer amer (F).
نوع من القار شجرته سبروتية تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. براعمها عادمة الحراشف صفراء اللون. اوراقها تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. وريقاتها وريّة التجميع، عدها يراوح بين ٧ و ٩ نصلها يطول نحو ١٦ سم. ويرعى ٣ سم. لونه الى الخضار الزاهي، حصاره منشاري التفرغ. ثمارها مكورة، جامدة الغلاف، بمنجحة القرب. لوزها قليبي الشكل مر العظم، قلوبى المادة.

٢١٤٠٢ - قارح Coin (F). Corner tooth (E).
سنّ قاطعة تلي الرابية. وهما عند الخيل قارحان في كل فك || ترتيب اسنان الخيل يتبدل بالتناوب ثلثها الرباعيات ثم القوارح.

٢١٤٠٣ - قارح Cniquier (F).
هو البندق الهندي، اطلبه.

٢١٤٠٤ - قاروص
هو الهرم نبات طيب من الدفليات، اطلبه.

٢١٤٠٥ - قارض، قاصم Rongeur (F). Rodent (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان ينتمي الى رتبة القوارص.

٢١٤٠٦ - قارود، قارودي
Acarostoxique, Acaricide (F). Acaricide (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تستعمل للقضاء على القراد والحلم.

٢١٤٠٧ - قارورة Ballon en verre (F).
Glass receiver (E).
آنية زجاجية لقياسة الحجم والسعة تستعمل في المختبرات.

٢١٤٠٨ - قاروس، قاروس Morone labrax (S).
Bar, Loup, Loubine (F). Sea bass (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرغيات. أنواعه المعروفة ٧ اصلها مياه المتوسط والاطلسي. جميعها كبيرة القد نحو ١٢ كيلو. انسابها الى الصهبة الفضية المولج يملونها في بعض الانواع تبقيج اسمر مستدير || وهي تألف الشواطئ الصخرية. قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات. تقطع غور الانهر وتترهل صعداً في طلب المراس وقد يكون ذلك في الشتاء قسراً وتعود الى البحر في الربيع || وهي من الاسماك المأكولة لحمها لذيق العظم مرغوب فيه.

٢١٤٠٩ - قاروس مبدول، قاروس مبدول
Labrax lupus (S).
Bar commun, Loup de la Méditerranée, Loubine vulgaire (F). Common sea bass (E).

نوع من القاروس. سمكة بحرية يروض من فصيلة الفرغيات.



قاروس



قاروس مبدول

وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصلها جاهد الصفة، بحري
الون ثنائي القصبة الصلبة الناعضة. ازهارها خافتة الون.
ثمارة قرمزية || يستخرج من ساقها عصارة صمغية حارة
الون شائعة الاستعمال.

٢١٤٣١ - قاطير عطر Dracona fragrans (S).
Dragonier balsamique, D. odorant (F).
شجرة زيتية تفل من ٣ الى ٦ امتار. اوراقها سائفة
الشكل تفل نحو ١٠٠ سم. نصلها اسن حادة الصفة، فسقي
الحصار اللامع. ازهارها لولاسة اللون العنبري. ثمارة
كرزية ارجوانية اللون || تزرع في المراكم والمصارى
ترغب في الاربة الدبابية.



قَطَّامُود

٢١٤٣٢ - قاطع Interruptif (F). Interruptive (E).
عمل قانوني يقطع مفعول عمل آخر.

٢١٤٣٣ - قاطع Interrupteur (F).
اداة يقطع بها التيار الكهربائي. Switch, Cut-out (E).

٢١٤٣٤ - قاطع Sécante (F). Secant (E).
خط مستقيم يقطع الدائرة.

٢١٤٣٥ - قاطع، حاكم Pérémptoire (F).
نعت الحكم القيسل الذي لا يقبل الاجدل. Peremptory (E).

٢١٤٣٦ - قاطع التمام Cosécante (F).
Cosecant (E).

٢١٤٣٧ - قاطع التثاقب، حاكس الدم Hémostatique (F). Haemostatic (E).
كل دواء يقطع النزف او السيلان.

٢١٤٣٨ - قاطعة Incisive (F). Incisor (E).
هي اسن الاسنان الاسمية في كل من الفكين. والقرامع
صت التحليل مثلاً ست اسنان: ثنيان وروبياع وقارحان.

٢١٤٣٩ - قاطوب موشع Anthribus nebulosis (S). Anthrbe nébuleux (F).
Anthrbus nebulosis (E).

حشرة وائمة قانصة وأخمة من فصيلة القاطوبيات وربة
مفصلات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر
الايض المتوسط. تألف ارجاج الصنوبر. خنثاهما
واحدة تعيش على اعداد الثباتات البرية تقضم الثباتات
والكؤوس والفاير. يرقاتها قانصة تعيش على ما تقرمه
من البرقات الخاشية التي تعمرى الصنوبر والشرين ||
جسمها صغير اللقد يطول من ٢ الى ٤ م. ثوبها الى
الوراء القصبي يطولو خل اشهب يمتكس عليه النور
فيبدو كأنه موشع. رأسها معتدل الحجم. قصير الخلم.
عينها كبيرتان. زناها خيطيان. فكاهما ذريان.
غدها شديقتا الصلابة، شبيهاة التميزيز. ارسافها
ثلاثية المقل || الانثى اكبر قدماً من الذكر وابنت ثوباً
سه واقصر زبناً || لها جيل واحد في الحول. تظهر
الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اوائل الصيف.
تسرح في النهار وبيت في الليل تحت قشور الصنوبر ||
الطور البرقي يستمر نحو ٣٦ اسبوعاً. والبرقة عند ادراكها
التكامل الجسدي تفل نحو ٦ م. جسمها وشي الشكل،
مستطيل القدم، مستطيل القوس. ثوبها الى الغلي
الاصفر المواج. رأسها وروبياعا وبشها وشرجهما الى
السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع

٢١٤٣٣ - قاضيوم Rongeur (F).
هو القارض، آكله. Gnawing, Biting (E).

٢١٤٣٤ - قاضي، حاصم Ester en justice, Agir en justice
التسبا الى القضاء

٢١٤٣٥ - قاضي الجبل Agame (F).
هو الحرزون، آكله ومنه الارزاق والاخير.

٢١٤٣٦ - قاط Elacates (S).
Elacate (F). Elacate (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي القاط.
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات شالكاك
الزعانف. انواحه المعروفة قليلة العدد. اسطائها مجار
البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة وشية الشكل. رؤوسها
اسنيفة ذلقة. اشداها كبيرة. عينها صغيرة، ماسحة.
زعانها الظهرية تمتد من اواسط الظهر الى مؤخره فتقدمها
بعض المناقص الحادة. زعانها الذيلية مقعرة || طويها
متوسطة الصنف، مأكولة.

٢١٤٣٧ - قاط أسود* Elacates nigricans (S).
Elacate noir (F). Black elacate (E).

نوع من القاط. سمكة بحرية بيوض. اسطائها البحر
الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي الشكل يطول من
٨٠ الى ١٠٠ سم. ثوبها الى السرة السوداء يطويها خطوط
فضية، قاطية، مستعرضة || رأسها معتدل الحجم. ذلق
الخلم. فكها الاسفل يتقدم الاعل بعض الشيء. شفاها
رسم الانفراج. عينها مستديرتان صغيرتان، ماسحتان.
وزعنفاها الظهرية مستطيلة فتقدمها ثمانية مناص حادة.
وزعنفاها الشرجية تقابل الظهرية. وتمائلها شكلاً. زعنفاها
الذيلية مقعرة الطرف || جسمها متوسط الصنف، مأكول.

٢١٤٣٨ - قاطير*، دم الثنين، دم الثعبان Dracona (S). Dragonnier (F). Dragon tree (E).

جنس اشجار ونبات برية وزيتية من سبط الفلويديات
وفصيلة الزنبقيات. انواحه المعروفة نحو ٢٠ اسطائها البلاد
الاستوائية جميعها بطيئة النمو مديدة العمر. بعضها يشبه
الشخل. اوراقها طرية الارتكاز يكثر فيها الشكل السني.
ازهارها عشكوية الصنيع، تاجية الارتكاز، يضاء اللون.
ثمارة كرزية اللقد والشكل، ورتقالية اللون او حمراء.
من خصاصها انها لا تزهق قبل بلوغ ٢٥ سنة من العمر.
يستخرج من سوق بعض انواعها عصارة صمغية حارة
تتحول بعد تجفيفها وصفيها الى دقيق احمر اللون كبير
الاستعمال الصنائي || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢١٤٣٩ - قاطير أرجواني Dracona terminalis (S). Dragonier pourpre (F).

جنية زربية صلبة اللقد، مشعولة، بطيئة النمو، ليلية
الجلد. اوراقها سيفية الشكل مستطيلة. نصلها اسن
الصفة ارجوانية اللون || منبها الصين. تزرع في المراكم
ترغب في الاربة الدبابية.

٢١٤٣٠ - قاطير جبار، دم الاخوين Dracona draco, Pleomele draco (S). Dragonier
sang-draco, D. gigantesque, Sang-draco (F).

جنية زربية صلبة اللقد، مشعولة، بطيئة النمو، ليلية
الجلد. اوراقها سيفية الشكل مستطيلة. نصلها اسن
الصفة ارجوانية اللون || منبها الصين. تزرع في المراكم
ترغب في الاربة الدبابية.



قَطَّامُود

اي يوم من القمر يقابل ٢٥ حزيران سنة ١٩٦٦. اتبع الطريقة التالية : القاعدة ٨ اخف اليها علامة شهر حزيران اي ٤ ثم اخف ٢٥ اي ايام الشهر الشمسي فيصح المجموع ٣٧ ، اسقط ٣٠ يبقى ٧ وهو المطلوب .

٢١٤٤٩ - **قَاعِدَةُ الْثَلَاثِ** (F). Base de triangle (F).
Base of a triangle (E).

السطح الذي يرتكز عليه الخط العمودي .

٢١٤٥٠ - **قَاعِدَةُ الْمُثَوَّرِ** (F). Base de prisme (F).
Base of a prism (E).

٢١٤٥١ - **قَاعِدِيّ ، أُسَامِيّ** (F). Basilaire, Basique (F). Basilar, Basic (E).
صفة الجسم الذي يحوي قاعدة . ونمت تمرني يطلق على كل ملح سوى شطآن من القاعدة .

٢١٤٥٢ - **قَاعِدِيَّة** (F). Basicité (F). Basicity (E).
صفة الاجسام التي تمثل دور القاعدة في التراكيب الكيماوية .

٢١٤٥٣ - **قَاتِفَاتِ الذَّنَبِ** (F). Collembeles (F).
هي الكهديات . اطلبها .

٢١٤٥٤ - **قَاتِفَةُ الْقُطْنِ** (S). Lepidocyrtinus incertus (S).
هي كهدل القطن ، اطلبه .

٢١٤٥٥ - **قَاتِفَةُ الْمَوْزِ** (F). Drépanure du bananier (F).
هي كهدل الموز ، اطلبه .

٢١٤٥٦ - **قَاتُور ، قُفُور** (F). Spatha (F).
هو الكافور ، وعاء ملغ لتخل .

٢١٤٥٧ - **قَاتِي** (F). Cornelle cendrée (F).
هو القرباب الابيض . يعتبر من الطيور المؤنفة .

٢١٤٥٨ - **قَاتِي الْبَحْرِ** (F). Corbeau de mer (F).
سمكة بحرية تدعى قرية سواد ، اطلبها .

٢١٤٥٩ - **قَاتِي الْمَاءِ** (F). Cormoran (F).
هو الباق ، اطلبه .

٢١٤٦٠ - **قَاتِل ، قَاتَالِيّ** (S). Cacialle (S). Cacialle (E). Kakalle (D). Cacialle, Cacao (I).
جنس نباتات عشبية معمرة ، برية وزراعية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة بعضها طبي وزرعي . اوراقه متناوبة ، لاقطاسية الشكل . ازهارها حلقية التجميع ، بيضاء اللون . يزور مهبلة ، اهدابها وحيدة الصف . اشهر انواعه ما يلي .

٢١٤٦١ - **قَاتِل سِرْمَكِي الْوَرَقِ** (S). Cacialle stripticifolia (S). Cacialle à feuilles d'arroche (F).
نوع من القاتل وهو جنبة معمرة تعمل من ٩٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مفصصة ، حادة التنتين . نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى . اهدابها مستعرضة ، لاقطاسية التراكيب . ازهارها بيض . ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١٤٦٢ - **قَاتِل طَبِي ، قَاتَالِيّ بُوَصْرِيَّة الْوَرَقِ** (S). Cacialle verbascifolia (S). Cacialle sacrée (F).
نوع من القاتل وهو جنبة طيبة صغيرة معمرة تعمل من ٦٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها بيضية الشكل ذائقة ، نصلها يطل

يقضي في آخر سرداب دخلته البرقة ضمن غشاء رقيق هزيل .

٢١٤٤٠ - **قَاتُونِيَّات** (S). Anthribidae (S). Anthribidae (F). Anthribidae (E).

فصيلة حشرات واسمة دائمة قائمة والنجمة من رتبة غديات الاجنحة || اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الاجراج وتميز على المواد النباتية المنسقة وعلى ما تقتصره من يرقاات الحشرات الخاشية || اجسامها متباينة الاحجام بين الصغيرة والوسطى . اشكالها قرية الشبه بالسوسيات . رؤوسها صغيرة . اخطامها مستعرضة وقصيرة . زباناها خيطية نحيلة وقد تنتهي بفصل صقبة متطاولة . كواسلها لاقطاسية الشكل . اعمادها لاحقة . جرائزها نسيطة . ارسافها ثلاثية العقول || اشهر اجناسها القاطوب والطحاعة .

٢١٤٤١ - **قَاتُورُ الْعَيْبِ** (F). Tordeuse de la grappe (F).
حشرة مؤنفة تدمر عناقيد العنب تدعى ادويس اطلبها .

٢١٤٤٢ - **قَاع** (F). القاع : ارض سهلة مسطحة قد انفرجت عنها الجبال والاكمام .

٢١٤٤٣ - **قَاعِدَةٌ** (F). Base (F).
هي الاساس . اطلبه .

٢١٤٤٤ - **قَاعِدَةٌ** (F). Règle (F). Rule (E).
الخط الواجب اتباعه للوصول الى الهدف .

٢١٤٤٥ - **قَاعِدَةٌ ، نَظَرِيَّة** (F). Théorie (F). Theory (E).

٢١٤٤٦ - **قَاعِدَةُ السَّنَوَاتِ السَّابِقَةِ** (F). Règle de la pénultième année (F).

٢١٤٤٧ - **قَاعِدَةُ السَّنَوَاتِ الْمَسِيحِيَّةِ وَالْمَجْرِيَّةِ** (F). هي القاعدة النظرية لثبته لمرقة السنة الهجرية اعتباراً من السنة المسيحية او السنة المسيحية اعتباراً من الهجرية .
١) السنة الهجرية = $XL + X_{PP}$
٢) السنة المسيحية = السنة الهجرية - ٣٢

٢١٤٤٨ - **قَاعِدَةُ النَّحْمَرِ** (F). Epacte (F). Epact (E).
علم القاعدة الحالية وقد دعا ٢٧ منذ اول اذار ١٩٦٥ واضف اليها علامة الشهر كما تراه اذانه ثم اخف عدد يوم الشهر الشمسي المراد معرفة ما يقابله من القمري فان كان المجموع اقل من ثلاثين فهو المطلوب وان زاد فاسقط منه ثلاثين وبالي يكون المطلوب || وهذه علامات الاشهر :

اذار نيسان ايار حزيران تموز آب ايلول تشرين الاول تشرين الثاني كانون الاول كانون الثاني شباط
٩ ١٠ ١١ ١٢
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

واعلم ان العدد الواجب اضافته ابتداء من اول اذار في كل سنة هو ١١ وان قاعدة السنة القابلة ستكون A كما هو مبين :
١١+٢٧=٣٨-٣٠=A=٣ || فلو شئت معرفة



ناتل

Moule (F), Mould (E).

٢١١٧٤ - قَالِب

الجهاز الخامس بالسبك .

Fibrophage (F).

٢١١٧٥ - قَالِف

Fibrophagous (E).

القائف من الحيوان والحشرات ، الذي يقضي على قشور النبات وأليافها .

Maclura (S).

٢١١٧٦ - قَائَة ، مَكْلُورَة

Maclura, Maclure (F), Osage tree (E).

جنس اشجار وغطيات ممررة فراء من فصيلة التوتيات .
انواعها قليلة منها البرية والزراعية . فروعها شائكة . اوراقها معتقة متعاقبة . نصلها يبيضي الصفحة الكاملة او لثلاثي التخصيص . ازهارها لثائية المسكن ، الكبرية منها عنقودية التجميع اما الانثوية فبطيئة . احشاشها قوية ، شتى ، لينة ، لونها الالفصاح الحلي ، تستعمل في صناعة القدي || اشهر انواعها القائة البرتقالية .



قائم ، هربين

٢١١٧٧ - قَائَة بَرْتَقَالِيَّة * ، مَكْلُورَة بَرْتَقَالِيَّة

Maclura aurantiaca, Toxylon pomiferum (S). Maclura oranger, Oranger des Ozages, Bois d'Arc (F). Bow-wood tree, Osage orange (E). Osagedorn, Osagenapfel (D). Maclura aurantiaca (I).

نوع من القائة وهي شجرة سبروتية فراء داخلة تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها تفلو من ٧ الى ١٦ سم . وتعرض من ٣ الى ١٠ سم . نصلها اخضر الصفحة للامعة البشرة ، بارز المروق الباعثة اللون . ازهارها يستمر من سزيران الى تموز . ثمارها مأكولة وهي برتقالية الشكل والحجم واللون .

Géler (F), Glizzard (E).

٢١١٧٨ - قَائَصَة

ثالث جيب في جهاز هضم الطير . وهي حدة دون القبة تعرف بالاختلاف والجربنة والحوصل والحوصلة والفرغة والقروضة والمخفلة ...

Canon

٢١١٧٩ - قَانُون

مجوعة شرائع كنسية متباينة المصادر بعضها يرتكز على التسليم السابوية وبعضها يجاري الحقوق الطبيعية والمعروف وتقاليده والقانون المدني .

Lol (F), Law (E).

٢١١٨٠ - قَانُون ، شَرِيعَة

القانون او الشريعة بالتبع معناه مجموعة القواعد القانونية التي سبها المشرع || والقانون بمعناه الضيق مجموعة القواعد الانجائية الثابتة التي تسبها السلطة العامة وتكمل الفقرة تنهلهما .

٢١١٨١ - قَانُون ، مَجْمُوعَة الْقَوَانِين

Code (F). اسم شامل يطلق على مختلف فروع علم القانون وتصومه التشريعية المنسقة والمجموعة في ابواب رمود .

٢١١٨٢ - قَانُونِ الْاَحْوَالِ الْشَخْصِيَّة

Code du statut personnel (F).

هو القانون الذي ينظم حالة المرء الشخصية من الولادة الى اللبنة وذلك من حيث الارتباط الاجتماعي والاعلى والخصائص .

٢١١٨٣ - قَانُونِ التِّجَارَةِ

Code de commerce (F).

هو القانون الذي ينظم المعاملات التجارية .

من ١٠ الى ٢٠ سم . وهو جامد الصفحة ، بارز المروق المتوازية . اعدادها صغيرة القند خمسية التركيب || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١١٦٣ - قَاتِل عَطْرِي

Callia suaveolens, Synosus suaveolens (S). Callia odoriférante (F).

نوع من القاتل وهو جنبة صغيرة القند ممررة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها السفل حراية الشكل بمنجمة المماثل ، اوراقها العليا مثلثة الزوايا . اعدادها كبيرة القند ، لاثامية التركيب تقسم من ٢٥ الى ٣٠ زهرة عرفها عطر فواح . ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢١١٦٤ - قَاتِل كَبِيرِي الْوَرِّي

Callia reniformis (S). Cacaile réniforme (F).

نوع من القاتل وهو جنبة ممررة تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها السفل كلوية الشكل ، كبيرة القند تعرض نحو ٦٠ سم . اوراقها العليا اعليلية مستطيلة . نصلها خضر الصفائح المسننة المختار . اعدادها صغيرة القند ، خمسية الازهار البيض || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

Amome (F).

٢١١٦٥ - قَائِدَة ، بَاقِلِي

في الحال ، اطليه .

٢١١٦٦ - قَائِدَة تَيْشِ الْفِيل

في الحال الجوزي ، اطليه .

٢١١٦٧ - قَائِدَة حَبَشِيَّة

Amome de Madagascar في الحال الجبشي ، اطليه .

٢١١٦٨ - قَائِدَة ذَكْرِيَّة

Mélaquette (F). في الحال الذكر ، اطليه .

٢١١٦٩ - قَائِدَة صَغِيرَة

Cardamome petit (F). في الحال الصغير ، اطليه .

٢١١٧٠ - قَائِدَة عُنُقُودِيَّة

Amome cardamome (F). في حال حما ، اطليه .

٢١١٧١ - قَائِدَة مَجْتَمَعَة

Cardamome allé de java (F). في حال جاوا ، اطليه .

٢١١٧٢ - قَائِلَات

Amomaceae (S). Amomacées (E).

في الهاليات سبط من فصيلة الزنجبليات . نباتاتها جسمية ، صخرية ، ممررة . بعضها طبي وبعضها عطري وزراحي ودرجي .

٢١١٧٣ - قَائِم * ، قَائِم ، هَرْمِين

lctis ermine, Putorius arminas (S). Hermine, Belette hermine (F). Ermine, Stoat (E). Hermelin (D).

حيوان من الرماحيب اطاقه البلاد الجبلية العالية . ثوبه العسبي الى الالوة الباقية . اما الشتوي فابيض اسفر او ابيض يلق الا طرف ذنبه الذي يبقى على لونه الجوزي يطوه ملج اسود . جسمه اخيف القند ، قصير الجرامز ، طوله يراوح بين ٢٤ و ٢٧ سم . وذنبه من ١٠ الى ١١ سم . وهو من الحيوانات الشجاعة الشرسة . يسرح في الليل ، يدمر حل الارض ويتسلق الانجار . قوته القزاع والارنب والطير والزحافات على اختلافها من الانعام الى العظام . انشاء تقسم مرة في الحول من جروين الى ثمانية . فروته جيدة الصنف ثينة القدر .



قائة برتقالية

القد؛ قشوره مستسمة، غلومة، بارزة الصلوع، ولها الى الصفرة || يرغب في التربة المروية الخفيفة الغنية بالناصر العضوية .

٢١٤٩٨ - قانون الميرير هو القطين الأقرع، اطلبه .

٢١٤٩٩ - قانون هندي *

Cucumis anguria (S). Anguria, Anguria, Concombre des Antilles, C. marron (F). Beer-gherkin, West Indian gherkin (E). Birgurke, Angurienturke (D). Anguria, Cocomero anguria (I).

نوع من القرعيات الحولية، غروبها عديدة منها البرية والزراعية، اصنافها البلاد الحارة. جميعها عديدة ومتسلسلة. اوراقها كفية ثلاثية التخصيص، حية النصل حل صفحتيه. ثمارها بقلية مأكولة وهي مستطيلة المالحق، رنية الشكل والحليم، مسلمة القشور الخزولية الشاذية. الوانها تختلف باختلاف الصروب منها الاخضر والاصفر والمخمد والموشم والاخضر.

Coccomyces ٢١٥٠٠ - قاوية *

جنس فطور مجهرية من البريات وفصيلة الفشاريات. يتميز ببدائه النائرة في وينته الرسة. بونه غطي او مخروطي الشكل مستقيم الانتصاب او احسن، إزلاقه كيدي وكتائده حمية الشكل. بوفياته كيفية التجميع شفاقة غطيبة مستقيمة او منمققة || انواعه قليلة منها واحد مؤذ يمس قاوية الكرز.

٢١٥٠١ - قاوية الكرز *

Coccomyces hiemalis, Cylindrosporium hiemale (S). قطر مجهرية يركب ائناد الكرز وأوراقه وأمن ثماره. منظره الخارجى حل الاوراق زرقه كيفية، لونها الى الجوزة تركب صفحة النصل العليا ويغيب الصلع والورق. قطر البقعة منها يراوح بين ١ و ٢ م. وهي شبه مستديرة او مقرنة الزوايا || يسبب جفاف النصل والأحيال الباكر بعد ان يوقف التبادل النسبي قبل زمن التركيز الطبيعي، وهو على الاذن يقع صغيرة ميمرة لونها الى الحمرة تسبب جفاف النسج الواصلة وتمزق نقل النسج الى التبار فتجهم وتسقط || أما على الفروع والافناد فهو يقع قرصية وسادية الشكل متوسطة الكثافة ميمرة بدون انظام يركب البشرة وتضرب اللحاء فتدخل الاويمة وتمطها وتمتصها عن القيام بوظيفتها || يكافح باستعمال احد الوسائل السلفوكسية التجارية بعد تخفيفها ٥٠ ٪ وتريديها نحو ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد. تلصق الانجبار حل مرتين او ثلاث مرات، الاول حل اثر العقد والثانية بعد الاول بأسبوعين والثالثة بعد الثانية بثلاثة أسابيع .

Alkalid (F). Alkalid (E). ٢١٥٠٢ - قالد

القائد آخر نجم من كوكبة بنات لنش الصفرى .

Morphologie interne (F). ٢١٥٠٣ - قالفية *

Internal morphology (E). هي ديس تركيب الاجسام وهيئتها الداخلية في الحيوان والنبات .

Membre (F). Membre (E). ٢١٥٠٤ - قاشمة

Troquer (F). To truck (E). ٢١٥٠٥ - قابض

استناس سلمة سلمة .

٢١٤٩٤ - قانون الحراج ، قانون الأجرع

Code forestier (F). Forest rule (E).

هو القانون الذي ينظم ملكية الأجرع وصيانتها واستغلالها الى آخره .

Droit industriel (F). ٢١٤٩٥ - قانون الصناعة

Industrial law (E). هو القانون الذي ينظم الشؤون الصناعية ويحميها .

Droit fiscal (F). ٢١٤٩٦ - قانون الضرائب

Fiscal law (E). هو القانون الذي ينظم الضرائب حل الإعيان الثابتة والمنقولة فيقدرها ويفرضها ويمن طرق جبايتها .

Code de la route (F). ٢١٤٩٧ - قانون الطرق

Rule of the road (E). هو القانون الذي ينظم السير حل الطرق .

٢١٤٩٨ - قانون العرف والعادات

Droit coutumier (F). Unwritten law sanctioned by usage (E). مجموعة التواعد القانونية التي تفرها العرف .

Code pénal (F). ٢١٤٩٩ - قانون العقوبات

Penal law (E). هو القانون الذي يبين الجرائم وعقوباتها والاشخاص الذين تصح معاقبتهم .

Lex fori ٢١٤٩٠ - قانون المحكمة

صفة لاتينية تشمل في القانون الدولي الخاص دلالة حل نصوص القانون الذي تأخذ به المحكمة المطروح عليها النزاع .

Droit rural (F). ٢١٤٩١ - قانون زراعي

Rural law (E). هو الذي ينظم الملكية الزراعية ويحمي الزراعة .

٢١٤٩٢ - قانون مكان التعاقد

Lex loci contractus صفة لاتينية تشمل في القانون الدولي الخاص دلالة حل قانون البلد الذي انعقد فيه العقد .

Lex rei sitae ٢١٤٩٣ - قانون موقع المال

صفة لاتينية تشمل في القانون الدولي الخاص دلالة حل قانون البلد الذي يقع فيه المال . وهو يسري حل الاموال الخاصة بجماء .

Légal (F). Legal, Lawful (E). ٢١٤٩٤ - قانوني

نمت يستعمل دلالة حل مطابقة القانون او حل صدور النصوص بعن القانون .

Martin-pêcheur (F). ٢١٤٩٥ - قاوند

هو القزل ، اطلبه .

Martin-pêcheur vulgaire ٢١٤٩٦ - قاوند شائع

هو القزل الشائع ، اطلبه .

٢١٤٩٧ - قانون * ، قانون ستنطاي

Cucumis angulatus (S). Melon santavi (F). Santavi melon (E). Santavische melon (D). Melone santavi d'Egypte (I).

نوع من الثيام الزراعي للأكل ، وهو من نبات البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر . ثماره رنية الشكل، كبيرة



قارون



قارون هندي



قاوية الكرز



قَبْ



قَبْ امْر



قَبْ



قَبْ



قَبْ

٢١٥١٤ - قَبْاح *

Tetraophasis (S). Tétraphase (F). Tetraophasis (E).

جنس طير من فصيلة التروبيات. ثوباء المعروفان ييشان في جبال التبت. شكله قريب الشبه بالفريز. جسمه متوسط القد. ثوبه الى السرة المنمرة بالاخير. زوره اسود مطوق بالابيض. ذنبه متوسط الطول، مستدير الطرف. منقاده ورجلاه الى الجفوة السوداء.

٢١٥١٥ - قَبْاح

القَبْاح طرف عظم المقد عما يلي المرفق.

٢١٥١٦ - قَبْاح *

Ours (vieux) (F). Bear (old) (E). القَبْاح : اللب الحرم.

٢١٥١٧ - قَبْار *

Claprier commun (F). هو الكبر الشائك، اطلبه.

٢١٥١٨ - قَبْاسَة *

Monogénie (F). Monogeny (E). القَبْاسَة منفع تناسل قوامه ان الاجسام المنضجة تلتن اجساماً تنفصل عنها وتستقل بذاتها.

٢١٥١٩ - قَبْاع * ، قَبْاع ، قَبْالِ يَوْس

Aulacodus (S). Aulacode (F). Cane rat (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الدغيات. انواعه عديدة قريبة الشبه من الجردان. اجسامها ربة قوية تقطن من ٥٠ الى ٦٠ سم. وذناها من ١٤ الى ٢٢ سم. روارها صغيرة. مقامها قصيرة وعريضة. اذناها نصف مستديرة. جرائها قصيرة خلسة الاصابع. المظارها قوية منجلية الشكل، اذناها حليلة الشعر شائكة || انوارها الى السهبة السوداء تعقب مع اقترابها من الظهر وتبيض عند البين. صوفها غثن للملص قبل الكفافة || مولها بغض الاصقاع الافريقية تكثر في المناطق الجنوبية والوسطى. تألف مختلف الاقاليم الزراعية. اجبرتها افاحيص تنفضها في الازدغال والمقاصب وبين الصغور القريبة من الحقول المزروعة. قربها الفتق وسائر النباتات الصغيرة وتغصب السكر والجزران.

٢١٥٢٠ - قَبْاع

صوت الخنزير.

٢١٥٢١ - قَبْان *

Bascule (F). See-saw (E). جهاز توزن به الاشياء.

٢١٥٢٢ - قَبْيب *

Cordylone (F). جلس نباتات برية وزينية من فصيلة الزنبقيات، انواعه عديدة مهداة البلاد الحارة. اوروبها خضرة، جلدها منتصب، اوراقتها عصفية الشكل مستطيلة. انوارها حامية الارتركار، علقية للتجميع، صغيرة القد يكثر فيها الابيض والبيكلي || اشهر انواعه ما يلي.

٢١٥٢٣ - قَبْيب أَحْمَر *

Cordylone rubra (S). Cordylone rouge (F).

نوع من القبيب وهو شجيرة زينية سبروتية، تقطن من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم. اوراقتها عصفية الشكل متعق. نصلها بطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. وهو جامد الصلابة المألوسة، شديد الخضار. مظهرها صغير القد، اسفل الشرخ. انوارها الى الحمرة يعلوها موج بنفسجي.

Telson

آخر حلقة من بطن القشريات.

٢١٥٠٧ - قَبْ

قَبْ النبات : ييس.

٢١٥٠٨ - قَبْا

كل طرف من طرفي فلك المحور الاكبر في الكواكب الخلس اي السيارة.

٢١٥٠٩ - قَبْا *

Pleurotomaria (S). Pleurotomaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الارجل وفصيلة القَبْايات. انواعه المعروفة كثيرة العدد، منها نحو ٥٠٠ من متحجرات الاحقاب الاول، واربعة انواع ماصرة منتشرة في مجار البلاد الحارة || اصداها كبيرة، عتلية، ريمية، صباغية الدورة الخلوية التي تعقب مع الاقتراب من القَبْ.

٢١٥١٠ - قَبْاب ، قَبْاب *

Polyprion (S). Cernier (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرانيات شاككات الزمايف. انواعه عديدة معظمها من اسماك البحر المتوسط. جميعها كبيرة القد، طول اجسامها يراوح من ٧٠ الى ٢٠٠ سم. فلونها مستديرة، جامدة، متراكية. زانها شاككة يستطيلة. انوارها الى السرة البنية يعلوها تيجنج ابيض. وهي من الاسماك المأكولة المستحبة الطعم.

٢١٥١١ - قَبْابِ اسْمَر * ، كَعْبَد ، دَبْج

Polyprion cernium (S). Cernier brun (F).

Brown Stone-bass (E). نوع من القباب. سمكة بحرية يبيض من فصيلة الصرانيات. كانت، في التصنيف السابق، تتبع فصيلة الفريشيات. اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط || جسمها اعليجي الشكل، كبير القد، بطول من ٧٠ الى ١٠٠ سم. حراشفها صغيرة، معدنية، مسننة الحوافي. ثوبها الى السرة البنية يعلوها تيجنج ابيض || رأسها مخروطي الشكل، ذلق الخط. شلقها واسع الانفراج. فكها الاسفل يتقدم الاعل. عينها كبيرتان، مستديرتان، نائزتان || زانها متباينة الاشكال والاحجام ومنها المنخسية الشاككة ومنها المفصلة السرة || عليها جبه الصفت، مخروطي فيه الا في زين مرض الخرجان الذي يمتد من شطاب الى نيسان ومن ايلول الى تشرين الثاني.

٢١٥١٢ - قَبْايات *

Pleurotomaridae (S). Pleurotomaridae (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الارجل اماميات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها من متحجرات الاحقاب الاول وبعضها ماصر || اصداها متباينة الاجسام والاشكال معظمها مستطيل المظلة التي تبدو كأنها قَبْ متراكية || اعرف اجناسها وانورها القباب والشرمة.

٢١٥١٣ - قَبْاسَة ، قَبْاسَة

عفة تنبت في الفلظ ولا تنبت في الجبل ترتفع عن الارض قيس الاعسج او لقل ترعها الموائ (١ م.) ج قبا.

مقاره لى السرة الزيتونية || مولته خضاب وسهل الشرق الاوسط واروبة . يكثر في المراق || انفاه تبيض من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها وسدها ثلاثة اسابيع .

٢١٥٣٠ - قُبَّة ، قُبَّة ، قُبَّة ، قُبَّة

Alauda (S). Alouette (F). Lark (E).
ج. قبر وقنار . جلس طير من فصيلة القبرات ، انواعه عديدة ، اعطائها فصحة الارجاء تشمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها ناعمة . اجسامها صغيرة اللد تطلو من ١٤ الى ٢٥ سم . مناقرها مخروطية قصيرة . اجنحتها مستطيلة . اذناها فارقة . اوقها موثقة مرقشة || قوتها الحشرات واليدور البرية . اشهر انواعها مايلي .

٢١٥٣١ - قُبَّة الحَقْل * ، قُبَّة مَعْرُوفَة

Alauda arvensis (S). Alouette des champs, A. commune (F). Skylark (E).
نوع من القبرة وهو طائر صغير اللد ، طوله نحو ١٨ سم . فوهه متداخل الالوان ، رأسه وظواهره الى الكمية الموشقة بالاسود والاصهب والافبر . بطنه وضوايله الى اليباض الاخر تملو رشفة سمره . حنار صوته الاجل مستطيل الشكل اشقر اللون . عيانه جوزيتان . مقاره الى السرة . يئن في القربة بين الزروع وفي المراعي والناظر . انفاه تبيض من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حناتها تتحول اربع بويضات او خمس ، اما الحفن فينوم ١٤ بيضا تقوم به الانثى بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٢ - قُبَّة النَبَاش * ، قُبَّة مَعْرُوفَة

Alauda arborea, Lullula arborea (S). Alouette lulu, A. des bois (F). Wood lark (E).
نوع من القبرة ، وهو طائر صغير اللد يطول نحو ١٥ سم . فوهه ثوب قبرة الحقل ، لكنه اصنع بيضا واشقر صهبة . بألف الوزر والحساب والنباش والمجرة الانجار ، رغب في مراعي الخلع والصمر . انفاه تبيض ثلاث مرات في السنة والحفن يكون بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٣ - قُبَّة سَمَرَاء * ، قُبَّة ، عَلْتَعَلَة

Alauda brachydactyla (S). Alouette calandrella (F).
نوع من القبرة ، صغيرة اللد تطلو نحو ١٤ سم . فوهها ثوب قبرة الحقل الا انه اشد سرة . وهي اطول جناحا من قبرة النباش واقصر رسا منها || تألف الاراضي الكنسية والريالية . انفاها تبيض ثلاث مرات في السنة . بويضها اصهب اللون تملو رشفة حنطية .

٢١٥٣٤ - قُبَّة مَنُوحَة * ، قُبَّة مَعْرُوفَة

Alauda cristata, Galerida cristata (S). Alouette cochevia, Cochevis huppé (F). Tufted lark (E)
نوع من القبرة ، ومنهم من جعلها جنسا مستقلا . جسمها يطول نحو ١٨ سم . رأسها مستطيل القنزعة . ظهوها اسمر اللون ، وريدي الملوخ ، حنار ريش رأسها وظهوها وجناحها الى الصهبة الحنطية . صندرها وبنها وضوايلها الى اليباض الاصهب تملو رشفة مستطيلة سوداء اللون . اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . تألف المناطق البويرة والمراعي والحقل الزردية ويوانب القرات . قوتها الحشرات والحوام واليدور والجويوب || تدن حناتها في القربة بين الاشجار او تحت التلع . وهي لا تبيض اكثر من مرتين في الحبل . حناتها تتألف من ٥ الى ٦ بويضات تقوم بها الانثى بمناوبة الذكر .

٢١٥٣٤ - قُبَّة الجَنُوب (S). Cordylina australis (S). Cordylina australis (F).

نوع من القتب وهو شجرة سرورية برية وتربيتية تملو من ١٠ الى ١٢ سم . ساقها فراء . اوراقها تشبه اوراق البيركا . تصلها بطول من ٨٥ الى ١٢٠ سم . وهو مائل البشرة جيل الخضر الزاهي يعلو ثوب اخضر او احمر . انفاها الى اليباض الاخر . احداثها كبيرة اللد متوسطة الكثافة . ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

٢١٥٣٥ - قُبَّة كَثِيف الزهر

Cordylina dense (S). Cordylina dense (F).
نوع من القتب وهو شجرة تربيتية تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها نحيلة فراء . اوراقها تطلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . نصلها جامد الصلصة مسن الحافة احمر الزام الاخضر ، لونه الى الخضر القمايق || حنارها الزهرى قرمزي اللون ، حناتها كثيف التجميع ، ازهارها ليلية .

٢١٥٣٦ - قُبَّة ، قُبَّة

Azha
القبة بعض نجوم كوكبية الاكليل الجنوبي . سميت قبة لاستدانتها . بين العرب من يسميها ادعى التمام لانها على جنوب التمامين .

٢١٥٣٧ - قُبَّة ، قُبَّة ، حِفْث

Feuillet (F). Third stomach of ruminantia (E).
هي من كلف واشلاحة ذات اطباق متصلة بالكروش وهي البوابة الذي يتنقل اليه الفرف .

٢١٥٣٨ - قُبْتُور * ، جَمَل مُكَرَّم

Ateuchus laticollis (S). Scarabée à large dôme (F). Ateuchus laticollis (E).

حشرة ناعمة من فصيلة الجمليات ورتبة حديدات الاجنحة . يألف المزارع والبراري يعيش على الخبي والروث والبشر . ماراه يدعى كبرتل يتألف من نفق او نفقين وسجيرة فصية لسانه لايزود القممولة التي يعيش عليها || جسمه متوسط اللد يطول من ١٦ الى ٢٢ سم . فوهه الى السواد اللامع . رأسه صغير الجرم . قصير الخطم . زياتاه صديران دقيقان . عيانه صديرتان ماصحتان . ظهرانه محدد الشكل ، بالغ التضخيد البهدي ، مقطوم المؤخر ، لا يلف كابل اللحن || الاثنى اصفر لدا من الذكر واجبت قوتها منه واكثر سراً || له جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة الاجلجلة في ايار وتعيش حتى ايلول . تسرح في النهار . تسلك في حيزيرات . تنجح مكنة واسعة في القممولة || البرقة عند بلوغها الاذراك اتام تطلو نحو ٢٢ سم . جسمها غليظ البيل والطرف ، مقوس الشكل ، قصير الراجب ، تصلح للتأثير فوهها الى القربة السمره . رأسها اسود اللون ، احمر الملوخ . تعيش في اول عهدا على المواد البصورية الموجودة في القممولة ثم على التزبل حتى زين الاكمال .

٢١٥٣٩ - قُبَّة ، قُبَّة ، حَجَل أَرْبَدَة ، حَجَل عِرَاقِي

Sterna (S). Sterna, Perdrix grise (F). Sand partridge, Bonham (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الجمليات وفصيلة الطيوريات . واسمته قبة للذكر والانثى ، وهي طائر ربع الجففة ، متوسط اللد ، طوله نحو ٢٨ سم . فوهه الى الربة الرصاصية الضفعية الملوخ يعلوها جميع وتؤم وتنجب .



قُبْتُور



قُبَّة



قُبَّة الحَقْل



قُبَّة النَبَاش



قُبَّة سَمَرَاء



قُبَّة مَنُوحَة

الحافة . شراعيها الزهري يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم .
ازهارها ال الصفار المابن يعلو توشم سطني يستقر صه
المختار || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢١٥٤٣ - قيس
Type
هو النموذج المثال الذي يجمع اللامع الشكلية الرئيسية
المالدة الى الضرب او الصلة او الفرع .

٢١٥٤٤ - قيس ، **بوليمونيم** (S).
Polemonium (F).
جنس نباتات برية وزراعية زينة من فصيلة القديسات
انواعها عديدة جميعها عشبية معمرة . اوراقها متعاقبة ،
مركبة ، مستطيلة . ازهارها عتقدي او عككولي التجميع .
اشهر انواعها الزراعية الزينة ما يتبع .

٢١٥٤٥ - قيس الأزرق
Polemoine bleue (F).
هو عشبية المغرب ، اطاليا .

٢١٥٤٦ - قيس بيجي

Polemonium pulcherrimum (S). Polemoine
superbe (F).
عشبة معمرة صغيرة لونه زيا . تملو نحو ٢٥ سم . سوقيها
فرعاه منتصبه قليلة الورق . وريقاتها وريعية وريعية التجميع
عندها رايح بين ١٧ و ٢٧ عناقيدها الزهرية متوالة
الكتافة . ازهارها ثنائية اللون منها الازرق والاصفر ومنها
الازرق والابيض ومنها الازرق والابيض الموشم بالاحمر .
ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٧ - قيس صوفي

Polemonium lanatum (S). Polemoine laineuse (F).
عشبة معمرة صغيرة لونه . مهبها البلاد الباردة . تملو من
١٠ الى ٢٥ سم . سوقيها واروقها وازهارها زغبية البشرة .
سوقيها نحلة . اوراقها قليلة العدد . وريقاتها وريعية التجميع
تألف من ١٧ الى ١٩ وريقة . ازهارها لينة
زرقاء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢١٥٤٨ - قيس قليل الزهر

Polemonium pauciflorum (S). Polemoine pauci-
flore (F).
عشبة معمرة زيا الفروع تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . ساقها
منتصبه . اوراقها نظامية . وريقاتها ٢٧ عتقديها
الزهرية قليل الازهار . ازهارها صفراء اللون مستطيلة الشكل .
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٤٩ - قيس مسطح

Polemonium reptans (S). Polemoine couchée (F).
عشبة معمرة صغيرة لونه . تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . سوقيها
منبطحة . اوراقها مرطاه متصل ، صغيرة الحجم . وريقاتها
وريعية ، خالصة او سباعية او تساعية العدد . عتقديها
الزهرية رطلة التجميع ، ازهارها الى القرحة اليلكية || ازهارها
يستمر من حزيران الى تموز .

٢١٥٥٠ - قيسي
Endémique (F). Endemic (E).
نمت تعريفه يطلق على النباتات والامراض التي تعيش
وتتكاثر في محيط مناخي معين محصور .

٢١٥٥١ - قيسي
Monogénique (F).
Monogenic, Monogenetic (E).
نمت تعريفه يطلق على كل ما هو عائل الى القيسية .

٢١٥٣٥ - قديسات

Aulaididae (S).
Aulaididae (E).
فصيلة القديسات ، من الجوامع المحرطيات المنقرض . اجنتها
عديدة منها القديرة واللبل والمكاه والرهول والرهول والقديسات .
معظمها من القوامع ويصنف اليها || جميعها تألف الحفيس
اكثر من الاجواء والاشجار . اجسامها ربة . رؤوسها
كبيرة ، متاعها لا قياسية . اجنتها مسطلة ، اذنانها
قصيرة || قديها المحرطات والبرور البرية .

٢١٥٣٦ - قديسة ، **قديس**

Corydalis (S). Corydalle (F). Corydalis (E). Kle-
terder (D). Corydallide (I).
جنس نباتات برية وزينة من فصيلة الحشائشيات
انواعها عديدة معظمها جديوري ويصنف دوسي . اوراقها
جديعية الاثناكاز او قرصية ، نصلها كثير التفريش
والتشريح . ازهارها عتقدي التجميع ترتكز على شراخ
يقوم مقام الساق || اشهر انواعها ما يتبع .

٢١٥٣٧ - قديسة جوفاء

Corydalis cava (S).
Corydalle creuse (F).
عشبة جديورية معمرة . جذورها دوفسية جوفاء . ساقها
شراخ يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم . ينهي بالعتقدي الزهري .
ازهارها حر او بيض || ازهارها يستمر من اذار
الى ايار .

٢١٥٣٨ - قديسة سد ابيغة الورق

Corydalis rucafolia (S). Corydalle à feuilles
de rue (F).
عشبة جديورية معمرة . جذورها دوفسية مقلطمة جامدة
اللباب . اوراقها ساقية الشكل . ازهارها وريعية كبيرة
القد . شراعيها يعلو نحو ١٥ سم . || ازهارها يستمر
من نيسان الى ايار .

٢١٥٣٩ - قديسة صفراء

Corydalis lutea (S).
Corydalle jaune (F).
عشبة جديورية معمرة . اوراقها متوسطة التفريش
والتشريح ، مالة البشرة . شراعيها الزهري يعلو من ٢٥
الى ٣٥ سم . ازهارها ذهبي اللون ، بزورها نمسية لامة .
ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢١٥٤٠ - قديسة قديرية الورق

Corydalis cheilandifolia (S). Corydalle à feuilles de
cheilanthe (F).
عشبة جديورية معمرة . اوراقها قديرية الشكل ، مالة
البشرة تملو نحو ٢٠ سم . شراعيها الزهري يعلو نحو
٢٥ سم . ازهارها كثيرة العدد ، جيلة الصفار القاتم .
ازهارها يستمر طويلا فصل الربيع .

٢١٥٤١ - قديسة مزخرفة

Corydalis tomentosa (S). Corydalle tomentosa (F).
عشبة نمسية نحلة . اوراقها قرصية الانتشاح ، نصلها
يعلو من ١٠ الى ١٨ سم . وهو متباح التفريش ، كثير
التشريح ، مزهر الصلصة . ازهارها الى الصفار الكبيرتي .
شراعيها يعلو نحو ٢٠ سم || ازهارها يستمر طويلا
فصل الربيع .

٢١٥٤٢ - قديسة نيسلة

Corydalis nobilis (S).
Corydalle noble (F).
عشبة جديورية معمرة . اوراقها متباحة التشريح ، مسنة



قديسة



قيس

٢١٥٦٠ - قَبْعيَّات *
Dermochelidae (S).
Dermochelidae (F). Dermochelidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاحف. النوع المعاصر الوحيد من هذه الفصيلة هو القبيص || يتبين القبيص بفقاره وضلوعه الطويلة غير الممتدة بالذبل. وبذيله المركب من صفائح صلبة متتالية تنقسم في السن. ويخلو من السطح القرني المادة الذي يتكون ذبال سائر السلاحف || الانثى وحدها تأتي الى البر من مرتين الى ثلاث مرات في الحول وذلك في زين الاشلاق حيث تقبض في كل مرة من ١٠٠ الى ١٥٠ شلقة تنفذ بعد وضعها بنحو ثمة اسابيع. والقبيص فور لفته يتوجه تراء نحو البحر.

٢١٥٦١ - قَبْط
Mélanger (F).
To mix, To mingle (E).
قبط الشيء : خلطه جيداً . يقال قبط الاسدة الكفاوية .

٢١٥٦٢ - قَبْعة
Aulacode (F).
هو القباغ حيوان لبون قاضم ا طليه .

٢١٥٦٣ - قَبْعة
Alouette calandrelle (F).
هي القبرة السراء . صفور ابقع ارض تكثر اقامته قرب اجساد الجردان فاذا فرغ اتبع فيها .

٢١٥٦٤ - قَبْعة *
Patasites (S). Pécasite (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة منها البرية والطيبة والتربينية . اوراقها جلدية معتقة متراكبة فارقة التصل المستدير او القلبي الشكل . ازهارها سبلي التجميع رأسي الارتكاز قاعدته مخراج غليظ متصطب تكسو الحراشف . ازهارها متعددة الالوان . اشهر انواعه ما يتبع .

٢١٥٦٥ - قَبْعة بيضاء
Patasite albus (S).
Pécasite blanc (F).
عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٨٠ سم . اوراقها كبيرة فارشة طولها نحو ٧٠ سم . وعرصها ٥٠ سم . نصلها ازغب البشرة اطبل اللون اخضر العروق السفلى . شراخها الزهري . يملو نحو ٨٠ سم . حراشفه خضر . ازهاره صفر .

٢١٥٦٦ - قَبْعة لنبجية
Patasite niveus (S).
Pécasite neigeux (F).
عشبة جبلية معمرة تملو نحو ٦٠ سم . اوراقها كبيرة ، مثثة ازوايا ، نصلها غثن الصفحة العليا البحرية اللون ازغب الصفحة السفلى الطحال . اللون . شراخها يملو نحو ٦٠ سم . ازهارها الى البياض اللبني .

٢١٥٦٧ - قَبْعة عطرية
Petasite fragrans, Nardosmia fragrans (S). Pécasite odoriférant, Héliotrope d'hiver (F).
عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها صلبة ، كلوية الشكل ، خضراء التصل عل صفحتيه ، مسنة الحافة . ازهارها بنفسجية اللون عطرية . عرفها يشبه الونيل . تزدهر الترين . ازهارها شوي .

٢١٥٦٨ - قَبْعة مخزنية
Pécasite officinal (F).
هي حشيشة القرماز ، اطليا .

٢١٥٥٢ - قَبْعيَّات *
Polemoniacae (S).
Polémóniacées (F). Polemoniacae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة مظهرها بري وبعضها زراعي تربي .

٢١٥٥٣ - قَبْعية
Monogénisme (F).
Monogenism (E).

وحدة الاصل والدرية . نظرية علمية ، ركيزتها التسلسل المنطقي ، توضح ان الاجناس البشرية تنفرع من قبس اصلي واحد .

٢١٥٥٤ - قَبْعرمة
Gonomeorrhée (F).
تصاب فرزي تكون انث افاله عاقرة أما ذكره فنائرة .

٢١٥٥٥ - قَبْص ، قَبْص
Fourmière (F).
Ant-hill, Ant's nest (E).
يجمع التل الكبير الكبير . وهو ما يدعى قرية وبشلة .

٢١٥٥٦ - قَبْصة *
Truxalus (S).
Truxale, Truxalis, Tryxalis (F). Truxalus (E).

حشرة قاضمة نطاطة من فصيلة الجراديات . اصطلحنا جميع الاصقاع الحارة والمعتلة الحارة من العالم القديم || جسمها كبير القده يطلو من ٣٥ الى ٤٠ سم . عته الذكر ويطلو من ٥٥ الى ٦٠ سم . عته الانثى . قوبها الى الكعبة الفراء يعلوها سواج اعصر ويجمعن امر . زباناها قلابيا الشكل ، متشابها اطول . اجنتها شفافة ملونة حراء القاعده ، وردية الشجاع ، حطليته الحاشية || تجوب المراعي والمواقع الرطبة من حزيزان الى آب || اضربها زعيدة لانها قليلة العدد .

٢١٥٥٧ - قَبْص
هو الانث ، اطليه .

٢١٥٥٨ - قَبْص *

Dermatohelys coriacea, Dermochelys coriacea (S).
Dermatohélyde, Dermochélide, Tortue-luth, Tortue-culr géante, Sphargis (F). Leather turtle (E).
سلطفاء بحرية بيوضة من فصيلة القبيصيات . كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة البشيات || اصطلحنا معتم بحار العالم . قوتها الاسماك والرخويات والنباتات البحرية والمرجان . لا تقرب من الشطوط الا في زين الاشلاق . محاضنها المشهورة شواطئ الهند والخليج والبرازيل || جسمها كبير القده ، يطلو من ١٨٠ الى ٢٥٠ سم . وذنها يراوح من ٥٥٠ الى ٩٠٠ كيلو . ذيلها سفني المادة والتركيب ، سبابي الاكثار القاطية المسترسعة عته قواعدها ، الضيقة والقصية التجميع عته اطرافها . زعظها ينسبط الصفحة . رأسها معتدل الجرم ، شبه اخطس . عتها غليظ ، معتدل الطول . قوامها خبطلة ، زعظية الشكل ، عادمة المقانب . قاتمها الاماميتان كبيرتان ، شليمتان ، مخروتا الى معتلتي مجدائتين لا يقل طولها من ٣٠٠ سم . ولا يتجاوز ٣٦٠ سم . || عويلها عته اقتناصها زماق صاصب شديد النقع || لحها مأكول .

٢١٥٥٩ - قَبْصيان *
Strombus lambs (S).
نوع من الدلاع وهو من الحلازين الكبيرة يحثف فيكون منه اطفاط الطيب .



قَبْعة




قَبْص



قَبْصان



قَبْعة




قبيل



قبيل



قبيل أخضر



قبيلة

وحيدات الاجهزة وقصيلة القشريات. انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. تعيش على الصخور المغمورة قرب الشاطئ || اصنافها غريبة قنية الشكل. اجسامها تأخذ اشكال الاصداف. رؤوسها بيضاء. افواهها مستعرضة تنتهي باعظام متفاعة الطول. لواسها مستطيلة ذلقة. حيواتها تحتل قواعد الاواس. خياشيمها وحيدة النصف تملو الحناجر الانامي من الرداء قرب الفتق. ارجلها وحيدة، كبيرة ورفيعة.

٢١٥٧٧ - قبليات ٥ Capulidae (S). Capulidae (F). Capulidae (E).

لمسلة حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل وحيدات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || تتميز باصنافها الغريبة التي يكثر فيها الشكل الشبي وبانواعها المستعرضة || اعرف اجناسها واشهرها القزوة والبابوبية والمقنة والوفش.

٢١٥٧٨ - قبيل Vent d'Est (F). Easterly wind (E). قبيل القبول : ريح الصبا.

٢١٥٧٩ - قبيل Acceptation (F). Acceptance (E). قبيل هو الرضا بما يمرض.

٢١٥٨٠ - قبيل ، موافقة Acquiescement (F). Acquiescence, Compliance (E). هو الرضا بعمل تم أو حكم صدر.

٢١٥٨١ - قبيل اختيار Levée d'option (F). قبيل عقد يقص فيه من كان خيرا في الشراء يهد مكتوب عن قبول الشراء بالشروط التي توافق عليها الطرفان.

٢١٥٨٢ - قبيل الكفيل Réception de caution (F). قبيل قبول كفالة شخص عنه المدين الى الدائن.

٢١٥٨٣ - قبيل اعية ، ائتمان Acceptation de donation (F). تصريح الموهوب له في القصد بقبول الهبة.

٢١٥٨٤ - قبيل تركمة ، قبول وصية Acceptation du succession, A. d'un legs (F). هو قبول الوارث أو الموصى له بما لحا أو عليه.

٢١٥٨٥ - قبيل شرطي ، قبول معقني Acquiescement conditionnel (F). هو اظهار الرضا أو القبول شرط ان يؤدي الراضي أو الغير الآخر عملا معينا.

٢١٥٨٦ - قبيل صريح Acquiescement exprès (F). قبيل هو القبول الذي يقرره القابل صراحة.

٢١٥٨٧ - قبيل ضمني Acquiescement implicite (F). قبول يدل عليه تفويت الاجال المحددة للعلن في مقد أو طلب أو حكم.

٢١٥٨٨ - قبيل مسكوت عنه Acquiescement tacite (F). قبول تدل عليه ، لزما ، بعض التصرفات ان كان معصدا صاحب الشأن أو غيره.

Anatina (S).
Anatine (F). Anatina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات فصيحيات الخياشيم وقصيلة القشريات. انواعها المعاصرة المعروفة المتعددة يكثر وجودها في بحار الهند ثم البحر الاحمر فالبحر الابيض المتوسط || اصنافها متباينة الاحجام ، لاقية الشكل ، قبابية ، فارقة ، رفيعة ، مالة ، شفاة ، عادية الخزانة والتعدد.

٢١٥٧٠ - قبيل ، صرب Cave (F). Cellar, Vault (E). بناء او دهلين وما اشبه يصلح لحفظ بعض الحاصل الزراعي الصناعية كالحمر والبن الخ. ج. اقباء.

٢١٥٧١ - قبليات Fressure (F). Pluck, Harset (E). قبليات هي السطع بمجموعة اعضاء الحيوان الداخلية التي تسقط من حساب الدم الغائم كالقلب والكسر والشمال الكرش ، الخ.

٢١٥٧٢ - قبيل ، قبول ، مزارعة Blettissement, Blettissure (F). Becoming over-ripe or sleepy (E). هو ابتداء دور اللدبر في الثمار وقد يكون ذلك بعد فطر الايناع || وهو في الاوراق دور اللدبر بعد الازدياب.

٢١٥٧٣ - قبيل * Antaxilus pedestris (S). Sauterelle des champs (F). جنس جنادب من فصيلة القشريات. انواعه خمسة. انوعها الى السمرة البنية الغضة الرقيقة. طولها يراوح من ١٧ الى ٢٧ سم. اقتضاها الخلفية تطول من ١٧ الى ٢٦ سم. اغمادها عند الذكور نحو ٤ سم. وعند الاناث نحو ٢ سم. مرزاتها تطول من ١٣ الى ١٨ سم. حذافرها هليية ، كواسلها لاحقة. اسراك ذكورها مغلطحة مسنة الصفحة الداخلية. تألف الارض البور ويكثر وجودها في القسم الثاني من فصل الصيف.

٢١٥٧٤ - قبيل أخضر * ، تقاطط أخضر Homorocoryphus nitidulus (S). Sauterelle verte (F). نوع من القبول أخضر اللون تحمل الجسم يطول من ٣ الى ٥ سم. رأسه غريبتي الشكل. رواشه كبيرة ، رفيعة ، شفاة. زبانا دقيقان مستطيلان. اشتره تطول نحو ٢٣ سم. تألف المراعي والحقول المزروعة. يرغب في النباتات التجليية وسها الزروع.

٢١٥٧٥ - قبليات Phasgonuridae, Tettigonidae (S). Phasgonuridae, Tettigonidae (F). Phasgonuridae, Tettigonidae, Long-horned grasshoppers, Geen meadow grasshoppers, Katyds (E). Laubheuschrecken (D). فصيلة حشرات من مستطيات الاجنحة. اجناسها عديدة اشهرها القبول. اجسامها متباينة الاحجام والالوان. قرونها الاستشعارية طويلة. ارجلها الخلفية قاذفة. اسرارها رباحية المقل. قرونها الشرجية لا عقدية. اشهرها مؤلفة من ثلاثة ازواج مستطيلة. ملاسها الشرجية عامة توجد في الذكور كما في الاناث.

٢١٥٧٦ - قبيلة Pileopsis (S). Capule, Cabochon (F). Pileopsis (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الارجل

اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاسحاق النابرة . جميع أنواعها الماصرة يمية قل ما تقترب من الشطوط . أسراها وأفره العدد . زناقتها رقيقة شفافة متفارة الانفلاق عادمة التفصيص الشفائي . أصداها كلسية المادة رقيقة الصدحات || أحرف اجناسها وأشهرها اقتبابة والقصعة والدوامة .

٢١٥٩٨ - قنات ، قنات Acacia du Sénégal (F). هو سوط السنغال ، اطليه .

٢١٥٩٩ - قنات الصمغ Astragal gommlifère (F). هو الاسطرافالوس البديق ، اطليه .

٢١٦٠٠ - قنار Neocosmospora (S). جنس تطور مجهرية من السناحيات لفصيلة المشويات أصنافها سطحية الارتكاز حر الششاء ، تكاثرها غروبية الشكل تحضن بيوضاً مستديراً أسير القرن || أنواعه عديدة جميعها حيودة كانوا يتخذون أنها مفطرة ويظنون لها بعض أمراض التعلل والبطنخ والتخيل .

٢١٦٠١ - قنار Orque (F). هو الاركة ، اطليا .

٢١٦٠٢ - قناب Bêc (F). هو الاكاف أو الرسل .

٢١٦٠٣ - قناب Intestin, Boyau (F). Bowel, Gut (E). هو المي . يقال أبو هيده : « القناب ما تحمى من البطن اي ما استدار منه وفي الحوايا وأما الامعاء فهي الاقصاب » . ج . آتباب .

٢١٦٠٤ - قنرة ، قنوم Affût (F). Stand for wait (E). ناموس الصائد الذي يشيده ليستر فيه عند الصيد .

٢١٦٠٥ - قنزال Calurus resplendens (S). Quetzal, Calure resplendissant (F). Quetzal (E). طائر من فصيلة الطرغونيات . موطنه بعض مناطق المكسيك وأمريكا الوسطى . يألف الإحراج الجبلية التي يراوح ارتفاعها بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ متر عن سطح البحر || طوله نحو ١٠٠ سم . منيا ٨٠ سم . الذنب و٢٠ للجسم . ثوبه متداخل الألوان الساطعة . رذاه وصدرة الى الخفصة اللحية المواج . يطن الى الحرة القريزية القائمة . عينه كستنية اللون . حواجبه سود . متقاده وساقه الى الصفار الاسمر . عزالان ذنب محبنا الاطراف || قوته الثار البرية والبرور والحشرات والدنويات الصغيرة || يطن عشه في صدفوع الإبحار الحرة . الاثنى تبين من ٤ الى ٥ . يبيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ثلاثة أسابيع .

٢١٦٠٦ - قتع الإبحاص ، حمار ساق التفاح Zeuzera pyrina, Z. aesculi (S). Zeuzère, Z. du poirier, Z. de l'olivier, Z. du marronnier, Coquette (F). Wood leopard, Leopard moth, Wood leopard moth (E). Kastanienbohner, Blausie, Roskastanienbohner, Apfelbohner (D). حشرة من فصيلة القتيصات حيوانا القد طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى البياض الاغبر . رواشها غيرة اللون تمليها رقة حنطية سوداء المواج . ريقها تطول نحو ٥ سم . ثوبها اغبر

٢١٥٩٩ - قتيبب Folin (F). Hay (E). هو الش ، ما ينس من الخشيش وجع وانخزن كملف .

٢١٥٩٠ - قتيبب Jusan (F). Ebb (E). القتيبب حركة المياجة عند ابتداء الجزر وسرعة تقلصه وإبابها .

٢١٥٩١ - قتيبب Polyplectron (S). Eperonnier (F). Asietic pea-cock (E). جنس طير من فصيلة الطرغونيات أنواعه المعروفة ١٠ جميعها من طيور الزايج والمند الصيفية . تألف المناطق الحرجية الجبلية . أبسائها قرية الشبه من التلوج ، أذبالها مستطيلة منقطة كاذبال الطلوس . تتميز بصيص أسفاها التي يراوح مدها بين ٢ و ٦ . قنارها تاجية منتصبة . أثوابها عديدة الألوان يكثر فيها الاخضر الاسفع والاريد الخشنى الاظرفى القتييج والتزييم || أنثاها تضع من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها رسدا في اناسيص رصمها بالفس والورق اليابس بين الادغال الكثيفة .

٢١٥٩٢ - قتيبب Mimeux (F). Mirnous (E). تمت تعريفي يطلق على كل نبات تفتيش اولاهه من القس .

٢١٥٩٣ - قتيبم ، قتيبم ، قنبرم Narine du porc (F). Nostril of the pig (E). هي نخرة الخنزير .

٢١٥٩٤ - قليل Calypse Heleneae (S). Calypse Hélène (F). طائر من فصيلة القريسيات . أعطاه بعض مناطق أمريكا الجنوبية . يعتبر أصغر صفور في العالم || جسمه يطول نحو ٥ سم . ثوبه متداخل الألوان الزاهية ، فيه الرمادي والاسفر والاصفر والاعضر . متقار وريق مستطيل || قوته الذباب والحوام ورسوق الاثمار . يطن عشه في الادغال . انثاه تحضن من مرة الى مرتين في الحبل . حشنتها من ٣ الى ٤ يبيضات ترخها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوما .

٢١٥٩٥ - قن Luzerne sauvage (F). هي القصة البرية ، اطليا .

٢١٥٩٦ - قنباة Cavolinia (S). Cavolinia, Hysle (F). Cavolinia (E). جنس حيوانات مجهرية من الرضويات مجنحات الارجل وفصيلة القنبايات . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ منها ٢٠ منتشرة في جميع مجار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ، وشرة انواع من متحجرات الاراضي الميسانية والبيسانية || أجسامها صغيرة القد ، مكورة الصفة البطنية ، ثلاثية الانسان أو الحيات ، كبيرة الزناصف القمية القليلة التفصيص ، لونها الى الصفرة يملوها مواج يختلف مع الانواع يكثر فيه الازرق والبنفسجي || أشهر أنواعها قنابة البحر الاخر الثلاثية الانياب الحادة .

٢١٥٩٧ - قنبايات Cavolinitidae (E). Cavolinitidae (E). فصيلة حيوانات مجهرية من الرضويات مجنحات الارجل .



قتيبب



قناب



قنزال



قنع الإبحاص



قَتِيبُ البَصْلِ

الرمادي والخضلي الاسمر . قرونها الإستثمارية قصيرة القدة ، مشطية الشكل . أنثاها أكبر قَدًا من ذكورها . مكنا مختلف الأشكال والألوان تحميه الإناث من سوء الأتجار .

٢١٦١٢ - قَتِينُوت *Chetodon saxatilis* (F).

هو يحمل الصفور ، أظلمه .

٢١٦١٣ - قَتَمُ الواحدة قَتَمَ . راجع ميرمين .

٢١٦١٤ - قَتَمَةُ

القَتَمَةُ نبات كزبرة الرائحة . (عجمل الحيط) .



قَتِيبُ الجَنَفَةِ

٢١٦١٥ - قَتَمِيَّات هي الميرسينيات ، أظلمها .

٢١٦١٦ - قَتَنُ * *Xerophile* (F). *Xerophilus* (E). نمت تعريني يطلق على النباتات التي ترغب في المناخات الجافة .

٢١٦١٧ - قَتَنُ * *Gerris* (S). *Gerre* (F). *Gerris* (E). جنس اسماء بحرية من فصيلة القَتَنِيَّات . أنزاعه المحروقة نحو ٢٠ أخطانها بجار البلاد الحارة اغصها اليسر الأحمر وشواطي الحند وسرنديب . اجسامها مبطلة ، عريضة ، قدو راحة الكف . زنايفها بارزة اغصها الظهيرة الشائعة للمقدم وللحرجية القارعة .



قَتِيبُ السَّاقِ

٢١٦١٨ - قَتَنِيَّات *Gerridae* (S).

Gerridae (E).

فصيلة اسماء مبطلة من شائكات الزنايف اجنتها وانواعها عديدة . اصطلحنا بجار البلاد الحارة . اصرفت اجنتها واشهرها القَتَنُ .

٢١٦١٩ - قَتَرَايَةُ ، قَتَامَةُ

Anemopaegma miranda, *Catuaba* (S). *Catuaba* (F). *Folia catuaba* (E). *Katuaba* (D).

جينة برية طيبة معمرة من فصيلة البنغوليات ، مهدها بعض اصفاغ البرازيل الى ساقها فراء تملو نحو ٤ امتار . فروعها مستطرفة فناء . اوراقها ابيدة ، متماعية ، معنفة ، ستانية التصلب الجلياد المايك الخشاش . انزاعها عقودي التجميع ، طرنج الاوتكار . انزاعها جريسية الشكل ، وردية اللون ، مرقتة بالايض والاصفر . ثمارها كاليسر شكلو قدأ لكها لا توكل لا اشترت بانها اقوى منط نباتي وضاعة لفسلس .



قَتِيبُ الصَّفَصَاتِ

٢١٦٢٠ - قَتِينُوت *Pteropterus* (S). *Pérotepe* (F).

جنس قتراد من فصيلة القَتِنِيَّات . انزاعه قليلة جينها عمياء صغيرة القدة يضيبة الشكل مبطلة طويلا نحو ملستر واحد . انزاعها الى الصفرة المخططة يملوها بعض الزراكش الجلوية . يركبها الطير والحفايش .



قَتِين

٢١٦٢١ - قَتِينُوت *Glyciphagus* (S).

Glyciphagus (F). *Glyciphagus* (E).

جنس حشرات مجهرية من فصيلة السكيات . انزاعه المرفقة ثمانية . اجسامها مبطلة تطول من ٤ الى ٥ اعشار المليمتر . اصطالحا ثمانية ماصة . ظهورها مشطية حباب دقيق مستطيل . قوائمها اربعة أزواج . انزاعها تراوح من انقرة السمراء الى السمرة المخططة الملوحة || تركب جمع الملوحة الصغيرة والثلاثية والرباعية عتة عتة وبعد تفتح والظهور الجافة . وقد تصيب الانسان في يديه ورجليه تسبب له



قَتِين

اللون تشوبه حرة ارجوانية ورشة سوداء . رأسها ودقاتها الصدرية والدرجية كستنية اللون . وهي تعيش من ٢٤ الى ٣٠ شهراً تركب سوق الاجاص والفراخ والسفرجل والزيتون والورداء ... تنتفخها وتعلبها || تظهر الفراشة من حزيران الى تموز . الذكر منها اصفر قَدًا من الانثى . زمن كويها يدوم نحو الشهر ينتهي بفتح الممكن على السوق ثم ينقث الكن بعد ذلك بضيعة ايام من رقات دقيقة يتأخر عليها التخريبي فور انسلخها الأول .

٢١٦٢٢ - قَتِيبُ البَصْلِ * ، دَسِيْسَةُ البَصْلِ

Dyspessa ulula, *Endegria ulula* (S). *Dyspessa des oligans* (F).

حشرة من القَتِنِيَّات صغيرة القدة طويلا نحو ١٠ م . وبسطها ٢ م . ثوبها ايض اللون حطلي الملوحة . روشناها الاماميان الى الياض الاطحل يملوها تبييض حطلي واصفر . روشناها الخلفيان سمر العروق بيض الاهداب || تظهر الفراشة من نيسان الى ايار ومن تموز الى آب . لها جيلان في الحول . ريقها صبرة القدة سمراء اللون تركب مختلف انزاع يصل الزينقيات . يكثر وجودها على البصل في حزيران وفي ايلول .

٢١٦٢٣ - قَتِيبُ الجَنَفَةِ * *Paropota paradoxa* (S).

Paropota paradoxal (F).

حشرة من القَتِنِيَّات . فراشها متوسطة القدة سمراء الثوب مبقية الرواشن المهدية . ريقها قصيرة ، غليظة ، حنطية اللون جلوية الملوحة تركب الجفنة قتردها تحت القشور .

٢١٦٢٤ - قَتِيبُ السَّاقِ * ، حَقَّارُ السَّاقِ

Cossus cossus, *C. ligniperda*, *Trypanus cossus* (S). *Cossus gâte-bois*, *Gâte-bois* (F). *Gout-moth* (E). *Weidenbohrrer* (D).

حشرة من القَتِنِيَّات ، فراشها خضمة غليظة سمراء اللون . روشناها حنطية يملوها تبييض ودي ، وتوتش ، وتجنيس . وهي ريقها تعيش من سنتين الى ثلاث سنوات وهي جلوية الثوب ، سمراء الظهر ، مشطية اللدب . تركب سوق واغصان وانزاع بعض الاتجار المشرة والحرجية فتتفرخ وتعلبها ، منها الاجاص والكرز واللوز واللوز والخوخ والمشمش والقرز والاكينديا والربان والزيتون والسنديان والحور والصفصاف .

٢١٦٢٥ - قَتِيبُ الصَّفَصَاتِ *

Cossus henleyi (S). *Cossus du saule* (F).

حشرة من القَتِنِيَّات . فراشها صغيرة القدة طويلا نحو ٢٥ م . اما بسطها فتراوح بين ٤٢ و ٥٥ م . ثوبها الى الربة العلوية روشناها الاماميان الى الكمية الحنطية الملوحة تتخللها حروق سمر . روشناها الخلفيان افتح لوناً من جسمها || ريقها مستطيلة الشكل ، تيلج ، عتة كالك دونها الحياتية ، نحو ٦ م . ثوبها في اول عهدا يدو ودي اللون ثم ينصرف تدريجياً نحو الجلوية تشوبها صفرة شاملة ويقيم سيد وريمية تملو جميع صفقات الجسم ما عدا الحلقة الصدرية الاول || وهي تركب الصفصاف والسبط والائل والحور . تحفر السوق في شكيرها تحت القلتل فتتخذها اشد الاندي .

٢١٦٢٦ - قَتِنِيَّات *Cossidae*, *Zeuzeridae* (S).

Cossidae, *Zeuzeridae* (F). *Cossidae*, *Zeuzeridae*, *Carpenter moths* (E). *Holzbohrrer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجنتها وانزاعها زهاء ٦٥٠ مظهرها جلوي للسر . اجنتها لا قياسية القدة . رواشها كبيرة . رواشها عديدة ينقلب لها

٢١٦٢٧ - **فَتَاءُ ثُعْبَانِيَّةٌ** * ، زَهْرَةٌ شَعْرِيَّةٌ
Thrichosanthes angula (S), *Thrichosanthes serpent*,
Patola, *Serpent végétal* (F), *Serpent gourd*,
Serpent gourd, *Viper gourd* (E), *Haarblume*, *Sinesticher*
kürbis (D), *Serpentone*, *Zuccetta cinese* (I).

نوع من قمرع الحشخشة القرعيات وهو نبات عشبي
 حولي حاشئ ساقه تطلو نحو ٥ أمتار. أوراقه ثلاثية أو
 خماسية التفتيس، انزعاج جميلة الشكل مهدبة البتلات
 البيضاء، ثماره اسطوانية مستطيلة ملتصقة بملوك طويلا
 بأرواح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٤ إلى ٥ سم.
 لوفا في أول عهدا إلى الخضار البحري يطبو تسليج
 أبيض، ثم ينحرف تدريجاً إلى أن يستقر عند النضج
 على الأصفر البرتقالي || ثماره مأكولة وتطبخ كالقوياء
 وغيرها من البقول.

٢١٦٢٨ - **فَتَائِيَّاتُ الْبَحْرِ**
Holothuridae
 رتبة حيوانات بحرية من شعبة الفوكيات.

٢١٦٢٩ - **فَقْد**
Concombras (F).
 هو الخيار وأشدته قلدة.

٢١٦٣٠ - **فَقْدَرْد**
Moignon sec (F), *Dry stump* (E).
 النشاء اليابس في أصل الشجرة والكرمة.

٢١٦٣١ - **فَقْعَبَانٌ** * ، **فَقْعَبَانٌ** *
Lixus (S).
Lixe (F).

جنس حشرات قارضة ناعرة من فصيلة السويات. أنواعه
 نحو ٣٥٠ جميعها مستطيلة الشكل مقطعة، طويلا بأرواح
 بين ٨ و ٢٢ سم. أطرافها عديدة يكثر فيها الأسود والأصفر
 والحطبي يطولها طيل أصفر أو أسف. رفاقها دقيقة
 غفراء اللون متشعبة الظهر تمشي داخل الراديب التي
 تحفرها في سوق النباتات البقلية والصناعية والمروحية التي
 تركبها أعصها الشوذر والمفوف والتنج والبزيم والنخل
 الخ.

٢١٦٣٢ - **فَقْعَبٌ مُسْتَطِيلٌ**
Lixe elongé (F).
 حشرة تدعى لكسون مستطيل، أطولها.

٢١٦٣٣ - **فَقِيْثٌ** ، **وَدِيْةٌ**
Pousse (jeune) (F).
Shoot (young) (E).
 النسيلة الفتية جاز اقتلاها من أروبيتها.

٢١٦٣٤ - **قَيْمَة البُوط** *
Phragmatiphila typhae, *Nonagria typhae* (S).
Phragmatiphila des massettes (F), *Phragmatiphila*
typhae (E).

حشرة من النسيقات حشرقيات الاجتمعة. موطنها يمتد
 من الشرق الأقصى إلى أروبة وإفريقية الشمالية. الفراءة
 بياضة قوتها رحيق الاثمار. السرقة خاضلة كثيفة تمشي
 في أول عهدا على أوراق النباتات المتفتحة ثم حل البوط
 والقصب فتضبط صلاحياتها وتعيش في داخلها حتى نهاية
 طور الاكمال || جسمها مستطيل الجرم يطول نحو
 ٢٢ سم. بطنها نحو ٢٦ سم. رأسها حطبي اللون يطلو
 منخس قرني المادة. عيناها كبيرتان. زباناها خفيفان.
 جوشها وبطنها إلى الحطبي الصناعي المواجه || روافدها
 صغيرة الحجم. الأزواج الامامي، عند التقاء، إلى
 الحطبي الصناعي يطلو تمشي وتبيض وتنشيط كسني.
 روافدها الخلفيان إلى الحطبي الانشع المواجه يسر بعض

حكاكا منضبا يبيع بشرة الجله. يقضى على الحكاك
 باستعمال الكحول عيار ٧٥°.

٢١٦٣٥ - **قَيْمَة** ، **قَيْمَة** ، **مَيْمَتِي** ، **فَقْعُوسٌ** ، **فَقْعُورٌ**
Cucumis sativus flexuosus (S), *Concombre serpent*,
C. flexuosus, *Melon serpent* (F), *Serpent cucumber*,
Curving cucumber (E), *Schlaugengurke* (D), *Cocomero*
serpente, *C. di turchia* (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات اصغاره
 اربعة او خمسة مترات. اوراقها طويلة الزناد مفصصة.
 ثمارها اسطوانية، مستطيلة، خلية البشرة في أول عهدا.
 طويلا بأرواح بين ٣٠ و ١٠٠ سم. وقطرها من ٣ إلى ٨
 سم. لوفا إلى الخضار المالح وبها البشري والاذخر الاصفر.
 طعمها بين الحار والكوي || تكثر زراعتها في البلاد
 الحارة. رغب في الارربة المتوسطة الانساج والرطوبة.

٢١٦٣٦ - **قَيْمَة الْبَحْرِ** * ، **عَيْمَارُ الْبَحْرِ** ، **دُبْ**
الْبَحْرِ
Holothuria (S).
Holothurie, *Biche de mer* (F), *Holothurian*, *Sea-*
Slug, *Sea-cucumber* (E).

جنس حيوانات بحرية من فتائيات البحر. انواعه عديدة
 جميعها اسطوانية عديمة الجسم المستطيل، مدية الطرف،
 خنوقة الفت، فائضة الحواس القمية التي بأرواح عدها بين
 ١٦ و ٢٠ || اعرف انواعه واشهرها. الثلاثة التالية:

قَيْمَة الْبَحْرِ الْاُبْرِي
Holothuria tubulosa (S).
 يكثر وجوده في المتوسط يعيش بين صخور الكشال.

قَيْمَة الْبَحْرِ الْمَأْكُول
Holothuria edulis (S).
 يكثر في بحار الصين وإسراييلة والخليج الفارسي والبحر
 الاحمر.

قَيْمَة الْبَحْرِ الْمَصْرَافِي
Holothuria intestinalis (S).
 موطنه بحار الشمال وهو مستطيل الجسم النثيق.

٢١٦٣٧ - **قَيْمَة الْخِطَار**
Ecbale (F).
 هو القنء البشري نبات يعمل ثمرًا كالثقاة من العلم
 كونه الرائحة يحسب بخصاره ليرقان الاصفر فيقلد
 من الانفة مادة صفراء يزيل اليرقان باستعمالها. (ا.م).

٢١٦٣٨ - **قَيْمَة الْحَنْد**
Bel indien (F).
 هو الايكل أو البيل، أطولها.

٢١٦٣٩ - **قَيْمَة بَرْي** * ، **قَيْمَة الْحِمَار** ، **فَقْعُوسٌ**
تَقْمِيرٌ ، **عَوَزُورٌ** ، **أَطْرَبُونٌ**

Ecballium elaterium, *Momordica elaterium*, *Elaterium officinale*, *E. agreste* (S), *Ecbale*, *Cornichon*
d'âne, *Concombre sauvage*, *Giclet* (F), *Squirting*
cucumber (E), *Echte Springsgurke* (D), *Cocomero*
asinino, *Eelasterio*, *Ponocini salvatici* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة القرعيات. يعيش في المزارع
 الرطبة. أوراقه تشبه أوراق القنء والاذخر تطلبها وتأكلا.
 ثماره رنية، مستطيلة، جسمها حبيبي يفيض الؤز، تنفصل
 عن الساق عند نضجها وتقلد بزورما بعيدا عند الضغط
 عليها وهي سامة يستخرج من صميرها مادة قمالة تدعى
 أيلاندر يوم تعبر من المسهلات المنيفة وما استعمالها الطبي
 المعروف.



قنء البحر



قنء بري



قنء ليمانيه



قنء



قنء بوط



فُحَّاج

Houppler (F). ٢١٦٤٥ - قَحْمَة ، يَفَّاح

Crown (E).
الشجرة اقتطعت أغصانها حتى السنة . ج قحام ويقوم .

Maroute (F). ٢١٦٤٦ - فُحْرَان
هو الاقمارون الحُصن ، اطلابه .

Décroptitude (F). ٢١٦٤٧ - قُحْمُونَة
Decreptitude (E).
القنوصة حالة الهرم وما ينتج عنها من وهن .

Cranis (S). ٢١٦٤٨ - قُحْمِيَّة *
Cranie (F). Cranie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل
وفصيلة القحفيقيات . انواعها المعاصرة المرفوعة قليلة العدد
بعضها من صلب البحر الابيض المتوسط والبيض الآخر
يوجد الى المحيط الهندي || امداها لانتشارها بالمضاريع ،
شبه مستديرة الشوزن ، مسطحة الصفحات السفل الثلاثة
القفوب ، محبة الصفحات العليا المجهزة من الداخل بكتابين
نلشرين || تعيش لاصقة بالصخور المدورة القليلة النمو .

Cranidae (S). ٢١٦٤٩ - قُحْمِيَّات *
Cranidés (F). Cranidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل .
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات
الطبقة الارضية الاول وبعضها يعود الى الطبقة الطباشيرية .
اما الانواع المعاصرة قليلة وتعيش في بحار البلاد الحارة
والمعتدلة الحارة . جميعها ملتحمة باصدانها ، عادية
الويقات العلوية || اعرف اجناسها واشهرها التحففة
والقنوصة .

Cottus (S). Cotte (F). Bull-head (E). ٢١٦٥٠ - قَدَّ *
جنس اسماك صغيرة القند مسطحة الشكل من فصيلة
الطريخيات الشائكات الزعانف || انواعه عديدة منها
البحرية والبرية جميعها تعيش في المسق . حولها دون المادي .

Chaboissau (F). ٢١٦٥١ - قَدَّ بَحْرِي *
Short-spined (E).

نوع من القند موطنه البحار يعيش قرب الشواطئ المصرية
المسماة القنور . جسمه ادليبي الشكل مستطيل الزعانف
الشائكة . رأسه كبير القند طوله يمازي الزام الاول من
الجسم . ثوبه متراكب الالوان فيه الازيوش والاسمر والجزوي
والاشقر || اشواكه زمالفه حادة مؤذية غشائها الصيادين .

Cottus gobic (S). ٢١٦٥٢ - قَدَّ تَهْرِي *
Chabot (F). Father-lasher (E).
نوع من القند يعيش في المياه العذبة . وهو سمكة صغيرة
القند ، كبيرة الرأس والزعانف الحادة الشائكة . ثوبه
متداخل الالوان المراكية . لحمه كرهه الطعم لا يؤكل .

Arôme (F). Aroma (E). ٢١٦٥٣ - قَدَّأ *
الرائحة الطيبة . يقال فاح قداه .

Fleurs de bigaradier (F). ٢١٦٥٤ - قَدَّاح *
Flowers of a Seville-orange tree (E).
القداح هو زهر التارنج او التفاح . ويهم من قال نور
النبات قبل ان يتفتح . اطراف الثيت القفس .

التي . عند اقترابه من الحمار الخاريجي || لها جيل واحد
في الجيل . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى اواخر
ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو ستة
اسباح ويمتد المكن لطفاً على الصفحات السفلى من فصال
الاوراق || السرة تقطع نحو ٣٤ سم . جسمها شبه اسطواني
الشكل ، حاجي اللون ، تنهي الموج يطول بعض الحلب
القصور الاغبر . رأسها اسود منها ورواجها الى السرة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي
داخل سلامة البرود او القصب .

٢١٦٣٥ - فُحَّاج *
Pagrus (S).
Pagre (F). Braize, Porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات الشائكات
الزعانف . انواعه نحو ١٥ اصنافها بحار البلاد الحارة .
اجناسها يفضي الشكل مسطحة طولها يراوح بين ٢٥
و ٧٥ سم . زمالفها كبيرة ، الشرجية منها غارقة . فلوها
رقيقة مسننة . ألوانها متداخلة الالوان ، ظهورها ودية
او مرجانية ، بطونها فضية . حولها قليلة العلم مرغوب
لها || اشهر انواعه :

Pagrus vulgaris (S). الفُحَّاج المبدول
Pagre commun (F).

سمكة شبيه بالمرجان . شائعة في المتوسط .
الفُحَّاج الارقي . Pagre orpheus (S). Pagre orphe (F).
سمكة مسطحة القند مسطيلة الخلف تكثر في شمالي المتوسط
رغل شواطئ الاطلسي .

٢١٦٣٦ - قُحَّاب *
سمال الخيل .

٢١٦٣٧ - قُحَّار *
سمال الابل .

٢١٦٣٨ - قُحَّاف *
هو السيل الجارف .

٢١٦٣٩ - قُحَّالَة *
Benne préneuse (F).
Grab-bucket (E).
جهاز آلي يستعمل لرفع التراب والحجارة ونقلها من مكان
الى مكان .

٢١٦٤٠ - قُحَّال *
داه يصيب القم تجفف جلودها .

٢١٦٤١ - قُحَّامَة *
Catabolisme (F).
Catabolism (E).
علم يبحث في دور انحطاط الكائنات الحية .

٢١٦٤٢ - قُحَّط *
Orontium (S).
Oronce (F). Floating arum (E).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القلقاسيات .
انواعه قليلة اصنافها متناقع وضفاف بحيرات البلاد الحارة
اغصانها ضفاف الماصي . اوراقها قرصية الانتشاح
منقطة اعليجية ، نصليها بطول ١٢ الى ٣٠ سم .
ويبرس من ٥ الى ١٢ شمراخها الزهري يطول نحو ٥٠ سم .

٢١٦٤٣ - قُحْف *
Crâne (F).
القحف هو الجمجمة او عظماها .

٢١٦٤٤ - قُحْل *
Aspermie (F).
Aspermatism, Aspermia (E).
التعلل اعدام الحويئات التنوية في المذي وأنعدام البزود
في ثمار النبات .



قَدَّ



قَدَّ بَحْرِي



قَدَّ سَهْرِي

Altise du tabac (F). **٢١٦٦٥ - قَدَادَانِ التَّبَاقِ**

راجع التيز التبغ .

Altise des céréales (F). **٢١٦٦٦ - قَدَادَانِ الزَّرْعِ**

راجع التيز الزروع .

Altise de la vigne (F). **٢١٦٦٧ - قَدَادَانِ الْكَرْمَةِ**

راجع التيز الكرمة .

Chaton (F). Setting of a gem (E). **٢١٦٦٨ - قَدَدُكْ**

هي الحمرية ، نظام هجرية يرتكز على سبله مركبة من ازهار وحيدة البثق .

Gobelet, Vase (F). **٢١٦٦٩ - قَدَدَجْ ***

Goblet, Vase (E). شكل من اشكال التقليم في الاشجار .

٢١٦٧٠ - قَدَر

القدر دائرة نجوم من كوكبة قيفاوس .

Puissance (F). Power (E). **٢١٦٧١ - قَدْرَكْ**

هي القوة على الشيء والتمكن منه .

Interligne (F). **٢١٦٧٢ - قَدْرَكْ**

Interlining, Space-line (E). هي الفراغ أي المسافة بين الزردق والزردق في الفرس المنسق .

Kadsura (S). **٢١٦٧٣ - قَدْرُصُورَة**

Kadsura, Kadsoura (F).

جنس جنبات برية وريضية من فصيلة المنطليات . أنواعه عديدة منها الشرق الاقصى . سيقانها فروع تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضاء ، متعاقبة ، متعققة ، ازهارها فردية التجميع ، ابليطة الارتكاز . ثمارها انورية ذلولية القشور || اشهر انواعها واعينها زراصة القصدوره اليابانية .

٢١٦٧٤ - قَدْرُصُورَة يَابَانِيَّة *

Kadsura japonica (S). Kadsoura du Japon (F).

نوع من القصدوره الزراعية والريضية وهي جنبة جادحة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اعطليجية ذرية ، تصلها جامد المنقطة مالمس البشرة . ازهارها الى البياض الاخير يطولو موج اصفر . ثمارها الى الحمرة القرمزية . افتادها واوراقها تستعمل في صناعة الورق . تنبع افانها واوراقها يستعمل في تنظيف الشعر من مواده الدهنية .

Anthèse (F). **٢١٦٧٥ - قَدَفْ ***

نمن فطر الزهرة أي زمن افتتاح فجرة الطلع .

Caranx trachurus (S). **٢١٦٧٦ - قَدَقُودْ**

نوع من الشم وهو سمكة بحرية مستطيلة الشكل طولها نحو ٥٠ سم . مرتها المياه الاقليمية ، توجد في المتوسط . لحمها مستحب الطعم مأكول .

Lignée (F). Issue, Progeny (E). **٢١٦٧٧ - قَدُورْ**

السلالة المنتجة من صرم معرف الصفات الشريفة .

Phophila (S). Philophile (F). **٢١٦٧٨ - قَدُودُحْ ***

جنس حشرات صغيرة القند ثنائية الجناح من فصيلة القندوسيات . انواعه عديدة انواعها الى البصرة اللامعة ،

Astragale (F). **٢١٦٥٥ - قَدَادْ**

هو الاسطراغاليس . اطلية .

Cricetus (S). Cricet (F). **٢١٦٥٦ - قَدَادْ ***

Cricetus (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية من الثأريات . انواعه عديدة موطنها العالم ، منها ١٣ مهدا العالم القديم . اجسامها رمية . رؤسها مخروطية . قاضها مقطوعة . آذانها متوسطة القند . جرائدها واذانها قصيرة . انواعها مختلفة الاخوان . بينها ناعم قصير ، صفوها جامد مستطيل || اعرف انواعه واشهرها :

Cricetus nigricans (S). **٢١٦٥٧ - قَدَادْ اَسْمَرْ**

Cricet noirâtre (F).

نوع من القداد موطنه شرقي البحر المتوسط . يوجد في جبال لبنان من حلو ١٢٠٠ الى ١٨٠٠ م . طوله نحو ٣٠ سم . وذنيه ٣ سم . ثوبه الى الزيدة السراء يطلو موج اسود ، ظهره احمر من بطنه || يألف الاسراج والادخال قوته المواد النباتية والعفوية .

Cricetus arenarius (S). **٢١٦٥٨ - قَدَادْ الرِمَالْ**

Cricet des sables (F).

نوع من القداد موطنه الشرق الاوسط والقفقاس واروپة . ثوبه الى الزيدة البطلحة . طوله الكامل نحو ٢٧ سم . يألف المناطق الرملية والجرف المغلة المليدة .

٢١٦٥٩ - قَدَادْ هَمْسْتَرْ ، قَدَادْ اَلْهَمَانِي

Cricetus frumentarius (S). Cricet Hamster, Hamster (F). Hamster (D).

نوع من القداد طوله ٣٠ سم . وذنيه ٣ سم . ثوبه الى الصفار الخفي يطلو موج اخضر . قمقه ابيض . جبهة موشية خط اسود . خداه الى الصفرة . عنقه الى الصبغة الصنائية . بطنه الى البصرة الباقية || موطنه بعض المناطق الاروپية انحصا الماتيه والاعزك || جعده رطب الارباء يقينه في الحرم حل عنق يراوح بين المتر والمترين . وهو مؤلف من جرة وسطى فسيحة ونفق مستطيل تعرضه من اليمين واليسار عدة دهاليز مستطيلة يحزن فيها ما به من سطة وفيها من الحبوب || انشاء تضع من ٤ الى ٨ ادراص رضعها ثلاثة اسابيع .

Cricetines (F). **٢١٦٦٠ - قَدَادِيَّات**

عزارة حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الثأريات اجناسها وانواعها كثيرة موطنها العالم . انواعها الامريكية فقط تمه ٨٢ جميعها رمية الجسم قصيرة الجرازم والاذنب . قوتها الحبوب وبائر المواد النباتية .

Yanne (F). Westergate (E). **٢١٦٦١ - قَدَدَاسْ**

القَدَاسْ حاجز ينصب على مصب الماء لتقنين كمية النسياب .

Altise (F). **٢١٦٦٢ - قَدَادَانْ**

هي الاتيز جنس حشرات من النضاريات .

Altise bleue (F). **٢١٦٦٣ - قَدَادَانْ اَزْرَقْ**

راجع التيز زرقاء .

Altise potagère (F). **٢١٦٦٤ - قَدَادَانْ البَقُولْ**

راجع التيز البقول .



قَدَادْ



قَدَجْ



قَدُصُورَة يَابَانِيَة

Occipital - قَدَكِي ، قَدَسِي
نمت تمرني يطلع على كل ما هو غرض بالقدال .

٢١٦٩١ - قَدَائِيَات

Aphanipetres, Siphonaptères (F). Aphaniptera, Siphonaptera (E).
رَبَّة حشرات صغيرة القند من طبقة دميات الجناح .
فصائلها خمس أما أجناسها وأنواعها فنحو ٥٠٠ || أجناسها خائفة الجوارب المصغرة ، هليّة الرَبَّة المنسجبة الى الوراء .
روبوها صغيرة القند ، حرياتها بسيطة .
قرونها الاستشعارية تحيلة مركبة من ثلاث فواصل .
مناك أخطاها ثاقبة ماصة .
أربطها قوية مدة للقفز || وتتميز افراد بعض فصائلها بصفت أو صفين من الانسان تعرف بالمشط وهذا المشط قد يكون عدي أو صدي الايتكساز .
ذكورها اصغر من انثاها تحمل هذه الكرم في قصبتها المنتفخة نحو العلاء || اخبر فصائلها البرغوثيات .



قُدُوح الجبن

Vexille (F). Vexillum (E). ٢١٦٩٢ - قَدَقْ

القدة تصل الريفة .
وهما قتلان ، القدة الوحشية اي الخارجية والقدة الانسية اي الداخلية .

Ejaculation - قَدَقْ

راجع انفاق .

Balistique (F). Ballistic (E). ٢١٦٩٤ - قَدَقِيَّة

القذيفة علم يبحث في ربي القذائف اي في ضبط حساب ملى الحرس وتسليله .

٢١٦٩٥ - قَدَرْ

هو حبل القتر .

Froid (F). Cold (E). ٢١٦٩٦ - قَرَرْ

هو البرد الشديد .

Poussin (F). Chick (E). ٢١٦٩٧ - قَرَرْ

صغير الدجاج . هو الصوص ولكتكوت .

٢١٦٩٨ - قَرَرْ ، وَدَقِي

Chaleurs, Durée du rut (F). Heats, Duration of the rut (E).

مدة استمرام انثى الحيوان أو زمن ودقها وقد يدوم عادة نحو ٤٨ ساعة وهو يعاود كما يلي :

بعد الوضع

— بتسعة ايام عند الفرس

— بعشرين يوماً عند البقرة

— باربعين يوماً عند الخنزيرة

— باربعة أو ستة اشهر عند الشاة

عند الانثى غير الحامل

كل ٢٥ يوماً عند الفرس

كل ٢٠ يوماً عند البقرة

كل ٢٠ يوماً عند الخنزيرة

من ١٥ الى ٢١ يوماً عند الشاة

٢١٦٩٩ - قُرَاب

سمكة بحرية تدعى شم قراب ، اعطيا .

Gaine ovarique (F). ٢١٧٠٠ - قُرَاب بَيْضِي

Ovaric sheath (E).
حضر من شوار اناث الطير والخرشتر وهو وهاء جراي الشكل يتكون فيه البيض



قَدَقْ

جربها هراكة نائلة تركب مختلف المواد العضوية اعصها الجبن والذهن || اشهر انواعه قُدُوح الجبن .

٢١٦٩٩ - قُدُوح الجبن

Plophile du fromage, Mouche du fromage (F).
نوع من القُدُوح وهو ذبابة صغيرة القند طولها نحو ٣ سم .
توجهها الى السمرة السوداء ، مقدمها وارجلها الى الصلبة ،
حرياتها حر .
تجمع مكانها في الجبن فينتفخ عن رقات دقيقة تحيلة تعيش على الجبن فتختره وتطعمه .

٢١٦٨٠ - قَدُوسِيَّات

Plophilidae (S).
Plophilidae (F).
نصيلة حشرات من ربة ذوات الجناسين .
اجناسها وانواعها قليلة ، جميعها من الذباب الموراك النازل الصغير القند المستطيل الاربعي || رقاتها تعيش على المواد العضوية الخسرة وصل الحوم المتفددة والجبن والسمك ...

٢١٦٨١ - قَدِيَّات

Cottidae (S).
Cottidae (F).
نصيلة اسماك من شالكات الزعانف .
اجناسها وانواعها قليلة العدد تقسم الى تسعين قسم الاسماك البحرية التي تقضي حياتها في البحار وقسم الاسماك البحرية التي تعيش في المياه العذبة .
جميعها من الاسماك المسنجة الشكل ، كبيرة الرؤوس ، صغيرة الاجسام المسنجة ، مستطيلة الزعانف الحادة الشائكة لحومها دنيئة الصف .

٢١٦٨٢ - قَدِيَّات

نصيلة نباتية تعرف بالخريرات ، اعطيا .

٢١٦٨٣ - قَدِيد

Vande desséchée (F).
لحم مقعد .

Dried meat (E).

٢١٦٨٤ - قَدِيَّسِيَّات

هي القردقيات ، نصيلة نباتية ، اعطيا .

٢١٦٨٥ - قَدُوسِيَّات ، لَامَرْكِيَّة

Lamarckia (S).
Lamarckia, Codion, Elaeodendron (F).

جنس نباتات عشبية برية من التبليات المكروشيات .
انواعه المعروفة عديدة منها براري حوض البحر الابيض المتوسط || اورالها صفية النصال المسطحة .
ازهارها سليل التجميع .
سبيلاتها صغيرة .

٢١٦٨٦ - قَدَقْ

Branchipus (S).
Branchipe (F). Branchipus (E).

درية من القشريات الدنيا غشيميات الاطراف .
تعيش في المياه العذبة .
جسمها عادم الحافات ، مستطيل الشكل ، طويل نحو ١ سم .
عينها مزنةتان .
زباناها مستطيلان عند الذكر .
قوائمها الصدرية صفيمية الشكل .
تدوم على ظهورها .

٢١٦٨٧ - قَدَاف

Brachyne (F).
هي الرائة ، اعطيا .

٢١٦٨٨ - قَدَاف أحمر الرأس

Brachyne crépizant .
هو الرائة الحمراء الرأس ، اعطيا .

٢١٦٨٩ - قَدَاف ، قَدَقْ

Nuque (F). Nape (E).
جماع مؤخر الرأس ويقل ما بين فقرة القفا الى الاذن .
والقدال من الفرس مقعد المذار خلف الناحية .
ج قَدَقْ وأقذلة .

٢١٧١٤ - قَرَامِسْ هُو البراد، اعليه .

٢١٧١٥ - قَرَامِسْ ، قَرَامِسْ ، حَرْمِيَّ ، أَنْجُرْمَة
Urtica (S), Ortie (F), Nettle (E).

جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة القرصيات
أصولها المروفة ٣٠ أصلها البلاد الممتدة الحارة . سواها
منتشرة فراء . أوراقها معتقة متقابلة أو متعاقبة . نصلها
مؤنفة المهاد زغبها حليبي دقيق يفرز عصارة حمرة ترتكز
على الحامض التل وهو يشبه بين يسه ينبج الجلد
وبلهي || أضرارها خضراء اللينة وحيدة أو ثنائية المسكن .
يزورها طيبة صديقة الفوائد مثيرة لرغبة الجلوس وقد تصاف
في العطارة إلى أكثر الادوية المنبهة المستعملة لهذه الغاية .
والقرص الجاف يفقد الخواص اللامعة بعد انحلال الحامض
التل || أعرف أنواله وأشهرها الكاري والكبير وأخرق .

٢١٧١٦ - قَرَامِسْ كَذَابِ Lamier blanc (F).
هو اللابيين الأبيض ، اعليه .

٢١٧١٧ - قَرَامِسْ كَنَارُ ، قَرَامِسْ رُومَانِي ،
نبات النار Urtica pilulifera (S).

Ortie à pilules, O. romaine (F), Roman nettle (E).
Pillennessel (D), Ortica romana (I).
نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طيب يحول يكثر
في البساتين والحقول . ساقه دقيقة زب . أوراقه معتقة ،
متعاقبة ، أحليبية ؛ نصلها حشن البشرة ، سن الحافة ،
كثيف الملب الشاك . أثماره وحيدة المسكن خضراء اللون .

٢١٧١٨ - قَرَامِسْ كَبِيرُ *
Urtica dioica (S), Ortie dioïque, Grande ortie,

Ortie puante (F), Stinging nettle, Large nettle (E).
Grosse Brandnetel, G. Nessel, Brennessel (D), Ortica
grande, O. maschia, Orticaone (I).
نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طيب حولي يكثر
في البور وقرب السياجات . ساقه فراء عالية . أوراقه
مستطيلة الزايم الأخير ، سلة الحافة ؛ نصلها كثيف
الحمل الثقيل مبهر الملب المستطيل . أثماره ثنائية
المسكن .

٢١٧١٩ - قَرَامِسْ صَحْرِي * ، قَرَامِسْ الصَّخْرُوزِ

Urtica urens (S), Ortie brûlante, Petite ortie (F).
Small nettle, Dwarf stinger (E), Kleine Nessel (D),
Piccola ortica, Ortica ardente (I).

نوع من القراص وهو نبات عشبي بري طيب حولي يعيش
إنما كان وفي أي تربة كانت . ساقه قصيرة فراء زب .
أوراقه بيضية الشكل منشارة الحافة نصلها لبد الحمل
الحليبي الشاك . أثماره وحيدة المسكن .

٢١٧٢٠ - قَرَامِصِيَّ * Prunus cerasifera (S).

Prunier cerise (F).
نوع من الفروع شجرة صغيرة القند تلون من ٣ إلى ٤ أمتار .
ساقها فراء . أوراقها أحليبية النصل شديدة الخضار العابق .
ثمارها مأكولة وهي كرزية الشكل والقند ، بنفسجية اللون ،
خضراء المواج .

٢١٧٢١ - قَرَامِصِيَّاتِ Urticaceae (S).

Urticacées, Urticées (F), Urticaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين هامة القنالات أجناسها
وأصولها عديدة معظمها نباتات عشبية وحشية وبعضها
شجري . جميعها هامة الحليبي . أوراقها حليبية النصل .
أثمارها رباعية أو خلبية التركيب . ثمارها فقيرة أو
نوعية ، صغيرة القند .

٢١٧٠١ - قَرَامِصِيَّ هُو الصبابة ، اعليه .

٢١٧٠٢ - قَرَامِصِيَّ ، لِيْرَامِصِيَّ Guéret (F).
Ploughed but unsown land (E).

أرض حرثت ولم تزرع ولم تقرس . وقيل للزراعة التي
ليس عليها بناء ولا فيها شجر . وقيل الأرض المخلصة لزراع
لو تقرس .

٢١٧٠٣ - قَرَامِصِيَّ ، قَرَامِصِيَّ حَكَمِ Tique (F), Tick (E).
اسم شامل يطلق عادة لا عرفاً على معظم أنواع الطلحيات .
الرأسمة قرادة وحلوة .

٢١٧٠٤ - قَرَامِصِيَّ سِمْبِيُ * Symbiose
جنس قراء يعمد جرباً في الخيل والمجترات .

٢١٧٠٥ - قَرَامِصِيَّاتِ ، حَكَمِصِيَّاتِ Acariens (F), Spiders (E), Milben (D).

رتبة حشرات من التكنيكيات فصائلها وأجناسها وأنواعها
كثيرة العدد . جميعها صئيرة القند . أجسامها هامة الفروسل
والحلقات . رؤوسها وصنوبرها ويطولها منقبة . مضغها
أزب الجلد . ملاسها الفككية لئاسية الشكل منها الملقطة
والبيضة ... غاطمها قارضة أو ثنائية ماصة . أربطها
ثمانية في الحشرات الكاملة . مداسية في البزقات وهي عجينة
الأطراف أو غطية || أشهر فصائلها : الأروغيات
والبراميات والجربيات والحليشيات والسكيات والشيشيات
والطلحيات والفشيات والكهدييات .

٢١٧٠٦ - قَرَامِصِيَّ Arrêté (F), Order in council (E).

هو آخر ما استقر عليه الرأي في تعين الإجراءات التي
يفضها نشر القوانين وتنفيذها || أما السلطات التي
يؤمها القانون حق استصدار القرارات فهي سلطة القضاء
والوزير والمخلف والبلدية .

٢١٧٠٧ - قَرَامِصِيَّ Décision (Jur.) (F), Decision (E).

هو الرأي النهائي الذي تستقر عليه الآراء ، وهو من الحكم
منطقه بين السلطات التصريح بها .

٢١٧٠٨ - قَرَامِصِيَّ Réquissitoire (F).

Leat of charges, indictment (E).
هو مرافعة النيابة العامة وطلبها تطبيق مواد معينة من القانون .

٢١٧٠٩ - قَرَامِصِيَّ Ordonnance de renvoi (F), Sending ordinance (E).

هو القرار الذي يصدره قاضي الإحالة .

٢١٧١٠ - قَرَامِصِيَّ Mise en recouvrement

قرار تصدده الإدارة أو مصلحة الضرائب يحمل قسام
التحصيل ثلثة منذ صدورها .

٢١٧١١ - قَرَامِصِيَّ Décision de rejet (F).


Carrying decision (E).
هو القرار القاضي برفض الطلب المقدم .

٢١٧١٢ - قَرَامِصِيَّ Arrêté de cessibilité (F), Transferrability order (E).

قرار تعين فيه الإدارة المقارات التي ستزوع ملكيتها من
أصحابها في سبيل تنفيذ عمل تقتضيه المنفعة العامة .

٢١٧١٣ - قَرَامِصِيَّ Décision exécutoire (F).

Executory decision (E).
هو القرار الواجب تنفيذه .



قراء الجرب



قَرَامِسْ كَنَارُ



قَرَامِسْ كَبِيرُ



قَرَامِسْ صَحْرِي



قَرَامِصِيَّ

فُرَامِيَّاتُ الْبَحْرِ - قُرْنُ

معظم أنواعها عصارة حليابية حراء اللون سريمة الجفاف تستعمل استعمال الكينور والكاشور .

Cornouiller (F).

٢١٣٣٢ - قُرَالِيَا

هي القزوين ، اطلبه .

Cornacées (F).

٢١٣٣٣ - قُرَالِيَّات

هي القزوينات ، اطلبها .

٢١٣٣٤ - قُرْبَكَة . هي الزق ، اطلبه .

Corvina (S).

٢١٣٣٥ - قُرْبَكَة

Corb (F). Corvina (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من شائكات الزعانف وفصيلة الجباريات || أنواعها المروفة نحو ٢٥ منظرها من اسماك المحيط الهادي والهندي والمحيط الاخر ، وبعضها يعيش في البحر الابيض المتوسط || اجسامها متغايرة القد ، اطوالها تراوح من ١٢ الى ٣٥ سم. اذنها متباعدة الانوارن يكثر فيها الرصاصي والاسمر القاتم || لحمها جيدة الصنف مأكولة || اصرف انواعها واشهرها القرية السوداء .

٢١٣٣٦ - قُرْبَكَة سَوْدَاه * ، قَلَقُ الْبَحْرِ

Corvina nigra (S).

Corb noir, Corbeu de mer (F). Crow fish (E).

نوع من القرية . سمكة بحرية بيوض . اصطناع البحر الابيض المتوسط || جسمها احليبي الشكل يطول من ١٨ الى ٣٥ سم. ثوبها الى السرة السوداء المواج . ظهرها اسود . بطنها قضي . زعانفها الى السوداء الارث المواج يطول تنطبق ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخطر . فكها متعادلان . شفتها مثل الانفراج . عيناها كبيرتان ناشرتان . زعانفها متباينة الاشكال . الظهيرة الارث محرس . الظهيرة الثانية مستطيلة . السدوية مجاذية . الحوضية تديرة . الشرجية مستطيلة . الذيلية مجوفة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢١٣٣٧ - قُرْتُ الْجِلْد . Kératose (F). Karatosis (E).

علة في الجلد تنشط الطيعة القرية تشقق وتتصلب .

٢١٣٣٨ - قُرَّة * ، قُرَّةُ الْعَيْنِ

Nasturtium officinale (S). Cresson de fontaine, Santé du corps (F). Water cress, Water grass (E). Brunnenkresse, Brunnenwasserkresse (D). Crescione di fonte, Nasturcio, N. acquatico, Sisembrio acquatico (I).

بقلة معمرة من فصيلة الحلييات تعيش على سطح الماء سوتها عشية . اوراقها منتقة ، مركبة ، ثلاثية الوريات . ازهارها متفرجة التجميع ، بيضاء اللون . فروصها واوراقها وازهارها مأكولة ، نافعة (راجع جذاوق الفيتامين).

٢١٣٣٩ - قُرْنُ

Cyclostrema (S).

Cyclostreme (F). Cyclostrema (E).

جنس حيوانات بحرية من القزوينات مملوكة الارجل وفصيلة القزوينات . انواعها المتعاصرة المروفة مدينة منتشرة في جميع بحار العالم || اصطناعها صخرة القند قمرية ، معزولة ، متدلة الانحناء ، جانبية القوطة المستديرة كالوق . لونها الى البياض الاخير تملو زخرفة جوية متناقة تمتد من القوطة والقاعدة الى القمة .



قُرَالَة



قُرَام



قُرْبَكَة سَوْدَاه



قُرَّة

٢١٣٣٢ - قُرَامِيَّاتُ الْبَحْرِ Acaláphes (F).

رئة من المحفرات تنتمي الى صف المحفرات اللوسية . فصائلها واجناسها مدينة تتميز بشكلها القضي التركيب تملو اعداب شائكة اذا لامست الجلد اذنتها كما يفعل القراص . اصطناعها جميع بحار البلاد الحارة والمتحدة تعيش على الصنوبر .

٢١٣٣٣ - قُرَامَة * Karata (S).

Karata, Karatas, Caratas, Ananas à feuilles longues (F). Curra-cowplant (E). Karatas Ananas (D). Karatas (I).

جنس نباتات معمرة برية وزراعية تربيتية من فصيلة الانتاسيات . اوراقها لحمية ليفية مستطيلة طملاء اللون شائكة الاطراف والمتعاصرة . ازهارها جميلة الشكل والانوارن ، سليبة التجميع || انواعها قليلة شهرها ما يتبع .

٢١٣٣٤ - قُرَامَة سَانْ دُومِنْغُ

Karata de St. Domingue

نوع من القراماة اوراقها صناعية لسيبة وقد تستعمل مع الجذور بعد سحقها في تدويج السلك لمبيد .

٢١٣٣٥ - قُرَامَة غُويَان ، شَجَرَةُ الْفَتَالِ

Karata de la Guyane, Bois de mêche

نوع من القراماة لها كالمصنوعات يستعمل استعمال الفتائل . ثمارها صلبة القند رنية الشكل تملو ليمون الارض لانها حارة الطعم وتنضج في التربة .

٢١٣٣٦ - قُرَاع * ، قُرَاعُ ، قُرَاعُ

Picus (S). Pic (F). Woodpecker (E).

طائر جسم الدورلر يتنشق جلود الاشجار وينقرها لاستخراج الحود من شقوقها . راجع نقار .

٢١٣٣٧ - قُرَاع Dermatomycoz (S).

Dermatomycoze (F).

مرض جلدي سببه القراد .

٢١٣٣٨ - قُرَاكَة

Ecorte (F). Bark (E).

هي اللحاء يوبه حام وفي التخصص حاد سوق النباتات الحولية والخولة .

٢١٣٣٩ - قُرَام Phalaris noueux (F).

هو البشعة المعقدة نبات عشبي علني من النجيليات .

٢١٣٤٠ - قُرَام *

Rhizophora (S).

Rhizophora, Manglier (F). Mangrove tree (E). Gemeiner Wurzelbaum, Mangelbaum (D). Rhizophora (I).

جنس اشجار منتقية من فصيلة القراميات . انواعه ٥ اشجارها كبيرة القند . اوراقها منتقة ، متعابلة ، جلدية النصل اللامع . ازهارها محورية الارتكاز ، نورية التجميع ، مستطيلة الزناد . ثمارها خلدونية الشكل ، مأكولة الحب . يستخرج من عصارة ثمارها بعد تخميرها مشروب خري لا بأس به .

٢١٣٤١ - قُرَامِيَّات Rhizophoraceae (S).

Rhizophoracées (F). Rhizophoraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الملتين مستقلة التعاللات . اجناسها ٥ وانواعها ٥٥ اصطناعها المناطق الاستوائية . جديسها اشجار وجنبات . اوراقها منتقة ، متعابلة ، بسيطة ، كاملة . ازهارها نورية التجميع ، ابغية الارتكاز او ناجية . ثمار بعض اجناسها مأكولة ويستخرج من سوق

أزهاره عصفودية التجميع ، كبيرة القد ، تبدو يضاء اللون ثم تتحول شيئا فشيئا إلى الأحمر || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول .

٢١٧٥٢ - قُرْدَبِ المَنَاقِعِ

Renouée à feuilles de patience (F).
يمر بالدَّار ، أظله .

٢١٧٥٣ - قُرْدَبِ شَرْقِي

Polygonum orientale (S). Renouée d'Orient. Bâton de St Jean, Cordon de cardinal, Monte au ciel (F).
نوع من القردوب الأترنجي شروبه عديدة سوقه سرحة قليلة الفروع تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه كبيرة القد ، نصلها يبيضي الشكل ، ذات الزوايا الأخرى . أزهاره سنبلية التجميع ، طرفية الارتكاز ويحورية ، مستطيلة الزنأد متدلية ، لونها يختلف باختلاف الضرب منها الأبيض والوردي والآخر والمزيج || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول .

٢١٧٥٤ - قُرْدَبِ صَوْبِي

Polygonum lanigerum (S). Renouée laineuse (F).
نوع من القردوب الأترنجي ساقه زهاب اللحم ، ملحاء اللون . ستانية ، نصلها خلى الصفحة القضيعة المواج . أزهارها سنبلية التجميع ، متباعدة ، يضاء اللون أو وردية . أزهارها يستمر طوال شهر أيلول .

٢١٧٥٥ - قُرْدَبِ صِينِي

Polygonum chinense (S). Renouée de Chine (F).
نوع من القردوب الأترنجي ساقه فرعاء تملو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه أهليجية مستطيلة ، نصلها قصير الملق ، سنن الحافة ، أخضر البشرة أو أحر . أزهاره عصفودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، قمرزية اللون . أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢١٧٥٦ - قُرْدَبِ

Guenon (F). She-monkey (E).
أنثى القرد .

٢١٧٥٧ - قُرْدُوح

Papion (F).
هو القردوح ، أظله .

٢١٧٥٨ - قُرْدُوع ، نَمَّ

Philopterus (S). Philoptère (F). Philoptère (E).
جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة اللعناتيات . أنواعه عديدة جميعها مفلطحة الجسم . مستطيلة الرأس . طولها يراوح بين ١ و ٤ مم. ألوانها إلى الخنثي يسمر أو يفسفر مع الألوان . وهي من الحشرات المؤذية ، تركب البظير فتفصيه بامتصاصها الدم .

٢١٧٥٩ - قُرْدُوعِ اسْمَر

Philopterus atratus (S). Philoptère noir (F).
نوع من القردوح طوله نحو ٢ مم. جسمه يبيضي الشكل ، كثيف الحلب المستطيل . ثوبه إلى السرة يطغى بفتح مثلث الزوايا حنطي اللون || يركب الفربان إحصاء البنات .

٢١٧٦٠ - قُرْدُوعِ البَطِّ * ، نَمَّ البَطِّ

Anaticola anseris (S). Anaticola des anserides (F).
نوع من القردوح طوله يراوح بين ٢ و ٣ مم. جسمه نحبي الشكل . ثوبه إلى الصفار الخنثي . طوله صغير القد ، كثيف التجميع || يركب البط ويؤذي به .

٢١٧٤٠ - قُرْدُوعِيَات *

Cyclostrematidae (S). Cyclostrematidae (F). Cyclostrematidae (E).

نفسيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الأبريل حشبات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم إحصاءها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أمثالها منقوشة أو شغافة ، عديمة المادة الأولية ، متباعدة الارتكاز ، يكثر لها الصفر . جميعها قمرزية مجزأة ، قليلة الارتفاع ، مستديرة القوية الجوانبية الارتكاز القرنية المادة || أشهر اجناسها القرنيح .

٢١٧٤١ - قُرْحَانَة

حرب من الكساء . ج. قرحان . والقرحان يبيض صفار ذوات رؤوس كروئيس القطر .

٢١٧٤٢ - قُرْحَة ، قُرْحَة

Ulcer (F). Ulcer (E).
تريه نسيجي لاثاني الشكل والثنان يحل في الاجسام الحيوانية والنباتية فيطبخ .

٢١٧٤٣ - قُرْحَة العنق ، قُرْحَة الحراشيف

Becqueriau du mouton, Chancres des lèvres (F).
مرض عضال يصيب الفم . مظهره الحارشي بثوب يبع مقروحة تملو مراثف الحيوان المصاب .

٢١٧٤٤ - قُرْحَة العنقا

Mal de nuque (F).
عارض يصيب الخيل .

٢١٧٤٥ - قُرْد ، مَسَدَّان

Singe (F). Ape (E).
اسم شامل يطلق على كل حيوان لبون من القرديات . كنيته أبو خالده وأبو حبيب وأبو خلف وأبو ربة وأبو رقة . جمه قردة وقردة . والاثني قردة جمها قرد . وتسمى لفة ودحية .

٢١٧٤٦ - قُرْدِ المغرب

Magot (F).
هو الشقيم ، أظله .

٢١٧٤٧ - قُرْدِ الهند المقدس

Singe saint des hindous (F).
هو هبار التليس . أظله .

٢١٧٤٨ - قُرْدِ أَمْرِيكي

Saki (F).
هو الساكى ، قرد كثر الذنب واللمية .

٢١٧٤٩ - قُرْدِ مَعْدَس

Semnopis (F).
هو الحبار ، أظله .

٢١٧٥٠ - قُرْدَب ، حَصَا الرائي

Polygonum (S). Persicaria, Renouée (F). Persicaria (E). Knöterich (D). Persicaria (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة البطاقيات . أنواعه عديدة منها البرية والأترنجية والشبية والجانبية والمعارة . سوقها عقدية ، أوراقها لافسية الشكل ، أزهارها عصفودية التجميع أو سنبلية ، أشهر أنواعه ما يلي .

٢١٧٥١ - قُرْدَبِ التُرْكْمَنِيَّانِ *

Polygonum badschuanicum (S). Renouée du Turkestan, R. du Badschouan (F).

نوع من القردوب الأترنجي . ساقه عارشة تطول من ٥ إلى ٨ أمتار ، فروصها رطلة ، أوراقها أهليجية الشكل ، قليلة القاعدية ، نصلها ملس البشرة ، سنن الحافة .



قرد التركستان



قردب شرقي



قردب صوبي



قردع اسمر



قردع البط

٢١٧٦٩ - قردوس شحوت ، رباح أبو الحول ، دهباب

Papio sphinx (S).
Papion sphinx, Papion grand (F). Cynocephalus mormon (E).

نوع من القردايع كبير الجثة افضل الزقود . موطنه عند من النيل الى النيجر والكنغو . ثوبه الى الجوزة الياضه بين مع اقترابه من ثيج الظهر وقررة الرأس . حاجبه اوبط الشعر الابيض . اخذه متوسطه القذ مراء . صوته يشبه نباح الخنزير || جماعته متوسطه البدن .



قردوس الحام



قردوس الجواميم

٢١٧٧٠ - قردوس غشزيري ، ششمكة

Papio porcarius (S). Papion chacma (F). Chacma (E).

اكبر القردايع جثة واطولاً زلقياً وهو عادم الفرة صغير الكتاب . ثوبه الى الكهبة السراء يطولها موج اخضر . حمار ابيض اللون وشعر حاجبيه كلكه || يالفت الحصاب والجبال والمناقع . يعيش جماعات كبيرة كمد بعض العشرات .



قردوس النور



قردوس الزنج

٢١٧٧١ - قردوس ميزواج ، ميمون

Mormon malmom (S). Papion mandrill (F). Papio malmom, Mandrill (E).

نوع من القردايع ويروايع القردود وادنها وانتمها واسهلها وانتمها واشهرها خلقاً واشدعاً يأساً . موطنه البلاد الافريقية يكثر في القانين والكنغو || جسمه صمغوي يطول نحو ١٠ سم . ويبلغ ١٠٠ سم . ذنبه ١٠ سم . قوامه شديدة النشط . رأسه متوسط الحجم . زلقوه مستطيل مقطوم . عيناه خائزان . انفه احمر اللون . كتابته غدة ، بارزة ، زرقاء اللون || ثوبه الى السرة الزرقية الخفيفة المخلج ، يبيت حدة الظهر والرأس || يعيش جماعات كبيرة كمد بعض العشرات .



قردوس الحيفة

٢١٧٧٢ - قردوس يمتي ، رباح

Papio hamadryas (S). Papion hamadryas, Hamadryas Tatarin (F). Hamadryas (E).

اعرف وحش انواع القردايع . موطن الحيفة والسودان والجزيرة . قله قد الكلب الكبير النظيف . ثوبه الى الكهبة الغصية . وجهه حطلي اللون . كتابته زائفة الحمرة . غليظة وقوية ، ذنبه بالغ الطول جلي الطرف || الذكر منه يتحل بمفره كثيفة تستطيلة الشعر تحفظ الرأس والتمن والصدر ونصف الظهر .



قردوس بيزان



قردوس خنزيري

٢١٧٧٣ - قردوس ، لپيور

Lipeurus (S). Lipeura (F).

جنس حشرات جلدية صغيرة من فصيلة النشانيات افرام حديثة جميعها دقيقة . طول اجسامها يراوح بين ١ و ٢ سم . ورونها مستطيلة ، عليها خيل وكثيف . اقوالها الى التبرة الطعلاء . تركيب النشانيات على اختلاف انواعها تختلجها لانها تحمص الدم .

٢١٧٧٤ - قردون

Chardon (F).

هو الحرفش ، اطليه .



قردوس بني

٢١٧٧٥ - قردوي

Simien (F). Simian (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يتعلق بالقرد .

٢١٧٧٦ - قردونات

Simiens (F). Simians (E).

مرتبة القردود وهي حيوانات لبرته من الرئيسات . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تقسم الى مجموعتين :

٢١٧٦١ - قردوس الجواميم ، تم الجواميم

Philopterus sublavascens (S). Philoptère des passeriaux (F).

نوع من القردود طوله يراوح بين ١ و ٢ م . ثوبه الى الصفار الخشن . جسمه كثيف الحلب الحقيق || يركب الجواميم اعصها الشروريات .

٢١٧٦٢ - قردوس احتكام ، تم احتكام

Columbicola columbae (S). Colombicola (F).

نوع من القردود طول ذكوره نحو ٢ م . واثانه ٣ م . جسمه ورأسه وزبانه وعليه الى الاستطالة . ثوبه حطلي اللون ، اصفر المويج || يركب الحام على اختلاف انواعه .

٢١٧٦٣ - قردوس الزوج ، تم الزوج

Degeriella ornata (S). Dégérie ornée (F).

نوع من القردود طوله نحو ٢ م . رأسه مخروطي الشكل . جسمه بيضي مفلطح . عليه دقيق مستطيل . ثوبه الى الصفرة يملوه تشويح سترش اسمر || يركب الزوج رنيج الماء .

٢١٧٦٤ - قردوس النور ، تم النور

Ethiopterum monile (S). Ethioptérme (F).

نوع من القردود يطول نحو ٤ م . ثوبه الى الحطلي الاسمر . زبانه عاذة الاطراف ، عليه صغير القذ ، متوسط الكثافة || يركب النور على اختلاف اجناسها وانواعها .

٢١٧٦٥ - قردومات

Cardamine amère (F).

هي الحسرة ، اطلبه .

٢١٧٦٦ - قردوس ، قردوس

Papio (S). Papion, Cynocéphale (F). Baboon, Cynocephalus (E).

جنس قردود من فصيلة الببوسيات . انواعه ٩ تتميز ببقاها منظرا وسفالة اخلاقتها ودمارتها وقذارتها واحتياها . اجسامها صمغوية ، عضلاتها قوية ، ورونها خضرة ، اجسامها زلقوية الشكل مقطوعة . اذانها صغيرة . قوامها قصيرة وقوية تمكثها من العمر السريع وتحول دون خفة التسلسل . اذانها لاقياسية الشكل والعليل || موطنها قسح الاربعاء ييم نصف القارة الافريقية وكال الجزيرة العربية . تألف المناطق البعرة تنجب الاحراج والغابات . تعيش جماعات كبيرة العدد قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحبوب والفاار والجذور والحشرات والمظاء ويروض الطير || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢١٧٦٧ - قردوس الحيفة ، قردوس دوجيرة

رباح دوجيري

Papio doguera (S).

Papion doguera (F). Doguera baboon (E).

نوع من القردايع موطنه عند من الجثة الى الكنگو ثوبه الى الصفار الزيتوني ، قوامه سيد . مفرة ذكره عادية اللون يطولها موج اسمر || يالفت المناطق الجبلية البعيدة من كل حران . جماعته متوسطه البدن .

٢١٧٦٨ - قردوس بيزان ، بيزان ، رنيج

Papio babuin (S). Papion babouin, Babouin (F).

Baboon (E).

نوع من القردايع العادم المفرة والكنائب . موطن الحيفة وجزولها . ثوبه الى الصفار الخشن يبيت حدة الظهر وينير حدة الرأس والعليل || يالفت الاماكن القريبة من الحقل الزردرة اعصها حطولي القرد والبدن || يعيش جماعات كمد بعض العشرات .

من ٤٦ إلى ٤٨ م. رأسها حطلي اللون. عيناها كيرتان. زياناها عيطيان. جوشها ويطيا إلى الحطلي الاسمر المواج || روشنها الامانيان إلى الحطلي الجوزي المواج تملو مجموعات من الزراكش وازناريق الجوزية. روشنها الحطليان إلى الحطلي الاسمر المواج. اهدائها إلى الحطلي الاسمر || لها جبل واحد في الحطلي. تظهر الفرائشة في اوائل تموز وتبقى حتى اواخر ايلول. تسهر في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمتدح المكان لغطاً على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة قطول نحو ٤٥ م. جسمها شبه اسطواني الشكل يعلو في السكة بالمشرة نحو هربي. ثوبها إلى الخضار الاصفر تملو جده قاطية سواء يتخللها تنقيط ابيض ويحدها من الجانبين خط اصفر. رأسها اسود يعلو تمشيع اصفر. مدنها ورواجبها إلى الخضار المايق || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً يتقضي في التربة حيث تنفسن السرعة ملتصقة بجلباب من الطين.

٢١٧٨٥ - قُرْدِس ، نَجْفُوس ، نِقْرُوس

Simulium (S). Simulium (F). Simulium (E).
جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة القرسيات تملو الذباب. انواعها عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم. تألف الاساكين الربطية. ذكورها تعيش على الانزعاج. اناثها لاسمة تمتص الدم.

٢١٧٨٦ - قُرْدِس أَجْمَرُ الرَّاسِ

Simulium erythrocephalum (S). Simulie à tête rouge (F).
حشرة مؤذية من فصيلة القرسيات. جسمها مستطيل صغير يطول نحو ٤ م. رأسها كبير. عيناها متقاربتان. زياناها اسطوانيان، قصيران. روشنها كيرتان شفافان. رأسها احمر. صدرها إلى السرة البنية. بطنها اصفر الزام الاولي والاخير، بني الزام الثاني والثالث. قوائمها بيضاء سمر. || تظهر الحشرة الجبلانة من ايار إلى تموز. الذكور يعيش على رصيق الارزاج. الانثى لاسمة، ماصة، تهاجم كل حيوان ولا تمتع عن الانسان. تقتسم بنوع خاص الأنف والعين والاذن والرجل.

٢١٧٨٧ - قُرْدِسُ الْخَيْلِ

Simulium equinum (S). Simulie du cheval (F).
نوع من القُرْدِس يطول رواج بين ٢ و ٤ م. اناثه تلسع الدواب اغصبا الخيل وقد لا تمتع عن الانسان فترصبه وتقلله || يكالغ باستمال الـ د د د ت. وانشالها من الادوية التي لا تفيدي الانسان والحيوان.

٢١٧٨٨ - قُرْدِسَةٌ

Crassatella (S). Crassatella (F). Crassatella (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صليحيات الخياض وفصيلة القرسليات. انواعها المعروفة تناهز المئة، اكثرها من متحجرات الاباج الثاني. انواعها الحاصرة وقدرها نحو ٣٠ تعيش في بحار البلاد الحارة || اصداها منتوسطة الحجم، مهيمنة الشكل، ثنائية المضاربع المتساوية. مزخرفة السطوح الخارجية المائلة.

٢١٧٨٩ - قُرْدِسِيَّاتٌ

Crassatellidae (S). Crassatellidae (F). Crassatellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صليحيات الخياض اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اصحابها بحار البلاد

مجسومة قردو العالم القديم المعروفة بسفليات المنخرين. ومجسومة قردو العالم الجديد المعروفة بالثخارات اوالفطاسيات ٢١٧٧٧ - قُرْدِيَّةٌ

٢١٧٧٨ - قُرْدِيْسٌ

Cardina (S). Cardine (F). Cardine (E).
جنس دويبات مائية من القشريات، عشاريات الارجل، طول الليل، وفصيلة القريدسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد، بعضها نهري يعيش في المياه الطيبة وبعضها بحري || اجسامها متوسطة القند. صدرها مستطيل المنك. مؤخرها معتدل الثخانة والتطيط. تمضي عيناها السفلية الاطراف || اشهر انواعها واكبرها قُدا القرديس الهندي (*C. fossarum*) الذي يكثر وجوده في نهر جنيس.

٢١٧٧٩ - قُرْدَرَّةٌ

Ochradenus (S). Ochradène (F).
جنس نباتات برية عجيبة مصرة من فصيلة الخزاميات. انواعها المعروفة قليلة مهددا بعض مناطق حوض البحر المتوسط. سيقانها مشتبكة القروص مستحيكتها. اوراقها غرزية النصل او خطية، قليلة العدد، متباعدة الاوتكار. ازهارها حادة القممالات. خالصة او سداسية الفصل، لا نظامية الابدية التي رواج عددها بين ١٥ و ١٥.

٢١٧٨٠ - قُرْدُوحٌ

Atraphaxis (S). Atraphace (F).
الواحدة قرزسة. جنس نباتات حينية مصرة صغيرة القند من فصيلة البيلابيات. انواعها قليلة. اوراقها بيضية، كاملة، صلبة، جلدية النصل. فصل ازهارها الداخلية تطول وتتلون بعد التور || اعرف انواعها ما يلي.

٢١٧٨١ - قُرْدُوحٌ سَنَانِي

Atraphaxis frutescens (S). Atraphace lancelolé (F).
نوع من القرزح وهو حينية سبروتية سرسة تملو من ١٠ سم. اوراقها سنانية الشكل، صغيرة القند، بحرية اللون، ازهارها إلى البيضاء الناصع || ازهاره يستمر من تموز إلى ايلول.

٢١٧٨٢ - قُرْدُوحٌ شَاكِلِكٌ

Atraphaxis spinosa (S). Atraphace épineux (F).
نوع من القرزح وهو بحيلة سبروتية شاككة تملو نحو ٥٠ سم. ساقها مبرصية غير الصماء. اوراقها صغيرة القند، سميكة النصل، بحرية اللون، ازهارها وردية || ازهاره يستمر من ايار إلى آب.

٢١٧٨٣ - قُرْدُوحٌ شَمْشَادِي

Atraphaxis buxifolia (S). Atraphace à feuilles de buis (F).
نوع من القرزح وهو بحيلة صغيرة سرسة تملو من ٥٠ إلى ١٠ سم. اوراقها بيضية شمشادية الشكل والتسج. ازهاره يستمر من ايار إلى سزيان.

٢١٧٨٤ - قُرْدُوبَةُ هَرْمِيَّةٌ

Amphipyra pyramides (S). Amphipyre pyramidal (F). Amphipyra pyramides (E).
حشرة من فصيلة السقيات سرشقيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية المتاخمة. قراشها واشعة قوفا رصيق الانزعاج. سرشها خاضعة تمضي على اوراق الاشجار الوريفة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٥ م. يسلها قراوح



قردوس



قرديس



قردوح



قردومة هرمية



قردس الخيل

مسكها مدون القشار ، جيد الصنف ، شائع الاستعمال .
لحمها متوسط الصنف مأكول . ويستخرج من كبدها
زيت مرغوب فيه .



قُرَشِ أَهْبَت

٢١٧٩٤ - قُرَشْ شَالِك * ، كَلْبَ بَحْرْ شَالِك

Squalus acanthias (S). *Alguillat* (F).
Picked dog-fish, *Hound-fish*, *Spiny dog-fish* (E).

سكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي ||
تعتبر من الاسماك البية . سرسحها الاغواط والثقات ||
جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٢٠ سم . رأسها مخروطي
الشرن ، معتدل التبيط ، ذلق الخلف المستدير الطرف .
انسانها ثلاثية الصفوف ، متباينة الاشكال بين الفكين
تكثر فيها الاطراف المشارة الحادة || ثوبها الى الطحلة
السرء يطولها موانع ازرق يبق عند الظهر . جانبها الى
الطحلة الموهة بالازرق تتر مع الاقتراب من البطن
الابيض || تتميز بانعدام الزعنفة الشرجية وبالمتمنص
الصلب القرني المادة الذي يستيق الزعنفة الظهرية الاول
والثاني || الاثني مثانة تقع في فصل الصيف نحو ٧٠
جيرا || لحمها قاس ، كثير الالياف ، كامن الصنف .
مسكها مرطوب فيه ويستخرج من كبدها زيت جيد
شائع الاستعمال .



قُرَشِ خَنَزِيرِي



قُرَشِ شَالِك

٢١٧٩٥ - قُرَشَام * *Hoplocampa* (S).

Hoplocampe (F).

جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة المشاريات . انواعه
المعروفة ١٦ جميعها وحيدة الجبل الحولي انواها ملوقة
تكثر فيها السرة . ورأسها شافة . رقاتها جلوية تركيب
النار وتطلي || لشر انواهم واضرها قرشامة التفاح
والاجاص والموخ .



قُرَشَامَةُ الْاجَاص

٢١٧٩٦ - قُرَشَامَةُ الْإِجَاص * *Hoplocampa brevis* (S).

Hoplocampe des polres (F).
Pear sawfly (E). *Birnensägegwespe* (D).

حشرة من القرشام طولها يراوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها
حتلي اللون تملوه بقع سمر . ارجلها الى الصفار العابق
اناتها تمتع الممكن على زهر الاجاص فينتف من رقات
دقيقة نحيلة تنخر الثمرة عنه بدء تكوينها تنقرض المبيض
وقبب الانعلاص .



قُرَشَامَةُ التَّفَاح

٢١٧٩٧ - قُرَشَامَةُ التَّفَاح * *Hoplocampa testudae* (S).

Hoplocampe des pommes (F). *Apple sawfly* (E). *Apfelsägegwespe* (D).

حشرة من القرشام . طولها يراوح بين ٦ و ٧ سم . رأسها
ورزبانها ويوشيا الى الصفرة تلمها رقة سوداء . بطها
اسود اللون مطوق بالاصفر || رقاتها حطية شواء المواج ،
كروية الرائحة تركيب ثمار التفاح قشرها سطحيا تحت
القشور ثم تنقبها باتجاه الجذور .

٢١٧٩٨ - قُرَشَامَةُ الْخَوْخ * *Hoplocampa minuta* (S).

Hoplocampe des prunes (F). *Plum sawfly* (E). *Schwarze Pflaumsägegwespe* (D).

حشرة من القرشام طولها يراوح بين ٤ و ٥ سم . ثوبها الى
السرة السوداء . اناتها تمتع الممكن داخل قشور الثار
فينتف عن رقات دقيقة تتابع الثقب والنخر حتى يبلوغ
العجالت .



قُرَشَامَةُ الْخَوْخ

الحارة || اصداها متشابهة ، مألوسة ، مزعقة ، شبه
عمرسة الشكل ، ثنائية المصارع ، حادة المادة الخولوية ||
اعرف اجناسها واشهرها القرسة .

٢١٧٩٠ - قُرَشِيَّات *Simulidae* (S).

Simulididae (F). *Simulididae*, *Sand flies*, *Buffalo gnats* (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد عينة الاشار . جميعها صغيرة القند طولها
يراوح بين ٢ و ٦ سم . اجسامها غليظة الشكل . خلية
الحراشف المستعدة ، رؤوسها وجوانبها كبيرة . قرونها
الاستشارية قصيرة ، ارجلها قوية ، ورأسها شافة
كبيرة || ذكورها تعيش على رقيق الانعام . اناتها
لاسعة تنصص الدم ، لفها مؤلم يلذذي ، لعابها يبع البثرة
وقد يسبب حدة اراض ومجات تنقلها الحشرات من الاجسام
المريضة الى السليمة .

٢١٧٩١ - قُرَشِيَّات * كُونَسَج ، لَحْم ، بُلْبُك ، كَلْبَ الْبَحْر

Squales (S).
Requin (F). *Shark* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة القرشيات . انواعه المعروفة
٣٥ جميعها كبيرة القند مستطيلة الشكل ، مفترسة لا تمر
بني . الاصمت باستناها الى شطرين .

٢١٧٩٢ - قُرَشِيَّاتِ أَهْبَت * *Centrophorus squamosus* (S).

Centrophore squameux, *Requin chagrin* (F). *Porpoise* (E).

سكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الابيض المتوسط . تعتبر من الاسماك البية .
سرسحها الاغواط والبجاج ولا تقترب من الجاهج الا نادرا
جدا || جسمها وشي الشكل بطول نحو ١٥٠ سم . رأسها
معتدل الحجم ، مستطيل الخلف الذلق . فها سفلي الزنكاز ،
صغير القند ، معتدل الشق ، متباينة الانسان بين الفكين
المولي والسفلي . ثوبها الى الطحلة السوداء المولج يسمر
ويميق عند الظهر وتبر ويبيض عند البطن || تتميز
بمسكها الميعش السهف اللاتراسي الحجم والترتيب وبانعدام
الزعنفة الشرجية وبالمتمنص الصلب القوي الذي يتقدم
كل من الزعنفتين الظهرين || الاثني مثانة تقع في فصل
الصيف نحو ٧٠ جيرا || مسكها شائع الاستعمال . لحمها
كامن الصنف قل من يرب فيه . ويستخرج من كبدها
كية من الزيت الجيد .

٢١٧٩٣ - قُرَشِيَّاتِ خَنَزِيرِي * *Oxyntos centrina* (S).

Centrânna, *Humantin*, *Cochon de mer* (F). *Seahog* (E).

سكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة القرشيات . اعطائها
البحر الابيض المتوسط || تعتبر من الاسماك البية .
سرسحها الاغواط واحالي الجاهج ولا تشاهد قرب الجاهج
الا نادرا || جسمها شبه وشي الشكل ، مستطيل الخوض ،
يطول نحو ١٢٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، مبسط المقدم
والخلف القصير . فها سفلي الزنكاز ، قصير الشق
العريض ، متباينة الانسان بين الفكين المولي والسفلي .
اعكاسها الخيشوية خاسية الفلوج اللصيقة . ثوبها الى
الحمرة القرميية تبق عند الظهر وتبر عند البطن .
زعنفتها الظهرية شرابيا الشكل ، كبريتا القند ||
الاثني مثانة تقع في فصل الصيف نحو ٥٠ جيرا ||

للتوصلة الارتفاع . ساقه ليفية دقيقة فراء عادمة الازراق تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه جلدية الالتشاب متراكبة ، نصلها متموج الصفحة الجامدة المقرصة الشائكة الاسنان . ازهاره عطرية التجميع ، تاجية ، زرقاء اللون || اوراقه مأكولة وقد تحنل .

Cyclostoma (S). * قُرْصُفَة ٢١٨٠٨

Cyclostoma (F). Cyclostoma (E). جنس حيوانات برية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة القُرْصُفِيَّات . انواعها المعروفة قليلة البدن منتشرة في معظم اقطار العالم || اشهر انواعها القُرْصُفَة المحددة (C. sulcatum) التي يكثر وجودها في معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . صدفها صغيرة ، بطيئة ، حلزونية ، قصيرة القنب ، يرتقالية اللون .

Cyclostomidae (S). * قُرْصُفِيَّات ٢١٨٠٩

Cyclostomidae (F). Cyclostomidae (E). فصيلة حيوانات برية من الرخويات مديات الارجل امنيات الخياشيم ومديات الاجهزة . اجناسها وانواعها المتمايزة المعروفة عديدة . جميعها برية تعيش على الارض في المواقع الرطبة || اصداؤها شبه غلورية الشكل ، متباينة الحلزونة ، صغيرة الاعقاب ، اسطوانية القواعد ، كلصية الاسقاط || اعرف اجناسها واشهرها القُرْصُفَة .

Cerianthus (S). * قُرْصُوع ٢١٨١٠

Cérianthe (F). Cerianthus (E). جنس حيوانات دنيا من المزهاريات وفصيلة القُرْصُوعِيَّات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || مداخنها لحمية تنشب في رمال القاع . حواملها مستطيلة ، عصفية الشكل كاوراق التنبليات || اشهر انواعها قُرْصُوع المتوسط (Cérianthe de la Méditerranée) .

Ceriantidae (S). * قُرْصُوعِيَّات ٢١٨١١

Cérianthidae (F). Ceriantidae (E). فصيلة حيوانات دنيا من المزهاريات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || مداخنها اسطوانية ، مستطيلة ، هريضة أو مفلجة ، تنتهي بمحلاق متعاقبة القواس || اعرف اجناسها واشهرها القُرْصُوع .

Discoïde (F). Discoid (E). * قُرْصِي ٢١٨١٢

لغت تعريب توصف به الاجسام القرصية الشكل كالقار وغيرها .

Discomycetes (F). * قُرْصِيَّات ٢١٨١٣

فصيلة الفطور القرصية تعرف بالفشاريات ، اطليا .

Erosion * قُرْص ، تَحْت ٢١٨١٤

اختناج وجوف جزء من ثي . سببه العوامل القارصة كالمياه التي تفرس التربة وتجرفها .

Prêt (F). * قُرْص ، إَعَارَة ، عَارِيَة ٢١٨١٥

Lending (E). عقد يقع به المرء الى غيره متقرباً او حثاً او شيئاً معيناً ليستعمله زمناً محدداً ثم يرد . فدفع القرض قارض او معير وآخذه مستقرض او مستعير .

Paederia (S). Pédérie (F). * قُرْشُوم ٢١٧٩٩

جنس جنبات عارضة ملطقة حمرة من فصيلة الفريات انواعها قليلة اصحابها البلاد الحارة . سوقها تطول من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها عابلة معتقة متعاقبة . نصلها بيضي الشكل ، ذائق الزام الاخير وهو غلي الصلصة السفلى ، كرهية الرائحة عند البس . ازهارها عقودية التجميع ، حلجية البترة ، كروية الرائحة ، انايبها وردية اللون ، ابواقها الى الياض الاخضر المزاج .

Squalidae (S). * قُرْشِيَّات ٢١٨٠٠

Squalidae (F). Squalidae (E). فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها عديدة ، اجسامها مستطيلة وشبه الشكل . اصحابها ذلقة ، شابة . اسنانها حادة متشارية تقطع كل شيء . زعانفها كبيرة . اصحابها بحار البلاد الحارة وقد تجوب انوار الانهر العميقة الغور .

Gaufre, Rayon (F). * قُرْصِي ٢١٨٠١

Honeycomb (E). مجموعة غرابيب السطح الواحد في خلية النحل .

Placement (F). Nipping (E). * قُرْصِي ٢١٨٠٢

هو القرمز اي قطع رؤوس الانضاض او الانفان الطرية .

Ranard corsac (F). * قُرْصَاق ٢١٨٠٣

هو الصليب الثعري ، اطليه .

Myletes (S). Mylète (F). * قُرْصَانَة ٢١٨٠٤

جنس اسماك ثورية من مفتوحات الخياشيم وفصيلة القُرْصَانِيَّات . انواعها المعروفة خمسة منها نومان يمشان في انهر الهند وسيام وبنيتام وثلاثة انواع تعيش في انهر امريكا الاستوائية || اجسامها متوسطة القد ، بيضية اللون ، مستطيلة ، تطول من ١٨ الى ٢٤ سم . رؤوسها صغيرة . زعانفها الظهرية كبيرة ورفيعة يتجمعا زعنفتان ضخمة صغيرة . زعانفها الشرجية مستطيلة مقعرة . زعانفها الذيلية منفرجة القوس ، قريبة الشبه بالحلل . اثلولها الى الخضار الاطحل المتفاوت الممايات || حولها مأكولة ، متوسطة الصنف .

Characidae (S). * قُرْصَانِيَّات ٢١٨٠٥

Characidae, Characnidae (F). Characidae (E). فصيلة اسماك ثورية من مفتوحات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اصحابها انهر وبحيرات المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها لاقيايسية الشكل واللقد . حراشفها صغيرة متراكبة . رؤوسها هريضة فتكرها مرصوة الاسنان الصغيرة الحادة . زعانفها الظهرية والذيلية لانفاضة || اعرف اجناسها واشهرها القُرْصَانَة والمردون والمسين والبيشوش والوفش .

Scrofalaire du désert (F). * قُرْصَة ٢١٨٠٦

هي خنازيرة الصحراء ، اطليا .

Eryngium creticum (S). Eryngie, Panicaud de Crète (F). Field eryngo (E). Feldmannstren (D). Eringio (I). * قُرْصَمَنَة ، قُرْصَمَنِي ، شَوْلْ ٢١٨٠٧

عَقْرَبَانِي ، شَنْدَاب إِكْرِي شنداب إِكْرِي نوع من الشنداب وهو نبات حشيشي بري يكثر في الجبال



قُرْصَمَنَة



قُرْص



قُرْص



قرط



قرط مور



قرطب الاربع



قرطب البط



قرطب الدجاج

٢١٨٢٦ - قُرْط ، قُرْص ، جُتْم Pincement (F).
Nipping (E).

تقطع رؤوس الاغصان أو الانداد أو الانثان .

٢١٨٢٧ - قُرْط مَوْز * ، طَرْح مَوْز Régime de bananes (F). Bunch of bananas, Cluster of bananas (E).

هو السنبلة الثمرية المشطية المتتابعة المتدللة التي يتألف منها حل الموزة .

٢١٨٢٨ - قُرْطَب Melampyrum (S).

Mélapyre (F).
جنس نباتات برية حشوية حولية من فصيلة الحمازريات. أنواعه ٦ جميعها اشباح متصبغة غدا . اوراقها سنانية او خطية النصل . ازهارها صفراء اللون او بنفسجية . اشهرها واضرها قرطب الزرع .

٢١٨٢٩ - قُرْطَب الزَّوْع * Melampyrum arvense (S). Mélapyre des champs, Blé-de-vache, Cornette, Queue de loup, Queue de renard, Rougeole (F). Purple cow-wheat (E). Roter Wachtelweizen (D). Melampiro, Grano di vacca, Coda di volpe (I).

نوع من القربط ينمو من البساتين الخضراء لانه يكثر في زروع الحنطة فينبش جنوده في جنودها ويقامها الغذاء . يزدهر الى السرة ، دقيقها احمر اللون مر الطعم .

٢١٨٣٠ - قُرْطَب Ménopon (F). Menopon (E).

جنس حشرات جليدية من فصيلة القربطيات . انواعه نحو ٦٠ جميعها مؤذية تركب الطيور قضيه || امرف انواعه واضرها الثلاثة التالية .

٢١٨٣١ - قُرْطَب الازَّز Ménopon pectinatum (S). Ménopon des oles (F).

نوع و القربط وهو حشرة صغيرة اللد طويلا براوح بين ١ الى ٢ سم . رأسها مستعرض الشكل ، مقعر القفص . ثوبها الى الربعة يطويها توشم اشقر . تركب الازوز وتؤذي .

٢١٨٣٢ - قُرْطَب البَط Trinoton anserinum (S). Trinoton des canards (F).

نوع من القربط يركب البط فيؤذي . جسمه الى الربعة السمراء بطول من ٤ الى ٥ سم . رأسه مثليث الزوايا المستديرة . جوشه وبطنه متساويان في الطول والشكل ، ترجأت بطنه مجلدة بالخطوط .

٢١٨٣٣ - قُرْطَب الدَّجَاج Ménopon gallinae (S). Ménopon des poules (F).

نوع من القربط وهو حشرة صغيرة اللد طويلا نحو ٢ سم . جسمها اهليجي الشكل ، كثيف الحلب البنيق . رأسها محدب القيد ، مقعر القفص ، دماغ الحلب المستطيل . ثوبها الى الربعة الصفراء المزاج || تركب جمع الطيور الباذنة اخصها الدجاج .

٢١٨٣٤ - قُرْطَبِيَّات Ménoponidae (S).

Ménoponidés (F). Menoponidae (E).
فصيلة حشرات جليدية من رتبة القملذيات . اجسامها وانواعها عديدة جميعها صغيرة اللد اجسامها مغطاة ، بيضية الشكل او اهليجية . طويلا براوح بين ١ و ٦ سم . رؤوسها مستديرة او مثثة الزوايا . ارساغها مستطيلة عذاشة .

٢١٨١٦ - قُرْص ، صِلْفَة Emprunt (F).
Borrowing (E).

عقد تبرم به صلفه قانونية يدفع بمقتضاها عادة مبلغ من المال او اي شيء آخر الى أحد طرفيه الذي يصبح مدينا به بشرط يتفق عليها . والقرض اشكال منها :

قرص جبري او ائزامي Emprunt forcé (F).
Forced borrowing (E).

قرص طويل الاجل Emprunt à long terms (F).
Long-dated borrowing (E).

قرص قصير الاجل Emprunt à court terme (F).
Short-dated borrowing (E).

قرص مجدد Emprunt consolidé (F).
Funded borrowing (E).

قرص مقدور الاستهلاك Emprunt amortissable (F).
Redeemable borrowing (E).

٢١٨١٧ - قُرْص المُنْصَاوِرَة Prêt à la grosse aventure (F). Bottomry lending (E).

قرص يسري حل اشياء معرضة لاختطاف البحر . شرطه انه اذا هلكت هذه الاشياء كلياً او جزئياً كان المقرض في حل من رد مقابل ما ملكه منها .

٢١٨١٨ - قُرْص يَصَالِدَة Prêt à insérêt (F).
Lending in interest (E).

نوع من انواع الاعارة الا انه يعاقب اي ان المستير يدفع للامير فائدة قدرها ما جرى عليه الاتفاق .

٢١٨١٩ - قُرْص زُرْاعِي Crédit agricole (F).

هو التسليل الزراعي .

٢١٨٢٠ - قُرْصَاب Xérophage (F).

Xerophagous (E).
نمت تعريبي يطلق على الحيوانات والحشرات التي تعيش على المواد الجافة .

٢١٨٢١ - قُرْصَب

ما يبقى في الغرابل ريمى به مع الرذالة .

٢١٨٢٢ - قُرْصِيم قشر الريان يستعمل في التدبغة .

٢١٨٢٣ - قُرْصِيَّة

القرصنة ج . قرص . من غريب شجر البر شكل ولوناً زهره اشد صفرة من الورس . قال ابو حنيفة : و القرص شتلق بالشرج وينبت في اصل السرة والعرض وزهره اشد صفرة من الورس ورقه لطاف رقيق .

٢١٨٢٤ - قُرْط * ، ثَوْم مُعَمَّر Allium schaeenoprasum (S). Ciboulette, Cive (F).

نبات دولسي معمر من فصيلة الزنبقيات . قصوه خطية الشكل غليظة . اوراقه قرصية الانتساب . دقيقة ، ضيقة ، جواء النصل ، متصبغة ، تطول نحو ٢٠ سم . شماريعه الزهرية تطو نحو ٣٠ سم . ازهارها حمراء اللون ، هامة الانكسار ، صويالية التجميع .

٢١٨٢٥ - قُرْط

Mélilot à petites fleurs (F).
هو الحنطوق الصغير الزهر . نبات مرهوي تنطفه القدواب بشوة .

Panellus (S).

٢١٨٤٢ - قَرْطُوب

Panellie (F). Panellus (E).

جنس فطور من فصيلة السميات. أنواعه المعروفة قليلة العدد. أصلها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها تتركب جلود الأجسام وأغصانها دون أن تؤذيها. تتميز بسوقها القصيرة وبكثافتها الفارشة، المكثفة الاطراف، الدبقة أو الحليمة السطح. || أحرقت أنواعه وأشهرها القربوب الحلو والقربوب المخمار.

٢١٨٤٣ - قَرْطُوب حَلْو *
Panellus mitis (S).
Panelle douce (F).

نوع من القربوب. يعيش على جلود الصنوبر دون أن يؤذيها. مجموعته لا تقتل عن ثلاث وحدات ولا تتجاوز السبع. ساقه شديدة القصير. نكتته غائرة لزجة داكنة مكثفة الاطراف، طحلا اللون الكاساك، قطرها يراوح من ١ إلى ٢ سم. اطراسه دقيقة، حلابة المادة || لحيته كاعثة الصف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٤ - قَرْطُوب مِشْخَر *

Panellus serotinus (S). Panelle cardive (F).

نوع من القربوب. يعيش على جلود وأغصان الاشجار المروية لخصها الستانيان. مجموعته تتألف من ثلاث إلى خمس وحدات. ساقه شديدة القصير. نكتته غائرة، مكثفة الاطراف، خلية السطح في ابل عدها ثم لزجة. قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الطحلة الصفراء الخضراء المواج || لحيته كاعثة الصف غير مرغوب فيها.

٢١٨٤٥ - قَرْطُوبُورَة *
Cortusa (S).
Cortuse (F). Cortusa (E).

نبات عشبي معمر من فصيلة الربيديات. معقود الصمغ على اسم العلامة «قربوزي». ينبت في بعض جبال الشرق الادلى وأروية. اوراقها جلدية الانتفاخ، مدقة، كبيرة القد، مقصصة وسننة المختار. ازهارها شبه صولاني التجميع، يتركز على غصن يرتفع من ١٥ الى ٢٥ سم. ازهارها صغيرة القد، وردية اللون، قصيرة الماعلى || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢١٨٤٦ - قَرْطُوب *
Euchoreutes (S).
Euchoreute (F).

حيوان لين قاصم وحيد الجلس والذراع من فصيلة البر بويحات موطنه يمتد من إيران الى تركستان || جسمه صغير القد يتميز ببساطة اذنيه وقائحيه الخلفيتين. اما ذنبه فيبالغ الطول. قويته الى الشبه بطنها مواج اشجع يسير في الراس والظهر ويشقر في الصدر والبطن، ذنبه اسود الزام الاخضر الذي ينتهي بالابيض.

٢١٨٤٧ - قَرْط *
Acacia sbrabique (F).
هو السط العربي الواحدة قرطة.

٢١٨٤٨ - قَرْع *
Teigne (F). Tinea (E).
على جلدية مختلفة تصيب الحيوانات والطيور الداجنة فتتغذى على اصوافها ووبرها وريشها. اسبابها فطور جمهورية تركب الجلد وبصل الشعر والريش.

٢١٨٤٩ - قَرْع البَقَر *
Teigne des bovins (F).
Cattle tinea (E).
نوع من القرع يركب رؤوس البقر واعناقها.

انواعها تختلف باختلاف الاجناس والانواع يكثر فيها الرمادي الاسفر المواج.

٢١٨٣٥ - قَرْطُف بقلة وقيل ثمرة الرث.

٢١٨٣٦ - قَرْطُف، قَرْطُف، إِحْرِيض، بِسْهَرَم، بَهْرَمَان، مَرْيَق
Carchamus (S).
Cartame, Cartame (F).

جنس نباتات عشبية وجنية، برية وزراعية، طبية وصباغية من سبط الحشريات وفصيلة المركبات. انواعه عديدة منها الحولية والمولية والممرة. سوقها متصبية. اوراقها متعاقبة مستطيلة لا تخلو من الحشف. ازهارها نارية اللون، سرفلية التركيب. بزورها مضطمة بيضاء اللون طيبة يستخرج منها مادة زيتية تستعمل لعلاج داء المفاصل. احرقت انواعه واشهرها ما يتبع.

٢١٨٣٧ - قَرْطُف الصَّبَاغِي *، تَرْيَاح، عَصْفُر
Carchamus tinctorius (S). Carchame officinal, C. des teinturiers, Safran bittard, S. d'Allemagne (F).
Safflower, Bastard saffron, False saffron (E). Färb-safflor, Bastardsaffron (D). Caramo officinale, Croco bastardo, Zafferano falso (I).

نوع من القرم الحولي او المحول يزود التزيين او لاستخراج القرمطين، مادته الفعالة الصباغية الصفراء اللون. ساقه متصبية سرسة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه يضيئة الشكل مستطيلة الزام الاخير. نصلها بارز المروق، سن الحافة، قصير الحشف. ازهاره برتقالية اللون ذبعية المواج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٨٣٨ - قَرْطُف بَرِّي *، قَرْطُف صَوْبِي، شَوَلُوب عَشْتَر
Carchamus lanatus, Kentrophylum lanatum (S).
Carchame laineux, Chardon jaune, Kentrophylie (F). Woolly safflower, Distaff thistle (E). Wolliges Spornblatt (D). Cartamo lanoso, Ceeceprete, Scardicione salvatico (I).

نوع من القرم الحولي البري الطبي. ساقه متصبية زياء تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. صارتها حراء اللون، كرسية الرائحة، جملة الخضاب الزاوي. اوراقه مقصصة، نصلها غدي الصلصة، لزوج البشرة. ازهاره الى الصفار البرتقالي. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢١٨٣٩ - قَرْطُف جَنْبِي *
Carchamus arborescens (S). Carchame arborescent (F).

نوع من القرم البروتي الممر. جنينه تملو نحو ٢٠٠ سم. ساقها خشوشية. اوراقها سانية مسترسية القاعدة. نصلها جبل الخضاب الزاوي، سن الحافة الشائكة. ازهارها الى الصفرة الوردية المواج || ازهاره يستمر طوال شهر آب.

٢١٨٤٠ - قَرْطُومَان *
Avoine cultivées (F).
هو الحنظل الزراعي، اطليه.

٢١٨٤١ - قَرْطُوب *
Orang-utan melle (F).
He orang-utan (E).
ذكر السالي ارتفاعه واقفاً على رجله يراوح بين ١١٨ و ١٢٢ سم.



قَرْطُف الصَّبَاغِي



قَرْطُف بَرِّي



قَرْطُوب حَلْو



قَرْطُوب مِشْخَر



قَرْطُوب

٢١٨٥٧ - قرع طويل * ، دبلاء ، كركيب ، حريف

Lagenaria vulgaris (S). Calebasse, Gourde, Bouteille, Courge d'ornement (F). Bottle-gourd, Calabash cucumber (E). Echter Flaschenkürbis (D). Zucca lunga, Z. bottiglia, Z. fiasco (I).

نوع من القرع الحلوى ، شروبه حديدية منها البرية والزراعية المأكولة والثرائية . سوه مادة حارسة . أوراقها كبيرة اللد لا قياسية التفصيص والتفريش . ثماره مختلفة الاشكال والأحجام منها الاطوائية والمطاطعة والبرية والقتاروية والمردنية ، الخ .



قرع اسود البزور

٢١٨٥٨ - قرع كبير * ، يقطين مضلع

Cucurbita maxima (S). Potiron, Clerouille, Grosse courge (F). Large gourd, Spanish gourd, Winter squash (E). Spätskürbis (D). Popone, Cetrinollo, Zucca potirona (I).

ويدعى قرع حلو وقرع مالح . نوع من القرع الزراعي المشهور . شروبه حديدية أوراقها قدر واشكال ثمارها المصنعة المستديرة المفلطحة التي يراوح قطرها بين ٢٥ و ١٠٠ سم . وزنها من ٤ إلى ٦٠ كيلو . لهاها جلد المكرس حادم الالياف يحوي نحو :

- ٩٥,٩٠ ٪ من الماء
- ١٧,٠ ٪ من المواد الازوتية
- ١٢,١ ٪ من المواد المعدنية
- ٢٦,٦ ٪ من المواد الاستخلاصية



قرع دوبي



قرع طويل

٢١٨٥٩ - قرع مسكي * ،

Cucurbita moschata (S). Courge musquée, Carabacette (F). Musky gourd (E). Moschuskürbis, Bismkürbis (D). Cetriolo muschiato (I).

نوع من القرع الزراعي الشائع الاستعمال . شروبه حديدية . سوه مادة طويلة . أوراقه مستديرة ، خلية النصل ، لا قياسية التفريش . ثماره مستطيلة مخنوقة الوسط يبلغ طولها في بعض الشروب نحو ١٠٠ سم . وزنها ٢٠ كيلو . لهاها اصفر اللون ، قليل الالياف ، مسكي الرائحة .



قرع كبير

٢١٨٦٠ - قرعاه

Céraste (F).

هي الحادية من اخبث الحيات .

٢١٨٦١ - قرع عبقيل

« دوية حريفة محبطة الظهر والبطن (السان) .

٢١٨٦٢ - قرعكة ، يقطينة

Citrouille, Courge (F). Pumpkin, Gourd (E).

هي ثمرة القرع أو اليقطين اشكالها واحجامها متباينة تختلف باختلاف النوع .



قرع مسكي

٢١٨٦٣ - قرع صوس ، قير صوس ، قرع صوس

هو الفالغ جل ذو ستاين .

٢١٨٦٤ - قرع صي

Pépoufère (F). Pepo (E).

نمت وصي يدل على ما شكله شكل القرع المستدير .

٢١٨٦٥ - قرعيات ، يقطينيات

Cucurbitaceae (S). Cucurbitacées (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القممالات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . سواها مادة او حارسة . أوراقها متعاقبة ، حوافها مخشبة . ازهارها وريدة المسكن ، خاسية الاكام . ثمارها لياوية مخنوقة الاشكال والاحجام . اشهر انواعها القرع والبطيخ والشام والخيول والقشاه والحظلل ، الخ .

٢١٨٥٠ - قرع الخيل

Taigne du cheval (F). Horse tinea (F).

نوع من القرع يركب صهوة الفرس ومنه وكفه .

٢١٨٥١ - قرع الغنم

Taigne du mouton (F). Sheep tinea (E).

نوع من القرع يركب لسان الماعز فيسبب امراض اسوانها وله يمتدح غالبا في اصنافها .

٢١٨٥٢ - قرع شهدي

Taigne faveuse (F). Tinea favosa (E).

نوع من القرع يركب الخيل والارانب والستائر والكلاب .

٢١٨٥٣ - قرع ، يقطين

Cucurbita (S). Courge (F). Gourd (E).

جنس نباتات حولية او معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه عديدة . سواها مستطيلة مدادة او حارسة . أوراقها متعقبة كبيرة اللد متعقبة الزناد الاجوف . نصلها قلبي القاعدة لا قياسي التفصيص . حوافها مخشبة . ازهارها وريدة المسكن ، كبيرة اللد ، صفراء اللون . ثمارها مخنوقة الاشكال والاحجام || اشهر انواعها الزراعية ، للمأكولة الثمار ، ما يتبع .

٢١٨٥٤ - قرع اسود البزور *

Cucurbita ficifolia (S). Courge à graines noires (F).

نوع من القرع الزراعي المعمر . ساقه لينة ، حقيقة ، مستطيلة حارسة ، فراء . أوراقه خماسية التفصيص ، نصلها عايق الخصار يولد تمشج وتسنج اصفر . ثماره بيضية الشكل كالبطيخ ثمرها صلبة خضراء اللون تملوها رشفة بيضاء . لهاها ابيض اللون كثير الالياف متوسط تركيبه يشمل :

- ٩٥,٩٠ ٪ من الماء
- ٢٢,٢٢ ٪ من المواد المعدنية
- ١٤,١٣ ٪ من المواد الازوتية
- ١٤,٠٦ ٪ من السيلولوز
- ١٢,٢٤ ٪ من الرباد
- ٥,٩٥ ٪ من المواد الاستخلاصية

زوره سوية اللون الاسود لهاها يحوي ما قدره

- ٢٢,٨٠ ٪ من المواد المعدنية
- ١٨,٩٥ ٪ من المواد الازوتية

٢١٨٥٥ - قرع الحشيش

Trichosanthe (F).

جنس نباتات مدادة حارسة من فصيلة القرعيات . انواعه نحو ٣٠ معظمها حولي وبعضها معمر . اعطائها البلاد الاسيوية الحارة وبعض مناطق استراليا . سواها عشية او ليلية مستطيلة . أوراقها كبيرة مفصصة . ازهارها حديدية البتلات . ثمارها وزورها لا قياسية الشكل والحجم . اشهر انواعها الفتاة النيبانية ، العليا .

٢١٨٥٦ - قرع رومي * ، قرع مغربي ، عسامة

Cucurbita pepo (S). Courge pépon, Girsamon, Courgeron (F). Pumpkin, Gourd (E). Schmuckkürbis (D). Giramonte. Zucca Indiana (I).

نوع من القرع الزراعي شروبه حديدية منها المكور والمستدير والمسطيل والقمبي والصنبر والكبير والمالسي والفصل والعقد || لباها ثماره جيد الصنف عادم الالياف .

المواج. ازهارها عذقي التجميع. محوري وطرفي الازتكاز. ثمارها عننية ، لاصقة السطح واللحم ، للذقة الطعم ، قطرها نحو ١٠ م. || قرفها سمراء اللون. غبراء المواج ، جيدة الصنف. يستخرج منها وين الاوراق والازهار وآثار طيوب وادهان فاعلة .

٢١٨٧٤ - قَرْفَة كَذَابَة (F). *Fausse cannelle*.
هي دريس جيلان ، اطليه .

٢١٨٧٥ - قَرْفَة مَلَبَار * ، سَكَاچ (F). *Cinnamomum citrodorum* (S). *Cannelier de Malabar* (F). *Malabar cinnamon* (E). *Malabarischer Zimmetbaum* (D). *Cannelli di Malabar* (I).

شجرة زراعية من الافاوية. مهدا بلاد ملبار وقد انتشرت زراعتها في جزر الزانج وغيرها من جزر المحيط الهادي. ثمرتها صغيرة اللد ، فراء ، يستخرج منها اجود الطيوب والادهان . اما قرفها فنادية .

٢١٨٧٦ - قَرْفَة قَنْصِيَّة (F). *Caryophyllia* (S). *Caryophyllie* (F).

جنس حوريات بحرية من الرجان عننية المدائح ، مستطيرة التبريجات المفردة || اشهر انواعها القرفول الجملي (C. cyanthus) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

٢١٨٧٨ - قَرْفِيَّات (F). *Cannellaceae* (S). *Cannellacées* (F). *Cannellaceae* (E).

فئة من فصيلة الاناريات تشمل القرفة والبيلون وغيرها .

٢١٨٧٩ - قَرْفِيَّات (F). *Manidae* (S). *Manidés* (F). *Manidae* (E).

فصيلة حيوانات من الدرد اجناسها وانواعها عديدة اعرفها ام قرفة .

٢١٨٨٠ - قَرْق (F). *Gloussement* (F). *Clucking* (E).

صوت للدجاجة عندما تدعو فراخها .

٢١٨٨١ - قَرْق (F). *Liège* (F).

هو القلين ، اطليه .

٢١٨٨٢ - قَرْقَب (F). *Mésange* (F).

هو القرقفت جنس طير من الجرائم .

٢١٨٨٣ - قَرْقَد (F). *Apocyn* (F).

هو الخوشان ، اطليه .

٢١٨٨٤ - قَرْقَدَان (F). *Gulmauve jauns* (F).

هو الابوتيلان الاسرح ، اطليه .

٢١٨٨٥ - قَرْقَدَنْ ، قَرْقَدُون ، قَرْقُصُون ، جَرْجَة سَنْجَاكِي (F). *Myoxos* (S). *Loir* (F).

Dormouse (E). *Siebenschläfer*, *Bilch* (D). جنس حيوانات قانسة من فصيلة القرقديات . انواعها قليلة . اجسامها صغيرة اللد مسطيلة . اذناها سوية اللون. اذنانها جبيلات الصفوف . رؤوسها اسطوانية الشكل . سالها طويلة قنسية . عيونها كبيرة . آذانها مستديرة رصية . تسرح في الليل . تتسلق الاشجار . قوتها النار والبلوط

٢١٨٦٦ - قَرْف (F). *Ecimage* (F).

هو الصنف ، اطليه .

٢١٨٦٧ - قَرْف (F). *Ecorce* (F). *Bark* (E).

لحاء الشجر ، وكل قشر قرف* منه قرف الزمان .

٢١٨٦٨ - قَرْف الزَوَالِد ، كَقَرْف (F). *Epamprage* (F). *Lopping off*, *Pruning* (E).

تقليم الفسنان او السروع الزائدة في الكروية .

٢١٨٦٩ - قَرْفَة (F). *Brou* (F). *Husk*, *Peel* (E).

هي غلاف صمالي الشرة قبل جفافه او عند انفصاله بعد تمام الجفاف .

٢١٨٧٠ - قَرْفَة (F). *Cannelle*, *Cannelier* (F). *Cinnamon-tree* (E).

جنس اشجار ومخبرات برية وزراعية من القرفيات وفصيلة القرفيات . انواعه عديدة منها بلاد الاسيرة . سوقها منتسبة فراء . اوراقها ابيدة متفكة . ازهارها صغيرة اللد لاقياسية التجميع والازتكاز || جميعها من الافاوية ازهارها وثمارها واوراقها ولحاء سوقها وفروعها وجلوهرها عطرية للمادة ، لذعة الطعم . يستخرج منها طيوب وادهان طيارة شائعة الاستعمال الطبي . وهي تقيح اللثة والكدية ، تلبه الاصاب وتقتطها وتذهب بها . وين منافها انها مفادة للنتنح . اشهر انواعها ما يلي .

٢١٨٧١ - قَرْفَة بَيْشَاء (F). *Cannelle blanche* (F). *Canella* (E).

هي البيلون ، اطليه .

٢١٨٧٢ - قَرْفَة مَرْتَدِيْب * ، قَرْفَة سِيلَان ، دَارَصِينِي (F). *Cinnamomum Zeylanicum* (S). *Cannelier de Ceylan*, *Cinnamome* (F). *Common cinnamon tree*, *Cinnamon* (E). *Zimmetbaum*, *Zimmet*, *Zimmetrinde*, *Kaneel* (D). *Cannella*, *C. del Ceylan*, *Cinnamo* (I).

شجرة زراعية من الافاوية مهدا سرتديب (سيلان) ساقها منتسبة فراء تمل نحو ١٠ اطار . فروعها متقابلة الانتشاب ، مستقيمة الزوايا ، اوراقها متفكة ، متقابلة ، بيفية الشكل ، ابيدة ؛ نصلها جامد النسيج ، مائل البثرة . اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلي ، ثلاثي السروع الرئيسية || ازهارها صغيرة اللد ، غبراء اللون ، عديدة الالامدية ، سداسية البلات. ازهارها عقديوية التجميع ، تاجي الازتكاز . ثمارها عننية لاصقة السطح واللحم . جمع اعضاء الشجرة عطرية تستخرج منها الطيوب والادهان اما لحاء السوق والفروع فتصبر من الافاوية الفاعلة الصنف .

٢١٨٧٣ - قَرْفَة صِينِيَّة * ، دَارَصُوصِي ، سَكِيَّحَة تَجَب (F). *Cinnamomum obtusifolium*, *C. cassia* (S). *Cannelier casse*, *C. de Chine*, *C. d'Annam*, *C. du Tonkin*, *Laurier casse* (F). *Chinese cinnamon tree*, *Cassia tree* (E). *Kassien Zimmetbaum* (D). *Cinnamo cassia*, *Lauro cassia*, *Cassia lignea* (I).

شجرة زراعية من الافاوية . اصلها فسيحة الارتداء تمتد من الالام الى الصين ويتش حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م. من سطح البحر || ساقها منتسبة تمل من ١٣ الى ١٧ م . اوراقها ابيدة اهليجية متقابلة متفكة . نصلها جامد الصفحة ، ثلاثي السروع الرئيسية . لونه الى الخضار البحري || ازهارها صغيرة اللد لونها الى البياض الاخضر



قَرْفَة مَرْتَدِيْب



قَرْفَة صِينِيَّة



قَرْفَة مَلَبَار



قَرْفُول



تَرَقْدَنُ البَلُوط



تَرَقْدَنُ شائع



تَرَقْس



قَرَقُفُ اَبْرَقِ الشَّكْلِ



قَرَقُفُ النَّمْطَر



قَرَقُفُ اَزْرَق

شديد الصغر ، متكاثف الحلب ، بطول من ٢ الى ٣ سم. ثوبها الى الكلسية . زباناها مطوكان بالاسود والابيض . ريشانها كبير اللد ، متكاثف الخمل || ظهور الخشرة الجبلية لا يتقطع طول السنة ، وهي مبالغة في كل مكان من القابات الى المساكن المأهولة || الانثى اكبر قداً من الذكر . تنجع مكنتها في كل مكان مظلم رطب . يتغذى المكان بعد متحه باسوسين من بركات مستطيلة ، بسيطة القدم والمخبر ، متطيلة الاذن ، حليلة الجهد والرأس والشرج || تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال .

٢١٨٩٥ - قَرَقُفُفَةُ المَتَوَسِّطِ *

Phlebotomus papatasi (S).
Phlebotomus papatasi (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقفيات . جسمها صغير الحجم ، بطول من ٢ الى ٥ سم. ثوبها الى الصفار الباهت ، خالي القشاد . رأسها مخروطي الشكل . خطتها معتدل اللد . صدرها بيضي القالب ، بطنها اسطواني . زباناها كثيف الحلب العقيق . صينها صغيرتان . ريشانها كروان ، مهدبان || تظهر الحشرة الجبلية من نيسان الى تشرين الثاني . تألف جميع المراتع الرطبة والشلط الرطبة . تسرح في الليل وتختفي في النهار وراء كل شيء لانها تخشى وقع النور || تنجع الانثى مكنتها في كل مكان مظلم رطب ويخت الانفاض والجهاز . يتغذى المكان بعد متحه بمدة اربع ساعات من لسوسين الى ثلاثة || البقرة مستطيلة ، شبه اسطوانية الشكل ، حليلة الجهد . فراء الاذن ، صمراء الرأس . يطعمها في مخبرها زوج من الحلب الجمل المستطيل . تعيش على المواد النباتية المتحللة حتى الاكمال .

٢١٨٩٦ - قَرَقُفُفَاتُ ، سَكَبَتَاتُ

Psychodidae (S). *Psychodidae* (F). *Psychodidae* (E). فضيلة سحرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة اللد زبد الجسم والرواشن والقرون الاستعمارية || اشهر اجناسها القرقس .

Loir (F).

٢١٨٩٧ - قَرَقُفُفُون

هو القرقن ، اطلبه .

٢١٨٩٨ - قَرَقُفُفُ ، قَرَقُفُفُ

Parus (S).
Mésange (F). *Tite* (E).

جنس طير من فصيلة القرقفيات انواعه كثيرة العدد اعطاهها العالم . اجناسها صغيرة اللد . مناقيرها مخروطية الشكل ، جالسة ، قصيرة ، قوية . اجنسها حبيطة اللد . اذانها مقطوعة او نازقة . ارسافها صغيرة مسطوية الجلد || تألف القابات والخلات . قوتها الحشرات ويكثها وقرقاتها والوزور البرية والناظر || اناثها تحضن مرتين في العام ، الاولى في نيسان والثانية في تموز . عدد بيض الحفنة اربعون بين ٦ و ١٦ اما الترسيم فيستمر من ١٤ الى ١٥ يوماً . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢١٨٩٩ - قَرَقُفُفُ اَزْرَق *

Parus corollae (S).
Mésange bleue, *M. azuree* (F). *Blue titmouse* (E). نوع من القرقف ، طولها اربعون بين ١١ و ١٢ سم. قوتها جبل الالوان . قة رأسه وجناحاه وذنبه الى الزرقة السنجابية يطعمها في الجناحين تبيع ابيض . ظهور زرقوتي ، بطنه اصفر . صمراء الى البياض الناصع . طوقه متقه اسود اللون ازرقي المخارج || وهو طائر اهد يالاف الاسراج والخلات والجناح .

والجزر واللينق والكسنة وبيوض الصائير ... || اجناسها اركان تربتها بين شقوق الصخور او في صدوع الاشجار . اناثها تنجع من ٤ الى ٦ ادواس تبصر وتكتفي بعد اسبوع وترضع نحو الشهر || اعرف انواعها ما يلي .

٢١٨٩٩ - قَرَقْدَنُ البَلُوط *

Myoxos nitidula (S). *Loir dryade* (F).

نوع من القرقن ، طولها نحو ١٥ سم. وذنبه ٨ . ظهره اريد اصفر . بطنه ابيض اقبر || موطنه معتدل من البحر الى اربعة . يالاف اسراج السديان لان ركيزة قوته البلوط .

٢١٨٩٧ - قَرَقْدَنُ اَبْرَقِ

Myoxos elegans (S).
Loir elegant (F).

نوع من القرقن . موطنه اليابان . طولها نحو ١٥ سم. وذنبه ٤ . ثوبه الى الصبغة السنابية يميل مع اقترابه من تيج الظهر . رأسه جزوي المخارج ، بطنه وسواقي جراسمه الى الصفرة || قوته اثار على اسفلها .

٢١٨٩٨ - قَرَقْدَنُ شائع *

Myoxos glis (S). *Loir commun* (F).

نوع من القرقن . طولها نحو ١٦ سم. وذنبه ١٤ . ظهره الى الصبغة الازرقاء يطعمها مخارج اسود . بطنه وسواقي جراسمه الى البياض القضي . خداه وصنقه واسفل ذنبه ببيض . موطنه شيوخ الارباع معتدل من الشرق الى اطراف اربعة . يوجد في لبنان وسورية .

٢١٨٩٩ - قَرَقْدَنَاتُ ، قَرَقْدَنَاتُ

Myoxidae (S). *Myoxidae* (F). *Myoxidae* (E).

فضيلة حيوانات لينة قاضية من مرتبة قرقنات الشوب ورتبة القواض . اجناسها ثلاثة القرقن وذئبة والقرب . موطنها العالم القديم || اجناسها صغيرة اللد مستطيلة الشكل والذئب . براطها العليا مطوقة ، جراسمه قصيرة . جميعها شاجرة تسرح في الليل . قوتها اثار والحشرات . يالها الشوي يدم نحو ستة اشهر .

٢١٨٩٠ - قَرَقْدَنَاتُ الشَّوْزَبِ *

مرتبة حيوانات لينة من رتبة القواض تشمل خس فصائل القرقنات والقاربات والمخلديات والجبوسيات والبريويات

٢١٨٩١ - قَرَقْدَنُ قَدَرِ

Puteolus fideus (F).

هو ابن حرس مدن ، اطلبه .

٢١٨٩٢ - قَرَقُفُفُ

Circus (F).

هو الذئد البري ، اطلبه .

٢١٨٩٣ - قَرَقُفُفُ ، سَكَبَتَاتُ

Phlebotomus (S).
Phlebotomus (F).

جنس حشرات من فصيلة القرقفيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة اللد ، طولها اربعون بين ٢ و ٥ سم. اجناسها ورواشنهم وقوتها الاستعمارية حليلة اللد ، صفراء الاذن ، حليلة المخارج . اعطاهها البلاد الحارة . ذكورها تعيش على رصق الاضمار والافرازات السكرية النباتية . اناثها تحضن اللحم حيث تستطيع . لسنتها مزججة يقال انها تنقل الحصى الباردة رصبة حلب .

٢١٨٩٤ - قَرَقُفُفَةُ اَزْبِقَةِ الشَّكْلِ *

Psychods phalaenoides (S).

Psychode phalaenoide (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفضيلة القرقفيات . جسمها

Alcedinidae (S).

٢١٩٠٨ - قُرُفَاتِيَّات

Alcedinidae (F). Alcedinidae (E).

فصيلة طير من الجواثم المتصقات الاصابع تتميز بصغر جرمها وحدة صبرها وسرعة اختطافها. رؤوسها غليظة. اجسامها ريمية منكشحة. مناقيرها قوية مستطيلة ذلقة. اجنحتها متوسطة القد. اذنانها واربعها قصيرة. الوهاج قزسي الالوان الزاهية || اجنحتها والوهاج عديدة تتجمع الى حمارتين القريات والمزوريات .

Alcedo (S).

٢١٩٠٩ - قُرُفَاتِيَّ ، قَاوَكْد

Martin-pêcheur (F). Plad kingfisher, Ceryle rudis (E).

جنس طير من القريات . انواعه ٣٠ موطنها العالم . ذكر كثير في المناطق الحارة والمعتدلة . تتميز باستطالة مناقيرها السود . اجنحتها متوسطة القد مستدرة . اذنانها واربعها قصيرة . اثنائها قزسية الالوان الزاهية الجميلة || وقد قيل فيه : طائر مزوم يهوى باحصى عليه الى قمر الماء طمعاً في ما يمسده ويغض الاخرى حذراً بما يصيبه منه المثل « هو احزم او احلر من قرق ان رأى خيراً نذل وان رأى شراً تولى » || وذلك لانه اذا ابصر في الماء ما يستل يحمله انقض عليه كالسم المرسل فاصغر من قمر الماء واذا ابصر في البحر كاسر دخل لير هرباً بسرعة البتلة . اصرف انواعه واشهرها ما يتبع .

Alcedo cyanotis (S).

٢١٩١٠ - قُرُفَاتِيَّ اَزْرَق *
Martin-pêcheur bleuâtre (F).

طائر من القرق . ثوبه الى الزرقه الجميلة اخضره الموج . مناقير اسود . ريشه الى الجفوة . موطنه افريقية الغربية . اخلاقه اخلاق القرق الشائع .

Alcedo bengalensis (S).

٢١٩١١ - قُرُفَاتِيَّ بَنْغَالِي *
Martin-pêcheur bengalais (F).

طائر من القرق . ثوبه قزسي الالوان الحاررة الجمال . موطنه يمتد من الهند الى اقصى الشرق . ارباشه مزرقه ، ثمينه ، مرغوب فيها || اخلاقه اخلاق القرق الشائع .

٢١٩١٢ - قُرُفَاتِيَّ شَالِع * ، قَاوَكْد شَالِع ، ابي

الرغص ، صلاب عليه

Alcedo ispida (S). Martin-pêcheur vulgaire (F). Common kingfisher (E).

طائر من القرق . مناقره اسير . رأسه مرطف . ذروه واعل عتقه الى البياض العاجي . حمره الى الصبغة القاتمة . ظهوره لائزدي . قنقه ويتناحه الى الزرقه اخضره الموج . صدره وظهره الى الشبه السفاه . ذنبه الى الزرقه المختلفة الموج . ريشه الى الجفوة || موطنه يمتد من الهند الى بلاد فارس والشرق الاوسط واروبه وافريقية الشالية . يالفت جرف مجاري الماء وصفات الصفات . قوته الاسماك والفقريات واخترت || اثناء تبيض من ٦ الى ٨ بيضات تحضنها وسحها من ١٩ الى ٢١ يوماً .

Alcedo cristata (S).

٢١٩١٣ - قُرُفَاتِيَّ قَنْبَرَالِي *
Martin-pêcheur huppé (F).

طائر من القرق . ثوبه قزسي الالوان الجميلة . رأسه قزسي الريش . موطنه افريقية الشرقية والشالية || اخلاقه اخلاق القرق الشائع .

Alcedinini (F).

٢١٩١٤ - قُرُفَاتِيَّات

جماعة طير من القريات تشتمل القرق والزرقاء وخط الماء . جميعها صغيرة الجرم ، زاهية الالوان المتراكبة .

٢١٩٠٠ - قُرُفَتِ الْمَقَابِبِ

Mésange des roseaux (F).

طائر من القريات يدهى سبال ، اطلبه .

٢١٩٠١ - قُرُفَتِ قَنْبَرَالِي *
Parus cristatus (S).

Mésange huppée (F).

نوع من القرق ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم . رأسه قنبري الريش الاسود المنقح بالاكعب . ظهوره الى الصبغة الرماد . بطنه الى الصبغة النبراه الصفراء الموج . ذروه اسود ، عتقه مطوق بالاسود والابيض . حمره الى البياض الاخير تملوه رشفة سره || يالفت احراج الصنوبر .

٢١٩٠٢ - قُرُفَتِ كَبِير *
Parus major (S).

Mésange charbonnière, Mésangère (F). Great titmouse, Ox-eye (E).

نوع من القرق ، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم . ثوبه متراكب الالوان . ظهوره الى اخضر الازرق يعلوه موج اصفر . بطنه الى الصفرة الباهتة يعلوه خط قاطب اسود يمتد من طوق العنق الى اواسط البطن . رأسه وعتقه الى السود اللامع ، حمره وقنقه ببيض ، جتناحه وذنبه الى الزرقه الزرادية . قوامه يفيض الحار || يالفت الحدائق والجنائن والنباتات والاغصان .

٢١٩٠٣ - قُرُفَتَتِيَّ
Fauvette orphée (F).

طائر من الدخال . اطلب دعلة غريبة .

٢١٩٠٤ - قُرُفَاتِيَّات

Paridae (S). Paridae (F). Paridae (E).

فصيلة طير من الجواثم الخروطيات المناقير ، اجنحتها وانواعها كثيرة الهند . اصطناعها العالم . مظهرها غريد . ذكورها واناثها متشابهة . تعيش على الاشجار . قوتها الحشرات ويكتها ويرقاتها والثمار والنبور || تكثر في تجاريف الاشجار واوقاب الصنوبر والابنية للمهجورة . اركنها كروية الشكل تحميها بمهارة وتفرشها بالورب والصفوف .

٢١٩٠٥ - قُرُفَتَان *
Calendula officinale (F).

هو الاذرين الهزني ، اطلبه .

٢١٩٠٦ - قُرُفُور *
Pristipoma stridens (S).

Pristipoma strident (F).

سمكة من الشجرم تنتمي الى فصيلة القزريات . طولها نحو ٥٠ سم . ثوبها الى الكهبة القزسية للمواج . حراشها مبهدة . زانفتها كبيرة . الظهريه مستطيلة شائكة والشربيه فارقة . يكتر وجوده في المنطوق والبحر الاحمر .

٢١٩٠٧ - قُرُفُوس *
Coriscus rostratus (S).

Sublet groin, Sublet, Sublaire (F).

Coriscus rostratus (E).


سمكة بحرية ينزف من فصيلة الكيديات . اصطناعها البحر الابيض المتوسط . مسرهما حشاش المباحذ والاغواط || جسمها احليلي القرون يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى اخضر الخجلي الموج يعلوه شمشع وردي واصفر . رأسها مخروطي ، ذلق القطن المنفخ . زعنفتها الظهريه مستطيلة تنتهي بمستوى الشربيه . زعنفتها الشالية شبه منطوية || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .



قُرُفَتِ قَنْبَرَالِي



قُرُفَتِ كَبِير



قُرُفُور



قُرُفُوس



قُرُفَاتِيَّ اَزْرَق



قُرُفَاتِيَّ شَالِع



قُرُفَاتِيَّ قَنْبَرَالِي



قُرْمَاة البرازيل



قُرْمِزِيَّة أَسْرَاطِي



قُرْمِزِيَّة الْبُرْتُقَالِ الْبِيْضَاءِ



قُرْمِزِيَّة الْبُرْتُقَالِ السَّوْدَاءِ



قُرْمِزِيَّة الْتَفْحَاحِ



قُرْمِزِيَّة الثَوْتُ

الولج . مكناتها غُمد العفصة ابيض اللون يحوي من ٦٠٠ الى ٨٠٠ مكنة قُرْمِزِيَّة اللون مُرَامَاة السُت . لها جيلان في الحول، الاول يستمر من آذار الى تموز والثاني من آب الى شباط || تركيب الحفصيات والورد والبسطة والدار واللوبياء والبطاطا || تكاثر عند نفث مكن الجليل الاول وذلك في خلال شهر نيسان .

٢١٩٢١ - قُرْمِزِيَّة الْبُرْتُقَالِ الْبِيْضَاءِ * مُغْفِرِيَّة الْحَفْصِيَّاتِ الدَّقِيقِيَّةِ ، كُوْشِيْل الْبُرْتُقَالِ الْاَيْشِ

Pseudococcus citri, *Dactylopius citri* (S). *Cochinilla blanca de Foranger*, *C. farinosa de Foranger* (F). حشرة من القُرْمِزِيَّات . اثنائها سمره اللون ، حراء الملوخ، بيضيه الشكل ، منشارة الخار، تقايط من ٢ الى ٦ م. جسمها منفي بمادة دقيقة بيضاء، مكناتها يحوي من ٤٠٠ الى ٥٠٠ مكنة صفراء اللون || اسيالها الحولية يراوح بين ٤ و ٥ تركيب الحفصيات والكمية والتين والخروبين والصبار ... وهي شديدة الاذى تقضي على الاوراق والاغصان والثمار || مكافحتها صعبة تستلزم رعاية خاصة قوامها التطهير بالمخازن السامة . وقد تم الاذابة الحشرات المضادة التي تقضي عليها اغصان الكريبتولايسوس (*Cryptoloeus*) .

٢١٩٢٢ - قُرْمِزِيَّة الْبُرْتُقَالِ السَّوْدَاءِ *، قُلْمَكَّة الْبُرْتُقَالِ السَّوْدَاءِ، حَشْرَكَة قَشْرِيَّة سَوْدَاءَ، كُوْشِيْل الْبُرْتُقَالِ السَّوْدَاءِ

Aspidiotus aspidium, *Parlatoresia ziziphi* (S). *Cochinilla negra de Foranger*, *Aspidiot de Foranger* (F). حشرة من القُرْمِزِيَّات . دروبها مسطحة الشكل قائمة الزوايا تقايط نحو ١ م. رنة خطوط وتومض نحو ٦ خطوط. قوامها الى السواد اللامع . مكناتها مخروطي الشكل يجمع الخار الابيض يحوي نحو ٣٠ مكنة ريفية الشكل، بنفسجية اللون || اسيالها الحولية من ٢ الى ٣ تركيب الحفصيات دون غيرها وهي لا تقرب الثواب ابدأ في حين ان تسميتها العلمية تشير اليه || تكاثر باستعمال مزيج من الازيت النباتية والبيضاء .

٢١٩٢٣ - قُرْمِزِيَّة الْتَفْحَاحِ *، وَغَفَّ حَمَكَارِي، مُغْفِرِيَّة الْتَفْحَاحِ الْمَدَكِيَّةِ، كُوْشِيْل الْتَفْحَاحِ كَرْمِيْسِ الْتَفْحَاحِ،

Lepidosaphes ulmi, *L. ceratoniae*, *Mytilaspis flava*, *M. pomorum*, *Diaspis pomorum* (S). *Cochinilla du pommier*, *C. virgule du pommier*, *Kermès virgule*, *Diaspis du pommier* (F). *Mussal scale* (E). حشرة من القُرْمِزِيَّات فاصلة الشكل ، دقيقة . طويلا من ٣ الى ٤ م. قوامها الى الخشنى فاصلة مادة شمعية بيضاء . مكناتها يحوي من ٤٠٠ الى ٦٠٠ مكنة حنطية اللون || جبلها الحولي واحد وهي تركيب التفاح واللاجاس والحوخ والمشمش والجوز والزيزين والازيدرت والحوخ والصنصنات ... || تكاثر على اثر نفث الممكن وقد يكون ذلك في حزيران .

٢١٩٢٤ - قُرْمِزِيَّة الثَوْتُ *، قُلْمَكَّة الثَوْتُ، دَسِيْسِي الثَوْتُ

Diaspis pentagona, *Pseudaulacaspis pentagona* (S). *Cochinilla du mûrier*, *Diaspis du mûrier* (F). حشرة من القُرْمِزِيَّات . دروبها صافية قوامها يراوح من

روسيها خفيفة . مناقيرها سادة مستطيلة . ارسافها قصيرة . تألف خطوط الجدار وجرثوم الانهار وشفاف البحيرات . قوامها الى السمك والشفافية والخفريات || تكاثر في اناضول تحضرها في الاماكن الرطبة المنتشرة على مجاري الماء .

٢١٩١٥ - قُرْم * ثَوْتُ كَالْدَلْبِ غُلْفًا وَيَبَاضًا يَنْتِث فِي جَوْثِ الْبَحْرِ (اللسان) .

٢١٩١٦ - قُرْم * الْفَحْل الْكَرْجَم من الابل الذي ترك القمل لم يسه حبل ولم يحبل عليه || وقيل السيد العظيم على انتشيه بالفحل . قال المتنبي : ولكننا نذهب منسلك قُرْمًا تراجمت القروم له حقائقا

٢١٩١٧ - قُرْمَاط * *Curimatus* (S). *Curimatus* (F). *Curimatus* (E).

جنس اسماك نهرية من متفرعات الحفافة وفضيلة السلمونيات. انواعها المعروفة لا تتجاوز عشرة . اصلها المياه السطحية الايركية انحصار امريكا الجنوبية || اجسامها اهلالية الشكل، مستطيلة القد، تتميز باعظامها الحادة الاطراف الدرة للفاقة وبفكوكها الخالية من الاسنان || الثور انولها قُرْمَاطَة البرازيل .

٢١٩١٨ - قُرْمَاطَة الْبِرَازِيلِ *

Curimatus laticeps (S). *Curimatus à large tête*, *C. du Brésil* (F). *Curimatus laticeps* (E).

نوع من القُرْمَاط . مبدؤها نهر البرازيل وبحيراته وقد شاعت تربيتها في اكثر سماء العالم لانها سرورية، قليلة التسلطيات، جيدة اللحم || جسمها اهلالي الشكل، مستعرض بطول نحو ٣٠ م. رأسها مخروطي الشكل، مستعرض القاعدة، ثوبها الى الخضار القضي يبدع مع اقترابه من ثوب الظفر ويبدو عند البطن . زعنفتها الظهرية واحدة شبه شراعية الشكل يقيمها في مؤخر الظهر جذعة فضرفية . زعنفتها الشريفة تقابل الجذعة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنوبر مغروب فيه .

٢١٩١٩ - قُرْمِزِيَّة، مُغْفِرِيَّة، حَشْرَكَة قَشْرِيَّة، قُلْمَكَّة الْبِنَات، كَرْمِيْس، كُوْشِيْل مُغْفِرِيْس

Cochinilla, *Kermès*, *Céroplaste* (F). *Cochineal*, *Kermès* (E).

اسم شامل يطلق على مختلف انواع القُرْمِزِيَّة والمغفريات وحشرات صغيرة القد تقضي الى فصيلة المغفريات. تركيب الاجسام المشددة وبقدرها من التباينات الزراعية والحرجية فتقوينا وتوقع بها الاضرار || اعرف انواعها المؤذية ما يلي .

٢١٩٢٠ - قُرْمِزِيَّة أَسْرَاطِيَّة *، كُوْشِيْل أَسْرَاطِي، اِيْسْطَار

Icerya purchasi, *Pericarya purchasi* (S). *Cochinilla australienne*, *Icerya* (F).

حشرة من القُرْمِزِيَّات طول الاكثر فيها يراوح بين ١ و ٢ م. ثوبه الى الحمرة، جناحها الى البياض الشفاف . (S). الانثى تقايط من ٤ الى ٥ م. ومكناتها يطول من ٣ الى ٤ م. جسمها وردي اللون تشابه حيوط زفنية شمعية فضية

٢ م. وتصل إلى ٢ م. وأربعة خطوط. ثوبها إلى البياض الأخير. الذكر يطول نحو ١ م. وخسة خطوط وهو يتغذى اللون، وشفاف الجناح. سريع الحركة. الأنثى مستعرضة الشكل، صفراء اللون. أجيالها الحولية ثلاثة، مكثها أصفر اللون تنمحه حل السوق والأضراس والأفنان ابتداء من أواخر نيسان فينتفج ابتداء من أواخر أيار || تركيب التوت والبذائق والشمس والورق والكشمش والياعين والصفصاف || تكاثف باستعمال الحشرات المضادة أو بعض الحواشير الفعالة أعصها الملوأكين الشفوية كالزيت النباتية المركزة بمعدل ٢٪.

٢١٩٢٩ - قرمزية الصبار ، كوشيل الصبار
Disaspis echinocacti (S). Cochenille des cactées (F).
حشرة من القرمزيات. درفها صابجية الشكل قطرها نحو ٢ م. أناتها مستعرضة، مبطلة، ثوبها إلى الخضرة السمرام. أجيالها الحولية ثلاثة. تركيب نباتات الصبار حل اختلاف أجناسها وألوانها || تكاثف باستعمال أسد الحواشير الفعالة حل حدة دلمات متتالية فترها تراوح من ١٥ إلى ١٢ يومًا.

٢١٩٣٠ - قرمزية القرونوس
Eulecanium corni (S). Lecanium du cornouiller, Cochenille du cornouiller (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات. أناتها بيضية الشكل مبطلة، تطول نحو ٦ م. وتعرض ٤ م. ثوبها إلى الجفوة اللامعة. زيانها سباحية الفواصل. مكثها بحوي من ١٥٠٠ إلى ٣٠٠٠ مكنة تنقف بعد معتها باسويين إذا كان ذلك في حزيران أو في تموز || وهي من الحشرات البهجة المؤذية. تركيب القرونوس والكريمة والخوخ والدراق والجوز والبندق والورد والسديان واللبية. تصطب الانزاع وتصيب الآثار وتسبب البثان || تكاثف في الشتاء باستعمال سائل الكريوتيل المركز من ٤ إلى ٥ ٪ وتكاثف في الصيف من تموز إلى آب باستعمال مركبات الباراثيون أو أسد الحواشير الفعالة أو الزيتي البيضاء المركزة من ١ إلى ٢ ٪ حل إن يتجه النضج من أسفل إلى أعلى ليم جميع صفحات الأوراق السفلى.

٢١٩٣١ - قرمزية الكرم القبراء ، كوشيل الكرم القبراء
Hellecococcus hysrix, Phenacoccus hysrix (S). Cochenille farineuse de la vigne (F).
حشرة من القرمزيات. طيلها نحو ٤ م. ثوبها وردي. زفها الشمعي يلحف الظهور دون سواء. مكثها بشمي بحوي من ٤٠ إلى ٦٠ مكنة ريفية الشكل حمراء اللون. أجيالها الحولية ثلاثة. تركيب الكرم والعنب.

٢١٩٣٢ - قرمزية الكرمسة البيضاء ، دمة بيشام
Dactylopius vitis (S). Cochenille blanche de la vigne (F).
حشرة من القرمزيات. جسمها بيضي مفلطح. ذكرها مجنح يطول نحو ١ م. لونه إلى الصفرة. أناتها عديدة الجناح، تطول نحو ٤ م. ثوبها إلى الجفوة القرمز. تفرز مادة شمعية بيضاء اللون تنفشا بكاملها. تمتع مكثها حل صفعة النضج السفلي في خلال حزيران فينتفج من رقات همة تحصى حصاره الأوراق ولا تنف من العنب. ثم تقضي نباتها الشتوي في شقوق غلاف الجلود ويصنع انتداب الجلود في التربة || تكاثف يكشط اللحاء القديمة اليابسة وبطرس الجلود بماء الكلور أو بسائل سلفات ألحميد المحلول ١٪.

٢١٩٣٣ - قرمزية الكرمسة الحمراء ، قرمزية الكرمسة الطوطية ، كوشيل طوطي
Pulvinaria vitis (S). Cochenille floconneuse de la vigne, C. rouge de la vigne (F). Grape scale (E). Wollige Rebschildläuse (D).
حشرة من القرمزيات. درفها بيضية الشكل تطول من ٤ إلى

٢ م. وتصل إلى ٢ م. وأربعة خطوط. ثوبها إلى البياض الأخير. الذكر يطول نحو ١ م. وخسة خطوط وهو يتغذى اللون، وشفاف الجناح. سريع الحركة. الأنثى مستعرضة الشكل، صفراء اللون. أجيالها الحولية ثلاثة، مكثها أصفر اللون تنمحه حل السوق والأضراس والأفنان ابتداء من أواخر نيسان فينتفج ابتداء من أواخر أيار || تركيب التوت والبذائق والشمس والورق والكشمش والياعين والصفصاف || تكاثف باستعمال الحشرات المضادة أو بعض الحواشير الفعالة أعصها الملوأكين الشفوية كالزيت النباتية المركزة بمعدل ٢٪.

٢١٩٢٥ - قرمزية الحمضيات ، وعف الحمضيات ، وعف أزجواني

Lepidosaphes citricola, L. pinnaeformis (S). Cochenille virgule des oranges (F).
حشرة من القرمزيات. درفها مبدية الشكل ثوبها إلى السمر. حصارها أخضر، وغلانها شمعي للمادة خلي التركيب. طيلها يراوح من ٢ م. وخسة خطوط إلى ٤ م. وخسة خطوط. عرضها نحو ٢ م. مكثها مستطيل الحراب بحوي من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ مكنة وشعية الشكل حطية اللون. أجيالها الحولية تراوح من ثلاثة إلى أربعة. تركيب أوراق الأفنان وثمار الحمضيات أعصها البرتقال واليوسفي وليوسف الجنة || تكاثف باستعمال الفنازات السامة لأن الحواشير والزيت البيضاء لا تقضي عليها تمامًا فطرًا لكثرة وجودها حل صفحات الأوراق العليا.

٢١٩٢٦ - قرمزية الخرنوب ، كوشيل الخرنوب
Chionaspis ceratoniae (S). Cochenille du caroubier (F).

حشرة من القرمزيات، أحاسية الشكل مفلطحة. الذكر حاصي اللون طوله نحو ١ م. الأنثى يتغذى اللون تطول نحو ٣ م. || يقال إن جيلها الحولي واحد، تركيب أوراق الخرنوب والبندق والزيتون || تكاثف باستعمال الزيت النباتية والبيضاء.

٢١٩٢٧ - قرمزية الزيتون السوداء ، قنبودة الزيتون المخططة ، كرميس الزيتون

Saissetia oleae, Lecanium oleae (S). Cochenille noire de l'olivier, Lécaine de l'olivier, Kermès de l'olivier (F).

حشرة من القرمزيات. درفها بيضية الشكل تطول من ٣ إلى ٤ م. وتعرض من ٢ إلى ٣ ثوبها إلى السمره الشمعية. مكثها مكور الشكل بحوي من ١٥٠٠ إلى ١٦٠٠ مكنة ريفية، حطية اللون || جيلها الحولي واحد. تمتع مكثها ابتداء من أيار ويستم إلى أواخر تموز. أما القنبودة فينتفج بعد المتع يتنوع ثلاثة أسابيع || تركيب الزيتون والحمضيات والبذائق واليوسف... تسبب البثان الأسود بالإضافة إلى أضرارها || تكاثف باستعمال الحشرات المضادة أو الزيتي الشفوية البيضاء أو الحواشير الفعالة الصيفية.

٢١٩٢٨ - قرمزية السديان ، كرميس السديان
Lecanium ilicis (S). Cochenille du chêne vert, Lécaine du chêne vert, Kermès du chêne (F).

حشرة من القرمزيات. درفها مستديرة، سوداء القرمص، صفراء الجسم، مرققة الخنار تحوي مادة شمعية لزجة،



قرمزية الحمضيات



قرمزية الخرنوب



قرمزية الزيتون السوداء



قرمزية الكرم القبراء




قرمزية الكرمسة البيضاء



قرمزية الكرمسة الحمراء



قمرية اللوز




قمرية النخيل



قمرية اللوز



قمرية فتاة



قمرية قمره



قمره

باستعمال اسد الحواشير الفعالة موزعاً بالزيت الأبيض . وقد تجري المكافئة حل عدة مرات ابتداء من زين القملة .

٢١٩٣٨ - قمرية لوز * ، مقبرية صيني

Lepidosaphes gloweri (S). Serpette (F).
حشرة من القمريات . مقسية الشكل سمراء الثوب طولها يتوسط من ٣ سم . ال ٣ م . وخمسة خطوط ، بينها عرضها من خطين إلى ثلاثة خطوط غشاء عليها شمي المادة ، نحيل النسيج ، أبيض اللون . مكنتها بحوي نحو ٢٠٠ مكنة رنية الشكل ، وردية اللون || أجيالها الحولية ثلاثة . تركيب أوراق الحشيشات والكناسية . تكاليف مكافئة قمرية الحشيشات .

٢١٩٣٩ - قمرية لوز ، مقبرية ، كرميات

Coccidae (S). *Coccidae* (F). *Coccidae*, Scale insects (E). *Schildläuse* (D).
نصيلة حشرات من رنية متجانسات الانجته . اجناسها وانواعها كثيرة اللد جميعها صفة اللد ، مزدوجة الشكل ، لا نظامية التناسل منها البيوضة والبيضة والسرودة || ذكورها مستطيلة الشكل مجنسة . اجناسها شائعة ، ثنائية العروق القاطبة . اناتها عادمة الجناح ، مستعرضة مبطلة ، وروسيه وجوانها متدخية ، متاكها ثالثة ماسة . قوائمها قصيرة ، ارجلها وصيدة المقلعة ، مقاطها فردية ، مدبية . اغشية اجسادها هذبة . تغرز بقض المواد ابراقية كالشمع والشمع واللغن والحرر وما اشبه || اشهر اقسامها القرمز والخلعير .

٢١٩٤٠ - قمريل

الابل الصغار الكثيرة الاورار ذات السنتين .

٢١٩٤١ - قمركة

٢١٩٤٢ - قمرود *

Tragelaphus selousi (S). *Tragelaphus de Selous* (F). *Sitatunga* (E).
نوع من الجبل قدمه قدر الملب . ثوبه اشبه اصفر يملو تجلج وتيج || يألف المنافع ويقيم كئنه بقرها . ج . قرايد . والاني قريدة .

٢١٩٤٣ - قمرص ، أحموص

Nid en terre (F). *Nest in land* (E).
وكر الطائر حيث يلصق في الارض .

٢١٩٤٤ - قمرط * ، سلور النيل

Clarias anguillaris (S). *Clarias commun*, C. du Nil (F). *Common catfish* (E).
نوع من السلور يكثر ويتجدد في النيل وهو قريب الشبه بالكنكليس الا انه مفلطح الرأس . طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى السمرة الزيتية يملو موج اعصر || لحمه حادي الصنف والمذاق .

٢١٩٤٥ - قمرعبد *

Bouquetin femelle (F). *She ibex* (E).
هي انثى الويل . ج . قرايد .

٢١٩٤٦ - قمرعبد *

Tulle (F). *Tile* (E).
نصينة من الصلصال الجاهد او المصنعت المشوي .

٢١٩٤٧ - قرن

Accouplement, *Accouplement*, *Attelage* (F). *Coupling*, *Harnessing*, *Yoking* (E).
هو شد او ربط البهائم السموت او للجر ...

٥ م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى السمرة اللعابية . مكنتها كبير اللد طولي المادة اللاصقة البيضاء يحوي من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ مكنة رنية الشكل ، سمراء اللون ، جزوية المواج || جيلها الحولي واحد . تنجح مكنتها من اوامر ايار الى اواخر تموز فيفتق في تموز وآب . تركيب الكرية والبيضة والملت . تكاليف كثيرها من القمريات باستعمال اسد الحواشير الفعالة .

٢١٩٣٤ - قمرية اللوز * ، كوشيل اللوز

Lecanium amygdali (S). *Cochenille de l'amygdalier*, *Lécaneum de l'amandier* (F).
حشرة من القمريات . مستدرة الشكل قطرها نحو ١ م . وخمسة خطوط . ثوبها الى الرمادي . افرازها لزج اسمر . مكنتها مركزي ، احمل اللون ، يحوي نحو ٢٠٠ مكنة وشية الشكل ، حطيلة اللون || جيلها الحولي واحد . تركيب اثنان وارواق جميع الاشجار الوردية انصها اللوز . تكاليف في الشتاء باستعمال مزيج من الزيت الابيض والنيابي المركز بمعدل ٢٪ .

٢١٩٣٥ - قمرية النخيل * ، وكمه النخيل ، كوشيل النخيل

Parlotes blanchardi, *Websteriella blanchardi* (S). *Cochenille du dattier* (F).
حشرة من القمريات . احطائها تشمل نخيل العالم . اذكر دقيق نخيل ابيض اللون يطول نحو ١ م . الاثني بنفسية اللون ريمية الشكل تطول نحو ١ م وثلاثة خطوط . رديتها سمراء اللون يحويها ثوب من الرطب شمي المادة احمل اللون . مكنتها يحوي من ٤٠ الى ٨٠ مكنة كروية الشكل وردية اللون || اجيالها الحولية ثلاثة او اربعة . تركيب عموم النخيل تنفذ في اشه الاثني || تكاليف باستعمال الزيوت النباتية او بعض الحواشير الفعالة الجبرية .

٢١٩٣٦ - قمرية اللوز * ، ديسوس اللوز ، قملة اللوز ، كرميس اللوز ، كوشيل اللوز

Dispis rosae, *Aulacaspis rosae* (S). *Cochenille du rosier*, *Diapsina du rosier*, *Kermès du rosier*, *Pou du rosier* (F).
حشرة من القمريات . رديتها صاجية الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ٣ م . ثوبها الى الجوزة حنايا ابيض . الذكر خري اللون . ابيض الجناح ، يطول نحو ١ م . الاثني مستطيلة الشكل سمراء اللون . مكنتها جراب مستعرض يحوي نحو ١٠٠ مكنة رنية الشكل خرية اللون || جيلها الحولي واحد . تركيب الوردة والشمج . تكاليف باستعمال الزيوت البيضاء موزجة بالزيوت النباتية بمعدل ١٥ ٪ .

٢١٩٣٧ - قمرية فتاة * ، قملة سنان جوزة ، كوشيل سنان جوزة

Aonidiella perniciosus, *Aspidiotus perniciosus*, *Quadrasipterus perniciosus* (S). *Pou de San José*, *Cochenille de San José* (F).
حشرة من القمريات . رديتها صاجية الشكل قطرها نحو ٢ م . ثوبها الى الرمادي الاسمر تملو رقة بيضاء . الاثني سرودة سمراء اللون ، حطيلة المواج تنقص بطرف سنة اسابع ما قدره ٤٠٠ رقة || اجيالها الحولية تراوح من ٣ الى ٤ تركيب التلحع والواجص والدران والخرق والمشمش والكرز والصرة والقرون والوردية ... || تتمركز حل سوق ولعاصن يروع النبات حيث تمص النسج || تكاليف

حيات سامة من فصيلة الاقاني لها نتوان صغيران في رأسها كأنها قرنان . أنواطها اربعة جميعها خفيفة تسرح في الليل . موطنها الصحاري من مراکش الى جنوب الهند . تكثر في تونس وليبيا ومصر والجزيرة العربية حيث تنسج في الرمل لذاذا مر بها احد لدنته || أنواطها : ابن قرة ، حارية ، قرناء مصرية ، قصرى .

Lozier cultivé (F).

٢١٩٥٦ - قرنيش

هو اصابع العرس ، راجسه .

Capricorne, Longicorne (F).

٢١٩٥٧ - قرنيش

Longicorne, Long horned beetle (E). جنس حشرات من فصيلة القرنيشات . أنواعه كثيرة العدد تتميز باجسامها الكبيرة القدر الهديبة الظهور وبجرامها وقربها الاستثنائية المستطيلة . قال الاخطل يصف جارية ويعلها :

الا يا عباد الله قلبي ميم
ياحسن من صل واتبعهم بعل
ينام اذا نامت حل عكناها
ويلم فساءاً كالسلالة او اسل
يلدب الى اسنانها كلى ليلة
دييب القرني بات يملو نقاً سهلا

٢١٩٥٨ - قرنيش الدلب *

Xystrocera globosa (S). Xystrocera globuleux (F). حشرة من القرنيشات . رنية الشكل ، عجيبة الظهر . طولها نحو ٢٢ سم . ثوبا الى البني تشوبه حرة قائمة وأعدادها خضر تملو الاغاد || يرقاتها تركيب الدلب والنسط والقيح فتتشر السوق وتعلها .

٢١٩٥٩ - قرنيش السنديان *

Cerambyx cerdo (S). Capricorne (le grand). Capricorne du chêne (F). Great capricorn beetle (E). Grosser Eichenbock (D).

حشرة من القرنيشات . طولها نحو ٥ سم . ثوبا الى السمر ، ماحجها خطية لامة . زباناها مستطيلة . تسرح عند الغروب || يرقاتها كبيرة القدر تعيش اربع سنوات داخل السرايد التي تحفرها في خشب السنديان .

٢١٩٦٠ - قرنيش الصفصاف *

Lamia textor (S). الصفصاف Lamie des saules (F).

حشرة من القرنيشات طولها نحو ٢٧ سم . ثوبا الى السواد اللحيي || يرقاتها نحيلة القدر تركيب جلودح وسوق الصفصاف وألحود قنصرها وتعلها .

٢١٩٦١ - قرنيش صبيخة *

Cerambyx scopolii (S). Capricorne (le petit) (F). Capricorn beetle (E). Buchenbock (D).

حشرة من القرنيشات طولها نحو ٢٢ سم . ثوبا الى السمر الداكنة . تعيش حل ازهار الفروديات والطحيات والبساتين . تسرح في النهار || يرقاتها تركيب سرق الاشجار الحرجية ولا تمت عن الاشجار للشمرة اعصها التفاح والكرز والتين .

٢١٩٦٢ - قرنيش مسكة

Aromie musquée

هي الاروية المسكية ، اطلها .

٢١٩٤٨ - قرن هو السطة ، اطلها .

٢١٩٤٩ - قرن

ج قرن . والقرن بوارز قاسية خضلة الاجسام والاشكال تنشا حل رؤوس بعض الحيوالات كالبقر والتمم والظلياء والماعز وغيرها ...

٢١٩٥٠ - قرن إسكيشكاري ، زباني ، زباني

Antenna (F). Antenna (E). عضو مفصل متحرك شكله كالقرن يكون في رأس الحشرات وبعض الحيوالات الدنيا . وما قرنان وزبانيان تستعملها الحشرات للمس كا في الجراد او القمل كا في الذباب او السع كا في اليموس او لتضام كا في النمل || والقرن الاستثنائية عديدة الاشكال خضلة الاجسام والتركيب وقد وضع لكل شكل منها كلمة تعريف خاصة . أشهرها :

أرسي Ariste (F). Aristate (E). عيشي Filliform (F). Filliform (E). رأسي Capitulé (F). Capitule (E). ريشي Pennée (F). Pinnate (E). شوكي Sétacée (F). Setaeous (E). صيني Lamellée (F). Lamellar, Scaly (E). صولاني ، صني Calviforme (F). Calviform (E). قلادي ، سبي Moniliform (F). Moniliform (E). غزاري Stylée (F). Stylate (E). مرقي Coudée (F). Bent (E). مشطي ، عالي Pectinée (F). Pectinata (E). مشطي مزدوج Bipectinée (F). Bipectinata (E). منشاري Serrulée (F). Serrate (E).

٢١٩٥١ - قرن الأروس

Platycerium bifurcatum (S). Platycerium à cornes d'élan (F). Common staghorn fern, Elk's horn fern (E). Gewelhfarn (D). Aldorne (I).

نبات عيشي يساهي معمر من السرخسيات يزرع للزينة . أرواته قرصية الانتشاب ، فستقية اللون ، حنطية الفلح ، منشعية كقرون الاروس .

٢١٩٥٢ - قرن الأيل

هو لسان الحمل القرني ، اطلها .

٢١٩٥٣ - قرن الغزال

هو الرولس القرني ، اطلها .

٢١٩٥٤ - قرناء

Ceratocephalus (S). Céatocephale (F). جنس نباتات شجيرة ، حولية ، برية من فصيلة الشقيقيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جبال البلاد المحتلة الحارة من الشرق الاذن || سوقها قصيرة فراء . أرواقها متعاقبة . معققة ، كفية ، مفروسة وبشرية . انشاها صبيخة صفراء اللون ، خامسة التركيب ، قليلة الاسدية ، مشترية ، يحرسها النمل || تنويعها ديمي || أشهر أنواعها القراء المبجلة والمنحيلة .

٢١٩٥٥ - قرناء ، حريش

Cerastes (S). Ceraste, Horned viper (E).

ويدعوها مرققة وذات القرنين وذات الزبيبين . جنس



قروم



قرناء



قرنيش الدلب



قرنيش السنديان



قرنيش الصفصاف



قرنيش صبيخة



٢١٩٦٣ - قَرْنُفَلَاتٌ ، زُهَقُفَلَاتٌ

Cerambycidae (S). Cérambycidés, Capricornes, Longicornes (F). Cerambycidae, Longicornes, Longhorned beetles (E). Bockkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة غدييات المنحاج. حمارياتها واجتاهتا وانواعها تعد نحو ٢٠ ألف. اجسامها مستطيلة، اشكالها مختلفة، اطولها تمتد من ١٠ الى ٨٠ سم. اذواها عديدة الالوان. قرونها الاستشعارية خيطية مركبة من ١١ فاصلة وهي في الذكر اطول ما هي عليه في الاناث. ارساها خاصة اما تيمز كاتها رباعية لان خالصها صغير القد لاسي الاوتكاز. غالبا حادة. تطير في الليل او في النهار. قوتها الازهار وجميع المواد النباتية. جيلها يمتد من سنتين الى اربع سنوات. مكنتها لالياسي الشكل، اصفر اللون، تجمعه الانثى في لحاء النبات او تحت قشوره او ترز في الثرة قرب الجلود || يقاتها مردية الشكل، غليظة الروس والمنطقة الصدرية، تحية الاطراف والمنطقة الشرجية. قوتها المواد الخفيفة والخشبية، تسردب الانفاذ والنفورق والمقصود والقوق والجفود. حورياتها تتلصق بفخاوة خشنة تصنعها من فضات الخشب المصين بالورال في آخر سرداب سفرتة عند آخر الانساج.

٢١٩٦٤ - قَرْنُفِلَيْطٌ * ، قَرْنُفِلَيْطٌ

Brassica oleracea botrytis (S). Chou-fleur (F). Cauliflower (E). Blumenkohl (D). Cavolfiore, Cavolflore (I).

بقلة زراعية حولية شائعة الاستعمال من فصيلة الميليبيات. ترغب في الارابة المسفوعة التركيب الحكسي، للمنتلة الانساج والمبيقة الفور، الغنية بالمواد الازوتية والنضوية. تتكاثر بالبزور. تتقلل التقليل من الاكواد الى المستقل عند بله لشرة المادة البقية وتقرس حل ابعاد ترواح من ٦٠ الى ٧٠ سم.

٢١٩٦٥ - قَرْنُفَلٌ

Corindon (F). Corundum (E). حجر من الاولوين الصوف وهو اصلب الاجسام بعدد الناس. انواعه عديدة منها الحجارة الكريمة كالسفير. كسره يستعمل في صيغ المادان.

٢١٩٦٦ - قَرْنُفَلُكَ

Mus des oiseaux de proie (F). Mouting (E).

الفرقة زين تحير الريش عند الجوارح.

٢١٩٦٧ - قَرْنُفَلٌ

Dianthus (S). Œillet (F). Pink (E). Nelke, Sommernelke (D). Garofano (I). جلس نباتات شبيهة مصرية من فصيلة القرنفليات. انواعه ابرية والزراعية نحو ٨٠٠ اما ضروبه المشهورة فزهاء ٥٠٠ جميعها زراعية تزيينية. سوقها عقدية فراء. اوراقها حاشية متقابلة. نصلها سنائي الشكل ثخين الازتكاز، البحرية اللون. ازهارها جميلة الشكل، تاجية الازتكاز، مختلفة التجميع والالوان، عطرية العرف الفواح. بزورها صلبة القد، مستديرة الشكل، رقيقة الجرم، سمره اللون || يتكاثر بالبزور والمقل. يرغب في الارابة المتوسطة الانساج والظروية الغنية بالمواد النضوية والمضوية والناصر المدنية || اشهر انواعه الرئيسية ما يتبع.

٢١٩٦٨ - قَرْنُفَلٌ أَحْمَرٌ زَهَقُفَرِيٌّ *

Dianthus cinnabarinus (S). Œillet rouge cinabre (F). نوع من القرنفل مهدد اليونان، ساقه فراء تملو من ٣٠

الى ٤٠ سم. اوراقه شديدة الخضار، خالصة الروق. ازهاره الى الحسرة الزهقرية، كاسها تطول نحو ٣٥ سم. وقطر ثباتها ايضا || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢١٩٦٩ - قَرْنُفَلٌ لَوْرِيصِيَّةٌ *

Dianthus armeria (S). Œillet velu, O. armeria (F). Armeria pink, Deptford pink (E). Rauhe Nelke (D). Armeria, Garofano peloso, Viola da lepre (I).

نوع من القرنفل ضروبه وهاله عديدة، سوقها فراء خلية تملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. اوراقها الجليدية خضبة مستطيلة. اوراق سوقها وفروها اقصر من سلاحياتها، نصلها ثلاثية المروق، بحرية اللون. ازهارها صغيرة القد، وديدة، ملونة الزرقاء || يرغب، مع سائر ضروبه، في الارابة الرملية. ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

٢١٩٧٠ - قَرْنُفَلٌ أَزْوَقٌ

Dianthus caesius, D. gratianopolitanus (S). Œillet bleuët (F).

نوع من القرنفل ساقه فراء مسطحة. اوراقه قصيرة بحرية اللون، نصلها سنن الخلفة، ثلاثي المروق. ازهاره عطرية العرف، ثباتها وديدة اللون، مسنة الحار الحاربي، قطرها يتفرج من ٢٠ الى ٢٥ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٢١٩٧١ - قَرْنُفَلٌ أَسْفَعٌ

Dianthus ferrugineus (S). Œillet ferrugineux (F).

نوع من القرنفل مهدد ايطاليا. ساقه منتصبه فراء تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقه الجليدية ضيقة. اوراقه الساقية والقرعية اقصر من السلاحيات، نصلها حلق الخفسار البحري || ازهاره صغيرة القد، ثباتها ثنائية التفصيص، ثلاثية السنين، صفر الصفحات الحاربية، سمر الناحلية، مسع الموج || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٢١٩٧٢ - قَرْنُفَلٌ الْبَلْقَانِ ، قَرْنُفَلٌ بَلْسِيْمِيٌّ

Dianthus Pancici (S). Œillet de Pancic (F).

نوع من القرنفل مهدد البلقان. ساقه فراء تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقه خيطية، ضيقة، نصلها مالمش البشرة، حبيك الصفحة، بحري اللون. ازهاره صغيرة القد، مستطيلة الكأس، ارجوانية اللون، سمر الموج. ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢١٩٧٣ - قَرْنُفَلٌ الرِّمَالِ

Dianthus arenarius (S). Œillet des sables (F).

نوع من القرنفل منته الرمال. ساقه قليلة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٥ سم. اوراقه قصيرة النصل الضيق الاخضر. ازهاره فردية التجميع، متوسطة القد، ثباتها الى البياض الناصع تملو شمة وسطى خضراء || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢١٩٧٤ - قَرْنُفَلٌ الزَّهَارَيْنِ *

Dianthus caryophyllus (S). Œillet des fleuristes, O. flamand, O. remontant, O. perpétuel, O. fantasia (F). Carnation, Clove pink, Picotee (E). Gartennelke, Gartennelken gefüllte, Nelke (D). Garofano dei fioristi, G. scempio (I).

نوع من القرنفل الزهين المشهور. ضروبه واسره كثيرة العدد. سوقها فراء. اوراقها بحرية، نصلها جامد الصفحة. ازهارها مكعبة، فواحة العرف العطر،



قَرْنُفَلٌ



قَرْنُفَلٌ أَحْمَرٌ زَهَقُفَرِيٌّ



قَرْنُفَلٌ أَمِيرِيَّةٌ



قَرْنُفَلٌ زَهَقُفَرِيٌّ

* ٢١٩٨١ - قرنفل صيني

Dianthus chinensis (S). *Œillet de Chine*, O. *régence* (F). *China pink*, *Indian pink* (E). *Chinesische Nelke*, *Indisches Niglein* (D). *Garofano della Cina*, *G. della reggenza* (I).

نوع من القرنفل المحول. مهد الصين. ضروب عديدة سيقها فراء تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها مستطيلة تعرض نحو ٢ سم. نصلها شديدة الخضار البحري. أزهارها بسيطة أو مكبسة، بتلاتها مهدبة الخمار. ألوانها مختلفة منها السوية والبهاء والموشة والمروشة || أزهارها يستمر طوال الصيف.

* ٢١٩٨٢ - قرنفل منقصب

Dianthus strictus (S). *Œillet dressé* (F).

نوع من القرنفل قائم منتصب، قليلة الفروع، مستطيلة السليكات النحيلة، تملو من ١٥ إلى ٢٥ سم. أوراقه ضيقة النصل، بحرية اللين. أزهار فردية أو ثنائية التجميع، مستطيلة الممايل، خاتمة العرف. بتلاتها بيضاء اللين متصلة الانتشاب مقرصة الأطراف. أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز.

* ٢١٩٨٣ - قرنفليات

Caryophyllaceae (S). *Caryophyllées*, *Caryophyllées*, *Dianthées* (F). *Caryophyllaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القنات. اجناسها وأواعها كثيرة العدد تجتمعها ثلاثة أسباط: السليكات والفلقيات والنحليات. جميعها عشبية، معظمها معمر وبعضها محول وسوي. ومنها أيضاً البرية والبطية والصناعية والقرينية.

* ٢١٩٨٤ - قرنفل

Eugenia aromatica, *E. caryophyllata*, *Caryophyllus aromaticus* (S). *Groffier*, *Géroffier* (F). *Clove tree* (E). *Gewürznelken* (D). *Garofano*, *G. aromatico*, *Eugenia aromatica*, *E. coriifolide*, *Chiodo flore* (I).

جنية معمرة من فصيلة الآسيات. مهدا البلاد الحارة ساكها وأغصانها سوسة. أوراقها متعابلة، نصلها جامدة، وريشة العروق. أزهارها صغيرة القد، كروية رباعية التخصيص، بتلاتها ثمانية، أسديتها كثيرة العدد، مبيض مفتحة ثنائي الحياء المنظم، عمارها نورية متعوبة، زهورها قليلة. تزود لأزهارها الطريقة الشائعة الاستعمال المعروفة باسم « كيش القرنفل ».

* ٢١٩٨٥ - قرنوس

Chorinus (S). *Chorine* (F). *Chorinus* (E).

جنس دوبيات بحرية من القرشيات مشاربيات الأبريل قصيرات الذيل وفصيلة الحيات، أنوعها المعروفة ستة، اصطفاها بحار البلاد الحارة || أجسامها صغيرة شبه رباعية الشكل. حناكها تنتهي بزوائد. قرنية المادة، جالسة الانتشاب. قوائمها الامامية ملقطة الأطراف، لامتناوية الطول والنخانة. ألوانها متباينة الألوان تكثر فيها الألوان والسمرة الحديدية المولج.

* ٢١٩٨٦ - قرنوس

Cornus (S). *Cornouiller* (F). *Cornel-tree* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنوسيات. أنوعها المعروفة نحو ٢٥ منها الأشجار والشجيرات والجنبات والأغصان. أوراقها كاملة حاملة. أزهارها

كبيرة القد، قطرها ينال من ٦ إلى ١٢ سم. ألوانها عديدة تغلب فيها السوية.

* ٢١٩٨٥ - قرنفل الشاعر

Dianthus barbatus (S). *Œillet barbu*, O. *de poète*, *Bouquet parfait*, *Jalousie*, *Tête de chat* (F). *London tute*, *Sweet William* (E). *Bartnelke*, *Samtelke* (D). *Garofano barbuto*, *G. poeta*, *Mazzetto perfetto* (I).

نوع من القرنفل، ساقه منتصبه فراء، دقيقة السليكات المستطيلة، تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه سائبة النصل تعرض نحو ١٠ سم. لونها إلى الخضار المائل، أزهارها كثيرة العدد، بتلاتها تطول نحو ٢ سم. وهي مستعرضة الطرف المسنن. ألوانها مختلفة متعابلة عديدة || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

* ٢١٩٨٦ - قرنفل الصخور

Dianthus petraeus (S). *Œillet des rochers* (F).

نوع من القرنفل البري يعيش بين الصخور وفي الجبال. ساقه دقيقة نحيلة قليلة الفروع تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه لينة نصلها ثلاثي العروق، أخضر اللين، مدبب القصة الشاككة. أزهاره وريدية، صغيرة القد، فردية التجميع، عادمة العرف. يوجد منه في لبنان || أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

* ٢١٩٨٧ - قرنفل الهند

Tagetes souffi (F). هو الخشبية الجلدية، لطيفة.

* ٢١٩٨٨ - قرنفل برقي

Dianthus sylvestris (S). *Wood pink* (E). *Stänelke*, *Wilde Nigeli* (D). *Garofano salvatico* (I).

نوع من القرنفل، ساقه فراء تملو من ١٥ إلى ٣٥ سم. أوراقه جامدة النصل الأخضر المدب الطرف || أزهاره عادمة العرف، فردية التجميع، بتلاتها مسطحة الخمار الحاربي، وريدية اللين أو حمراء. يوجد منه في لبنان حتى ارتفاع ٧٠٠ م.

* ٢١٩٨٩ - قرنفل بهي

Dianthus superbus (S). *Œillet superbo*, O. *frangé* (F). *Fringed pink* (E). *Prachtnelke* (D). *Garofano frangato*, *G. superba* (I).

نوع من القرنفل، ضروبه عديدة سيقها فراء تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها تطول من ٤ إلى ٧ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٠ م. نصلها ثلاثي العروق، أخضر القصة. أزهارها عديدة، متوسطة القد، فواحة العرف، قطرها يراوح من ٢٥ إلى ٤٠ سم. ألوانها سوية مختلفة منها الأبيض والبيجي والوردي والاحمر والبنفسجي || أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

* ٢١٩٩٠ - قرنفل ريشي، قرنفل عطري

Dianthus plumarius (S). *Œillet mignardise*, O. *musqué* (F). *Feathered pink*, *Garden pink* (E). *Feder-nelke* (D). *Garofano a plumino*, *G. pennino*, *Garofani* (I).

نوع من القرنفل ساقه منتصبه فراء تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقه لينة تطول نحو ٥ سم. نصلها جامد الصفحة مدبب القصة، ياحت الخضار البحري. أزهاره فواحة العرف الطري قطرها نحو ٥ سم. بتلاتها مستطيلة التشرج مختلفة الألوان السوية || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.



قرنفل الشاعر



قرنفل برقي



قرنفل صيني



قرنفل



قرنوس

٢١٩٣٣ - قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الرَّقِّ

Cornus macrophylla, *C. brachypoda* (S). Cornouiller à grandes feuilles (F).

شجرة سبروتية تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها رطبة التصليب. أوراقها متعاقبة طول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٨ سم. نصلها منزهر البشرة على صفحتيه. حروفه سداسية أو خمائية الأزواج. أزهارها بيضاء. ثمارها الالاذق. السواد الازرق المالح.

٢١٩٩٤ - قُرْنُوسٌ كَنْدَاكَا

Cornus canadensis (S). Cornouiller du Canada (F).

حشية سبروتية عمرة تملو من ١٢ إلى ١٦ م. أوراقها السفل لاطفة متعاقبة اما العليا فضية ثلاثية. أزهارها نورية التصليب. بيض اللون. خضر المزاج. ثمارها شولية الشكل. حامزة الطعم. مأكولة. يستمر من حزيران الى آب.

٢١٩٩٥ - قُرْنُوسٌ مُحْبِرٌ

Cornus controversa (S). Cornouiller discuté (F).

شجرة فناء تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أثمارها وأغصانها زيا. السماء. أوراقها متعاقبة مستديرة القامة. نصلها طول نحو ١٥ سم. ويعرض ٨ سم. حروفه شضية سداسية أو خمائية الأزواج. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها زيتونية الشكل واللذ. سوداء اللون. رزقاء المالح. حامزة الطعم. مأكولة. أثمارها شديدة الصلابة. ناعمة الرقة. فائرة الصف.

٢١٩٩٦ - قُرْنُوسِيَّاتٌ، قُرْنَاتِيَّاتٌ

Cornaceae (S). Cornacées (F). Cornaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات. أجناسها وأنواعها عديدة جميعها نباتات معمرة منها الأشجار والجنات والاشجار. أوراقها بسيطة لكنها لا تقياسية الاثنكاز منها المتعاقبة والمتعاقبة. أزهارها عشوية. صبوابة أو عقودية التصليب. ثمارها نورية صغيرة لثمة مأكولة. أثمارها شديدة الصلابة. صناعية، مرغوب فيها.

٢١٩٩٧ - قُرْنُونٌ

هو لشوكة الصفراء، اطليا.

٢١٩٩٨ - قُرْنِيَّةٌ

Carotoida (F). Carotoid (F).

نمت تعريبي يوصف به ما كان شكله كالقرن.

٢١٩٩٩ - قُرْنِيَّاتٌ، قُرْنَاتِيَّاتٌ

Leguminoceae (S). Légumineuses (F). Leguminosae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القائلات. أجناسها وأنواعها كثيرة العدد تنقسمها لثلاثة أسباط: القرنيات والتمسنيات والسطيات. نباتاتها غظلة الاشكال والاحجام فيها الاشجار والجنات والاشجار. أوراقها مركبة لا تقياسية الاثنكاز. أزهارها عشوية. أثمارها عقودية. وهي تشمل العديد من ثنائيات الأزواجية الثلاثية والعلقية أشهرها الفول والبس والحصص واللوبيا والبرسيم والفول والبيقية والتيل والسنط.

٢٢٠٠٠ - قُرْنِيَّةٌ

Cornée (F). Cornée (E).

الجزء الخاربي الشفاف من العين.

٢٢٠٠١ - قُرْبَبٌ

Taureau corpuient (F).

Stout bull (E).

الثور اللسن الضخم. وقيل الثور الكبير الضخم.

٢٢٠٠٢ - قُرْهَدٌ

ولد البطل ج. قراعيد.

عشوية. رباعية التركيب، صغيرة اللذ، صبوابة التصليب. ثمارها نورية مستطيلة مأكولة. يزورها دهنية يتسخر منها زيت حاد يستعمل في صناعة الصابون أثمارها شديدة الصلابة، صناعية. أشهر أنواعه ما يتبع.

٢١٩٨٧ - قُرْنُوسٌ أَتَيْسُ

Cornus alba (S). Cornouiller blanc (F).

جنبة سبروتية تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ م. أثمارها مرجانية اللون أو صفراء. أوراقها بيضية. طول نحو ١٠ سم. وتعرض ٧ سم. نصلها خلى الصفحة السفل. حروفه خمسية أو سداسية الأزواج. أزهارها غيرة اللون. ثمارها حامية اللذ والشكل. بيضاء اللون. حامزة الطعم، مأكولة.

٢١٩٨٨ - قُرْنُوسٌ السُّوَيْدُ

Cornus suecica (S). Cornouiller de Suède (F).

حشية معمرة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها لاطفة متعاقبة. أزهارها نورية التصليب. جزوية اللون تحضبا أربع قنابات بيض. ثمارها صغيرة اللذ حامزة الطعم مأكولة. أثمارها يستمر طول شهر حزيران.

٢١٩٨٩ - قُرْنُوسٌ ذَكَرٌ، قُرْنُوسٌ مَبْدُولٌ

Cornus mas (S). Cornouiller mâle, C. commun, Courgeiller (F). Common cornel tree, Cornelian cherry (E). Kirschenhartriegel, Kornelkirsche, Kornelbeern, Kornelbaum (D). Corniolo, Corniale, Cornio (I).

شجرة سبروتية مبذولة تملو من مترين إلى خمسة أمتار. أثمارها حطية اللذاء مبشرة الزغب. أوراقها متعاقبة، صغيرة اللذ، حامة البشرة، خمسية أو سداسية العروق المزدوجة. أزهارها صفر التبرجات. خضر القنابات. ثمارها حامزة مأكولة. رقيقة الشكل طول نحو ١٥ م. لونها الى الحمرة.

٢١٩٩٠ - قُرْنُوسٌ عُنُقُودِيٌّ

Cornus racemosa (S). Cornouiller à grappes (F).

جنبة تملو من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ م. أثمارها وأغصانها حطية اللون. سرسة. أوراقها متعاقبة طول نحو ١٠ سم. وتعرض ٣ سم. نصلها خلى الصفحة السفل. حروفه رباعية الأزواج. أثمارها عشودية هري. أثمارها وثمارها بيض.

٢١٩٩١ - قُرْنُوسٌ فُلُورِيْدَاكَا، قُرْنُوسٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ

Cornus florida (S). Cornouiller de Floride, C. à grandes fleurs (F). Dog-wood, Flowering dog-wood (E). Blumen Hartriegel, Hartriegel (D). Corniolo florido (I).

شجرة سبروتية تملو من ١٢ م. أوراقها متعاقبة طول نحو ١٤ سم. وتعرض ٨ سم. نصلها ذات الزام الأخير، مذهب البعصة. خلى الصفحة السفل، سداسي أو سداسي العروق المزدوجة. أزهارها وردية اللون. كبيرة القنابات الحامسة. ثمارها زيتونية اللذ والشكل. جزوية اللون، حامزة. مأكولة.

٢١٩٩٢ - قُرْنُوسٌ لَبْلِي الْمَرْقِي

Cornus paucinervis (S). Cornouiller paucinerve (F).

جنبة صغيرة تملو نحو ٢٠٠ م. أثمارها رباعية التصليب، زيا اللذ. أوراقها متعاقبة، صغيرة، ضيقة، نصلها بطول نحو ٥ سم. حروفه ثنائية أو ثلاثية الأزواج. خلية البشرة من الجهة السفل. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها رقيقة الشكل حامية اللذ، حراء القشرة واللباب، حامزة الطعم، مرة المذاق.



قُرْنُوسٌ

٢٢٠١٤ - قُرَيْس هي الصابونية ، اطليها .

٢٢٠١٥ - قُرَيْسِيَّات

هي الصابونيات ، فصيلة اسماك بحرية ، اطليها .

٢٢٠١٦ - قُرَيْس *Ortie (F)* هو القراس ، اطليها .

٢٢٠١٧ - قُرَيْسِ أَحْمَر *Lamier pourpre (F)* هو اللاميون الارچوني ، اطليها .

٢٢٠١٨ - قُرَيْسِ الصَّجُور *Ortie brûlante (F)* هو القراس المحرق ، اطليها .

٢٢٠١٩ - قُرَيْسِ رُوْمَانِي *Ortie à pilules (F)* هو القراس الكاوي ، اطليها .

٢٢٠٢٠ - قُرَيْس * ، يُوْرِيْسَا *Urena (S)* *Urena, Herbe aux paniers (F)* *Indian mallow (E)* *Urena (D)* *Urena (I)* .
جلس نباتات جنينية ليفة من فصيلة الخبازيات . اطليها بلاد الشرق . انواعها المزروعة اربعة ، بعضها منتصب . اوراتها ممتدة متعاقبة ، نصلها مستعرض الشكل ، خماسي الفصوص . جامد الصفة . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الازتكاز ، خاسية التركيب || ذرع لايانها الخشنة المتينة الشاملة الاستعمال الصناعي .

٢٢٠٢١ - قُرَيْق *Coryphaena (S)* *Coryphène (F)* *Dolphin, Dorado (E)* .
جنس اسماك بحرية من الاسقمريات شاككات الزعانف . انواعها المروفة نحو ١٥ اطليها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . جميعها من الاسماك البية || اجسامها اعليجية الشكل ، كبيرة القد ، تطول من ٨٠ الى ١٦٠ سم . انوارها متعاطلة الالوان المتباينة تكثر فيها الربعة القصبية المنسقة بالاخضر والاصفر الذهبي . زعانفها الظهرية قاطبة ، الذيلية قارئة او بعيدة الفلقة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيه .

٢٢٠٢٢ - قُرَيْقِي مَوَاكِب *

Coryphaena pomplilus (S) *Coryphène pompile, Lampuge, Sourcil d'or (F)* *Pompil (E)* .
نوع من القُرَيْق . سمكة بحرية بيوض . اطليها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والهادي . جسمها اعليجي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ثوبها الى الشبهة الزيتية المنسقة بالاخضر والاصفر الذهبي . ظهرها الى الخفسار الالاسي الاسفع المواج ، رأسها متدل الجرم ، قصير الخلف المستدير . ميتاها كيرقان . حاجباها مذهبان . زعنفتها الظهرية قاطبة . الشرجية مستطيلة رفيعة . الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٢٠٢٣ - قُرَيْن *Cornicule (F)* *Cornicle (E)* .
هو السرك ، اطليها .

٢٢٠٢٤ - قُرَيْسَا *Ambrevade (F)* .
هي الكنجوس الهندي ، اطليها .

٢٢٠٢٥ - قُرَيْسَا *٢٢٠٢٥* هي المارلية الزراعية ، اطليها .

٢٢٠٠٣ - قُرُوح

الخنقة للماء الطويلة التي انجد كرمها ج . قراولج .

٢٢٠٠٤ - قُرُوة المَنفُوف * ، لَفِيق المَنفُوف

Pissmodiophora brassicae (S) *Hernie du chou, H. des crucifères, Maladie digitale, Gros pied (F)* *Clubroot of cabbages (E)* *Kohlhernie, Kohlkropf (D)* .
وصم ظري يترى معظم الصليبيات واعصها المنفوف . شته مركب من الجذور فيسبب فتح اللجج وارتقاعها . الموالئ التي تنشط انتشاره وفكته : تربة متدهية وحرارة معتدلة ورطوبة تفوق ٩٠ ٪ || يكالغ بتطويع البذار والثرية وباستبدال الارربة المتدهية والمواقع الرطبة بغيرها اقل اتساعاً ورطوبة .

٢٢٠٠٥ - قُرُود دَيْبِيَّة ، اَلْقَرَامُ القُرُود

Hapalidae (S) *Arctopithèques, Hapalides (F)* *Arctopitheci, Hapalidae (E)* *Kraillaffen (D)* .
فصيلة قرد من الخنازوات موطنها امريكة الوسطى والجنوبية . انواعها المروفة ٢٨ تضم الى جنسين : اليباس والهبال . اجسامها مسنونة القند ربة ، اذنانها جتلة مسطيلة . انوارها سوية الالوان ، وافرقة الشعر اللؤلؤ المستطيل . تعيش حياة السناجب . جاماتها كبيرة المدد . قوتها اثار والخرشات اثنائها تقص من جرو الى جروين وربما ثلاثة .

٢٢٠٠٦ - قُرُود ذَيْنَالَة ، قُرُود مَدَنِيَّة

Cercopithecidae, Cercopithèques (F) *Cercopithe- cidae, Cercopithecus, Tailed apes (E)* *Meerkatzen (D)* .
هي المجرسيات فصيلة قرد من سفليات المنقرئين تشمل ستة اجناس : المجرس والحودل والمكاك والشديم والقشة والقدود .

٢٢٠٠٧ - قُرُوس *Bar (F)* .
هي القاروس سمكة مأكولة من القرشيات .

٢٢٠٠٨ - قُرُوس مَبْدُون *Loubine vulgaire (F)* .
سمكة بحرية تدعى قاروس مبدول ، اطليها .

٢٢٠٠٩ - قُرَيْة التَمَل *Fourmillière (F)* *Ant-hill (E)* .
هي جرثومة التل حيث يبيت ويتكاثر ويخزن الغذاء . وتسمى ايضاً للزربة والمنسلة .

٢٢٠١٠ - قُرَيْث *Anguille (F)* .
هو الانقليس ، اطليها .

٢٢٠١١ - قُرَيْثِي الشَكَل *Anguilliforme (F)* *Anguilliform (E)* .
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان مائي او قارب شكله كالقُرَيْث أي الانقليس .

٢٢٠١٢ - قُرَيْدِ مِي *Crevettes (F)* .
هو الاربيان ، اطليها .

٢٢٠١٣ - قُرَيْدِ سِيَّات *Carididae (S)* *Caridides (F)* *Carididae (E)* .
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات المشاريات الاقدام . اجناسها وانواعها كثيرة المدد . اطليها بحار الماد . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، منمقة المتوسر .



قررة المنفوف



قُرَيْس



قُرَيْن مَوَاكِب

٢٢٠٢٦ - قزينة ، شبهة

Adminicule, Présomption, Contexta (F). Presumption, Context (E).

عنصر من عناصر الالتيات قد لا تقوم به الحجة تماماً ولكنه يساعد .

٢٢٠٢٧ - قزينة عدم التمييز

Présomption de non-discrimination (F). Presumption of not discernment (E).

قزينة قانونية يستدل بها ما اذا كان القاصر الذي اُتُرف جرماً يمي او لا يمي مسؤولية جرمه . وفي القانون اللبناني اذا لم تتجاوز سن القاصر الجرم ثلاث عشرة سنة عقيب بتأديبه وبقايته .

٢٢٠٢٨ - قزوح

مرض يصيب الدم ليلزما ويذهب بدمها .

٢٢٠٢٩ - قزومي

Iridescent (F). Iridescent (E).
نمت تعريفياً بوصف به الشيء الذي يعكس ألوان قوس قزح .

٢٢٠٣٠ - قزحي ، قسطناني

Iris (F).
Irisated, irisad (E).
نمت تعريفياً يطلق على ما كان لونه كألوان قوس قزح .

٢٢٠٣١ - قزحية

Iris (F).
راجع حقله .

٢٢٠٣٢ - قزق

Alto-cumulus
فوج من السحاب المهيذب الجيد الارتفاع . وهو من النيم الماطرة . القطعة من قزعة .

٢٢٠٣٣ - قزوق

Deverra (S). Deverre (F).
جنس نباتات شبيهة معمرة بيرة من فصيلة الخيميات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من ثبوت بعض وسائل البصر الابيض المتوسط || سطوها فروعها قليلة الازواك أو عادمها . والازواك عند وجودها ، في بعض الانواع تكون متعاقبة ، مركبة ريشية التفصيل . ازهارها صوباني التجميع . ازهارها شبيهة الانواع منها الابيض والبنّي والاصفر والاعصر الاصفر . تنويرها ربيعي .

٢٢٠٣٤ - قزول

Polypier de Corail (F).
Polypary of Coral (E).
القزول دكرية البسد ، اي المرجان ، حيث تنشب المذبة .

٢٢٠٣٥ - قزوي

Séricicole (F). Silk-producing (E).
نمت تعريفياً يطلق على ما هو مختص بتربية دود القز .

٢٢٠٣٦ - قزبات

Bombycidae, Liparidae (S).
Bombycidae, Liparidae (F). Bombycidae, Liparidae (E).
فصيلة حشرات من حشريات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة العدد . فراشاتها متوسطة الحجم ، غليظة الجسم ، عديمة الخيط ، قصيرة الحياة ، لا تتغذى . اجسامها كثيفة المرافش الزباء . وراثتها الى اليباض الاخير تملو رشفة سمر خفيفة . قزتها الاستعمارية شطية مزدوجة || مكها كروي الشكل ، فردي المنح ، وراثتها كبيرة القد ملء الجلود وحيدة القرن الترسجي . خادواتها تقتل بشرا في حريرة المحيط || اشهر اجناسه القزبة .

٢٢٠٣٧ - قزينة ، بمبيكس

Bombyx
جنس حشرات قزينة من فصيلة القزيات . انواعها عديدة معظمها ضار وبشها اقتصادي . تالق كودة القز . اشهر انواعها ما يلي .

٢٢٠٣٨ - قزينة الحرير ، قزينة الثوت

Bombyx mori, Saricaria mori (S). Bombyx du mûrier, Ver à soie (F). Silk-moth, Silk-moth worm (E).
قزينة من القزيات متوسطة القد لا كدة لما حل الطيران تعيش نحو عشرة ايام . تسافه بعد اليوم الرابع . اناتها تبيض بعد السواد بنحو ٢٤ ساعة . زين متحيا ينمو من يوبين الى ثلاثة ايام . عند مكها لا يقل عن ٥٠٠ يرف عنه المربين (بالبور) || جسمها نحني حشني . طولها نحو ٣ سم . ويسهلها ٤ سم . زانابا مشطية مزدوجة . ثوبا الى اليباض الاصل تملو مابة سفراء . تحصل على الجناحين الامامين بعض الخطوط المتفرعة السمراء اللون . لا تارق خارجي بين الذكر والانثى سوى الجسم فالانثى اكبر واغلظ من الذكر . مكها كروي الشكل ينمو اصفر اللون ، عند تنحه ، ثم ينصرف الى البسة ويبدو قبيل التفت || البرقة ترمف بعودة الحرير ، اطلسها ، يراوح طولها عند تمام انسلختها من ٧ الى ٩ سم . جسمها مائل البشرة . رأسها صغير القد اسود اللون . قزها الترسجي دقيق ويهدب . ثوبا الى اليباض الاضر . يملو حقلات جسمها من جانبيها سمت سود تدعى سمام التسم وظيفتها التفت || ضرورها عديدة فوارقها الجسم والقرب وقدر الشرفة ولونها وشكلها .

٢٢٠٣٩ - قزينة القزوق ، بمبيكس القزوق ، دودة حرير آريا

Bombyx ricini, B. arrindia, Attacus arrindia (S). Bombyx du ricin (F).
موطنها البلاد الحارة اخصها الاسيرية . تربى على ورق القزوق . صليجتها متوسطة الحجم والصف . حريرها اقبز اللون .

٢٢٠٤٠ - قزينة القزوق ، بمبيكس القزوق

Bombyx cecropia, Saturnia cecropia (S). Bombyx du prunier, Ver à soie du prunier (F).
موطنها بلاد امريكا الجنوبية . تربى على ورق القزوق ، والزيتون . صليجتها متوسطة الحجم ، حريرها قوي الخيط ، غليظ ، اسمر اللون .

٢٢٠٤١ - قزينة السنديان ، قزينة البسوط ، بمبيكس السنديان

Bombyx mylitta, Saturnia mylitta (S). Bombyx du chène, Ver à soie du chène (F).
موطنها الهند . تربى على ورق السنديان . صليجتها صغيرة القد مستطيلة . حريرها براق الخيط متوسط الصنت .

٢٢٠٤٢ - قزينة السنديان الجزاركة ، بمبيكس السنديان الجزارك

Cnethocampa processionnea (S). Bombyx processionnaire du chène (F). Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Processionsspinner (D).
حشرة مملوكة قزينة في جميع البلاد المعتدلة الحارة . ريقها سمر اللون . كثيفة الملب ، لسها يبيح الجله كالقزواس . تركب اوزاكن السنديان على اختلاف انواعها فتقرضها وتؤذيها .



قزينة الحرير



قزينة الحرير



قزينة السنديان



قزينة السنديان الجزاركة

المائل || السرة تطول من ٣٢ إلى ٣٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، كثيف الحلب القصير ، مبهر الحلب الطويل الضبي التجميع . أطول اللون ، أريد الموج ، يملؤ خط ليجي أبيض وسطان جانبيين احمران وسطان متعلقان اصفران . رأسها جوزي اللون . مدنها ورواجها الى السرة || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقص ضمن صلصلة تحبها على النبات المائل .

٢٢٠٤٧ - قُوَّةُ الْكَزْرِ * ، مُبْيِكْسُ الْكَزْرِ

Porthesia similis (S). *Bombyx cul doré* (F). Gold-tailed moth (E). Schwan (D).

حشرة من القزيات ريقها شرعة تركب اوراق الكرز وانفاج تفترضها وقد تقضي عليها .

٢٢٠٤٨ - قُوَّةُ شَارِدَة * ، مُبْيِكْسُ شَارِدَة

Liparis dispar, *Lymantria dispar* (S). *Bombyx disparis*, *Spongheuse* (F). Gipsy moth, Gypsy moth (E). Schwammspanner (D).

حشرة من القزيات ريقها همة تركب اوراق الاجنار الحرجية والشرعة اخصها السديان والصفصاف وانفاج .

٢٢٠٤٩ - قُوَّةُ مُبْرَقَمَة * ، مُبْيِكْسُ مُبْرَقَمَة

Liparis monacha (S). *Bombyx nonne*, *Nonne*, *Bombyx moine* (F). Nun moth, Black arches moth (E). Nonne, Fichtenspanner (D).

حشرة مبدولة موطنها البلاد المعتدلة الحرارة . ريقها همة تركب اوراق عدة نباتات اخصها اجنار الفصيلة الصنوبرية

٢٢٠٥٠ - قُوَّةُ يَمَامَايَ * ، مُبْيِكْسُ يَمَامَايَ

Bombyx yamamai (S). *Bombyx yamamai* (F).

حشرة من القزيات موطنها الصين . ترى على ورق السديان ، صليجها متوسطة القد ، سررها جيد الصنف نخب الخيط .

٢٢٠٥١ - قُسَابَة رَدِي التمر .

٢٢٠٥٢ - قَسَاحَة

Rétractilité (F). *Retractility* (E).

القَسَاحَة قابلية الانقباض .

٢٢٠٥٣ - قُسْبَارِيَّات

Cuspariées (F). سبط من فصيلة السبائيات . اجنانه وانواعه عديدة جميعها اجنار ونباتات . اطناها البلاد الحارة اخصها امريكا الجنوبية . بعض انواعها طبي دافع للحيات .

٢٢٠٥٤ - قُسْبَارِيَّةُ الْخَمِي * ، قُسْبَارِيَّةُ قَنْزَوِيلا

Cusparia febrifuga (S). *Cusparia* (F). *Cusparia* (E). *Cusparia* (D). *Cusparia* (I).

نبهرة من القسباريات . ساقها منتصبه فروع تملؤ من ٧ الى ١٥ م . اوراقها عايلة ، معتقة ، متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الورديات . ازهارها عشقودية التجميع ، بيضاء اللون ، خامية البتلات ، حيلة الشكل ، مستحبة الريف . يزورها سد احادية || لحاء الشجرة عطري رائحة غزير المركبات الفعالة يستخرج منه مادة القسبارين التي تستخرج من القزويات المرموقة وين دافع للحيات المشهورة .

٢٢٠٥٥ - قُسْتُ * ، قُسْتُسْ

Costus (S). *Costus* (F). *Costus*, *Kust-root* (E). *Kostus* (D). *Costo* (I).

جنس نباتات جفمورية عشقودية برة وزراعية من فصيلة الزنجبيليات . انواعه المعروفة ١٥ منها المناطق الحارة .

٢٢٠٤٣ - قُوَّةُ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَارَةِ * ، مُبْيِكْسُ الصَّنَوْبَرِ الْجَرَارِ

Cnethocampa pityocampa (S). *Bombyx processionnaire du pin* (F). Pine processionary caterpillar (E). Pinien-Prozessionspinner (D).

حشرة شديدة الافى . ريقها كثيفة الحلب تركب بانثاق واهداب الصنوبر تقضي عليها .



قزبة الصنوبر الجارارة



قزبة الصيف



قزبة الكرز



قزبة شاردة



قزبة مبرقمة



قُسْبَارِيَّةُ الْحَمِي



قُسْتُ

اوراقها خضراء ، لائقة ، متعاقبة . ازهارها كبيرة اللبد ، ناجية الارزكانز ، لا قياسية التجميع منها التورية والسليبية . جلديها عذبة ، كانت ولا تزال تستعمل في الترياق .

٢٢٠٥٦ - قُسُوس
هو اللادن ، اطلبه .

٢٢٠٥٧ - قُسُوس لَادِي (F).
هو اللادن الاسباني ، اطلبه .

٢٢٠٥٨ - قُسُوس بَرِّي (F).
هو البشارة ، اطلبه .

٢٢٠٥٩ - قُسُوس شَامِي (F).
هو الرأس الشبي ، اطلبه .

٢٢٠٦٠ - قُسُودَان ، قُوس قُزَح

Arc-en-ciel (F). Rainbow (E).
ويدهي أيضاً قوس السحاب . ظاهرة جوية تشاهد في أثناء سقوط المطر أو تنجم الجو بقطرات الماء . ذلك ان اشعة الشمس عند مرورها خلال هذه القطرات تنكسر كما ينكسر الشعاع الضوئي النافذ الى منشور زجاجي ويتحمل في اللون الطيف فيشاهد في السماء قوس يتكون من الاحمر والبرتقالي والاصفر والاحمر والازرق والنيلي والبنفسجي . ويشاهد القوسان أيضاً في بعض الايام التي تتسبب السحب نفاً .

٢٢٠٦١ - قُسُودَانِي (F).
راجع قُوسِي .

٢٢٠٦٢ - قُسُودَان (F).
هو البطريقا ، اطلبه .

٢٢٠٦٣ - قُسُودَان (F).
هو الكتنة ، اطلبه .

٢٢٠٦٤ - قُسُودَانِ الْأَرْضِي (F).
هو الجوز الشرقي ، اطلبه .

٢٢٠٦٥ - قُسُودَانِ الْمَاء (F).
هو السكر ، اطلبه .

٢٢٠٦٦ - قُسُودَانِ هِنْدِي (F).
هو القندل المبلول ، اطلبه .

٢٢٠٦٧ - قُسُودَانِي (F).
هي الكتنة ثمرة الكتنة .

٢٢٠٦٨ - قُسُودَانِي ، قُسُودَانِي ، قُسُودَانِي (F).
هو الجندبادستر ، اطلبه .

٢٢٠٦٩ - قُسُودَانِي (F).
هو اللادن ، اطلبه .

٢٢٠٧٠ - قُسُودَانِي الْإِيطِي (F).
هو اللادن الاكبري ، اطلبه .

٢٢٠٧١ - قُسُودَانِي (F).
Echiostoma (F). Echiostoma (E).

جنس اسماء بحرية من مفتوحات المائة فصيلة الزمراسيات . انواعها الممرقة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الممتدة الحرارة . مسرحها الاغوار البعيدة والبعج . تتميز بمهازها

الفسفوري الخفي ، اجسامها مستطيلة الشكل ، قريبة الشبه بالرماس تطول من ٢٠ الى ٣٥ سم . رؤوسها غليظة ، مقطوعة الاطراف ، كبيرة الاشدان ، ستة الفكين . اسنانها مستطيلة ذرية . فكوكها السفلى وحيدة المدية . عيونها جاحضة . قشورها مائل الصفحة . زعانفها الظهرية وسعيدة ، صغيرة الحجم ، خلفية الارزكانز ، تقابل الشرسية ومماثلها قدراً وشكلاً . زعانفها الخلفية صغيرة غارقة . اذنيها الى السرة السوداء يعلوها موج اسفح .

٢٢٠٧٢ - قُسُودَانِي (F).
هو البشارة ، اطلبه .

Iris oratoria (S). Iris orataur (F).
حشرة غاصلة من مستطيات الاجنحة فضيلة السرغيفيات اصطناعها المناطق الحارة من الشرق الاوسط والاندلس وادوية العربية وافريقية النيلية . تألف البراري والوادي الدلتا || جسمها مستطيل نحيل بطول نحو ٤ سم . قويه الى السرعة . الخلفاء الموج . رأسها صغير مستعرض . عينها جاحضتان . زباناها حديقتان مستطيتان . قوائمها مستطيلة ، الزوج الامامي مستطيف ضليح . اجسماها مثقلة الطول قسطانية الالوان الزاهية الجميلة ، تلحف العين عند الذكر ولا تلحف عند الانثى . الانثى اكبر قدماً من الذكر وابتعت لونها منه . ترزّ مكها في التورية قرب جفونع الثبات .

٢٢٠٧٣ - قُسُودَانِي (F).
نبت كالكرش اخضر خيش الريح ينبت في سبل الماء له زهرة بيضاء .

٢٢٠٧٤ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٧٥ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٧٦ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٧٧ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٧٨ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٧٩ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٨٠ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٨١ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٨٢ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٨٣ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .

٢٢٠٨٤ - قُسُودَانِي (F).
هو الكركاز ، مرض خبيث ، اطلبه .



قُسُودَانِي



قُسُودَانِي

٢٢٠٩٢ - قَشَاب * Toxicifera, Toxicophora (F).

Toxiciferous (E).

نمت ثمريني يطلق على كل حيوان أو سمكة أو طائر يأكل مواد سامة فلا تؤذيها أما تؤذي الإنسان أن أكل من لحمه .

٢٢٠٩٣ - قَشَار Pellicule, Tégument (F).

Pellicle, Tégument (E).

بشرة جلد الحية ومائل الزخافات التي تسلك مرة كل عام .

٢٢٠٩٤ - قَشَامَة Relief

هي النتوء الذي يبدو على الاجسام المنبسطة .

٢٢٠٩٥ - قَشَب، قَشِين، ذَيْفَان Toxine (F).

Toxin (E).

كل مادة سامة، مها كانت عناصرها، تفردا بالميكروبات أو البكتيريا .

٢٢٠٩٦ - قَشَب Kerria (S), Kerrie, Corète (F).

جنس نباتات برية وزراعية تريينية من فصيلة الورديات منهاها البثرق الاصق . اوراقها متعاقبة ، معققة . ازهارها لوانها الوردية تتجمع ، كبيرة القد ، جميلة الشكل كل اشهر انولها الوردية قش اليابان .

٢٢٠٩٧ - قَشَب اليابان Kerria japonica (S).

Kerrie du Japon, Corète du Japon, Spirée du Japon, Corchorus (F), Jew's-mallow, Summer-rose (E), Japanischer Ranunkelstrauch (D), Kerria japonica (I).

نوع من القش وهو جنبة معمرة صغيرة القد تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . جلورها مدادة ، فروعها جالسة ، متصببة ، سرسجة ، لامة البشرة الخضراء . اوراقها متعاقبة ، صلها يطول نحو ١٠ سم . ويخرج ٥ وهو لامع البشرة ، جبل الخضار الزاهي . ازهارها فردية تتجمع ، ذهبية اللون ، تحورها نقصا ودية الشكل تستقيت اخضرار || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٢٠٩٨ - قَشْبَة * Ashbia gossypii, Nemastopora coryli, Spermothora gossypii, Eramothecium ashbyi (S), Stigmatomycose (F).

وصم يصيب ثمار القطن والبرتقال والأتروج واليوسني والبنودرة والفاصوليا والصوبه سبه لطر مجهرى من الحشرات يتدخل نسيج الثمار حل أثر ويترى بعض الحشرات فيمطها ويغضها .

٢٢٠٩٩ - قَشَة Guenuche (F).

Young she-monkey (E).

هي النسية الصينية اي القرعة الاثني الفية .

٢٢١٠٠ - قَشَة Cynopithecus niger (S).

Cynopithecus niger, Singe à couplet (F).

قرود وسيد الجنس والنوع من فصيلة المجرسيات . مركزه بين الماكاك والقردودج . جسمه يطول نحو ٦٥ سم . ويرتفع ٥٠ سم . ذنبه جملة طولا ٢٠ سم . ثوبه الى السواد القاتم . شعره قصير ، ناعم ، ابيض ، وجهه جقوي اللون . راسه مكمل بشفة متصببة هدنية الشعر || قوته الثار والحرب والجلود والحشرات . انشاء تسع جروا واحدا ترسمه نحو ٦ شهور .

٢٢١٠١ - قَشْدَة ، قَشْطَة ، كَشَاة ، قَشْدَة ، كَشْدَاة Crème (F), Cream (E).

مادة سميكة في الحليب تسلك عنه بالفرز الحلي (الميكانيكي)

٢٢٠٨٠ - قَشْسُ جَوْوِي ، أَصَالِيَا كُسْمُوسُ

Cosmos atrosanguineus (S), Cosmos rouge-brun, Dahlia zimapani (F).

عشبة تريينية سرودية معمرة تملو نحو ٦٥ سم . جلورها جنبي خليط ، ساقها متصببة فرواء . اوراقها فردية للتشريح . ازهارها حشوكية التجميع ، تحورها الزهرية جوية الطباب . ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

٢٢٠٨١ - قَشْسُ كَبْرِيّ Cosmos sulphureus (S), Cosmos jaune soufre (F).

جملة تريينية سرودية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها فرواء زباه . اوراقها سنانية التشريح مهدبة . ازهارها فردية متتامة . تحورها الزهرية كبريتية الطباب والسينات . ازهاره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٢٢٠٨٢ - قَشْسُ مُزْدَوِج الرئش Cosmos bipinnatus (S), Cosmos bipinné (F).

عشبة تريينية سرودية حولية تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . ساقها متصببة فرواء فناء . اوراقها مزدوجة التشريح الريشي . ازهارها فردية التجميع . تحورها الزهرية صفر الطباب ، ودية السينات قفرا نحو ٦ سم . || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٢٠٨٣ - قَشِيل Lionceau (F), Young lion (E).

وله الاسد لم يبلغ الول .

٢٢٠٨٤ - قَشَوْر * Chasmanthère (F).

جنس نباتات برية طيبة عارشة من فصيلة القرميات . انولها عديدة اصطنائها البلاد الاستوائية والحارة . سقها متسلقة تطلو من ٣ الى ٧ امار . اوراقها معققة ، كفية ، خاسية التفصيص . ازهارها خشوية مسامية التركيب . جلورها طيبة يستخلص منها يده التجفيف والسحق مادة الكوليين ومادة البر برين . واسحة قسوة .

٢٢٠٨٥ - قَشَوَس Iris à l'all (F).

هو السون المنتر ، اطله .

٢٢٠٨٦ - قَشَوَس هو شاي المروج ، اطله .

٢٢٠٨٧ - قَشَوَس مُسَلَق Lierre commun (F).

هو الشقة المبولة ، اطلها .

٢٢٠٨٨ - قَشِيح Rétractile (F), Retractable (E).

نمت ثمريني توصف به الاحشاء القابلة الانتشار والانقباض .

٢٢٠٨٩ - قَشِيَمَة ضَامِيَة هي سده الخزن ، اطله .

٢٢٠٩٠ - قَشْ Pallie (F), Straw (E).

هو قصب الزرع اليابس الذي يصبح نيباً بعد دوسه .

٢٢٠٩١ - قَشْ السُت Glut (F).

Straw for chatching (E).

هو قصب السلت اليابس يستعمل كراياط . وقد يستعمل في تغطيت ثنائي الخمر وما اشبه لغفلها من الطب عند الصدم .




قشور



قش اليابان



قشبة



قشة

وقشورها حلينة المنافع والنفائذ الصعبة || انواعها الزراعية المأكولة البار نحو ١٢ اشهرها ما يتبع :



نشطة

٢٢١١٦ - قِشَّةَ سَهْنِيَّة * قِشَّةَ سَكَاوُونَا

Anona squamosa (S). Attier, Anone écaillouse, Pomme-cannelle (F). Custard-apple, Sugar-apple, Sweet-sop (E). Honigapfel, Zuckerapfel (D). Anona scalliosa, Pomo cannella, Mala cannella (I).

نوع من القشطة، تصنفه يأتي بعد السكاوونا. ثمرته تشبه التفاح شكلاً وثالثاً وهي تملو نحو أربعة أمتار. اوراقها بيضية النصل مستطيلة، ازهارها مستقيمة اللون، ثمارها كاكواز الصنوبر، لهاها ابيض المادة غزير العصارة السكرية، يزورها سود كبيرة.



نشطة سهنية

٢٢١١٧ - قِشَّةَ شَاكِكَة *

Anona muricata (S). Corossolier, Anone hérissée, Corosol épineux (F). Sour-sop, Prickly custard-apple (E). Suresobbe, Sorer bissen (D). Anona spinosa, Caslmentaria (I).

نوع من القشطة، ثمرته متوسطة الحجم. اوراقها مستطيلة، مساه، لامعة، شديدة الخضار، فريضة اللون. ازهارها قصيرة القند، غليظة الشكل. ثمارها كبيرة مستطيلة، شكلها شكل كوز الصنوبر جرهاته ناضرة مرفوعة شاككة. اما طول الثمرة فيراوح من ٢٥ الى ٣٠ سم. وزنها من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ غرام. قشورها صميكة، رائحيية العرف، حامزة المذاق، لهاها ابيض اللون، حلو العلم لا غلو من الحامضة المستعجة.



نشطة شاككة

٢٢١١٨ - قِشَّةَ شَبْكِيَّة *

Anona reticulata (S). Anone cœur de bœuf, Cachimau (F). Bullock's heart, Common custard-apple (E). Gustardapfel, Rahmapfel (D). Anona cuore di bus (I).

نوع من القشطة، تصنفه يأتي بعد السكاوونا. ثمرته كبيرة الحجم تملو نحو ثمانية أمتار. اوراقها مستطيلة زغبية الصفحة السفلى. ازهارها كبيرة، بيضاء اللون يشوبها شيء من الخضار. ثمارها كبيرة القند، قلبية الشكل. قشورها الى الصفار الناري. لها جامد المادة، متوسط الصف، ابيض اللون او احمر.



نشطة شبكية

٢٢١١٩ - قِشَّةَ شَرْمِيْمِيَّة *

Anona cherimolla (S). Chirimollier, Chirimoye (F). Chirimoya, Purple-apple (E). Chirimoya, Purpurapfel (D). Anona cherimolla (I).

لوع من القشطة وهو اجودها صفاء، ثمرته صغرى القند تملو نحو خمسة أمتار. اوراقها بيضية فضاء، زبادة، جميلة الخضار. ازهارها محورية متدلية، بتلاتها مستطيلة الشكل بيض الصفحة العليا الداخلية، خضر السفلى الخارجية. ثمارها ردهاء اللون حبيبيها حجم البرتقال. لهاها حاجي المادة، غزير العصارة، حلو المذاق، لذيق العلم، فواح العرف المستحب.



نشطة شرميما

٢٢١٢٠ - قِشَّةَ مُنْجِيَّة

Anona palustris (S). Corossolier des marais, Corosol des marais (F). Alligator apple, Cork wood (E). Alligatorapfel, Wasseraepfel (D). Anona di stagno (I). نوع من القشطة يجود في الاماكن الرطبة. ثمارها صغرى القند قلبية الشكل، عادية الصف، خضراء الياض الغزير العصارة المعتدلة الحلاوة.

نظراً لغنىها التسمية. وهي دسمة، للذيق العلم، بيضاء اللون. ومنها تستخرج الزبدة بعد غسها.

٢٢١١٢ - قِشَّةَ هِنْدِي Cavequi (F).

هي البرسام الهندي، اطلبها.

٢٢١١٣ - قِشَّةَ يَات Annonacées (F).

هي القشطات فصيلة نباتية، اطلبها.

٢٢١١٤ - قِشَّر Ebonage (F).

هو قششر الحبوب لاسياً للزور.

٢٢١١٥ - قِشَّر، حِخَاء، قِرْق، قِلْث Ecorces (F). Barks (E).

هو في النبات الجزء الخارجي الذي يلف الخشب من الجلود والسوق والاغصان والاغنان.

٢٢١١٦ - قِشَّر Latices (F).

جلى اسماك ثورية تلى لاس.

٢٢١١٧ - قِشَّر عِثَر Cascarille (F).

هو الكركن العثري، اطلبه.

٢٢١١٨ - قِشَّرَان Altes de sauterelles (F).

Wings of the locust (E). جناح الجراد الزرقان كالنشاء الشفاف.

٢٢١١٩ - قِشَّرَة Pellicule (F). Pellicle (E).

غشاء الشيء، غليظة او مرصاً. ج قشر وقشور.

٢٢١٢٠ - قِشَّرِي Cortical

نمت تعمرني يطلق على كل ما له صلة بالقشور او يشبهها.

٢٢١٢١ - قِشَّرِيَات Crustacea (S).

Crustacés (F). Crustacea (E). صف حيوانات منفصلة مائية عديدة الرتب والصفات والاجناس، التي تنتم الى طائفتين: حشرات الصدف وليات الصدف.

٢٢١٢٢ - قِشَّرِيَات دُنْيَا Crustacés inférieurs (F). Inferior Crustacea (E).

طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «حشرات الصدف».

٢٢١٢٣ - قِشَّرِيَات عَلْيَا Crustacés supérieurs (F). Superior crustacea (E).

طائفة من القشريات كانت تدعى في التصنيف السابق «ليات الصدف».

٢٢١٢٤ - قِشَّة Crème (F). Cream (E).

هي القشدة، المادة السنية في الحليب.

٢٢١٢٥ - قِشَّة * قِشَّة Anona (S).

Annona, Anone (F). جنس نباتات يوية وزراعية من فصيلة القشطات. انواعها نحو ٥٠ جميعها اثمار وثيريات وجينات. اوراقها متناقية، مستطيلة، بيضية او اهليلجية. نصلها جامد الصفعة، بارز العروق. ازهارها فردية محورية او جاعية تاجية. ثمارها كوزية لحمية || معظم انواعها البرية طلي. اوراقها

تركب جلود وسوق التجليات اخضا الشعر والثوفان والسنن والذرة .

٢٢١٢٧ - فُشَبَانِ اُرْبَعِيَّة

Dascillus pubescens (S). *Dascille pubescent* (F). *Dascillus pubescens* (E).

حشرة واحة غاطسة من فصيلة الفُشَبَانِيَّات رتبة غمدقات الاجنحة . تألف الموائل القريبة من الماء . خنافسها تعيش على ازهار الصبوراتيات . يرقاتها تركب جلود الصبوراتيات التي تنمو في الاراضي الرطبة || جسمها صغير القد يطول من ١٠ الى ١٢ سم . ثوبها الى الوردية الخطفية الموج . رأسها صغير الحجم . فكها ضليمان . عينها صغيرتان زبانا خيطيان ، مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف اللامع ، بين التضخيد الغندي القاطب . ارساغها خاسية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار تملأ به ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتع المكان تحت الجملانة والمبل وبين اشطاء الاشباه الحولية || البرقة عند بلوغها الاندراك الجسموي تطول من ١٦ الى ١٩ سم . جسمها مردي الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، اخضر اللون اصفر الموج ، اسمر الرأس ، ضليع التأثير الفكية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في التربة تحت الجملانة او تحت ارومات النباتات المشية .

٢٢١٢٨ - فُشَبَانِيَّات

Dascillidae (S). *Dascillidae* (F). *Dascillidae* (E).

فصيلة حشرات من غمدقات الاجنح اجسامها وانواعها عديدة جميعها ست عمارات . اعطائها العالم جميعها ثارية خاسلة . اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد او صغيرة .

٢٢١٢٩ - فُشَبَر

Concombre serpent (F).

هو الفشا ، اطلبه .

٢٢١٣٠ - فُشَقُوش * ، حُصَانِ المَوَسَط

هَيْفَةُ المَوَسَط ، تَرِيك

Atherina hepsetus (S). *Athérine de la Méditerranée*, *Sauleit* (F). *Silvridae*, *Sand smelt* (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة الهسبسات شاككات الانواع اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تتميز من امثال النفاث . مسرعا الجناح الطويل || جسمها شبه وشي الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الشبيه بملوحا في جانبها شمسي ازيق وموج فقي يسمر في الظهر ويغير ويبيض في البطن || رأسها معتدل الحجم ، يرمي الشكل . فكها السفلي يتقدم العلوي بعض الشيء . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، جاحشتان . زعانفها نظامية الترتيب . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مغروب فيه .

٢٢١٣١ - فُشَلْب

Cladanthus (S). *Cladantha* (F).

جنس نباتات عشبية سولية من فصيلة المركبات الابوبية الزهر . سوقها فراء تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . فروعها متعاقبة فرقة . اوراتها مقرفة خلية النصل حل فصعته . ازهارها رؤسية ، عطرية العرف ، صفير الطياب والصبغات الثنائية الصف || اشهر انواعه قلب الجزيرة .

٢٢١٢١ - فُشَيات ، فُشَبَات

Anonaceae (S). *Annonacées*, *Anonacées* (F). *Anonaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة الثمرات . اجناسها المعروفة ٩٠ انواعها نحو ٣٢٠ . اعطائها البلاد الحارة . منها الاجبار والشعيرات والنباتات . اوراتها معتقة ، متعاقبة ، بسيطة . ازهارها ثلاثية التركيب او سداسية . ثمارها اكواز خسية ، بزورها دهنية .

٢٢١٢٢ - فُشَتَام ، فُشَبَانِ

Gyps

جنس طير من الكواس وفصيلة البشريات . انواعه ثلاثة جميعها كبيرة القد . رؤوسها مستطيلة غفيرة . محاسرها ضلع . حيزها سود المقل ، صفير الاحداق . مناسرها قصيرة ، خيلطة ، متعقبة البر . اعناقها مستطيلة غفيرة . سواقلها كبيرة شارفة . اذنانها قصيرة || والقتشام شرس الاخلاق قوي الشكبة يسور يطول على جميع انواع السور التي تباه وتخشاه . طيراته معتدل القوي يفوق برصته سرعة جميع السور لكنه لا يجاري المتبان . يألف الحياة الجابية ، سره يمد من ١٠ الى ٥٠ سنة . الجيف . مأواه الجبال النائية .

٢٢١٢٣ - فُشَتَام اُرْبَعِيَّة * ، فُشَب

Gyps rupellii (S). *Gyps de Ruppell*, *Vautour-épervier* (F).

طائر من القتشام طول نحو ١٥٠ سم . بسطته نحو ٢٧٥ سم . ثوبه الى السمرة الزاوية . عنقه اسهب . طوق جزيئوي طويل الزغب اغمز اللون ، ظهره وبطنه وباطن سقلبه ونفضه الى السمرة . ظاهر سقلبه الى الرقعة الموشة يعلوها تجذع ابيض ممتدح || موطنه البلاد الاقريقية . يطن وكرو في اوتاب الصغور الفسحة . الانثى تبيض رفته واحدة تخشها بتجارة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يمد من ٤٠ الى ٥٠ .

٢٢١٢٤ - فُشَتَام اَكْلَت * ، عَقَق

Gyps fulvus (S). *Gyps fauve*, *Vautour fauve*, *Griffon* (F). *Griffon-vulture* (E).

طائر من القتشام طول نحو ١٢٠ سم . بسطته نحو ٢٧٠ سم . ثوبه الى الكلفة الفراء زخو في الظهر وتقلق في البطن . سقلبه واقل كبير تعرضه خطوط يبيض || اعطائه تسمية الارباء تمتد من الهند الى اوروبا والافريقية الشمالية والشرقية || يطن وكرو في صنوع الصغور الشائعة الموشة . الانثى تبيض رفته واحدة تخشها بتجارة الذكر نحو خمسة اسابيع . سره يمد من ٣٠ الى ٥٠ وهو من الطيور القواطع .

٢٢١٢٥ - فُشَتَام هندي * ، هَوَرَب

Gyps indicus (S). *Gyps des Indes* (F).

طائر من القتشام طول نحو ١١٠ سم . بسطته نحو ٢٥٠ سم . ثوبه الى السمرة القاتمة . عنقه اسهب . سقلبه جملدن بالخطي ويعلوها خط ابيض ممتدح . ذليه جمدح بالابيض . موطنه جبال الهند وجوارها . انثاء تبيض رفته واحدة . سره يمد نحو ٢٠ .

٢٢١٢٦ - فُشَبَانِ

Dascillus (S). *Dascille* (F).

جنس حشرات من فصيلة الفُشَبَانِيَّات انواعه ١٢ اجسامها اهلبيجية الشكل مفلطحة . قرونها الاستشعارية خيلية ، مسنة ، مركبة من ١١ مفاصل . مناقرها ضيقة . بطونها خمسية الاقسام . الزوايا سوية الالوان يكثر فيها الالوان الرمادي . اتحادها مخددة خلية || خنافسها ورقانة



قتشام اربش



قتشام اكلت



قتشام هندي



قتشبان



قتشوش

٢٢١٣٢ - قُصْبُ الجَزِيرَةِ ، أَلْحُوَانُ الجَزِيرَةِ

Cladanthus arabicus, *Anthemis arabica*, *A. prolifera* (S). *Cladanthus d'Arable* (F).

نوع من القُصْبِ الحولي يملو نحو ٧٠ سم. ساقه كثيرة الفروع المتعاقبة الفرقة . أوراقه لسة التلويض . خلية النصل . أزهاره عديدة ، صفراء اللون ، فواصة العرف . أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول .

٢٢١٣٣ - قُصْبُ

Lit d'un ruisseau (F).

Brook bed, Stream bed (E).

القُصْبُ مجرى النهر وسهم من قال مسيله .

٢٢١٣٤ - قُصْبِيَّة

Chloroea andive (F).

واحدة القُصْبِيَّين ، بقلة مشهورة تعرف بالهندب ، أطليه .

٢٢١٣٥ - قُصْبُ

في القنوة ، أطليه .

٢٢١٣٦ - قُصْبُ

Légume sec (F).

Dried vegetable (E).

القُصْبُ ج ثُتْ هي البقول الناضفة . القُصْبُ منها كالبايما أو الحبي كالفلو والمُدس والحمص والفاصوليا .

٢٢١٣٧ - قُصْبُ ، قُصْبُ

Starnum

هو في الطير عظم مقدم الصدر الذي يرتكز عليه هيكل القُصْبُ الجُرْشِي .

٢٢١٣٨ - قُصْبِيَّة

Boucherie (F).

هي صنعة القُصْبِ أي الجزار .

٢٢١٣٩ - قُصْبِيَّة

Tubicoles (F).

Tube-worm (E).

اسم يطلق على الحفريات اللازمة لحلات اقابتها والتي تعيش ضمن قصبات كلسية الملمة أو دويلة أو شفاكية .

٢٢١٤٠ - قُصْبُ الأَعْمَادِ

Brachélytres (F).

Brachelytron (E).

اسم يطلق على كل حشرة من غدييات الجُتْلَحِ الحادِدا تلحف جزءاً من بطونها فقط .

٢٢١٤١ - قُصْبُ الأَلْسِنَةِ

Brévilingues (F).

Brevilingual (E).

رؤية من العظائيات اجناسها وأزهارها عديدة تجتمع في فصليتين المستقروريات والصفريات . دويباتها تتميز بقصر السنها وصغر قوائمها وقرب سببها من المياه .

٢٢١٤٢ - قُصْبُ الدَّيْلِ

Brachyours (F).

Brachyours (E).

رؤية من القُصْبِيَّاتِ المشاريات الارجل ، أشهر اجناسها السرطان .

٢٢١٤٣ - قُصْبُ السَّوَالِقِ

Brachypètres (F).

Brachypters (E).

رؤية من الطير تتميز بقصر سواقطها مما يجعلها عاجزة عن الطيران ولذا فيضع طيورها مائة قوتها الاسماك . أشهرها الطريق والطرسوخ والنطاس والنفاس ...

٢٢١٤٤ - قُصْبُ القُرُونِ

Brachycères (F).

أطلب قصبات القرون .

٢٢١٤٥ - قُصْبُ ، قُصْبُ

هو القصة الشجرة ، أطليا . الواحدة قصاصة وهو نبات مثثري تجمره النمل فيقال لسلها حبل قصاص .

٢٢١٤٦ - قُصْبَاعَةٌ

Epinastie (F). *Epinasty* (E).

حالة كل عضو نباتي ينمو الجزء الباقى منه على حساب الجزء الظاهري كالورقة المقمرة الصفحة العليا المتعددة النسل .

٢٢١٤٧ - قُصْبَاعَةٌ

Coniocybe (S).

جس ططور مجهرية من الرطبات وفصيلة الحشريات . يتميز بنكهته القلنسوية التي تملو الرية . تكاته مستطيلة يوفها قرصي الشكل ثنائي الخلية . تكاته غطية مفصيلة تشابع التكاثر || له نوع واحد ملا يهى قصاصة الكرمة .

٢٢١٤٨ - قُصْبَاعَةُ الكَرْمَةِ

Coniocybe pallida, *Pilacre pallida*, *Rosleria hypogaea*, *Coniocybe nives* (S).

ططور مجهرية يصيب بطور الكرمة وقد يصيب عرفاً وفي ظروف بيئية خاصة بطور الجوز الإجماع وتكاته مستطيلة وألوانها واللورد والقيش والمثلث || ظهورها الجري على الكرمة في أعضائها الطولية ، يتميز شمل يقيه وفوف في النمو وتجمع في الأوراق . وهو في الجوز غفن خفي ناشف أصهب اللون يلحم الجراداة فيسبب تزيدها وتفجير طوبوها المكافية || لم يكلف حتى الآن لان فووه وانتشاره نمطان بعدة عوامل منها الرطوبة المشوية ، وطعم القوية ، وتركيب التربة وتساكها .. لذلك فالاعمال الحرفية والعناية بالربة هي أنجع علاج له .

٢٢١٤٩ - قُصْبِيَّة

Aphélie (F). *Aphelion* (E).

القُصْبِيَّةُ البعد الأقصى لسيارة عن الشمس . الكرة الأرضية تكون في قُصْبِيَّتِها في أول شهر تموز من كل عام .

٢٢١٥٠ - قُصْبُ ، قُصْبُ ، قُصْبُ

Equarrissage (F). *Squaring* (E).

هو قطع الشيء وتقسيه وترتيبه كالجوارق ويطورع الاشجار الخ .

٢٢١٥١ - قُصْبُ ، قُصْبُ

Arundo phragmites (S). *Roseau*, *R. commun*, *R. à balais* (F). *Common reed*, *Ditch reed* (E). *Deckrohr*, *Teichrohr* (D). *Canna*, *C. a spazzola*, *Spazzole* (I).

ويسمى غاب وقُصْبُ المكائن . نبات كمبروي من فصيلة النجيليات ، ساقه قصبة ، جامدة ، متشابكة السلاسل الجوفاء . أوراقه صفية كبيرة اللد مملدة متداقبة . أزهارها مجتمعة عناقيد عامة ترتكز على سراج واحد . يكثر في المنائق وعلى ضفاف الماء . يستعمل للسياج وفي صناعاتي السلال والمكائن .

٢٢١٥٢ - قُصْبُ الدَّرِيَّةِ

هو حرد الوج ، أطليه .

٢٢١٥٣ - قُصْبُ الرِّمَالِ

Arundo arenaria (S). *Arunde*, *Gourbet* (F). *Cane*, *Reed grass* (E). *Mahbrohr*, *Rohr* (D). *Cannuccia marina* (I).

نبات كمبروي قصبي من فصيلة النجيليات . أعضائه البلاد الحارة والمعتدلة . يكثر ويبروه في الرمال الرطبة وفي المنتقع . ساقه تستعمل في عدة صناعات زراعة أعضائها البوائير .



قُصْبَةُ الكَرْمَةِ



قُصْبُ



قُصْبُ الرِّمَالِ

قَصَب بوردون ، قَصَب أوتاھي

Canne de Bourbon, C. d'Otahtiti (F).
ساقه كبيرة مستطيلة غبراء اللون غزيرة العصارة السكرية .
والقصب يحد في جميع الأتربة المرورية الثنية بالمواد العضوية
والناصر الغاذية غوط أن لا تغتفر إلى الكلس وأن لا
تكون كثيرة الانفعال || أما كمية السكر الممكن
استخراجها من عود القصب فتراوح من ١٠ إلى ١٥ ٪
من وزن العود .

22156 - **قَصَب النِيل**
Rousseau canne (F).
هو القصب الرومي ، أطله .

22157 - **قَصَب بَلَكْدِي**
Canne de Provence (F).
هو القصب الرومي ، أطله .

22158 - **قَصَب دَرَاكُو**
Jong de l'Inde (F).
هو أصل الهند ، أطله .

22159 - **قَصَب ذَهَبِي**
Lysimaque commune (F).
هو السراجية ، أطله .

22160 - **قَصَب رُومِي ، قَصَب بَلَكْدِي ، قَصَب النِيل**
Arundo donax (S).
Canne, Canne de Provence, Rousseau canne (F). Giant
reed-cane (E). Echtenpflrohr Grosses-schiff (D).
Canna comune, Canna di giardino (I).

نوع من القصب الكبير المستطيل يكثر وبيده في المناطق
المعتدلة وإفريقية في الأماكن الرطبة أنحصر أنواع الأنهر
حيث يظل ويوجد تمامًا || يستعمل كسائر أنواع القصب.

22161 - **قَصَب قَارِسِي ، بُوَص قَارِسِي**
Arundo isia (S). Canne de Perse (F). Persian cane
(E). Persische Pflrohr (D). Canna di Persia (I).

نوع من القصب الكبير القند . يكثر في المناطق ويلي
ضفاف الأنهر والجداول الرطبة || يستعمل في مختلف
الصناعات القصبية .

22162 - **قَصَب هَرَّ** هو السوروبيا ، أطله .

22163 - **قَصَبَات**
Bronches (F). Bronchia (E).
هي مجموعة الشعب الرئيسية والثانوية التي تزين الاتصال
بين الحويصلات الرئوية والرقاضي فتضع الجبال لتسهيل
الحواء وشروجه .

22164 - **قَصَبَة**
Bronche (F). Bronchi (E).
اسم تعريفي يطلق على جزء من الجهاز الانبوبي التنفسي
الذي يوصل الرغامى أي قصبة الرئة بالحويصلات الرئوية .

22165 - **قَصَبَة**
Paspale (F).
هي أبو يبيص ، أطله .

22166 - **قَصَبَة**
Roreau (F). Reed (E).
واسدة القصب .

22167 - **قَصَبَة ، قَلَم**
Chaume (F). Thatch (E).
ساق التيجليات كالحظنة والشعير والشرافات والذرة وغيرها .
وهي مجوفة مركبة من عدة سلاميات وطقة ينشأ عليها النصف
أي الورق .

22168 - **قَصَبَة الْأَنْف**
Chanfrein (F).
Forehead (E).
جزء من رأس الدابة يمتد من بين عينها إلى منخرها .

22154 - قَصَب الرَّمْل ، غُرَاكُو

Calamagrostis (S). Calamagrostida (F). Small reed,
Sea sand-reed (E). Schilf, Rohrgress (D). Calama-
grostis (I).

جلس نباتات كمبودية قصية من فصيلة التيجليات .
أطولها نحو ٨٠ سم أطاها البلاد الحارة والمعتدلة . ترفب في
الأراضي الرطبة ولا تنحش المناطق البحرية . بعضها يستعمل
في تثبيت رمال الكثبان القاسلة لأنه لا ينحش الطش .

22155 - قَصَب السُّكَّر ، مَصَان ، بَرَسُوم

Saccharum officinarum (S). Canne à sucre, Cannamel-
le (F). Common sugar cane (E). Zuckerrohr (D).
Canna da zucchero, Cannamelle (I).

نبات زراعي من فصيلة التيجليات مهدد البلاد الآسيوية
الحارة ونها انتقل ونقش في ثلاثة أقطار العالم الباقية لأنه
كان حتى عام ١٨٠٠ النبات الوحيد الذي تستعمل حصارته
في صناعة السكر . أما الإقليم الصالحة لزراعته فهي مبدئياً
أقاليم البرتغال التي لا يقل متوسط حرارتها الرطبة عن ٢٣°
وإلى لا ينخفض متوسط حرارتها الدنيا عن ١٠°
ساقه منتصبه مسقوفة تعلو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم .

سلامياتها تعلو من ١٠ إلى ٣٠ سم . وقطرها يراوح
من ٣ إلى ٨ سم . ألوانها الخارجية خشية التركيب جامدة
تلفها مادة شمعية يغطها اللون . أما الألوان الداخلية
فأصفرية النسيج غزيرة العصارة السكرية . أوراثه متطاوية ،
عصيفة الشكل ، حافضة . فصلها يطول من ١٠٠ إلى
٢٠٠ سم . وهو جامد المنصفه سنن الحافة . أزهاره حنقودي
التجميع ، هامى الارتكاز . أزهاره صغيرة الحجم ، فضة
اللون ، ثنائية ، متباينة ، كثيفة الأزغب للمستطيل || حمراء
برّ نجيل دقيق || ضروب القصب الزراعي عديدة أشهرها
وأعماها ما يلي :

قصب أزرق ، قصب جاييك

Canne bleue, C. jamaïque (F).
ضرب سروتي قوي المنفعة يتحمل الطش وهو متوسط
القند والانتاج السكري .

قصب أسود
Canne noire (F).
ساقه صلبة جوية اللون سماء ألوان متوسطه العصارة
السكرية . تكثر زراعته في ملقا وجزيرة موريس .

قصب أصفر ، قصب صيني
Canne chinoise, C. de Penang (F).
متوسط القند ، أصفر اللون ، أخضر الملوخ ، كثيف
المنفعة القصية غزير العصارة السكرية تكثر زراعته في
الصين وفورموزا وجزر الملايو .

قصب الصين
Canne de Chine (F).
صغير القند ، حنطي اللون ، أصفر الملوخ متوسط العصارة
السكرية لكنه سروتي وقوي المنفعة ضد الأصوام القفطرية .
تكثر زراعته في الصين والهند والهند الصينية .

قصب الكوششين
Canne de Cochinchine (F).
ساقه خفيفة غبراء اللون متوسطه العصارة السكرية .

قصب الهند
Canne guinghan (F).
كبير القند يطول نحو ٦ أمتار . يملك التربة ربيصة
حاصرها الغاذية . ساقه غزيرة المادة السكرية ، صفراء
اللون مجلعة بالبنفسجي .

قصب بتافيا
Canne de Batavia (F).
أصرامه عديدة موثها كبيرة القند ، مجلعة بالألوان
الباقية والغائقة ، غزيرة العصارة السكرية .



قصب الرمل



قصب السكر



قصب رومى

٦٠ سم. اوراته احليبية قليلة القامة نصلها شغل
المس اذنب البشرة. ازماره وردية اللون زرق الملاج.
ثمارة قفاسية الشكل حقة التركيب.

٢٢١٨١ - قَصِيْف
Frangible (F).
Frangible, Breakable (E).
نمت تمريني يطلق عل ما كان سهل الانكسار او
الانحلال.

٢٢١٨٢ - قَصِف
هو الياض ، اطليا .

٢٢١٨٣ - قَصْفَة
Brize (F).
هي البريزه ، اطليا .

٢٢١٨٤ - قَصَمَكَة
Conceptacle (F).
حق يحسن اعضاء التمثل في بعض اجناس الفطور .
ج قسم .

٢٢١٨٥ - قَصِيل
Osteoclaste (F).
Osteoclasty (E).
يعن يسحب العظم في الحيوانات اخصها الحرة فتهش ويسهل
انصاعها وكسرها .

٢٢١٨٦ - قَصَوَان *
Cirsium (S).
Cirse (F). Horse-thistle (E).
جنس نباتات شائكة ميلولة برية من فصيلة المركبات .
انواعه عديدة منها الحولية والمحولة والمعرة . سيقانها اسطوانية
تعلم من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراتها ساعدة شائكة .
ورئيسياتها كبيرة اللد . ازمارها انبوية . قناباتها مهدية
الاطراف . بزورها مغلفة مستطيلة || اعرف انواعه
واشهرها ما يتبع :

قَصَوَان افريقي
Cirsium afrum (S).
Cirse d'Afrique (F).

قَصَوَان الحقل
C. arvense (S). Cirse des champs (F).

قَصَوَان المَنَاحِل
C. oleraceum (S). Cirse potager (F).

قَصَوَان سنائي
C. lanceolatus (S). Cirse lanceolé (F).

قَصَوَان شَكس
C. ferox (S). Cirse féroce (F).

قَصَوَان كَثِير الشوك
C. spinosissimum (S).

قَصَوَان ثَلَاث
C. très épineux (F).

قَصَوَان لُبْنَانِي
C. libanotifum (S). Cirse du Liban (F).

قَصَوَان مَصُوف
C. eriophorum (S). Cirse laineux (F).

٢٢١٨٧ - قَصَوَان الْجِبَال
هو الصلحاح ، اطليا .

٢٢١٨٨ - قَصُوص *
Textor (S).
Alecto (F). Textor (E).

جنس طير من فصيلة التوتويات . انواعه المرحولة قليلة
العدد موطنها بعض مناطق افريقية البطل والجنوبية .
تألف المراهي والاحراج البصرة الانهار . ملجئها الجبال
جامي افريقيا قليلة البدن || اجسامها متوسطة اللد تعلل
من ٢٢ الى ٢٦ سم. مناقبها كبيرة عرطية الشكل .
اجنحتها مستطيلة . اذناها مغلفة الاطراف او مستديرة ||
قوتها الحشرات والديدان وبعض البزور البرية || اعرف
انواعه واشهرها قصوص احمر المنقاد .

٢٢١٨٩ - قَصُوصُ أَحْمَرُ الْمَنَاقِد *

Textor erythrorhynchus (S).
Alecto à bec rouge (F).
طائر من القصوص . موطنه يمتد من افريقية الجنوبية الى

٢٢١٩٠ - قَصْبَةُ الرِّثَّة ، وَخَاسِي

Trachée-artère (F). Trachea, Windpipe (E).
النضو في الجسم الذي يوصل الحنجرة بشقي القصبة .
وهي التي يمر منها الهواء الى الرئة ان داخل او خارجا .

٢٢١٩٠ - قَصْبِي
Tubiforma (F).
Tubiform, Tubular (E).
ما كان شكله كالقصب او الانبوب .

٢٢١٩١ - قَصْبِيَّات
Trachées (F). Tracheates (E).
هي المصليات التي تتحلل بمجهر تنفسي انبوي يقابله جهاز
تنفسي شعبي .

٢٢١٩٢ - قَصَبَةُ الْحَبَّة
Petite centaurée (F).
هي مرارة الحش ، اطليا .

٢٢١٩٣ - قَصَد
Ronce (F).
القصد الموج . وقصد الموج فروعه الثانية .

٢٢١٩٤ - قَصْدِير
Etain (F). Tin (E).
معدن معروف منذ زمن الفينيقيين الذين نقلوه الى مصر
قبل عهد موسى . لونه الى البياض الفضي الازرق الملاج .
يصهر في ٢٢٨° سغ ويغل في ١٢٠٠° سغ. رمزه (Sn-).
وزنه الانبوي ١١٨,٧ ثقله النوبي ٧,٢٩ واصلته
الكهربائية في ٢١° سغ. تبلغ ١١,٤٥ || وهو اطرى
من الزنك واشد صلابة من الرصاص كما انه لا يتأثر
بالخامض النيتري والمصارات العضوية || يوجد في الطبيعة
على هيئة اكسيد القصدير « قصديريت » Cassitérite .
Oxyde d'étain .

٢٢١٩٥ - قَصِيرَة ، دَسِيع
Baze du cou (F).
قاعدة العنق او ممرز العنق في الكاهل .

٢٢١٩٦ - قَصِيرَكَة
Gammule (F).
هي الباردة ، اطليا .

٢٢١٩٧ - قَصْرَمِي
Cerastes cornutus (S).
القصرى والقصرى نوع من القزراء صغيرة اللد غريبة
تنسج في الرمال .

٢٢١٩٨ - قَصْمَةُ الْمَاء * ، قَصْرَةُ الْبَحْرِ ، هَيْدْرُوكَيْتِل
Hydrocotyle (S). Hydrocotyle, Ecuelle d'eau (F).
Marsh pennywort, Sheep-bane, White-rot (E).
Nabel Necke, Wassernabel (D). Idrocotile, Scodella
d'acqua (I).

جنس نباتات عشبية برية مائية من فصيلة الالحيات كثر
في المنام وفي المراتق المستديرة الرطاب . الوراها عديدة.
سوقها مدادة . اوراتها ثنائية الالتشاب . مستطيلة الزناد،
دقيقة النصل المستدير المدام الانقسام . ازمارها صغيرة
خامسة البتلات .

٢٢١٩٩ - قَصْمُل ، قَصْمِل
Scorpion
هو القرب . وقيل ولعاب .

٢٢١٩٠ - قَصْمِين *
Salvia pommaria (S).
Sauge pommaria (F). Sage apple (E). Salbeispfel (D).
Salvia baccifera, S. Spirea (I).
نوع من القوصية . يقال ان منافعه الصمية عديدة . يكثر
في الاراضي البرية الملساة . ساقه فراء تعلم من ٣٠ الى



قصة الماء



قصمين



قصور

٢٢٢٠١ - قُصْبِيَّة نبت ينبت في اصول الكفاة (أ. م).

Pygidium ٢٢٢٠٢ - قُصْبِيَّة هي آخر مفصل بطي من جسم الحشرة .

Tardif (F). ٢٢٢٠٣ - قُصْبِيَّة ، لُقْبِيَّة ، مِثْخَار Tardy, Late (E). هو ما كان بطيء النمو او ما طال زمن نموه ان في الحيوان ام في النبات . م. قصبة .

Epinaute (F). ٢٢٢٠٤ - قُصْبِيَّة * نمت تعريفى يطلق على كل نبات او جزء منه اصابعه القضاة .

Biscutella (S). ٢٢٢٠٥ - قُصْبِيَّة * Biscutelle (F). Biscutelle (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الباسليات . انواعها المعروفة قليلة العدد . منها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || بعضها فراء منتصب . اوراقها متعاقبة . نصالها ملقحة ، مقلوبة ، مستطيلة النصال ، مسننة الحتار . ازهارها طرفي . ازهارها صفراء اللون . ثمارها قسمية الشكل . اعرف انواعها واشهرها :

٢٢٢٠٦ - قُصْبِيَّة العمود ، قُصْبِيَّة جَبَل طَارِق

Biscutella columnea (S). Biscutelle de Gibraltar (F). اوراقها الجذعية ملقحة الشكل ، مستطيلة النصال ، متعاقبة التنوين . اما الساقية والفرعية فرمحية الشكل متقاربة الاسنان . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٧ - قُصْبِيَّة حَقِيقَة

Biscutella genuina (S). Biscutelle vraie (F). منها بعض المناطق الجافة من لبنان وسوريه . اوراقها الجذعية متراكبة ، اما الساقية والفرعية لقليلة العدد متعاقبة التنوين . تنويرها ربيعي .

٢٢٢٠٨ - قُصْبِيَّة مُسَنَّنة

Biscutella dentata (S). Biscutelle dentée (F). منها بعض المناطق الجبلية ، تتميز بكثرة عدد اوراقها الساقية والفرعية ويكثر اسنانها الحادة الشائكة ، تنويرها ربيعي .

Patella (S). ٢٢٢٠٩ - قُصْبِيَّة * Patelle (F). Patella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبدلات الارجل امايات الخياشيم الجذعية وفضيلة القسيميات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الصخور المنورة || اصداؤها جلونية او صاجية او مظلية او اهليلجية . جميعها وسيدة المضارم ، مألوفة للشاء الداخل القلبي المادة ، غدة الشفاء الخارجي الخياشيم الالوان ، مسنة الحتار || اجسامها متباينة الاحجام التي تراوح من ٣ الى ١٠ سم . ارضها ربة فضفاضة . رؤوسها صغيرة ثنائية القواس الميونة القواعد الخارجية . غياشيمها صفيحات متساوية الترتيب تغطي الجسم تحت الرداء || جميع انواعها مأكولة مستحبة الطعم .

الشرقية . يالفت المراعي وضايف مجاري الماء حيث تكثر طعان البقر الرستني والظباء . ملجته الحيائي جماعي ، نوبه يد من ١٠ الى ٣٠ زوجا || جسمه مستدل القدر يطول نحو ٢٥ سم . ثوبه الى السواد القمعي . قوامه جتانه يبيض الصفاط الخارجية . متفاده مرجاني اللون . حدة عينه كسنتية . رصاف الى السرعة المتلطة || قوته الخشرات والظيدان والبلور ويلتقط القراد والطلع من على ظهور الظباء والافئار || يذئ عشه في السند المشوك . عشه شارب الرجاية والكبر ، قطره نحو ١٢٠ سم . شكله كالصالح يملو طوي يرتفع نحو ١٥ سم . الاثني تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوما .

٢٢١٩٠ - قُصُوع ، إِذْبَاس Lovée (F). Gathering (E). عروج الزرع من الارض او ظهور بؤادر البزور على سطح التربة .

٢٢١٩١ - قُصْبِيَّة * Phragmites (S). Phragmite, Canne à balais (F). Reed (E).

لبات لمجوري من فصيلة النجيليات . ساقه قصبية ، متباينة السلاحيات والكماير ، تطول نحو ٣ امتار . اوراقها غمدية ، حاشية ، صفيقة النصل الجلمد ، المسن الحافة ، البحري اللون || ازهاره عالمي الاوتكاز ، يشكل مجموعة من السنايل المتباينة . ازهاره بنفسجية اللون || منتبه جميع الاصناف المتعددة الحارة من العالم القديع . يكثر ببؤده في المواقف الرطبة وعلى ضفاف مجاري الماء || ويدعى في مصر والسودان « الحنطة » .

٢٢١٩٢ - قُصْبِيَّة Tube هي في بعض النباتات انبوبة الزهرة التي ترتكز عليها البتلات . ج. قصاب .

٢٢١٩٣ - قُصِير الجَذع Brévicaque (F). Brévicaque (E).

٢٢١٩٤ - قُصِير الجِنَاح Brévipenne (F). Brévipennate (E).

٢٢١٩٥ - قُصِير الرُسْع Court-jointé (F). Shors-paterned (E). من كان رسنه دون المعدل الوسط وهو من صوب الخيل .

٢٢١٩٦ - قُصِير العُمر Brachybiote (F). نمت تعريفى يطلق على كل حيوان قصير العمر من اي جنس كان .

٢٢١٩٧ - قُصِير القَدَم Brévipède (F). Brevipède (E).

٢٢١٩٨ - قُصِير المِنْفَار Brévirostre (F). Brevirostrate (E).

٢٢١٩٩ - قُصِيرَات التَرْتُون Brachycera (S). Brachycères (F). Brachycera (E). لة حشرات من ذوات الجناسين نصالها واجناسها وانواعها نحو ٢٥٠٠٠٠ اصنافها جميع اصناف العالم || اشهر نصالها : اللبابيات والبريات والمتريرات والمجيبات .

٢٢٢٠٠ - قُصِيرَة القَلَم Brachystylée (F). نمت تعريفى يطلق على كل زهرة قصيرة قلم السمة .



قُصْبِيَّة



قُصْبِيَّة



قُصْبِيَّة



قَصَب أَحْمَر لِلْعَاد

٢٢٢١٧ - قَصَب لَبْنَانِي (S). *Vinca libanotica* (S).
 ٢٢٢١٨ - قَصَب لَبْنَانِي (F). *Pervanche libanale* (F).
 نوع من القصاب. عشية طيبة ممررة. منبتها تمتد من السواحل اللبنانية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ متر من سطح البحر. ساقها مسطحة لا مجذرة. أوراقها متعاقبة، حاشية، مسطحة الاثنا، نصالها شبه قلبية الشكل، جملة الخضر، جرداء البشرة. أزهارها محورية الأركان، معنقة، خماسية البتلات، زرقاء اللون، وقد تكون بيضاء في بعض المواقع || أرواقها الخضر والجلبة لا تخلو من المنافع الطبية أعصها في السيلان وأنفطاع الطمث. وقد تحوي بعض البساتينات الكثيره النفع.

٢٢٢١٨ - قَصَب مُسَطَّح (S). *Vinca herbacea* (S).
 ٢٢٢١٩ - قَصَب وَرْدِي (F). *Pervanche rose, P. de Madagascar* (F).
 نوع من القصاب المسمر وقد يزرع كسولي في البلاد الممتدة الحاررة. ساقه مستقيمة لينة تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها أحليجية مقبولة القاعدة. أزهاره عرسطة القد، وردية اللون || أزهاره يشتر من الربيع إلى الخريف.



قَصَب صَنِير

٢٢٢٢٠ - قَصَبِيَّة (F). *Volis* (F). Lop and top (E).
 الاغصان والاينات المفصلة عن الشجرة.
 ٢٢٢٢١ - قَصَبِيَّة *، قَصَب الْمَاء، قَصَبِيَّة (S). *Lutra* (S). *Loutre* (F). *Otter* (E).
 جنس حيوانات لبونة من السرمويات وردية الرأس. أنواعه ثمانية موطنها ضفاف وبحير بعض الأنهار الآسيوية والاروية والاركية. جميعها قازية. قوتها الاسماك. اجسامها مستطيلة، وروبوها عريضة، قوائمها قصيرة، حطب اصابعها تميمها هل الباسية، اذنانها طويلة. أذواها كيفية الورير القصير. ألوانها إلى الجوزة موانجها يختلف باختلاف الانواع.

٢٢٢٢٢ - قَصَبِيَّة *، قَصَبِيَّة (F). *Etiolation* (F).
 ٢٢٢٢٣ - قَصَبِيَّة *، قَصَبِيَّة (F). *Etiolation, Sickness* (E).
 اصفرار النبات ونحوه من جراء فقدان الخصب سبه التلل أو الطمر أي قلة النور أو انعدامه.

٢٢٢٢٤ - قَصَبِيَّة (F). *Judiciaire* (F). *Judiciary* (E).
 كل ما هو مختص بالقضاء.
 ٢٢٢٢٥ - قَصَب (F). *Luzerne* (F).
 هو القصة. الحلبا.

٢٢٢٢٦ - قَصَب (F). *Recéper* (F).
 To cut down close (E).
 قصب الكر. قلع اغصانه أيام الربيع.

٢٢٢٢٧ - قَصَبِيَّة * (F). *Dendrochalcid* (S).
 ٢٢٢٢٨ - قَصَبِيَّة (F). *Dendrochalcid* (F).
 جنس طير من الجواثم مشروبها المنقير وقصيلة البساتينات. ألوانه المعروفة خسة. اطالها تمتد من الحنك إلى جزر

٢٢٢١٠ - قَصَبِيَّات * (S). *Patellidae* (S).
 ٢٢٢١١ - قَصَبِيَّات (F). *Patellidae* (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مملكات الاربعل اصابها الخياشيم الحلقية. اجناسها قليلة العدد اما انواعها لكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم. تعيش على الصخور المغمورة قرب الشواطئ || أحرف اجناسها واشهرها القصبة والشنكولة.

٢٢٢١٢ - قَصَب (F). *Gravier pour béton* (F). *Gravel of concrete* (E).
 حصى صلبة القد متساوية الحجم عادة المكسر تستعمل في الباطون.

٢٢٢١٣ - قَصَب أَحْمَر الْمَيْتَان *، أَو قَصَب (F). *Xiphorhynchus procursus* (S).
 ٢٢٢١٤ - قَصَبِيَّة (F). *Falcistrostre à bac en sabre* (F).
 نوع من القصاب. طائر من فصيلة الفالسيات. موطنه بعض مناطق أمريكا الجنوبية وأغصها النريان. يألف الأراجح الجبلية حيث يكثر الرقل والوقل || جسمه معتدل القد بطول نحو ٢٥ سم. بما فيه الشفاذ الذي يبلغ ٧ سم. يتميز بمقلاده المستطيل الاحمر كالحسام العربي وبذيله المستطيل المستدير الطرف. ثوبه متداخل الألوان. ودلوه وبطه إلى السمرة الزيتية الملوحة. زوره ابيض. رأسه ومقله وصدره إلى البياض الاصفر يملوه تشيز مستطيل احمر. جناحاه وذنبه إلى الجوزة. حدة عينه كسنتية اللون. منقاده وساقه إلى الخشمة السوداء || طيرانه خفيف الحركة، قصير القوط. قوته البندان واسارع اخفارت يتلصبا إنها كانت بواسطة منقاده المستطيل || يدن عنده في تجاريف الاجارح. الاثني تقع من يعضين إلى ثلاث يعضات تحضها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يومًا.

٢٢٢١٥ - قَصَب، عَنَابِيَّة، وَنَكَا (S). *Vinca* (S). *Pervanche* (F). *Periwinkle* (E). *Stingrin* (D). *Pervinca* (I).
 جنس نباتات عشية وعشوية من فصيلة الفلديات. أنواعه ١٢ معظمها بري وبعضها زراعي زينة. أرواقها متعاقبة معنقة كاملة. أزهارها ابليية فردية طويلة الزناد قيمة الكأس خماسية البتلات، يكثر فيها اللون الأزرق. أشهر انواعها ما يتبع:

٢٢٢١٦ - قَصَب كَبِير * (F). *Vinca minor* (S). *Petite pervanche, Violette des serpents* (F).
 نوع من القصاب المسمر غروبها هدية. ساقها عشوية فرعاء تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أرواقها سنجة بالابيض أو بالاصفر. أزهارها عادية أو مكسبة منها الابيض والأزرق والبنفسجي والوردي والاحمر || أزهارها يشتر من شباط إلى حزيران.

٢٢٢١٧ - قَصَب كَبِير * (F). *Vinca major* (S).
 ٢٢٢١٨ - قَصَبِيَّة (F). *Grande pervanche, Violette des sorciers* (F).
 نوع من القصاب المسمر. ساقه عشوية فرعاء تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أرواقه صلبة القد، نصلها ستاني الشكل، قلبية القاعدة، مسنج الصلبة أو مطلق الخشار بالاصفر. أزهاره كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها إلى الزرقاء الجبلية || أزهاره يشتر من آذار إلى حزيران.



قَصَب كَبِير



قَصَاة

S. sempervirens (S). **قصيب الذهب الدائم الخضار**
Verge d'or toujours vert (F).

S. latifolia (S). **قصيب الذهب العريض الورل**
Verge d'or à larges feuilles (F).

S. graminifolia (S). **قصيب الذهب المصني الورل**
Verge d'or à feuilles de graminées (F).

S. multiflora (S). **قصيب الذهب الكبير الزهر**
Verge d'or multiflore (F).

S. canadensis (S). **قصيب الذهب الكندي**
Verge d'or du Canada, Gerbe d'or (F).

S. serotina (S). **قصيب الذهب المخضار**
Verge d'or tardive (F).

S. virga-aurea (S). **قصيب الذهب المبلول**
Verge d'or commune (F).

S. nutans (S). **قصيب الذهب المنحني**
Verge d'or penchée (F).

Bactériacées (F). **٢٢٢٢٧ - قَصَبِيَّات**
Bacteriaceae (E).

فصيلة من البكتيريا تتميز بشكلها القفصية . خلاياها اسطوانية مستقيمة تنقسم حودياً وباتجاه واحد . اجناسها ثلاثة : البكتيريوم والبليسلوس والثرانثف . اما الانواع فمديدة وهي مذكورة في مواقعها التسلسلية .

Procès (F). Law-Suit (E). **٢٢٢٣٨ - قَصَبِيَّة**
هي النزاع الذي يعرض على المحكمة .

Affaire en état (F). **٢٢٢٣٩ - قَصَبِيَّة مُعَدَّة لِلْحُكْم**
هي القضية التي استوفيت فيها المرافعات .

Chat (F). **٢٢٢٤٠ - قَطْ**
هو السنور ، اطلبه .

Serval (F). **٢٢٢٤١ - قَطْ سَمِير**
هو البج ، اطلبه .

Gangas, Ptérocles (F). **٢٢٢٤٢ - قَطَا**
Ptérocles, Sandgrouse (E).

جنس طير من فصيلة الجوبيات وأحد قطاة قطاط . انواعه عديدة جميعها قريبة الشبه من الحمام تتميز باستطالة ردة ريشتين من اخفيكها تكنتان الذهب . وهي سريرة الطيران تطير مسافات شاسعة في طلب القوت والماء . تألف الثنائي ، قوتها الجيوب واليزور ونواحي بعض النباتات . تعيش اسراباً كبيرة . تنفث في ادموس رصمها بالقش والوبر . اناثها تحضن اربع بيضات صغيرة القذ مرطلة || وقوصف القطا بالهداية والعرب تصرب بها الخلل في ذلك . ومن قول الشاعر :

« والتاس احدى في القبح من القطا
واضل في الحسنى من الفران »

ويقول في وصفها :

« اما القطاة فاني سرف انتها
نمناً يوافق متى بعض ما فيها »

« سكا مخفورية في ريشها طرف

سود قوادها صهب غزائها »

اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

انزاج وبعض الاقاليم الافريقية || اجسامها صغيرة تطلي من ٢٥ الى ٢٢ سم . اجنتها ضيقة مستطيلة . اذناها فاقرة . رالها بالغة الطول . اناها الى السواد الاسع يملو مزاج اخضر او بنفسجي . حاسرها غططة بالابيض . صدورها وبطنها الى البياض الاشر || ملاجئها الخياطة جماعية . تكثن عشاتها في قر الانجار الباسقة . الاثى تحضن من بيضة الى ريشتين ثلاث مرات في الحول .

٢٢٢٢٨ - **قَصَبِيَّة** ، **سَرْح** ، **طَرْح**
Cadaba (S). Cadaba (F). Ezel-wood (E). Ezelbaum (D). Cadaba (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه قليلة . جميعها مجبريات ونباتات سرحة او شائكة . اوراقها كاملة متعاقبة ، تسلسل جامد النسيج ، بحري اللون . ازهارها فردية ، عذرية وتاجية . ثمارها قرنية اسطوانية ، لونها الى الخضار البصري ، لباها جامد المكسر غزير العصارة الحامضة المرة || يقال ان عصارتها تلثم الجرح وتطرد الديدان المعوية .

٢٢٢٢٩ - **قَصَبِيَّة**
نبت من الحشيش ينبت في السهل . ج قصات .

Terrain peu caillouteux (F). **٢٢٢٣٠ - قَصَبِيَّة**
Pebbly ground (E).
هي التربة القليلة الحصى . اما التربة الكثيرة الحصى فتدعى حصية .

Pépins de raisin sec (F). **٢٢٢٣١ - قَصِي**
هو زرد الزبيب اني العنب المجفف . (E). Raisins-stones

Pénis (F). **٢٢٢٣٢ - قَصَبِي**
اسم شامل يطلق على ذكر كل حيوان .

Branche (F). Branch, Bough (E). **٢٢٢٣٣ - قَصَبِي**
كل نبت من الاضمان يقصب . ج قصب وقصبان .

Ente (F). **٢٢٢٣٤ - قَصَبِي التَقْطِيع**
Graft, Branch bearing a graft (E).

قصب او فصن دقيق له من ريمة واحدة الى ثلاث زيمات وهو يصلح لتقليم وقد يستعمل لعملاً للشجرة .

٢٢٢٣٥ - **قَصَبِي الحَمَل**
Coursion, Coursonne (F). Shoe cut down to three- or four eyes (E).
كل قصب قلم ورطه على من ثلاث الى اربع براعم ثمرة .

٢٢٢٣٦ - **قَصَبِي الذهب** ، **عَصَا الذهب**
Solidago (S). Solidage, Verge d'or (F). Golden-rod, G. wings (E). Goldruta (D). Solidago, Verga aurea (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة المركبات الشامية الزهر . انواعه نحو ٩٠ منظرها عشوي وبعضها جبني . اوراقها متعاقبة رهيبة . ازهارها غصية شامية متعاقبة جميلة الشكل صفراء اللون || اعرف انواعه واشهرها :

S. glabra (S). **قصيب الذهب الامرد**
Verge d'or glabre (F).
S. bicolor (S). **قصيب الذهب الثنائي اللون**
Verge d'or bilocore (F).
S. rigida (S). **قصيب الذهب الجامد**
Verge d'or rigide (F).



قَصَبِي



قَصَبِي الذهب



قطاة كدرية

٢٢٢٥٢ - قُطَاس * ، قُوتَاش ، خُشْطَاء ، يَاك

Poephagus (S). Yack (F). Yak (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة البقريات انزواه المبرقة
اثنتان موطنها جبال التبت من ارتفاع ٢٤٠٠ الى ٥٥٠٠ م.
من سطح البحر || والقطاس حيوان كبير الخنثى يملو
من ١٦٠ الى ١٨٠ سم. ويزن من ٥٠٠ الى ٦٠٠
كيلو. شكل جسمه يأخذ من البيسون والجاموس والثور.
رأسه كراس الثور الا انه محدد التقص ، مستطيل القرون
للمنتصبة. خنثايتاه متعادلتان ، عيناها كبيرتان ، اذناه
مستطيلتان ، قوائمها قوية. ثوبه الى السرة الباقية السوية
تملوحا رقعة صهابة ، خطمه وذخرته ونبمة ذنبه بيض .
ذنبه يشبه ذنب الفرس وكان الترك يزبنون فيه العلم . قوته
الاضباب ، سره كبير المدد . اثناء تنعم ينفوروا واحدا
في الحول يسير وراء امه فور وضعه || اما ثوباء فيها :

P. musus (S). Yack musz (F).

القطاس الاخضر

P. grunniens (S). Yack commun (F).

القطاس الخفيف

ومثلك القطاس الداخن وهو قريب من الخفيف يشمل
بعض الفروق . يستعمل في الجر واقتل والحرارة . حلب
اناله غزير المادة السكرية ، مستحب العرف .

Secteur, Domaine (F).

قُطَاع

Sector, Domain (E).

Coupe (F). Cutting (E).

قُطَاعَة

٢٢٢٥٥ - قُطَاف ، خِرَاف ، صِرَاف

Cueillette (F). Gathering (E).

اجتباء كثر او خلافة من الانتاج النباتي عند الادراك .

Vendange (F).

قُطَاف الكَرْمَة

Vintage, Grape-gathering (E).

اجتباء مناقيد العنب او وزن قطاف العنب .

Polyandrie (F).

قُطَامَة ٥

Polyandry (E).

القطامة تعدد الأزواج عند المرأة الواحدة .

Rostrhamus (S).

قُطَامِي * ، قُطَامِي

Rostrhame (F).

جنس طير من حماره الحداء وقبيلة الصقريات ، اقوامه
ثلاثة موطنها البلاد الحارة . وهو عزيز الرصيد ، كبير
الجمعة ، يمتد من اعظم الطيور التي يصاد بها || يألف
البيسرات ويجاري الله . يثنى عنه في الانجراف القرية
من لئام . اثناء تبيض وتحسن من رقتين الى ثلاث رفات
مستطيلة الشكل حطامه اللين .

Légumineuses (F).

قُطَانِيَّات

هي الفزريات فصيلة نباتية ، اطليا .

Henné (F).

قُطَب

هو الحناء ، اطليا .

Pôle (F). Pole (E).

قُطَب

القطبان ، جغرافياً ، هما طرفا محور الارض الذي يمر
بمركز الكرة الارضية ، وهما القطب الشمالي والقطب الجنوبي .
ويبلغ للسافة بين خط الاستواء وبين كل من القطبين نحو
عشرة الاف كيلومتر . اما القطر القطبي للارض فهو



قطاي

Catapodium (S).

٢٢٢٥٣ - قُطَاب ٥

Catapode (F). Catapodium (E).

نبات عشبي بري من فصيلة النجيليات . يألف
الربال البحرية . يمتد من النباتات الطوعية في لبنان .

٢٢٢٥٤ - قُطَاة الرَّمَال ، دِيَلَم

Pterocles arenarius (S). Ganga des sables (F).

اكبر انواع القطا . طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الصهبة
الخمره يملو توشيح ربادي واصفر . بطنها عاتق اللون .
متقاربا اسدا . موطنها شاسع الاطراف يمتد من رمال آسية الى
ومال افريقية .

٢٢٢٥٥ - قُطَاة شَرْعِيَّة ، جُوْنِيَّة

Pterocles orientalis (S). Ganga oriental (F).

طائر من القطا . طولها نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الصهبة
الخطية يملو توشيح ابيض ارقط . صدره الى الجوزة الباهتة ،
بطه الى السرة ، متقاربه وبطن جناحيه وقوادبه الى السود .
موطنه فياني الشرق الاذن .

٢٢٢٥٦ - قُطَاة كَهْمَرَاوِيَّة ، خُطَاط

Pterocles exustus (S). Ganga brûlé (F).

طائر من القطا متوسط القد طولها نحو ٣٠ سم. ثوبه الى
الصهبة الخطية تملو رقعة الى الجوزة الفاتحة الزاوية .
صدره وبطه الى الصفرة الموشحة بالاسمر . سره متوسط
المدد . موطنه الصحاري .

٢٢٢٥٧ - قُطَاة كُدْرِيَّة * ، كُدْرِيَّة

Pterocles sichteni (S). Ganga cata (F). Large painted sandgrouse (E).

طائر من القطا ، طولها نحو ٢٧ سم. ثوبه الى البرة
اكثر الظاهر والبطن . اسفر الخلق . اسود الحار .
موطنه فياني صحاري الشرق الاوسط وافريقية الشمالية
والغربية . اسراهه كثيرة المدد .

٢٢٢٥٨ - قُطَاة مَرْقَلَة

Pterocles senegallus (S). Ganga du Sénégal (F). Spotted sandgrouse (E).

طائر من القطا . صغير القد طولها نحو ٢٥ سم. ثوبه الى
الصهبة المرقطة بالاسمر والاخر || موطنه رمال السنغال
والصحراء الكبرى .

٢٢٢٥٩ - قُطَاة مُكَلَّلَة

Pterocles coronatus (S). Ganga couronné (F). Coronated sandgrouse (E).

طائر من القطا . صغير القد طولها نحو ٢٦ سم. ثوبه الى
الصهبة الغبراء تملو رقعة حمراء . رأسه ناشق بعض الريش
الذي يبدو كالاكليل . سره متوسط المدد . موطنه المناطق
الاستوائية الافريقية .

٢٢٢٥٠ - قُطَاة مَوْشَحَة ، دَلِيم

Pterocles lichtenheini (S). Ganga rayé (F). Close-barred sandgrouse (E).

طائر من القطا متوسط القد ، طولها نحو ٢٨ سم. ثوبه
الى الصهبة الغبراء يملو توشيح اسمر يقطب البسائط
والليل . صدره اطلل ارقط . بطه وزمكا الى البياض
التي . سره متوسط المدد . موطنه افريقية الاستوائية .

٢٢٢٥١ - قُطَارَة ، مَشْفَاظ

Compte-gouttes (F). Drop-tube (E).

انبوب من قزاز مذهب الطرف المستطع يستطاع بواسطته
تنقيط المواد السائلة نقطة نقطة .

نشوية ماكولة. شراخها يعلو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ازهارها عاجية البتلات، صفراء الاسدية. اوراقها قرصية الانتشاب، كبيرة القد، زنادها يعلو نحو المتر. ازهارها صيني.

٢٢٢٧٥ - قُطْبَة عَالِيَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الْعَالِمِ

Sagittaria natans (S). *Sagittaire flottante* (F). عشية سبروتية ترينية ممرمة تعيش في الأكواريوم. شراخها يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. اوراقها قرصية الانتشاب، طويلة الزناد، نصلها لا تقاسي الشكل والحجم يوم حل سطح الماء. ازهارها ضمية التجميع، بتلاتها يضاء اللون شفافا || ازهارها صيني.

٢٢٢٧٦ - قُطْبَة تَجِيلِيَّة ، سَهْمُ الْمَاءِ التَّجِيلِي

Sagittaria graminea (S). *Sagittaire graminée* (F). عشية ترينية زهية. شراخها دقيق يحمل من ٣٠ إلى ٦٠ سم. اوراقها قرصية فالقرصية مستطيلة الزناد، نصلها متوسط الحجم عايق الخصار اما الشراخية الهوائية فضيقة النصل الاطوي اليابات الخصار. ازهارها معلانية. اسديتها كبيرة رافعة الجسم، حليلة البتلة. ازهارها صيني.

٢٢٢٧٧ - قُطْبَة هَائِكَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الْهَائِكِ

Sagittaria heterophylla (S). *Sagittaire hétérophylle* (F). عشية جاذبة ممرمة مهدا امريكية الثالائية. شراخها يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ازهارها السفلى لاطقة مربعة، ازهارها العليا مسطحة مجدية. اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة الزناد. نصلها هالك الشكل والحجم والون. ازهارها صيني.

٢٢٢٧٨ - قُطْرُوس

Catabrosa aquatica (S). *Catabrose aquatique* (F). نبات عشبي يربي حولي من فصيلة النجيليات. منته صفات مجاري الماء. يعتبر من النباتات الطوعية في لبنان.

٢٢٢٧٩ - قُطْبِي

نبات يصنع منه جبل مرم وهو غير من الكنبار (السان)

٢٢٢٨٠ - قُطْبِي

نمت تحريفي يطل على كل ما له صلة بالقطب.

٢٢٢٨١ - قُطْبِيَّة

خاصة اتجاه الايزة المغنطة الى القطب.

٢٢٢٨٢ - قُطَّة

الثقيقة من البليغ وفيرة. تقول حات قطة من البليغ.

٢٢٢٨٣ - قُطْر

خط مستقيم يمر بمركز الدائرة وينتهي عند طرفيها المتقابلين فيقسمها الى قسمين متساويين. وهو في مساحته ثلث المحيط. قطر المربع والمستطيل والمعين والشبه بالمعين هو الخط المستقيم الواصل بين الزاويتين المتقابلتين من هذه الاشكال.

٢٢٢٨٤ - قُطْرَاس حَقْلِي

Lycotocoris campestris (S). *Lycotocoris champêtre* (F). حشرة مفترسة من فصيلة القترسيات. جسمها صغير القد.

اتصر من قطرها الاسرائلي بنحو ٤٣ كيلومتراً. والقطبان منطوسياً يتجاذبان اذا كانا مختلفين، موجب وسالب، ويتقاربان اذا تشابها.

٢٢٢٦٢ - قُطْب جَنُوبِي

Pôle sud (F). South pole (E).

٢٢٢٦٣ - قُطْب حَيَوَانِي

Pôle animal (F). Animal pole (E).

٢٢٢٦٤ - قُطْب سَالِب

Cathode (F). Negative pole (E). هو المحيط، اقلية.

٢٢٢٦٥ - قُطْب حَقْلِي

Pôle nord (F). North pole (E).

٢٢٢٦٦ - قُطْب مَتَوَكَّد

Pôle conséquent (F). Consequent pole (E).

٢٢٢٦٧ - قُطْب مَنَظِّطِي

Pôle magnétique (F). Magnetic pole (E).

٢٢٢٦٨ - قُطْب مُوجِب

Anode (F). Positive pole (E). هو للصد، اقلية.

٢٢٢٦٩ - قُطْب نَبَاتِي

Pôle végétal (F). Vegetal pole (E).

٢٢٢٧٠ - قُطْبَان

Brachypodium (S).

Brachypodium, Bromes chiendent (F). False brome grass (E). Kurzstamm, Zwenke (D). Páleo, Pennacchi (I). نبات عشبي يربي من فصيلة النجيليات قريب الشبه من المكروش يكثر في البور وفي الاراضي المصحاة برصاص المال ويسكن عليه. وهو اذا كثر بين الزروع وفي الاراضي المزروعة استوجب الابادة.

٢٢٢٧١ - قُطْبَة ٥

Ketupa (F). هي الخوزن، طائر من البويات.

٢٢٢٧٢ - قُطْبِيَّة ، سَهْمُ الْمَاءِ

Sagittaria (S). *Sagittaire, Fléchière* (F). *Adder's tongue, Arrow-head* (E). *Peilkraut* (D). *Sagittaria, Barba silvana* (I).

جنس نباتات عشبية، جلوسورية، مائية، ممرمة، من فصيلة الزمراريات. انواعه ١٧ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمعتدلة اوراقها صمغية الشكل، مستطيلة الزناد قرصية الانتشاب. ازهارها ثلاثية التكوين والتجميع يعلو نها اللون الابيض ثم الاحمر || اشهر انواعه ما يلي.

٢٢٢٧٣ - قُطْبَة شَالِيَة ، سَهْمُ الْمَاءِ الشَّالِكِ

Sagittaria sagittifolia (S). *Sagittaire commune, Sagette, Flèche d'eau* (F).

عشية ترينية سبروتية ممرمة مبلولة في المناق والاحواض. تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقها قرصية وشراخية فالقرصية طويلة الزناد كبيرة القد مستعرضة اما الشراخية الهوائية فضيقة السنان حادة الزناد. ازهارها ضمية، ثلاثية او خاسية التجميع. بتلاتها شفافة التبيج، يضاء اللون، وريدة الحمار || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٢٢٧٤ - قُطْبَة صِيْنِيَّة ، سَهْمُ الْمَاءِ الصَّيْنِي

Sagittaria sinensis (S). *Sagittaire de Chine* (F).

عشية ترينية سبروتية ممرمة مهدا الصين. جذاميرها



قطبان



قطبة

Lagotis (F).

٢٢٢٩٠ - قَطْرِب

نبات عشبي بري ، طبي ، من السكيات يدعى لغوتيا ، اطلبها .

٢٢٢٩١ - قَطْرِب

القُطْرِب ، ويدعى أركطون ، نبات شائك الازهار ، ينشعب بمن يمر به . واسع اركطون .

Cilbanarius (S).

٢٢٢٩٢ - قَطْرِبَة

Cilbanarius (F). Cilbanarius (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وعضلة الباغوريات . انواعها المروفة مدينة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || تعيش في الاطوار قرب الشواطئ . ملجأها الحيائي جاعي ، جاماتها متوسطة العدد || اجسامها تظل من ٤ الى ٦ سم . اذواها زاحية الالوان الجلدية وبعضها مجلج .

Alkahurops

٢٢٢٩٣ - قَطْرَبُوس

القطربوس نجم من كوكبة المواء مركزه على رأس البقار اي المواء .

Diomedea (S).

٢٢٢٩٤ - قَطْرَس *

Albatros (F). Albatross, Diomedes (E).

جنس طيور بحرية من كليات القدم . موطنها البحار الجنوبية من جميع خط الاستواء . انواعها سبعة جميعها كبيرة الحجم - عظيمة القدة ، طولها يراوح من ١٦٠ الى ١٨٠ سم . ويصلها تراوح من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم . وهي طيور فصحاء وتقوم قشور وتسرع وتنقض فتصيد ذلك . اقولها الى اليابس لتأصع بلسنتها اجنحتها المتدودة اللون او الطملاء . منتقياها كبيرة القدة ، منتقفة المنسر ، حنطية اللون ، صفر المولج || قوتها الاساك والقشريات والجمف البحرية . تكثر في افصوس ترصه بالثقل . حنطتها بيضاء واحدة ترخها نحو حصة اسابع .

٢٢٢٩٥ - قَطْرَس مَرْتَبِك *

Anthocoris confusus (S). Anthocoris confus (F).

حشرة مفترسة من فصيلة القطرسيات . جسمها صغير القدة ، يطول نحو ٤ سم . رأسها صغير الحجم ، اسود . غطتها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناثرتان . زباناا دقيقتان ، مبشرا . الحلب . كوسلها اسود وحسبها كذلك . ظهرها لاسن يتجاوز البين بزاوين . يظنها الى السرة السوداء . قوائمها الى الشقة السوداء || تألف المواقف التي يكثر فيها الحور والصفساف . تعيش تحت القشور . قوتها ما تقتصه من حشرات .

٢٢٢٩٦ - قَطْرَسِيَّات *

Anthocoridae (S). Anthocoridae (F). Anthocoridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة عثفليات الاجنحة وطيفة لخصيات الجناح . اجناسها وانواعها المروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ، متدلة التباطيط ، ملونة . رؤوسها صغيرة . اعطائها نشطة ، لثائية الاجزاء . عيناها جانبية ، ناثرة . قربتها الاستعمارية رباعية الفصل . كوسلها محببة . حناها صغيرة . ظهرها وروافها لاسقة في معظم الاقتران . حناجب ظهرها لاقية ، تكثر فيها الاطالة . قوائمها صغيرة || الحشرة الجملة مفترسة في

يطول نحو ٤ سم . رأسها محرم ، جزوي اللون . غطتها معتدل الطول . عيناها صغيرتان ، ناثرتان . زباناا دقيقتان ، مذهبان . كوسلها بني اللون ، جزوي المولج . حنطتها صغيرة . ظهرها لا يلسف كامل البطن ، حنطتها بلون الكوسل بعلوها تدبج حنطي ونعته سمراء . يظنها الى الجفوة الباهتة . قوائمها حنطية || تألف الغابات . قوتها الحشرات الصغيرة والحوام .

٢٢٢٩٥ - قَطْرَان ، قِير

Goudron, Polx (F).

Tar, Pitch (E).

مادة راتنجية تستخرج بالقطار من اعشاب الصنوبر والتوب والسرو . ويورسها . ومن القسم الحجري .

Goudron de bols

قطران الخشب

Goudron de houille, Cositar

قطران الفحم الحجري

يحمس في الهواء ويستعمل لطلاء جروح الشجر .

Sapin gracieux (F).

٢٢٢٩٦ - قَطْرَانِي

هو التوب الجليل ، اطلبه .

Sapin de Cilicia (F).

٢٢٢٩٧ - قَطْرَانِي اَمَصَر

هو التوب الاناضولي . اطلبه .

٢٢٢٩٨ - قَطْرِب

جاء في كتاب الجلسه : || القُطْرِب طائر يحل الليل كله لا ينام . وقالوا اجدول من قُطْرِب واسهر من قُطْرِب .

٢٢٢٩٩ - قَطْرِب * ، قَطْرِب

Colobus (S).

Colobe (F).

جنس قرد من فصيلة الهباريات . انواعها المروفة ١٢ جميعها افريقية تألف غابات واسراج المناطق الاستوائية وما جاورها || اجسامها رفيقة القوام تطول من ١٠ الى ٨٠ سم . تتميز باندحام اهام ايديها . اذواها حنطة الشعر . الرأيا تختلف باختلاف الانواع فيها الاسود والابلق والاسمر والاصهب . انها تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم . || قوتها الثمار والحبوب والجلود . تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٥٠ . انها تضع جروا واسدا ترصه نحو ٥ اشهر || اما انواع القناري فهي :

C. palliatus (S).

قطرب ابيض الماكب

C. à épaules blanches (F).

C. angolensis (S). C. d'Angola (F).

قطرب انكولا

C. ferrugineus (S).

قطرب حديدي اللون

C. ferrugineux (F).

C. ursinus (S). C. ourson (F).

قطرب دلي

C. kirk (S). C. de Zanzibar (F).

قطرب زنجبار

C. Satanas (S). C. satan (F).

قطرب ساتان

C. guereza (S). C. guérza (F).

قطرب فرزه

C. vellerosus (S). C. à fourrure (F).

قطرب فروي

C. foal (S). C. de Foa (F).

قطرب فوا

C. cristatus (S). C. à huppe (F).

قطرب تنبراني

C. fuliginosus (S). C. fuligineux (F).

قطرب كئي

C. polycomus (S). C. à camail (F).

قطرب مردن



قطرب



قطرس

قليلة العدد . تألفت الاغوار والمناقع وضفاف مجاري المياه الدلبة || اجسامها مستطيلة ، اسطوانية الشكل او قرصية . رؤوسها مبطلة الجرم ، شبه مخروطية الشوذن . جميعها رباعية القوائم والاصابع || اعرف اجناسها واشهرها القنطروس والتقطور .

٢٢٣٠٢ - قَطَرُوف * Chotorhea (S).

Chotorhé (F). **Chotorhea (E).** طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدفائيات . موطنه يمتد من الهند الى جزر الزايب . يألف الرياض والحراج القريبة من مجاري الماء || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٧ سم . يتميز بكون منقاره الصليح لشبه مخروطي الشكل وباسطالة سباله التي تمتد حتى الزور . جناحه معتدلا الطول . ذنبه عشاري الزوال ، مستدير الطرف . قوبه العلوي الى الخصار الاصم . رأسه احمر . حشره الى الزرقه . عيناه كبرتان ، مملوحتان بالافبر . حقله عينه ذهبية اللون . عنقه وامل صدره الى الزرقه المرقوشة بالابيض . بطنه وافيخه الى الخصار الاصفر المواج . منقاره ورصافه واصابعه الى الطحله السمراء || قوته الحشرات من صغيرها الى كبيرها وبعض البآر اعصها النعنية وبعض البذور || يدخن اقصومه في حبر محتفزه في القرية . الانثى تبيض ٣ الى ٤ بيضات تحضنها متناوبة الذكر نحو ١٣ يوما .

٢٢٣٠٤ - قَطَرُوي Diamétral (F).

Diametrical (E). ما كان تابعا لقطر كوكب خط قطري .

٢٢٣٠٥ - قَطَع ، قَطْل Abattage, Coupe (F).

Felling (E). فصل الاشجار عن اروابها وطرسها على الارض .

٢٢٣٠٦ - قَطْع الودج Jugulation

اسخى طرائق جزر الماشية .

٢٢٣٠٧ - قَطْع طولي Section longitudinale (F).

Longitudinal section (E).

٢٢٣٠٨ - قَطْع منطوي Section conque (F).

Conic section (E).

٢٢٣٠٩ - قَطْع ناقص Ellipse

٢٢٣١٠ - قَطْعَاوَات هي دمجات الاربجل ، اطلسها .

٢٢٣١١ - قِطْعَة Parcella (F).

Parcel, Portion (E). هي القطعة من الارض التي تولدت في مفهوم المساحة وحدة مقادير .

٢٢٣١٢ - قِطْعَة الفرس ، قَرَس صَبر Petit cheval (F).

Equuleus (E). قطعة الفرس او الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية المربع مركزها بالقرب من كوكبة الفرس الاظم || نجمة قطلة العدد منها اربعة مزدوجة ونجمان مثلثان . اشهرها « ثير قطعة الفرس » .

٢٢٣١٣ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

٢٢٣١٤ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

٢٢٣١٥ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

٢٢٣١٦ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

٢٢٣١٧ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

٢٢٣١٨ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

٢٢٣١٩ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

٢٢٣٢٠ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

٢٢٣٢١ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

٢٢٣٢٢ - قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت ، قَطَفَت

جمع الانواع . اما البرقة فانما تعيش على الثبات وتحت لواء الايجار حيث تقترن من تسطيع من حشرات ودوريات .

٢٢٢٩٧ - قَطَرَم Nepeta (S).

Népète, Cataire, Chataire (F).

جنس نباتات عشبية عطرية برية ممرسة من فصيلة الشفويات . انواعه نحو ١٥٥ معظمها المرفقي المنبت يكثر في البراري الرطبة . سيقانها مستقيمة فراءه . اوراقها متقابلة متنفقة يضيية الشكل ، نصلها سنب الحافة ، خلى الصفحة السفلى . ازهارها عتقدي التجميع . ازهارها فواصة العرف الاغاذ لونها الى الزرقه المتباينة المواج || اعرفها واشهرها ما يتبع .

٢٢٢٩٨ - قَطَرَم اهر * ، حشيشة الهرة ، قالدنج جبكي Nepeta cataria (S).

Népète cataire, Herbe aux chats (F). **Echtas Katzenkraut, Nept (D).** **Cataris comune, Erba gattaja, Gattala (I).**

نوع من القطرم المائل يعيش في المواق الرطبة . ساقه منتصبه فراءه تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه عطرية الرائحة ، زياء النصل . عتاقده لينة . ازهاره صتيرة القد ، يضاء اللون زرقاء المواج || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٢٩٩ - قَطَرَم بنفسجي * ، زهر مرثيم Nepeta mussini (S).

Cataire violet, C. de Mussini (F). **Violet catmint (E).** **Nepepflanze (D).** **Cataris violacea (I).**

نوع من القطرم . ساقه مسطحة تعلو نحو ٤٠ سم . فروعها منتصبه تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . جميعها خلية الماء ، طحلاء اللون . اوراقه يضيية الشكل ، قليلة القاعدية ، نصلها غشخ المس اعصر الصفحة العليا ، خلى السفلى الغراء اللون . عتاقده ازهاره رهلة . ازهاره بنفسجية . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٣٠٠ - قَطَرَم كبير الزهر Nepeta grandiflora (S).

Cataire à grandes fleurs (F).

نوع من القطرم ساقه منتصبه تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه كبيرة القد مزخفة النصل . عتاقده رهلة . ازهاره كبيرة زرقاء اللون فواصة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٣٠١ - قَطَرُوس Proteus anguinus (S).

Protée anguillard (F).

حيوان قارب وحيد الجنس والنوع من فصيلة القنطروسيات وريقة السرفويات . موطنه بعض اغوار يوفولايفه واعصها لحامسة || جسمه قرني الشكل ، رباعي القوائم ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . رأسه مبط الجرم ، شبه مخروطي الشكل . عيناه شديتا الصغر لذلك يبدو كأنه اكة . ثوبه الى الياض الوردي الباهت ، خصه الحشوية حراء اللون || قوته الكبدان والذويبات الصغيرة .

٢٢٣٠٢ - قَطَرُوسيات Protéides (S).

Protéides (F).

فصيلة حيوانات قاذية من الضفديات وريقة السرفويات وقفة مستقرات الخيلس . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة



قطرم اهر



قطرم بنفسجي



لطرؤف

٢٢٣١٤ - قُطُنْ، غُثْرَاف، جُثْنِي

Cueillage, Cuellalson (F). Gathering, Gathering-time (E).

هو اقتطاع الثمار من الأشجار وهو أيضاً لغرفان والقطاف والمرام وأجزاء في وقت القطف .

٢٢٣١٥ - قُطُنْ

Grappe (F). Bunch (E).

المنقود ساحة يقطف .

٢٢٣١٦ - قُطُنْ *

Commiphora kataf, Balsamodendron kataf (S). Baumi de Kataf (F). Balsam of Kataf (E). Katsf Myrrhenbaum (D). Balsamo di Katsf (I).

نوع من البلسان ينتمي إلى فصيلة البخوريات . يجثو بواسطة اللد راتنجية الصمارة يستخرج منها صمغ وادخان عطرية شائعة الاستعمال . انشابهاً متينة، صناعية .

٢٢٣١٧ - قُطُنْ

Arroche (F).

هو السمق ، أغلبه . الواحدة قطفة . ومنه الأايض والبحري .

٢٢٣١٨ - قُطُنْطُ

هو التوروم ، طائر يدخل في التمساح يأكل ما فيه من السم .

٢٢٣١٩ - قُطُنْطَة

صوت القطن .

٢٢٣٢٠ - قُطُنْ

Blanc éoc, Blanc estoc (F). Felling clear (E).

قطن غير الخرجية من اصلها قطناً كاملاً .

٢٢٣٢١ - قُطُنْب ، قُطُنْب ، بَجْ ، قَاتِل أَيْبَة

Arbutus (S). Arbousier (F). Arbutus (E).

جنس نباتات سرجية من فصيلة الالغنيات ، أنواعه عديدة منها الأشجار والشجيرات . سوقها منتصبه فراء . أوراقها بيضاء ، شبه بيضيه ، مستطيلة ، مسنة الحافة ؛ تصلها مائل البشرة ، لاصق الصفيحة العليا انفخراء اللون ، لحمل السفل . وأوراقها عله تصلح للبلانة لأنها غزيرة المادة الماصية . ازهارها جلجلية الشكل . ثمارها حنبيه نافقة وهي بطيئة النضج حاملة المذاق ، للبلدة الطعم || أشهر أنواعه ما يقع .

٢٢٣٢٢ - قُطُنْب شَالَع * ، عَصِير الدُّب ، جِيَاء أَخْمَر

Arbutus unedo (S).

Arbousier commun, Arbre aux fraises (F). Arbutus, Strawberry, Cane apple (E). Echter Erbeerbaum, Laudbeere (D). Albato, Corbezzolo, Brichello (I).

نوع من القُطُنْب للبلول في الأشجار البتانية . يجثو تملو من ٣ إلى ١٥ أمتار . ساقها وأغصانها حمر اللحاء . أوراقها متناقبة منقطة ، تصلها جامد الصفيحة للامعة المسنة الأطراف . ازهارها عثقية التجميع وردية اللون . ثمارها شكلية الشكل الارجوانية طولها نحو ٢ سم . لهايا ناشف المادّة .

٢٢٣٢٣ - قُطُنْب عُنْكَوِي

Arbutus andrachne (S). Arbousier paniculé (F).

نوع من القُطُنْب ، مهداه الشرق الأوسط . يجثو تملو من ١٢ م . ساقها وأغصانها جوية اللحاء . أوراقه بيضيه الشكل ، قلبية القاعدة ، جامدة النصل . ازهاره عثقوية التجميع . ازهاره شقيقة اللون . ثماره قرونية .

٢٢٣٢٤ - قُطُنْب مَنَزِيَس

Arbutus menziesi (S). Arbousier de Menzies (F).

نوع من القُطُنْب ، مهداه البلاد الأمريكية . يجثو تملو من ١٥ إلى ٣٠ م . أوراقها كبيرة القد . ازهارها عثقوية التجميع . ازهارها بيض . ثمارها وردية طولها نحو ٣ سم .

٢٢٣٢٥ - قُطُنْطَة ، مَلَاعِيَة *

Cattleya (S). Cattleya (E).

جنس نباتات سحلية من الجولليات . أنواعها المرسوة عديدة ، منها أمريكية الاستوائية || أوراقها مستطيلة النصل للمتساكنة المقعرة كالمخلاق ، نصلها جملة الخصار البحري . ازهارها كبيرة البتلات القفاشة الضمجة || تزدهج في الأماكن لكها تحشى البرد .

٢٢٣٢٦ - قُطْم

Orgasme (F). Orgasm (E).

حالة الشبق أي الانعاطاط المطلق التي تعقب التبع وتسبق الرجز .

٢٢٣٢٧ - قُطُنْطُور

Hille (F). Hilum (E).

هو الفتحة التي في الثمرة وهي نكتة يضاء مقورة الالتات .

٢٢٣٢٨ - قُطْمِيم

Tégmen, Tégumen (F). Tegument (E).

هو السبراء أي الرشح الباطني الذي يلفف البويضة والبزرة .

٢٢٣٢٩ - قُطْن

Croupion (F). Parson's nose (E).

هو منبت ذنب المائر راجع ذك . ج أفتان .

٢٢٣٣٠ - قُطْن ، حَكْو

Lombes (F). Lumbar (E).

٢٢٣٣١ - قُطْن * ، بَرَس ، طُوْط ، عُطْب ، كُرْسَف

Gossypium (S).

Cotonnier (F). Cotton plant (E). Baumwolle (D). Cotone (I).

جنس نباتات زراعية صناعية من فصيلة البازاريات . أنواعه عديدة منها شجرية مصورة تعيش عدة أعولم ومنها سولية تعيش بعض للشهور إلى أن تم دورتها الحياتية وتبيس .

تصريفه - القطن الزراعي ، يرسه حام ، يتصف بالتحلية التالية : جنبة فنوا ترتفع من ٨٠ إلى ٢٠٠٠ سم . تزكز على جث مستطيل تملو ساق ليفية ثم غشبية التركيب تنزع منها القطن واللائان || أوراقها معتقة كنية مقصعة براوح عدد قصوصها من ٣ إلى ٩ || ازهارها فردية ، كبيرة القد ، جرسية الشكل تزكز على مائل محورية . الزوايا ضبابية اعماها الاصفر والاحمر والأبيض . والزهرة كاملة التركيب ، عثقية ، خسانية القعالات والبتلات ، عديدة الاسدية والمقات . عذوها بحري من ثلاثة إلى خمسة مصاريع يتألف منها المبيض الثلاثي أو الخماسي اللؤلؤ || ثمارها ارجوانية اللون تسمى فزارة ثم كسج . والمأذنة يمد تكون زروها وريادتها التالية تنتزع عن ثلاثة أو خمسة أراج علوية بالتالي يعمل كل منها من خمس إلى عشر زور ونية الشكل سيد للفلان يمشاها الزغب اللاصق بها . لما نسبة التيل إلى الزور فسراها من ٢٦ إلى ٩٢ ٪ . والتيلة عله هي للمادة الصناعية الخام التي تصعب بد غزها ونسجها تلك الألفه القطنية المشهورة التي تبلغ نسبة استعمالها في العالم نحو ٧٠ ٪ . من حين أن سائر الألفه الأخرى من حريرية وصفية وغيرها لا يريده استعمالها من ٣٠ ٪ .



قُطُنْ



قُطُنْ شَالَع



قُطُنْ



قُطُنْ

تتصي إلى ثلاثة عناصر رئيسية هي الآزوت والفسفور والبوتاس . أفضلها لقطع تلك التي تركبها يشمل ما يحتاج إليه القطن دون نقص أو زيادة || ولما كانت الحاجة تختلف باختلاف مقتضيات التربة والنبات لذلك فلا بد من احتياذ صيغة وسطية يميزها التعميل وفقاً لحالة التربة والصيغة الفضل الممكن أحياناً تركب من ١/٢/١ أي واحد أزوت واثنين فسفور وواحد بوتاس . وقد يميز نحوها ما يزيد الآزوت من واحد إلى اثنين أو يتخفيض البوتاس من واحد إلى ثلاثة أرباع الواحد || أما الكمية اللازمة للدم الواحد فتراوح من ٧٥ إلى ١٠٠ كيلو.

حراثة - يجب أن تكون الأرض المعدة لزراعة القطن خالية من الأعشاب ، معتدلة الرطوبة ذات تربة ناعمة لا تلغ فيها ولا من || ولكي تأتي الحراثة بالنتيجة المنشودة يجب القيام بها في الأوقات المناسبة وفقاً لحالة التربة والموائل الجوية .

زراعة - من مستلزمات زراعة القطن العناية المستمرة والسرور الدائم . ومن الواجب أن تكون كثيفة لأن الكلفة تموت النسب وتتساق الشواثل والأوصام ونسب الملاصق الأجزاء والكناج .

مهمل الزراعة - ليس لزراعة القطن وقت معين كل من تقدمه أو جاوزه كان نصيبه الإخفاق . ولكن الزراعة في أي نوع كانت أوقات ملائمة لا يميز الأستثمار بها . بحيث أن القطن يتطلب الكثير من الحراثة فصول إلى كامل انتاجه ، وهو يخشى لمطار الحريف وسقيته . لذلك يحسن بذرهما باكراً للاستفادة من الأحوال الجوية الملائمة أطول مدة ممكنة . وأنسب وقت لبذرهما يراوح من ٢٠ آذار إلى ٢٠ نيسان || وأن يذر باكراً في العقد الأول من آذار وكانت زراعته تقراً لا بد من تعطفية البزور بالرمل منماً لتأسيك التربة

تحديد المسافات - لتحديد المسافات شروط عديدة أولاً الصرم المستحب ثم طريقة البذر أن آلية أو يدوية ثم حالة التربة وظرفها الخاصة ثم الاتساع ومواصله المناخية ثم الموقع والمعرض ثم نوع الزراعة أن مروية أو حدية || لذلك فالنسب المسافات تلك التي تراوح خطوطها من ٥٠ إلى ٧٠ سم . ولا تقل فسماتها البيئية في الخط الواحد من ٤٠ سم .

البذر - يبذر القطن إما نثراً أو لقطاً أو نثراً فالبذر نثراً لا يلائم أقاليم البلاد العربية ومواصلها الجوية وطرق دجا وظروف زراعتها || أما لقطه حل فرصة التلم أو بواسطة المبادئ الآلية فهو عملية شائعة مرسومة لكنها تستلزم الكثير من البذار وتستوجب عناية خاصة تامة قلما يقوم بها المزارع || أما طريقة البذر فليقرأ بسده التخطيط فهي الأسمن أعما يجب أن تكون البذر أن في فليج التلم أن كانت الزراعة يدوية أو في الربيع الأخير من سقمه إذا كانت الزراعة نصف مروية أو حل غارب التلم إذا كانت مروية || وكيفية كانت الطريقة المختمة فليقرأ من الانتباه الكلي لوضع البزرة في التربة في العمق المناسب لنباتها ونشروها لأن البزرة الصلبة تكثر الرطوبة عليها ويقل عنها الهواء ويقل فوقها الغطاء فتضيق من البذر . والبزرة الطائفة يحف عليها الغطاء ويكثر حولها الهواء ويحس عنها الرطوبة فيسبب بعد الاقتران لا تنبت أصلاً || أما البزرة التي صار طمرها حل العمق الأنسب وهو نحو ٤ سم . فإنها تكون في محيطها الطبيعي الواجب بميدة من تأثيرات العوامل الجوية الضخامة ومن الظروف التي تلتقطها والرطوبة الزائدة التي تهللكها .

تاريخه - من المؤرخين من قال أن القطن أنزل من التاريخ . ومنهم من يقول أنه قدم العهد غير أن قلمه لا يتعدى احتجاب الصور الفرعونية . والدليل حل ذلك عدم استعماله في أقطه القراصة بينما كانوا يستعملون الكتان والقنب || لكن صدقوا أو موهوا فالخريد والقرس معروفون واستعملوا وكذلك الكبر منذ أن استعملوا ما بين البحرين . والمرب هم الذين نقلوا إلى سورية قصب فاجزأر صقلية فالاندلس . وهم الذين عرفوا بجميع شروب شواطئ البحر المتوسط . فادخله الأوروبيون كالمهم الخضفة بلطفه العربي (قطن cotton) دون تحريف .

القيمة - ينمو القطن في جميع الأقاليم التي لا يقل متوسط حرارتها مدة نمو الحصري وأدراك ثماره من ١٨ أو ٢٠ درجة مع بشرط أن لا تكون فوارق الحرارتين القصوى وأدراك كبره ونباتية . وهو يخشى الصقيح في نيسان وأيار وهما الحريف الجارد المساطر . وكل زراعة تخرج من نطاق هذه القنوس المناسبة تعتبر من المغامرات الخطرة هذا أن لم يتوصل العلم إلى الآتي القريب إلى استنباط هماغ جديدة سريعة النمو الحصري والدرة الحياتية تفوق بتكثيرها وأدراكها الإسراع المعروفة حالياً .

زهره - يميز القطن في الآرية الطبيعية الرملية والرمالية الطبيعية التي لا تقتصر إلى الكلس والتي يربو غورها من ١٠٠ سم . لأن نمو جهور القطن ونشروته يلتصق هذا القاع || وقد تلازمه أيضاً كل تربة عميقة الغور قليلة الانتساج بشرط أن لا تنفذ منها الرطوبة بسرعة || وصحت أنه من النباتات المفروضة فيها سرعة النمو والأدراك ، لا يستحسن زهره في الآرية المنجعة المتأسكة خوفاً من تأخير نموه واستطالة دورته الحياتية || أما الأراضي الرملية والقلبية التي لا تحتفظ برطوبة الري أكثر من ستة أيام فلها لا تصلح أبداً لزراعة القطن وكذلك الآرية الكثيرة المحصى لأن المحصى تمتع التربة من استيعاب كامل مغنوها من الحرارة القصوى .

لسموده - يميز القطن من النباتات القشرة التي تميزه التربة وتسننن خواصها . فتكرار زراعته في التربة حينها يفقد هذه التربة جزءاً من عناصرها الأولية والثانوية . لذلك لا بد من البحث عن أنجح طرق الإخصاب وإتباع أفضلها حفاظاً حل التربة وزراعتها || وحيث أن الدورة الزراعية والتسميد هما المبدأان الأساسيان للذات يرتكز عليهما محور الحسب . فنقول في الدورة الزراعية أنها ضرورية جداً بشرط أن لا تكون ثنائية لأنها تصبح قليلة الفائدة . أما الدورة الثلاثية التي تلجج التربة في الوقت اللازم لتعزير نشاط جراثيمها وتجنبه بعض ما فقدته من العناصر . فلها أصلح الدورات || أما التسميد فليأخذ منه إعادة العناصر التي صدرتها التربة مع حاصلها فهو حل شكلي منضوي ومعنى .

١ - الأسمدة العضوية : الأسمدة العضوية أشهر من أن تعرف وهي شائعة الاستعمال أهمها غني البقر والجواميس فربط الحيل وصائر الدواب فيبر اللحم والماغز || وألحى الذي يصير من الأسمدة الباردة يستعمل في الآرية القليلة الانتساج لأنه يخفف من مقدار استيعابها الحرارة ويقوي فيها خاصة الانتساج وينشط حل الجراثيم المفيدة فريسي . البيئة النهائية للآرية الحسب فضلاً عما يتكره من غذاء متعصر النبات || أما الروث فيستعمل في الآرية المنتجة لأنه يعدها بحراثة ويخفف من انتساجها ورطوبتها بعد أن يمينا حل القيام بجميع أعمالها الجوفية والكليوية .

ب - الأسمدة المعدنية : الأسمدة المعدنية كما هو معروف

تربيه - تظهر عادة بوادر القطن بعد القطف أو التفرع بنحو عشرة أيام. ويصار إلى التفرع بعد ظهور البوادر بيوين ولا يجوز تأخير هذه العملية خوفاً من اتساع فارق النمو بين النباتات الأولى ونباتات التفرع فتأتي هذه الأخيرة متخلفة ضعيفة وقد لا تسلم من شر الحشرات والأمراض. عطف - الخلف أو التقدير عملية لا بد منها من أجل تزامن النبات مع الغذاء وتشكيلها لانتاج. وقد تم على مرحلتين في الأول يقلع بعد ظهور البوادر بنحو ٢٥ يوماً ينتزع من النقرة كل ما هو ضعيف ويزيد من التلاتة. وفي المرحلة الثانية وذلك بعد الأولى بمسرة أيام تنتزع النباتات الضعوى ولا يترك في النقرة الواحدة إلا نبات واحد || ولا يجوز تأخير الخلف عن الزمن الممنوع خوفاً من النباتات المنافسة من الضعف والسقم || وإذا كانت الزراعة لقطيعاً فلا موجب لخلفها على مرتين بل يباشر تغريدها منسداً يراوح ارتفاع نباتاتها من ١٢ إلى ١٥ سم. وه - ليس لري موانيد مقررة ثابتة لانه مرتبط بمحالة جفاف التربة والجفاف يبين عليه شئ العوامل الجوية من رياح وسراة ويتغير وطوبى جوية نسبية وضج ووضاء... ومن المستحسن ري القطن بمسدة يده بنحو ٢٥ يوماً إلا في حالة التفرع || وقد يتطلب القطن مبدئياً ثلثي ريات. التربة الأولى بعد البذر بنحو ٣٠ يوماً ومن ثم كل أسبوعين مرة حتى أواسط شهر آب حيث يجب تثبيت الري خوفاً من تجفيف التربة الضعوى الذي يؤثر الإدراك ويعرض للتوالي الحديثة إلى شك الندية التفرغلية التي تكثر في هذه الأونة || أما إذا كانت الزراعة بحاجبة مائة إلى الماد ولا خوف عليها من الندوة التفرغلية فلا مانع من دحها من جديد.

٢ - معاد الجني : يستمر الجني عادة من اواخر آب إلى اواخر تشرين الأول وهو منوط بمعدل كمية وموسمية تسير عليها عناصر المناخ || وفي سبيل التذكير نقول انه لا يجوز أبداً جني الكتان قبل أسوداد زهورها لان الاطكان التي يتخللها بذر اخر يمن عن علم اكثال نضجها لا يمكن اعتبارها من الاصناف الجيدة العائدة الشوفاً. ٣ - طرق الجني : يعني القطن أما باليد أو آلياً بواسطة القطارات. لذلك طرقت فيه تختلف مع البلاد المنتجة لانها منوطه بإمكانات اليد العاملة وسهولة النقل والجمع والحفظ.

١ - طريقة الجني الشامل. أنها لا شك أهم الطرق استعمالاً في البلاد العربية، تقوم على ترك القطن حتى اكثال نضج جميع ثمارها فيصار إذا ذلك إلى جني وجمع كل ما تقطع من الكتانجيا وسقط ما على الأرض فتضل إلى مكان الفرز حيث تنظف من الشفوف والأوراق والفصوص المبرومة. جوب هذه الطريقة مهيئة لان كثرة تغليب القطن في أثناء مختلف عمليات الفرز لانواع الفصوص المبرومة والشفوف والأوراق بسبب التفتت الفصوص الجيدة وتقلوها بجرائل الفص الاسود المزجج في الفصوص المبرومة تنسقط من ذلك رتبة القطن فيفسد معه وتقل اتانوته.

ب - طريقة الجني المتتابع - قوامها جني الكتانجيا تماماً. وهي عملية موفقة تزيد من وزن الحصول لأنها تمتد التيلة من أشعة الشمس اللاذنة ومن مداخل السدى والندى المبردة فتصطفها من انحطاط صفحتها الرئيسية. اللون والرائحة، وتحمل دون سقط الكتانجيا على الأرض. ج - طريقة الجني الآلي - عملية اقتصادية تقوم بها القطارات الآلية لكنها تقع بالمخاطر عنها إذا ذكرناها في طريقة الجني الشامل.

د - جمع القطن وفرزه : يجمع القطن بعد جنيه في المكان المده لفرزه وهذا المكان قد يكون أما ثابتاً ويده المستودع أو نقلاً ويده المحطة. والمحلة كالمتدج يجب ان تكون نظيفة مفرقة بالخشيش من أن تلوث القطن بشئ الاقذار. يتبنى عملية الفرز حدة وصول القطن إلى المحطة إلا اذا كان القطن من جني الصالح للبارك ولا يزال رطباً من الندى فمتحداً يقتضي نشره بعض البث ردياً بحيث تم يفرز || يفرز القطن عادة اما بالأيدي أو بواسطة.

تربيه - تظهر عادة بوادر القطن بعد القطف أو التفرع بنحو عشرة أيام. ويصار إلى التفرع بعد ظهور البوادر بيوين ولا يجوز تأخير هذه العملية خوفاً من اتساع فارق النمو بين النباتات الأولى ونباتات التفرع فتأتي هذه الأخيرة متخلفة ضعيفة وقد لا تسلم من شر الحشرات والأمراض.

عطف - الخلف أو التقدير عملية لا بد منها من أجل تزامن النبات مع الغذاء وتشكيلها لانتاج. وقد تم على مرحلتين في الأول يقلع بعد ظهور البوادر بنحو ٢٥ يوماً ينتزع من النقرة كل ما هو ضعيف ويزيد من التلاتة. وفي المرحلة الثانية وذلك بعد الأولى بمسرة أيام تنتزع النباتات الضعوى ولا يترك في النقرة الواحدة إلا نبات واحد || ولا يجوز تأخير الخلف عن الزمن الممنوع خوفاً من النباتات المنافسة من الضعف والسقم || وإذا كانت الزراعة لقطيعاً فلا موجب لخلفها على مرتين بل يباشر تغريدها منسداً يراوح ارتفاع نباتاتها من ١٢ إلى ١٥ سم. وه - ليس لري موانيد مقررة ثابتة لانه مرتبط بمحالة جفاف التربة والجفاف يبين عليه شئ العوامل الجوية من رياح وسراة ويتغير وطوبى جوية نسبية وضج ووضاء... ومن المستحسن ري القطن بمسدة يده بنحو ٢٥ يوماً إلا في حالة التفرع || وقد يتطلب القطن مبدئياً ثلثي ريات. التربة الأولى بعد البذر بنحو ٣٠ يوماً ومن ثم كل أسبوعين مرة حتى أواسط شهر آب حيث يجب تثبيت الري خوفاً من تجفيف التربة الضعوى الذي يؤثر الإدراك ويعرض للتوالي الحديثة إلى شك الندية التفرغلية التي تكثر في هذه الأونة || أما إذا كانت الزراعة بحاجبة مائة إلى الماد ولا خوف عليها من الندوة التفرغلية فلا مانع من دحها من جديد.

عطف - ان كانت رطوبة التربة تحجب النباتات فمزق التربة الذي يظفها من الاعشاب الضارة ويحافظ على رطوبتها عمل واجب جليل النفع || يمزق القطن عادة كل ثلاث مرات. المزة الأولى بعد الخلف وتقل الريا التانية. من الضروري ان تكون سطحية، ملائمة ما يمكن، خوفاً من اقتلاع النباتات الفتية أو قطع شروشها الدقيقة || والمزة الثانية تم عادة بعد التربة الرابعة. الغاية منها اقتلاع الاعشاب الضارة وتفكيك التربة وتهيئتها وتصلحها لخطوط ويجاري الماد وتضيق النباتات اذا كان ذلك واجباً || اما المزة الثالثة المبرقة بالسقم فنورها يأتي بعد التربة السادسة. قوامها ركش التربة لتجديد عزم الجرائم المنافسة ثم كمن النبات وضعفه بالقرب ليقوى على استحالة مصف الرياح || وإذا كانت الزراعة حدة فن الواجب ايضاً عطفها وكهها في الاوقات التالية : يباشر بالمزة الأولى بعد الخلف بأسبوع وليس أكثر خوفاً من ان تفتقد التربة الكثير من رطوبتها. ومن الأفضل ان تكون هذه المزة سطحية || اما المزة الثانية والتصفين فيباشران بعد المزة الأولى بنحو ثلاثين يوماً ومن الواجب ان يكون المرق حقيقاً لتصرفه كل ما أمكن من الناييب استملااب الرطوبة.

جنيه - ١ - معلومات عامة : القطن كما ذكرنا جنية فناء يستمر ازهارها نحو ثلاثة اشهر. وهي تبشر حدة استملاابها نحو ٢٠٠٠ مسرة وقد يتم ذلك في غضون ثلاثة اشهر. ومن التغير إلى اكثال البرصة الزهرية وانلاجها عن زهرة كاملة نحو ٥٥٠ مسرة التي يمكن الحصول عليها بمدة ٢٥ يوماً. وتستمر الزهرة نضرة زاهية نحو ٤٨ ساعة إلى ان يتم تأيرها فيحمر لونها وتبدل بضع ساعات

٢٢٣٣٨ - قُطْن مُشَجَّر

Gossypium arboreum (S). *Cotonnier en arbre* (F). *Tree cotton* (E). *Baumwollbaum* (D). *Cotone arbusto*, *C. dipietra* (I).

نوع من القطن المعمّنة الهند. شجرته تعلو من ٤ الى ٦ أمتار. أوراقه ثلاثية أو خاسية التفصيص. ساقها قليلة القاعدة، خالية الصلابة السفلى. كنانته كبيرة القد، قصيرة التيلة، ناعمة اليباس، محدودة الاستعمال الصناعي.

٢٢٣٣٩ - قُطْنَجِيَّة ٥
Ampelis (S). *Cotinga* (F). *Cotinga* (E).

جنس طير من فصيلة القطنجيات ورتبة الجوارثم سنيات التأثير. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها غابات ومنتقع أمريكا الوسطى والجنوبية. أجسامها صغيرة القد تطول من ١٤ الى ١٨ سم. ألوانها ساطعة الألوان الجميلة. مناقيدها صغيرة مستعرضة القواعد. قوتها البار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل. أشهر أنواعها القطنجية الزرقاء القلادة.

٢٢٣٤٠ - قُطْنَجِيَّة زُرْقَاءُ القِلَادَةِ ٥
Ampelis cincta (S). *Cotinga cordon-bleu* (F).

طائر من القطنجية. موطنها بعض مناطق أمريكا الجنوبية. تألف الغابات والحدائق القريبة من الأماكن الأكلة. جسمها صغير، معتدل الرقعة يطول نحو ١٦ سم. ثوبها العلوي الى الزرقاء البحرية السفاه المروج. ثوبها السفلي الى الخضار البنفسجي المروج تملوه في الصدر قلادة من لون الظهر يطوقها الأحمر. علاطها مشيرة بالأحمر. رأسها وأطراف جناحها وذنبها موشة بالأسود الاسف. طيراتها غريفة الحركة طويل الشوط. قوتها البار البانمة والخشرات الصغيرة والنمل. تدنن عشها في شكل كبر فناء قليلة الارتفاع. الاثنى تقص من ٤ الى ٥ يبيات حل مرتين في الحول. التزويج يستمر نحو ١٥ يوماً تقوم به الاثنى بتأدية الذكر.

٢٢٣٤١ - قُطْنَجِيَّات ٥
Cotingidae (S). *Cotingidae, Ampelidae* (F). *Cotingidae* (E).

فصيلة طير من الجوارثم سنيات التأثير. اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة. موطنها القارة الامريكية اخصها أمريكا الجنوبية والوسطى. تألف غابات المناطق الحارة، ملجأها الحارثي زوجي باستثناء بعض الانواع الجابية. اجسامها متوسطة القد أو كبيرة. تميز برسابة اشدقها وبالوانها الجميلة الألوان السفاه اللمعة. أعرف اجناسها وأشهرها القطنجية والطرقسب.

٢٢٣٤٢ - قُطْنِيّ، حَقْوَرِيّ
Lombaire (F). *Lombar* (E).

٢٢٣٤٣ - قُطْبُوب ٥
Catops (S). *Catops* (F). *Catops* (E).

جنس حشرات من فصيلة القظويبات ورتبة غديات الاجنحة. أنواعه المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد المعتدلة الحارة والمعتدلة نحو الباردة. اجسامها صغيرة القد، اهليجية الشكل، تطول من ٤ الى ٨ سم. رؤوسها مستعرضة. عيونها صغيرة، مائحة. تأثيرها ولكونها نظامية. ملامها مستطيلة. قوتها الاستغارة غطية. كواشها مستعرضة. عذبة. اغمارها عذدة، لاسفة، قوتها مستطيلة. ألوانها تراوح

الفرزات أو الترابيل الفارزة وعلى حال الفرز ان يقتربوا جيداً لتفانقة القطن وتختلف مراتبه لانها اساس لشترى وطلي التحويل. وبعد فرز القطن وتقسيمه الى الرتب والدرجات المطلوبة يصار الى تميته ضمن اكياس خاصة نظيفة ثم ينقل الى حابر المالح حيث يفرز من جديد قبل تقديمه الى الماكنت الحالجة التي تفصل التيلة عن البذور.

٢٢٣٣٢ - قُطْن آزَب، قُطْن امريكي

Gossypium hirsutum (S). *Cotonnier américain*, *Coton à courte soie*, *C. velu* (F). *Upland cotton plant* (E). *Amerikanische Baumwolle*, *Kurze Baumwolle* (D). *Coton peloso* (I).

نوع من القطن الأمريكي المنت. ساقه وقبره وأوراقه مزينة. ضروبه واسرامه وهالجه كثيرة العدد معظمها زراعي وافر الانتاج الجيد. تيلة متوسطة القد مشكوة الصنف.

٢٢٣٣٣ - قُطْن البَرْبَادَةِ، قُطْن مِصْرِيّ، قُطْن جَزِيرَةِ الْبَحْرِ

Gossypium barbadense (S). *Cotonnier égyptien*, *Coton à longue soie*, *C. d'Egypte* (F). *Egyptian cotton*, *Sea Island cotton* (E). *Ägyptische Wollpflanze* (D). *Cotone egiziano* (I).

نوع من القطن الشرقي تيلة في مصر واتصف بمخاض بيزة منها استمالة التيلة واستمالة الثورة الحياتية وكثرة الانتاج. ضروبه واسرامه وهالجه عديدة لكنها محدودة الانتشار نظراً لطول مدة بقائها في التربة.

٢٢٣٣٤ - قُطْن البيرو
Gossypium peruvianum (S). *Cotonnier péruvien* (F). *Peruvian cotton plant* (E). *Peruvian Baumwolle* (D). *Cotone peruviano* (I).

نوع من القطن، متوسط التيلة جيد الانتاج، مهد أمريكا الجنوبية. ضروبه واسرامه عديدة معظمها وافر الانتاج لكنه مستطيل الثورة الحياتية.

٢٢٣٣٥ - قُطْن الهند
Gossypium indicum (S). *Cotonnier indien*, *Indian cotton plant* (E). *Indische Baumwolle* (D). *Cotone indiano* (I).

نوع من القطن الزراعي الجيد الانتاج المتوسط الثورة الحياتية. اسرامه عديدة منها الهند والهند الصينية.

٢٢٣٣٦ - قُطْن حَشِيشِيّ، قُطْن الشَّرْقِيّ، قُطْن مُلْتَبَك
Gossypium herbaceum (S). *Cotonnier d'Asie* (F). *Levant cotton plant* (E). *Kurze Georgia Baumwolle* (D). *Cotone erbacea*, *C. annua*, *Bambagia* (I).

نوع من القطن الشرقي الناعم الصنف القليل الانتاج. كنانته كبيرة القد قليلة العدد. تيلة مستطيلة ناعمة وتينة. ضروبه واسرامه لا تحصى لانه دخل في تهجين معن اقلان العالم اخصها الاقلان المصرية والامريكية.

٢٢٣٣٧ - قُطْن شَرَقِيّ
Gossypium obtusifolium (S). *Cotonnier oriental* (F). *Oriental cotton plant* (E). *Nanking Baumwolle* (D). *Cotone orientale* (I).

نوع من القطن الصناعي المعتدل الانتاج والجودة. مهد البلاد الاميرية تكثر زراعته في الصين والنام، تيلة متوسطة القد يضاء اللون.



قطنجية زرقاء القلادة



قطروب

٨٠ الى ١٠٠ سم. هيئتها هريية الشكل. اوراقها ثلاثية الالوان الزياضية. ازهارها سنبلية التجميع متبلي الاطراف.

٢٢٣٥٣ - نُطُيَّة جَسِيَّة * ، دَلَق ، رُغَاف

Amarantus retroflexus (S). *Amarante réfléchi* (F). *Wild beet* (E). *Gömeseamarant* (D). *Fior bellosa* (I). نوع من النطيفة الزريرية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. هيئتها هريية الشكل. اوراقها ملونة. ازهارها عنقودية التجميع متبلي الطرف. ازهارها الى الى الحرة المخلطة الملاج.

٢٢٣٥٤ - نُطُيَّة حَسْبِيَّة * ، نُطُيَّة ذَيْل النَّعْتَب ، نُطُور الجَنْدِي

Amarantus caudatus (S). *Amarante d'Abyssinie*, *A. queue de renard*, *Discipline de religieuse* (F). *Lova-les-bleeding*, *Prince's feather* (E). *Fuchschwanz*, *Floramour* (D). *Amaranto codato*, *Blito maggiore*, *Stuffle* (I).

نوع من النطيفة الزريرية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متبارجة الالوان المابقة. ازهارها عنقودية التجميع، متبلي القد، شديد التحسين والالتواء.

٢٢٣٥٥ - نُطُيَّة حَضْرَاء ، شَدَح هِنْدِي

Amarantus oleraceus (S). *Amarante oléracée*, *Brède de l'Inde* (F). *Edible amaranth*, *Pot amaranth* (E). *Kohlamarant* (D). *Amaranto oleraceo*, *Spinacio marrone* (I).

نوع من النطيفة الزريرية. ساقها منتصبه تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها زاهية الخضار الجليل. ازهارها عنقودية التجميع، مردني الشكل، محين الطرف، ازهارها فستقية اللون، اربواية الملاج.

٢٢٣٥٦ - نُطُيَّة بَالَعَاء ، شَدَح ، بَلَعَاء عَرَبِيَّة

Amarantus blitum (S). *Amarante blette*, *A. sauvage* (F). *Blite*, *Wild amaranth* (E). *Gemeiner Erdmarant* (D). *Amaranto salvatico*, *Bledire*, *Blito* (I). نوع من النطيفة الزريرية البقية. ساقها منتصبه تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها كبيرة القد مأكولة. ازهارها عنقودية التجميع، هريي الشكل.

٢٢٣٥٧ - نُطُيَّات

Amarantaceae (S). *Amarantacées* (F). *Amarantaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، اجناسها وانواعها قليلة المدد معظمها عشبي وبعضها جنبي. ساقها لينة. اوراقها بسيطة متعاقبة. ازهارها لاقحاسي التجميع والارتكاز. ازهارها غنظوية او وسيدة او ثنائية المسكن. اكثر نباتاتها برية صلبة لائمة تغذي للمعدة والامعاء.

٢٢٣٥٨ - نُطُيَّة * ، *Polysandre* (F). *Polyandrous* (E).

نطيفة من الاثبات من تزواج اكثر من ذكر. والنظم من النبات من كانت ازهارها كثيرة الاسدية.

٢٢٣٥٩ - نُطُيَّة * ، *Eriocrania* (S).

Eriocranie (F). *Eriocrania* (E). حشرة من فصيلة النطيفيات ورقية غشائيات الاجنحة. اصطناعها فسيحة الاربعاء تشغل معظم مناطق البلاد المجدلة الحارة || جسمها صغير، نحيل، مردني الشكل. بسطنها نحو ١٤ م. راسها مغطى الجرم. صيغتها صغرتان، باروتان. خطها ولسانها شديدة القصر. زباناها

من الخططي الاسمر المواج الى الاسود || تعيش في المزاب والدردي البتاني.

٢٢٣٥٤ - نُطُورِيَّات * ، *Catopides* (S).

Catopides (F). *Catopides* (E). فصيلة حشرات من لمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اطراف العالم واصعبها المناطق الباردة والمجدلة الحارة || اجسامها صغيرة، احليجية، تطلو من ٣ الى ٨ م. رؤوسها شبه مكدرة. هيئتها صغيرة، بارزة. تكاثرها وفكرها نظامية. قرونها الاستعمارية شيطانية، متبلي الاطراف، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محبة. المجدلة لاحقة، قرونها نشطة || تعيش في المزاب والدردي ويحاصر الثدييات الصغيرة واكثر الطير وعشاشها || اشهر اجناسها القطررب.

٢٢٣٥٥ - نُطُورَاء ، *Cotula* (S). *Cotula* (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة المركبات انواعها عديدة اصطناعها البلاد الحارة والمجدلة. سطفا متبلي او مسطحة، اوراقها مفصصة او مفرقة. نصلها خلية البشرة بمعمرة اللند. ازهارها رؤسية فردية صغيرة اللند صفراء اللون. زورها نجيله متبلي عادية الجناح والافرة.

٢٢٣٥٦ - نُطُورُش ، *Nonette de Calcutta* (F).

طائر من النساقي الصغيرة يدعى دسوم مكبر، اطلبه.

٢٢٣٥٧ - نُطُيَّة ، *Astragalus drusorum* (S).

هو الاسطرغالوس الدرزي، اطلبه.

٢٢٣٥٨ - نُطُيَّع ، *Troupeau* (F).

Flock, *Herd*, *Drove* (E).

الطائفة من النعم كالابل والبقر والتم. ج قطاع وقطعان.

٢٢٣٥٩ - نُطُيَّة ، اُمْلَاك ، *Domaine* (F).

Domain, *Property* (E).

اراض زراعية واسعة يملكها شخص واحد.

٢٢٣٥٠ - نُطُيَّة ، سَالَف العَرُوس ، *Amarantus* (S). *Amarante* (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزريرية من فصيلة النطيفيات. انواعها عديدة. ساقها منتصبه. اوراقها بسيطة متعاقبة. ازهارها صغيرة القد، لا قياسية التجميع. احرف افواها واشهرها ما يتبع.

٢٢٣٥١ - نُطُيَّة بَسْفَاء ، *Amarantus albus* (S).

Amarante blanche, *Fleur de jalousie* (F). *White cockscomb*, *Tumbleweed* (E). *Waisee Amarant* (D). *Amaranto alba*, *Erba di gelosia* (I).

نوع من النطيفة الزريرية. ساقها منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها شديدة الخضار القاتم. ازهارها عنقودية التجميع. ازهارها بيض. عنقوكها متبلي الشكل محين.

٢٢٣٥٢ - نُطُيَّة لَلَايَةِ الْاَلْوَان ، دِجَّة الْاَمِير

Amarantus tricolor (S).

Amarante tricolore (F). *Amaranth*, *Joseph's coat* (E). *Fuchschwanz*, *Tricolor* (D). *Amaranto a tre colori*, *Pappaglio* (I).

نوع من النطيفة الزريرية. ساقها منتصبه تملو من



نطيفة جبيلة



نطيفة حبشية



نطيفة



لعل



تعبول



قشبان أزرق



قشبان مسجس

خبطيان . اجتمعتها خبطة . مستعرضة القليل المحاري .
كوسلها ويطبخا كثيرا الخمل اللينق الناعم . ثوبها الى
السرة || الاثني اميز قعداً من الذكر وابت ثوباً منه ||
السرة لائحة تبيض حل وثن النصال . تركب الكثير من
النبات اخضاه البندق والستيان .

٢٢٣٦٠ - فُطَيَّيَات * Eriocranidae (S).

Eriocranidae (S). Eriocranidae (S).
فضيلة حشرات من رتبة حشرليات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد ، نحو ٣٥ منتشرة في معظم
الاستقام المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واوروبا وامريكا ||
اجناسها صغيرة ، نحيلة . رؤوسها مستعرضة ، حيرتها
بارزة . اعطاشها وملابسها شديدة القصر . قرونها
الاستقامية عجيبة . اجتمعتها خبطة ، شبه سنائية الشكل
مهيئة الخمار . بطونها وشية الشكل ، متكاثفة الخمل .
الاثواب ملونة || اساربها دقيقة ، عادمة الراجب ،
تلف الاوراق وتعيش في وثن النصال || اشهر اجناسها
القطعة .

٢٢٣٦١ - قَعَد Cuvrir (F).

To couple with , To serve (E).
قما القمل الاثني وقما عليها : اصل نفسه عليها .

٢٢٣٦٢ - قَعَاد Immobilité (F). Immobility (E).

داه يصيب الخمل فيقتضاه عن العمل اذ يجمل بعض
حركاتها متدراً احياناً . وقد يصير من الصوب المبطلة
لبيع .

٢٢٣٦٣ - قَعَاص ، قَعَاث Clavelée (F).

هو جديري القدان ، اطلبه .

٢٢٣٦٤ - قَعَاعَة Saunage (F). Salt-making (E).

التعامة استخلاص الملح من مياه البحر ، وتصنيع الملح
وللتجارة به .

٢٢٣٦٥ - قَعَاعِي Halophyte

هو النبات الذي ينمو في الارربة للملحية او التي تنقص
لتأثير المياه للملحية .

٢٢٣٦٦ - قَعَالَة Pétale (F).

هي البتلة ، اطلبا .

٢٢٣٦٧ - قَعَالِب ، قَعْتَب Renard mille (F).

هو الثعلب الأكبر He fox (E).

٢٢٣٦٨ - قَعْبَارُون هو السلي الاسود ، اطلبه .

٢٢٣٦٩ - قَعْبِيل * Actinomma (F).

Actinomma (E).

جنس شعاعيات بحرية تتميز ببيكلها الصواني التركيب
المثلث من ثلاث كرات شبكية الشكل متلاحقة ترتكز
على مناسخ شعاعية مخروطية تجمع بين الكرات || انواعها
عديدة يكثر ويوجدوا في البحر الابيض المتوسط .

٢٢٣٧٠ - قَعْبُول * (زهرة الولول الافريقية)

Dimorphotheca (S). Dimorphothèque (F). African
orange daisy (E). Kagenblume, Kapkürbchen (D).

Dimorphotheca (S). Dimorphothèque (F). African
orange daisy (E). Kagenblume, Kapkürbchen (D).

Dimorphotheca (S). Dimorphothèque (F). African
orange daisy (E). Kagenblume, Kapkürbchen (D).

Dimorphotheca (S). Dimorphothèque (F). African
orange daisy (E). Kagenblume, Kapkürbchen (D).

Dimorphotheca (S). Dimorphothèque (F). African
orange daisy (E). Kagenblume, Kapkürbchen (D).

Dimorphotheca (S). Dimorphothèque (F). African
orange daisy (E). Kagenblume, Kapkürbchen (D).

منها البرية التي تنابت الكماء في الربيع تجي يبيضها قشوي
وتطبخ فتفكر . ومنها الزيبية الشائعة الاستعمال || سفيها
فراءه ، اوراقها متعاقبة ، رؤوسها الزهرية كبيرة القد
مستعرضة . بذورها غريزية الشكل ، ثنائية الجناح ، عادمة
الاغرة || اشهر انواعها الزيبية ما يلي .

٢٢٣٧١ - قَعْبُول المطر

Dimorphotheca pluvialis (S). Dimorphothèque
pluviale, Souci pluvial, Souci hygrométrique (F).
لوع من القبول الزيبية الخولي . ساقه منتصب كثيرة
الفرع تمل نحو ٤٥ سم . اوراقه سنائية الشكل ، مصنفة
الخافة ؛ نصليا خلي البشرة دبق اللمس . رؤوسها الزهرية
كبيرة القد قطرها نحو ٦ سم . طبها اصفر اللون ، لسانها
بيض الصفعة العليا حر السفل . تتليج وزهر في النهار
من الساعة السابعة صباحاً الى الخامسة بعد الظهر وتتكشف
في الليل وفي الايام الماطرة || ازهاره يستمر من تموز
الى آب .

٢٢٣٧٢ - قَعْبُول برنقالي

Dimorphotheca surantiaca (S). Dimorphothèque
orangée (F).

نوع من القبول الزيبية . ساقه منتصب فراءه تمل من
٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقه السفلى كبيرة القد مقطوعة
الاطراف قليلة الزغب . اوراقه العليا سنائية صغيرة .
رؤوسها الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم . طبها
اصفر اللون ، لسانها برنقالية || ازهاره يستمر طوال
فصل الربيع .

٢٢٣٧٣ - قَعْبَانِ اَزْرَق * ، قَعْبَانِ بَنَفْسَجِي * Xylocopa violacea (S). Xylocope violet, Abeille

charpentière (F).

حشرة عاشية من فصيلة القشبانيات قريبة الشبه من النحل
طولها يراوح من ٢٥ الى ٣٥ م . لونها الى الزرقة يطلها
مواج اسود || تشيد خلياتها في الاغشاب التي تحفرها وقد
شاهدناها مراراً في غشب اليمون المصنوع واللايزنت
والزان .

٢٢٣٧٤ - قَعْبَانِ مُسَجَس * ، قَعْبَانِ مسجس * Xylocopa aestuans (S).

Xylocopa agité (F).

حشرة عاشية من القشبانيات طولها نحو ٢٢ م . تركب
الاغشاب المصنوعة والاعمدة تصفرها وتشيد فيها خلياتها .
الاثني اكبر قعداً من الذكر ، ثوبها الى السرة السوداء
يطلها مواج ازرق . جوشها كثيف الحلب اصفر اللون .
الذكر صغير القد اصفر اللون اخضر المواج . اجتمعت
معدلة الطول عاقبة الزرة السراء .

٢٢٣٧٥ - قَعْبَانِيَّات * Xylocopidae (S).

Xylocopidae (F). Xylocopidae (E).

فصيلة حشرات عاشية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها عديدة معظمها متوسط القد قريب الشبه من النحل .
اجناسها بكثافة الحلب . بطونها غليظة . تكثرها قوية
مدية تحكها من ثقب وغفر الاغشاب اليابسة اخضاه
المصنوعة والاعمدة تصفر فيها الانفاق المستطيلة والسراريب
المنزوعة .

٢٢٣٧٦ - قَعَد

القعد : النخل الصنار . وقعدت النسيلة وهي قاعد :

٢٢٣٨٧ - قُفَّاعُ الْإِجَامِ * ، زَمَّارُ الرَّمْلِ

Actitis hypoleucos (S). Guignette vulgaire (F).
طائر من القُفَّاع طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه إلى السمره
الزيتونية يعلوه موج جزوي وبقعة سوداء. بطنه أبيض.
صدره موشع بالأسود. منقاره رمادي. سيقله إلى الحصار
الزيتوني || أقليمه فسيح الإرياض يحيط البلاد الاسبورية
والأروبية والأفريقية. يرتاد النالغ وصفات المياه العذبة
ورمال أخوا الأثر.



نقش

٢٢٣٨٨ - قُفَّاعُ مُلْطَحِ

Actitis macularia (S).
Guignette griselee (F).
طائر من القُفَّاع طوله نحو ١٨ سم. أقليمه البلاد
الامريكية. يتصف بميزات وإخلاق وصفات قُفَّاع
الاجام. ثوبه أقل سمره وبقعة. منقاره الحبل اللون. سيقله
رمادية.

٢٢٣٨٩ - قُفَّاعَةُ
Cry du faucon (F).
صوت الصقر.

٢٢٣٩٠ - قُفَّاعُ صَرْبِ مِنَ الْكَلْبَةِ .

٢٢٣٩١ - قُفَّاعَةُ
ج. قس .٢٢٣٩٢ - قُفَّاعُ
للشاة التي تمنع البدة .

٢٢٣٩٣ - قُفَّاعُ

القعيد : الجراد اذا لم يستر جناحاه بعد .

٢٢٣٩٤ - قُفَّاعَةُ
Perdrix chukar (F).

هي الحجل الشقر ، اطلبه .

٢٢٣٩٥ - قُفَّاعُ
Bouquin (F). Buck-rabbit (E).

هو الخنزير اي الارنب الذكر .

٢٢٣٩٦ - قُفَّاعُ
Monticule (F). Hillcock, Knoll (E).

القف ج . قفّاف وأقاف : ما ارتفع من الارض دون
الغضبة .

٢٢٣٩٧ - قُفَّاعُ
Nuque (F). Nape (E).

هو القذال الجزء الخلفي من المتى مركزه تحت القف .

٢٢٣٩٨ - قُفَّاعُ الْجَلُزُ *
Apodérus coryll (S).

Apodère du coudrier (F).
حشرة من فصيلة السوسيات طوطها ٧ م. رأسها اسود ،
ثوبها وسائر جسمها إلى الحمرة || تركب أوراك الجوز
فتضللها وتعيش عليها تتسلقها .

٢٢٣٩٩ - قُفَّاعُ مَرَّيْمِ
Campanule gantée (F).

هو جريس الت ، اطلبه .

٢٢٤٠٠ - قُفَّاعُ
Bouquetin d'Abyssinie (F).

هو الوول الحبشي ، اطلبه .

٢٢٤٠١ - قُفَّاعُ
داه يصعب النواص قتيص قوتها .
٢٢٤٠٢ - قُفَّاعُ
داه في قوائم الشاة يوسجها .
٢٢٤٠٣ - قُفَّاعُ
Diotis (S). Diotide (F).

جنس نباتات عشبية برية مصر من فصيلة المُرَكَبَات .
أنواعه المروقة قليلة . سيقانها خالية زباد تملن من ١٠ إلى
٥٠ سم . لورائها متعاقبة ، حاضنة ، اعطالية ، صغيرة

صار لها جلع تغد عليه . وفي ارض فلان من القاعد
كلها وكلها ...

٢٢٣٩٧ - قُفَّاعُهُ
Biotype
كل اسبل مائك لقرابة إلى البة .٢٢٣٩٨ - قُفَّاعُ
Déracinement (F).

Rooting up, Eradication (E).
هو الانجاء . يقال قُفَّاعُ الشجرة : اتقلها مع جلجورها .

٢٢٣٩٩ - قُفَّاعُ
القفس : القرب المثن .٢٢٣٨٠ - قُفَّاعُ
Formica animosa (S). قُفَّاعُ

Fourmi féroce (F).
نوع من النمل الحربي كبير القد أحر اللون أسمر الموج
يكثر وجوده في غابات وإسراج البلاد الاستوائية والحارة .

٢٢٣٨١ - قُفَّاعُ
Saprolegnisacae (S).

Saprolegnisacae (E).
فصيلة فطور مجهرية من مرتبة التنسبات ورتبة البيضيات .

٢٢٣٨٢ - قُفَّاعُ
Arcure (F). Arching (E).

قفس العمود : عطفه كما تحطف عروش الأكرم .

٢٢٣٨٣ - قُفَّاعُ
Extirpation

القصف هو تلغ البنية إن جنية او شجرة من أصولها .

٢٢٣٨٤ - قُفَّاعُ * ، طَيْرُ الْقُفَّاعِ

Serpentarius secretarius (S). Serpentinaire, Secr-
taire (F). Secretary bird (E).

طائر من فصيلة القففايات وسيد الجنس والنوع ، كبير
الجثة ، ريشه القوام ، أخيف اللد ، طوله نحو ١٢٠ سم.
رأسه قصير وعريض . قفنه متخرج يكشف عن الريش
الضيق المستطيل . وهو أشبه العين الكبيرة . أحر الجفن .
غليظ المنسر الاحفف الحاد . طويل المتى واللنب والساقي .

كبير السقط . كثيف الريش . ظهره أريد اللون يعلوه
مواج أزرق . صفه ويطفه ويتكاه إلى الحلقة الزاهية .
قولاده إلى السمره البادئة . ذنبه جلع الحظوف || الاثن
أكبر حبساً من الذكر لكنهما صغيرة الكثرة . نبيش

من ٣ إلى ٤ ورفنا تحضها نحو ٦ أسابيع في أنحوص
تشيد بالطين وتبطنه بالقش والريش التام || أطلانه
البلاد الحارة . يألف الاثاكن الأكلة ويدفن بسهولة .

قوته الافاعي حل اختلاط اجناسها وأنواعها يقتصها
أيضا فاعدها ولا ينف من سائر الزحافات والقوائم اغصها
الجردان والقثان والإبريق وتربها .

٢٢٣٨٥ - قُفَّاعِيَّاتُ
Gypogérinidae (S).

Gypogérinidae (F).

فصيلة طير من كواسر الجوار ورتبة الجوارح ، وحيدة
الجنس والنوع يملها القمق .

٢٢٣٨٦ - قُفَّاعُ ، قُفَّاعُ ، رَيْبَةُ
Actitis (S).

Guignette (F). Small hoe (E).

جنس طير من مارة اللوانيات وفصيلة دجائيات
الارض . صغير القد منسج الشكل . ثوبه مرهق الرأس
والظفر ، أبيض البطن . منقاره معتدل الطول . رسته دقيق
وقصير . ذنبه كثيف الانفيك مستدير || يرتاد النالغ
وصفات المياه العذبة . قوته الحشرات والديدان والناصك
والدباب . يدفن حبه في الاجار القريبة من الماء اغصها

الحلوف والصنصناف والأثل || الاثن قتيص ويضات
تحضها بمناءة الذكر نحو الاسبوين || له ثومان قفط .



قُفَّاعُ الْجَلُزُ

Cage (F). Bird-cage (E).

٢٢٤١٦ - قَلَصَص

عجس الطير وقد شاع استعماله للصائير البيئية .

Couvrir (F). To cover (E).

٢٢٤١٧ - قَلِطَط

قَطَط وقَطَط الطائر أثناء : سفدها . وقَطَط الماطر : رَآ .

٢٢٤١٨ - قَلِصَاء

عشية عذراء ثَمَارها قرون دقيقة تستدير كالحلق دون أن تلتقي أطرافها . وهي من أسرار البقل (السان) .

Claveau (F). Arch-stone (E).

٢٢٤١٩ - قَفَل

كل من الحجارة الواقعة بين الفلق والحجرين الأسفلين في المقعد .

Balsamodendron kafal (S).

٢٢٤٢٠ - قَفَل

Baumier de Kafal (F). Balm of Kafal (E). Kafalischer Balsambaum (D). Balsamo di Kafal (I).

نوع من البلسان، شجرته صغيرة القند فروعها غارشة . أوراقها مركبة . أزهارها غليظ التجميع . أزهارها صغيرة القند بيضاء اللون فواحة العرف الطري . أخشابها بخورية الرائحة . يستخرج من سوقها بالحز حصاراة راتنجية بخورية طيبة الاستعمال .

Arbre desséché (F).

٢٢٤٢١ - قَفَلَة ، قَفَلَة

Dried tree (E). هي الشجرة اليابسة وقد كثر استنادها الى الشجرة الحرجية اليابسة .

٢٢٤٢٢ - قَفَلُوط

هو الكراث الاندلسي ، اطلبه .

Occiput

٢٢٤٢٣ - قَفَن

الجزء الخلفي للأسفل من رأس الحيوان يعرف عنه بالبحق في الحشرات .

Occipital

٢٢٤٢٤ - قَفَنِي

كل ما له صلة بالقفن .

Fontanesia (S).

٢٢٤٢٥ - قَفُور ، قَفُورِيَة

Fontaine (F).

قَفُور هو الاسم العربي ، أما العلمي فيقود التعريف على اسم العلامة « Desfontaines » . جلس جنيات وشجيرات برية وزراعية صابغية وتزيينية من فصيلة القفورييات || أنواعها المعروفة قليلة العدد ، مهددا بحد من الشرق الأدنى الى الصين || سقها فروعها تملو من مترين الى اربعة امتار . شكلها قريب الشبه بالياسم . اثنائها نجيله متدلية ، أوراقها متعاقبة ، متناحية النصال اللرية . أزهارها صغيرة ، رباعية البتلات الضيقة ، عاجية اللون . لحاء سوقها وفروعها صابغية ، صابغها الى الصفار الكبريتي الجميل || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

Desfontainacées (F).

٢٢٤٢٦ - قَفُورِيَات

Desfontainaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متصلة الفلقات مرتفعة المبيض . أجناسها وأنواعها قليلة العدد . اعطائها تمتد من الشرق الأدنى الى الاصل || جميع نباتاتها شجيرات وجنيات برية . سوقها فروع . أخصابها متبسطة او متدلية . أوراقها متعاقبة ، قصيرة الاصل ، متناحية النصال . أزهارها رباعية البتلات ، صغيرة القند ، عاجية اللون او تبتية || أشهر أجناسها القفوز .

القد . رؤسها الزهرية صفراء اللون ، عادمة السينات . قوتجها فائضة استقبية التجميع . يزورها مضلة عادمة الجناح والافرة .

Mys (S). Mys (F).

٢٢٤٠٤ - قَلَالَة *

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القلاليات . أنواعها الماصرة المعروفة قليلة العدد جميعها من صلب بحار المناطق الشالية || أصدانها بيضاء اللون ، شبه بيضيه اللون تملوها نتوءات صغيرة || اجسامها مستطيلة الخائض المزدينية التجميع . مصاريها لامتناهية القند ، منفصلة الأطراف || تعيش في الرمال والاصال المغمورة . لحومها مأكولة .

Myidae (S).

٢٢٤٠٥ - قَلَالِيَّات

Myidae (F). Myidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في صلب بحار العالم || أصدانها لاصابية الشكل والقند ، قليلة الاحديداب ، مائلة الطروح . تتميز بمصاريها اللامتناهية المنفصلة الأطراف || أعرف أجناسها وأشهرها القلالة والقيقب والكريولة .

Couffe, Couffin, Cabas (F).

٢٢٤٠٦ - قَلَّة

Hamperfall, Basket (E).

وعاء ثنائي القطع من الاسل أو القنب أو الكيف أو الكروشك يستعمل في نقل الاشياء .

٢٢٤٠٧ - قَفَر

راسع يادية .

٢٢٤٠٨ - قَفَر البود ، قَفَر البود

Bitume de Judée (F). Bitumen of Judaea (E).

نوع من الحمر جيد الصنف يكثر في البحر الميت .

٢٢٤٠٩ - قَفَرِي

Xérophyte (F). Xerophyta (E).

نمت تمرين يطلق على كل نبات يستطيع مقاومة الجفاف .

٢٢٤١٠ - قَفَرَات الطيَاء

قفزات الطياء كوكبة من ستة نجم وتسمى قفزات النزالان أيضا .

٢٢٤١١ - قَفَرَة أُول

القفزة الاول نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤١٢ - قَفَرَة ثَالِثَة

القفزة الثالثة نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤١٣ - قَفَرَة ثَانِيَة

القفزة الثانية نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر .

٢٢٤١٤ - قَفَرِي *

Salsolre (F). Salsolre (E).


نمت تعريف يطلق على كل عضو من اعضاء القفز او صالح القفز عند الحشرات .

٢٢٤١٥ - قَفَسَاء

Estomac des ruminants (F).

Stomach of the ruminants (E).

معدة الحيوانات الهبزة تشمل الكرش والفلسوة وأم التلائف والجوت .



قِدَالَة

٧٢٤٣٥ - قُفُولٌ هو التَّمْ، الطَّيْء .

Caldie (F).

٧٢٤٣٦ - قُفُولٌ

جلس نباتات حشوية حرولية برية من فصيلة السليبيات .
أعطائها الشطوط الرملية .

Muretta (F). Small wall (E).

٧٢٤٣٧ - قُلٌّ

هو الحائط القليل الارتفاع .

Zygophyllum (S). Zygophylle (F). ٧٢٤٣٨ - قُلَابٌ

جلس نباتات جنينية من فصيلة الفردييات . أنواعه نحو ٦٠ معظما بري وبعضها زُرْبِي . سيقانها فرعاء جالسة .
أوراقها متقابلة حركية ريشية . أزهارها نطائية خماسية التركيب . ثمارها حنطة || أشهر أنواعه الزُرْبِيَّة قُلَاب القرم .

Zygophyllum fabago (S). ٧٢٤٣٩ - قُلَاب القرم

Zygophylle de Crimée, Fabagelle, Faux caprier (F).
Syrian bean caper (E). Bohnenkapers (D). Fabaria, Favaggina (I).نوع من القلاب وهو جنس زُرْبِيَّة شائعة الاستعمال .
موطنها بلاد القرم وقد عمت زراعتها الزُرْبِيَّة (جمع البلاد)
المعتلة الحرارة . أزهارها كبيرة القند جميلة الشكل أرجوانية اللون .

٧٢٤٤٠ - قِلَادَةٌ

القِلَادَة ستة كَوَاكِب يمرقن بالقوس .

Moniliforme (F). ٧٢٤٤١ - قِلَادِيٌّ ، سُبْحِيٌّ

Moniliform (E).
شكل من الزباني فواصله كمحب القِلَادَة أو السبحة .

Figue (F). Flg (E).

٧٢٤٤٢ - قِلَاقٌ

ضرب من التين أبيض إذا جف أصفر لونه وهو أجود من الطليار .

Merycote (F).

٧٢٤٤٣ - قِلَاقٌ

القِلَاق من استعمال القِلَاق القشلية .

Muguet, Stomatite (F).

٧٢٤٤٤ - قِلَاقٌ

Stomatite (E).
القِلَاق مرض معد يعرف بالتهاب غشاء اللسان . يصيب البشر والتم . سببه فطر مجهري شديد الانحناء . مظهره الخارجي بقع بيضاء تركب اللسان ودخلت أهد .

Brunella (S). Brunella (F).

٧٢٤٤٥ - قِلَاقٌ

Self-heal, Sickle-wort (E). Brunella (D). Brunella (I).
جلس نباتات حشوية برية عطرية معمرة من فصيلة الشفويات .
أنواعها عديدة جميعها صغيرة القند . سيقانها فرعاء . أوراقها متقابلة منتنة كاملة . أزهارها مثل التجميع طرفي الارتكاز . أزهارها عطرية متوسطة الحجم خطفة الألوان سبها الأحمر والأزرق والبنفسجي والأبيض || أرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

Brunella hyssopifolia (S). Brunelle à feuilles d'hyssop (F).

نوع من القِلَاق البري الزُرْبِي ساقه فرعاء تملو نحو ٤ سم . أوراقها شقيقة كاملة تشبه أوراق الزُرْبَة . سبله

Blattissement, Blattissure (F). ٧٢٤٤٧ - قُفُولٌ

Becoming over-ripe or sleepy (E).

القُفُول كالقُفُول والحرارة أو تمام نضج الثمر .

٧٢٤٤٨ - قُلْبِيٌّ ، حَشِيَّةٌ ، صَبَاةٌ

Ruche à cadres (F). Frame hive (E).

هو مأوى النحل صنع من الخشب ويجهز بالنحالت والأقراص الشمسية .

Hapiophyllum (S).

٧٢٤٤٩ - قُفُولٌ

Hapiophylle (F).

جلس نباتات حشوية برية معمرة من فصيلة السليبيات .
أنواعها المعروفة عديدة منها حشاب ونجاد والشرق الأوسط وبعض الأصناف الأروبية || سيقانها متصلة فرعاء منتصب . أوراقها بسيطة أو ثلاثية التفرع . أزهارها ملو التجميع ، طرفي الارتكاز . أزهارها متباينة الأحجام والألوان || أرف أنواعها وأشهرها الخمسة التالية .

٧٢٤٥٠ - قُفُولٌ حَرَجِيٌّ

Hapiophyllum sylvaticum (S).

Hapiophylle de Syrie (F).

نوع من القُفُول . منته أرحاج المناطق الجبلية . ساقه فرعاء ملسة . أوراقه ريشية النصال الحادة الأطراف . أزهاره صغيرة القند ، يضاء اللون . تنموه صيفي .

٧٢٤٥١ - قُفُولٌ سُرِّيٌّ

Hapiophyllum syriacum (S).

Hapiophylle de Syrie (F).

نوع من القُفُول . منته معظم الأصناف السورية باستثناء القُفُول البحري . ساقه منتصب فرعاء تملو نحو ٦٠ سم .
أوراقه شبه بيضبة الشكل ، ملوقة . أما العليا فثلاثية التفرع . أزهاره صفراء اللون . تنموه منه من الربيع إلى أوائل الصيف .

٧٢٤٥٢ - قُفُولٌ مُسْتَطِيلٌ الْوَرَق

Hapiophyllum longifolium (S).

Hapiophylle à feuilles longues (F).

نوع من القُفُول . منته جلاد الأروبية . ساقه فرعاء متباينة للحد الخضراء المزجة . أوراقه سنائية النصال النسيقة تطلو من ٤ إلى ٥ سم . أزهاره صغيرة متكايفة ، لونها إلى الحمرة المزجانية . تنموه ديمبي .

٧٢٤٥٣ - قُفُولٌ مَهْدَبٌ

Hapiophyllum villosus (S) Hapiophylle velu (F).

نوع من القُفُول . ساقه مزغبة اللحماء فرعاء . أوراقه السفلى اطليجية النصال أما الوسطى والعليا فثلاثية التفرع .
أزهاره مهدبة الكؤوس ، وردية اللون ، معتدلة الحجم . تنموه في أوائل الصيف .

٧٢٤٥٤ - قُفُولٌ تَجْمِيٌّ

Hapiophyllum fruticosum (S).

Hapiophylle branchu (F).

نوع من القُفُول . منته الحشاب والنجاد . ساقه كثيرة الفروع المتراكبة . أوراقه السفلى بيضبة للشكل أما العليا فرمجة . أزهاره صغيرة القند لونها إلى الأبيض الأصفر الملوّج . تنموه صيفي .



قُفُولٌ

Cambium

٢٢٤٥٥ - قَلْبُ ، كَتِينوم

الطبقة المولدة في النبات. ج قلوب .

٢٢٤٥٦ - قَلْبُ ، جُمَارَكَة ، شَحْمَة

Bourgeon terminal du dattier (F). Terminal bud of date-tree (E).

البرعمة الحامية الطرفية في النخلة وهي شطبة يهشأ برصعة طيبة الطعم تكون في أصل جلد النخلة. وقد سمي قلباً لبياحه. ج قلبية .

٢٢٤٥٧ - قَلْبُ الأَسَد

قلب الأسد نجم ثير من كوكبة الأسد الاصغر .

٢٢٤٥٨ - قَلْبُ الأَسَد المَلَكِي

قلب الأسد الملكي نجم ثير من برج الأسد وهو النور النجم الجبهة .

٢٢٤٥٩ - قَلْبُ الشُّجَاع

قلب الشجاع نجم ثير من المرتبة الثانية ينتمي الى كوكبة الشجاع الاثني .

٢٢٤٦٠ - قَلْبُ العَقْرَب

Antares, Coeur du Scorpion (F). Antares (E).

قلب العقرب أو القلب منزل من منازل القمر البانية . وهو نجم ثير آخر الصوم من كوكبة برج العقرب . مركزي في اواسط البدن وراء الاكليل بين كوكبين يقال لهما التباط . وقبب القلب يعني الدبران || وقلب العقرب يبعد من الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية وهو من نجوم المجرة التي يترى حجمها ٧٠ مليون مرة حجم الشمس .

Plebeus (S).

٢٢٤٦١ - قَلْبُوس

جنس حشرات فراشية من فصيلة القنليات . أنواعه عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جسمها صغيرة القد طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٢٨ سم . اجسامها سمره اللون رواشها مختلفة الالوان المتداخلة يكثر فيها الازرق والبنفسجي والاطمطل الموشع والمتقط بالاسود والاحمر || اناثها اكبر قدماً من ذكورها واقم لوناً واقل رقة ونوشياً || يرقاها تركب اوراق نباتات الفصيلة القرنية .

٢٢٤٦٢ - قَلْبُوس القَطَائِيَّات

Plebeus idas (S). Argus bleu des légumineuses (F). Plebeus idas (E).

حشرة من فصيلة القنليات ودية حرشفايات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية فراشها راضعة قوتها مشر الازهار . سرشها خاضعة قوتها اوراق القنليات || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ ا.م . يسحبها نحو ٢٧ سم . رأسها صغير الحجم . عينها كبيرتان . زباناها مستطيلان ، شبه صوطانان . جوشها ازرق اللون اطمطل المواج عند الذكر ، كستني اللون عند الانثى . بطنها اريد اللون عند الذكر ، كستني اللون الداكن القاتم عند الانثى || رواشها عند الذكر الى الزرق البنفسجية يطويها اطار اسود ينتهي بهامش ضيق ابيض . وهي عند الاقلى الى الكستني الاصمر يطويها اطار جميل ابيض تنفذه نقط حر رسود || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجبل الاول في ايار وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في النهار . تماثل بعد ظهورها بحسبة اسابيع وتتمح

الزهرية متوصلة القد تحمل ست زهرة || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢٤٦٧ - قَلْع شائع *

Brunella vulgaris (S). Brunelle commune (F).

نوع من القلاع الصبروني البليوط . ساقه متصببة فراءه تملو نحو ٢٠ سم . اوراقه اهلالية الشكل . سبلته الزهرية قصيرة . ازهاره صغيرة بنفسجية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٨ - قَلْع كبير الزهر

Brunella grandiflora (S). Brunelle à grandes fleurs (F).

نوع من القلاع البري التزييني يرض في الاربة الكلسية ساقه فراءه تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه بيضية الشكل مسلبة الحافة . سبلته الزهرية مسطيلة . ازهارها كبيرة القد ، متباعدة ، ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٢٤٦٩ - قَلْعَة

Aphtho (F). Aphtho (E).

بثرة صغيرة يهشأ اللون تظهر في فم الحيوان المريض .

٢٢٤٧٠ - قَلْعَة

هي الحفلة . اطلمها .

٢٢٤٧١ - قَلْعَة

مجموع القنليات حول قاعدة الخجة الزهرية أو الرؤوس الزهرية .

٢٢٤٧٢ - قَلْعَة

اعمة من الباطون أو الخشب تنصب عليها الاسلاك لتعرض النكرة ورمها عن الارض .

٢٢٤٧٣ - قَلْعَم

جنس نباتات جفمورية عشية نمرة من فصيلة الجسنيريات . انواعه قليلة . اوراقها قرصية التجميع ، شمية . نصاها سنائية شعدة ومسلة الحار . ازهارها ثورية التجميع ليلية اللون ، خاسية القيقع الوردي || ازهاره يستمر طول فصل الصيف .

٢٢٤٧٤ - قَلْب

Coeur (F). Heart (E).

عضو عضل الجوف . وهو العضو الرئيسي في الجهاز التنوي لان مل عمله تتوقف حياة الانسجة والجسم . مركزة عند الانسان والحيوان في تجويف الصدر بين الرئتين من اليسار والقلب مركب من جزئين : ايمن ، يسوي الدم القاسد واليسر ، يسوي الدم الفتي ويتكون كل جزء من تجويفين يرفان بالاذين والبطين . ويتصل الاذين بالبطين الذي يقايبه بقصبة صمامية . ويتصل الاذين الايمن بالوردين الايمنين السلي والعلوي . ويتصل البطين الايمن بالشريان الرؤوي الذي يتفرع الى فروع اصغر قاصر تعرف بالشعيرات الدموية . ويتصل الاذين اليسر بالوردين الايمنين السلي والعلوي . ويتصل البطين اليسر بالشريان الايسر . اما الدورة الدموية التي تستغرق نحو ثمانية اعشار الثانية فتجري حل الشكل التالي : يرد الدم الى القلب بواسطة الوردين الايمنين الى الاذين الايمن ثم ينتقل الى البطين الايمن ومنه يخرج من طريق الشريان الرؤوي الى الشعيرات الرؤوية التي تتجمع في فروع اوسع فتكون الاوردة الرؤوية التي تحمل الدم المتأكسد ونصبه في الاذين الايسر ومنه ينتقل الى البطين الايسر ثم ينتقل الى الايسر الذي يفرغ ويوصله الى جميع الشعيرات الدموية المنتشرة في الجسم .



قلاع شائع



فلبوس



فلبوس القَطَائِيَّات

٢٢٤٧٢ - فَلَكَ يَات

Mallophages

رَبَّةٌ حشرات قارضة من طبقة القمليات ، فصائلها عديدة جميعها عادمة الجناح . أجسامها صغيرة ملفحة . رؤوسها كبيرة وحريضة . تكاثرها قوية ، قربها الاستعمارية قصيرة || تميش طفيلية على الخيل وبعض الحيوانات البدينة فتقرض الريش والصوف والوبر وبشرة الجلد والدم الجاف . ضدها وبشي للشكل اغبر اللون تلصقه حيث تمتصه ان بالريش او بالصوف او بالشر فيقتف عن حوريات تلصق عدة مرات قبل اكثال تطورها || اشهر فصائلها القرطيات والمفرنيات والتمنياتيات .



فلبوس الرزال

٢٢٤٧٣ - فَلَز

Alrain (F). Briss (E).

سبيكة من معادن مختلفة اغصها انتحاس والقصدير .

٢٢٤٧٤ - فَلَز

Régurgitation (F).

Regurgitation (E).

القلس طريقة تغذية خاصة ببعض الحشرات اغصها التمل . راجع للتغام .

٢٢٤٧٥ - فَلَز

Drainage (F).

هي عملية تصريف المياه من الآرية الربلة .

٢٢٤٧٦ - فَلَسا ، فَلَسوة ، فَلَسوة

Calotta (F).

هي الاروسة ، اطليا .

٢٢٤٧٧ - فَلَوس

Fallow (F).

جاء في السان : نبات يكون منه اللادن .

٢٢٤٧٨ - فَلَوس

Cyon dukhunensis (S).

Coleon (F). Colan (E).

نوع من الكلاب المتوسطة المقامة . ونهم من جملة نوما من الضل . موته غابات غفاف المحتوس وادية حلايا وكشير وأسام . جماعته تد من ٧ الى ١٢ زوجا يرأسها ذكر سن . يقتصر الايل الاقظ وايل المسك وادوية الشرق وجميع الحيوانات الضعيفة || جسمه منقسم التقاطع ، اعقب القذ ، يطول نحو ١٠٥ سم . ذنبه نحو ٥٠ سم . وارتفاعه ٥٠ سم . اذنه ٨ سم . ثوبه الى الشقة الصناية تسم بعض التي ، في الصيف . بطة تبي اللون . سباله اسود الملب . ذنبه جزل الوبر الكيث ، منخفض الطرف || يسرح في النهار ويبيت في الليل .

٢٢٤٧٩ - فَلَطُوسُ أَسَدِ الرِّاسِ

Malathus melanocephalus (S). Malatha melanocephala (F). Malathus melanocephalus (E).

حشرة داسنة من فصيلة البقريات وربة غديلات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد المشتلة الحارة من الشرق الاذق ولادوية . تألف الاراضي المشحة والباري الكثيرة الصغور حيث تراكم المواد النباتية من اوراق وميل فطش ونظام ... || جسمها صغير القذ يطول من ٦ الى ٨ سم . رأسها اسود اللون ، قصير الخط . زبانا عيطيان مستطيلان . عينها كيرتان جاسطتان . كيرلها معيوب السطح ، احر اللون . ظهراتها جزوي اللون ، محتدل الاحدياب ، مستدير الطرف الاصح ، ثنائي التحزيز التمددي القاطب . ارساها خامية العغل || الانثى اصفر قذا من للذكر وابيت ثوبا منه واقصر زبانا || لها جيل



فلطوس أسود الرأس

المكن مباحدا على الصفحات السفلى من نصال اوراق النبات المائل || السرة تطول نحو ٧٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، خلى القشار . ثوبا اغضر يطلو جميع منفرص اصفر . رأسها كسني اللون . مدبها ورواجبها الى الصلحة الخمره || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن صلبة تحببها السرة على النبات المائل حيث تتدل .

٢٢٤٨٠ - فَلَطُوسُ الرِّزَالِ

Piebleus argus (S).

Argus bleu des genets (F). Piebleus argus (E).

حشرة من الثعنايات وربة حرشيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاذق وادوية . فراشها واحة قربها رحيق الازهار . سرلها تميش على اوراق الرزال والقصور والشيح والتندول || جسمها صغير القذ يطول نحو ٩ سم . سبطها نحو ٢٥ م . رأسها صغير الجرم . عينها كيرتان . زباناها مستطيلان ، شبه صولجانيان . حرشها ويطنها الى الزقة يطلوها مواج اغبر عنه الذكر والى السرة الكسنية عند الاثى || رواش الذكر الى الزقة البنفسجية يطوفا حمار اسود وتهديب ابهى . رواش الاثى الى السرة الكسنية يطوفا تهديب حنلي ويطوفا في الزوج الامامي ثلاث نقط صناية || لها جيل واحد في الخول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في النهار . تماطل بمد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكن مباحدا على الصفحات السفلى من نصال الوراق || السرة تطول نحو ٢٢ م . جسمها بهي الشكل ، كيث الحمل القصير . اغضر اللون اصفر المواج تملو حمة خطوط سود . رأسها اسود . مدبها ورواجبها الى السرة القاتمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي معلقا في النبات حيث تتدل السرة .

٢٢٤٨١ - فَلَطِي

Cordiforme (F).

Cordiform, Heart-shaped (E).

نمت تعريتي يوصف به الشكل الذي يشبه القلب .

٢٢٤٨٥ - فَلَطِيَّات

هي فصيلة البقريات ، اطليا .

٢٢٤٨٦ - فَلَنت

القلت النقرة في الجبل يشتق لها الماء . ج قلات .

٢٢٤٨٧ - فَلَنت

Salière (F). Eye-pit (E).

القرة فوق عين الفرس .

٢٢٤٨٨ - فَلَنت

هو الحجر ، اطليا .

٢٢٤٨٩ - فَلَنت

القلع : اخلار اسن .

٢٢٤٩٠ - فَلَنت

قلع الازرع : سقا .

٢٢٤٩١ - فَلَنت

Arrosage, Part d'eau (F). Watering, Share of water (E).

القلع هو البتي ويوم البتي ويقال : ما بين القلدين ظرم . وهو التصيب من الماء . يقال اخذ قلدا اي نصيبه من الماء . ج قلد واقلد .

٢٢٤٨٨ - قَلَّوْةٌ هَلَالِيَّةٌ *

Calophasia lunata (S). Calophasie à croissant (F). Calophasia lunata (E).

حشرة من فصيلة النسيقات وربيّة حشرشيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشها واحة قوتها رقيق الازهار . سرقها تمش على اوراق نباتات الفصيلة الخنازيرية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٢ م . بسطها نحو ٣١ م . رأسها حطلي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها عظيمان . جوشها وبطنها الى الحطلي الاسمر المواج || ورشها الاماميان ، عند الشقين ، الى الحطلي يطوى علو علل ابيض ويثقب اسمر ويجعل بني . ورشها الخلفيان الى الحطلي يطوى ملو ملو اسمر عند الذكر || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان . وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها باسبوعين وتمنع المكن لطعا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، ماس القشار . ثوبها الى الزبداء السوداء ملوقة خسة عطلوط مزدوجة قاطبة جزوية . رأسها الى الحمرة المرجانية . مذهبها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة حيث تلتحف بجلباب من الطين .

٢٢٤٨٩ - قَلَّع

و ما تقشر عن اسفل مياه السيول مشققا بعد نضوبها . والقلفعة : قشرة الارض التي ترتفع عن الكساء فدل عليها (الانسان) .

Colophane (F). **قَلَّوْةٌ ، قَلَّانَة** ٢٢٤٩٠ Colophany (E). هو صمغ البطم .

٢٢٤٩١ - قَلَّاس *

Colocasias antiquorum, C. esculenta, Arum esculenta (S). Colocase, Colocasie, Arum colocasie, A. d'Egypte, Taro, Mon, Sonje, Madère (F). Colocasia, C. estable arum, Egyptian arum, Egyptian colocasia, Taro (E). Echte Blattwarz, Agyptisches Arum, Colocase (D). Colocasia, Aro egiziano, Gichero (I).

نبات صفولي زراعي معمر من فصيلة القلقاسيات . اصطناعه للبلاد الحارة . ساقه ارضية صفولية خفيفة . اوراقه قرصية التجميع تقوم على مالمين مسطيلة منصبة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . وهي كبيرة القد ، قليلة الشكل ، نصلها جامد الصفحة المتواجبة قائم الخضار يطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . ويعرض من ٣٠ الى ٤٠ سم . ضروبه اتراعية عديدة جميعها ترغب في الارربة الدبالية الرطبة . زراعتها تستقيم في التربة من ٧ الى ١٤ شهرا . محصوله وافر الانتاج . لباب صالقه يتركز بعد طبخه او نقعه بالماء لزوال ما فيه من مواد قارصة كادوية . ولها هذا يحوي نحو :

- ٢,٦٥ ٪ من المواد الازوتية .
- ٥,٩ ٪ من المواد الدهنية .
- ١٦,٨٢ ٪ من المواد الميخروكربونية .

٢٢٤٩٢ - قَلَّاس رُومِي

هو عباد الشمس الصفولي ، اطله .

واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها المواد النباتية المنحلة والصالبة نحو الانحلل || البرقة عند بلولها الادراك الجسودي تطول من ١٢ الى ١٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل . رأسها وصدرها وتظهر سكها وشرجها الى السرة الكسنتية القائمة . بقها الظورية تضيق وتضيق تدريجيا من سكة الى سكة مع ابتعادها عن الرأس . مذهبها ورواجها اقل سرة من رأسها . درتها بجوهر باستان حادة . فكها ضليمان || طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة في اوائل نيسان يستمر نحو اربعة اسابيع وينتهي في هجر البرقة طليقا من كل فلات .

٢٢٤٨٠ - قَلَّع Arracher (F). To pull (E). قلع النبات : استخرج من التربة .

٢٢٤٨١ - قَلَّع ، حَكِي ، اِحْتِفَاف Arraschage (F). Pulling up (E). استفرج النبات من التراب .

٢٢٤٨٢ - قَلَف Phloem الثلف هو اجزاء الداخل من لحاء الشجر يتميز بيسود الازمية الثربالية المقطع التي تنقل النسج التذالي الكامل .

٢٢٤٨٣ - قَلَّفَ Ecorcer (F). To bark, To strip (E). قلف الشجرة : زرع منها لحاءها .

٢٢٤٨٤ - قَلَّاق Colophaca (S). Colophaque (F). Colophaca (E).

جنس نباتات بحلية معمرة من فصيلة السليانيات . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اواسط القباي الروسية . سوقها قرماء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها مركبة وثرية اللند . اثمارها صفراء اللون ، عقدوية التجميع || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٢٤٨٥ - قَلَّاق السُّوَلَكَا *

Colophaca Wolgarica (S). Colophaque de la Volga (F).

نوع من القلقاق . موطنه القباي الروسية . ساقه تملو نحو ١٠٠ سم . افئاده منسطة الاعتداد ، الحولية منها حلية اللحاء ، مبشرة اللند الدهنية . اوراقها مركبة وثرية اللند الذي يراوح من ١١ الى ١٩ سم . وريقاتها صغيرة ، حلية النصال . اثمارها صفراء اللون ، تطول نحو ٢ سم . || تنويره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٢٤٨٦ - قَلَّاق كبير الزهر *

Colophaca grandiflora (S). Colophaque à grandes fleurs (F).

نوع من القلقاق . موطنه يمتد من جبال تركية الى ايران وافغان . ساقه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . افئاده جرداء اللحاء ، عادمة اللند الدهنية . اوراقها مركبة وثرية اللند الذي يراوح من ٢١ الى ٢٧ سم . اثمارها صفراء اللون ، تطول نحو ٣ سم . || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٤٨٧ - قَلَفَة

نبات اخضر له ثمرة صفيرة والمال عليها حريص (السان) .



لفزة ملاحة



قلقاس

٢٠ إلى ٤٠ سم. أوراقها تشبه ورق القزاق. أزهارها صغيرة القند صويالية التجميع || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٢٥٠٢ - قَلَسِيَّة مَلَسِيَّة

Minuartia laticifolia (S). *Aislne à feuilles de mûlène* (F).
نوع من القلقلقة منبهاً الأرضية الرملية. ساقها تملو من ١٢ إلى ٢٠ سم. أوراقها ملهسية الشكل صلبة النصل النقي. أزهارها مصابة الارتكاز على الساق، كبيرة القند مستطيلة البتلات || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.



قلقلة

Alsnées (F).

٢٢٥٠٣ - قَلَسِيَّات

سبط من فصيلة القلقلقيات.

Geotropes (S). *Géotrupe* (F). **قَلَقُولِيَّة**
جنس شجرات من الجملليات. أنواعه عديدة جميعها راسية نائلة تسرح في الليل وتعيش على البراز وتضلف المواد العضوية المنحلة || أشهر أنواعها قلقلقة البراز.

٢٢٥٠٥ - قَلَقُولِيَّة الْبَرَاكُز *

Geotropes starcorialis (S). *Géotrupe starcoriale* (F).
نوع من القلقلقة طويلاً يراوح من ١٨ إلى ٢٥ سم. جسمها يضيء الشكل مفلطح الجرم صفته العليا إلى السود الأخضر المروج صفته السفلى إلى الزرقاء الخضراء المروج. تسرح من غروب الشمس إلى أواخر أو أواخر المربع الثاني من الليل. قوتها البراز اصعب ووث العواب. يحبرها سرداب ينور من التربة ترصف فيه كامل مكها بعد أن تلتقه بلحاف تحين من الروث يمد الحرارة اللازمة حتى تنفخ ثم القوت الفردوى حتى الانسلاخ.

٢٢٥٠٦ - قَلَم ، قَلَم السِمْع ، حَكِيل السِمْع

Styla
أحد أجزاء مدقة الزهرة وهو غيط اجنوت يحمل السمة ويوصلها بالمبيض.

Grefion (F). *Graft* (E). **قَلَم**
هو العلم.

Bouture (F). *Slip* (E). **قَلَم**
القلم والمقلقة والفلسه قصب أو جزء من قصب ينقل من النبات ويغرس. راجع قفلة.

٢٢٥٠٩ - قَلَمَتَت هو تمنع البر ، أظله.

Averrhon **قَلَسْبَاق ، رَشْدِيَّة**
جنس اشجار مشرة من فصيلة الحماسيات. أنواعه المعروفة اثنان. منبهاً البلاد الحارة اعصبا الهند. سورها منتصب. اصنافها دائمة منفردة. أوراقها مصابة مركبة ريشية. ورقها طاباً ملهسية شديدة. أزهارها صغوية التجميع محورية الارتكاز، طرفية. ثمارها يضيء مستطيلة، لهايا حامز العلم مستحب النكهة يؤكل رطباً وورباً. وهو من النباتات البهرقية التي تجود في جميع الأرياء القليلة والمتوسطة الانتماع || يتكاثر بالبذر. اشجاره زهر وتثمر طوال السنة.



قلقلقة البراز

٢٢٤٩٣ - قَلَسِيَّات

Araceae, Aroidaceae (S). *Aracées, Aroïdées, Aroidacées* (F). *Araceae, Aroidaceae* (E).

فصيلة نباتية من وحدات الفلقة. اجناسها وانواعها كثيرة ألعند تجتمع إلى ثلاثة اسباط: الرسيات والرنسيات والروبيات. نباتاتها صمودية او صغولية ممره. معظمها بري وبعضها زراعي وتربي || حسانها لا تتخلو من المواد الكاوية السامة التي يضلعل مغعوا بعد القتل او الضغ بالماء او التحميص على النار.

٢٢٤٩٤ - قَلَقَلَانِي كَوْنِيَّة

Starnes cyanoccephala (S). *Colombi-perdrix cyanoccephala* (F).

طائر من القلقانيات وفصيلة الحاميات. طوله نحو ٢٠ سم. قمة رأسه وصافية اللون زرقاء المروج، عماره وقته وزوره سود. ثوبه حنلي اللون العابق يعلو مخرج جثوي. صدره إلى الجفوة الخمرية. منقاره احمر الانتساب أزرق الكرافت. ارجله حر || يألف الإخراج والمناطق الصخرية. اصرابه صغيرة يراوح عدد افرادها من ١٢ إلى ٤٠. قوته الثار والحبيب والبلور. يش في الجينات والأشجار القليلة الارتفاع. اناته تبغى بيضين.

٢٢٤٩٥ - قَلَقَلَانِيَّات

Colombi-perdrix (F).
جنس جحر من فصيلة الحاميات. أنواعه قليلة تنبغ بشكلها الذي يشبه شكل الحجل. منقارها قوية محبة. اجنسها قصيرة شبه مستديرة، اذناها حريضة مستديرة. ارسافها طويلة، اصابعها قصيرة. غالباً قوية || لشهر انواعها قلقلاني كويه.

Vitriol vert (F). **قَلَقَدَسِيَس**
هو الزجاج الاخضر، اظله.

Vitriol vert calciné, Calcite (F). **قَلَقَدَسِيَس**
هو الزجاج الاخضر المكلس.

٢٢٤٩٨ - قَلَسِل ، قَلَل
هو السنا البري. شجرة تقارب الزمان تحمل حباً اسود مستديراً في سيم الفلفل او اكبر يبرأ ألس فيه لزوجة وصلابة حسن الثم ورق هذا لشجر اللغات.

Minuartia, Aislne (S). **قَلَسِيَّة**
Aislne (F). *Aislne* (E). *Steinmiero* (D). *Aislne, Centocchio* (I).

جنس نباتات عشبية برية مصره من لفيلة القلقلقيات. انواعها المعروفة نحو ١٢ منبهاً الفرق الأدنى وأدوية الجنبية. جميعها صغيرة القند قليلة الفروع. أوراقها متعاقبة نصافاً محززة على حدية الشكل. أزهارها صغيرة الحليم يبيض اللون || اصرافها ما يتبع:

Minuartia iliflora (S). **قَلَسِيَّة كَلَسِيَّة**
Aislne à fleur de lin (F).

نوع من القلقلقة، منبهاً الأرضية الكلسية. ساقها تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أوراقها منتصبه جلدة مهدية. أزهارها صغيرة القند متعاقبة تشبه زهر الكتان. أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٢٥٠١ - قَلَسِيَّة لَزَاجِيَّة

Minuartia juniperina (S). *Aislne à feuilles de genévrier* (F).
نوع من القلقلقة، منبهاً الحضاب والجبال. ساقها تملو من

٢٢٥١١ - قَلْبَق لَدِيد *

Averrhoa carambola (S). Averrhoa carambola, Carambolier (F). Caramba, Carambola (E). Karambolabaum, Karambola (D). Averroz carambola, A. acellare (I).

لوع من القلنباق، شجرة صغيرة القد تملو نحو ٤ أمتار. أوراقها مائلة. وريقاتها ثلاثية أو خماسية الأزواج. نصلها مائل البشرة، قائم الخضار. ازهارها صغيرة القد، بيضاء اللون أو وردية. ثمارها اهليلية الشكل، خماسية التضيق، صفراء اللون، خضراء الملوّج. لهاها غزير العصارة، ذكي العرق، مأكول.

٢٢٥١٢ - قَلْبَقُوءَ (F). Plexus (E).

قسم من أقسام عدة المجترات صغير الحجم يتصل بالكرش من جهة وبألم للتلافيف من الجهة الثانية. راجع عدة.

٢٢٥١٣ - قَلْبَقُوءَ في الاصطوة، اطلها.

٢٢٥١٤ - قَلْبَقُوءَ (F). Collinsia (S).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الحنازيريات. أنواعه عديدة منها البرية والزراعية الصياغة والزيينة. مهدها البلاد الامريكية. أوراقها كاملة متعابلة. ازهارها زاهية الالوان فسيحة التجميع متتالية || تتكاثر بالبذر. ترطب في التربة الحولرة الجافة المواد الغذائية. امرو انواعها واشهرها ما يلي :

٢٢٥١٥ - قَلْبَقُوءَ ثَلَاثِيَةِ الْوَن (F).

Collinsia bicolor (S). Collinsia bicolor (F). عشبة ثريية زياء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقها معتقة نصلها ساني الصفحة، مسن الحافة، قلبي القاعدة. ازهارها ثنائية اللون فيها البنيضي والاييض. ازهارها يتسمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٦ - قَلْبَقُوءَ رِبْعِيَةِ (F).

Collinsia verna (S). Collinsia printanère (F). عشبة ثريية مزهجرة. ساقها منتصبه فرعاء تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها معتقة نصلها خلبي البشرة مسن الحافة. ازهارها الى الزرقه. اطراف بتلاتها ييض وفي متوسطه القد مستطيلة الامن || ازهارها يتسمر من نيسان الى حزيران.

٢٢٥١٧ - قَلْبَقُوءَ صَيَاغِيَةِ (F).

Collinsia tinctoria (S). Collinsia tinctoriale (F). عشبة صناعية زياء. ساقها منتصبه تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها لائقة، اهليلية، نصلها غدي الصفحة الزرقه. ازهارها الى البياض الاصفر الملوّج يملو توضيح ارجواني. ازهارها صيني.

٢٢٥١٨ - قَلْبَقُوءَ كَبِيرَةِ الزَهَر (F).

Collinsia grandiflora (S). Collinsia à grandes fleurs (F). عشبة ثريية سرسة. ساقها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. أوراقها اهليلية سمكة النصل المادم التسين. ازهارها الى الزرقه الموشحة بالوردي. بتلاتها كبيرة مستطيلة مجتحة. ازهارها يتسمر من ايار الى تموز.

٢٢٥١٩ - قَلْبَقُوءَ (F).

Styldium (F). Styldie, Styldier (F). جنس نباتات عشبية معمرة برية وثرثريية من فصيلة القلنباقيات. انواعها المعروفة ثلاثة جميعها ثريية تزور



قلنباق كنيد

في المراكن وفي المواقع الرطبة شرط الا تتعرض للصقيع في فصل الشتاء. أوراقها متباينة الاشكال وبها المصفية. ازهارها حيلة ملونة.

٢٢٥٢٠ - قَلْبَقُوءَ (F). Stylidiaceae (S).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القمالات منخفضة المبيض. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطه العدد جميعها نباتات عشبية وعشوشية ترطب في المواقع الرطبة والمناطق اشهر اجناسها القلنفة.

٢٢٥٢١ - قَلْبَقُوءَ في القصور، نبات بري طيب معمر.

٢٢٥٢٢ - قَلْبَقُوءَ (F). Otardesau (F).

فرخ الحباري (السان).

٢٢٥٢٣ - قَلْبَقُوءَ (F). Chamelle jeune (F).

Young she-camel (E). قال الجلاط : « الشاة من النوق. وهي اول ما يركب من اناث الابل الى ان تنثي فاذا انثت فهي ناقة ».

٢٢٥٢٤ - قَلْبَقُوءَ (F). Alcalin (F).

Alkaline (E). نسبة الى القلي. يقال اربة قلوية وسائل قلوي واملاح قلوية.

٢٢٥٢٥ - قَلْبَقُوءَ، قَلْبَقُوءَ، تاشقي

Alcalinité (F). Alkalinity (E). خاصية المواد القلوية. وهي اعتماد مقدار المذائب، في محلول ما او محيط ما، من رقم الاحتمال الممين وقدره سبعة الى ما فوق ذلك الرقم. راجع دالف.

٢٢٥٢٦ - قَلْبَقُوءَ، شَيْه قَلْبَقُوءَ (F).

Alcaloide (F). Alcaloid (E). مادة عضوية تتميز بنوعها المشابهة لخواص القلي.

٢٢٥٢٧ - قَلْبَقُوءَ هو اثنان القلي او الحرس، اطلها.

٢٢٥٢٨ - قَلْبَقُوءَ، قَلْبَقُوءَ، قَلْبَقُوءَ (F).

Alkali (F). Alkali (E). مواد مركبة من معدن واكسجين كالكلس والبيتاس والصودا والمُنْتِزِبا.

٢٢٥٢٩ - قَلْبَقُوءَ (F). Pâcurin commun (F).

هو تف البر، اطله.

٢٢٥٣٠ - قَلْبَقُوءَ عَطَمَاءَ، قَلْبَقُوءَ الزَرْع

Aelia rostrata (S). Aelia rostré, Punaise des céréales (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الفاسياتيات. جسمها مفلطح، اهليلي الشوزن، يملو نحو ١٢ مم. قوتها الى الخفسار الاصفر الملوّج يملو تبشر امر يتد من الرأس الى الكويل فالجففة فالخنجين. رأسها مخروطي. عظمها مستطيل. عينها صغيرتان. زباناها مستطيلتان. كوسلها قصي الشوزن. حجبها وحجبها سنانة الاطراف، ومقاربة الطول. قشراتها شفافة. يعلها وقوتها الى الخفسار الاصفر الاسمر الملوّج || مرثها النباتات النجيلية وبها الزروع || راجعها كربة.

وأجناسها وأنواعها قليلة العدد جميعها عشوية . انماثل
بم الأبل على البعل واست الواحد في قم الآخر || الحمر
فصائلها الخرطونيات .

Callanthemum (S).

٢٢٥٣٩ - ثَلْبَة

Callanthemum (F).

جنس نباتات عشية معمرة من فصيلة الشفويات . أنواعه
المعروفة قليلة جميعها اشجار جبلية برية تعيش في المناطق
التي يراوح ارتفاعها من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ م . جلدها
جلدية يتوصلها شراخ يملو حسب الأنواع من ١٥ الى ٣٠
سم . ويتهيأ زهرة متوسطة القند يفضاء اللون او وردية
ارواح عدد بتلاتها ٦ الى ١٦ . اولها جلدية
الانتشاب مستطيلة الزناد مشرمة وخرقة . احرف انواعه

C. rutae-folium (S).

لبلت ملاني الورق

C. corlandrifolium (S).

لبلت كزيري الورق

Salitr (F). To serve (E).

٢٢٥٤٠ - قم

قم وائم الفحل الايل : اشتعل عليها وضربها كلها .

٢٢٥٤١ - قِطَام

القِطَام : الأماكن التي لا تصيبها الشمس . الواحدة قِطَام .

Ectoplasia

٢٢٥٤٢ - قِطَامِي

جنس طير وحيد النوع من فصيلة الحانيات . يتميز
بامتداده جناحيه واثنكبيه . مناره دقيق البنية . رسته
قصير وسرود . غلبه الاوسط بين الانعكاف . واحده
قري اطلية .

Reproduction des oiseaux (F).

٢٢٥٤٣ - قِطَام

Reproduction of the birds (E).

القِطَام : سفاد الطير . وقيل زين راسع الطير .

Acidie (F). Acidium (E).

٢٢٥٤٤ - قِطَامَة

عارض جسمودي يكثر في الماهج ، يشو اوراق انبات
بزيادته التنصيلة التي تشبه القمع او البرق او الاناء .

Polycarpon (S).

٢٢٥٤٥ - قِطَامَة

Polycarpon (F). Polycarpon (E).

جنس نباتات عشية حولية برية من فصيلة النورانيات .
انواعها المعروفة ستة منها بعض اصناف اليلاد الحارة
والمعتدلة الحارة من العالم القديم || سيقانها خضراء ، معطها
متنصب وبسطها مستطيل . اوراقها مفصصة ، فصالحا
لحمية ، متالية الشكل ، مخنجة ، خلية البشرة . ازهارها
لاقامية للتجميع ، منها الفردية والثنائية والثلاثية والارباعية .
الوانها تراوح بين الوردي والوردي الاحمر او الازرقالي
المواج .

٢٢٥٤٦ - قِطَامِي

ايام من آخر ايلول بقدر شهور السنة يستدل منها فيما قيل
من حالة الهواء في كل شهر من السنة القابلة .

٢٢٥٤٧ - قِطَام

هو الاس الملبد الورق ، اطلية .

Vaccinium (S).

٢٢٥٤٨ - قِطَام

Airelle, Vaccinier (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الخلنجيات أنواعه
نحو ٤٠ فيها الشجيرات والنباتات والجنات . سيقانها
فصاء . اوراقها متعاقبة متبادلة . ازهارها وزية التجميع ،

Kaliya (S).

٢٢٥٣١ - ثَلْبَة

Kaliya (F). Kaliya (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم
وفصيلة البرسويات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
معظم بحار العالم . اجناسها صغيرة . اصدانها قبابية شبه
صويانية الشكل . تعيش لاصقة بالصخور . ليفها غزير
المادة .

٢٢٥٣٢ - ثَلْبَة

ما يترك من السبل عند اشتياؤه او ما تحبه النمل من السبل
في ظروف معينة .

٢٢٥٣٣ - ثَلْبَة مُتَعَبَة

Callist lunatus (S). Calliste orné (F).

Callist lunatus (E).

حشرة رانجة قانصة من فصيلة القليسيات وربة مخدبات
الاجنحة . تألف الاراضي الكلسية في التهام والحضاب
البحرية المرض || جسمها صغير القند يطول من ٦ الى ٧
م . رأسها قصير الخيط اذرق اللون فكها ضلحيان .
زبانها ضلحيان ، مستطيلان . صينها صغيرتان . كسلها
احمر اللون . ظفرها الى الحفرة الزاوية تملو اربع بقع
كبيرة وبقيتان صغيرتان لونها الى السواد الازرق المواج ||
ها جبل واحد في الحول . تسرح في التبار وتبيت في الليل ||
يرتقها تطول من ١٥ الى ١١ م . جسمها مربع السك ،
احمل اللون اسمر اللب ، اسود الرأس والشرج ، ضلع
التأثير الحادة . قوتها المواد الضعوية تسمى اليها بدون
انقطاع لانها شديدة النهم || طور الاكمال يستمر نحو
خسة اسابيع .

Callistidae (S).

٢٢٥٣٤ - قَلْيَسِيَّات

Callistidae (F). Callistidae (E).

فصيلة حشرات لاحة وقانصة من ربة مخدبات الاجنحة .
اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اصناف
العالم واخصها اليلاد الحارة || جميعها صغيرة القند او
متوسطة الطول الذي قلما يتجاوز ٢٥ م . اجناسها خلية
القشار ، جملة الالوان الزاوية الحامة . رؤوسها شبه
اسطوانية الجرم ، ناشزة العين ، مستطيلة الزباني ،
معتدلة الكواهل اللاباقمية الشكل ، لاحقة الانغام التساعية
الاعاديد الخوازية || تسرح في التبار وتبيت في الليل .
تسمى بصره ورشقة وتعتبر بطة || قوتها المواد الضعوية
المختلفة المصادر ولا تست في فريسة تستطيع اليها سيلا ||
اشهر اجناسها القليسية والثلنوس .

٢٢٥٣٥ - ثَلْبَة

هو ابلق القلع ، صفور من الجوامث صغير القند ابلق الثوب
يكثر من الزوف مل الصنخور ولذا سمي قليسي .

Fruits deséchés (F).

٢٢٥٣٦ - ثَلْبَة

Dried fruits (E).

هي الثيار المخلقة المرسية .

٢٢٥٣٧ - ثَلْبَة

هي السبرغولة ، اطلية .

Oligochaetes (F).

٢٢٥٣٨ - قَلْيَلَات الْهَلْب

Oligochaeta (E).

ربة من الحليقات المفرديات تتميز بمخلوطها من الواس
والايل والفاشيم . اما حلها فتشديد القصر ، قليل العدد
اذ لا يتجاوز اربعة ازواج في كل فتحة || فصائلها



ثَلْبَة



ثَلْبَة مَهْجَة

اوراقه ابيدة نخيلة ملتفة الاطراف تطول نحو ١٠ سم. ازهاره الى الحمرة الفاتحة. ثماره وردية اللون مأكولة ويستعمل ثمرها مشروب كحمولي للذئب الطم. اوراقه رافقانه ويجذره عاصمة تستعمل في الدبابة.

٢٢٥٥٥ - قِيَامُ كَبِيرُ الثَمَرِ

Vaccinium macrocarpum, *Oxycoccus macrocarpa* (S). *Airelle à gros fruits*, *Canneberge à gros fruits* (F). نوع من القِيَام، جنسه مشدودة تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه ابيدة سائنية تطول نحو ٣ سم. نصلها جامد الصفعة ملئت الحنار. ازهاره لائيمية التجميع فيها الاحادية والثلاثية والخناسية والسبامية والتناسية. ثماره مأكولة قطرها نحو ٢ سم.

Vaccinium arboreum (S). **قِيَامُ مَشْجَر**. *Airelle en arbre* (F).

نوع من القِيَام، شجرته تطول من ٤ الى ٨ امتار. فروعها واقفاها خلية البعاد. اوراقها عابلة سائنية تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها جامد النسيج، مالمس الصفعة العليا للامعة الخشار، خلي السفل البحرية اللون. ازهارها الى البياض الوردى. ثمارها سود حامزة حافصة لا تؤكل.

Ordures des villes (F). **قِيَامَة**. *Ordures de city* (E).

بقايا الماطين وكناسة البيوت والشوارع تستعمل في تسميد التربة وهي من الاسمدة العضوية.

Vacciniées (F).

٢٢٥٥٨ - قِيَامِيَّات

سبط من قصبية الخنسيات يشمل بعض الاجناس والالتواع. معظمها من نباتات جبال البلاد المعتدلة الحرارة. اشهر اجناسه القِيَام.

Nanisme (F). *Nanisme* (E). **قِيَامَة**.

خاصة في بعض النباتات والحيوانات تنمها من اتخاذ حجمها المألوف فتلبث صغيرة. من اسبابها الرئيسية في النبات فقر التربة ببعض العناصر الغذائية.

Vertex

٢٢٥٦٠ - قِمَّةُ الرَّاسِ

هي النافوخ، اعطبه.

Triticum (S).

٢٢٥٦١ - قَمَح * ، حِنْطَة

Blé, *Froment* (F). *Wheat* (E). *Weizen* (D). *Fromento* (I).

جنس نباتات عشبية زراعية حولية من فصيلة النجيليات بطورها جرزة دقيقة. سورها شطاه، قصبية، اسطوانية، مستقيمة، فارغة، سلاية التركيب، مصمتة البعد والاطراف التي تنتهي بالسنايل. سنايلها محورية مركبة من حدة سقبيات متتالية. اما الاشطاء فانها ترسية الانتشاب وهي حل فتبين امهات وبنيات فالامهات تلك التي سورها وسنايلها تطول قدر البيلة الرئوسية اما البنيات فتلك التي تتأخر عن الامهات وقد تكون سنايلها جامدة البر. اوراقها متعاقبة مستطيلة مركبة من قسمين، غمد طويل ملئت رنكز حل البعدة ويخفف السلاي ونصل ضيق مستطيل بدعي المصطف يرتكز عند قاعدة انفصاله عن البعد على لسين مسن الحنار وعلى اذنين تكتنفان الساق. اما ثمارها فيايسة لانفرجة تدعى البر. الواحدة برّة. تاويغّه - راجعه في كلمة حنطة.

محورية الارتكاز. ثمارها عتية الشكل، حامزة الطم. مأكولة || احرف ازواحه واضهرها ما يلي.

٢٢٥٦٩ - قِيَامُ أَحْمَر

Vaccinium vitis-idaea (S). *Airelle rouge*, *Myrtille ponctuée*, *Vigne de l'ida* (F). *Cow-berry*, *Whim-berry* (E). *Preiselheidebeere* (D). *Bacari vite idea*, *Mortella pungtata*, *Vigna d'orso* (I).

نوع من القِيَام جنسه ينال البلاد المعتدلة الحرارة. جنته تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقه سائنية صغيرة تطول نحو ٣ سم. نصلها بحري اللون على صفحته. ثماره الى الحمرة القريزية يستخرج منها بعد تحميرها وتقطيرها مشروب كحمولي للذئب الطم.

٢٢٥٧٠ - قِيَامُ آسِي

Vaccinium myrtillus (S). *Airelle myrtille*, *Abreder*, *Myrtille* (F). *Bilberry*, *Blackberry*, *Whortle-berry* (E). *Echte Heidelbeere* (D). *Bacari mirtillo*, *Mirtille*, *Uva ursina* (I).

نوع من القِيَام. جنته فناء تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها صغيرة القد آسية الشكل، نصلها جامد النسيج اخضر الصفعة. ازهارها وردية، خناسية الفصوص، عشارية الاسدية. ثمارها خرة اللون مأكولة ويستعمل منها كحول للذئب الطم || جلوره وانفاته واوراقه تستعمل في الدبابة.

٢٢٥٧١ - قِيَامُ الْمَنَاقِعِ

Vaccinium uliginosum (S). *Airelle des marais*, *Canneberge* (F). *Crauberry*, *Moss-berry* (E). *Mosshatdelbeere* (D). *Mortella di palude*, *Mortellina di lago*, *Scopa fructifera* (I).

نوع من القِيَام الملبول يكثر في المنائق الرطبة، ساه فراء تطول نحو ٨٠ سم. اوراقه عابلة صغيرة، القد، نصلها سائني الشكل يطول نحو ٣ سم. صفحت بحرية اللون. ازهاره احادية او ثلاثية التجميع. ثماره سكرية الطم مأكولة وصالحة للتقطير.

٢٢٥٧٢ - قِيَامُ جَبَلِي

Vaccinium arctostaphylos (S). *Airelle de Cappadocia*, *Thé de Trébizonde* (F). *Oriental whortle-berry*, *Trebizond tea* (E). *Broussatee* (D). *Tà di Brousse*, *Vaccinio di Cappadocia* (I).

نوع من القِيَام يكثر في بعض مناطق البلاد التركية. اوراقه ابيدة، نصلها جامد الصفعة الضيقة المسنة الاطراف. ازهاره قصبية الشكل بياض اللون احادية او ثلاثية التجميع. ثماره حامزة عصصة حراء اللون || اوراقه صعبة تستعمل استعمال الشاي.

٢٢٥٧٣ - قِيَامُ عَفْكَوْنِي

Vaccinium corymbosum (S). *Airelle à corymbos* (F). نوع من القِيَام جنسه تطول من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. ساقها وفروعها واقفاها سرحة. اوراقها عابلة تطول نحو ٧ سم. نصلها مفند الصفعة، قليل اللمعة. ازهارها وردية اللون، خناسية او سبامية التجميع، عتكرية الترتيب. ثمارها الى الزرقة السوداء وهي مأكولة وصناعية كحمولية.

٢٢٥٧٤ - قِيَامُ صَبِير * ، قِيَامُ شَاكِع

Vaccinium oxycoccus, *Oxycoccus palustris* (S). *Airelle commune*, *A. à maurets*, *Canneberge commune*, *Brimbelle* (F). *Small cranberry*, *Bog-berry*, *Fau-berry* (E). *Moosebeere* (D). *Bacari canneberg*, *Vaccinio dei paduli* (I).

نوع من القِيَام، ساهه مسطحة تطول من ٢٠ الى ٨٠ سم.



قام احمر



قام آسي



قام المنائق



قام جبل



قام صبير

٢٢٥٦٧ - قَمْحُ صَبْ ، قَمْحُ قَسِر

Triticum durum (S). Blé dur (F).

من الأنواع الجرد تكثر زراعته في بلاد حوض البحر المتوسط. ضروبه وأصرامه كثيرة العدد. ساقه مستقيمة أو مقلوبة. سنابلها مقوية. برءه مستطيل الشكل صلب المكسر.

٢٢٥٦٨ - قَمْحُ تِين

Triticum sativum (S).

Blé tendre (F). Common wheat (E). Saatweizen (D). Fromento, Fromento, Blada, Grano (I). من الأنواع الجرد تكثر زراعته في البلاد الأوروبية والأمريكية ضروبه كثيرة العدد وأصرامه أيضاً. ساقه مجنونة سنابلها كبيرة القند منها البقوية واللافقوية. برءه لانياس الشكل واللون. لين المكسر اللين.

٢٢٥٦٩ - قَمْحُ تَشْوِي

Triticum dicoccum, T. amyleum (S). Blé de Jérusalem, Amidonnier (F). Two grained wheat, Emmer wheat (E). Emmer, Emmerweizen, Emmerkorn (D). Fromento di Gerusalemme (I).

من الأنواع المكثية. زراعته محصورة ببعض جهال أروبة الوسطى والشرق الأدنى. ضروبه وأصرامه قليلة. ساقه فارغة. سنابلها كثيفة مقوية. برءه حنطي اللون، أبيض المكسر، غزير اللادة التشوية.

٢٢٥٧٠ - قَمْحُ وَحِيدُ الْحَبَّةِ

Triticum monococcum (S). Blé locular, Engrain, Petit épeautre (F). One grained wheat, Small spelt (E). Einkorn, Einkornweizen (D). Fromento loculare, Piccola spelta (I).

من الأنواع المكثية. زراعته معروفة في ألمانيا وبغيتاريا ورومية. ساقه فارغة. سنابلها مستطيلة مقوية. سنابلها وسيدة الحبة. برءه حنطي اللون اسمر المواج.

٢٢٥٧١ - قَمْحُ

Lune (F). Moon (E).

جرم شمسي كروي الشكل يشهد ضوؤه من الشمس ويكسبه حل الأرض. وهو أقرب الأجرام إليها فقلبه يبلغ نحو ٣٥٠٠ كلم. وحجمه نحو ثلثي من حجم الأرض وهو يدور حولها في فلك إهليلجي بعد أوجه منها، وهو المسافة القمرية، يبلغ نحو ٣٥٤٥٨٠ كلم. ويحده قمره، وهو المسافة البعيدة، يبلغ نحو ٤٠٤٧٥٠ كلم || ولقمر ثلاث حركات، اليومية واليلية والصمودية وهو ينتج دورته حول الشمس في أربعة أسابيع. والحركة الصمودية هي التي يشهد عليها في حساب السنة القمرية التي يبلغ عدد أيامها ٣٥٤ يوماً أي أنها تنقص ٥٨ دقيقة من السنة الشمسية || أما الشهر القمري فعددته ٢٩ يوماً و١٢ ساعة و١٤ دقيقة.

٢٢٥٧٢ - قَمْحُ

Caranx lune (S).

لوح من الشم. وهو سمكة بحرية مأكولة كبيرة القند تطول نحو ٦٥ سم. أعطانها مياه بحار البلاد المطلة لتوسد في المتوسط. تكثر في مناطقه الشمالية.

٢٢٥٧٣ - قَمْحُ التُّفَّاحِ

Echadure lenticulaire (F).

Lenticel spotting, Apple scald (E). عارض يصيب ثمار التفاح والأجاص الخفزية في البراد منه جميع بعض الفنازات الناتجة من تنفس الثمار في أثناء خزنها || مظهره الخارجي بقع صغيرة بيضاء اللون تملأ سطح البشرة ثم تنتشر رويداً رويداً إلى أن تغطيها بكاملها فتتسبب عندئذ صلب الآليات على عمق يراوح من ٢ إلى

القلبي - يحتاج القمح في دورته الحياتية القائمة بين انتاعه واستحصاده إلى كمية من السرعات الحرارية يراوح فيها بالنسبة إلى مختلف ضروبه وأصرامه من ١٧٠٠ إلى ٢٢٠٠ سرعة. ولا يحصل انتاع إذا كانت الحرارة دون تلك السرعات. أو فوق ٤٥ درجة سخ. أما أصلح حرارة لانياته فهي التي يراوح معدلها من ٢٢ إلى ٢٨ درجة سخ. لذلك يمكن القول أن أقليم الحنطة يشمل العالم باستثناء المناطق القطبية والجبلية العالية ومناطق خط الاستواء التي يراوح ارتفاعها من سطح البحر من صفر إلى ٢٠٠٠ م. تربه - يثبت القمح في مختلف الأترية التي ألها بالزراعة المتتالية لكنه يرغب في الأترية العميقة القور المنسوبة التركيب الحنكي المتوسط الاندماج التي تستحب الانطار وتحتفظ على الرطوبة ولا يحد في الأترية الكلسية والربوية لأنها تجف سريعاً وهو يخشى الأترية الطينية المنتجة لأنه يتضرر من تماسكها بين مفاهيم يفيضها الرطوبة المفرطة والجفاف الزائد.

أنواعه - أنواعه الزراعية سبعة أما ضروبه وأصرامه فكبيرة العدد. وأنواعه الرئيسية هذه قسم إلى قسمين: ١- الأنواع الجرد وعددها أربعة والأنواع المكثية وعددها ثلاثة. فالأنواع الجرد التي تنفصل فيها البر من صفاتها والتي تتميز بلبين قمار سنابلها ولدانتها وعدم انفصالها، أربعة: القمح الصلب والقمح القين والقمح البولوني والقمح الشنن. ٢- الأنواع المكثية التي لا يتفصل برءها عن صفاتها والتي يسهل انتعاص سنابلها وقصها فهي: القمح الربوي والقمح الشري والقمح الوحيد الحبة.

٢٢٥٧٢ - قَمْحُ الْبَقَرِ

Sarrasin ménager, Bucali (F).

هو السرازان المرووف، أطلبه.

٢٢٥٦٣ - قَمْحُ الْبَقَرِ الْهَنْدِي

Blé de Tartarie (F).

هو السرازان التري، أطلبه.

٢٢٥٦٤ - قَمْحُ بُولُونِي

Triticum polonicum (S). Blé de Pologne, Froment de Pologne (F). Polish wheat (E). Polnischer Weizen (D). Fromento di Polonia (I).

من الأنواع الجرد تكثر زراعته في بعض مناطق أروبة وأفريقية الشمالية. ضروبه وأصرامه عديدة. برءه شديد الاستطالة، جامد المكسر الصلب.

٢٢٥٦٥ - قَمْحُ تَحْنِيْن ، قَمْحُ عَرَبِي

Triticum turgidum, T. vulgare (S). Blé renflé, Froment renflé, Poulard, Gros blé (F). Humpy grained wheat, Turgid wheat, River wheat (E). Engilischer Weizen (D). Fromento turgido, Grani grossi (I). من الأنواع الجرد. تكثر زراعته في الشرق العربي لكنه يرغب في الأترية الحارة الوافرة المواد الغذائية. ساقه مستقيمة في أصلها. سنابلها مربعة الأصغر، كثيرة البر. برءه غليظة مخدبة، صلبة المكسر.

٢٢٥٦٦ - قَمْحُ رُبُونِي، قَمْحُ مَكْتَسِر، عَدَس، عَدَسْ رُونِي

Triticum spelta (S). Blé vètu, Epeautre, Grand épeautre (F). Spelt wheat, Dinkel wheat (E). Speiz-Weizen (D). Spelta, Marzolo, Fromento rosso (I). من الأنواع المكثية. زراعته محصورة بالأقاليم الباردة والجبلية. ضروبه وأصرامه معدودة. ساقه عالية فارغة. سنابلها فرقة، مستطيلة، مقوية، لانياس يختلف باختلاف الضروب منها الأبيض والأحمر والأسمر.



ح

٢٢٥٨٠ - قمرُون هو الاربيان ، اطلبه .

٢٢٥٨١ - قمرُون رَشِيق (F). *Gnatophylle élégante*

دوية من القشريات وفصيلة القريدسيات مشهورة باسم هوبر . اطلبه .

٢٢٥٨٢ - قمرِي (F). *Lunais*

٢٢٥٨٣ - قمرِي (F). *Luniforme, Lunulaire*

٢٢٥٨٤ - قمرِي (F). *Lunifrom*

لمت تعري يوصف به ما كان شكله شكل القمر .

٢٢٥٨٤ - قمرِي (F). *Ectopistes migratoria*

٢٢٥٨٤ - قمرِي (F). *Ectopiste migrateur*

طائر من القهارى وفصيلة الحاميات كنيته ابو ذكري وابر طلحة . الانثى قرية والجمع قاري وقر في يروي ان هبة الرحمن بن أبي بكر الصديق لما تلقى زوجته حاتكة ، زولها عنه رغبة ابيه ، كان يشد :

احاتك لا اتسأك ما ذر شارق

وسا نلع قمر الحام المطوق

ولم ار مثلي طلق اليوم قطي

ولا مثله من غير جرم يطلق

احاتك قلبي كل يوم ويلي

اليك بما تحقني النفوس معلق

ها خلق جزل ورأي وينصب

وعلق سوي في الحياة ومنلق

فرق له ابوه وامره ان يربحها || والقري طائر طوله نحو ٤٠ سم . ظهره الى الزرق الرصاصية متفك بنفسجي المواج . صدره وبيضه الى الصبغة الصنائية . زكاه ابيض الريش . انفيكه رصاصي الانتشاب اربد الطرف متفرقه بقع سود . جناحه اسود الوسط رمادي الاطوار والحافة . منقاره اسود . عيناه برتقاليان ، جفونها حر . الانثى اصفر قدام الذكر وادكن قويا واقل مائية || موطنه فسح الارباء يم جميع البلاد . وهو من الطيور القواطع التي تجوب البلاد سميا وراء الرزق وليس في سبيل المصيف والمشي . اسرايه كيفية يراوح عدد افرادها من ٥٠ الى ١٠٠٠٠ . قوته الحبيب والبؤور . يدن حته في الاجبار . اناته تبيض من المرتين الى الثلاث مرات في السنة .

٢٢٥٨٥ - قمرِيَات (F). *Menispermaceae*

٢٢٥٨٥ - قمرِيَات (F). *Menispermaceae*

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اسماها || اجناسها ٣٠ وانواعها ١٠٥ . اصلها البلاد الاسيوية والامريكية تكثر في المناطق رطب وشفات الانهار . معظمها من اجنبات المارسة . اوراقها متعاقبة منقطة . ازهارها صغيرة القذ ، متعقبة التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها نورية صغيرة الحبر .

٢٢٥٨٦ - قمرِيَة هي حشيشة القمر ، اطلبه .

٢٢٥٨٧ - قمرِيَة * ، حبّ الهلال ، سمّ الحوت

٢٢٥٨٧ - قمرِيَة (F). *Menispermum*

٢٢٥٨٧ - قمرِيَة (F). *Monsamee*

٢٢٥٨٧ - قمرِيَة (F). *Monsamee*

٢٢٥٨٧ - قمرِيَة (F). *Monsamee*

٢٢٥٨٧ - قمرِيَة (F). *Monsamee*

٢٢٥٨٧ - قمرِيَة (F). *Monsamee*

٢٢٥٨٧ - قمرِيَة (F). *Monsamee*

٢٢٥٨٧ - قمرِيَة (F). *Monsamee*

٥ م . || يمكن اجتنبه : ١ بالتبريد المعتدل والتهوية الجيدة . ٢ بعدم الافراط في ري الاشجار قبل ثمن الجلي . ٣ بجني الثمار حته يده اذراكها حيث تكون نسبة المولد الاثيرة المختلفة على احسن حال .

٢٢٥٧٤ - قمر الليل (F). *Citharinus Geoffroyi*

٢٢٥٧٤ - قمر الليل (F). *Citharinus*

قر الليل هو الاسم المصري . سمكة نهريه يبيض من مفتوحات الشانة وفصيلة السمكيات . موطنها النيل من منتهى الى مصبه . تعيش في الاسمال والاوراح || جسمها كبير القذ ، مبط الجرم ، بطول نحو ٥٠ سم . عرضها ، من حافة بطها الى قاعدة زعنفتها الظهرية الأولى ، نحو ٢٥ سم . رأسها صغير الحجم ، شبه اسفني الشكل . شدتها قليل الانفرج . انتابها صغيرة حادة ، على صف واحد . زعنفتها الظهرية الأولى كبيرة القذ شبه هرية الشكل ، اما الثانية صغيرة . زعانفها الصدرية والحوضية صغيرة الجرم . زعنفتها الشرجية مسطولة ناعمة المقدم . زعنفتها الذيلية فائقة ، رحية الانفرج || نواها الى الشبة الغضبية مما دس الى تسميتها بقمر الليل || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*

٢٢٥٧٥ - قمرَكه (F). *Fauvette des Jardins*



قر الليل



قروش



قروش مهذب



قري



قريَة

٢٢٥٧٨ - قمرِيَات (F). *Glomeris*

٢٢٥٧٨ - قمرِيَات (F). *Glomeris*

٢٢٥٧٨ - قمرِيَات (F). *Glomeris*

٢٢٥٧٨ - قمرِيَات (F). *Glomeris*

٢٢٥٧٨ - قمرِيَات (F). *Glomeris*

٢٢٥٧٨ - قمرِيَات (F). *Glomeris*

٢٢٥٧٨ - قمرِيَات (F). *Glomeris*

٢٢٥٧٨ - قمرِيَات (F). *Glomeris*

٢٢٥٧٨ - قمرِيَات (F). *Glomeris*

٢٢٥٨٨ - قَمْزِيَّةُ الصَّيْنِ

Menispermum dauricum (S). Ménisperme de Daourie, M. de Chine (F).

جنية زُرْبِينَة عارضة تملو نحو ٤ اثمار ، اوراقها مستطيلة المسك ، احليجية الشكل ، خماسية التفصيص ، نصلها مائل البثرة اللامعة على صفحتها . ثمارها الى الجلوة الغالطة || انزعاجها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٥٨٩ - قَمْزِيَّةُ كَنْدَا

Menispermum canadense (S). Ménisperme du Canada (F).

جنية زُرْبِينَة عارضة تملو نحو ٤ اثمار . اوراقها كلية الشكل خماسية أو سباعية التفصيص ، نصلها مائل الصفحة العليا ، خلي المروق على السفلى ، ثمارها الى السواد اللامع || انزعاجها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٥٩٠ - قَمْصُ اسْوَدَّ

Tipula nigra (S). *Tipula nigra* (F). Black tipula (E).

حشرة من فصيلة القمصيات . جسمها اسطواني الشكل ، مستدل القدر ، يطول من ١١ الى ١٥ سم . || ثوبها الى السواد الاسمر . وروشها الى البصرة العابقة ، زباناها عيطيان ، مهدبان || الاثني اكبر قدماً من الذكر واصغر ووشناً منه || تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى ايلول . تألف المئات والغابات الظليلة || تمتع الاثني كمكها في التربة ينبت من يرقات تعيش على المواد النباتية والمضوية المنحلة .

٢٢٥٩١ - قَمْصُ الْبُقُولِ *

Tipula cleracea (S). *Tipule potagère* (F). Leatherjacket (E). Wiesenschnake (D).

حشرة من القمصيات طولها يراوح من ١٥ الى ٢٣ سم . جسمها واجنتها وارجلها مستطيلة . لونها الى الخطي تشوبه صفرة زيتية . ذكرها اصفر حسيماً من انثاه . والاثنى تمتع كمكها في ايارن الربيع على سوق الزروع وغفلت نباتات المرامي والمروج ينبت من يرقات صفرة نمة تلثم الجلود وقد تركب الاوراق وتؤذيها . وهي تسرح في الليل وتبيت في النهار . لها جيلان في الحول ، الاول في الربيع والثاني في الصيف .

٢٢٥٩٢ - قَمْصُ كَبِير

Tipula maxima (S). *Tipule maximale* (F). Major tipule (E).

حشرة لامؤذية من فصيلة القمصيات . جسمها مستطعم كبير ، يطول من ٢٧ الى ٤٠ سم . || ثوبها الى الخطي الاسمر . وروشها مهدبان بالابيض والوردي الباهت || زباناها مرفقيان ، مهدبان ، تتميز بكمز القدره وبامتدالة للقران || الذكر اصفر قدماً من الانثى . تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى تشرين الثاني . تألف الاسكن الرطبة وصفاف مجاري الماء ، تمتع الاثنى كمكها في التربة . يرقاتها تعيش على المواد المضوية والنباتية المنحلة .

٢٢٥٩٣ - قَمْصِيَّة

Sauterelle à l'éclosion (F).

الجرادة عند تفقيها . ج . قص .

Tipulidae (S). *Tipulidae* (F). *Tipulidae*, Crane flies (E). *Schnaken*, *Riesenschnaken* (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها

عديدة لا تقل عن ٥٠٠ من معظمها من الحشرات الثائفة او القليلة الضرر . تعيش على ريق الانهار واوراق الاوراق . تكثر في الاسكن الرطبة القليلة وعلى صفات الانهار . يرقاتها تعيش في الماء او قرب الماء في التربة والريال على مختلف المواد المضوية والنباتية المتخرسة .

٢٢٥٩٥ - قَمْطُول

Antedon (S). *Antedon*, *Comastule* (F). *Comastule* (E).

جئس حيوانات بحرية من زنايق البحر وفصيلة القمطوليات . انواعها المعاصرة المدربة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها عشارية الاصابع القابلة للانطواء والتمصيص . احادية الساق النحيلة المنخفضة عند الادوك || نسج بواسطة اصابعها . يكثر وجودها حيث يكثر اخذ الطرخ || اعرف انواعها القمطول الاجر والقمطول الوردي .

٢٢٥٩٦ - قَمْطُولِيَّات

Comatulidae (S). *Comatulidae* (F). *Comatulidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من زنايق البحر . اجناسها وانواعها المعاصرة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميع انواعها ثابثة مستقرة حتى نهاية زين قوتها ثم تتحول الى متغلة بجولة تقوم وتلتصق بالاشياء بواسطة زوائد عديدة || اشهر اجناسها القمطول .

٢٢٥٩٧ - قَمْص

Entonnoir (F). *Funnel* (E).

جهاز يوضع على فم الاناء فيسبب فيه الماء ويغير . ج . قمع .

٢٢٥٩٨ - قَمْص ، قَمْع

Cupule كأس صفرة كلية غشبية التركيب تحيط بجوار بعض الاشجار كالبلوط والبتدق .

٢٢٥٩٩ - قَمْعَة

ذباب يركب الايل والظباء اذا اشتد الحر . ج . قمعع وقمع (السان) .

٢٢٦٠٠ - قَمَمَل

Bourgeonner (F). *To bud* (E).

قمل النبات : خرجت قاصيله اي براعمه .

٢٢٦٠١ - قَمَمَلَة

Bourgeonnement (F). *Budding*, *Sprouting* (E).

هي نمو قاصيل النبات وزمعاها . وهي مجموعة المناشع التي تتابع تكوين البراعم ونموها .

٢٢٦٠٢ - قَمْزُونَةُ حَمْرَاءُ *

Catocala nupta (S). *Lichénée rouge*, *Marisée* (F). *Catocala nupta* (E).

حشرة من الفصليات مرشقات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اردوة . يرقاتها وائمة قوتها رقيق الانهار . سرقتها تعيش على اوراق الخور والصفصيات || جسمها كبير القد يطول نحو ٣١ مم . بسطها تراوح من ٧٤ الى ٧٨ مم . رأسها كسني الين . صيادها كيرتان . زباناها عيطيان . جوشها وبطنها الى الكسني الاكلت || وروشها الاماميان الى الريدة السمره يطولها زراكن وتزاورق خلفه الالوان البني والكسني والازرق الاطلح . حناها انخاري متتابع الاقواس الحلاقية السمره . وروشها الخلفيان الى الحمرة القرمزية يطولها طرق مجوري وبيدة وسطى من اللون نفسه || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو سمة اصابع وتمتص الحنك مبادياً



قص البقول



قَمْزُونَةُ حَمْرَاءُ



فُصُونَةُ زَرْقَاءَ



قَمِيَةِ التَّيْنِ



قَمِيَةِ التَّيْنِ

في شقوق لحاء السوق والافصان || السرة تطول نحو ٧٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها الى الطحله الخضراء يملؤها تنيش دقيق اسود ونقط جانبية فردية حراء اللون. رأسها الى الجلاوة. مدنها ورواجبها الى النطلة السراء || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي ضمن صلبة تحببها السرة بين الاوراق التي يجسمها الى بعضها بعض.

٢٢٦٠٣ - قُمُونَةُ زَرْقَاءَ *

Catocala fraxini (S). Lichenée bleue, Lichenée bleue (F). Catocala fraxini (E).

حشرة من النعيقات حرشقيات الاجنحة. موطنها عند من الشرق الاتص الى ادوية وافريقية الشالية. فراشها واحة قوتها مفر الاضرار. سرتها تعيش على نصال الاوراق || جسمها كبير القند بطول نحو ٣٥ م. يسطها تراوح من ٩٢ الى ٩٦ م. رأسها كخني اللون اسمر المواج. صناعها كيرتان. ذواتها عيجان. جوشها ويطنها الى الكسني الاسمر تملو ماجة غبراء || روشاها الاماميان الى الطحله السراء يملوها ستة صفوف من الزراكش الكسنية اللون. روشاها الخلفيان الى الكسني الكلف تملو جده مقيمة قاطبة زرقاء اللون || لها جبل واحد في الخول. تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو خسة اسابيع وتضع المكن مبيدا في شقوق لحاء السوق والافصان || السرة تطول نحو ٨٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها الى الطحله تملوها نمرة زرقاء ونقط سود جانبية. رأسها الى الطحله الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن صلبة تحببها السرة بين طيات القشور او تحت اللحاء.

٢٢٦٠٤ - قُمُونَةُ ، قُمُونَةُ دوية (السان).

٢٢٦٠٥ - قُمُونَةُ

Bourgeon à feuille (F). في البرعة الورقية. ج قاقيل. Leafy bud (E).

٢٢٦٠٦ - قُمِيَةِ

Infundibuliforme (F). Infundibular, Infundibuliform (E).

نمت تعريف يطلق على ما كان شكله كالقبع. ويطلق في علم النبات على التوريجات و متحدة القناعات و القمية الشكل.

٢٢٦٠٧ - قُمِيَةِ التَّيْنِ * ، حَشَرَةُ التَّيْنِ

التَّيْنِيَّانِيَّةُ كُوشِيلُ التَّيْنِ Astarolecanium كوشيل التين sambuci (S). Cochenille du figuier (F). حشرة صغيرة من القرمزيات. جسمها مستدير الشكل ظهره نحو ٣ م. لونها الى الصفرة الخضراء المواج. تركب في التين الانسية اللينة قسب حيث تمل تجايف صغيرة يزداد ارتفاع حافتيها مع طول اقامة الحشرة.

٢٢٦٠٨ - قُمِيَّاتِيَّات

Anaplores رتبة حشرات من طبقة القمليات. فصائلها واجناسها وانواعها عديدة، زهاء ٢٠٠ منها ٢٤ نوعا يركب الانسان والحيوانات البينة الداجنة. اما الانواع الالبانية فضرري الحيوانات البرية من القردة الى الفئران || والقمليات حشرات مدممة التطور والاجنحة، جسمها صغير القند مفلطح الشكل. رأسها وتدي. متكها ثقب ماص. قوتها

الاستشعاري مركب من ٥ فواصل صغيرة. رسلها وسيد المقلعة ينتهي بمقلع حاد قروي || تعيش طفيلية حسل الانسان والحيوان البين. تنصص الدماء وتسبب الامراض التي تنقلها || اشهر فصائلها القرمزيات والقرمزيات.

٢٢٦٠٩ - قُمِيَّاتِيَّات Flacon (F). Case-bottle (E).

انه من نحاس او زجاج يحكم السد يحفظ فيه السائل

٢٢٦١٠ - قُمِيَّاتِيَّات الجبش راجع سكية الجبش.

٢٢٦١١ - قُمِيَّاتِيَّات الحيشان Cyane (F).

هو القشر ، دوية بحرية من القشريات ، اطلبه .

٢٢٦١٢ - قُمِيَّاتِيَّات الرأس هو القرفة ، اطلبه .

٢٢٦١٣ - قُمِيَّاتِيَّات الصاغة هو الطيور ، اطلبه .

٢٢٦١٤ - قُمِيَّاتِيَّات الكتب هو ناسم الكتب ، اطلبه .

٢٢٦١٥ - قُمِيَّاتِيَّات في الدمة ، اطلبه .

٢٢٦١٦ - قُمِيَّاتِيَّات البرققال السوداء

هي قمرزية البرققال السوداء ، اطلبه .

٢٢٦١٧ - قُمِيَّاتِيَّات الفخاح هي وزية التفاح ، اطلبه .

٢٢٦١٨ - قُمِيَّاتِيَّات الثوت هي قمرزية الثوت ، اطلبه .

٢٢٦١٩ - قُمِيَّاتِيَّات التبات هي القرمزية ، اطلبه .

٢٢٦٢٠ - قُمِيَّاتِيَّات الزرد هي قمرزية الورد ، اطلبه .

٢٢٦٢١ - قُمِيَّاتِيَّات ساجوزو

هي القرمزية الفتاكة ، اطلبه .

٢٢٦٢٢ - قُمِيَّاتِيَّات

Psocopteroïdes (F). Psocopteroïdes (E).

طبقة حشرات صغيرة القند ثائية ماصة وقارضة من شعبة الحيات. تطورها تدريجي. لا ملامس شرجية لها. قوتها المواد العضوية والنباتات القطرية || رتبها ثلاث القمليات والقمليات والقمليات.

٢٢٦٢٣ - قُمِيَّاتِيَّات الماء Hydrachnidae (S).

Hydrachnidae (F). Hydrachnidae (E).

فصيلة حشرات صغيرة القند من رتبة القمليات اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها مائية معظمها طفيلي .

٢٢٦٢٤ - قُمِيَّاتِيَّات Tique (petite) (F).

Tick (small) (E).

القرادة اول ما تكون صغيرة ثم تصير لحفنة ثم قرادة .

٢٢٦٢٥ - قُمِيَّاتِيَّات *

Calceola (S).

Calcolea (F). Calcolea (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة التحيقيات. انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من متحركات الاحساب الاول والطبقة البياشيرية ، وبعضها يعيش على الصغور المعفورة البعيدة النور في بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصنافها قمية ، شبه غروبية الشوزن ، للولاية الغشاء الداخلي .

٢٢٦٢٦ - قُمِيَّاتِيَّات Bruant proyer (F).

صغور من الدرس يدعى الاكمل اطلبه .

٢٢١٣٧ - **فيميس** ، **قنأ**
Légumes secs (F). Pulses (E).
هي البقول الجافة من أي نوع كانت .
٢٢١٣٨ - **قنأ**
هو الحم ، البهت المد المدجاج .

٢٢١٣٩ - **قنأ**
Canna (S).
Canna, Balsier (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).



قنأ

جنس نباتات عشبية جلمودية معمرة من فصيلة القنويات.
أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والبنفسجية . بعضها
متسببة ، أوراقها متضامة كبيرة ، نصلها جامدة . أزهارها
سنبلية التجميع حامية الارتكاز || أهراف أنواعها وأشهرها
ما يلي .

٢٢١٤٠ - **قنأ الهند** ، **مكارزون**
Canna indies (S).
Canna d'Inde, Balsier d'Inde (F).

نوع من القنأ ضروب وأصرامه وبهجته عديدة . جميعها
ترتيبية . بعضها خضراء تملو من ١٠٠ إلى ١٨٠ سم.
أوراقها تطول نحو ٥٠ سم. وتعرض من ٢٠ إلى ٢٥ سم.
أزهارها حراء اللون أو وردية يعلوها شمع أصفر متفارت
الاتساع || أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢١٤١ - **قنأ رهل** ، **قنأ سحلي**
Canna flaccida (S). Canna à fleurs d'orchidées, Balsier flasque (F).

نوع من القنأ الزرني . ضروب وأصرامه وبهجته عديدة .
ساقه فسقية اللون تملو من ٨٠ إلى ١٦٠ سم. أوراقها
ضيضة الزام الأول ثم سنائية تطول من ٢٠ إلى ٦٠ سم.
أزهارها تشبه أزهار السحلب ، لونها إلى الصفار الكبري .
وهي كبيرة الشريقات المستديرة المتسببة للوسلة .
أزهارها يستمر طوال السنة .



قنأ النمر

٢٢١٤٢ - **قنأ زنبقي**
Canna filiflora (S).
Canna à fleurs de lys, Balsier à fleurs de lis (F).

نوع من القنأ الزنبقي ألونه القرف . ضروب وأصرامه
قليلة البعد . ساقه خضراء اللون غليظة تملو نحو ٢٠٠ سم.
أوراقها كبيرة اللد تطول من ٩٠ إلى ١٢٠ سم. وتعرض
من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أزهارها زنبقية الشكل ، حاجية اللون ،
قواسم القرف الطري ، كبيرة اللد تطول نحو ١٥ سم .
أزهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢١٤٣ - **قنأ سوسني**
Canna lridiflora (S).
Canna à fleurs d'iris, Balsier à fleurs d'iris (F).

نوع من القنأ الزنبقي . ضروب وأصرامه وبهجته عديدة .
ساقه حراء اللون حتى تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها كبيرة
اللد ، سنائية الشكل ، نصلها خالي الصفة السفلى . أزهارها
قرمزية تطول نحو ١٦ سم. شرباتها ثنائية التفصيص .
أزهارها يستمر طوال فصل الربيع .



قنأ

٢٢١٤٤ - **قنأ مأكول**
Canna comestible (S).
Canna comestible, Balsier comestible (F).

نوع من القنأ الزراني . ساقها كبيرة اللد ، لبوها لشري
للمادة شائع الاستعمال النذالي . ساقه حراء اللون مستطيلة
تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها حراء اللون
سنائية النصل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ويعرض نحو ١٨.
أزهارها متوسطة الحجم تملو نحو ٨ سم. لونها إلى الحمرة
الساكنة ، باطنها يرتقالي || أزهارها يستمر من حزيران
إلى تشرين الأول .

٢٢١٣٧ - **فيميس** ، **قنأ**
Koumis, Koumys (F).
Koumiss, Koumiss (E).
مشروب يستخرج من لبن الخيل المختصر وهو شائع الاستعمال
في بعض الأقطار الآسيوية .

٢٢١٣٨ - **قنأ** ، **جلباب**
Cape
قلعة من نصل ورقة التبغ ألحاف تصلح لتغليف السيكار ،
أطب كآب .

٢٢١٣٩ - **قنأ** ، **قنأ**
Canna (S).
Canna, Balsier (F). Flowering reed (E). Blumenrohr, Krebsblume (D). Canna, Cannacoro (I).

جنس نباتات عشبية جلمودية معمرة من فصيلة القنويات.
أنواعها عديدة منها البرية والزرينية والبنفسجية . بعضها
متسببة ، أوراقها متضامة كبيرة ، نصلها جامدة . أزهارها
سنبلية التجميع حامية الارتكاز || أهراف أنواعها وأشهرها
ما يلي .

٢٢١٤٠ - **قنأ الهند** ، **مكارزون**
Canna indies (S).
Canna d'Inde, Balsier d'Inde (F).

نوع من القنأ ضروب وأصرامه وبهجته عديدة . جميعها
ترتيبية . بعضها خضراء تملو من ١٠٠ إلى ١٨٠ سم.
أوراقها تطول نحو ٥٠ سم. وتعرض من ٢٠ إلى ٢٥ سم.
أزهارها حراء اللون أو وردية يعلوها شمع أصفر متفارت
الاتساع || أزهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢١٤١ - **قنأ رهل** ، **قنأ سحلي**
Canna flaccida (S). Canna à fleurs d'orchidées, Balsier flasque (F).

نوع من القنأ الزرني . ضروب وأصرامه وبهجته عديدة .
ساقه فسقية اللون تملو من ٨٠ إلى ١٦٠ سم. أوراقها
ضيضة الزام الأول ثم سنائية تطول من ٢٠ إلى ٦٠ سم.
أزهارها تشبه أزهار السحلب ، لونها إلى الصفار الكبري .
وهي كبيرة الشريقات المستديرة المتسببة للوسلة .
أزهارها يستمر طوال السنة .

٢٢١٤٢ - **قنأ زنبقي**
Canna filiflora (S).
Canna à fleurs de lys, Balsier à fleurs de lis (F).

نوع من القنأ الزنبقي ألونه القرف . ضروب وأصرامه
قليلة البعد . ساقه خضراء اللون غليظة تملو نحو ٢٠٠ سم.
أوراقها كبيرة اللد تطول من ٩٠ إلى ١٢٠ سم. وتعرض
من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أزهارها زنبقية الشكل ، حاجية اللون ،
قواسم القرف الطري ، كبيرة اللد تطول نحو ١٥ سم .
أزهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢١٤٣ - **قنأ سوسني**
Canna lridiflora (S).
Canna à fleurs d'iris, Balsier à fleurs d'iris (F).

نوع من القنأ الزنبقي . ضروب وأصرامه وبهجته عديدة .
ساقه حراء اللون حتى تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها كبيرة
اللد ، سنائية الشكل ، نصلها خالي الصفة السفلى . أزهارها
قرمزية تطول نحو ١٦ سم. شرباتها ثنائية التفصيص .
أزهارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢٢١٤٤ - **قنأ مأكول**
Canna comestible (S).
Canna comestible, Balsier comestible (F).

نوع من القنأ الزراني . ساقها كبيرة اللد ، لبوها لشري
للمادة شائع الاستعمال النذالي . ساقه حراء اللون مستطيلة
تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها حراء اللون
سنائية النصل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ويعرض نحو ١٨.
أزهارها متوسطة الحجم تملو نحو ٨ سم. لونها إلى الحمرة
الساكنة ، باطنها يرتقالي || أزهارها يستمر من حزيران
إلى تشرين الأول .

٢٢١٣٧ - **فيميس** ، **قنأ**
Koumis, Koumys (F).
Koumiss, Koumiss (E).
مشروب يستخرج من لبن الخيل المختصر وهو شائع الاستعمال
في بعض الأقطار الآسيوية .

٢٢١٣٨ - **قنأ** ، **جلباب**
Cape
قلعة من نصل ورقة التبغ ألحاف تصلح لتغليف السيكار ،
أطب كآب .

Connaraceae (S).

٢٢٦٥٦ - قناريات ٥

Connaracées (F). Connaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . مركزها التنسيقي يأتي بين الورديات والقطانيات . اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد ، اطلابها معظم المناطق الحارة من المابين القديم والجديد باستثناء أستراليا || نباتاتها جنبت شائكة . اوراقها صغيرة ، متقابلة فصالحا سنانية الشكل ، مجرية الخصار . ازهارها محورية ، صغيرة ، متنفقة || أشهر اجناسها القنارة .

Pimelia (S).

٢٢٦٥٧ - قنار ٥

Pimélie (F). Pimelia (E).

الواحدة قنارة . جنس حشرات من غمديات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفصيلة البشيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم القديم || اجسامها مختلفة الاحجام يكثر فيها الاعتدال ويقلب فيها الشكل الاهليبي ورؤوسها صغيرة . قرونها الاستشعارية معتدلة الطول . كوتلسها خروطية . الحماها لاحقة ، منها المنددة ومنها الهززة . جزامها بين المنددة والمستطيلة . انواها تراوح من السمرة القاتمة الى السواد الاسفر .

Pimélie géante (F).

٢٢٦٥٨ - قنارة جبارة ٥

هي الدسلول حشرة من غمديات الاجنحة ، اطلبا .

Rhinopterus (S).

٢٢٦٥٩ - قناسة ٥

Rhinoptère (F). Rhinopterus (E).

جنس اسماك بحرية من السفنقيات وفصيلة الشفنيات البحرية . انواعها المعروفة ستة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها كبيرة القد . اجسامها شبيهة باجسام المورمية . رؤوسها اسطوانية يملؤها ميزاب قليل العمق يقسمها الى شطرين متساوين . اذنانها مستطيلة كالمساطر تحمها عند قواعدها مناسخ منشارة التركيب قاعدتها الزعنفة الشرجية . قوتها الاسماك . تألف المهادح الصغرة حيث تكمن للانقباض على فراشها || لحومها كاعنة الصنف ، قل من يرض في اكلها .

Masque (F). Mask (E).

٢٢٦٦٠ - قناع ٥

جهاز يوضع على الرأس لوقاية حواسه أو بعضها .

Radiasthéiste (F).

٢٢٦٦١ - قناني ٥

Dowser (E).

من عالج اشعاع التفتنط الكهربي ويعرف بروجود الماء والمعادن في جوف الارض .

Alléger (F). To ease (E). قناب ، قناب ٥

قنب الكرمية : قلمها وقطع ضها ما يؤدي حملها .

Fourreau (F). Sheath, Cover (E). قناب ٥

جراب قفص الدابة ، وقيل وعاء قفص كل ذي حافر . كقنق قناب الحمار : وعاء جردانه . وقناب الجمل : وعاء ثيله .

Epanouir (e) (F).

٢٢٦٦٤ - قناب ٥

To blow, To expand, To open (E).

قنب الزهر : خرج عن اكامه .

Cannabis sativa (S).

٢٢٦٦٥ - قناب ٥

Chanvre commun, Chanvriier, Pantagruillon (F).

Bractée (F). Bract (E). قنابة ، قنابة ٥

كل ورقة شذت في شكلها أو تركيبها ليويدها قرب الزهرة كالكنافور في البتل والمصيفة في التسع . الخ .

Bractéaire, Bractéal (F).

٢٢٦٦٦ - قنابي ٥

Bractéal (E).

لمت تعريفه يطلق على كل ما له صلة بالقنابة .

Ostrya (S).

٢٢٦٦٧ - قنابية ، قنابية ٥

Ostryer, Iron-wood (F). Lever-wood (E). Hopfenbaum (D). Ostria, Legnoferro (I).

جنس اشجار حرجية وريزية من فصيلة السوليات . انواعها قليلة العدد هيكلها واوراقها وازهارها تشبه الشرم (الحريينوس) . سوقها تملن من ١٥ الى ٢٠ م . اغصانها شديدة الصلابة ، ثقيلة الوزن اللسي . اوراقها عابطة متعاقبة طول من ٦ الى ١٣ سم . وتعرض من ٣ الى ٦ م . تفصلها مژبة الصفة ، متقارب المروق المتقابلة التي يراوح عددها من ١١ الى ١٧ . ثمارها كوزية الشكل كثار الجنجل . زبروها خلية الطرف البقيق || احرف انواعها واشهرها : قنابة اليابان

Ostrya japonica (S).

Ostryer du japon (F).

Ostrya carpinifolia (S).

قنابة شرمية الورق

Ostryer à feuilles de charme (F).

Ostrya virginiana (S).

قنابة فيرجينية

Ostryer de Virginie (F).

Dalot (F). Scupper (E).

٢٢٦٦٨ - قنقة ٥

جبرى ماء من صنع الانسان يستعمل لنقل وتوزيع مياه الري .

Canal axzygos (F).

٢٢٦٦٩ - قنقة الزكبة ٥

Azygous canal (E).

جبرى انبوي شعري ينقل زكبه ذكور الحشرات من تلاميها الى قنابها .

Oviducta (F). Oviduct (E).

٢٢٦٧٠ - قنقة المبيض ٥

جبرى انبوي ينقل البيض من المبيض الى خارج الجسم الحيواني .

Canal cystique (F).

٢٢٦٧١ - قنقة المرارة ٥

Cystic canal, Cystic duct (E).

هي قناة المرصلة الصفراوية .

Canal marginal (F).

٢٢٦٧٢ - قنقة حافة ٥

Marginal canal (E).

Canal rachidien (F).

٢٢٦٧٣ - قنقة فقرية ٥

Rachidian canal (E).

هي القناة التي يمر بها الفقار الفقري .

Canal rachidien (F).

٢٢٦٧٤ - قنادة ٥

القنادية أو القندة هي زهرة المرجان ، اطلبا .

Connerus (S).

٢٢٦٧٥ - قنارة ٥

Connarac (F). Connarac (E).

جنس نباتات جنبية ، برسة ، معمرة ، من فصيلة القناريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || سوقها وفروعها شائكة . اوراقها متقابلة . ازهارها متنفقة ، صغيرة ، جميلة الشكل ، يكثر فيها اللون الاصفر . ومنها انواع زرقاء الزهار او ليلكية .



قنار



قناسة

٢٢١٧٧ - **قَنْبَرُ** Chênevis (F). Hemp-seed (E).
هو بَرْد القنب ويصنع شنداج يأكله الطير ويستخرج منه زيت صناعي بلية ترواح من ٢٠ الى ٢٤ ٪ كسبه يستعمل في تلييل التربة .

٢٢١٧٨ - **قَنْبَكَة** Glumelia (F). Glumelia (E).
القنبينة قنبانة تحيط برؤسة التيجليات وعلها ينشأ السفا وهما قنبتان لكل زهرة من زهور السلييلة .

٢٢١٧٩ - **قَنْبَل** Pavonia (S).
Pavonie (F). Scarlet mallow (E). Pavonie (D). Pavonia (I).
يحبس اشجار ونباتات برية وتربيتين من فصيلة الحليانيات.

انواعه قليلة المدد، اعطائها البلاد الحارة، جميعها مسرة فراءه فنواء . اوراقها ابيدة معتقة ، يفضية او ريفية التصل، عطرية العرف عند السس . ازهارها لا قابلية التجميع والارتكاز، طويلة الزناد مخفلة الالوان . ثمارها رباعية الفلق . يزورها ذفبة القشور ا عرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٢١٨٠ - **قَنْبَل دَائِم الزهر**

Pavonia semperflores (S). Pavonie toujours fleurie (F).
شجرة تربيتية فراءه فنواء تملو نحو حشرة امتار . اوراقها سنانية الشكل ، لصلها جامدة الصفحة سنن الزام الاخير . ازهارها متدلية ، كبيرة القند ، حادة الكسم ، ناشرة الاسدية ، لونها الى الحمرة القانعة || ازهاره يستمر طوال السنة .

٢٢١٨١ - **قَنْبَل كبير الزهر**

Pavonia multiflora (S). Pavonie multiflora (F).
جنية تربيتية سروقية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها فراءه فنواء . اوراقها سنانية التصل ، منشارة الحافة، تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . تعرض نحو ٦ سم . ازهارها حشوكية التجميع ، تاجية الارتكاز ، اوجوانية اللون ، كيم ازهارها كثيف الورديات الفقية الحليية || ازهاره يستمر طوال شهر ايلول .

٢٢١٨٢ - **قَنْبَل مَكُونَا** Pavonia mackoyana (S).
Pavonie de Mackoy (F).

جنية تربيتية سروقية تملو من ٦٠ الى ١٧٥ سم . ساقها غليظة فنواء . اوراقها كاملة ماسية سنانية التصل خلية المتق . ازهارها خسية التجميع ، تاجية الارتكاز ، قرمزية اللون . كيم ازهارها خاسي الورديات القليلة الشكل . ازهاره يستمر من ايار الى آب .

٢٢١٨٣ - **قَنْبَل مُمَيَّر** Pavonia speciosa (S).
Pavonie specieuse (F).

جنية تربيتية زهية تملو نحو ٢٠٠ سم . ساقها فراءه فنواء . اوراقها يفضية الشكل ، قلبية القانعة؛ لصلها سنن الحافة ، مزغب الصفحة السفلى فنواء اللون . ازهارها ينغمسية الظاهر حر الباطن . قطرها نحو ٥ سم . لصلها تعد من ٧ الى ٩ يكتسها كيم يحمل ذات المدد || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٢١٨٤ - **قَنْبِيَانَات** Cannabinaceae (S).
Cannabinaceae (F). Cannabinaceae (E).
منهم من جعلها فصيلة ثنائية مستقلة ومنهم من قال انها سبط من فصيلة القرصيات || اشهر اجناسها القنب والجنبل .

٢٢١٨٥ - **قَنْبِيَط** هو الترنيط ، اطلبه .

Common hemp (E). Echter Hanf, Riesen Hanf (D). Canapa, Cansepe (I).

نبات عشبي حولي زراعي لبني صناعي من فصيلة القنليات . وهو نبات وحيد الجنس والتوع عديد القروب اشهرها الهندي والجنبل . ساقه معتسبة تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم . اوراقه كلية مركبة ومعتقة . السفل منها متقابلة والعليا متناحية . جميعها خاسية او سباعية الورديات الفقية اللدية . لصلها عشن للملس، ازغب الصفحة المنشارة الحافة . ازهاره ثنائية المسكن، للذكورة منها عطرية التجميع اما الانثوية ففسية || ثماره فقيرة متنفخة تلمى القنيز والشنداج وهي مأكلة بعض المصافير ويستخرج منها زيت صناعي لا باس به قيلج كتبه نحو ٢٢ ٪ . يزود القنب لاستخراج الياف سوه التي تستعمل خاصة في صناعة الاكياس والحبال .

٢٢١٦٦ - **قَنْبُ الْمَنَافِعِ** هو البتولا المنغية، اطلبه .

٢٢١٦٧ - **قَنْبُ جَبَّار**

Cannabis sativa gigantea (S). Chanvre géant (F).
عرب من القنب منته المدد . ساقه فراءه تملو من ٣ الى ٥ امتار . قروصها فائرة مستطيلة يحمل قطر دوسة النبات اطول من ارتفاعه || الياف ساقه وقروصها صناعية تستعمل في جدل حبال القنب .

٢٢١٦٨ - **قَنْبُ سِيَام** هو الرامي ، اطلبه .

٢٢١٦٩ - **قَنْبُ كَلْكُوتَه** هو الجوت ، اطلبه .

٢٢١٧٠ - **قَنْبُ مَسِيلِيَا** هو الابن ، اطلبه .

٢٢١٧١ - **قَنْبُ هندي *** ، حشيشة الكيف

Cannabis sativa indica (S). Chanvre indien, Bang, Hachisch (F). Indian hemp (E). Indischer Hanf (D). Canapa indica (I).
عرب من القنب ساقه تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . يزود لاستخراج ما تفرزه النباتات الاثنى من مادة وانسية تكثر في عناقيدها الزهرية واوراقها اللها يصنع منها والحشيش او الحشيشة او الكيف ، الذي يستعمل لتخسبا فيقدر احصاب منمنينه ويحلل عقولهم || زراعته محظورة في لبنان .

٢٢١٧٢ - **قَنْبَر** هو القبرية ، اطلبه .

٢٢١٧٣ - **قَنْبَرَة ، قَنْبَرَة ، كَشَة ، طَرَة**

Huppa (F). Crest (E).
هي فصل ريش قائم . اطلب قنطرة .

٢٢١٧٤ - **قَنْبَرَة ، قَنْبَرَة** هي القبرة ، راجعها .

٢٢١٧٥ - **قَنْبَرَة الماء ***

Arenaria incarper, Strepellia incarper (S). Tourne-pierre incarper, T. vulgairs (F).
طائر من طوال القن القطايع . صابر القند طوله نحو ٢٢ سم . لربه ابيض اللون كثير البياض والازغافز للتناحلة المركبة من الاسود والاحمر || يأنف الشطوط البحرية ، قوته القشريات والديدان يلتقطها بين الحصى . يدن اقصومه في الكشيان . حشسته تراوح من ٣ الى ٤ يضا .

٢٢١٧٦ - **قَنْبَرُول** هو ابو متقار ، اطلبه .



قنب



قنب هندي



قنبرة الماء



قنبيل

٢٢٦٨٦ - قَنْدَلِي * وَرْس مَلَوَن
Mallotus (S). Rottlère, Rottlerie (F). Kamala tree (F). Kamelbaum (D). Kamala (I).
جنس شجيرات برية من فصيلة البتويات. منها المناطق الاستوائية الآسيوية. انواعه قليلة جميعها متوسطة القد. يستخرج من ثمارها صباغ احمر قريدي مرغوب فيه.

٢٢٦٩٣ - قَنْج
Arquer (F). To bend, To arch (E). قنج البود : صقله حتى يصير كالخمين.

٢٢٦٩٤ - قَنْدَاش *
Candacus (S). Candace (F). Candacus (E).
جنس دوبيات بحرية من القشريات مجذبات الارجل وفصيلة الكلنوسيات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الاستوائية والحرارة والممتدة الحارة.

٢٢٦٩٥ - قَنْدَاق
Sucre candie (F). في الابلوج ، اطليه .

٢٢٦٩٦ - قَنْدَاق *
Potologie (F). Potology (E). القنددة علم يبحث في المشروبات الرحيمة وفي تراكيبها.

٢٢٦٩٧ - قَنْدَرُ
Castor (F). هو الحاريد ، اطليه .

٢٢٦٩٨ - قَنْدَرُوس *
Chondrus (S). Chondre (F). Chondrus (E).
جنس نباتات بحرية من الخليات الحمر . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اعرف انواعه واشهرها القندروس المتقيش Chondrus crispus (S). والاشهر Chondrus crispé الذي يستعمل طبيا في معالجة بعض الامراض الصدرية .

٢٢٦٩٩ - قَنْدُس
Loutre commune (F). هو القنفصة ، حيوان من المروحيات .

٢٢٧٠٠ - قَنْدُكِي
Aesculus (S). Marronnier (F). Horse-chestnut-tree (E).
جنس نباتات معمرة من فصيلة القندليات. انواعه نحو ١٥ جميعها اشجار وشجيرات ونباتات فاشرة ، غضة ، حيلة الشكل . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، منقطة ، مركبة ، كثيفة خامسة او سباعية او تساعية الوريقات . ازهارها عشقونية التجميع او عطقية ، مديدة الالوان منها الاصفر والبنير والوردي والاحمر || اشهر انواعه ما يلي :

٢٢٧٠١ - قَنْدُكِي حَنْزُوسِي
Aesculus turbinata (S). Marronnier à fruit turbiné (F).
شجرة دائمة فاشرة مهددة اليابان تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقها خامسة او سباعية التركيب وريقاتها كبيرة القد ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، سنن الحافة . ازهارها كبيرة القد ، لونها الى البياض الاخضر تملو رقة حراء . ثمارها اجاصية الشكل حلزونية ، قشرها مثاقلة شائكة ، لبها حطلي اللون .

٢٢٧٠٢ - قَنْدُكِي مَبْدُول * ، قَسْطَل هِنْدِي
Aesculus hippocastanum (S). Marronnier commun (F). Common horse-chestnut-tree (E).
شجرة مبدولة دائمة فاشرة تملو من ٢٠ الى ٣٥ م. اوراقها خامسة او سباعية التركيب . وريقاتها لا متساوية الطول والعرض ، نصلها حائق الحصار . ازهارها كبيرة القد لونها الى البياض الناصع تملو رقة حراء او صفراء . ثمارها كستنية الشكل والقد قشرها شائكة ، لبها اسمر .

٢٢٦٨٧ - قَنْه
Cime (F). Cyme, Summit (E). القنة : شمع يقع من رأس الجبل واصل ما يكون في الشجرة . ج قن وقنان وقنن وقنات .

٢٢٦٨٨ - قَنْه مَبْدُول * ، كَنْخ
Ferula communis (S). Férula commun, Pameller, Grand fenouil (F). Giant fennel (E). Gemelins Steeukrout (D). Ferula comune, Ferola, Fregola (I).
نوع من الابدان وهو نبات عشبي بري معمر مبدول. ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه كثيرة التفرع والتفرع نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى . بطوره غليظة يستخرج منها بعض الناصر الطبية الصحية النافعة. ويستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت لكنه دون الحلتيت الاصلي خواصا ونفعا .

٢٢٦٨٩ - قَنْه مَهْجُول * ، بَزَلْزَد ، قَنْسَا وَشَق
Ferula ferulago, F. galbanifera (S). Férula bitarde, Galbanum (F). Galbanum plant (E). Galbanpflanze, Galbenkraut (D). Galbano (I).
نوع من الابدان وهو نبات عشبي طيب بري معمر. ساقه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. يستخرج من ساقه عصارة صمغية لزجة تدعى البازيد وتلوش وتذوق وتعرف عند الطائفة بالوشق تستعمل في الامراض الصدرية وغلخا وهي مفادة للتشنج .

٢٢٦٩٠ - قَنْشَر * ، قَسْلُ الحَيْثَان *
Cyamis (S). Cyame, Cyamide (F). Cyamis (E).
جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا وفصيلة القشريات. انواعه المعروفة قليلة البدد جميعها عطقية تنشب في جلود الحيتان وفي طيات رؤوسها وثنايا زانفها || اجسامها متباينة الاحجام يغلب فيها الصغر ، جميعها مبطلة . قوائمها الصدرية خامسة الازواج ، نشيطة ، تنتهي بمخاط ذرية . قرونها الاستقامية ثلاثية الفصل . لولاسها رباعية الازواج متغايرة الطول ، شبه انبوية الشكل . اثنائها الى الشبهة او الشقعة .

٢٢٦٩١ - قَنْشَرِيَّات *
Cyamidae (S). Cyamidae (F). Cyamidae (E).
فصيلة دوبيات بحرية من القشريات العليا مزدوجيات الارجل . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة البدد . جميعها عطقية تركب الحيتان || تتميز بانجسامها المبطلة وبانوسها او لمساتها المتغايرة الطول والحم . قوائمها الصدرية مجهزة بمخاط صمغ ذرية || اشهر اجناسها القنشر .

٢٢٦٩٢ - قَنْسُجُول *
Abacetis (S). Abacete, Astigis (F). Abacetis (E).
جنس حشرات من فصيلة السلكوتيات ورثة ممدبات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٤٠ اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة من العالم القديم اجساما افريقية الثالية وبعض الانواع يعيش في الشرق الادنى وفي اودية الجنوبية ||



قندلي



قند مبدولة



قند مهجولة



قنر



قنجل



قندروس



فندلي مبدول

٢٢٧١٠ - **فَنْزَاع** * ، **مِفْتَال**
 Machetas (S).
 Combatant (F). Ruff (E).
 طائر وحيد الجس والفرع من عائلة الطوطيات. وفضيلة
 دجاجيات الارض. طول نحو ٣٠ سم. بسطه من ٦٠
 الى ٧٠ سم. قوي الى الصهبة الزبداء تطلعا رقعة حنطية
 يحرقها اطار ابيض. الذكر قشري الرأس طروق السن،
 طوقه مستطيل الريش يتصب عند القتال والبارزة.
 مبارزة الاكود تدوم نحو ثمانية اسابيع تحتوي من زين
 الصفاد وتستمر حتى نهاية الخريف || الاثني يبيض نحو ٥
 بيضات تحضنها من ١٧ الى ١٩ يوما. تمش مشا في
 النطاق بين الاشجار || قوته اخشرات والديدان والرخويات.



فندوس

٢٢٧١١ - **فَنْزَعَكَة**
 Astragale (F). Astragalus (E).
 هي رصع القدم وطم الكعب.

٢٢٧١٢ - **فَنْزَعَكَة** ، **فَنْزَعَكَة** ، **فَنْزَعَكَة**
 Algretea
 ريش قائم مجتمع على رأس بعض الطيور.

٢٢٧١٣ - **فَنْس**
 Norme (F). Norm (E).
 القنس ج قنوس. مبدأ يتخذ كقاعدة. او غطط قنيس
 يتخذ كقاعدة.

٢٢٧١٤ - **فَنْس**
 Aunée (F).
 جنس نباتات عشبية برية معمرة مشهورة باسم رائحة
 اطلبها.



فندول

٢٢٧١٥ - **فَنْسَطِيْطْ اَبْيَض**
 Aesculus parviflora, Pavia alba (S). Pavier blanc (F).
 شجرة زينة غضة من فصيلة الفندليات تملو من متر
 الى خمسة امتار. اوراقها خالصة التركيب، وريقاتها
 تطلو نحو ١٩ سم. وتعرض ٧ سم. فصلها بجري اللون، وفي
 الصفعة السفلى. ازهارها سنبلية تتجمع لنوا الى البياض
 الاخير. ثمارها كستنية الشكل ولقده مالة القشور.



فنزاع

٢٢٧١٦ - **فَنْسَطِيْطْ احْمَر**
 Aesculus pavia, Pavia rubra (S). Pavier rouge (F).
 شجرة زينة سبروتية من فصيلة الفندليات تملو من مترين
 الى ستة امتار. اوراقها خالصة التركيب. وريقاتها
 سنائية، مسنة الحافة. فصلها جامد الصفعة يطلو نحو
 ١٥ سم. ويمرض ٦ سم. ازهارها متفوية تتجمع، بتلاتها
 حراء اللون، مهدبة الاطراف. ثمارها كستنية صلبة
 مالة القشور.

٢٢٧١٧ - **فَنْسَطِيْطْ اصْفَر**
 Aesculus octandra, Pavia lutes (S). Pavier jaune (F).
 شجرة كبيرة دائمة من فصيلة الفندليات تملو من ٢٠ الى ٢٥
 م. اوراقها خالصة التركيب. وريقاتها سنائية داكنة،
 فصلها ازغب الصفعة السفلى، مسنة الحافة. ازهارها
 متفوية تتجمع، بتلاتها مهدبة، صفراء اللون. ثمارها
 كستنية الشكل كبيرة القد مالة القشور.

٢٢٧١٨ - **فَنْسُون**
 Ciste ladanifère (F).
 هو اللادن الاسباني، اطلبه.

٢٢٧١٩ - **فَنْشِيل** * ، **فَنْشِيل**
 Tragulus (S).
Tragule (F). Tragulus (E).
 جنس حيوانات لبونة بجرة. انواعها خمسة جميعها صغيرة
 القد، وشيقة القوام، فيها من الايل والمامز والارانب.
 طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم. طولها من ٢٥ الى ٣٢ سم.



فنشيل

٢٢٧١٣ - **فَنْدَلِي هِنْدِي**
 Aesculus indica (S).
 Marronnier de l'Indus (F). indian horse-chestnut-trees (E).

شجرة هرمية الشكل مملها المكنوس تملو من ٢٠ الى ٢٥ م.
 اوراقها لايقاسية التركيب منها الخالصة والسباعية
 والسباعية. وريقاتها مستطيلة، فصلها جامد الصفعة،
 مسنة الحافة. ازهارها كبيرة القد. عنابدها هرمية الشكل،
 تطلو نحو ٥ سم. بتلاتها لا متساوية القد لنوا الى الابيض
 المرقوش بالاصفر او الوردي. ثمارها رنية، قشورها
 ثلثولية حادة الشوك.

٢٢٧١٤ - **فَنْدَلِيَات**

Aesculaceae, Hippocastanaceae (S). Aesculacées,
 Hippocastanacées (F). Aesculaceae, Hippocastanaceae (E).

فصيلة نباتية ورسدة الجس، عديدة الانواع. نباتاتها
 اشجار وشجيرات ونبات برية وزينة. اوراقها مركبة
 متقابلة. ازهارها غشوية خالصة التركيب والانام، سامية
 الاسدية، متفوية تتجمع او حلقية او سنبلية.

٢٢٧١٥ - **فَنْدَلُوس** *
 Cœndus (S).
 Cœndous, Synèthère, Orico, Couly (F).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الشمميات. انواعها
 ١٣ موطنها امريكة الجنوبية || اجسامها غضة مستطيلة
 براوح طولها من ٥٠ الى ٧٠ سم. واذاها من ٢٥ الى ٥٠ سم.
 رؤوسها خفيفة. مقاضها قصيرة مقلية.
 عنابها عريضة. حوربا واذاها صغيرة. جرامزها متدلة
 القد. اظفارها قوية سادة. اذانها طويلة اعادة. شعرها
 هليبي هدي نغاز يتخلل شوك قصير كاسال تفنقه للفاخ
 عن النفس فيند ويطلب حيث يبرز || تألف الثنايات
 والاحراج. تسرح في الليل. تتسلق الاشجار وتستن
 باذانها للاتقال من ضمن الى ضمن || قوتها الثأر
 والزيمات والاوراق والازهار والجذور ولها الاشجار.

٢٢٧١٦ - **فَنْدُولِي** * ، **دَار شَيْفَعَان** ، **عُودُ الْبَرْق**
 Spartium spinosum, Cytisus spinosus, Calycotome
 spinosa (S). Cytisus épineux, Genêt épineux, Calycotome épineux, Aspalot (F). Spiny broom, Spiny
 cytisus (E). Stacheliger Ginster (D). Citiso spinoso (I).
 جنبة برية معمرة شالكة من فصيلة الترينيات. اوراقها
 صلبة مركبة. ازهارها صفراء اللون صطرة. يكثر ويوجد
 في وحر الجبال البانانية السورية.

٢٢٧١٧ - **فَنْدِيلِيد** ، **بَذَاقِي**
 Eau-de-vie (F).
 Brandy (E).
 سائل كحول يحصل من تقطير الثأر بعد تقصيرها وهو
 يحمر من الكحول ما يراوح حياره من ٤٥ الى ٨٥ درجة
 متفوية وهذا القارق التاسع بالنسبة يمد الى نوع المنسوب
 وما يقتضيه من حيار خفيف او متوسط او ثقيل.

٢٢٧١٨ - **فَنْدِيلِيدِي** *
 Potologique (F).
 Potological (E).
 نعت تمريني يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالقعدة.

٢٢٧١٩ - **فَنْدِيلُ الْبَحْرِ**
 Crysaore (F).
 Sea nettle (E).
 نوع من المدوس، يكثر في البحر الاحمر وعلى جرف شواطئ
 المتوسط. راجع مدوس.

٢٢٧٢٥ - قَنْصُور صَغِير الْوَرْد

Colutea halepica, *C. istria* (S). *Bagueaudier micropphylla* (F).
جنية برية سريرية مهددة الشرق الأوسط ويكثر وجودها من حلب إلى سيناء. تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. وريقاتها دقيقة تعد من ٩ إلى ١٣ نصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو يجري اللون أبيض الصفحة السفلى. أزهارها برتقالية كبيرة القد. سنفاتها صغيرة جرابية مطبقة. أزهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٢٧٢٦ - قَنْطَار
Quintal (F).
القنطار العربي العالمي وزن مئة رطل أي ألف وبنو أوقية أو ما يماثلها من الوزن المئري وقدره ٢٥٦ كيلو. أما القنطار المئري فوزنه ١٠٠ كيلوغرام.

٢٢٧٢٧ - قَنْطَر
Goura couronné (F).
هو الدبسي الملتفج، الحلبه.

٢٢٧٢٨ - قَنْطَرُون، قَنْطَارُون
Centaurea (S). *Centauree* (F). *Centaury* (E).

جئس نباتات عشية خشبية من فصيلة المركبات. أنواعه زهاء ٤٠٠ منها الحولية والمهولة والمعمرة بعضها بري وبعضها ترابي. أوراقها متعاقبة لا نظامية. قناباتها لا قياسية. أزهارها رؤسية. بزورها عادمة الاغرة مختلفة الاشكال والاحجام || أحرف أنواعه وأشهرها ما يلي :

٢٢٧٢٩ - قَنْطَرُونِ اسْمَر * ، رأس الدوزي
Centaurea jacea (S). *Centauree jacee*, *Jacée des prés*, *Chevalon*, *Malon*, *Tête de moineau* (F). *Black centaury*, *Brown rayed*, *Knapweed* (E). *Weissenfloekenblume* (D). *Giacea*, *G. dei prati*, *Erba della ferita* (I).

نوع من القنطريون البري المعمر. ساقه زهاب فروع تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. رؤسياته الزهرية عديدة، صغيرة القد ليلكية اللون ، قناباتها الى السرة || يكثر في المراعي والزرود فيصبح من النباتات الضارة || جلوده غليظة غزيرة المادة اللبية التي تستعمل في علاجات امراض الفم والحلقوم.

٢٢٧٣٠ - قَنْطَرُونِ الْقَفَاس

Centaurea depressa (S). *Bleuet du Caucase* (F).
عشبة سريرية حولية ترابية ساقها منه السنج تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها المثلجية الشكل خلية البشرة. رؤسياتها الزهرية حادة العرف لونيا الى الزرق الزاهية تتوسطها الحمرة ؛ قناباتها مألصة الصفحة ، مهددة الحنار. اهدابها فضية || أزهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٢٧٣١ - قَنْطَرُونِ امْرِيكي

Centaurea americana (S). *Centauree américaine* (F).
عشبة ترابينية سريرية حولية. ساقها مزينة متنبية قليلة الفروع تملو من ٦٠ إلى ١٨٠ سم. أوراقها سنانية النصل مسننة تملو من ١٣ سم. وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم. رؤسياتها الزهرية فردية التجميع حادة العرف قطرها يراوح من ٥ إلى ١٠ سم. لونيا الى الزرق الزاهي والحمرة. قناباتها مهددة الحنار || أزهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٢٧٣٢ - قَنْطَرُونِ بَابِل

Centaurea babylonica (S). *Centauree de Babylone* (F).
عشبة ترابينية سريرية حولية. ساقها مجنحة تملو من ٢٠٠

روبوها مستطيلة جهاد. اذناها قصيرة عريضة متنبية. قلوها دقيقة. اغلافها اريسة. اذناها مرفقة كاذناب. لثام. سطحها خلى ناعم للمس. اثنيا الى الصلبة المتخللة المشعة والمواج || مهددة الفرجاء يمتد من سرتديب والهند الى الصين. تألف الثابتات الجبلية الرطبة قربا الاشباب. تمشج جابات قليلة العدد. إجلاها يتألف من ٤ او ٥ اثان يقودها ذكر واحد.

٢٢٧٣٠ - قَنْصُور * ، قَنْطَرُون

Colutea (S). *Bagueaudier*, *Colutea*, *Faux séné* (F). *Bladder-senna tree* (E). *Baumartiger blasenstrach*, *Gewöhnlicher blasenstrach* (D). *Colutea*, *Cantamaggio*, *Saluno*, *Sena falsa* (I).
جئس نباتات برية طيبة معمرة من فصيلة القنريات الفراقية. أنواعه عديدة، بعضها جنات صغيرة أو متوسطة القد. أوراقها متعاقبة مركبة تشبه أوراق السناء. أزهارها عقدية التجميع ، محورية الايتكانز ، صفراء اللون. ثمارها سنقات متنبية مثانة الشكل || أحرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

٢٢٧٣١ - قَنْصُور اسود الكيم

Colutea melanocalyx (S). *Bagueaudier à calice noir* (F).
جنية سريرية مهولة تملو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم. أوراقها مركبة كبيرة وثرية العدد مؤلفة من ٩ أو ١١ وريقة بيضية الشكل، نصلها خلى الصفحة السفلى. أزهارها صفراء اللون صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم. اكلمها زهاب البشرة زهاب اسود اللون. سنفاتها متوسطة القد تطول نحو ٦ سم. وتعرض نحو ٣ || أزهارها يستمر من ايار الى تموز.

٢٢٧٣٢ - قَنْصُور الشَّرْقِي

Colutea orientalis (S). *Bagueaudier d'Orient* (F).
جنية سريرية مهولة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها سباعية أو تساعية الوريقات. نصلها بيض الشكل ، يجري اللون يطول من ١٠ إلى ١٥ سم. ويعرض من ٧ الى ١١. أزهارها الى المهولة يطولها تمشج اسفر. سنفاتها تطول نحو ٤ سم. لونيا الى الخضار المشج بالبنفسجي. أزهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٢٧٣٣ - قَنْصُور الصَّم

Colutea persica (S). *Bagueaudier de Perso* (F).
جنية سريرية تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. وريقاتها صغيرة القد ، حادة العروق ، خلية الصفحة السفلى. أزهارها الى الصفرة الزاهية يطولها تبقيج اسمر. سنفاتها متوسطة القد مشوقة الطرف || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٢٧٣٤ - قَنْصُور شَالِع

Colutea arborescens (S). *Bagueaudier commun*, *Arbre à vessies*, *Balandier* (F).
جنية سريرية مهولة تملو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم. أوراقها وثرية الترتيب مركبة من ٧ الى ٩ وريقة اعليجية الشكل تطول من ٢٠ إلى ٤٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥. نصلها يجري الصفحة السفلى متلائق العروق. أزهارها الى الصفرة البرتقالية. سنفاتها متنبية مطبقة تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٣ || أزهارها يستمر من ايار الى تموز.



قنصور



قنطريون اسمر

Blue-bottle, Corn-flower (E). Kornblume, Kornflockenblume (D). Ciano, Battesegola, Fioraliso, Fioralino (I).

حشبة سبروتية حولية برية بلية وتربينية. ساقها منتصبة فروعها زياة تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. أوراقها الجذمية خضيلة. ورؤسها الزهرية زرقاء اللون حادة الطرف. قناباتها حناكية النصل سم الحنار || كانوا يمتدونه لفا مضى من الفم علاجات العين والبصر. ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.



قنطريون صيفي

٢٢٣٩ - قنطريون قنزل (S). *Centaurea fenzli* (S). *Centaurea de Fenzl* (F). حشبة تربينية سبروتية عمولة. ساقها قليلة الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها بيضية الشكل، قليلة القاعدة، مجتمعة المتى، ورؤسها الزهرية فردية التجميع، كبيرة القند، صفراء اللون، حادة الطرف. قناباتها الى البيضاء الناصع || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٢٢٤٠ - قنطريون قيجيني الوركي

Centaurea rutaeifolia (S). *Centauree à feuilles de rue* (F). بحلة برية وتربينية عمولة. ساقها فروع منتصبة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها كبيرة القند فيجينية الشكل باللة التضريس. ورؤسها الزهرية كثيرة العدد صغيرة القند وديدة اللون. قناباتها مهدبة الحنار. اهدابا سود قاسية || ازهاره يستمر طوال فصل الصيف.



قنطريون صيفي

٢٢٤١ - قنطريون قصيرة الساق

Centaurea scutell (S). *Centauree scaule* (F). *Centaury* (E). *Flockenblume* (D). *Centaurea* (I). نوع من القنطريون البري وهو نجمة جعدة الساق فروعها تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. أوراقها قرصية طرحة الارنكاز، صغيرة القند، سنانية النصل الحبل البشرة. ورؤسها الزهرية فردية، زرقاء اللون، قناباتها خضيلة || يكثر في المراعي والبور ويقال ان صدارة جلوره نائمة تغيب المنة ونشاط الدم.

٢٢٤٢ - قنطريون كبير * عرطب

Centaurea centaurium (S). *Centauree officinale*, *C. commune*, *Grande centauree* (F). *Great centaury* (E). *Grosse Flockenblume*, *Tausendgüldenraut* (D). *Centaurea maggiore*, *C. comune*, *Fiele di terra* (I). نوع من القنطريون الطبي البري الممر. ساقه فروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه كبيرة سنانية سفنة. رؤسها الزهرية عديدة خضطة القند زرقاء اللون || يكثر في الاراضي الجبلية الملحاة. جلوره طرية، حارة الطعم، مرة للملحاق، عديدة اللقوات الصسية المغوية المشبهه الماداة الاثر الرجعي.



قنطريون كبير

٢٢٤٣ - قنطريون مسكي

Centaurea moschata (S). *Centauree ambrette*, *Ambrette*, *Barbeus musqué* (F). نبات تربيني سبروتي حولي. فروعها واصرامها عديدة. ساقه فروع تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه سنانية الشكل صغيرة القند. رؤسها الزهرية ذكية الطرف السطري، كبيرة القند، عديدة اللقوات التي تختلف مع للصبوب والاصرام || ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

الى ٣٠٠ سم. أوراقها الجذمية حنطة رجمية. نصلها جامد الصلصة. أوراقها العليا رباعية صغيرة القند حناكية الصفة السفل، رؤسها الزهرية كثيرة العدد، كبريتية اللون، حادة الطرف. قناباتها نحيلة مهدبة بالاسمر || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

٢٢٣٣ - قنطريون بهمن * بهمن ابيض

Centaurea behen (S). *Centauree blanche*, *Béhan blanc*, *Rhapontic blanc* (F). *White behen*, *White rhapontic* (E). *Weiss Behen* (D). *Behen bianco* (I). حشبة سحولية برية بلية تكثر في الحقول وفي الاراضي الملحاة. ساقها زياة منتصبة فروعها تملو نحو ٧٠ سم. أوراقها مزفورة البشرة على صفحتها، زغبها لبد التجميع ابيض اللون. رؤسها الزهرية قرصية اللون صفراء الملاج. قناباتها بيضة مستطيلة، عديدة الملاحق || يقال ان فوائده الصعية جليلة اعصابا للتشنج لانه مقر ناض وقد يستعمل في التوابل.

٢٢٣٤ - قنطريون دلماسي

Centaurea ragusina (S). *Centauree de Dalmatie* (F). بحلة تربينية عمولة. ساقها منتصبة سرعة قاعدة الفروع تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. أوراقها وريشة فضية اللون. رؤسها الزهرية قليلة العدد ملحية اللون مبراء الملاج. قناباتها بيضة الشكل مالملة الصفة مهدبة الاطراف. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٢٣٥ - قنطريون ريبي

Centaurea phrygia (S). *Centauree plumose* (F). بحلة تربينية عمولة ساقها فروع تملو نحو ٧٥ سم. أوراقها اهلجية النصل، حادة منشاري التسنين. رؤسها الزهرية صغيرة القند ظفرا نحو ٣ سم. لونها الى الحمرة البنفسجية الملاج، قناباتها وريشة التضريس، حنطية اللون، سيد الملاحق || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٢٣٦ - قنطريون شرقي

Centaurea cineraria (S). *Centauree cinéaire* (F). حشبة سبروتية تربينية عمولة فروعها واصرامها عديدة. ساقها فروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها كثيرة التضريس والتضريس، خلية البشرة، فضية اللون. رؤسها الزهرية حنطية حادة العدد والحجم لونها الى الصفار الملح. قناباتها حنطية اللون والحار المهدب || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٢٣٧ - قنطريون صغير * مرارة الحشيش

Erythraea centaurium, *Chironia centaurium*, *Gentiana centaurium* (S). *Erythrae centauree*, *Petite centauree*, *Herbe à la fièvre* (F). *Earth-gall*, *Feverwort* (E). *Echtes Tausendgüldenraut* (D). *Centaurea minor*, *Blondella*, *Caccia-ebbra* (I).

نبات عشبي طبي ممر من فصيلة الجنتيانيات. يكثر في البور. ساقه قصيرة فروعها تملو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه لاطئة متقاطعة رجمية النصل. ازهارها مشكوية التجميع هامة الارنكاز وديدة اللون || يستعمل في الطب لملاج بعض الحشبات ولزود الديدان الحموية.

٢٢٣٨ - قنطريون عتري * لرنشاه

Centaurea cyanus (S). *Blouet*, *Bluet*, *Aubifoin*, *Barbeau bleu*, *Casse-lunettes* (F). *Bachelor button*,

٢٢٧٤٤ - قَنْطَرُونٌ مُعَمَّرٌ *

Pytho (S).

Pytho (F), Pytho (E).

جنس شجرات من فصيلة القنطريانيات ورتبة عذبات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق الصنوبريات || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطلو من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها ممتلئة الجرم. عينوها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضلعية. قرونها الاستشعارية غوطية. كواسلها محصورة. احمادها لاسفة. قوائمها نشطة. الاطراف ملونة يكثر فيها البنفسجي الاسود المواج || يكثر وجودها تحت غطاء السرو والشرين حيث تخفي فصل الشتاء .

Centaurea montana (S). Centaurée vivace, Bleuet vivace, Barbeau vivace (F).

ليات لبني ترابي حمر شكليل. ضروبها واصرامها عديدة ساقه فرعاء زياه تطلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه سنانية، نصلها سرح الصلحة العليا عناكيي السلسل. رؤوساته الزهرية كبيرة القد ، حايفة الزرقه. قناباتها سيد الاهداب || انزهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٢٧٤٥ - قَنْطَرُونٌ تَجْمِي * و مَرَكَا

Centaurea calcitrapa, C. stellata (S). Centaurée étoilée, Chausta-trape, Chardon étoilé (F). Caltrop, Mouse-thorn, Star thistle (E). Calciatras, Sternflockenblume (D), Calciatras, Calcatripolis, Cardo stellato (I).

حشبة برية محولة تكثر في البرور والمراعي وعلى حافة الطرقات ، جلوسها مأكولة نافعة طعمها كطعم الارضي شوكي .

٢٢٧٤٦ - قَنْطَرُونٌ وَحِيدُ الزَهْرَةِ

Centaurea uniflora (S). Centaurée uniflora (F). برية ورتبية معمرة . ساقها فردية زياه تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها حاضنة ، سنانية الشكل ، مستديرة النفاضة ، ثنائية الاذنيات . رؤوسها الزهرية وحيدة، قطرها نحو ٣ سم. لها الى الحرة التريزية. قناباتها مفرقة سطحية اللون || انزهارها يستمر من تموز الى آب .



قنطرون معمّر

٢٢٧٤٧ - قَنْطَرُونِيَّات *

Pythidae (S).

Pythidae (F), Pythidae (E).

فصيلة شجرات من عذبات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، مبططة ، تطلو من ٨ الى ١٠ سم. رؤوسها ممتلئة الجرم. عينوها بارزة. تأثيرها وعلامتها ضلعية. قرونها الاستشعارية غوطية مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محصورة. احمادها لاسفة. قوائمها نشطة. ارسافها خماسية المقل باستثناء الزوج الخلفي الرباعي المقل. الاطراف ملونة || تعيش تحت غطاء الصنوبريات اخصها السرو والشرين || اشهر اجناسها القنطريث .

٢٢٧٤٨ - قَنْطَرُونِيَّة

Centaureidum (S). Centauride, Xanthisme (F). Centauridium (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى شبيهة بالقنطريون . جنس نباتات حولية ومحولة . برية وزراعية تريزيتية من فصيلة المركبات الشعاعية . منبتها بعض اصقاع امريكية الشمالية. ضروبها التريزيتية شائعة الاستعمال الحدائقي || سوقها عقاقية ، فرعاء . اوراقها متعاقبة ، ضيقة النصال . انزهارها طرفي الازيتكان . ازهارها شعاعية ، فردية ، كبيرة القد ، بنفسجية اللون او سمجنونية . سطرية العرف المحمود .



قنطرون نجمي

٢٢٧٤٩ - قَنْطَرُونُورس

le Centaure (F).

the Centaure (E).

كوكبة نجوم جنوبية الميقي مركزها تحت برج العقدر. وهي تمثل صورة حيوان خرافي مقدس مقدم انسان من رأسه الى آخر ظهره . اما مؤخره ، من منشأ الظهر الى الذنب ، فليغر فرس . وجهه الى المشرق وذنبه الى المغرب . ويده شراخان قد قبض بيده الاخرى على يد السبع || عدد نجومها ٣٧ بعضها من المرتبة الاولى والثانية والثالثة . والمرب تسمي النير الذي حل بطن قنطورس « بطن » . والنير الذي حل حافر يده اليمنى « حصار » . والنير الذي حل يده الاخرى « الون » . والحصار والون هما اللذان يسميان « الخلدن » .

٢٢٧٤٩ - قَنْطَرُونَةُ إِجْصَافِيَّةِ الْوَرَقِ *

Cantus pyrifolia (S).

Cantus à feuilles de poirier (F).

نوع من القنطرونات تزود قنطرين . ساقها كثيرة القروص المتصبة ، تطلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها كاوراق الاجاص . نصلها حيلة اخضر الاسفر المواج . انزهارها ملوئي التصبغ البليد . ازهارها معتقة ، يضاء اللون ، صفراء المواج . محببة التبرجات مستطيلة الالاسية البالغة للثشوز || قنطريها يستمر من آذار الى حزيران .

٢٢٧٥٠ - قَنْطَرُونَةُ بَقْسِيَّةِ الْوَرَقِ *

Cantus buxifolia (S). Cantus à feuilles de buis (F).

نوع من القنطرونات ، تزود قنطرين . ساقها فرعاء تطلو من متر الى مترين . اوراقها كاوراق البقس . نصلها حيلة اخضر الامس . انزهارها ملوئي التصبغ . ازهارها معتقة ممتلئة حراء اللون ، صفراء التوبيع تطلو نحو ٦ سم. || قنطريها يستمر طولا شهر نيسان .



قنطرون

٢٢٧٥٥ - قَنْطَرُونِيَّات *

Xanthusidae (S).

Xanthusidae (F), Xanthusidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة البطانيات قابيات الانسان. اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها خمسة . تطلو بعض مناطق امريكية الوسطى وكليفورنيا || اجسامها ممتلئة من ٨ الى ٢٥ سم. رؤوسها شبه حرمسة الشكل . اسنانها صغيرة كثيرة

السرة العاقبة || قوتها رقيق الانذار . الاثنى اكبر قدًا من الذكر . تمتع الممكن على بطون الزناير والجنادب .

٢٢٧٦٢ - قُتْمِيَّات *
Conopidae (S). Conopidae (F). Conopidae (E).

فصيلة حشرات من ذوات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها مقترية || قوتها رقيق الانذار || اجسامها بيضاء الجرم ، طولها من ٥ الى ٣٠ م . رؤوسها مسطحة ، نافذة ابريق . اعطائها مرقية . حورتها كبيرة . قوتها الاستيعابية لاقبسية الطول ويعد الفصّل . وراثتها مستطيلة ، دقيقة . صفورها معتدلة . بطونها مستطيلة . اجسامها هريالة او حلقة التشار ، خلفها شديد اللقّة والقصر || انثاها اكبر قدًا من ذكورها . مكنا شديد الصغر مستطيل الشكل . يتبعه الاثنا على بطون الزناير والنسوح والجراد والجنادب . يفتتح عن يرقاات دقيقة تقبب قنار بلن المائل فتدخله وتمش كامل حياتها البرية التي تنتهي مع حياة المائل || اشهر انواعها القنصة المذهبة والمزينة والقفار .

٢٢٧٦٣ - قُتْمَر

القنصر : شجر مثل الكبر الا الا غلط شوكة صودًا وثمرتها كثرته ولا ينبت في الصخر . حكاة ابو حنيفة .

٢٢٧٦٤ - قُتْمَاشَة *
Cryptops
جنس دويبات من فصيلة القنفشيات . انواعها المرفقة ٦ اجسامها مركبة من ٢١ حلقة تحمل ٢١ زوجًا من الجرازم . ج قنفس .

٢٢٧٦٥ - قُتْمَاشِيَّات *
Scolopendridae (S). Scolopendridae (F). Scolopendridae (E).
فصيلة دويبات من القنفشيات الشقويات الاربل . اجناسها وانواعها كثيرة الحد اشهرها القنفشة وام اربع واربعين (الحريش) .

٢٢٧٦٦ - قُتْمَاش

Diots maritima, D. candidissima (S). Diotie argentea, Herbe blanche (F). Cotton weed, Sea cud-weed (E). Silberzweleohr (D). Santolina maritima (I).
نبات عشبي بري معمر وسيد البحر والترح من فصيلة المركبات . منبت السواحل البحرية . ساقه رفاه زياه تلون من ١٥ الى ٥٠ سم . ثلثها مستطيل القذ قطبي الشكل . اوراقه متعاقبة لاطفة ، نصلها اعليجي الصفة ، مقطوع القامة ، خلي البثرة . رويته الزرية عديدة صفراء اللون ، قنابا جريسي الشكل ، تويجها اسفنجي التسنج . بزورها مضلعة عادية الجناح والافرة || انثرها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٧٦٧ - قُفْد * ، كُتْبَانَة الشوك ، اُنْدَسْد حَسِيكَة ، ذُلَج ، ذُرَام ، كُتْكَب ، كُتْكَب الشوك ، لُتْنَة ، مِدْلَج .

Erlinaceus (S). Hérissou (F). Hedge hog, Urchin (E). Igel (D).

كنيت ابو سفيان وابو الشوك والاثنى لم دلال ج قنافة ويقال لها الصامس || جنس حيوانات لبونة ناعمة من اكلاات الحشرات صغيرة القذ طولها يراوح من ١٦ الى ٣٠ سم . طولها من ٧ الى ١٢ م . اجسامها ملحوة بنطاه من الشوك يكتنفها بكاملها دون الرأس والذراع والرجل والجرازم . قوتها الحشرات والقنار والجراد والظاء والحيات

المد . آنتها قصيرة هنا المائلة بينها الضلعة . حورتها صغيرة ، سراجها لامتحركة . قوتها معتدلة الطول . رؤوسها وبيضا حرشية القنار . ظهورها مضلعة . انثيا الى المركبة السراء .

٢٢٧٥٦ - قُتْمَاب العظيم من الوبيل .

٢٢٧٥٧ - قُتْمَالَة شَكْرَاء *
Physcephala rufipes (S). Physcephala rufes (F).

حشرة من فصيلة القنفشيات . جسمها متوسط القذ ، بطول من ٨ الى ١٢ م . رأسها مستطيل ، اصفر اللون . جبينها وعصرها جلعة بالاسود . عظمها معتدل القذ . عينها كيرتان ، مرجانيان . زباناها مستطيلان ، اصمران . رشتها مستطيلان ، ضيقان ، تملوها مشقة صناعية في الشطر الاسمي . صدرها قنسي الشكل ، اصمر اللون ، حطلي الموج . بطنها قنسي الشكل ، اشجع اللون ، جلج بالاسود . قوتها الى الشقة السراء || قوتها المشر ترشفه من اذهار فصيلة المركبات || تمتع الاثنى مكنا حل بطون اللتان والقنصان يفتتح عن يرقاات تقبب بطون الموائ وتدخلها وتمش فيها حتى الاكمال .

٢٢٧٥٨ - قُتْمَار *
Tragelaphus gratus (S).

Tragelaphus des marais (F).
نوع من الجهيل كبير الجذة قنصر قدر القنص لكنه اصغر قنار واعين ثوبًا واسمي اخلافا . يتميز باستمالة واتساع انظاره التي تحول دون غوصه في امال ورمال المتناقص . موته فسح الارياه عند من الكامرون الى التايوان . يعيش قرب الماء يرتاد المتناقص في الليل والناهار .

٢٢٧٥٩ - قُتْمَعَة
Regard (F). Look (E).
الكرة في الحائط .

٢٢٧٦٠ - قُتْمَعَة مَذْهَبَة *
Conops flavipes (S). Conops doré (F).

حشرة من فصيلة القنفشيات . جسمها متوسط القذ ، بطول نحو ١٠ م . رأسها كبير ، شبه هرمي الشوّن ، ملهب اللون ، يملو في النافوخ والجبّة زركشة سوداء . عظمها معتدل الجرم ، مرقتي الشكل . عينها كيرتان ، مستتبان . زباناها مستطيلان ، اشجان . رشتها مستطيلان ، ضيقان ، تملوها مشقة صناعية في الشطر الاسمي . صدرها قنسي الشكل ، تملو نقطتان حاريتا الارنكاز . ذبيبا اللون وطوق ضيق ملهب . بطنها الى الجلوة الرصاصية الموج تملو ثلاثة اطواق ذبيبة الخضاب . قوتها الى الشقة . اخفاها سطوة الاطراف بالاسود || تمتع الاثنى مكنا حل بطون اللتان والعداس والزيور يفتتح الممكن عن يرقاات تقبب بطون الموائ وتدخلها وتمش فيها حتى الاكمال .

٢٢٧٦١ - قُتْمَعَة مُزْرَنْة *

Conops quadrifasciatus (S). Conops bandé (F).

حشرة من فصيلة القنفشيات . جسمها بطول نحو ١٢ م . رأسها كبير ، شبه هرمي الشوّن ، اصمر اللون اسود الجبة . اصفر النافوخ . عظمها مرقتي مستطيل . عينها كيرتان كستنيان . زباناها مستطيلان اصمران . رشتها ضيقان . صدرها قنسي الشكل ، حديدي اللون ، يملو زبجان من القنط الصفر والبيض . بطنها الى الصفرة الصنابية الموج تملوها اربعة اطواق سود : قوتها الى



قُتْمَاب



قُتْمَاشَة



قُفْد

٢٢٧٧٨ - **فُفْزْدَةُ الْبَحْرِ *** ، **شَيْتَه بَحْرِي**
 Diodon (S), Hérissou de mer (F), Sea-urchin (E).
 جنس اسماء بحرية شائكة من فصيلة الفهيات وربية
 لمحميات الفكوك. أنواعه نحو ٤٠ معظمها من اسماك بحار
 البلاد الحارة . مقدمها يشبه مقدم الفنفذ || قوتها
 الحشرات والمريجان . لحومها مؤذية وقد تكون سامة .

٢٢٧٧٩ - **فُفْزْدَات**
 Erinaceidae (S), Erinacédés (F), Erinacidae (E).
 فصيلة النافذ من الحيوانات الباردة وربية الحشرات اي
 آكلات الحشرات .

٢٢٧٨٠ - **فُفْزْدَةُ** هي الآربة ، اطباها ، ج قناش .

٢٢٧٨١ - **فُفْزْدُ**
 Acornys جنس دويبات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات. أنواعه
 ١٦ موطنها افريقية الشرقية والجزيرة العربية وفلسطين .
 اجسامها صغيرة القند مستطيلة تحمل في مؤخر ظهورها
 خيطوط من الحلب اللؤلؤ الشائك . تألف الففرف . قوتها
 الحشرات والوزغ والحرب والجلود || اعرف أنواعه
 واشهرها فنفقة القاهرة والفنفقة المصرية .

٢٢٧٨٢ - **فُفْزْدَةُ الْقَاهِرَةِ**
 Acornys cahirinus (S), Acornys du Caire (F).
 موطنها مصر السفلى . حجمها حجم الفأرة . ثوبها بلون
 الرمل . بطنها ابيض . ذنبها قصير . اذناها كيرتان

٢٢٧٨٣ - **فُفْزْدَةُ مِصْرِيَّة**
 Acornys dimidiatus (S), Spiny mouse (E).
 موطنها مصر وفلسطين والجزيرة العربية . ثوبها بلون الرمل
 يصب عند الظهر ويبيض عند الصدر والبطن . طولها نحو ١٢
 سم . وذنبها ٨ سم . اذناها كيرتان || تألف القفار
 والقبلياني .

٢٢٧٨٤ - **فُفْزْدُ**
 Chèvre (F), Goat (E).
 المعز السمين الفخمة .

٢٢٧٨٥ - **فُفْزْدُوس**
 Gomphosus (S), Gomphosus (F).
 جنس اسماء بحرية من شائكات الزعانف فصيلة الكيميات.

أنواعه المعروفة أربعة اصلها المحيط الهندي || اجسامها
 احليجية الشكل ، مستتلة التبط ، تحمل من ١٧ الى
 ٢٢ سم . انثواها تراوح بين السدرة والجودة الزينية الموج .
 بطونها ابيض كبر من ظهورها . زعانفها مبطلة بالاصفر
 والاسود . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل ، مستطيلة
 الخاطم . حوتها ماصة . زعانفها الظهرية مستطيلة . زعانفها
 الذيلية مستعرضة ، محدودة الاطراف العليا والسفلى بتأخر
 خضروفية لينة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٢٢٧٨٦ - **فُفْزْدُ**
 Canavalia (S), Canavalia (F).
 جنس نباتات برية وزراعية ، حارشة اومدادة ، من فصيلة
 القرنيات . أنواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات
 المناطق الحارة والاستوائية الاسيوية والافريقية . اوراقها
 مركبة ثلاثية تشبه اوراق الفاصوليا . ازهارها متعقوبة
 التجميع ، محورية الارتكاز . ثمارها قرين كبيرة القند ،
 حليقة الحب ، ثنائية الجناح البرزي || اشهر أنواعه
 الزراعية ما يلي .

وهي مولة بالتمام الاقليمي لا تأثر بسما . ترح في
 الجبل وترقد في النهار وهي في وقادها تنقبض وتتكور فتبدو
 ككرة من الفلك . الاثني اكبر حجماً من الذكر تنضج
 من ٢ الى ٨ جراه تبصر النور بعد وضعها باربعة اسابيع .

٢٢٧٨٨ - **فُفْزْدُ آذِن**
 Erinaceus auritus (S).
 موطنه العراق والاناضول وسورية ولبنان . جسمه يطول
 نحو ٢٦ سم . ويملو نحو ١٢ سم . اذناه كيرتان .
 خطمه وجراحوه مستطيلة . شوكة ابيض القاعدة اسمر الجرم
 اصفر الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٨٩ - **فُفْزْدُ أُرُوبِي**
 Erinaceus europaeus (S), Hérissou d'Europe, Echinus (F).
 موطنه اوروبية ، جسمه يطول نحو ٣٠ سم . ويملو ١٠ سم .
 عظمه يشبه فنفقة الخنزير . عتقه قصير . اذناه صغيرتان .
 شوكة اسمر الجرم ابيض الطرف يطول نحو ٣ سم .

٢٢٧٩٠ - **فُفْزْدُ الْمَغْرِب**
 Erinaceus algirus (S), Hérissou algérien (F).
 موطنه افريقية الشمالية من مراکش الى طرابلس القريب .
 جسمه يطول نحو ٢٢ سم . بطنه حنطي اللون . شوكة فضي
 القاعدة ، احمر الجرم ، اسود الطرف ، يطول نحو ٢٥ سم .

٢٢٧٩١ - **فُفْزْدُ التَّمَل**
 Echidné (F).
 هو النضاض ، اطليه .

٢٢٧٩٢ - **فُفْزْدُ حَبَشِي**
 Erinaceus aethiopicus (S), Hérissou abyssin (F).
 موطنه الحبشة وجورجيا . جسمه يطول نحو ١٨ سم .
 بطنه اسمر اللون . شوكة ابيض القاعدة مضلع الجرم
 الاسمر ، لغير الطرف ، يطول نحو ٢٥ سم .

٢٢٧٩٣ - **فُفْزْدُ سُكَّارِي**
 Erinaceus megalotis (S), Hérissou à longues oreilles (F).
 موطنه الانفان ، جسمه كبير القند يطول نحو ٣٠ سم .
 اذناه كيرتان وذنبه كذلك . شوكة اسمر اللون يطول نحو
 ٣ سم .

٢٢٧٩٤ - **فُفْزْدُ طَوِيلُ الشَّوْكَةِ**
 Erinaceus macrocanthus (S), Hérissou à longs piquants (F).
 موطنه العرب والانفان والكرديستان . جسمه متوسط القند يطول
 نحو ٢٤ سم . اذناه كيرتان ذلقتان . شوكة اريد الجرم ،
 اصعب الطرف ، يطول نحو ٤ سم .

٢٢٧٩٥ - **فُفْزْدُ مِطْبَن**
 Erinaceus albiventris (S), Hérissou à ventre blanc (F).
 موطنه افريقية الشرقية والجنوبية من مصر والسودان وسائر
 ال الموزنيك . جسمه يطول نحو ٢٥ سم . بطنه ابيض
 اللون . شوكة الى الصبغة يطول نحو ٢٧ سم .

٢٢٧٩٦ - **فُفْزْدُ مَطْوِق**
 Erinaceus collaris (S), Hérissou à collier (F).
 موطنه الهند والسند والبنجاب . يرغب في القلياني والصمغاري
 الزينة . جسمه اسمر اللون يطول نحو ١٨ سم . عتقه مطوق
 بالابيض . شوكة اسمر الجرم ، اغبر الطرف ، يطول نحو
 ٢٨ سم .

٢٢٧٩٧ - **فُفْزْدَةُ**
 Hérissoune (F), She-hedgehog (E).
 انثي الفنفذ .



فنفذ البحر



فنفذ



فنفذ

٢٢٧٨٧ - قُفُول بَايِر ، قُفُول هِنْدِي

٢٢٧٩٢ - قُنْقِينَة *

Trigona (S).

Trigone (F), Trigone (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم
وفصيلة القنفذات. أنواعها الماعسة المرفوعة حبة أطرافها
تحت من البحر الأحمر إلى الهند وأستراليا || أصدافها
ثنائية المصاريح المتساوية الإضلاع ، مخددة السطح
الخارجية ، مائلة الداعلية القلوية التركيب الجميلة الألوان
القنقطنية .



قنفر

٢٢٧٨٨ - قُنْقُول سَبِي ، قُفُول سَبِي

٢٢٧٩٤ - قُنْقِينِيَات

Trigonidae (S).

Trigonidae (F), Trigonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الحياشيم
اجتناسها وأنواعها المرفوعة عديدة منتشرة في معظم بحار
العالم || أصدافها ثنائية المصاريح ، متباينة الأحجام ،
شبه مخروطية الشكل ، مخددة الصنعات المحززة || أشهر
اجتناسها القنفذة والجمبة .

Canavalia ensiformis (S). Canavalle ensiforme, Har-
ricot-sabre, Pois-sabre (F). Sword-bean, Jack-bean
(E). Kanavalbohne (D). Canavalia (I).

نوع من القنقولات وهو نبات زراعي مأكول البُأَر كاللوباء
والقول . ينبت البلاد الحارة . يعيش من ٣ إلى ٥ سنوات .
ساقه عارية ملتفة . أوراقه كبيرة . وريقاتها بيضيه ذلقة ،
لصلها جلدي الصلصة . أزهاره جزئية اللون . مغنونة
التصنيع . مستطيلة الماديق . ثمارها قرون متدلية ، مقوسة
كالبسب تطول نحو ٣٠ سم . وقمرش ٣ سم . تغلف من ٨
إلى ١٢ حبة كبيرة القند مغلطمة الشكل يبيض البُأَر أو
وردي || قرونها المخضرة تستعمل استعمال القوياء وهي
للبنوة العلم جيدة الصنف . سحوية مأكولة ، غزيرة المواد
الغذائية ، تحوي ما تزيده وقدره :

مواد ازرقية	٢٥,٦٢ ٪
مواد دهنية	٢,٣٢ ٪
مواد هيدروكربونية	٤٧,٩٤ ٪

Ranchement (F). Rancidity (E). قَسَم - ٢٢٧٩٥
فساد اللحم أو الزيت رغيث رجيها .

Thyrs شكل من أشكال الاضرار المغنوي تكون فيه الاجزاء
الوسطى أطول من السفل والعليا .



قفر منسأ

٢٢٧٩٧ - قُنُو ، قُنُو ، قُنِي ، كَبَسَة

Régime de dattes (F). Cluster (E).

هو البُكَ الذي يحمل ثمار النخل وهو كالمغنون من السنب
ج أَقْناء وقُتبان وقُتوان .

Bourgeons à fleurs (F). قُنُو - ٢٢٧٩٨

Blossoms buds (E).

هي أذن الثبات أو أكنة زهرة نخل . يدق قيل قد أقب .

٢٢٧٩٩ - قُنُوس التَغْدِيَة

Normes d'alimentation (F). Feeding norms (E).

ما يجب اعتداده في تمييز مقادير العناصر الغذائية اللازمة
لكل حيوان أو فئة من الحيوانات بالنسبة إلى صه ووزنه
وجيرمه وعمله .

Chanos salomoné (F). قُنُوس - ٢٢٨٠٠

سمكة بحرية من الصابغيات تدعى شوموس ، أطرافها .

Mormyrus (S). Mormyre (F). قُنُوم - ٢٢٨٠١

جنس اسماك نهري من فصيلة القنقليات . أنواعه نحو ١٨
منظفها من اسماك المياه الإفريقية اصحابها النيل والنيجر .
أشهر أنواعه القنقولة أطرافها وقنوة النيل والقنقولة .



قنفة

Mormyrus caschive (S). قُنُومَة خَطْمَاء - ٢٢٨٠٢

Mormyre ruma (F).

سمكة مستطيلة الجسم ، لينة الزعانف ، صغرة الفم ، مستطيلة
الخطم الطويل . يتكرر رسوؤها في النيل . كانت من الاسماك
المكرمة عند قدماء المصريين .



قنوم

٢٢٨٠٣ - قُنُومَة خَطْمَاء ، أَمُورُوز

Mormyrus oxyrhynchus (S). Mormyre à bec (F).

نوع من القنوم وهي سمكة لينة الزعانف ، مودية الفم ،
تكثر في النيل والنيجر .

Kangourous (F). قُنُقَارِيَات - ٢٢٧٩١

Kangaroo (E).

فصيلة حيوانات لبونة عاشية من الجرابيات طولات
الأرجل . أنواعها المرفوعة نحو ٢٥ تنقسم إلى ثلاثة اجناس
القنقور والفراب والتغاب || اجسامها متباينة الأحجام
التي تراوح من قد الأرنب إلى قد الصلابة . رؤوسها شبه
مخروطية الشكل . أذنانها كبيرة منتصبة . أعناقها وأذنانها
مستطيلة . قوائمها الخلفية بالغة الطول . أذنانها رباعية
الاختلاف || موطنها أستراليا وتسمانية ونيوفا الجديدة والجزر
الجارية .

٢٢٧٩٢ - قُنُقَان صدف بحري .

٢٢٨٢٠ - قَتَوِيَّة ٥ Ductule
قناة جهازية دقيقة تكون في الحشرات والحشرات الدنيا .
٢٢٨٢١ - قَتَبَلَة ٥ كل حشرة تنتمي الى القهليليات .

٢٢٨٢٢ - قَتَبَلَس ٥
كل حشرة تنتمي الى فصيلة القهليليات .

٢٢٨٢٣ - قَتَبَلَسِيَّات ٥ Psocidae (S).
Psocidés (F). Psocidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة القهليليات اجناسها وانواعها عديدة
جميعها صغيرة القد طويلا يراوح من ١ الى ٣ م . اثنائها
الى الرتبة السوداء يطولها موج اسفح || قوتها ما ينمو
على النبات من الفطور .

٢٢٨٢٤ - قَتَبَلِيَّات ٥ Corrodentia,
Psocoptera (S). Psocoptères (F). Psocoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة القمليات تشمل القهليليات
والناسيات .

٢٢٨٢٥ - قَتَبِي ٥ Perdrix robuste (F).
هو الحجل النباهي ، اطلبه .

٢٢٨٢٦ - قَتَد Narcisse (F).
هو الزرجس ، اطلبه .

٢٢٨٢٧ - قَتَب Aubergine blanche (F).
ضرب من الباذنجان ابيض الجار يستعمل كنبات تزيين .

٢٢٨٢٨ - قَتَهْر ، قَتَهْوَر Fibres du dattier (F).
قشرة حمراء مسفرة الالياف المبركة تكون على لب النخلة .

٢٢٨٢٩ - قَتَبَعَة صوت الدب .

٢٢٨٣٠ - قَتَهْم Anorexie (F). Loss of appetite (E).
قلة الشهوة للطعام عند الحيوان .

٢٢٨٣١ - قَتَبَج Perdrix robuste (F).
هو الحجل النباهي ، اطلبه .

٢٢٨٣٢ - قَتَهْرَان ٥ * Amphibenus (S).
Amphibène (F).
جنس عظام من فصيلة القهقرانيات انواعه ثلاثة طويلا
من ٣٠ الى ٥٠ سم . اجسامها اسطوانية . اثنائها
الى السرة السوداء يطولها تجذيع اخير . قوتها الحشرات .
تميش في التربة وتكثر قرب المنازل حيث تؤين الغذاء .

٢٢٨٣٣ - قَتَهْرَانِيَّات ٥ Amphibinidae (S).
Amphibinidés (F). Amphibinidae (E).
فصيلة من البطانيات المديمات الارجل والروح الجنيهي .
اجناسها قليلة العدد . تميش تحت الارض . جميعها من
الزحافات الناعمة .

٢٢٨٣٤ - قَوَائِم Rémiges primaires, Flèches (F).
Wing primaries (E).
ريش مقدم جناح الطائر وهي الاصغار والواشر .

٢٢٨٣٥ - قَوَائِم Rongeurs (F). Rodentia (E).
رتبة حيوانات من البوانات تتميز باجسامها الصغيرة القد
وبشايها المستطيلة الحادة الاطراف التي تمكها من القضم .

٢٢٨٠٤ - قَتَوِيَّات Mormyridae (S).
Mormyridés (F). Mormyridae (E).
فصيلة اسماك نهريه من مفتحات المثانة اشهر اجناسها
القوم .

٢٢٨٠٥ - قَتَوِي ، وَعَالِي Vascular (F).
Vascular (E).
نمت تعريني يطلق على النباتات القنوية اي الوائية النسيج .

٢٢٨٠٦ - قَتَرِي ٥ Botryoides (F). Botryoid (E).
نمت ترمويي يطلق على ما كان شكله كالقنر .

٢٢٨٠٧ - قَتَوِيَّات هي المارزوانيات ، اطلها .

٢٢٨٠٨ - قَتَرِي ، وَعَالِي Vascularisation (F).
Vascularization (E).

القنوية ، جسوريا ، تكون اوعية جديدة في النسيج
المضوية . وهي ايضا النمط الذي تتخذه الاوعية في حالة
عضوية معينة .

٢٢٨٠٩ - قَنِيْل Nuque de l'éléphant (F).
Nape of the elephant (E).
رتبة الفيل حيث يجلس الفيل .

٢٢٨١٠ - قَتِيْب Nuage épais (F). Thick cloud (E).
سحاب متكاثف التجميع عابق اللون .

٢٢٨١١ - قَتِيْب Involutelle (F).
قنابة صغيرة القد تملق قاعدة الرؤية الزهرية .

٢٢٨١٢ - قَتِيْبَة Bractéole (F). Bracteole (E).
قنابة صغيرة الحجم تملق قاعدة القتيب .

٢٢٨١٣ - قَتِيْبَرَة Feuilles mortes de pins (F).
اوراق الصنوبر اليابسة تلتصق الارض .

٢٢٨١٤ - قَتِيْبَعَة Glumellule (F).
حبة ثلثافة صغيرة القد تحت العنيفة ملاصقة الزهرة . وما
قنبتان لكل زهرة من زهرات السنبلة .

٢٢٨١٥ - قَتِيْس Phénotype (F). Phenotype (E).
هو من النبات الذي يتصل بالصفات الشوزبية المنسوبة
الى محوره .

٢٢٨١٦ - قَتِيْبَعَة راجع صيه .

٢٢٨١٧ - قَتِيْبَعَة راجع أناسيكلوس .

٢٢٨١٨ - قَتِيْبَة Vorticillolaps (S).
جنس فطور مجهرية من الفتيخيات وفصيلة الوطحيات .

جره الكنيبة منتصبة ، فرومه ريشية الشكل ، قاعدة
الارتكاز . كتائفه شمعية التجميع ، يفضي للشكل ثلثافة .
انواعه قليلة العدد والاذى تهر في تكاثرها ككتل من العفن
الايش تركب المواد النباتية والمضوية المنطلة .

٢٢٨١٩ - قَتِيْبَة Fiote (F). Phial (E).
ققم زجاجي اامادة صنير القد محكم الد .



قَتِيْبَرَة

Malandre (F).

Malander, Rotten Knot (E).

٢٢٨٤٣ - قُوَيْمَةُ الرُكْبَةِ

مرض جلدي يَترى رُكْبَةُ القُرْس .

Dartrose de la vigne (F).

Dartous of the vine (E).

وصم نباتي مظهره الخارجي قروح وفلوج في اصول وسروع الكرمية . سببه حائل غشائية احصها الفسوية .

٢٢٨٤٥ - قُوَيْمَةُ رَطْبَةِ ، اَكْرَمِيَا رَطْبَةِ

Impétigo, Eczéma humide (F). Impetigo, Eczéma damp (E).

مرض جلدي يركب الحبوب .

Alouette cochevis (F).

٢٢٨٤٦ - قُوَيْمَةُ

في القبرة المنحنية ، اطليا .

Sternite (F).

٢٢٨٤٧ - قُوَيْمَةُ

هي الاسرة مفصل من مفصل بين الحشرة . ج قوب .

Coque d'oeuf (F). Shell (E).

٢٢٨٤٨ - قُوَيْمَةُ

قشرة البيض بعد انفلاتها من القرخ . ج قوب والوباب .

Bergeronnette pristanrière (F).

٢٢٨٤٩ - قُوَيْمَةُ

رابع ذمرة الربيع .

٢٢٨٥٠ - قُوَيْمَةُ الارضي شوكي *

Depressaria subpropinquella (S). Teigne de l'artichaut (F).

حشرة من القديريات فراشتها صغيرة اللد ، حنطية اللون ، يسطها نحو ١٠ م . يرتقا غبار اللون ثلاثية الخطوط القلابة . تركب الارضي شوكي .

٢٢٨٥١ - قُوَيْمَةُ الاراكيبه * ، قُوَيْمَةُ الجُلَسَان

Gracilaria azulella, G. azulella (S). Teigne de l'axaïlle (F). Axaïlle leaf miner (E). Axaïlle-motte (D).

حشرة من القديريات يسطها نحو ١٠ م . رؤاشها خفيفة حنطية اللون فضية اللون . يرتقا دقيقة الجسم غبار التوب تلم الارواك ولذاتها .

٢٢٨٥٢ - قُوَيْمَةُ الأشجار المنشرة

Teigne des arbres fruitiers (F).

هي التبيكة الصنيرة ، اطليا .

٢٢٨٥٣ - قُوَيْمَةُ البراهيم

Teigne des bourgeons (F).

هي التبيكة الصنيرة ، اطليا .

٢٢٨٥٤ - قُوَيْمَةُ التفاح

Teigne des pommiers (F).

هي عرطيط التفاح ، اطلبه .

٢٢٨٥٥ - قُوَيْمَةُ التين * ، لاهمة التين

Simaschis nemorana (S). Mineuse du figuier, Teigne du figuier (F). Fig moth (E). Feigenblatt-motte (D).

حشرة من القديريات فراشتها سمراء اللون تطول نحو ١٠ م . يسطها تراوح من ١٥ الى ١٨ م . رؤاشها مستعرضة حنطية يعلاها بيج اسف الموالج || لما جيلان في السنة . يرتقا صغيرة دقيقة تركب في جيلها الاول السطح العلوي من الورقة وتركب في جيلها الثاني الورقة والورقة والورقة حما .

فصائلها ١٤ تقتضي الى ٤ مراتب : السنجابيات الشوزب ، والقردييات الشوزب ، والشجيات الشوزب ، والبيكيات الشوزب || اما اجناسها ونواصها فكبيرة العدد .

Migrateurs (F). Migratory (E).

قواطع

الطيور التي تذهب من بلاد الى بلاد وهي ضد الاوابد .

٢٢٨٣٧ - قُوَيْمَةُ * ، اُرْتَب يَرْي ، اُرْتَب وَحْشِي

Lepus (S). Lièvre (F). Hare (E).

جلس حيوانات لبيقة تنافسة من فصيلة الارنيبات . انولاه ٦٩ موطنها العالم . اجسامها مستطيلة منسجمة . طولها الكامل ، من طرفها الى طرف ذنبها ، لا يقل من ٦٠ سم . ولا يفوق ٧٥ سم . اذنانها مستطيلة ضيقة متصبة . هييا كبيرة . راطمها مفلوكة . جرابها الامامية قصيرة اللد . خاسية الاصابع ، اما الخلفية فمستطيلة وديابة الاصابع . اطانها قوية حادة . اقلها سوية اللون منها الاكهب والاصفر والاصهب والابيض الخ ... || تألت اليهر والجهال والقائبات والاحراج والحضاب والسهول . ترح في الليل . اصحرتا رداء مستطيلة الشكل تخلطها على اعماق غشلة تراوح من ٥ الى ٧٠ م . مدخلها وعرجها نطق واسه مستقيم || قوتها التيات والمجرب . اناثها ثنورة تضع من ٣ الى ٥ مرات في السنة وكل مرة من الفريسين الى الخمسة تخلف بامرة كاسية ترح برقعة امهاتها بعد وضعها بامبرع . واثي القواح تدعى درامة . وقواحة || احرف انولاه واشهرها :

Lepus timidus (S).

قواح ابيض ، قواح جبول

Lièvre timide, L. blanc (F).

Lepus europaeus (S).

قواح اروي

Lièvre européen, L. commun (F).

Lepus tolai (S). Lièvre du Thibet (F).

قواح التبت

Lepus arcticus (S). Lièvre arctique (F).

قواح الشمال

Lepus capensis (S). Lièvre du Cap (F).

قواح القطب

Lepus mediterraneus (S).

قواح المتوسط

Lièvre méditerranéen (F).

Lepus campestris (S).

قواح المراعي

Lièvre des prairies (F).

Lepus americanus (S).

قواح امريكي

Lièvre américain (F).

Lepus aegyptius (S).

قواح مصري

Lièvre d'Egypte (F).

Lepus nigricollis (S).

قواح مقلد

Lièvre mosel, L. à cou noir (F).

Eudynamis orientalis (F).

٢٢٨٣٨ - قُوَيْمَةُ

القول طائر معروف باسم عديس شرقي ، اطلبه .

٢٢٨٣٩ - قُوَيْمَةُ ، قُوَيْمَةُ

في الولاية ، اطليا .

Membres (F). Limbe (E).

٢٢٨١٠ - قُوَيْمَةُ

اعضاء الحيوان كالدين والرجلين التي توتن انتقال الجسم .

Pousin (F).

٢٢٨٤١ - قُوَيْمَةُ

هو الصمور والكنكوت . ج اقواب .

Eczéma (F).

٢٢٨٤٢ - قُوَيْمَةُ

هي الاكريميا ، اطليا .



قواح



قويمة الارضي شوكي



قويمة الازالية



قويمة التين

٢٢٨٦٥ - قُوْبَعَةُ الشَّحْمِ

Aglossa pinguinalis (S). Teigne de la graisse (F).
حشرة من القرميات. رقتها صغيرة دقيقة وريدية اللون تعيش
على اللحم الجاف.

٢٢٨٦٦ - قُوْبَعَةُ الشُّوَدَرِ ، لَيْتَه

Liza ocellatella (S). Teigne de la bettecarve (F).
حشرة من القرميات. يسقطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ م.
نوبها إلى الحطلة المائلة. رقتها خضراء اللون حمراء الحواف
تلفم بطول الشندر وتقع بها أشد الأذى.

٢٢٨٦٧ - قُوْبَعَةُ الصَّكْبِيَّاتِ
Teigne du colza
هي القرمية المائية، أطلها.

٢٢٨٦٨ - قُوْبَعَةُ الصُّوفِ * ، سَيْفَعَةُ الصُّوفِ

Tineola bisellifella (S). Teigne de la laine. Mite
des vêtements (F). Webbing clothes moth (E).
Kleidermotte (D).

حشرة من القرميات رقتها صغيرة دقيقة زبداء اللون تركب
جميع الاجسام الصوفية بما فيها السجاد.

٢٢٨٦٩ - قُوْبَعَةُ الْفِرَاكِ * ، سَيْفَعَةُ الْفِرَاكِ

Trichophaga tapetzella, *Tinea tapetzella* (S). Teigne
des fourrures, Mite des fourrures, Mite des
tapis (F). Carpet moth (E). Tapetanmotte (D).

حشرة من القرميات رقتها صغيرة اللون سمراء اللون تركب
الفراء وتقرضها.

٢٢٨٧٠ - قُوْبَعَةُ الْفَلَيْنِ ، سَيْفَعَةُ الْفَلَيْنِ

Aenophila flavum (S). Teigne du liège (F).
حشرة من القرميات رقتها صغيرة اللون دقيقة سمراء اللون
سنتية المروج تلفم الفلين المصنوع لتعطيه.

٢٢٨٧١ - قُوْبَعَةُ الْكُرَاتِ

Acrolepis assectella (S). Teigne du poireau (F).
Leek moth (E). Lauchmotte (D).

حشرة من القرميات صغيرة اللون يسقطها نحو ١٢ م.
نوبها إلى الحطلة السواء رواشها منشفة بالأسود. رقتها
دقيقة سنتية اللون تلفم الكرات بأوراقه وقص ساه.

٢٢٨٧٢ - قُوْبَعَةُ الْكَرْزِ *

Argyresthia aphipella (S). Teigne du cerisier (F).
Cherry fruit moth (E). Kirschblütenmotte (D).

حشرة من القرميات. يسقطها تراوح من ١٠ إلى ١٢ م.
رواشها الايمانين الى الرمادي يطولها تمريج أسود.
رواشها الحفلانيان الى السمرة الخطية السوية يحرقها أطار
من الخمل الاصب التام. رقتها تركب ازهار وتماز
الاجرام المشرقة اصعبها الكررز.

٢٢٨٧٣ - قُوْبَعَةُ الْكَيْشِيشِ

Incurvaria capitella (S). Teigne du groseillier (F).
حشرة من القرميات يسقطها نحو ١٥ م. رواشها جورية
اللون يعلوها تبيج اصفر مثلث الزوايا. رقتها تبرد حمراء
اللون في اول عهدها ثم خضراء زاهية فقاومة وهي تقرض
براعم وتماز الكشمش.

٢٢٨٥٦ - قُوْبَعَةُ النَّبَاتِ * ، سَيْفَعَةُ النَّبَاتِ

Tinea pellionella (S). Teigne des vêtements (F).
Pelt moth (E). Pelzmotte (D).

حشرة من القرميات. رقتها صغيرة دقيقة تعيش على
النبتات الصوفية. احيائها الحولية من ٢ الى ٥. فبالج
عادتها غدية الشكل متينة النواص.

٢٢٨٥٧ - قُوْبَعَةُ الْجَزْرِ

Depressaria nervosa (S). Teigne de la carotte (F).
Carrot moth (E). Kümmermotte, Möhrenschebe (D).
حشرة من القرميات. رقتها صغيرة خضراء اللون تعيش على
ازهار الجزر وفيرة من لباتات الفصيلة الحمية تنقص
على الازهار وقد لا تمتص من البذور.

٢٢٨٥٨ - قُوْبَعَةُ الْحَبِيبِ * ، حَنْطَبُ الْحَبِيبِ

Tinea granella (S). Teigne des grains (F).
European grain moth (E). Kornmotte, Weisser
kornwurm (D).

حشرة من القرميات. يسقطها تراوح من ١٠ الى ١٤ م.
رواشها الى البياض الاخير يطولها تبيج حنطي ومجاة نضية.
رقتها وسيدة الجبل الحولي، صغيرة اللون، تركب. جميع اجزاء
المواد الغذائية المخزونة ولا تمتص من الحنطة والشعير.

٢٢٨٥٩ - قُوْبَعَةُ الْحُصْبِيَّاتِ *

Prays citri (S).
Teigne du citronnier (F).
حشرة من القرميات. صغيرة اللون يسقطها نحو ١٠ م.
نوبها الى الحطلة. رواشها مرقشة. ثلاثية الاجيال الحولية.
رقتها صغيرة اللون، تركب ازهار وتماز الحصبيات.

٢٢٨٦٠ - قُوْبَعَةُ الْخَشَبِ

Teigne du bois mort (F).
هي المرمية النيبكة، أطلها.

٢٢٨٦١ - قُوْبَعَةُ الدَّرَّاقِنِ ، سَرَسْتُوم *

Cerostoma persicella (S). Cérostome du pêcher (F).
حشرة من القرميات كبيرة اللون يسقطها نحو ٢٥ م.
رواشها الايمانين الى الصفار الكبريتي والخلفاني الى
الطحلة. رقتها وسيدة الجبل الحولي تركب اوراق الدراقن
والوزر.

٢٢٨٦٢ - قُوْبَعَةُ الدَّرَّاقِنِ الصَّغِيرَةِ * ، أُنْرَسِيَا *

Anarsia lineatella (S). Petite mineuse du pêcher (F).
Peach twig borer (E). Pfirsichmotte (D).
حشرة من القرميات. يسقطها تراوح من ١٤ الى ١٦ م.
رواشها شقيقة حطلاء اللون. لها حيلان في الحول. تركب
رقعة الجبل الاول الاثنان الثانية ضلعمها وتحول دون تمها.
اما رقات الجيل الثاني فتتركب الثمار وتنقرها.

٢٢٨٦٣ - قُوْبَعَةُ الزُّعُرُورِ

Teigne de l'aubépine (F).
هي التبيكة الصغيرة، أطلها.

٢٢٨٦٤ - قُوْبَعَةُ الزَّيْتُونِ *

Prays oleella (S).
Teigne de l'olive (F). Olive moth (E). Oliven-
motte (D).

حشرة من القرميات. صغيرة اللون يسقطها نحو ١٠ م.
نوبها رمادي اللون نضي المروج. احيائها الحولية ثلاثة.
رقتها صغيرة اللون سنتية اللون ثلاثية الحطوط السمرة القاطية
تركب الارواق ضلعمها والازهار تقسب اخلصها والثمار
فتنقرها وتعلبها.



قوبعة النياب



قوبعة الحبوب



قوبعة الحصبيات



قوبعة الدراقن الصغيرة



قوبعة الزيتون



قوبعة الصوف



قوبعة الفراء



قوبعة الكررز

مكثا ذري القند مستدير الشكل لاقلامي التجميع . يرتقاها صغيرة ملونة تلثم الاوراق والاعزاز . خادراتها تحلج ضمن نبالج سبكها نولس لبد متين .

٢٧٨٨٤ - قُبُوعِيَاتُ
Cobecaeae (S). Cobacaeae (F). Cobacés (F). Cobacées (F).

فصيلة نباتية وسيدة الجلوس . نباتاتها عارضة مهددا امريكية الاستوائية . ومن النباتيين من قال انها عارمة من القبيسات ومنهم من اعتبرها عارمة من البقبيسات .



قُبُوعَةُ مَاسِيَّة

٢٧٨٨٢ - قُبُوعِيَّةُ
Cobaea (S). Cobéa, Cobéa (F). Cobée (F).

جلوس نباتات عارضة معمرة من فصيلة القوبييات . انواعها اربعة اصنافها البلاد الامريكية . جميعها تريبتية . ازهارها جرسية الشكل ملونة . ثمارها حقية مسطلة . يزورها مبطلة || اعرف انواعها واشهرها القوية العارضة .

٢٧٨٨٣ - قُبُوعِيَّةُ عَاشِرَةٌ *
Cobaea scandens (S). Cobéa grimpante (F). Cups and saucers, Cathedral bells (E). Klettertulpen, Glockenrabe (D). Cobea (I).

نوع من القوية ساقها ليفية عارضة تطول نحو ١٨ م . اوراقها مركبة وريقاتها ليفية النصل تطول من ١٥ الى ٢٢ سم . ازهارها كبيرة القند تطول نحو ٨ سم . اكلمها بنفسجية مضلعة . توجعها جرسية الشكل ، لغرض اللون ، بنفسجي المروج || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين الاول .



قُبُوعَةُ نَاسِجَةٍ

٢٧٨٨٤ - قُبُوعِيُون ، حُوتُ الْجِنِّ *
Gobius (S). Gobia (F). Goby (E).

جنس اسماك بحرية بثرية ترشب في لباد الرأكة . اجسامها صغيرة . رؤوسها كبيرة ، اشداها واسعة ، انزاعها حديدية . جميعها من الاسماك الرئائية التي تقفز فوق الماء . منظرها في الاسماك السامة وبعضها مأكول . انزاعها للامانة كثر في البحر الاحمر والخليج الفارسي وبحر الهند .



قُبُوعِيَّةُ عَاشِرَةٌ

٢٧٨٨٥ - قُبُوعِيُونُ اسْوَدَ * ، كُرُوجُ اسْوَدَ
Gobius niger (S). Gobie noir, Boulereot noir (F). Black goby, Rock-fish (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة القوبيويات وربة شاكاتات الزعانف . اصنافها معظم اقلام البحر الابيض المتوسط . تغير من اسماك الغثاف والمهادج . تموش بين الصغور وفي الاوساخ || جسمها مستطيل الشكل ، مستدلل البطيط ، يطول نحو ٢٠ سم . ثوبها الى الكعبة السراء يعلموها تتحجج اسود في الظهور وتنظف اسود في الجانبين تتخلله بعض النقط الصف . رأسها كبير الجرم ، برمي الشكل ، قصير الخيط . شفاها مستدل الانفراج ، فكها متعادلان . اسنانها صغيرة ، ذرية ثنائية الصف . عينها يبيضتان . رديتا الانكاز . زعانفها متباعدة التركيب والاشكال . زعنفتها الذيلية رديحة الشكل || لديها جيد الصف ، مرغوب فيه .



قُوبِيرُونُ اسْوَدَ

٢٧٨٨٦ - قُوبِيرُونُ مُدَمَّى * ، كُرُوجُ مُدَمَّى
Gobius cruentatus (S). Gobie sanglant (F). Bloody goby, Sea-gudgeon (E).

سمكة بحرية يبيض من فصيلة القوبيويات . اصنافها معظم اقلام البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق الهند الاطلسي || تغير من اسماك الغثاف والمهادج . جسمها مستدل القند ، شبه احليجي الشكل ، يطول من ٢٠ الى



قُوبِيرُونُ مُدَمَّى

٢٧٨٨٤ - قُبُوعِيَّةُ الْبَلَاكُ
Gracilaria syringella, Xanthosiphaster syringella (S). Taigne du lilas (F). Lilac leaf miner (E). Fleddermotte (D).

حشرة من القوبييات صغيرة القند بسطها تراوح من ٩ الى ١٠ م . ثوبها حنطي اللون . يرتقاها تلثم اوراق اليك وتقتل اطرافها شغلها .

٢٧٨٨٥ - قُبُوعِيَّةُ الْمَضَافِ
Hyponomeuta cognatella, H. evonymella (S). Hyponomeute du fusain (F).

حشرة من القوبييات فراشها صغيرة القند ودهاء الثوب . يرتقاها فبراء اللون تلثم ورق المضاف بعد ان تجلبه بشاشة من النواص المنكوي تمش في داخلها حتى اكبال تطورها .

٢٧٨٨٦ - قُبُوعِيَّةُ التَّجِيلِيَّاتِ * ، اَكِيْسَةُ
Elachista argentella (S). Elachiste argentée (F).

حشرة مؤذية من القوبييات . فراشها صغيرة القند ، بسطها تراوح من ١٢ الى ١٥ م . روشنها الاماميان الى الطلعة الفضية . روشنها الخلفيان الى الصلبة يحجبها اطوار من الخمل المهدب الصنابي اللون || يرتقاها صغيرة دقيقة حنطية اللون تركب صفت التجليات فتلثم النصل بين بشرته || تظهر الغرافة في ايار ويثقي حتى اواخر حزيران . لها سبل واحد في الحول . تنشط البرقة وتظهر دماليزها في النصل في شهر نيسان .

٢٧٨٨٧ - قُبُوعِيَّةُ الْهَلْبِ ، صَعْفَةُ الْهَلْبِ
Tinea crinella (S). Taigne des crins (F).

حشرة من القوبييات يرتقاها صغيرة القند سمراء اللون تركب الهلب وتقرعه .

٢٧٨٨٨ - قُبُوعِيَّةُ مَاسِيَّةُ * ، قُبُوعِيَّةُ الصَّلْبِيَّاتِ
Plutella maculipennis (S). Taigne du colza, Taigne des crucifères (F). Diamond back moth (E). Kohlschabe, Kohlmoths, Schleirmotte (D).

حشرة من القوبييات . بسطها تراوح من ١١ الى ١٢ م . روشنها حنطية اللون تغرقها صفرة تملو الخمل المستطيل فتلثم كالاس . يرتقا زباً ، ثوبها الى الخضار الغاتج تطول نحو ١٢ م . تركب نباتات الفصيلة الصليبية اخضا السليم فتقرض الازهار والبزور .

٢٧٨٨٩ - قُبُوعِيَّةُ نَاسِجَةٍ *
Hyponomeuta padella, H. malinella (S). Hyponomeute, Chenille fleuve (F).

حشرة من القوبييات ، نملة الجسم ضيقة الترواشن ، بسطها تراوح من ١٦ الى ٢٠ م . جيلها الحولي واحد . يرتقا تركب التفاح والخوخ والزيزرود فتتجس على الاوراق جلباباً مزياً من النواص تمش في داخلها .

٢٧٨٩٠ - قُبُوعِيَّاتٌ ، صَعْفِيَّاتٌ
Tineidae (S). Tineides (F). Clothes moths (E). Echte motten (D).

فصيلة حشرات من رتبة سرشفيات الاجنة . اجناسها وانواعها زهاء ١٤٠٠٠ منظرها من الحشرات النادرة ، صغيرة القند ضيقة الترواشن المهدبة الاطراف . ملاسها الشفوية صغيرة مدية . قروها الاستشارية عيطية سررية .

٢٢٨٩١ - **قُوَّةُ الإِنْتِاشِ** (F). Pouvoir germinatif (F).
Germinal power (E).
من المعلوم ان لكل نوع من النبات مدة فصل من الزمن تستغلها البذور الى ان يتم انتاشها || قُوَّةُ الانتاش قياس نسبي لحي يقدر بواسطته نسبة البذور الجيدة والسريعة الانبات .

٢٢٨٩٢ - **قُوَّةُ جَذَابَةٍ** (F). Force centripète (F).
Centripetal force (E).
هي القوة التي تدفع الشيء نحو المركز .

٢٢٨٩٣ - **قُوَّةُ حَامِيَةٍ** ، **قُوَّةُ حَمِيَّةٍ** (E). Force marémotrice (F). Tide-moving force (E).
هي القوة التي تكثفها أمواج البحر الطافية الغامرة في مدما وقد توسلوا في فرنسا الى استخدامها لتوليد الحركة الاندماجية .

٢٢٨٩٤ - **قُوَّةُ نَائِيْدَةٍ** ، **قُوَّةُ طَائِرِدَةٍ** ، **قُوَّةُ مَبْعِدَةٍ** (F). Force centrifuge (F).
Centrifugal force (E).
هي القوة التي تدفع الشيء لابتعاد من المركز .

٢٢٨٩٥ - **قُوَّتَانِ** (F). Yaek (F).
هو القطاس ، اطلبه .

٢٢٨٩٦ - **قُوِّيَّةٌ** (F). Bromatologie (F).
Bromatology (E).
الْقُوِّيَّة علم يبحث في الاعتناء مع وصف الاغذية وتراكيبها ومعاييرها العنصرية .

٢٢٨٩٧ - **قُوَّتِج** (F). هو الظلم ذكر النعام .

٢٢٨٩٨ - **قُوْس** (F). Arc (F). Arch (E).

٢٢٨٩٩ - **قُوْس** (F). Cintre (F). Curve of an arch (E).
٢٢٩٠٠ - **قُوْس**

القوس مجموعة من ستة كواكب تدعى القلادة .

٢٢٩٠١ - **قُوْس قُوَّتِج** (F). Arc-en-ciel (F).
هو القسطن ، اطلبه .

٢٢٩٠٢ - **قُوْسِيَّات** (F). Arctotées, Arctotidées (F).
سبط من فصيلة المركبات الهيدريات .

٢٢٩٠٣ - **قُوْصَرَةٌ** (F). Pot (F).
هي المكن زرع فيه الزهور ، ج قواصر .

٢٢٩٠٤ - **قُوْطَلَةٌ**
كلمة عامية تستعمل للدلالة على الثمر ويصل البانورة .

٢٢٩٠٥ - **قُوْطِي** ، **قُوْطَاةٌ** (F). Nasua (S). Coati (F).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة الرثويات . أنواعه المعروفة خمسة ويهم من قال انها نوبان وثلاثة ضرب . جميعها امريكية الموطن ، صغيرة القد ، جميلة الشكل ، مستندرة الاذن و كثيفة السوف الناعم ، مستطيلة الذيل الجلل . اناتها تصع من ٣ الى ٥ جراء . تألف الغابات الكثيفة . قوتها الحار والموبيبات والحشرات .

٣٠ سم . حراشفها صغيرة ، جامدة . ثوبها الى الربعة والنبرة الحمراء يطبقها في رأسها وظهرا ويطلبها يتبع عابن الحفرة كالم . زعانفها الظهرية والصدوية والذيلية مرفوعة بالاسر والاخر || رأسها كبير الجرم مستعرض الضلع والظلم . شدتها واسع الانفرج لكنها الاسفل يتقدم الاعل قليلا . اسنانها صغيرة ذرية ، ثنائية الهنث . عيناها كيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيتا الايتكار . زعنفتها الظهرية الاول مستطيلة المناخس . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || الاثني تسرا في لفقة من الصدف الكبير بد تنظيمها من الرمال والاتصال وتتقلب مع الذكر على حراسة السره حتى التفت || لها جيد الصف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٧ - **قُوْبِيُونُ مَصْبٍ** ، **كَرُوْجُ أَصْبَرٍ**
Gobius nebulosus (S). Gobie nébuleux (F).
Gobius nebulosus (E).

مكة بحرية بيوض من القويون . اصطناعا تمتد من الخليج الى البحر الاخر فالبحر الابيض المتوسط عبر قناة السويس || تعتبر من اسماك النفاق والمخادع . جسمها صغير الحجم ، مستطيل الشكل ، متدل التليط ، يطبق من ١٢ الى ١٥ سم . حراشفها معيئة جامدة . ثوبها ابيض اللون ويعلو من الخط الجانبي الى الظهر تمتد غير متفاوت الكثافة يبدو كالفصاي . اما القسم السفلي قفصي المراج . زعانفها الظهرية والرجية شفافة . الصدريه والحوضية الى الخصار البحر ويعلو الحوضية مواج اسمر . الذيلية شفافة ملوكة يختار اسود || رأسها كبير الحجم ، غزواني الشكل ، قصير الضلع النثق . اسنانها صغيرة ، متراسة . عيناها صديرتان ، مستديرتان ، ناشرتان ، رفيتا الايتكار || زعانفها الظهرية اثنتان تتميز باستطالة الشراع الثاني من الظهرية الاول الذي يبدو كسلك دقيق ، مستطيل اسود اللون . زعنفتها الحوضيتان متلاصقتان لها جيد الصف ، مرغوب فيه .

٢٢٨٨٨ - **قُوْبِيُونِيَّات** (S). Gobilidae (S).
Gobilidae (F). Gobilidae (E).

فصيلة اسماك بيوضة من شاكات الزعانف . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، معظمها بحري وبعضها نهري والبحري يكثر وجوده عند الاغوار . اصطناعا مياه البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها متوسطة القد او صغيرة . رؤوسها كبيرة . شدتها معتدلة الانفرج . عيناها مستديرة ، ناشرة . زعانفها الظهرية الاول منخسية الاطراف || أشهر اجناسها القويون .

٢٢٨٨٩ - **قُوَّةٌ** (F). Force (F).

هي صفة الالتزامية المفروضة وهي تستعمل في الصيغ التالية :

قوة الاثبات Force probante (F).

قوة الالتزام الخاص Force d'obligation privée (F).

قوة القانون Force de loi (F).

قوة المحكوم به Force de chose jugée (F).

قوة تنفيذية Force exécutoire, Exécution parée (F).

قوة قاهرة Force majeure (F).

٢٢٨٩٠ - **قُوَّةُ الْإِتْمَاصِ** ، **قُوَّةُ الْمَصِّ**
Pouvoir absorbant (F). Absorptive power (E).

خاصة الترأب التي تمكنه من الاحتفاظ بين ذراته بعض العناصر الذائبة القابلة للربان .



قويون مصب

والبور. ساقه فراءه تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. اوراقه صفوة
فضيلة زينة النصل. وروائته الزهرية فردية التجميع،
لقنوسية الشكل، صفراء اللون.

٢٢٩١٧ - قُوطِحَان المَرْجُج * ، كَرْوَلَم البَر * ، مَنَدِيلَه

Chrysanthemum coronarium (S). *Chrysanthème à carène*, C. des jardins, Marguerite des champs (F). *Crown daisy*, C. marigold, *Garden chrysanthemum* (E). *Kronenwucherblume* (D). *Crisantemo da mazzi*, *Bambagelle*, *Margherita gialla* (I).

حشبة سولية برية وردينية. ساقها فراءه مكشعة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقها قدية التفريش. وروائتها الزهرية متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم. طليها أصفر اللون أخضر الملاج. لبنتها للصفراء الزاوي || أزهاره يستمر من حزيران إلى ايلول.

٢٢٩١٨ - قُوطِحَان ذَهَبِي * ، قُودِيَا ، كَرْوَلَم مَحْصَل

Chrysanthemum segetum (S). *Chrysanthème des blés*, *Marguerite dorée*, M. jaune (F). *Corn chrysanthemum*, C. marigold, *Yellow corn-flower* (E). *Echte Wucherblume*, *Kornringelblume* (D). *Margherita dorata*, M. delle messi, *Crisantemo* (I).

حشبة سولية برية وردينية ساقها قليلة الفروع تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. اوراقها قدية التفريش، بحرية اللون، تحية النصل، متباعدة التنوين. وروائتها الزهرية ذهبية اللون، متوسطة القد، قطرها نحو ٤ سم. طليها متفخمة حية الشكل || أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

٢٢٩١٩ - قُوطِحَان كَبِير *

Chrysanthemum leucanthemum, *Leucanthemum vulgare* (S). *Chrysanthème grande marguerite*, *Cil de bœuf* (F). *Ox-eye daisy*, *White-weed*, *Dog daisy* (E). *Ginsäwucherblume*, *Riesenmargherita*, *Goldsblume* (D). *Margherita grande*, M. dei prati, *Margaritone* (I).

حشبة برية مملوءة ممرسة ساقها فراءه تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. اوراقها لاقياسية الشكل وإلته، وروائتها الزهرية كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ سم. لبنتها غنية مستطيلة. أزهارها يستمر من ايار إلى تشرين الثاني.

٢٢٩٢٠ - قُوطِحَان مَحْزُونِي * ، رُؤَيْدَة مَسْمُومِي

Calendula officinalis (S). *Souci officinal*, S. des jardins, S. à bouquet, S. double, *Mirliton* (F). *Hen and chickens*, *Poc marigold* (E). *Ringelblume*, *Garten-ringelblume* (D). *Calendula*, *Calta dei giardini* (I). نبات حشبي حولي ويحول من فصيلة المركبات. فروعها الزراعية عديدة سقها تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. اوراقها سنائية متعاقبة. وروائتها الزهرية كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها إلى الصفرة اللحية المائلة.

٢٢٩٢١ - قُوطِحَان مَنِيَات * ، شَجَرَة مَرَم * ، كَرْكَاش

Chrysanthemum parthenium (S). *Chrysanthème-Matricaire*, *Grande camomille* (F). *Feverfew chrysanthemum* (E). *Goldfederwucherblume*, *Grosse Kamillen* (D). *Amarella*, *Matricale*, *Morella*, *Partenion* (I).

حشبة برية ممرسة فواحة اللرب. ساقها حيداء فراءه تملو من ٢٠ إلى ٧٠ سم. اوراقها رطلة لاقياسية للثريم تطويل



قُوطِي مَعْرُوف



قُوطَاغ



قُوطِحَان المَرْجُج

قُوطِحَان الحَقْل



قُوطِحَان كَبِير

قُوطِحَان ذَهَبِي



قُوطِحَان مَنِيَات

قُوطِحَان مَحْزُونِي

Nasua rufa (S).

Coati roux (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٤٨ سم. وذنبه ٤٢ سم. ارتفاعه نحو ١٩ سم. ثوبه إلى الجلوة الزاهية يمتد حتى الظهر. رأسه ويصره إلى السمرة الرمادية. ذنبه أصهب اللون مطرق بالأبيض || أعضائه شاسعة الحفود تم جمع بلاد أمريكا الجنوبية.

٢٢٩٠٧ - قُوطِي مَعْرُوف * ، قُوطِي مَنَحْجَابِي * Nasua narica (S). Coati auricula (F).

نوع من القوطي. جسمه يطول نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٢ سم. ارتفاعه نحو ٢٥ سم. ثوبه إلى السمرة السوداء المراج. بطنه إلى الصفرة. خطمه أبيض الطرف. جوارحه قصيرة وقوية، غزاله حادة خاسية || أعضائه نحيفة الأرباء تشمل المكسيك وغواتيمالا وهندوراس وكوستاريكا.

٢٢٩٠٨ - قُوطِي ، مَحْكَارَة ، صِيَوَان Pavillon de l'oreille (F). Pavillon, Auricle (E).

قُوطِي الأذن عبارة الأذن وصيوان الأذن، ثلاثة أسماء لسمي واحد.

٢٢٩٠٩ - قُوطَا Silex meulier, Pierre meulière (F). Millstone grit (E).

حجر أسود استغني شديد الصلابة تعمل منه الرعى.

٢٢٩١٠ - قُوطِي هُو البَيْع ، اَطْبَه.

٢٢٩١١ - قُوطَاغ Caquet (F). Cackle (E).

صوت للدجاجة على البيض وصوت الازرق.

٢٢٩١٢ - قُوطَاغ * Pyrola (S). Pyrolo (F).

Wintergreen (E). *Wintergrün* (D). *Pirola* (I). جنس نباتات حشبية برية ممرسة من فصيلة القُوطَاغيات أنواعها المعروفة نحو ١٢ أصلها بلاد الإقليم المعتدل. جلودها لينة. سقها مشوكة. اوراقها متعاقبة متفخمة بيضية. شاربها الزهرية متبسة. أزهارها سلبية التجميع يضاء اللون.

٢٢٩١٣ - قُوطَاغِيَات Pyrolaceae (S). Pyrolacées (F). Pyrolacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الثفلتين متحدة القساعات. أصلها وأنواعها عديدة جميعها برية لا تنفع لها. أشهرها القُوطَاغ.

٢٢٩١٤ - قُوطَاغ طَائِر يَأْلَف الخُرْبة من الاماكن

٢٢٩١٥ - قُوطِحَان Chrysanthemum (S). Chrysanthème (F).

جنس نباتات حشبية سولية ويحول وممرسة من فصيلة المركبات. الزواحة عديدة منها البرية والبرية والبرية والبرية. سقها فراءه. اوراقها متعاقبة ممرسة. أزهارها رؤسية صفراء اللون أو يضاء || أشهر أنواعها ما يتبع.

٢٢٩١٦ - قُوطِحَان الحَقْل * Calendula arvensis (S). Souci des champs, Fleur de tous les mois (F). Field marigold, Gools (E). Feld-ringelblume, Wilde Ringelblume (D). Calendula, Calta dei campi, Fiorancio (I).

نبات حشبي بري من فصيلة المركبات يتكرر في الحقول

٢٩٩٣٠ - قوتسيات *
 Delphinapteridae (S).
 Delphinapteridae (F). Delphinapteridae (E).
 فصيلة حيوانات بحرية لينة من مرتبة مثالثات الانسان
 رتبة الحوتيات || انواعها المعروفة قليلة تتميز بصر
 الحظاء وبانعدام الزعانف الظهرية || اشهر انواعها
 واهربها القوتى والبالوتة .

٢٩٩٣١ - قوتيس *
 Otocoris (S).
 Otocoris, Alouette de montagne (F). Otocoris (E).
 جنس طير من فصيلة القيريات انواعه قليلة جميعها قاطعة
 تجوب جبال الپلاد الاسيوية والاروبية . تتميز بقصصها
 الراسية الفارقة التي تبدو كقرنين صغرين . انواعها متباينة
 الألوان و ظهورها الى الربة الحمراء المواج يطولها تجذيع
 اسمر . بطونها الى الكهية البغراء . رؤوسها واعناقها موشحة
 بالاصفر || قوتيا الحشرات والبرور البرية .

٢٩٩٣٢ - قوتلان
 Koulan
 هو فراد الهند ، نوع من حمر الوحش ، اطلبه .

٢٩٩٣٣ - قوتلد زعفراني * ، قوتباد زعفراني
 Colias croceus (S). Coliade safran, le Souci (F).
 Colias croceus (E).
 حشرة من فصيلة الكرنيبات حشرغيات الاجنحة . موطنها
 المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . فراشها واثمة
 قوتيا مشر الزهار . سرقها تعيش على اوراق فصيلة
 القرنيبات القراشية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٩ م .
 يسقطها نحو ٤٨ م . رأسها اسمر اللون . عيناها كبيرتان .
 زباناها صولجانان . جنيشها برتقالي الحلقة الصدرية
 الاولي ، اريد الثانية والثالثة . بطنا احمر اللون ، اسمر
 المواج عند الذكر ، العسة عند الانثى || رؤسها الاماميان
 الى الصفار الزعفراني تملو نقطة سوداء وجدة كستنية عند
 الذكر ، سوداء اللون عند الانثى . رؤسها الخلفيان الى
 الصفار الزعفراني يتوسطه بقعة حمراء يطولها اطراف اسمر
 عند الذكر ، اسمر عند الانثى || لها جيلان في الحول .
 تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل
 الثاني في آب . تسرح في النهار . تتألف اربعة ظهورها
 بستة اسابيع وتضع المكن مهادما على نصال الاوراق ||
 البرقة تطول نحو ٤٢ م . جسمها اسطواني الشكل . قوتيا
 الى الخضار الاصفر يطولها خطان جانبيان اخيران قاطبان
 وعشرة اطواق كستنية وتغطي متباد اسود واصفر . رأسها
 اسود . مدنها ورواجها الى السمره || طول الاكمال الذي
 يستمر في الجبل الاول نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في
 الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

٢٩٩٣٤ - قوتس العظم الثاني بين اذني الغرس .

٢٩٩٣٥ - قوتس ، قوتسمة ، قوتسمة
 Salvia (S). Sage (E).
 جنس نباتات برية وريزية من فصيلة الشفويات . انواعه
 نحو ٥٠٠ منظمها بجلي وببعضها جنبي . منها الحولي
 والحول والمعمر . سوقها خشبية فمراء سريعة الانقاص
 اوراقها متقابلة معتقة . ازهارها متباينة الاشكال والاحجام
 والالوان . لانيامية التجميع والارتكاز || اشرف واشهر
 انواعها البرية والعلية والريزية ما يتبع .

نحو ٨ م . وتعرض نحو ٥ م . رؤسها الزهرية صغيرة
 اللد تقطرها نحو ٢ م . لسنتها متساوية الطول والمرض .
 ضرره عديدة منها الاصفر والابيض . واللحي والبرحي .

٢٩٩٣٦ - قوتش
 Milvago (S).
 جنس طير من فصيلة الشيوريات رتبة الجوارح جسمه
 ربع اللد ، طوله نحو ٤٠ م . رأسه مستطال الشكل .
 سقله ضيق مستطيل يذنبه كذلك وهو مسرول الفرع ،
 دقيق الخبط || موطنه البلاد الاسيوية والامريكية .
 اشهر انواعه قوتش شيشيا .

٢٩٩٣٧ - قوتش شيمشيم
 Milvago chimachima (S). Chimachima (F).
 طائر من القوتش ، طوله نحو ٤٠ م . ثوبه الى الصمبة
 الداكنة . قوائم سقله موشحة بالابيض . مسره ازرق
 اللون . رجلاه الى الخضار البحري . غاليه دقيقة || موطنه
 امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل والشيلى يعيش منفردا
 الا في زمن الترمع والحضانة || قوته الجيف والزحافات
 والانامي والحشرات على اختلاف اجناسها . اثناء تحضن
 من ٥ الى ٦ بيضات .

٢٩٩٣٨ - قوتع
 Helix (S). Escargot (F).
 هو الحلزون ، اطلبه .

٢٩٩٣٩ - قوتع
 Cantharellus (S). Chantarelle (F).
 جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات . انواعه قليلة تتميز
 باطراسها الخارجية الخامة المنتظمة التي تكثف كامل
 المسقلان || اشرف انواعه واشهرها الاصفر والبرتقالي .

٢٩٩٤٠ - قوتع اصفر *
 Cantharellus cibarius (S). Chantarelle comestible.
 Girolle, G. comestible (F).
 فطر مأكول كبير القد ، يربي الشكل ، عني الصفار ،
 ثخين الصفحة . يتباد الاطراس .

٢٩٩٤١ - قوتع برتقالي *
 Cantharellus coronilla (S). Chantarelle orange.
 Girolle orangée, Fausse girolle (F).
 فطر مأكول يكثر ساقا في بعض الاجيان . مسقلانه
 لتل تجردا من مسقلان القيقع الاصفر ، لوله الى البرتقالي .
 اطراسه متقاربة الارتكاز حادة الاطراس .

٢٩٩٤٢ - قوتل
 Tetrageallus (S).
 Tétragealle, T. du Caucase, T. Caspien (F).
 Tetrageallus (E).
 طائر وحيد الجلس والتدفع من عمارة الحجلليات وفصيلة
 البشيريات . كبير الجفط طوله نحو ٦٠ م . ثوبه الى
 الطحلة الزبداء الموشة بالاسود والاصهب . متقار اسحب
 اسحب . عنقه مطوق الزور ، قوائمه يبيض القواعد سود
 الاطراف ، افيئكه كثيف اليريش المستطيل اللبضع بالصمبة
 والسود . رصه وغاليه الى الربة || موطنه الجبال الربية
 المنقلية الاخبار . قوته الاحشاب والحروب والساقط والجفور .
 اثناء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها .

٢٩٩٤٣ - قوتبي
 Narval (F).
 هو حريش البسر ، اطلبه .



قوتع اصفر



قوتع برتقالي



قوتيس



قوتل زعفراني

وفروعها خالية زباد. اورثاقها بيضية الشكل، نصلها مذهب الطرف سنن الحافة. ازهارها كبيرة القند مستطيلة لنها الى الحفرة المايقة. توجعها تربر حل اكمامها نحو ست مرات || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢٩٤٣ - قُوْسَةُ سَمَّاجُولِيَّة *
Salvia azurea (S).
Sauge azurée (F).
جنية تريينية سروتيئة معمرة تملو من ١٠٥ الى ٢٠٠ سم. ساقها فروع خالية القلم. اورثاقها سائبة مضطوية، نصلها سنن الحافة اخضر اللون يطول من ٦ الى ٨ سم. ازهارها سبيلية التجميع، كبيرة، القند سمنجونية اللون. اكمامها لا قياسية الشكل والقند لنها الى الخضار المشرب الزرقاء || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

٢٢٩٤٤ - قُوْسَةُ صِينِيَّة *
Salvia flava (S).
Sauge chinoise (F).
بجلة تريينية معمرة فروعها تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اعطائها الصين. ازهارها عنقودية التجميع، متشعبة، كبيرة القند، تطول من ٦ الى ٧ سم. اكمامها الى الاصفر الكبريتي يطلو توضيح ارجواني || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٢٩٤٥ - قُوْسَةُ رُمِيَّة *
Salvia verticillata (S).
Sauge verticillée (F). Whorled blue flowered sage
(E). *Quiralsalvei* (D). *Salvia verticillata* (I).
بجلة تريينية معمرة. ساقها فروع تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اورثاقها قليلة الشكل نصلها جامد الصفعة الخشنة الزباد. ازهارها سبيلي التجميع. ازهارها سائبة متناقبة مستطيلة القند زرقاء اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٢٢٩٤٦ - قُوْسَةُ هَيْفَةِ الْوَرَق *
Salvia angustifolia (S). *Sauge à feuilles étroites* (F).
جنية تريينية سروتيئة معمرة . ساقها فروع تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اورثاقها ضيقة النصل مدبة الاطراف تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ ازهارها سبيلية التجميع ، زرقاء اللون ، صغيرة القند || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٢٩٤٧ - قُوْسَةُ فِصْبِيَّة *
Salvia argentea (S).
Sauge argentée (F).
جنية تريينية بجلة . ساقها فروع مزينة القلم تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اورثاقها كبيرة القند نصلها خالي البشرة على صفحيه يطلو كأنه مطلي بالفضة. ازهارها متوسطة الحجم تطول نحو ٤ سم. لنها الى البياض العاجي يطلو مزيج وردي . اكمامها غدية دقة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٢٩٤٨ - قُوْسَةُ قَاسِيَّة * وَ كَتَبُ الدَّب *
Salvia sclarea (S). *Sauge sclairée*, *Sclairée*, *Toutte-bonne*, *Orvale* (F). *Clary* (E). *Muskatsalvei* (D).
Salvia sclarea, *Matrisalvia*, *Tuttasana* (I).
جنية برية مبلولة معمرة مسكية العرف القفاوح . ساقها فروعها تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. اورثاقها بسيطة بيضية الشكل، نصلها يطول من ٧ الى ١٨ سم. ويخرج البشرة على صفحيه. ازهارها وردية اللون، ليكية المويج . اكمامها مسنة شاذكة قليلة الخمل || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٢٩٤٩ - قُوْسَةُ كَثِيرَةِ الزَّهَر *
Salvia patens (S). *Sauge à grandes fleurs* (F).
جنية تريينية معمرة . تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ساقها

Salvia sylvestris (S).
Sauge de montagne (F). *Wild sage*, *Wood sage* (E). *Waldsalvei*, *Wilde Salvei* (D). *Salvia montana*, *S. salvatica* (I).

بجلة برية طيبة مبلولة معمرة . ساقها زباد فروع تملو من ١٥ الى ٤٠ سم. اورثاقها اطيالية ضيقة ، نصلها جامد الصفعة المسنة الخملية البشرة . ازهارها عنقودية التجميع زرقاء اللون بتفسيج المويج || تكثر في الاراضي الجبلية المخجاة منهاها الصعية المعوية صديدة ويقال انها تستعمل في علاجات القالج .

٢٢٩٣٧ - قُوْسَةُ الْمَرْوَج *
Salvia pratensis (S).
Sauge des prés (F).
جنية برية مبلولة معمرة . ساقها فروع زباد دقة تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اورثاقها بيضية الشكل، قليلة القفاضة . نصلها متسج الصفعة ، سنن الحافة يطول من ١٢ الى ١٧ سم. ازهارها عنقودية التجميع ، زرقاء اللون ، بتفسيج المويج ، متوسطة القند || ازهارها يحصل على دفتين الاول من ايار الى حزيران والثانية طوال الحريف .

٢٢٩٣٨ - قُوْسَةُ رَهَبِيَّة *
Salvia splendens (S).
Sauge éclatante (F).
جنية تريينية معمرة ترعب في الموائع القليلة الرطبة . ساقها فروعها تملو من ٥٠ الى ١٧٥ سم. اورثاقها بيضية مدبة نصلها رمل التسج القاتم ، سنن الحافة ، مائل البشرة على صفحيه. ازهارها سبيلية التجميع ، ياتقوتة اللون تطول من ٧ الى ٧ سم. || ازهارها يحصل على دفتين الاول في الصيف والثانية في الشتاء .

٢٢٩٣٩ - قُوْسَةُ ثَنَائِيَّةِ الْوَلَن *
Salvia bicolor (S). *Sauge bicolorée* (F).
جنية تريينية معمرة فروعها تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اورثاقها مفردة ، مزينة ، دقة . ازهارها ثنائية اللون . اقتسامها العليا الى الزرة البنفسجية المنسقة بالاصفر اللذحي، اقتسامها السفلى الى البياض السوي . اكمامها متوسطة القند ، غدية النصل . عنقودها الزهري يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٢٩٤٠ - قُوْسَةُ صِينِيَّة وَ الْيُفُوس *
Salvia aethiops (S). *Satuge d'Ethiopie*, *Ethiopienne*.
(F). *Ethiopian sage* (E). *Ungrische Salvei* (D). *Salvia di Candia*, *S. lanata* (I).

جنية برية طيبة معمرة . ساقها فروع زباد تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. وهي كثيفة الخمل والزغب الصوفي الشكل . اورثاقها متوسطة الطول . نصلها خالي الصفعة . ازهارها صندرة القند يفضاها اللون . اكمامها مزينة عادمة التثنيق . توجعها يطول نحو ٢ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٢٩٤١ - قُوْسَةُ دَقِيْقِيَّة *
Salvia glutinosa (S).
Sauge glutineuse (F).
جنية مبلولة معمرة تكثر في الجبال . ساقها فروع تملو نحو ١٠٠ سم. اورثاقها السفلى كبيرة القند تطول من ١٨ الى ٢٠ سم. نصلها غدي الصفعة . ازهارها تطول نحو ٤ سم. لنها الى الصفرة الجملية . اكمامها انبوبية الشكل غدية البشرة || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٩٤٢ - قُوْسَةُ رُضِيْقِيَّة *
Salvia elegans (S).
Sauge élégante (F).
جنية تريينية معمرة تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها



قُوْسَةُ الْجَبَل



قُوْسَةُ الْمَرْوَج



قُوْسَةُ صِينِيَّة



قُوْسَةُ قَاسِيَّة

٢٢٩٥٧ - **قِيَاس ، تَقْيِيح ، انْفِصَاح** Grasserie
مرض يصيب دودة القز في طورها النهائي أي قبل الصمود
على الشَّح فينتفخ جسمها ويصفر لونها ويصبح جلدها
شفافاً يفرز مائلاً غروباً يلوث الورق فتضخم أجسامها
الداخلية وتموت . ويمكن للديدان المصاب بهذا المرض أن
ينسج سلجته ويتحول فيها إلى خادرة ولكن لا يلبث أن
يموت فيصبح مادة فاسدة مائلة تعطب الفيلجة .

٢٢٩٥٨ - **قِيَاس** Jockey
هو الجوكي ، اطلبه .

٢٢٩٥٩ - **قِيَاس** Mesure

٢٢٩٦٠ - **قِيَاس الإِرْتِفَاع ، تَعْدِين**
Nivellament (F). Levelling (E).
تعيين الارتفاع النسبي لختلف أجزاء الشيء .

٢٢٩٦١ - **قِيَاس الأشعة** Actinométrie (F).
Actinometry (E).
هو قياس قوة الاشعة .

٢٢٩٦٢ - **قِيَاس التحليل** Acéltimétrie (F).
Acetimetry (E).
قياس درجة تحليل الخلل أي حوضته .

٢٢٩٦٣ - **قِيَاس الحموضة** Acidimétrie (F).
Acidimetry (E).
قياس الحوامض مجردة عن مائها .

٢٢٩٦٤ - **قِيَاس الرُّطوبَة ، رَكاكَة**
Hygrométrie (F). Hygrometry (E).
قياس كمية بخار الماء في الجو .

٢٢٩٦٥ - **قِيَاس السُّكَّر** Saccharimétrie (F).
Saccharimetry (E).
طريقة تعيين مقدار السكر في السوائل والمعادن السكرية

٢٢٩٦٦ - **قِيَاس القلبي** Alcalimétrie (F).
Alkalmetry (E).
معرفة مقدار القلبي الحقيقي في البوتاس وفيه .

٢٢٩٦٧ - **قِيَاس الكُحُول**
Alcoolométrie. Alcométrie (F). Alcohology (E).
مجموعة الأساليب أو الطرائق المتصلة لتحديد مقادير
الكحول الموجودة في السوائل أو المشروبات الروحية .

٢٢٩٦٨ - **قِيَاس أملاح الماء** Hydrotimétrie (F).
Hydrotimetry (E).
قياس مقدار الأملاح الجسيمة المذوبة في الماء .

٢٢٩٦٩ - **قِيَاسَة** Mensuration (F).
Measurement (E).
وسيلة استقصاء تستعمل في الطب وفي علم الطابع والجوهران
لتحديد بعض القياسات وتقدير مواقع وأحجام بعض
الأعضاء .

٢٢٩٧٠ - **قِيَاسِي ، تَنَاسُفِي** Symétrique (F).
Symmetrical (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان منقسم التركيب منسوبه .

٢٢٩٧١ - **قِيَاسِيَّة الشَّكْلِ** Actinomorphe (F).

فروع زياء . أرواقها ريمية الشكل ، نصلها خشن الملمس
متشح الخمار . أزهارها كبيرة القذ زرقاء اللون . أكامها
تطول نحو ٢ سم . وهي خلية البشرة || أزهارها يستمر
من آب الى تشرين .

٢٢٩٥٠ - **قُوْنَسَة كَرْدِيْنَالِيَّة**
Salvia cardinalis, S. fulgens (S). Sauge cardinale (F).
جنية ترينيتية معمرة . ساقها منتصبة فروعها تملو من ١٠٠
الى ١٢٠ سم . أرواقها بيضيه الشكل قلبية القاعدة تطول
نحو ١٢ سم . نصلها جامد الصفحة خلي البشرة الخسل
مدبب الطرف . أزهارها كبيرة القذ أرجوانية اللون سلبية
التجميع تتعاقب على أبعاد متساوية قدرها نحو ٣ سم .
أزهارها يستمر من أيار الى تشرين الأول .

٢٢٩٥١ - **قُوْنَسَة مُتَقَابِلَة الْأَزْهَار**
Salvia oppositiflora (S). Sauge à fleurs opposées (F).
جنية برية وترينيتية معمرة تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم .
أرواقها بيضيه مغنوية تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم . وتعرض
من ١٥ الى ٤٠ سم . نصلها غند الصفحة ، يارز المروق .
أزهارها سلبية التجميع ، متقابلة ، برتقالية اللون .
أزهارها يستمر طوال الخريف .

٢٢٩٥٢ - **قُوْنَسَة مَعْرَنِيَّة * ، مَرْنِيَّة ،**
أَسْفَاس Salvia officinalis (S).

Sauge officinale, Herbe sacrée, Thé de France, Thé
de Grèce (F). Common sage, Garden sage (E).
Echto Salbei, Garten Salbei, Salbey (D). Salvia offi-
cinalis, S. grande, S. cultivata (I).
جنية برية طيبة مفضولة معمرة . ساقها فروع زياء تملو من
٢٠ الى ٧٠ سم . أرواقها كاملة ، اعليجية ، اذنيّة للقاعدة .
نصلها خلي البشرة على صفحتيه . أزهارها بتضجية اللون
تطول نحو ٣ سم . أكامها ملونة خلية || أزهارها يستمر
من حزيران الى تموز . وهي تستعمل استهلاك الشاي . منافها
الصحية عديدة .

٢٢٩٥٣ - **قُوْنَسَة مُشَدُّوْلَة** Salvia hians (S).
Sauge béante (F).

جنية برية جبلية معمرة . ساقها فروع غنية لزجة تملو
من ٦٠ الى ٩٠ سم . أرواقها لا قياسية الشكل منها البيضية
والقلبية والريمية ، بعضها مستطيلة الأضلاع المثلثية التي يبلغ
طولها نحو ٢٥ سم . نصلها تطول من ١٣ الى ١٥ سم .
وهي سبعة الحانة خلية البشرة . أزهارها الى الزرقاء الزاهية ،
توجهها بطول نحو ٤ سم . قسما العلوي منصف الى الخارج
يضم كانه مشقوق الشفة || أزهارها يستمر من تموز
الى آب .

٢٢٩٥٤ - **قُوْنَسَة مُهَيَّجَة**
هي المردكوش الآخر ، اطلبه .

٢٢٩٥٥ - **قُوْنَسَة يَابَانِيَّة** Slavia nipponica (S).

Sauge japonaise (F).
بجلة بروقية فروعها تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . أظانها
اليابان . ساقها وفروها زياء اللحاء . أرواقها صغيرة القذ
خلية النصل . أزهارها اسمية الانكاز ، صفوية التجميع ،
مستطيلة الشكل ، صفراء اللون . أكامها رطلة نفضاعة
خلية البشرة || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٢٩٥٦ - **قُوْنَسَة ، قُوْنَسَة** Sauge (F).
هي القوسية . راجعها .



قُوْنَسَة مَعْرَنِيَّة

وترتفع قدر الذراع ونورها كنورة البنفسج يستوقد بعضها رطبة . الواحدة قيسة (السان) .

٢٢٩٨٤ - **قَيْسُون** * ، **قَيْصُومُ الْاَنْثَى** ، **عَيْبَة مَقْدَسَة**

Santolina Chamaecyparissus (S). *Santoline*, *Petit cyprès*, *Aurora femelle*, *Gold-robe* (F). *Lavender cotton*, *Ground cypress* (E). *Zyprassenheiligenpflanze*, *Zyprassenkraut* (D). *Santolina*, *Abrotano femina*, *Crespolina* (I).

نبات جنوبي عطري بري معمر من فصيلة المركبات . ساقه فرها تملو من ٦٥ الى ١٢٥ سم . أوراقه صغيرة اللد ، ضيقة النصل للسنة المزنب البشرة . رؤسائه الزهرية فردية التجميع صغيرة اللد صفراء اللون || ازهاره يشمر من تموز الى ايلول .

٢٢٩٨٥ - **قَيْصَانَة** **Lampris**
جنس اسمك بحرية من فصيلة الاسقمريات . اولها حذبة جميعها كبيرة اللد ، بيضية الشكل ، صغيرة القم والظم ، حذبة الاسنان ، زرقاء القوب ، وردية المواج ، قصبية التفتيح . زفافها الى الحمرة القاتمة || اسطفاها بحار البلاد المحتلة الحاررة . اشهرها قيصانة البدر .

٢٢٩٨٦ - **قَيْصَانَة الْبَدَر** * **Lampris luna** (S).
Lampris lune, *Poisson lune*, *Chrysotosse* (F). *Moon-fish*, *Opah* (E).

نوع من القيصانة وهي سمكة بحرية حرة الوجد المتوسط طولها نحو ١٥٠ سم . ثوبا الى الزرقاء الوردية المواج . جانيها مقيبان بالقصبة .

٢٢٩٨٧ - **قَيْصَل** * **Pinna** (S).
Pinna (F). *Pinna* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وقصبلة الميديات . انواعه المبرقة متوسطة الممد ، بعضها من سمجرات الاراضي الجورية والياشيرة والبعض الآخر منتشر في مطر بحار البلاد الحارة والعلقة الحاررة || اصداها كبيرة تطول من ٥٥ الى ٧٥ سم . وهي غروبية الشكل متساوية المصاريح البانقة التخديط العلوي تملوها زركمة وزعارف وخطوط متفرقة متباينة الالوان . داخلها لؤلؤي المادة وكثيرا ما يوجد في جوفها لؤلؤ وردية اللون فاعرة الصفب ثمينة . ثلثها غزير المادة يستعمل في صناعة التفازات والجوارب وغيرها ، لونه الى الغبار للملح ، تسجبه لائم الخطب منه || تعيش لاسعة بالصخور على اعماق قراوح من ٤ الى ١٢ م . ملجئها الحيائي جامي . مجموعاتها كد من ٥٥ زوجا الى اكثر من مئتين .

٢٢٩٨٨ - **قَيْصَرُم** **Verge du taureau** (F).
Penis of a bull (E).

قصب الثور .
٢٢٩٨٩ - **قَيْصُوم** * ، **أَبْرُوطُونُون** ، **زَيْحَان الْأَرْض** ، **سَمَكُ الْجَبِين**

Artemisia abrotanum, *Abrotanum* (S). *Aurone*, *Citronella* (F). *Abrotanum*, *Southern wood*, *Old man* (E). *Eberautra*, *Citronkraut* (D). *Abrotano*, *Citronella* (I).

جنيبة عطرية طيبة برية معمرة من فصيلة المركبات الانثوية الزهر . عرفها فواح مستحب . انعامها ابطية الارتكار حذوية التجميع ذقية اللون عطرية العرف . انزوارها

٢٢٩٧٢ - **قَيْصَانَة** ، **قَيْصِي** ، **مَقْبَانَة**

Troc (F). *Truck* (E).
هي الاستماعة ، من الاعمال الاقتصادية التجارية . تركيز حل مبادلة غني . بشي .

٢٢٩٧٣ - **قَيْطَا**
القيطان من الزرع ما زرع في الحريف قبل المطر .

٢٢٩٧٤ - **قَيْطَا** * **Bathymétrie** (F).
Bathymetry (E).

٢٢٩٧٥ - **قَيْطَا** * **Morphologie** (F).
Morphology (E).

القائفة علم هيئة الاجسام الحية وتركيبها . وقد ترجموا بكلمة مرفولوجية .

٢٢٩٧٦ - **قَيْطَا** * **Despotisme** (F).
Despotism (E).

القائمة الحكم المطلق المستبد النافذ الارادة .

٢٢٩٧٧ - **قَيْطَارَكَة** ، **سَيْطَا** ، **سَلْحَبَانَة** **Lyre, Tortue, Testudo** (F). *Lyra, Testudo* (E).

التجارة والسلياق والسلفانة ثلاث اسماء لكوكبة نجوم ثمانية الموقر . مركزها بين الدجاجة والجالبي . وقد تمتدوا بالسلفانة نظرا لشدته بطه حركتها || عدد نجميها ٢١ منها « النسر الواقع » الذي يعتبر من الحرة الاولى وقد شبهته العرب بنسر ضم جناحيه الى نفسه كانه واقع على شيه . وقدام النسر الواقع نجم صغير تسميه العرب « الاطفاة » علماء الفلك يقولون ان النظام الشمسي يتجلبب ببطه نحو النسر الواقع .

٢٢٩٧٨ - **قَيْطِد** ، **تَقِيد** **Inscription** (F).
Inscription, Registry (E).

٢٢٩٧٩ - **قَيْر** **Polx** (F).
هو القطران ، اطبل .

٢٢٩٨٠ - **قَيْسَرَاط** **Carat**
سمة توازي واحداً من اربعة وعشرين . وهو في بعض المداين الثنية اصغها الذهب يبر من مقدار الذهب الصنف . فالذهب ميار ٢٤ هو الذهب الختالي من كل جرم غريب والذهب ميار ١٨ مثلاً هو ما شغل ١٨ جزءاً من الذهب الخمر ويشت اجزاء من شير الذهب || والقيراط يساري في وزن الحجارة الكريمة كاللؤلؤ ما قدره :

في فرنسة ٥,٢٠٥٩ غرام
في انكلترا والمانيا ٥,٢٠٥٥ غرام
في البرازيل ٥,١٩٢٢ غرام

٢٢٩٨١ - **قَيْسَرَاط** **Quirat**
هو نصف دانق . كان وزن حبة غروب . والديم اثنتا عشرة حبة . وهو في الحجاز ربع مسد دينار وفي العراق نصف حبة || ويشت استعماله في المساحة في مرض الاصبع || وقد جعلوه دستوراً في الحساب فقسوا المتجزئات الى اربعة وعشرين قيراطاً .

٢٢٩٨٢ - **قَيْسَانَة** **Muscar botryoides** (F).

هي الخليل الجليل ، اطبل .

٢٢٩٨٣ - **قَيْسَب**
نجر من الخمس . وهو شميرة تثبت خيطاً من اصل واحد



قيسون



قيصانة البدر



قيسل



قيصوم

المائية . بلايعيها عادة الحطاط القرنية والاسنان الشفوية .
لكنها مزودة بلواس مستطيلة تملو زوايا الانشقاق ||
سها انواع تميش وتتكاثر في الاكواريوم ، اعصها قيطم
لفيس (Xenopus laevis) .

٢٢٩٩٨ - قَيْصُوم هو السنور .

٢٢٩٩٩ - قَيْصُوم Cheilanthes (S). Chélanthe (F).
جنس سرائس من البسباجيات . انواحه نحو ٣٠ اعطائها
مختلف مناطق العالم اعصها الاستوائية والحارة .

٢٣٠٠٠ - قَيْقَب Céphalanthé (F).
هو الرأسية ، اطلبها .

٢٣٠٠١ - قَيْصُوم Cephé (F). Cephus (E).
كوكبة نجوم شمالية الموقع . مركزها بين الدجاجة والتنين
وذات الكرسى . عدد نجومها ٢١ || والعرب تسمي النجم
الذي على الصدر « النثرة » والذي على الكتف الايمن
« القردة » . ولذا تارة التي تحصل من نجوم ذراعها وما هو
خارج ضبا « القدر » . والذي على الرجل اليسرى يدعى
« الراعي » . والنجوم الصغار الموجودة بين الرجلين تدعى
« الاغنام » .

٢٣٠٠٢ - قَيْصُوم Physionomie (F).
Physiognomy (E).
هي مجموعة التعاطيف والملامح والقبسات الفارقة التي تميز بين
شيء وبشيء .

٢٣٠٠٣ - قَيْصُوم
نبته ذات ثمرة في قرون وهي ذات ورق وغصنة تثبت بكل
مكان (السان) .

٢٣٠٠٤ - قَيْقَب Garrulus lanceolatus (S). Gari lanceolé (F). Jay (E).
طائر من الزرياب وفصيلة الزريابات . يألف القفص
فيقتبس الاصوات ويردها || وهو طائر مؤذ غار .
شكله كالبومة ، جسمه يطول نحو ٢٥ سم . اصدا الثوب .
اسود الرأس . ازرق الزنكي . مجزع الجناحين والذنب
مغطى بمتراكبة السود والزرق والبياض || قوته الحبوب
والأثار اللبنة ويختلف انواع العصافير الصغيرة ويصها
وفراخها والمطاز والحشرات الكبيرة والصغيرة || يدن في
الاشجار الحرجية اللظلية ، اثناء تسع من ٤ الى ٦ بيضات
تحضنها ١٦ يوماً .

٢٣٠٠٥ - قَيْقَب هو القوقاز ، اطلبها .

٢٣٠٠٦ - قَيْقَب Acer (S).
Erable (F). Maple-trees (E).
جنس اشجار حرجية ورزينة من فصيلة القيقبيات . انواعه
نحو ١٨٠ سها الكبيرة القد والصغيرة . جميعها حسنة
المحيط والقالب . سكرية العصارة . اوراقها متعاقبة ،
لاقياسة الشكل ، مسطحة حایل وبضها ابيد . ازوارها
مختلفة التجميع والالوان ، غزيرة الرقيق ، يحمرها النحل .
ثمراها جناسية مركبة من جناسيتين ملتصقتين || اعرف
انواعه اشد حاداً منه .

يدوم من تموز الى آب . ثمارها لينة صغيرة تشبه حب
الآس ، طعمها مر ، رائحتها ذكية . يقال انها مضادة
لحميات وثالثة تخلف اوجاع الصدر وضيق النفس
والمغاسل . ويمن من قال انها من القويوات وقد تستعمل
ايضاً كطاردة للديدان || اما اسم مسك الجن فيطلق
على عدة نباتات اعصها القيصوم والشفروور والزريرج والورام
وشيشة الريح .

٢٢٩٩٠ - قَيْصُوم أنثى Santoline (F).
هو القيسون ، اطلبها .

٢٢٩٩١ - قَيْصُوم جبكي Achillée suave (F).
هو الاخيلا المنشقة ، اطلبها .

٢٢٩٩٢ - قَيْصُوم طيبي Armoise santonique (F).
هو الشيح التراساني ، اطلبها .

٢٢٩٩٣ - قَيْصُوم كاثوري * Artemisia camphorata (S). Armoise camphrée, A. dorée (F). Gold wormwood, Rock wormwood (E). Wermut (D). Assenzio salvatico (I).
نبات حشيش طيب يري من المركبات الانبوية الزهر .
ساقه فراء تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مضقة صغيرة
القد ، غليظة النصل . رويساته الزهرية خلية القناب ،
ذخية اللون ، عشقودية التجميع ، كاثورية العرف المستحب .
انزهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٢٩٩٤ - قَيْصُوم Coquille d'oeuf (F). Egg-shell (E).
القشرة العليا اي الخارجية البايمة على البيضة اما القشرة
الداخلية فتسمى الغرق .

٢٢٩٩٥ - قَيْطَلِيَا Noisetier de Turquie (F).
هي البندق التركي ، اطلبها .

٢٢٩٩٦ - قَيْطَس ، قَيْطُوس Baleine (F).
Cetus (E).

كوكبة نجوم جنوبية تشرق على خط الاستواء وتمتد
جنوبي برج الحمل وبرج الحوت . وهي على صورة حيوان
بحري مقدمه في ناحية المشرق ويؤخره في ناحية المغرب ||
عدد نجومها ١٠٢ والعرب تسمي الكواكب التي في الرأس
« الكف الجذاء » ونها تير يدعى « المنقب » . وتسمى
الحسة التي في اواسط البدن « الثمامات » . والتي على اصل
الذنب « النقام » . والتي على الشمة الجنوبية من الذنب
« القفص الثاني » . والتي على الشمة الشمالية « ذنب قيطس
الثاني » . وفي حق قيطس نجم يدعى « الاصبرية » او
« امجوبة قيطس » لان جسمه يتحول في اثناء مداره من
المرية الثانية الى الثامنة ولان لونه يتحول ايضاً من الاحمر
الى الاصفر .

٢٢٩٩٧ - قَيْطَم * Xenopus (S).
Dactylète (F). Xenopus (E).

جنس شفادع من فصيلة الليليات عاداته السان .
انواحه المعروفة قليلة العدد مهددا بعض المياه الافريقية
اعصها مياه المناطق الاستوائية || اجسامها صغيرة تطول
٧ الى ١٠ سم . رؤوسها مستطيلة . عيونها عادية
الاجفان . كوكبها العليا عادية الانسان . اصابع قوائمها
الامامية عادية الخطاب اما الخلفية فكاملة الخطاب والثلاث
الداخلية سها مفردة الاطراف باغداد قرنية المادة تهر
كأغالب || انشأه ٢٠٠٠ حصلة لتعلمنا المناشآت



قَيْصُوم كاثوري



قَيْطَم



قَيْقَب

صفحة ثلاثية العروق ، بحجرة اللون ، زيتية المواج .
أزهارها خضراء اللون . تنور في شهر شباط .

٢٣٠١٣ - قَيْبٌ لَتَرِي Acer tataricum (S). Erable de Tartarie (F).

شجرة حرجية سبروتية تملو نحو ٨ أمتار. مدها آسية الصغرى ، أوراقها عابلة منقطة . نصلها بيضي الشكل ، قلبى الناعمة ، مدب الطرف ، سنن الحافة ، الزغب الصفحة السفلى ، باهت الخضار . أزهارها علقية التجميع ، خاسية البتلات الأبيض جناحياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .



قَيْبٌ حَبَرِي

٢٣٠١٤ - قَيْبٌ ثَلَاثِي الْأَجْزَاءِ Acer trifidum (S). Erable trifide (F).

شجرة حرجية وريديئة جادة تملو نحو ٨ أمتار. مدها اليابان . أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفتيس . نصلها اسفيني الشكل لامع الصفحة الخضراء . أزهارها علقية التجميع ، فسفتية اللون ، جناحياتها متصالة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١٥ - قَيْبٌ جَمِيزِي * جَرْمَشَق Acer pseudoplatanus (S). Erable sycamore, Faux platane, Grand érable (F). Great maple, Sycamore maple, Mock-plane (E). Bergahorn, Falscher platane (D). Acero liso, A. sicomoro, A. fico, Mollacero (I).

شجرة حرجية جبيلة مبذولة تملو من ١٥ إلى ٤٠ م. أوراقها عابلة منقطة، ثلاثية أو خاسية التفتيس، تقوّل وتقرض من ١٠ م. نصلها مالى البشرة على صفحته وهو أخضر العليا بحري للسل يتشع ثم يحمر في الخريف أزهارها متفرقة التجميع متدلية. جناحياتها متبادعة المشافر، حادة الزوايا . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ مَقْلِي

٢٣٠١٦ - قَيْبٌ حَكَلِي * شَجَرَةُ الْكَرْبِ Acer campestre (S). Erable champêtre, Auzerole (F). Bird's tongue, Dog oak, Maple tree, Master tree (E). Angerbinbaum, Feldshorn, Maszholder (D). Acero campestre, Averliello, Ceppolo (I).

شجرة سبروتية مبذولة تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. ساقها غلظة اللحم . أوراقها عابلة منقطة صغيرة اللد ، ثلاثية أو خاسية التفتيس . نصلها جامد الصفحة ، مبسر الحمل ، أخضر اللون . أزهارها حلقية التجميع خضراء اللون . جناحياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .

٢٣٠١٧ - قَيْبٌ دُرْبِي * Acer platanoides (S). Erable plane, E. platane, Plane (F). Norway maple (E). Spitzahorn, Norwegischer ahorn (D). Acero platano, Amilacero, Acero riccio (I).

شجرة حرجية مبذولة تملو من ١٥ إلى ٣٠ م. ساقها البارد الباردة . ساقها ملاء ، صماتية لينة . أوراقها ثلاثية التفتيس تقوّل من ٨ إلى ١٨ م. وتقرض من ٩ إلى ٢٥ م. نصلها مالى البشرة مدب الطرف . أزهارها علقية التجميع صفراء اللون . جناحياتها أفقية المشافر . تنور من نيسان إلى أيار .



قَيْبٌ دَلْبِي

٢٣٠١٨ - قَيْبٌ رَاحِي Acer palmatum, A. polymorphum (S). Erable palmé (F).

شجرة حرجية وريديئة تنفر من الارتفاع الكسبية . مدها الصين واليابان . تملو من ٥ إلى ١٥ م. أوراقها عابلة ،

٢٣٠٠٧ - قَيْبٌ أَيْضٌ Acer saccharinum, A. dasycarpum (S). Erable blanc, E. tendre (F). Silver leaved maple, White maple (E). Silber-ahorn, Weissahorn (D). Acero bianco (I).

شجرة سبروتية حرجية وريديئة تملو من ١٥ إلى ٣٠ م. أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خاسية التفتيس . نصلها يعطو من ٦ إلى ١٥ م. ويرض من ٥ إلى ١٢ صفحته العليا باهتة الخضار ، صفحته السفلى خلية البشرة ، خضراء اللون ، بيضاء المواج . أزهارها علقية التجميع ، صفراء اللون ، عادمة البتلات . جناحياتها كبيرة اللد متفاربة المشافر طولها بأربع من ٥ إلى ٧ م. تنور من شباط إلى نيسان .

٢٣٠٠٨ - قَيْبٌ أَحْمَرُ Acer rubrum (S). Erable rouge, E. femelle (F). Red flowered maple, Swamp maple (E). Rocer ahorn, Virginlicher ahorn (D). Acero rosso (I).

شجرة سبروتية حرجية وريديئة، مدها أمريكية الشالية . تملو من ١٠ إلى ٢٥ م. أوراقها عابلة منقطة ثلاثية أو خاسية التفتيس . نصلها يطوّل ويرض من ٥ إلى ١٥ م. صفحته العليا مائلة البشرة ، زاهية الخضار ، صفحته السفلى خلية البشرة ، أزهارها علقية التجميع حراء اللون . جناحياتها حر الأهن ، متبادعة المشافر . تنور من آذار إلى نيسان .

٢٣٠٠٩ - قَيْبٌ أُرِيدُ Acer griseum (S). Erable gris (F).

شجرة حرجية وريديئة مدها الصين . تملو من ١٠ إلى ١٢ م. أوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . نصلها بيضي الشكل ، ذرب الطرف يعطو من ٥ إلى ٦ م. وهو مسن الحافة ، خلى الصفحة السفلى . أزهارها متدلية ثلاثية أو خاسية التجميع ، مهدبة التوجعات والبتلات . جناحياتها خلية البشرة متبادعة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١٠ - قَيْبٌ الْيَابَانِ Acer japonicum (S). Erable du Japon (F).

شجرة وريديئة سبروتية مدها اليابان. تملو نحو ٤ أمتار. ساقها ملاء اللحم ، لونها مسطيلة، مستتقة ، جوية اللون . أوراقها عابلة منقطة خاسية أو سباعية أو تساعية التفتيس . نصلها مسن الحافة ، مالى البشرة ، أخضر اللون ، مذهب المواج ، يحمر في الخريف . أزهارها علقية التجميع حراء اللون . جناحياتها متوازية المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١١ - قَيْبٌ أَمْرَطُ Acer glabrum (S). Erable glabre (F).

شجرة حرجية جادة تملو من ٧ إلى ١٢ م. أوراقها عابلة منقطة ثلاثية التفتيس ، عنها جلوي اللون ، نصلها يعطو ويرض نحو ٧ م. صفته العليا لامة البشرة شديدة الخضار ، صفته السفلى خلية خضراء . أزهارها حلقية التجميع . جناحياتها متبادعة المشافر . تنور في أيار .

٢٣٠١٢ - قَيْبٌ إِيْلِيْجِي الْوَرَقِ Acer oblongum (S). Erable à feuilles oblongues (F).

شجرة حرجية سبروتية تملو نحو ١٨ م. مدها الصين . أوراقها عابلة منقطة . نصلها حاد التفتيس ، إيليجي الشكل يعطو من ١٥ إلى ٢٠ م. ويرض من ٥ إلى ٦ م.

ويرض من ٩ إلى ١٢ سم. وهو مسن الحافة، خلى الصفحة السفلى، يصفر ويحمر في الخريف. جناحياتها مستطيلة الاذن متوازية المشافر. تنور في نيسان.

٢٣٠٢٥ - قَيْبُ كَبِيرِ الْوَرَق

Acer macrophyllum (S). Erable à grandes feuilles (F).
شجرة حرجية جاذبة تملو من ١٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابطة متفقة خاسية أو مسابية التفصيص تطول نحو ٣٥ سم. وتعرض نحو ٢٥ نصلاها لامع الصفحة العليا الخضراء اللون، أزغب السفلى. أزهارها عبقودية التجميع، متدلية، فصلها واسديتها خلية البشرة. جناحياتها متوازية المشافر الزباء. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٦ - قَيْبُ عُرَائِي الْوَرَق

Acer negundo, *Negundo fraxinifolium* (S). Erable à feuilles de frêne (F).
شجرة حرجية وتزيينية مهدا امريكة الثالية تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. أوراقها مركبة وتزيينية التجميع. وريقاتها خمس أوسع، نصلاها لا قياسية الشكل تطول من ٥ إلى ١٣ سم. لونها إلى الخضار الجليل اللامع يملو توضيح اصفراريفض. أزهارها عناقيد مستطيلة متدلية. جناحياتها متساوية المشافر الدقيقة المستعرة. تنور في نيسان.

٢٣٠٢٧ - قَيْبُ مُسْتَدِيرِ الْوَرَق

Acer circinnatum (S). Erable à feuilles rondes (F).
شجرة حرجية وتزيينية تملو من ٨ إلى ١٢ م. فروصها وإفانها إلى الجؤرة. أوراقها عابطة، متفقة، ثلاثية التفصيص. نصلاها مستدير الشكل قطره نحو ١٠ سم. صفته خضراء اللون، خلية العروق، مسنة الحافة، نحر في الخريف. أزهارها علقية التجميع، متدلية. فصلها إلى الحمرة. بتلاتها إلى البياض. جناحياتها صغيرة اللد شبه مستديرة. تنور في أيار.

٢٣٠٢٨ - قَيْبُ مِلْوان

Acer opalus (S). Erable opale, Duret, Ayzale (F).
شجرة سبروتية مبلولة تملو من ٨ إلى ٢٥ م. أوراقها عابطة ثلاثية التفصيص. نصلاها يضي الشكل، مستدير الطرف، مسن الحافة، بارز العروق المتتامة. أزهارها علقية التجميع. جناحياتها متباعدة المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٩ - قَيْبُ مِيَّابِي

Acer mlyabei (S). Erable de Miyabe (F).
شجرة حرجية تملو نحو ١٢ م. مهدا اليابان. ساقها غلظة اللحاء. أوراقها عابطة ثلاثية التفصيص. نصلاها أخضر الصفحة العليا، خلى السفلى، باعث العروق. أزهارها علقية التجميع، جناحياتها خلية البشرة. تنور من أيار إلى حزيران.

٢٣٠٣٠ - قَيْبَات، أَسْدَتُ كَانِيَات

Acaraceae (S). *Acéracées*, *Acérinées* (F). *Aceraceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة التمثالات. اجناسها وأنواعها عديدة أشهرها القيقب || جميع نباتاتها شجرية. اغشائها مسابية مرققة يكثر فيها اللون الأحمر.

متفقة، خاسية أو مسابية التفصيص. نصلاها جامد الصفحة، راسي الشكل، أخضر اللون، ملعب الملوغ. أزهارها علقية التجميع حراء اللون. تنور في أيار.

٢٣٠١٩ - قَيْبُ رُبَاهِي الْأَجْزَاء

Acer tetramerum (S). Erable tétramère (F).
شجرة حرجية سبروتية تملو من ٥ إلى ٨ أمتار. مهدا الصين. أوراقها عابطة متفقة يضيبة الشكل. نصلاها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويرض من ٣ إلى ٥ صفته السفلى خلية البشرة، خاسية العروق البارزة، حثاره مزدوج التسنين. أزهارها علقية التجميع، رباعية الاجزاء والبتلات الأخضر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٠ - قَيْبُ زُورُورِي الْوَرَق

Acer crataegifolium (S). Erable à feuilles d'aulépine (F).
شجرة حرجية تملو نحو ٨ أمتار. مهدا اليابان. أوراقها عابطة متفقة. نصلاها ثلاثي التفصيص مسن الحافة يطول من ٤ إلى ٨ سم. ويرض من ٣ إلى ٦ سم. وهو أخضر الصفحة العليا، بحري السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها علقية التجميع لونها إلى الخضار القطني. جناحياتها مستقيمة الزوليا. تنور في أيار.

٢٣٠٢١ - قَيْبُ سَكْرِي

Acer saccharum, *A. barbatum* (S). Erable à sucre, E. dur (F). Hard-maple, Rock-maple, Sugar-maple (E). Zuckernahorn, Zucker massholder (D). *Acero zuchcherino*, *A. del Canadie* (I).
شجرة سبروتية داتحة تملو من ٣٠ إلى ٤٥ م. ساقها ملساء، صلابتها غزيرة للمادة السكرية. أوراقها عابطة، متفقة، ثلاثية التفصيص، تطول من ١٥ إلى ١٥ سم. وتعرض من ١١ إلى ١٦، نصلاها مائل البشرة، ملب الطرف، أخضر الصفحة العليا، بحري السفلى، يحمر في الخريف. أزهارها علقية التجميع، غبراء اللون. جناحياتها انقية المشافر. تنور من نيسان إلى أيار.

٢٣٠٢٢ - قَيْبُ سَكْمِي الْوَرَق

Acer clasifolium (S). Erable à feuilles de cissus (F).
شجرة سبروتية تزيينية مهدا اليابان تملو من ١٥٥ إلى ٣٠٥ م. أوراقها مركبة، وتزيينية التجميع، لا قياسية الحد. وريقاتها غريبة الشكل تطول نحو ٨ سم. نصلاها مائل البشرة على صفحته، مسن الحافة. أزهارها خلية، رباعية الفصل والبتلات. جناحياتها صغيرة اللد، متباعدة المشافر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٣ - قَيْبُ شُرْمِي الْوَرَق

Acer caprinifolium (S). Erable à feuilles de charme (F).
شجرة حرجية سبروتية تملو من ٥ إلى ٨ أمتار. مهدا اليابان. أوراقها عابطة متفقة. نصلاها لامع الصفحة المحبوة المسنة الحافة، بارز العروق التي يراوح حددها من ١٦ إلى ٢٥ زوجاً. أزهارها عبقودية التجميع متدلية، وبلغية البتلات الأخضر. جناحياتها مستقيمة المشافر. تنور في أيار.

٢٣٠٢٤ - قَيْبُ شَيْطَانِي

Acer diabolicum (S). Erable diabolique (F).
شجرة جاذبة مهدا اليابان تملو من ٦ إلى ١٥ أمتار. أوراقها عابطة، متفقة، ثلاثية التفصيص. نصلاها يطول

جدول ٢
القيمة الغذائية في أشهر البقول وفي بعض الخمار الجافة^(١)

النوع	ماء %	مواد معدنية %	بروتين %	مواد دسمة %	غلوسيد %	عدد السعرات في كيلوغرام واحد
بازيلا غصراء	٧٨	٠,٨٠	٤,٧٠	٠,٣٠	١٠,٤٠	٦٥٠
بصل	٨٨	٠,٦٠	٠,٦٠	٠,٠٧	٦,٢٠	٢٨٩
بطاطا	٧٥	١,٠٠	١,٥٢	٠,٠٧	٢٠,٧٠	٩١٨
بندوره	٩٣	٠,٥٠	٠,٧٠	٠	٢,٢٠	٢١١
ثوم	٦٤	١,٤٠	٣,٤٠	٠,١٣	١٧,٤٠	٨٥٤
جزر	٨٨	٠,٧٠	٠,٧٧	٠,١٣	٦,٩٠	٣٢٥
حمص (جافة)	١٤	٢,٨٠	١٦,٣٠	٠,٦٠	٤٤,٧٠	٢٥٦٠
خرشوف	٨٦	١,٣٠	١,٣٠	٠,٠٥	٥,٥٠	٢٨١
غصن	٩٢	١,٠٠	٠,٩٠	٠,٣٢	٣,٠٠	١٨٩
غبار	٩٥	٠,٤٠	٠,٤٥	٠,١٠	٠,٧٠	٥٩
دبج زراعي	٨٠	١,٠٠	٠,٥٠	٠,٢٠	٩,٨٠	٤٤٥
سيانغ	٩٣	١,٩٠	١,١٠	٠,١٠	١,١٠	١٠٧
سرفل لقي	٦٥	١,٧٠	١,٩٥	٠,١٦	١٨,٤٠	٨٣٨
سلق	٩٢	١,٦٠	١,٢٠	٠,٢٠	١,٩٠	١٤٧
شمام	٩١	٠,٥٠	٠,٦٠	٠,٠٨	٥,٣٠	٢٥٠
شمندر سكري	٨٠	١,٠٠	١,٠٠	٠,١٠	١٥,٤٠	٦٧٩
سوجا (جافة)	١٠,٢٠	٥,٢٠	٢٣,٦٠	١٧,٢٠	٢٣,٠٠	٣٥١٤
عصن (جافة)	١٢,١٠	٣,٠٠	١٨,١٠	٠,٦٠	٤٤,٦٠	٢١٣٠
فاصوليا (جافة)	١٤	٣,١٠	١٨,٠٠	٠,٥٠	٤٠,٢٠	٢٤٣٠
فجل	٩٣	٠,٧٠	٠,٩٠	٠,١٠	٣,٢٠	١٧٦
فستق صيد	٧,٥٠	٢,٤٠	١٩,٣٠	٤٠,٠٠	١٣,٢٠	٥٠٦٠
فول أخضر	٨٢	٠,٨٠	٤,٣٠	٠,٢٠	٧,٤٠	٥٠٢
قرع	٩٠	٠,٧٠	٠,٥٠	٠,٠٧	٤,٢٠	٢٠٢
قرنيط	٩٤	٠,٨٠	١,٢٠	٠,١٧	٣,٠٠	١٨٩
كرات أندلسي	٧٥	٠,٥٠	١,٣٠	٠,٠٥	١٧,٠٠	٧٥٥
كرات معروف	٨٨	١,٢٠	١,٤٠	٠,١٥	٤,٣٠	٢٤٩
كرلس	٩٠	١,٤٠	٠,٥٠	٠,١٧	٤,٣٠	٢١٠
كربن	٩٠	٠,٧٠	٠,٦٠	٠,١٠	٤,٠٠	٢٠٠
لفت	٨٩	٠,٧٠	٠,٧٠	٠,١٠	٤,٩٠	٢٣٦
لوبيا غصراء	٨٩	٠,٧٠	١,٣٠	٠,١٠	٤,٢٠	٢٣٤
ملفوف	٨٠	١,٥٠	٢,٤٠	٠,٤٥	٦,٨٠	٤٢٠
هليون	٩٤	٠,٦٠	١,٠٠	٠,٠٧	١,٦٠	١١٠
هندب (طرخشقون)	٨٥	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٢٠	٦,٣٠	٢٥٠
بندق	٧,١٠	٢,٥٠	١٢,٢٠	٥٦,٣٠	٦,١٠	٦٠٢٦
جوز	٧,٢٠	١,٦٠	١١,٧٠	٥٢,٦٠	١١,٠٠	٥٨٢٤
فستق	٧,٠٠	٢,٠٠	١٣,٥٠	٥٠,٢٠	١٠,٥٠	١٠٠٦٠
لوز	٦,٣٠	٢,٣٠	١٥,٠٠	٤٧,٨٠	١١,٢٠	٥٥٢٠
كستناء	٤٧,٥٠	٢,٠٠	٤,٣٠	٣,٧٠	٣٣,٥٠	١٩٠٠

(١) القيم الغذائية للمدرة في الجدولين ١ و ٢ هي قيم مريضة لا تعمل نيا هتشور ولاندور.

مستطيلة ذرية . انوارها متراكبة الاطراف || تألف النابات ويجاري الماء . قوتها العطاء والحشرات اغصها الجراد . تنش في تجاويف الاشجار . اناثها تضع من ٣ الى ٤ بيضات مستديرة الشكل تحضنها بمثابة الكورور .

٢٣٠٤٦ - **قيون الجبل** (F). *Cyon de montagne*
حيوان مفترس يدهى سهل الشال ، اقله .

٢٣٠٤٧ - **قيون الغاب * ، قيون زميرتي**
Halcyon smyrnensis (S). *Halcyon de Smyrne* (F).
Halcyon (E).

طائر من المازوريات . موطنه يمتد من الشرق الاوسط الى الهند وسيام وجزر الزابيج . اعطاه البيئات تشل بعض الرياض وصفات الانهر في فصل الخريف || جسمه متوسط القد ، منكش الشكل . طوله نحو ٢٢ سم . وبسطه نحو ٢٨ سم . ثوبه متراكب الالوان . رأسه ومنقه وخوشاء وبطنه الى الكستاني الداكن . زوره واهل صدره الى البياض . رداؤه وظهره وصمغته الى الزرقه الخضراء . جناحه متراكب الازرق والاصفر والاسود والكستاني والابيض . قوادسه الى الزرقه الخضراء . كلاه الى السمرة القاتمة . اياهره الى السمرة الخنطية . مناكبه مجذعة بالابيض عيشه كيرتان . حلقة عيشه صناعية . متقاده كبير الجرم . مستطيل الشكل . محدوب الافك الاسفل ، احمر اللون . ساقاه الى الجلوة وصفه قصيرة سرديّة القشار || يألف النابات والرياض ويجاري الماء . قوته العطاء والحشرات اغصها السحال والجنادب والجراد || يدشن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات كروية الشكل ، عاجية اللون تحضنها بمثابة الكورور نحو ١٨ يوماً . يعتبر من الطيور النافعة .



قيون الغاب

٢٣٠٤٨ - **قيمة غذائية** (F). *Valeur alimentaire*
Alimentary value (E).

القيمة الغذائية هي ما يحويه الغذاء من عناصر تتحول في الجسم بعد الانقسام والتشيل الى طاقة ويؤاد استهلاكية لا حياة الجسم بدونها || وقد وضعنا في الجدول الاول ما تيسر لنا من القيم الغذائية العائدة لبعض الطائر المشهورة . اما الجدول الثاني فللقبول وبعض الطائر الجافة .

٢٣٠٤٩ - **قيمة مريئية** (F). *Valeur atibile*
Nutritive value (E).

هي نسبة ما تحويه كل مادة من عناصر غذائية قابلة التشيل والانسجام .

٢٣٠٥٢ - **قيونس** (S). *Tragelaphus angus*
Tragelaphe d'Angus (F).

نوع من الجهيل وهو اكبر جفة من اليرع واصغر من الغلب . ثوبه احمر اللون يملو موج اصفر وتجديع ابيض . موطنه جنوبي شرقي افريقيا .

٢٣٠٥٣ - **قيونسل ، قيونكة** (F). *Face*
وجه الشهي كقرونك قبل البناء ...

٢٣٠٥٤ - **قيونسي** (F). *Facial*
نمت تعري يطلق كل ما له صلة بالتهيل .

٢٣٠٥٥ - **قيون ، ديك البحر** (F). *Halcyon* (F). *Halcyon*, *Kingfisher* (E).

جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد اعطاهها البلاد الافريقية واسرالية . اجسامها متوسطة القد . منافعها

Conidiophore

٢٣١٤١ - كاسيلينة

جهاز تكاثرى تتميز به بعض الفطور الكاذبة . قوامه سوط نواصى التركيب ، قاعدة ارتكازها المشيج ، طرفه صني الشكل ، ينتهي بشفرة أو يشماغ من الشفاير يحمل الكناك المرفوعة المتناوبة كحبوب السحبة .

Décembre (F).

٢٣١٤٢ - كانون الأول

December (E).

يعرف أيضاً بـ ديسمبر . الشهر الثاني عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الخريف والشتاء . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الرابع عشر منه تبدئ الأريبينيات . وفي الواحد والعشرين ينتهي فصل الخريف ويكون الانقلاب الشتوي وهو ما يمتدح به مخرج النور من حد نقصان إلى حد الزيادة . وفي الثاني والعشرين تبدئ فصل الشتاء فتخرج الشمس من برج الرامي لتدخل في برج الدلو . تقويمه الزراعي - انحص اعماله الزراعية ما يلي :

١ - في الزراعات العامة الموصية . متابعة واهاء بذر الفول والمندس والباقية وسائر النباتات العطيفة . متابعة توصيب وزرم أوراق التبغ الجافة . تحضير مشاتل التبغ وتوزيع الاسمدة العضوية حل الاكباد .

٢ - في الاشجار المثمرة ، متابعة اعمال المكافحة الشتوية والتسميد الكيماوي في المناطق الساحلية والوسطى . الابتداء بالتقليم مع الانتهاء الى ويوب جمع كل ما لا قطع من الاشجار وحرثه يوباً . المباشرة بفرس النصبوب في المناطق التي لا تحض التلج والاعتناء بالنقاية بمد الفرس تأتين البيتة الفضل الضرورية . اتخاذ الحيطه اللازمة لمنع ركود المياه في تربة البساتين . متابعة تشذيب وتقسيم وحرق الكركمة والزيتون . وتوزيع الاسمدة العضوية حل الموز . وتقليم كياشه اي طروحه لوقايتها من البرد والصقيع . انجاز تضييد البزور ثم تليطها في المشاتل الخاصة بها او في مستورها . اقتلاع النصبوب المدة فدرس قبل طفر البرام .

٣ - في الحفصيات : متابعة قطف البرتقال وتوزيع الاسمدة الكاملة والحامسة وفرس نصبوب التارنج (ابو صفيح) في البساتين المستحدثة وتقليم نصبوب المشاتل .

٤ - في الاشجار المختلفة : فرس نصبوب الاشجار الحرجية والثرينية وتقليم وتقليم وتقليم معظم اشجار الحدائق والطرقات .

٥ - في البقول والزهور . متابعة العناية بالتربة والنبات و بمشاتل البنورة والنس وبالهذجان وبأكواد الزبق والرجس . والسون .

٢٣١٤٣ - كانون الثاني

Janvier (F). January (E).

يعرف أيضاً بـ يناير . الشهر الاول من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء القزيرة الاطمار . مدته واحد وثلاثون يوماً . في اليوم الثاني والعشرين منه تنتهي الاربيبيات . تقويمه الزراعي - انحص اعماله الزراعية ما يلي :

١ - في الزراعات العامة الموصية . لتلقذ زروع المحطة واستلحاقها بالاسمدة الاثرية التيرائية اذا كانت متأخرة او سقيمة . حرث التربة المدة لزراعة التبغ اذا كان سرحاً لم يتيسر في الشهر المنصرم . اعداد مشاتل التبغ وتحضير الاكباد والمباشرة بذر البزور .

٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة فرس الاشجار المثمرة والمكافحة الشتوية والتسميد والتقليم . المباشرة بتعليق فساتل السفريل والربان والتفاح الجيت مولين والكركمة والزيتون . متابعة تليظ كبالش ألوز .

التركيب ، مسنة الاطراف . ازهارها فردية او عقدية تصبح كبيرة القند يضاء اللون اوجراء || أشهر اجناسها الشاي والكافيا .

Caméline (F).

٢٣١٣٣ - كاسيلينة

هي النصار ، اطلبه .

Camélinées (F).

٢٣١٣٤ - كاسيلينيات

هي النصاريات سبط من فصيلة الصليبيات .

Latent (F). Latent, Hidden (E).

٢٣١٣٥ - كامين

ما هو مقدر الوجود الخفي .

Chamidae (S).

٢٣١٣٦ - كاميات

Chamidae, Camacés, Chamacés (F). Chamidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشم . اجناسها وزاها المعروفة عديدة معظمها من متحبرات الاراضي الجورية والطباشيرية . انواعها المعاصرة منتشرة في سطر عمار البلاد الاستوائية والحارة || اصداقها متفاوتة الاشكال والجمهر . ثنائية المضارب الانظامية للامتساوية جميعها عادمة المناصب . مستغلطة الأربيل || اعرف اجناسها واشهرها الكامة والظفير .

Camellia (S).

٢٣١٣٧ - كاسيلينا

Camellia, Camelia (F). Camellia (E).

جنس اشجار وشجيرات وسنجات برية وثرينية من فصيلة الكاسليات . ازهاره نحو ١٤ سوطاً متصبة قوام . اوراها ابدة ، متناقية ، ممتقة ، كاملة . فصالها جامدة الصلصة حيلة الخصار الزاهي . ازهارها ابيلة او تاجية الارتكاز ، كبيرة القند ، خالصة او مسابية الفصل وخاصة او مسابية او تمسابية البلات المندحة القواعد || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣١٣٨ - كاسيلينا سرديّة

Camellia reticulata (S). Camellia réticulé (F).

نوع من الكاسليات الفاخر الصف . جنسه جادة متوسطة القند فرعا تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراها سرديّة عابطة الخصار . ازهارها عادمة العرف ، كبيرة القند ، ظهرا براوح من ١٣ الى ١٥ سم . لونها الى الحمرة الكرزية ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

٢٣١٣٩ - كاسيلينا مستنكا

Camellia sasangua (S). Camellia sasangua (F).

نوع من الكاسليات وهي جنبة سرديّة فرعا تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراها مقطوعة القامة مسنة الحامسة . ازهارها مكبة ظهرا براوح من ٦ الى ٨ سم . لونها الى البياض المالحى || ازهارها يستمر من شباط الى حزيران .

٢٣١٤٠ - كاسيلينا يابانية

Camellia japonica (S). Camellia du Japon, Rose du Japon (F). Camellia, Japan rose, Rose of the world (E). Japansche Kamellie, Japansche Rose (D). Camellia, Rosa del Giappone (I).

نوع من الكاسليات الشائع الزامة . ضرره او اصراعه نحو ١٥٠٠ جميعها هريبة الشكل تملو من ٤ الى ٦ امتار . اوراها ماسلة ، لامة ، حيلة الخصار . ازهارها عادية او مكبة ، كبيرة القند ، عادمة العرف ، يضاء اللون او حراء .



كاسيلينا

Clêpre (F), Caper (E).

٢٣١٧٧ - كَبْرَة

ثمرة الكبر. ج. اكيار وكبار :

Coproah (F), Coco-nut (E).

٢٣١٧٨ - كَبْرَة

هي لب الناربيل ، اطلبه .

Soufrage (F), Sulphuring (E).

٢٣١٧٩ - كَبْرَة

هو التغير بالكبريت اي ذر مسحوق الكبريت على النباتات الملوها من بعض الاوصام الفطرية او لمكافحة تلك الاوصام .

Coléoptère mâle (F).

٢٣١٨٠ - كَبْرَتَل

He-coleoptere (E).

ذكر الخنفساء ، وهو ايضاً جسر الجمل المقدس .

Capromys (S).

٢٣١٨١ - كَبْرُوسِيَس ٥

Capromys, Houtia, Chemi (F), Capromys (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الداغيات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الجرذان . اجسامها ريمية ضخمة تطول من ٤ الى ٥٥ سم. وذناها من ١٥ الى ٢٧ سم. ورونها مستطيلة . مقاضها مقلوبة . اذناها مستعرضة متحدة الحجم . عيونها كبيرة . رباطها العليا مغلوقة . اعناقها قصيرة غليظة . جريزها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فثنائية . اطرافها طويلة مقوسة سادة . اذناها حشوية الجلد يكسوها حلب مستطيل دقيق . ثآلف موطها فزوليا ومتنوراس وكرويا والجايك ... تألف الغابات والاحراج والادغال . تتسلق الاشجار بحفة ونسبر على الارض يبطي || قربها الاوراق والثمار والحاء .

Capros (S).

٢٣١٨٢ - كَبْرُوس ٥

Capros (F), Capros (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكبريات شاكات الزعانف . انواعه المعروفة عديدة . اعطانها بجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سارحها حشاش المجاهد في الاعماق التي يراوح فيها من ١٠ الى ٣٠ م. || اجسامها صغيرة القدة ، مستعرضة الجسم ، مستطيلة الرأس والخطم ، كبيرة العين . زعانفها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة الأطراف || اعرف انواعه واشهرها الكبروس الخنزيري .

٢٣١٨٣ - كَبْرُوسِ عَشْتَرِي ٥

Capros aper (S).

Capros sanglier, Sanglier (F), Boar-fish (E).

سمكة بحرية من الكبروس . اعطانها البحر الابيض المتوسط ، جسمها صغير القدة ، بيضي اللون ، مبط الجرم ، يطول نحو ١٥ سم. رأسها متفطس الاركانز ، مخروطي الخطم المستدق الطرف كفتيشية الخنزير . عيناها كبيرتان . زعنفتها الظهرية الامامية تساعية المناسخ الحادة . سفنها مهدب الصفعة الخشنة . ثوبا الى الجلوة الفضية المواج || لجها كاهن الصنف ، مستهجن الرائحة ، قل من يأكله .

Caproidae (S).

٢٣١٨٤ - كَبْرُوسِيَات ٥

Caproidae (F), Caproidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شاكات الزعانف . اجسامها وانواعها عديدة . اعطانها بجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اجسامها صغيرة مستعرضة . اعطائها ذلفة . عيونها كبيرة . زعانفها الظهرية كثيرة المناسخ الحادة حشافة خشنة || اشهر اجناسها الكبروس .

Hépatiques (F), Liverwort (E).

٢٣١٧٠ - كَبْدِيَّة

صنف من قسم الطحليات .

Capparis (S).

٢٣١٧١ - كَبْر ، كَبَار

Capprier (F), Caper-tree (E).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الكبريات . انواعه زهاء ١٢٥ منظرها من نباتات المناطق الحارة ، منها الاشجار والشجيرات والجنات ومنها الشائكة والرسعة . اوراقها متعقبة متناحية بيضية النصل . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الاركانز ، طويلة الزناد ، بحيلة الشكل ، كبيرة القدة ، مستطيلة الاسدية المدينة للملوة || اعرف انواعه واشهرها الكبر الشائك .

٢٣١٧٢ - كَبْر شَائِك ٥ ، كَبَار شَائِك ، اصْف ،

صنف ، كَبَار

Capparis spinosa (S).

Capprier commun, C. épineux (F), Caper tree, Common caper-bush (E), Kappernstrauch, Echter Kappernstrauch, Kapper (D), Cappero, C. spinosa (I).

نوع من الكبر وهو جنبة قراءه فناء شائكة تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ م. منبها اقل البحر المتوسط . فروعهها دقيقة منبسطة ، اشواكها محمجة . ازهارها وردية اللون كبيرة الحجم قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثمارها كاتليار شكل وقالب لكن لا تطول اكثر من ٥ سم. || ازهارها وثمارها تستعمل في الخللات . جلجورها طيبة يقال انها نافعة وسطمة ومدرة البول .

Coccinia (S).

٢٣١٧٣ - كَبْر هِنْدِي

Coccinie, Céphalandre (F), Scarlet fruited gourd (E), Scharlachranke (D), Cefalandro (I).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة القرعيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانها البلاد الحارة . جلجورها صقولة . سرقها مدادة او عارضة . اوراقها مقصصة او مثله الزوايا . ازهارها كبيرة القدة ، بيضاء اللون او صفراء . ثمارها ريفية الشكل ، صغيرة الحجم ، جامدة الياب . يزورها الى السواد المرط بالابيض || اعرف انواعه ما يلي .

٢٣١٧٤ - كَبْر هِنْدِي لَتْبِي الورقي

Coccinia cordifolia (S), Coccinie à feuilles en cœur (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات زواحي مداد يطول نحو ٢٠٠ م. اوراقه صغيرة القدة ، خماسية التخصيص ، قليلة الشكل ، تطول نحو ١٠ سم. فصلها لامع البشرة على صفحتها . حوائطها بسيطة . ازهارها الى الياض المائج ، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم. ثماره ريفية تطول نحو ٥ سم. لونها الى الحمرة ، لهاها جامدة المادة ارجواني الخضاب . ثماره وصقله مأكولة .

٢٣١٧٥ - كَبْر هِنْدِي كَفِّي الورقي

Coccinia palmata (S), Coccinie à feuilles palmées (F).

نوع من الكبر الهندي وهو نبات متسلق يطول من ٦ الى ٨ امتار . اوراقه كلية الشكل طويلا يراوح من ٨ الى ١٠ سم. حوائطه فارقة . ازهاره الذكرية عتقوية التجميع صفراء اللون . ثماره بيضيه الشكل والحجم ، عتيقية اللون ، لهاها جامدة المادة الصفراء || ثماره وصقله مأكولة .

٢٣١٧٦ - كَبْرَت

Sulfurer (F), To sulphurate (E).

استعمل الكبريت .



كبر شائك



كبريس



كبروس خنزيري

البياض اللغضي. اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢١٤ - كَبُوعَةُ مَلَوَانَكَة

Megaptera verzeabilis (S). *Mégaptère changeante* (F). موطنها شمالي المحيط الهادي طليطا يراوح من ١٨ الى ٢٥ م. رأسها وظهورها الى الزبدية السمره الزرقاء الملوحة . وظهرها الى البياض المالحى تعلو ماجة وردية . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السمره القاتمة .

٢٣٢١٥ - كَبُوكَابُ الشُّوْكَ *Hérissor* (F). هو القنذ ، اظله .

٢٣٢١٦ - كَبُول *Fouurre garnie* (F). الكبيل : الكثير الصوف من الغنم .

٢٣٢١٧ - كَبُوعَةُ *Cabomba* (S). جنس نباتات مائية معمرة من فصيلة النيلوفرديات . انواعها المعروفة قليلة . سوتها شجيلة . جلورها كالشمر تشاهها مادة لزجة . اوراقها متناقصة صاجية النصل تركيز حل معاليق مستطيلة . ازهارها فردية التجميع ابضية الارتكاز سداسية الثلاث . بتلاتها صفراء الانتشاب بيض الاطراف . اوراقها وازهارها تنطقو حل سطح الماء . وهي تعيش في الاكواريوم وتتسمل كرمي لاسماك المياه العذبة ا عروف انواعها ما يلي .

٢٣٢١٨ - كَبُوعَةُ كَرُولِيَّة

Cabomba caroliniana (S). *Cabomba de la Caroline* (F). نوع من الكبعية المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كرمي للاسماك . اوراقها صاجية طافية . ازهارها بيض الاطراف ، صفر الانتشاب والاقراص || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٢١٩ - كَبُوعَةُ مَالِيَّة

Cabomba aquatica (S). *Cabomba aquatique* (F). نوع من الكبعية المعمرة السبروتية الشائعة الاستعمال كرمي للاسماك . اوراقها طافية بيضية النصل الاخضر الذي يطول من ١ الى ٣ سم . ازهارها صفراء اللون تشبه زهر الخيزران المائي || تنويرها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٣٢٢٠ - كَبُونَد *Capnodium* (S). هو التيج ، فطر مجهرى ، اظله .

٢٣٢٢١ - كَبُون *Chabot, Chabotage* (F). مرض جرثومى يصيب الكرمة ينشطا على افراخ الجلودر المولدة الشبنة .

٢٣٢٢٢ - كَبُولُ *Copris lunaris* (S).

Copris (F). حشرة من الجملليات يكثر وجودها في الربيع والصيف . طولها يراوح من ١٥ الى ٢٢ سم . ثوبها الى السواد اللامع . ذكرها مسلح بقرن مستطيل حاد . انتفاها سلسلة بشفرة ذرية عمودية الارتكاز . وهي من الحشرات العنصرية النائلة التي تعيش حل مختلف انواع البراز . محبرها سرداب فردية نسبية تنبع فيها اكر الزبل التي تحفرها الانثى بالاشتراك مع الذكر ثم تمتع في كل اكرة بكثرة وتقوم حل حراستها حتى اكتمال التفك الذي يستمر اكثر من اسبوعين .

٢٣٢٢٠ - كَبَشُ الْجَبَل *Mouflon* (F). حيوان ليون يجر يعرف بالاروية ، اظله .

٢٣٢٢٧ - كَبَشُ الصَّرْفُول

Girofle, Clou de girofler (F). *Clove* (E). هو زهرة القرنفل المخلطة . طعمها حريف ، ورائحتها ذكية المرقة فواحة . يستخرج منها زيت شائع الاستعمال الطبي ويؤخذ منه والتشج يغير الاعصاب ويمكن ا لم الانسان .

٢٣٢٢٨ - كَبَشِي الرُّأْس *Criocéphale* (F). *Criocephalous* (E). نعت ثمريني يطلق حل كل فن كان رأسه كراس الكيش .

٢٣٢٢٩ - كَبُوع *Megaptera* (S). *Mégaptère* (F). *Humpback whale* (E). الواحدة كبية . جنس حيتان عظيمة القد مربية الشكل . ازماره المعروفة حخة تائف المحيطات . طولها يراوح من ١٢ الى ٣٥ م . تتميز زعانفها الصدرية المستطيلة الضيقة الرابمية الاصابع . رؤوسها ضخمة ، صفائح احداها قصيرة مستعرضة مطاطة . صدرها عديدة متوازية التخديد الطويل || قوتها الاسماك الصغيرة . تجوب الاعماق والمياه السطحية والاقليمية في طلب الرزق . اناتها تقص من جرو الى جرون ترضعها بضمه شهود || سرعتها تفوق سرعة المراكب البخارية . صيدها غطر وشاق دهنها مغروب فيه وقد يراوح انتاج الكبية الواحدة من ٤ الى ٥ اطنان . اما انواعه الخمسة فهي ما يتبع .

٢٣٢١٠ - كَبُوعَةُ الْجَنْتُب ، كَبُوعَةُ لَانْتَد

Megaptera Islande (S). *Mégaptère de l'Islande* (F). موطنها جنوب المحيط الاطلسي . طولها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م . رأسها وظهورها الى السمره الزرقاء . وظهرها الى البياض الاغبر . صفائح حنكها الى السمره القاتمة .

٢٣٢١١ - كَبُوعَةُ الْخَلِيْج *Megaptera Indica* (S). *Mégaptère Indienne* (F). موطنها الاقائس الهندي تكثر في الخليج الفارسي . طولها يراوح من ١٢ الى ١٥ م . رأسها وظهورها الى الكبعية السمره الصفراء الملوحة . وظهرها الى البياض الاغبر الكدر . اخاديد صدرها وصفائح حنكها الى السواد الباهت .

٢٣٢١٢ - كَبُوعَةُ الْقَطْب ، جَبَلُ الْبَر

Megaptera Boops (S). *Mégaptère Boops, M. longimane, Baleine à bosse, Jubarte, Gibbar, Poisson de Jupiter, Képorak* (F). اكبر انواع الكبج وارضها جنة واطولها هيكل واغربها شكلًا . طولها يراوح من ٣٠ الى ٣٦ م . تتميز بسلام كسام الجمل بطول شبح الطير ورزعة ظهريه منجلية الشكل صغيرة القد . رأسها وظهورها الى السواد اللامع . وظهرها الى البياض . اخاديد صدرها الى السمره القاتمة . صفائح حنكها سود || موطنها نسيج الاربياء يشمل بحار القطب الشمالي واقتسم الاحل من المحيط الاطلسي .

٢٣٢١٣ - كَبُوعَةُ كُوْزِيْرَا *Megaptera Kuzira* (S). *Mégaptère Kuzira* (F). تكثر في مضيق بارين وبحار المازورة . طولها نحو ٢٠ م . رأسها وظهورها الى السواد الأزرق الملوحة . وظهرها الى



كَب



كبعية كروليه



كَبُول (١)



كَبُول (٢) منظر جانبي

Swine-book ٢٣٢٢٧ - **كتاب أنساب الخنازير**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الخنازير .

Stud-book ٢٣٢٢٨ - **كتاب أنساب الخيل**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الخيل .

Flock-book ٢٣٢٢٩ - **كتاب أنساب الضأن**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الضأن .

Cants-book ٢٣٢٣٠ - **كتاب أنساب الكلاب**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات الكلاب .

٢٣٢٣١ - **كتفلة** نبات كالجرير . (السان) .

Agglomérat, Conglomérat (F). ٢٣٢٣٢ - **كتفلة** ٥
Agglomerate, Conglomerate (E).
حالة تجميع طبيعية تكون عليها بعض المواد المختلفة . أحيانا طبقات الحصى والريال المتناسقة .

Imperméabilité (F). ٢٣٢٣٣ - **كتفم** ، **كتوم**
Impermeability (E).
خاصة مسك الماء في بعض أنواع القربة . وفي من حيرب القربة الزراعية لأنها تجعلها شديدة الصلابة والانتعاج .

Linum (S). Lin (F). Flax (E). ٢٣٢٣٤ - **كتان**
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الكتانيات . أنواعه المعروفة زهاء ١٠٠ معظمها حولي وبهشها ممر . بعضها خشبية أو ليفية منتصبة خشية . أوراقها لائقة متعاقبة سنانية التصلب أو خشية . أزهارها خالية التركيب عقدية التجميع مختلفة الألوان منها الأبيض والأصفر والوردي والأزرق والأحمر . ثمارها حقية ، بزورها بيضية صغيرة ملساء تستعمل في الطب ويستخرج منها زيوت حارة تستعمل في النعناع والصلاد . كما وأنه يستخرج من غلاف سوقها اللبغية اللياف صناعة نسيجية تحتل المركز الثاني بعد القطن || أشهر أنواعه البرية والزراعية الصناعية والزراعية ما يتبع .

Linum suffruticosum (S). ٢٣٢٣٥ - **كتان أبيص**
Lin blanc (F). White flax (E).
نوع من الكتان البردي الزرني . وهو عشية حولية تملو نحو ٣٠ سم . ساقها خشبية ، منتصبة ، معوية ، فراءه ، خلية اللحاء . أوراقها غززية الشكل ، جامدة التصلب . أزهارها إلى البيضاء الناصع . حصار يتخلل إلى الحمرة البنفسجية الملوحة || أزهاره يمتد من أيار إلى آب .

٢٣٢٣٦ - **كتان الزهر** * ، **كتان زهري** ، **كتان كبير الزهر**
Linum grandiflorum (S).
Lin à grandes fleurs (F). Flowering flax (E).
Leinblume (D). Lino d'Africa (I).
نوع من الكتان وهو عشية حولية زرينية تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . ساقها فراءه ، فروصها منتصبة منتصبة . أوراقها سنانية ، فصلها بحري اللون . أزهارها كبيرة اللد . حيلة الحمرة مهدبة التصلب || أزهاره يمتد طوال شهر حزيران

٢٣٢٣٧ - **كتان الشرق**
Linum orientale (S).
Lin d'Orient (F). Oriental flax (E).
نوع من الكتان الطبي البري البديل ، منته الشرق الأوسط . عشية معمرة تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم . ساقها خشبية فراءه . أوراقها صغيرة اللد ، فصلها وسيد العرق

Productif (F). Productive (E). ٢٣٢٢٣ - **كبوس**
كثير الحمل . يقال نقاسة كبوس ونقطة كبوس .

Capucine (F). ٢٣٢٢٤ - **كبوسين**
هي السلية ، نبات عشبي زرعني مأكلي الأوراق والأزهار ، اطلبها .

Loche (F). ٢٣٢٢٥ - **كجيت**
هو القمح من الإصمك النهرية ، اطلبها .

Copelera (S). ٢٣٢٢٦ - **كجيت** * ، **كجيت**
Copaler, Copahler, Copayar (F). Copelba-tras (E).
جنس أشجار حرجية من فصيلة القرنيات . أنواعه المعروفة نحو ٢٠ . أصلها البلاد الحارة الأفريقية والأمريكية . ٢٥ م . أغصانها منتصبة . أوراقها مركبة متعاقبة . أزهارها سلبية التجميع . ثمارها قرون صغيرة بيضاء البزرة المستطيلة المبطلة || أغصانها جذوية اللون سلبية تستعمل في التجارة . يستخرج من سوقها صلب ورائحي المادة ، يلسي العرق يستعمل في الصيدلة .

Macrocarpe (F). ٢٣٢٢٧ - **كجير القصر**
Macrocarpus (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات ينتج ثماراً كبيرة .

Mégalocephale (F). ٢٣٢٢٨ - **كجير الرأس**
Megalcephalous (E).
نمت تعريفي ووصني يطلق على الحيوانات الشاذة بفسخامة رؤوسها .

Renoncule des fleuristes ٢٣٢٢٩ - **كجيج**
هو الخواند الأسبوي ، نبات قصير الساق ، كزبه الرائحة ، اطلبها .

Blométrie (F). ٢٣٢٣٠ - **كت** ، **بيومتريا**
Biometry (E).
بحث بيولوجي يطبق القواعد الاحصائية وسحاب الاحتمالات على حياة الكائنات الحية .

٢٣٢٣١ - **كتا**
الواحدة كتاة . نبات كالجرير يطبخ فيوكل (السان) .

Book ٢٣٢٣٢ - **كتاب**
يحمل الانساب في الحيوانات الداجنة .

Lettre de crédit (F). ٢٣٢٣٣ - **كتاب الإعتماد**
Letter of credit (E).
رسالة يبعث بها صاحب المصرف إلى وكلائه لكي يحتفظوا مبلغاً من المال رهن تصرف شخص سمي .

Pedigree (F). ٢٣٢٣٤ - **كتاب الأنساب**
Pedigree (E).
يحمل تدوين فيه انساب سلالات الخيل العرب وحياد الرعان وسائر الحيوانات الموصلة .

Lettre de garantie (F). ٢٣٢٣٥ - **كتاب الضمان**
Letter of guaranty (E).
كتاب يتعهد به شاحن البضائع وناقلها بإيصالها على الحالة المبينة في تذكرة الشحن .

Herd-book ٢٣٢٣٦ - **كتاب أنساب البقر**
يحمل تدوين فيه أنساب سلالات البقر .



كبوس



كتان الزهر

Linum viscosum (S).
Lin visqueux (F).

نوع من الكُتَان الزَيَّي وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فراء مرفية . أوراقها سنانية ثلاثية أو خاسية القروق . نصلها مبهرم القد، خلي البشرة على صفتيه . أزهارها وردية اللون موشة بالنحسي . أزهاره يستمر من أيار إلى تموز .

٢٣٢٥٣ - كُتَان مُسَهِّل * ، قَرَقِ
Linum catharticum (S). Lin purgatif (F). Purgin flax, Fairy flax, Cathartic flax (E). Purgier-Lein, Purgier-Flachs (D). Lino a foglia purgative (I).

نوع من الكُتَان البري الطلي المبلول وهو عشبة معمرة تملو من ١٠ إلى ٢٥ سم. ساقها غشوية فراء . أوراقها طيبة مسهلة ، السفل منها ضمة الجميع ، سنانية النصل ، الوسطى والعليا متناقبة غطية . أزهارها كبيرة القد لونها ال صفار النبي || أزهاره يستمر طوال شهر تموز .

Linaceae (S).
Linacées (F). Linaceae (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القملات. أجناسها ١٤ تشمل ٢٣٠ نوعاً منها جميع الأصناف المتدلة . معظمها عشبي حولي أو معمّر وبعضها شجري أو جنبي . أوراقها متناقبة أو متقابلة . أزهارها تاجية الارتكاز ، لاقسية الجميع منها الفردية والمتقودة والمشكولية . أشهر أجناسها الكُتَان والكوكوا والرديولا .

٢٣٢٥٥ - كِتَابِيَة
Démographie (F).
Demography (E).

الكِتَابِيَة علم إحصاء الجماعات البشرية .

٢٣٢٥٦ - كُتُبُ الْأَنْسَاب
Livres généalogiques (F). Genealogical books (E).
مجلات تدون فيها الحيوانات بأسمائها وأشكالها مع أسماء وأشكال الآباء والأمهات وصفاتها المميزة وما اشهرت به الخ .

٢٣٢٥٧ - كَعْد ، كَعْدَة
الكعد والكعد هو اعل الكعف وقيل هو الكامل وقيل هو ما بين الكامل إلى الظاهر . ج . اكعاد وكعد .

٢٣٢٥٨ - كَعْر ، كَعْر ، كَعْرَة
Milieu d'une chose (F). Middle of one thing (E).
هو جواز كل شي، أي أوسطه .

٢٣٢٥٩ - كَعْرِيش * ، جَمِيْمِلُ الشَّعْرِ
Callitriche (S). Callitriche, Callitriche (F). Wassersternwurt (E). Wasserstern, Sternkraut (D). Callitriche (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الكثرشييات . أنواعه قليلة العدد ، أعضائها البلاد الحارة والمعتدلة تعيش في المياه العذبة || يستخرج منها عصارة لزجة ملينة تقيد الشعر وتحمده ملده وسسته .

٢٣٢٦٠ - كَثْرِيَّات
Callitrichaceae (S).
Callitrichacées (F). Callitrichaceae (E).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين أجناسها وأنواعها قليلة العدد . جميعها مائية . أشهرها الكثرش .

يطول نحو ٦ م. ويعمر نحو ٢ م . قلمته تنتهي بهلية دقيقة خدية . أزهارها برتقالية اللون ، غدية النصل الشفافة . أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران .

٢٣٢٤٨ - كُتَان بَرِّي * ، كُتَان هَبِّي الزَّرِّي ،
فِينَس

Linum angustifolium (S).
Lin sauvage (F). Pale flowered flax (E). Wilder Lein (D). Lino salvatico (I).

نوع من الكُتَان البري المبلول وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٣٥ سم. ساقها غشوية قليلة القروق المتصبة . أوراقها غشوية ، نصلها غطي الصفحة ، وسيد القرق . أزهارها قليلة العدد لونها ال الزرق اليلكيه المسلوخ . أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران .

٢٣٢٤٩ - كُتَان ذَهَبِي
Linum flavum (S).
Lin jaune d'or (F).

نوع من الكُتَان البروتي الزبي وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. ساقها غشوية فراء . أوراقها ملوكة الشكل ، نصلها يطول من ٢ إلى ٣ سم. ويعمر من ١٥ إلى ١٠ م. وهو ثلاثي القروق ، بحري اللون . أزهارها فرقة ، كثيرة العدد ، نحبة اللون || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٣٢٥٠ - كُتَان زَيْلَنْدَة
Lin de la Nouvelle Zélande (F).

هو القربوم المتصلب ، أخليه .

٢٣٢٥١ - كُتَان شَايَع * ، مَلَسَج
Linum uscatissimum (S). Lin cutévé, Lin commun (F). Common flax (E). Echter Lein, Gemeiner Flachs (D). Lino usuale, Lino comune (I).

هو الكُتَان الزراعي الصناعي المشهور - شروبه عذبة . جلده ونبته متوسطة الانشعاب . ساقه متصبة فراء تملو من ٤٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه سنانية النصل ، خضراء اللون . أزهاره ال البيضاء أو الزرقاة الباجونية . ثمار جرداء كروية مقنونة الرأس والمقعب ، عشارية المصاريم وفي كل مصراع بذرة . والبذرة مألصة ، لاصدة ، حمراء اللون ، مغلطنة : تطوي من ٤ إلى ٦ م. وتعرض من ٢ إلى ٣ م.

لها زبي للادة ينتج من ٢٢ إلى ٤٢ ٪ من الزيت . يقال انه من اقدم النباتات الصناعية لان زراعته وصناعة اليافه في بلاد ما بين النهرين في مصر تمتد الى ابد من اربعة الاف سنة || زراعته الحالية فيسبة الاجزاء تشمل الولايات المتحدة والارجنتين وروسيا وبوليفيا ولتوانية والمانيه وفرنسة وهولنده وبلجيكا وركيا || وهو موجود في الاقاليم المعتدلة ويفضل المناخات الرطبة حل الجافة والاعواد المعركة المبشرة اليوم حل الصافية الادم || وهو رطب في الاربة الخصبه اللذنية المنسوبة التركيب الحكي ، المتوسطة الاندماج ، لانه من النباتات الشرطه التي تستدق كل ما وصل اليها من العناصر المغنوية والمعدنية || يذو عادة في اوائل الربيع ويقطع حنثا تصفر سيقه وقد يكون ذلك في اوائل الصيف . فيترك في الحقل بفسه ايام الى ان تجف سيقه ثم ينقل الى المصارب حيث تفصل البزور من السوق . اما الالياف الصناعية للنسيج تفصل من السوق اما بواسطة الحرارة في مامل خاصة مجهزة هذه الناية واسا بواسطة الماء وهو ما يسمونه التطنين وقد يتم بنقع حزم سوق الكُتَان بالماء ارا كدة من الزمن تقروها حرارة المقيع لكنها صدياً تراوح من اسبوع الى اسبوعين .



كُتَان بَرِّي



كُتَان شَايَع



كُتَان سَهْل



كَثْرِيش

٢٣٢٧٠ - كَتَلْبَة صِيْغَة

Catalpa bungei (S).

Catalpa de Bunge, Arbra puant (F).

نوع من الكتلة بهذا الصن. تجربها صغرة اللقد تملو من ٧ الى ١٢ م. اوراتها رعية الشكل مقبولة القاعدة . نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويرض ١٤ وهو ماس البشره على المروق حل الصفحة للشل . انزلها طول نحو ٤ سم. وقمرض ٥ سم. لويا الى الياسج الشج بالاغصر والجلوي . ثمارها مخروطية طول من ٢٥ الى ٤٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٣٢٧١ - كَتَلْبَة ظَرْفِيْكَه

Catalpa speciosa (S).

Catalpa elegant (F).

نوع من الكتلة وهو شجرة سرية السريرة تملو من ٢٠ الى ٣٠ م. مهذا أمريكية الشالية . ساقها مستقيمة فرصاه . اوراتها طول نحو ٣٠ سم. وقمرض ١٨ سم. نصلها ذوب المقصه المستطيلة . ازهارها مقنودة التجميع ، كبيرة اللقد طول نحو ٧ سم. وقمرض ٨ سم. لويا الى البياض المرقط بالاغصر . ثمارها طول نحو ٥٠ سم. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٣٢٧٢ - كَتَلْبَة يَابَانِيْه

Catalpa ovata (S).

Catalpa du Japon (F).

نوع من الكتلة السريرة مهذا اليابان . تجربها صغرة اللقد تملو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراتها ثلاثية اوحاسية التفصيص البيضي الشكل . نصلها بطول نحو ٢٠ سم. ويرض ١٥ سم. ازهارها صغرة اللقد ، صفراء اللون ، ملطخة بالبيضي . ثمارها مستطيلة دقيقة كالاصابع . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٣٢٧٣ - كَتَلْبَة صَفْرَا

Immortelle des sables (F).

هي الخالية الطاقية ، الحلبا .

٢٣٢٧٤ - كَتَلْبَة هَوَا

Masse d'air (F).

Mass of wind (E).

تعريف جيولي يدل على مجرى الهواء المتحرك في اتجاه معين .

٢٣٢٧٥ - كَتَم

• نبات جبلي ورية كورق الآس يغضب به مقلو وله قمر كمر القفلل ويسود اذا لضع وله يستمر منه دهن (١. م.) .

٢٣٢٧٦ - كَتَن

Tubercularia (S).

جنس تطور مجهرية من عارة الوطنيات وفصيلة الككتيات . جرابها الكندي كثير الفروع المبادنة الترتيب . ككاته وسيدة الخلية ، كروية او اسطوانية الشكل . وسادته بجنية تيمو عند انفلاها خلية اللؤلؤ زاهرة اللون || انواعه قليلة . اعرفها الثلاثة التالية .

٢٣٢٧٧ - كَتْنُ الإِجَاصِ

Tubercularia pircola (S).

نظر مجهري ركب البار المنقوشة . لفرونة اخصها الاجاص وانتفاخ || ينشط ويتكاثر في بيئة خاصة سرارها تفروق الاربع درجات ستيفارد ورويتها من ٨٠ ٪ / وصاحه || مظهره الخارجي نندت خلي آخر اللون ، ابيض الملوحي ، يركب البشره فيطبعها ثم ينور في الب ينفعه ويره .

٢٣٢٧٨ - كُتُسُوس

Chatossus (S).

Chatossus (F). Chatossus (E).

جنس اسماك بحرية زهرية من ملتحات الائمة وفصيلة الصابوشيات . انواعه المعروفة عديدة معظمها بحري وبعضها بحري . والبحري منها يلزم البحر في زمن الاسراء || اجسامها اهليجية الشوزن ، طول من ٢٠ الى ٢٦ سم. ورونها صغرة ، مثثلة الاشداق . صيوتا ماصة . زانفها الظهرية صغرة ، شبه مزوانية . الصدوية والخرسية صغرة . الشرجية مستطيلة . الليلية فارقة . انواعها متقاربة تسر في القسم الاحل وتثير في الاسفل || يكثر وجودها في الهند والصين واليابان || حورنها مأكولة وبعضها جيد الصنف .

٢٣٢٧٩ - كُتْسُول

Catéchol (F).

بلورات ابرية حامدة اللون براقه تستخلص من الكاشو والفيسر والصلان الخ ... تلي عنه ١٧٧/ ١٧٥ سم.

٢٣٢٨٣ - كُتْهَد

Cernier (F).

سكة بحرية تدعى قباب ، احلبا .

٢٣٢٨٤ - كُتْف ، عَاتِق ، مَتَكِب

Epaule (F). Shoulder (E).

الجزء العلوي من النصف .

٢٣٢٨٥ - كُتْشَان

الكُتْشَان الجراد اول ما يطير . ويقال هو الجراد يمسد للدواء اوله السر ثم اللب ثم اللقواء ثم الكُتْشَان . الواحدة كُتْشَانة .

٢٣٢٨٦ - كُتْشَوْت

Poussin (F).

هو القروب والصوس .

٢٣٢٨٧ - كُتْشَلَز

خبرة نباتية تيمس على انتاج واتزان هيدرات الاوكسين في النبات .

٢٣٢٨٨ - كَتَلْبَة

Catalpa (S).

Catalpa (F). Catalpa (E). Trompetenbaum, Trom-

petenstrauch (D). Catalpa (F). جنس نباتات برية زهرية من فصيلة البننويات . انواعه المعروفة ا جميعها اشجار صغرة او متوسطة اللقد . سطها مستقيمة . اغصانها فارقة . اوراتها بسيطة ، حابلة ، متفائلة . نضفانها النصل . ازهارها جربية الشكل . ثمارها جرد مستطيلة كالخيار || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٣٢٨٩ - كَتَلْبَة شَالَمَة

Catalpa bignonioides (S). Catalpa commun, C. de la Caroline (F).

نوع من الكتلة الحرجية السريرة المبالولة مهذا أمريكية الشالية . ساقها تملو من ٥ الى ١٥ م. اوراتها كبيرة اللقد ، بيئة الفصوص نصلها بطول نحو ٢٥ سم. ويرض نحو ٢٠ وهو ازغب المروق كربه الزائفة عند المس . ازهارها مقنودة التجميع طول نحو ٥ سم. وقمرض ٦ سم. لويا الى البياض المرقط بالاغصر والاخر . ثمارها طول من ٢٠ الى ٤٠ سم. وقمرض من ٦ الى ١٥ || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .



كلته شالمة

تعيش على الصخور المشورة قرب الشواطئ || اصداؤها داخلية رقيقة صغيرة . اجسامها لحمية ، بيضية الشكل او املجية تتلفها الاديء الغفافة . غياشها عينية الاركانز نظامية الترتيب الثنائي الصف . افواها عطنية الشكل . لواسها ثنائية انبوية مفلوجة السطوح الخارجية .

٢٢٢٨٧ - كَتِيَمِيَّات (S). Pleurobranchidae (F). Pleurobranchidés (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || دويباتها تتميز باصداؤها الرقيقة الصغيرة التي تلمس الظاهر . غياشها هدية يميلية الاركانز . افواها عظمية الشكل و ثنائية القواس الانبوية المفلوجة من الخارج || اعرف اجناسها واشهرها الكتيمة والقضابة والندبة .

٢٢٢٨٨ - كَتِيَلَة

الكتيلة هي النحلة فالت اليه . ج كئائل .

٢٢٢٨٩ - كَتِين * ، كَتِيَنَة (F). Catène (F). Catena (E).

مجموعة تربية لياقسية التركيب الحكمي جمعها المومل الطبيعية تميزت بوسنها للشكلية .

٢٢٢٩٠ - كَتِيَهَة Lotier corniculé (F).

هي القرص القرني ، اطليه .

٢٢٢٩١ - كَتَّاه Brachycome (F).

هي البراكيم ، اطليه .

٢٢٢٩٢ - كَتَّاب * ، زَقْرَاقُ النَحْص

Sarciphorus (S). Sarciphore, Vanneau à caroncule (F).

جنس طير من طوالب الساق وفصيلة الزرقايات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض الفلوات الافريقية القريبة من مجاري الماء . ملجها الحيالي جماعي . قوتها الخشرات والدويات الصغيرة والذباب . تتميز بسرعة عدوها على الزوال || اجسامها صغيرة القدة ، متراكبة الالوان الجميلة ، فيها الاخضر والاسود والجلوي والاشهب والابيض . رؤوسها صغيرة . مناقبها مبطلة الصفحات السفلى وتعلوها في قواعدها عمليا لخص صغيرة لحمية المادة . اجناسها لاسعة . افذاها شديدة الصغر . سيقانها دقيقة سمراء اللون كالنمل .

نوعها المعروفان :

٢٢٢٩٣ - كَتَّاه Crème (F).

هي القشدة ، المادة السنية في الحليب .

٢٢٢٩٤ - كَتَّاه Roquette (F).

هي الجرجير من احرار البقول ، اطليه .

٢٢٢٩٥ - كَتَّافَة Densité (F). Density (E).

هي مقدار الشيء في وحدة معينة . كترك ١٠ شول في المتر المربع .

٢٢٢٧٨ - كَتَّن البُحْس

Tubercularia versicolor (S).

فطر مجهرى يعيش على اغصان البُحْس اليابسة وقد شوهد على حاء المطاط في الاوشنا .

٢٢٢٧٩ - كَتَّن شائع

Tubercularia vulgaris (S).

فطر مجهرى دني يكثر في الخريف والشتاء . يركب حاء الاغصان اليابسة في غلاف الانجار الحربية والمشرية .

٢٢٢٨٠ - كَتْنَة ، كَوْبَالِيَة

Hymenaea verrucosa (S). Copalier, Hyménée ver-rueuse (F). Gum copal tree (E). Henschrecken-baum (D). Imeneo (I).

شجرة حرجية من فصيلة القرنيات . مهدا افريقية الجنوبية وبمضكر . ساقها كثيرة الثمول متوسطة الارتفاع تملو نحو ١٠ اطار . غشها صلب المكسر احمر اللون مروط في . يستخرج من ساقها بالثقب عصارة صفية رائحة صفراء اللون فواحة العرف المستحب تدعى كويال شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٢٢٨١ - كَتْنِيَّات (S). Tuberculariaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرتبة الميفانيات ورثة الزوييات . اجناسها وانواعها عديدة تجمعها حارزان : الطحانيات والطحانيات .

٢٢٢٨٢ - كَتْنِيَّه Tuberculina (S).

جنس فطور مجهرية من عارة الطحانيات وفصيلة الكتيات . جراه الكتيدي بسيط التركيب قليل الفروع . كتائده وحيدة الخلية كروية او اسطوانية الشكل || انواعه قليلة العدد والاذى تركب اوراق بعض الصنوبريات والاجاص البري فتوشها بيض صغيرة للقد لوها الى الحسة البنفسجية .

٢٢٢٨٣ - كَتُّوم Imperméabilité (F).

Impermeability (E). الكتوم والكتام هي خاصة سلك الماء في بعض انواع التربة . وهي من هيوب القربة الزراعية لانها تجعلها شديدة الصلابة والاندماج .

٢٢٢٨٤ - كَتُّوم ، كَتِيَم ، مَكْتَم

Imperméable (F). Impermeable (E).

نمت وصفة التربة التي تمسك الماء .

٢٢٢٨٥ - كَتِيَلَة Kitzibella (S).

Kitzibelle (F). جنبة معمرة برية وتزديت من فصيلة الهازيات معوية الشريف على اسم اليوناني المغاربي بولس كيتيل (١٧٥٧-١٨١٧) ساقها فراء تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها متمالة خامية التخصيص . نصلها جبل الخضار . مسن الحافة . ازهارها ابطية الاركانز ، كبيرة القدة ، خامية البتلات ، يضاء اللون .

٢٢٢٨٦ - كَتِيَمَة Pleurobranch (S).

Pleurobranche (F). Pleurobranchus (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتييات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتلة الحارة .



كتيلة



كتاب

٢ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة ، ملحوفة . حيوها بارزة .
تأثيرها وولادتها نظامية . قرونها الاستثمارية دبوسية
الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كوالها نصف دائرية
الشكل . انحدارها لاسقة . قوائمها نشيطة . ارساها خاسية
المقل . اثنائها ملونة || جميعها واشمة تعيش على الازهار
وتغني بيئاتها الشري تحت الحاء . يرقاتها مؤذية تقضم
تخوت الازهار والمبيض والجرح وتقتضي عليها || اشهر
اجناسها الكحيصة .

Eternuement des bêtes (F). كدأص
Sneezing of beast (E). هو عطاس البهائم .

Moyette, Dizeau (F). كدأصة
Hay cock, Shock, Stook (E). مجموعة حمامات من الحصيد تهرم وتكسح وتحط وريها
تُدْرَس .

٢٢٣٣١ - كدأل مئوج °
Gubernatrix cristatella (S).

Commandeur huppé, Cardinal vert (F).
طائر من فصيلة التشرشورات ورتبة الجواثم غروريات
الناقير . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى ومنها البرازيل.
يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . نظامه الحياتي
جماعي الا في زمن الترعيم || جسمه صغير اللد ، بطول
من ١٨ الى ٢٥ سم. ثوب الذكر متراكب الانوار الجميلة.
ظهره الى الشبهة انقراض المواجه . صدره ورطبه ولواصف
جناحيه وافيحه الى الصفار الزاهي . قبتيره ورأسه وعتقه
الى السود الاسفع . متفاده حطلي القرن . رسده الى
السرة السوداء . اما الانثى فصدرها الى الشبهة وبطنها الى
الغضار البامت . صدفاها وصمراها الى البياض العاجي ||
قوته الحشرات والبلود . يألف حياة الاسر ويعيش
ويتكاثر في القفص شرط ان يكون فسيحا || يذئن عشه
بين اثناد الاشجار القريبة من سطح الارض . الانثى
تحضن حل مرتين في الحول . حشنتها من يعضين الى ثلاث
بيضات تقوم برعيها دون الذكر الذي يولن لها الغذاء .

Mouvement (F). كدأمة
Movement (E). الكدامة هي الحركة ، اطلبها .

٢٢٣٣٢ - كدأمة °
Leptodactylus (S).
Leptodactyle (F). Leptodactylus (E).

جنس ضفادع قاذبة من فصيلة الكداميات . انواعه المعروفة
سنة مهدا المناطق الاستوائية الامريكية || اجسامها
صغيرة اللد تطول من ٦ الى ٨ سم. عتد الذكور من ٧
الى ١٥ سم. عتد الاناث . رؤوسها معتدلة الطول والعرض
حيوتها مستديرة جاحطة . فكوكها السفلى عادمة الانسان .
اصابع قوائمها الخلفية نصفية الخطاب . جلودها مثاقلة
دقيقة الفتق || اثنائها الى السرة انقراض المابقة الازمة
تلعلوا رقشة جزوية على الظهر ، صفراء على البطن ||
تعيش قرب الخنازير ويجاري الماء اكثر من عشرة اعوام .
تسرح في الليل وتنبئ في النهار بين اوراق النبات او في
الناقع . قوتها الحشرات والديدان || الانثى تقرأ نحو ٥٠٠
دعيلة في شلة تطرحها في مكان منتخب قليل العمق لا
تتجاوز مساحته المتر المربع الواحد تطوقه بالسبال واخر
والنباتات المائية المختلفة .

٢٢٣٣٠ - كحولاز ، زيمزاع

Alcoholase, Zymase (F). Alcoholase, Zymase (E).
خيرة كياوية تحول السكر على اختلاف اشكاله الى كحول
وطاز كربوني .

Spiritueux (F). كحولوي
Spirit, Spirituous (E).

نعت تعريبي يطلق على السوائل التي تحوي بعض الكحول .

٢٢٣٣٢ - كحيتية °
Seilbetta (S).
جنس فلور مجهرية من عارة الخنثيات وفضيلة الكحيثيات .
يتميز بكريمااته المستطيلة القصبان اللبوسية الرأس .
بورناته كروية الشكل ، صغيرة اللد || انواعه المؤذية
قليلة اخرها كحيبة الشاي .

٢٢٣٣٣ - كحيتية الشاي °
Seilbetta theae (S).
فطر مجري يتطفل على افئاد الشاي . مظهره الخارجي يقع
خلية زياء تشبه القنابر تركب لها الافئاد . تيمو وردية
اللون ثم يبيض . مضججه يسير في الارضية وقد يستقر في
قرب الاناثان ليرتبط فيها ويسبب ياسها || يكافح
(١) باقطار الاغصاء الموصلة وحرقتها . (٢) بتطهير
الجرح . (٣) بتجفيف التربة لصفوف المياه الزائدة التي
تسبب هذا الورم .

٢٢٣٣٤ - كحيتية °
Seilbacae (S). Seilbacae (F).

فصيلة فلور مجهرية من مرتبة الميفانيات ورتبة الزوييات
تتميز بكتلتها المجرية الى كريات . حينها لا نظامي
الارتكاز من المستتب الخوازي ومن المتشاكك اللاتياحي
الترتيب . مشجها فرعي الزول . يورثها قلادية التنجيح .
اجناسها عديدة تجمعها عمارتان الخنثيات والمعدنيات .

٢٢٣٣٥ - كحيصة °
Crypte (F). Crypte (E).

كحيصة ج كحيثات . الكحيثات ، جسورياً ، اسم
يطلق على هذبات صغيرة او الانبيس نحيلة ، غير نافذة ،
تلتصق في الفتاة الخفصية عتد بعض الحشرات .

٢٢٣٣٦ - كحيصيلة
Fauvette orphée (F).
طائر من الدسلل ، اطلب دخلة غريبة .

٢٢٣٣٧ - كحيصة °
Phalacrus (S).
Phalacre (F). Phalacrus (E).

جنس حشرات واشمة من فصيلة الكحيصيات ورتبة هذبات
الاجنسة . اثنائها المعروفة متوسطة اللد منتشرة في بعض
المناطق الجارية والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ،
بيضية الشكل ، تطول نحو ٣ سم. رؤوسها غروروية ،
صغيرة . حيوها بارزة . تأثيرها وولادتها نظامية . قرونها
الاستثمارية دبوسية الاطراف . كوالها معدنية نصف
دائرية الشكل . انحدارها لاسقة يطولها تضديد نحيل
قاطب . قوائمها نشيطة . اثنائها ملونة || جميعها واشمة
تعيش على الازهار . يرقاتها تقضم تخوت الازهار ويبعضها .

٢٢٣٣٨ - كحيصيات °
Phalacridae (S).
Phalacridae (F). Phalacridae (E).

فصيلة حشرات واشمة من هذبات الاجنسة . اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة اللد منتشرة في معظم اقطار
العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية اللون . تطول من



كحيبة الشاي



كحيصة



كُدُوَّة الارز

23347 - كُدُوَّة
Lentour (F).
Slowness, Tardiness (E).
يقال كدت الارض اذا بطا نباتها . وربة كاداة اي بطيئة الانبات .

23348 - كُدُوَّة
Leptosphaeria (S).
جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات . تتميز باصنافها الفارقة في نسج النبات للنحار وحبوبها الوشي الشكل الملون والتبدد الزئالي المخرشة في انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

23349 - كُدُوَّة الارز

Leptosphaeria salvinii, Helminthosporium sigmaeum, Sclerotium oryzae (S).
فطر مجهرى يركب الارز في جميع اصفاء الحولية ينفذها ويحطبها || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة موهبة ، لون غورها الى الخمر ثم يزداد اسمرارا مع اقترابه من الاطوار الاخضر ، تركب المصغ والسوق والنبات || اغراضه تختلف باختلاف انتشاره واذا || يكافح بتطهير الشلب للمد الى البذار .

23350 - كُدُوَّة الحنطة

Leptosphaeria tritici (S).
فطر مجهرى يركب صنف ازروع واصعبا الحنطة ثم الشعير والشونان والشليم || مظهره الخارجي يقع صفر تنتشر على المصغ والاعقاد تسبب جفافها الباكر . اغراضه تقوم على مدى نتائج انتشاره لانه يبق على نمو ويحد من نشاطه .

23351 - كُدُوَّة السقندرية

Leptosphaeria rusci (S).
فطر مجهرى يصيب بعض انواع السقندرية واصعبا السقندرية الاربع || مظهره الخارجي نكت كثيفة لعلولية الشكل تكثف الانفاد تسبب ذبها ويغلفها || يكافح باستعمال سائل يورود وغيره من السوائل السلفوكسية .

23352 - كُدُوَّة السلمج

Leptosphaeria napi, Pleospora napi, Alternaria excruciosa, A. brassicae, A. herculea, Macrosporium brassicae, Sporodemiolum excruciosum, S. brassicae (S).
فطر مجهرى يصيب بعض النباتات الصليبية واصعبا السلمج واللفت والملفوف والبقيل ... || مظهره الخارجي يقع شقر تملو سطح اللادة الخضراء في السوق والاوراق وانفريبات تسبب يباس التسج ويغلف انفريبات وتحميدها وانفلاتها || وبهم من قال ان حفر جطور اقلت يمد الى هذا الفطر الذي يتكاثر بسرعة مذهلة اذا لامته المومال الجوية واصعبا الرطوبة || يكافح بتطهير البذار .

23353 - كُدُوَّة الشونان

Leptosphaeria avenaria, Septoria avenae (S).
Malaria des taches sombres (F).
Oat leaf spot (E).
فطر مجهرى يركب صنف الشونان فيؤذي وبسبه الى نمو . مظهره الخارجي يقع صغيرة مبيضة على نصال الحنط ، تبدو اقل اخضراراً من النصل ثم تفسد بعد ان يملوها في وسطها نكتات خلية بيضاء || اغراضه زهيدة لانه قليل الانبات والاسادة .

23354 - كُدُوَّة الصَّجَمَان

Leptosphaeria herpotrichoides, L. culmifraga, L. amphibola (S).
Pétin-verse des céréales (F).
فطر مجهرى يركب سوق ازروع اصعبا الشليم والحنطة

23344 - كَدَامِيَّات (S).
Leptodactylidae (F).
Leptodactylidae (E).

فصيلة حيوانات ديداء قازية من الديات السونيات ورتبة البتراوات اي حديدات الذب || اجناسها وانواعها عديدة . مهدا امريكة البوسل واسترالية . مظهر انواعها قازب وبها البري والمالي والشاجر والباس . جميعها سمنة التكرنك العليا ، عادمة الانسان في السفلى . وقرة صيرضا شبه غالية من التثوات الضفوية الجانية || اشهر اجناسها واعربها الكدامة والاوزيا والهيلود والسيراثيريس .

23345 - كَدَان (E).
Schiste (F).
Schist, Slaty rock (E).
اربة صفيحية التركيب متراسة متوالية صلبة المكسر .

23346 - كَدَر (F).
Lie (F).
Loes, Dregg (E).
كل مادة ترسب في قعر الابوية التي تحفظ فيها المشروبات الكحولية ويورها كالمخمر والرويت .

23347 - كُدُوَّة
Ganga cata
طائر من النطا يعرف بقطة كدوية وبهم من قل كدارية . الجلس كدوي وكداري وكدر .

23348 - كَدَس ، كَدَسيس (F).
Botteage (F).
Tying up in bundles (E).
جعب الحشيش واثاله الى اكادس .

23349 - كَدَس ، كَدَسيس (F).
Entasser (F).
To hoard up (E).
جمل الشيء كدسا بضمه على بعض .

23349 - كَدَم (F).
Tondre le gazon (F).
To mow a grass (E).
كم اخضر جزء بالكداة او المكدة .

23341 - كَدَم (F).
Tondre le gazon (F).
To mow a grass (E).
نوع من الجراد سيد الاجسام خضر القرويس الواحدة كدة .


23342 - كَدَمَة (F).
Brebis grasse (F).
Fatted ewe (E).
نجة سمينة غليظة .

23343 - كَدَمَة (F).
Echymose (F).
Echymosis (E).
أثر نفسيج او اجر اللون يظهر في الجلد عقب جرح او رضه سببه انسكاب الدم تحت الجلد .

23344 - كَدَمِيَّوم (F).
Cadmium
معدن ثنائي الذرة ابيض اللون ، ازرق الملوأ ، لدن المادة ، قابل التصفيح ، شديد المطرية ، اصلب من القصدير . ثقله النوعي براوح من ٨٦٠ الى ٨٦٩٠ ريزه (ك-ك) وزنه الانبهي ١١٢.٤١ ينصهر تحت ٣٢٠ مس . ويبل في ٨٦٠ مس . يغاره ذاهي ، شديد الادي ، يرتقالي اللون ، يتكثف بلورات ثمانية الارجح من المدن التي الحر . وهو يذوب في بعض الموماس منها الكبريتي والازوتي والكلوريدسيكي .

23345 - كَدَن (F).
Fruiteuse (F).
Grazz (E).
نمت تمرين يدل على الاصول الصلبة في النباتات الجنية .

23346 - كَدَن (F).
Talure (F).
عارض فيزيولوجي يعترض حلاه الاجبار .



كُدُوَّة الحنطة



كُدُوَّة السلمج



كُدُوَّة الشونان

٢٣٣٦٣ - **كُرَاب ، كُرَاب** Scarflage (F).
هو السلف أي الخرت السطحي يبعثر ذرات التراب ويقتد المدر ولا يقلب التربة .

٢٣٣٦٤ - **كُرَات**
شجر كبير بجبال الطائف . الواحدة كرات (١ م.) .

٢٣٣٦٥ - **كُرَات البَرَّ ، طَيِّطَان**

Allium vineale (S). All des vignes, Porreau sauvege, Porrette (F). Crow garlic, Crow onion (E). Hundslauch, Feldlauch (D). Aglio cipolla (I).

نوع من الكرات البري ينكر في الكروم . ديوسته مستديرة مسطحة . أوراقه مستطيلة تعرض من ٨ إلى ١٥ سم . لونها إلى الأخضر البهري المايق . شراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . نورة صيوانية كروية الشكل ، أزهارها إلى الأبيض الودي المواج .

٢٣٣٦٦ - **كُرَات الدُبَّ** Allium ursinum (S).
All des ours, Ail des bois (F). Bear's garlic, Ramsons, Wild-leek (E). Bärenlauch, Wilder Knoblauch (D). Aglio confoglio pedunculata (I).

نوع من الكرات البري الميزيل . أوراقه مستطيلة مستعرضة . شراخه يعلو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . نورة صيوانية كروية ، أزهارها غبراء اللون ودية المواج .

٢٣٣٦٧ - **كُرَات الصَّخُور ، كُرَات إسبانيا** Allium scorodoprasum (S). Ail rouge, Rocambole, Ail d'Espagne (F). Rocambole, Sand leek, Spanish garlic (E). Graslach, Rocambole (D). Aglio di Spagna, Scalogno di Spagna (I).

نوع من الكرات للمسمر . شراخه الزهري ينتهي بنورة صيوانية كروية تكتنفها الأوراق الزهرية والفصوص الخلفية الشكل . أزهاره إلى الأبيض الأخضر يعلو مواج أحر . زراعته شائعة في أروبة وهو أقل مادة حريفة وفعالة من الثوم . يتكاثر بالفصوص لأنها أصغر وأسرع من البزور . يوجد في جميع الأتربة غير أنه يفضل الدبالية .

٢٣٣٦٨ - **كُرَات عَسَقَلُون ، كُرَات أندلسي**
كُرَات أَبُو شُوَيْشَة ، قُفْلُكُوط

Allium ascalonicum (S). Echalotte (F). Ascalonian garlic, Shallot (E). Eschlauch, Schalotte (D). Cipollina, Scalogno (I).

نوع من الكرات الزراعي الشائع الاستعمال . زراعته من البزرة إلى الدفوعة تستلزم ثلاث سنوات . يوجد أيتها زرع ولا يختل سوى الأتربة الكلسية . يقال أنه طيب ويستعمل كطارد للديدان المعوية .

٢٣٣٦٩ - **كُرَات مَعْرُوف ، كُرَات رُؤْمِي**

Allium porrum (S). Poireau, Porreau (F). Leek (E). Lauch, Porree, Porrei (D). Porro (I).

بقلة زراعية معولة شائعة الزراعة والاستعمال . يصلها اهليجية الشكل . أوراقها قرصية متتابعة حاشية ، نصلها مستطيل الصصفة عابق الخضار . شراخه الزهري يعلو نحو ٦٠ سم . ينتهي بنورة صيوانية كروية الشكل أزهارها إلى الحمرة . يرغب في الأتربة الدبالية لتنسجه الاندماج . يندر في أكواد خاصة وينقل إلى مستقره عندما يبلسغ ارتفاعه نحو ١٥ سم . تقطع أوراقه وتكدم جلوره ثم يصار إلى غرسه .

والشعير والدونان فيسب قصفها في ايان تحبيب السنايل او قبل تمام الادراك . مظهره الخارجي بقعة حمراء مستطيلة تكتنف غدة الشراخ فالحالية الاول حيث تطب جدار القصبة . ثم يعلو مع الزرع من غدة إلى غدة بعد أن يدخل في التربة حتى مستوى الجذور الاول فينتقلها بنشاة فسمية لبنة تعزل التبادل النسي ان لم تقض عليه .

٢٣٣٥٥ - **كُدَوَة الفَصَّة**

Leptosphaeria circinans (S).

نظر مجهرى يصيب الفصاة فيؤذيها ويشل نشاطها . مظهره الخارجي بقع خلية بنفسجية اللون لاقياسية الشكل والحجم تركب الجثث والجذور فتعطها وتشل نشاطها وقد تسبب ذبول النبات وموته . لم تنجح فيه مكافحة حتى الآن .

٢٣٣٥٦ - **كُدَوَة المُرَّ**

Leptosphaeria musarum (S).

نظر مجهرى يركب اوراق المر فيؤذيها بعض الشيء . مظهره الخارجي لطح خطية لاقياسية الشكل والحجم تركب نصل الاوراق وتسبب جفاف النسيج للمحار . اضراره زهيدة لانه قلما يعزل ويؤخر تبادل النسخ . يكافح باستعمال الفطائير غير المركزة على النحاس .

٢٣٣٥٧ - **كُدَوَة الورْد**

Leptosphaeria coniothyrium, Coniothyrium Fuckelii, Septoria sarmenti (S).

نظر مجهرى واسع الانتشار يصيب الورْد والمليق والموجع والكشمش والخمضيات . مظهره الخارجي كلف باهت اللون لاقياسي الشكل والحجم يعلو الزواي فيسبب ذبولاً كما في الورْد والموجع ، ويعلو نصل الاوراق كما في الخمضيات فيؤذيها ويؤخر نشاطها . ومن الملاء من قال انه يصيب النبات الضعيف دين غيره . يكافح بتسميد النباتات الضعيفة وباستعمال احد الادوية الفطورية اعينها سائل بورديو وسائل سلفوكسليك .

٢٣٣٥٨ - **كُدَيْس**

Cystocarp (F).

Cystocarp (E).

اسم يطلق على كل مجموعة من البوغ او اكياس البوغ عند انقياض الحمر .

٢٣٣٥٩ - **كُدَيْس الزَبَاد** هو دباح دنقله ، اطليه .

٢٣٣٦٠ - **كُدَان ، يَسْكَة ، حَقَان** Ponce (F).

Pumice (E).

حجارة خفيفة نخرة يكثر وجودها عند مرى الموج .

٢٣٣٦١ - **كُدَو ، كُورْبَرِيل**

Hymenaea courbaril (S). Hyménée courbaril,

Courbaril (F). Courbaril tree (E). Kourbaril (D).

Courbaril (I).

شجرة حرجية كبيرة القد حيلة الشكل من فصيلة القرنيات . مهدا البلاد الافريقية الحارة . ساقها منتصبه فراء تملو من ١٥ إلى ٢٥ م . خشبها صلب المكسر ، ناعم الرقة ، جزوي اللون ، صناعى الاستعمال ، مرغوب فيه . يستخرج من ساقها بالخز حليبان غزير المادة الراتنجية ، اصفر اللون ، مستحب المرق يدعى « كوربرين » يستعمل كطلاء فاخر الصفت .

٢٣٣٦٢ - **كِرَاء** Louage (F).

رابع اجارة .



كُدَوَة المُرَّ



كُدَوَة الورْد



كُدَو



كُرَات البَر



كُرَات الدُب



كُرَات الصَّخُور

كُرَات إسبانيا



كزّات تبطي



كزّات وردی



كزّاة الحراج



كزّاة الخوخ



كزّاة اللوز



كزّاة الشمس

كزّاة اللبص
الصغيرة

كزّاة خشنة

٢٣٣٧٨ - كزّاة البص *، سكوليت البص
Scolytus scolytus (S). Grand scolyte de l'orme (F).
Larger European elm bark beetle (E). Großer
Ulmenplintzkäfer (D).

حشرة من الكرشيات. جسمها مفلطح الشكل مقطوع
الطرف. طولها نحو ٦ م. رأسها وصدرها وكولها الى
السود الازرق المالح. غمداء الى الجوزة المتأبى. تركيب
المس وبضى الانجرار الزينية فتخلج الشكير وتقع به
اشد الاذى.

٢٣٣٧٩ - كزّاة المس الصغيرة *

Scolytus multistriatus (S). Petit scolyte de l'orme
(F). Lesser European elm bark beetle (E). Kleiner
Ulmenplintzkäfer (D).

حشرة من الكرشيات. جسمها مفلطح الشكل اسطوانى
الحية يطول نحو ٤ م. رأسها اسود اللون. جسمها كستى
الزوب. غمداء سطحية للتخديد. تركيب المس ولا تنف
من الانجرار المثمرة فتخلج شكير الاصصان والافناد وتقع
به اشد الاذى.

٢٣٣٨٠ - كزّاة خشنة *، سكوليت خشنة

Scolytus rugulosus (S). Scolyte rugueux, Petit scolyte
des arbres fruitiers (F). Fruit bark beetle, Shot-hole
borer (E). Ruzzelliger Obstbaumpinnkäfer (D).

حشرة من الكرشيات، طولها نحو ٣ م. كولها اسود اللون،
غمداء الى الجوزة البنية. تركيب جميع الانجرار المثمرة
اغصها التفلح والكرز والخرق فتخلج شكير الاصصان
وتقع به اشد الاذى. لها جيلان في الحول. بيئاتها الشتوى
يحصل في الطور البيرى.

٢٣٣٨١ - كزّاة لامتنجالة

Xylébore disparate (F).
غضفاء مؤذية تدعى كزّاة الحراج، اطلها.

٢٣٣٨٢ - كرشيات *، سكوليتيات *

Scolytidae (S). Scolytidae (F). Scolytidae, Bark
beetles, Engraver beetles (E). Borkenkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجناسها وانواعها
عددية جميعها صغيرة القند. اجناسها اسطوانية: الزوايا
الى السواد ومشتقاته والجوزى والبنى والحلجى. قربتها
الاستشارية صغيرة، رفيقة او صرطانية. ارباغها اربابية.
تميش باكثرها تحت لحاء الانجرار وفي الشكير فتخلجه
وتعطيه ثم تفتح مكها الذي يتقف من رقات دقيقة تميش
على المواد الشتوية والسكرية التي يفرزها النبات.

٢٣٣٨٣ - كزّافى *

Sperme des oiseaux (F).
Sperm of the birds (E).
هو افراز الغدد التناسلية الالكترية عند الطير.

٢٣٣٨٤ - كزّاع

الكزاع من اللحم واليقر بمنزلة الوليف من القرب وهو
مستفك اللسان. قيل هو ما دون الكعب من البهائم. ج
اكرع واكرع وكرومان.

٢٣٣٨٥ - كزّام

Vigneron, Viticulteur (F).
Vine-dresser, Viticulturist (E).
من تعاملى زراعة الكرمة لاستثمار العنب.

٢٣٣٧٠ - كزّات تبطي *، بصل العفريت،
ثمور الفرق

Allium ampeloprasum (S). Ail d'Orient, A. à cheval,
Poireau sauvage, Pourrai, Pourriole (F). Blue-leek,
Vine-leek, Wild-leek (E). Perl Lauch, Wilder Lauch
(D). Porro salvatico, Porro bastardo (I).

نوع من الكزّات الببرى البجلول. اوراقه مستطيلة،
متضربة، شديدة الخضار. خضراؤه يملو من ٣٠
الى ٦٠ سم. ينتهى بنورة صيونية قلنسوية الشكل،
ازهارها الى البياض الاغبر.

٢٣٣٧١ - كزّات وردى *، قرط

Allium roseum (S). Ail rose (F). Rosy-flowered garlic
(E). Rosen Lauch (D). Porro piccolo (I).

نوع من الكزّات الببرى والزراعى المأكول. دوفسته يضيبة
الشكل سمراء اللون تحرقها فصوص غليظة صغيرة القند.
اوراقه مستطيلة محددة تعرض من ٥ الى ١٢ م. خضراؤه
الزهرى يملو نحو ٧٠ سم. ينتهى بنورة صيونية كروية،
ازهارها وردية اللون.

٢٣٣٧٢ - كزّاز

Menon (F).
ثيس أو كيش يقود القطيع.

٢٣٣٧٣ - كزّاسولا

Cassula (F).
هي الكركب، اطلها.

٢٣٣٧٤ - كزّاة الحراج *

Xylébore dispar, Anisandrus dispar (S). Xylébore
disparate (F). Shot hole borer (E). Ungleich, Holzbohrer
(D).

حشرة من الكرشيات. ثوبها الى السمرة السوية. الذكر
اصفر قدماً من الاثني التي يراوح طولها من ٣ الى ٤ م.
تركب الانجرار الخرجية على اختلاف فصائلها واجناسها
ولا تنف من الدراق والمشمش والجوز. تتخلج للشكير
وتسرده على حدود الخشب حيث تتجمع المكن.

٢٣٣٧٥ - كزّاة الخوخ *، سكوليت الخوخ

Scolytus pruni (S). Scolyte du prunier, Grand scolyte
des arbres fruitiers (F).

حشرة من الكرشيات طولها نحو ٥ م. رأسها وكولها
وصدرها الى السواد اللامع، غمداء ويطها الى البني
الزاهى. تركيب الخوخ وصائر الانجرار المثمرة فتخلج
الشكير في السوق والاصصان. لها جيلان في الحول.
بيئاتها يتم في الطور البيرى.

٢٣٣٧٦ - كزّاة اللوز *، سكوليت اللوز

Scolytus amygdali (S). Scolyte de l'amandier (F).
حشرة من الكرشيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. ثوبها
كستاني اللون سطلي المالح. تركيب معظم الانجرار
الورزية اغصها اللوز فتخلج الشكير وتعطيه.

٢٣٣٧٧ - كزّاة المشمش *

Xylébore saxeus, X. xylographus (S). Xylébore
de l'abricotier, X. xylographe (F). Flat-celled shot
borer (E). Borkenkäfer, Kleiner Holzbohrer (D).

حشرة من الكرشيات جسمها اسطوانى الشكل، قصير القند،
يطول نحو ٢ م. ثوبها الى الحنطى المالح || تركيب
اغصان المشمش فتخلج الشكير وتعطيه.

٢٣٣٩٤ - كَرْبَس *
Porcellio scaber (S).
Porcellion (F). Porcellio (E).

دودية من القشريات مساويات الأرجل من فصيلة
الظفرليات مملوكة في معظم مناطق البلاد الحارة والمتعددة
الحارة || جسمها قليل الصلابة ، صغير اللدغ ، سمكي
التركيب ، يطول نحو ٨ سم. عند الذكر ونحو ١٤ سم.
عند الانثى. رأسها صغير الحجم ، متكئا قارض ،
قربها الاستشعارية أربعة ، جرابها صلبة ، تخرجها
بفتحة ياربع زوائد لامتناهية القد. ثوبا الى الطلحة
والقاصية الملوحة. مدها اغير || تألف الموالع الرطبة
وي ملة بطيئة الحركة تسمى جهود وتتكور عند الشعور
بالخطر || تسرح في الليل وينبت في النهار. قربها المواد
النضوية المنحلة وبعض اوراق البقول وسوقها وصالحها
ويطورها .

٢٣٣٩٥ - كَرْبُورُوت
Grape-fruit
هو ليون الجنة ، اطلبه .

٢٣٣٩٦ - كَرْبَل
هو الشش ، نوع من الاسماك ، اطلبه .

٢٣٣٩٧ - كَرْبَل *
Kalmia (S).
Kalmie (F). Calico-bush (E). Kalmie (D). Calmia (I).
جلس نباتات معمرة من فصيلة الخلنجيات ، انواعه عديدة
جميعها سامة الوراق والازهار. منها الاربية الربلية. منها
الاجبار والاشجار والجنات والاعشاب. معظمها بري
وبعضها زرعى. اوراقها كاملة ابيدة لا قياسية النظام
الدوري. ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز ، خاسية
البتلات الثنائية الفصن ، عشارية الاسدية ، جميلة الشكل ،
مختلطة الالوان || اشهر انواعها ما يلي .

٢٣٣٩٨ - كَرْبَل بَحْرِي الْوَرَق
Kalmia polifolia, K. glauca (S). Kalmie glauque (F).
نوع من الكربل وهو بجملة سبروتية معمرة تملو من ٥٠ الى
٧٠ سم. ساقها فراء فرونها فضلة. اوراقها متقابلة
سنائية الشكل ، نصلها يطول نحو ٥ سم. ويعرض نحو ١ سم.
صفحة السفلى خالية البشرة بيضاء اللون ، صفحة العليا
الى الخضار البحري. ازهارها حلقية التجميع ، حسانية
الارتكاز ، وردية اللون ، ليلكية المواج || ازهارها يستمر
من نيسان الى ايار .

٢٣٣٩٩ - كَرْبَل زَهْبِي الْوَرَق
Kalmia hirsuta (S). Kalmie velue (F).
نوع من الكربل وهو عشية سبروتية معمرة ، شكلها شكل
الصنوبر. ساقها ليفية فراء تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها
متقابلة لاطئة صلبة اللدغ. نصلها يطول نحو ١٠ سم.
ويعرض من ١ الى ٣ سم. وهو خلى البشرة على صفحته .
ازهارها ابطية ، فردية ، حواء اللون || ازهارها يستمر
من ايار الى حزيران .

٢٣٤٠٠ - كَرْبَل صَفِيح الْوَرَق
Kalmia angustifolia (S). Kalmie à feuilles étroites (F).
نوع من الكربل وهو بجملة سبروتية معمرة تملو من ٦٠
الى ١٠٠ سم. ساقها خشوية فراء. اوراقها متقابلة
منقطة تملو نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهارها عديدة
التجميع ، تاجية الارتكاز ، وردية اللون || ازهارها يستمر
طوال شهر حزيران .

٢٣٣٩٦ - كَرْوَايَا * ، كَرْوَايَا ، كَمْوَن لَوْحِي
Carum carvi (S). Carvi, Cumín des prés, Kummel
(F). Common caraway (E). Echter Kümmel, Kümmel
(D). Carvi, Comino tedesco, Kümmel (I).
نبات من الاناثوية وهي عشية حولية من فصيلة الحميات.
منها المروج والراعي الجبلية وزرع بكثرة. جميع اجزاء
النبات طرية من الجلود الى الازهار والبرور وهي
تستعمل استعمالا وتدخل في تغذية الاجبان وصار
المأكلا || بزورها حافظة تقطع الشهية وتكدر العاط
وتنشط العصائر للمعدة وتفتح الشهية وحسن الطعم
وتعمل التليق وتطرد الرياح وتلد البرل. غير ان الاكثار
من استعمالها يفسد بالكل || ويستخرج من بزورها
زيت طيار فاخر الصنف ذكي العرف .

٢٣٣٩٧ - كَرْب
اصول الصف لقتلاذ الفراش التي تقطع معها . الوحدة
كربة .

٢٣٣٩٨ - كَرْبَا ، رَهْم
Emblaver (F).
سرح الارض ومعدا وبذرها .
To sow with wheat (E).

٢٣٣٩٩ - كَرْبَايَا
Entelurus (S).
Entelure (F). Entelurus (E).

جلس إسماعل بحرية من عصيليات الخياشم وفصيلة زمارات
البحر . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بعض مناطق
البحر الابيض المتوسط . جميعها دقيقة الاجسام المستطيلة .
الاولها تراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ورقوها شديدة الاعظام
الحافرية الأطراف .

٢٣٣٩٠ - كَرْبَايَايَا
Flagellariaceae (S).
Flagellariacées (F). Flagellariaceae (E).
فصيلة نباتية من سبديات الفلقة قريبة الشبه من الاسليات.
اشهر نباتاتها الكر بايية .

٢٣٣٩١ - كَرْبَايَايَا *
Flagellaria (S).
Flagellaire (F). Wild ratan (E). Wilder Ratang (D).
Flagellaria (I).
جلس نباتات سبوتية معمرة متسلقة من فصيلة
الكر باييات. انواعها عديدة مدها البلاد الحارة . تألف
النامق وضفاف الأنهار . اوراقها حاشية ، صلبة الشكل ،
مستطيلة . نصلها سميك الصلابة ، بحري اللون ، يلتصق
بجوانق حلزونية مزدوية .

٢٣٣٩٢ - كَرْبَا *
Carapa (S). Carapa.
Carapa, Bois de Crabe (F). Crab-wood tree, Carapa-
oil tree (E). Carapa-Baum, Crabbaum (D). Carapa (I).
جلس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة الازدوتيات ،
مدها البلاد الاستوائية . تنبت قرب الشواطئ وعل صفات
الاشجار . اشجارها كبيرة اللدغ دائمة يراوح ارتفاعها من
٢٠ الى ٣٠ م. ثمارها جراء ليفية التركيب تحسن بعض
البور المختلفة الاشكال والاسجام ، يستخرج من لبها
مادة دهنية مرة الطعم صفراء اللون يستعملونها في افريقية
لقاية من الحشرات لافيتون بها اجسادهم واعشاب منازلهم .
قد يستعمل دهن الكربة في صناعة الصابون . اما لحاء
الاشجار فليفية ويستخرج منها مادة مرة تستعمل استعمال
الكينا في مكافحة الحميات .

٢٣٣٩٣ - كَرْبَل
الكربز : الفتاه الكبار الطول .



كراويا



كرباية




كربة



كربس



كربل



رقم ٦

شبكة صفائح الكرة الأرضية وما يحفّ بها من أسرار عظيمة

للسطح الجوفية والبحرية.

عوليس بطاكية - أعرها حتى الآن الصدح الوسط -
الحالي الذي يمتد من رقم ١٠ إلى ٣٧.

الإشعاع الشمسي - المواقع المزعجة للشمس الناصي
نوع في الأرقام ١ و ١٧ و ٤١.

الانفجار الأتومي - يقارون، بعد الأتات الشمسي،
أن انفجاراً نووياً وقع تلقائياً منذ ١٧٠٠ مليون سنة في
حدود الرقم ٤٠. أما سبه فيعود إلى الأورانيوم ٢٣٥.

المعادن - مناجم المعادن تحتشد طوال الخطوط

النواتج الرهيبه - عشر مناطق، توزيعها حول الكرة
الأرضية متناسق الخطوط، تتميز بوابوها المدهشة.
يدخل في أطارها مثلك البرمود. للمناطق المشر تحصل
الأرقام ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٨، ٥٠، ٥٢، ٥٤، ٥٦، ٥٨، ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٦٦، ٦٨، ٧٠، ٧٢، ٧٤، ٧٦، ٧٨، ٨٠، ٨٢، ٨٤، ٨٦، ٨٨، ٩٠، ٩٢، ٩٤، ٩٦، ٩٨، ١٠٠.

البراكين - معظمها واشتد نشاطاً يقع على خطوط
التحام صفائح القلاف اليابس الذي يأتي مباشرة تحت
القلاف الجوي.

جوكات - مراكز المصيف محصورة في بعض عقد
الشبكة وقد ينجم عنها زلازل وأعاصير لا تقاسية
الفيض والسرعة تسير مع الخطوط كما هي الحال في

الشبكة للتفتية يتنوع الصفائح الكوردية. أما مناجم
النفط منذ التقاطع. والدليل على ذلك منجم
«ديومن» الذي ينفق كل حد.

تركيب قشرة - النقص المنصري في تركيب القشرة
يسبب بعض الشذوذ والقرابات في تطور النبات كما
هي الحال في القرنين ٢ و ٤ إذ أن ٧٥٪ من الأنواع
الجبرائية والنباتية لا توجد إلا في هاتين المنطقتين.
استحصا منطقة بحيرة بينكال.

توزيع الطير - أنواع الطيور القواطع التي تجوب البلاد
عديدة أشهرها تلك التي رجاعها محصور بمناطق معينة
لا تتخطاها وهي رقم ١٢ و ٢٠ و ٤١.

٢٣٤٠١ - كَرْبَلْ عَرِيشِ الْوَرَقْ ، غُكْرَ سَمَّ ،
لُورْة

Kalmia latifolia (S).
Kalmia à feuilles larges, *Laurier de montagne* (F).
Mountain laurel (E). *Breitblättrige Kalmia* (D).
Calmia a foglia larghe, *Lauro di montagna* (I).

نوع من الكربيل وهو شجرة جميلة الشكل تلو من ٧ إلى ١٢ م. أوراقها مقابلة أو خسية ثلاثية ، نصلها بطول نحو ١٣ سم. وعرص ٤ سم. أزهارها عذوقية للتجميع ثنائية الارتكاز عديدة الألوان التي تختلف مع الضروب || أنظرها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٣٤٠٢ - كَرْبَلْة
هي إنباء ، أطليه .٢٣٤٠٣ - كَرْبَلْة
المعالجة بالكربونيل وفي عملية تقوم على طلاء الأشياء الخشبية أو نغمها بالكربونيل لحفظها من التلف .٢٣٤٠٤ - كَرْبُون
نصم ثنائي أو هيدروجيني .٢٣٤٠٥ - كَرْبُونُوس
Pelodytes (S).
Pelodytes (F). *Parsley-frog* (E).

جنس ضفادع من فصيلة الحكسريات. أنواعه المعروفة قليلة العدد مهدا بعض اصناف العالم القديم || اجسامها صغيرة فقد تطل من ٤ إلى ٦ سم. عيونها كبيرة ناشرة. حدقات عيونها عذوقية الارتكاز . جلدها مبرمة التمثل والعتد || أنفها في المنطقة الخفراء تملوا زراكن متباعدة الإشكال تختلف مع اختلاف النوع || من ميزات هذا الجنس رائحة الثوم الخامسة التي تفوح منه واستمراره على التفرقة نحو تسعة أشهر من كل عام || أشهر أنواعه الكربون المشط .

٢٣٤٠٦ - كَرْبُونُوسُ مَشْطُوطٌ
Pelodytes punctatus (S). *Pelodytes punctus* (F).
Spotted Parsley-frog (E).

نوع من ضفادع الكربون وفصيلة الحكسريات . اصنامه تمتد من الشرق الأوسط إلى أطراف البلاد الاسبانية دين ان تيمارز الاقاليم المتدلة || جسمه صغير القد . الذكر يعطون من ٤ إلى ٥ سم. والانثى تطلون من ٦ إلى ٧ سم. رأسه متوسط الحجم . خطمه مستدير الطرف . صياحه كبرتان ناشدتان . حلقه صبي عذوقية الارتكاز . اصابع قوائم الخلفية قليلة الخطاطب الذي يكتنف قواعدها فقط . جلده مثالي البشرة . ظهروه مجزج بعض التمثل ولقد المتدلة الشوز تنفخ الماددة اللبوية الرائحة التي يتميز بها || فوه الى الحلة الخفراء تملوا نكت خضر عابقة || يعيش في المناطق وجاري الماء . يجمع نحو حشر سنوات . مسرعه دجوي يستمر من الدروب الى الفجر . قوته الحشرات والديدان || الانثى تقرأ خلال موسمها السنوي الذي يستمر نحو تسعة أشهر من ١٢٠٠ إلى ١٦٠٠ دجيلة ضمن حبال مستطيلة تلفها على بعض النباتات المائية . التف يثم بد التفرقة بنحو ثلاثة اصابع والبطايع عند اكتمال طورها البلوغ تطلون نحو ٦ سم.

٢٣٤٠٧ - كَرْبُونِيلُ حَنْطِي
هو الوضعة الخنطية ، أطليه .
Carpophila bruna (F).٢٣٤٠٨ - كَرْبُونِيلَاز
نوع من الأزيم الكثير الانتشار في معظم اعضاء النبات . نشاطه ينحصر بتأثيره في الحوافض .

٢٣٤٠٩ - كَرْبُونِيلْة

Corbula (S).
Corbula (F). *Corbula* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صليبيات الخياشيم وفصيلة القفاليات . أنواعها المعروفة عديدة نحو ٧٠ ، قسم منها أي نحو ٢٥ من متحجرات الاراضي الثائرة والثالثة ، اما الباقى فتنتشر في جميع بحار العالم || اصداؤها صميكة الصفحة ، بيضية اللون ، لامتنارية المصارع الفصيلة الاطراف .

٢٣٤١٠ - كَرْبُولِيَاظ
أزيم شاذة تربط في الخنط وفي الصفاح وفي بعض أوراق النبات . جودها يماكس جوده في الترميز .٢٣٤١١ - كَرْبُون
Carbone (F). *Carbon* (E).
جسم بسيط وزنه (ك-١٢) وزنه الاتومي ١٢.٠١ وهو من عناصر المركبات الضورية الاسمية ان نباتية او حيوانية . ونظراً لكثرة واهية هذه المركبات الكربونية فقد جعلوا الكيمياء الضورية لدراستها || والكربون لا ينحصر وهو قابل للاقتاد وحلل وبيد الاصلية الحرارية والكهرية || يوجد في الطبيعة على اشكال مختلفة اصحابها البلورة كالكلس والاسرب وغير البلورة كالكشم والساج .٢٣٤١٢ - كَرْبُونَات
ملح الحامض الكربوني .٢٣٤١٣ - كَرْبُونَاتُ الْبُوتَاسِيُوم
Carbonate de potassium (F). *Potassium carbonate* (E).
ملح ابيض سريع الذوبان في الماء يحوي من ٥٢ الى ٦٢ ٪ من البوتاس || يستعمل ككاشي بوتاسي .٢٣٤١٤ - كَرْبُونَاتُ الْكَلْسِيُوم ، كَرْبُونَاتُ الْكَلْس
Carbonate de calcium (F).
Calcium carbonate (E).

ملح الكلسيوم الطبيعي الذي يؤلف معظم الطبقة السطحية من الكرة الارضية .

٢٣٤١٥ - كَرْبُونِي
Carbonifère (F).
Carboniferous, *Coal-bearing* (E).

نمت تربوي يطلق على الصخور والاثارية التي تحوي بعض الكربون أو الفحم الحجري || ويطلق خاصة على الحقبة الرابعة من الاياج القديم وفي الطبقة الارضية التي ترتكز على التيفونية . راجع مادة حياة .

٢٣٤١٦ - كَرْبُونِيلُ
Carbonyla (F). *Carbonyls* (E).
مركب مضاد تنفخ يستعمل في صيانة الاخشاب .٢٣٤١٧ - كَرْبُونِيَاوَال
Carbohydraz
هو العسل الذي تقوم به الاريمات في مضافة الحلويد والمغروسيد .٢٣٤١٨ - كَرْبُونِيَّة
Couroupita (S).
Couroupe (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الآسيات . أنواعها المعروفة خمسة منها بعض اصناف امريكة الجنوبية اصحابها



كربون مشط



كربلة



كريته



كريس

٢٢٤١٩ - كُرْدَانَة

Corbis (S).
Corbis (F). Corbis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القرينيات ، أنواعه المعروفة عديدة منها المعاصرة ومنها النادرة المتحجرة التي تعود الى الحقبة السيلورية || اصدها شبه بيضيه الشكل متساكنة ، مخددة ، عابقة الاوران ، يكثر فيها الجلوري القاتم || اجسامها متوسطة الحجم او صغيرة ، ثنائية المشابح المستطيلة الطليقة || اعطائها معظم بحار العالم ، تعيش منفردة في الرمال المغورة بالماء المعتدل القور .

٢٢٤٢٠ - كُرْدَانَة

Sphère, Globe (F).
Sphere, Globe (E).

جسم مستدير الشكل يتميز بشدتي جميع خطوطه المستقيمة المحتة من المركز الى السطح . تؤخذ مساحة الكرة بضرب مربع قطرها بعدد ١٢,٥٦٦٤ ويؤخذ حجمها بضرب مكعب قطرها بعدد ٤,١٨٨٨ .

٢٢٤٢١ - كُرْدَانَة لُزْبِيَّة

Globe terrestre (F).
Terrestrial globe (E).

الكرة الارضية كوكب سيار من النظام الشمسي . (راجع ارض) || كيف تكونت وتي ؟ بحث يقودنا الى عدة نظريات لا مجال لدرسا جميعها ، انما نذكر اشيعها واقربها لطقن || عند حصول الانفجار السديمي ، اي منذ نحو ٧ مليارات سنة ، تكوّن الفرج الرقيق المعروف بالنظام الشمسي ، لانه يتألف من الشمس وكواكبها ومنها الكرة الارضية التي بعد ان دارت حول الشمس مليارات السنين أصبحت ما نعرف عنها الآن : ارض متباينة التضاريس والقشامة تطلوها مياه البحر ، حركة مستمرة لا يمكن ان تتوقف لان وقودها يعني الزواك . وحياة تنبت من كنه الخالق فتجسد وتتنو ثم تلوي وتندثر . (راجع تاريخ الكرة الارضية) || اما الخواطر الاربع المدرجة تباعا فاثباتين مدى التطورات المنظمة المذهلة التي حصلت عبر الازمنة السميكة الثابتة ، وما سيحصل في المستقبل البعيد بعد مرور ٤ او ٥٠ مليون سنة .

٢٢٤٢٢ - كُرْدَانَة الثلج

Boule de neige (F).

هي الاطلس الثلجي ، اطلبه .

٢٢٤٢٣ - كُرْدَانَة هَوَلِيَّة

Photosphère (F).
Photosphère (E).

سطح الشمس المضيء .

٢٢٤٢٤ - كُرْدَانَة اسود الرأس

Cartallum ebulinum (S). Cartallum à tête noire (F).
Cartallum ebulinum (E).

حشرة واشمة غاضلة من فصيلة القرينيات ورتبة ضفدعات الانجسة . تألف البراري والجزائرين . غناقصها تعيش حل بتلات الازهار واغصنها اثمار الصوليانيات . يرقاتها همة



كرد

تسردب لحاء وشكير جلوع النباتات البرية || جسمها صغير القند يطول من ٨ الى ١٢ سم . رأسها وكسليها وبطنها وجرانها الى السواد الاسفع . ظهورها الى انفسار الازرق المواج . صيدها كيرتات جاحظتان ، زباناها دقيقان مستطيلون || غاظرها مقطوم الطرف اللاسف . غدها متباعدتا التخديد . ارسافها رباعية العغل الظاهرة || الاثن اثن قفأ من الذكر واغصم بطأ منه واغصم زبانا || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجملانية في نيسان وتميش حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار || البرقة عند ادراكها الكيال الجسوري تطول نحو ١٨ سم . جسمها مستطيل المقدم والرأس ، مستدق المؤخر ، قليل الملب المبيشر . ثوبا الى الخلفي الاسمر . رأسها وشرجها الى السمرة السوداء .

٢٣٤٢٥ - كُرْدَانَة

Karat

هي الطليقة الطليانية السطحية كُرْدَانَة فيها الإمات والكتل الاقنيسية الارتكاز والاجرام .

٢٣٤٢٦ - كُرْدَانَة

Corrigiola (S).
Corrigiolo (F). Corrigiola (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة التوبانيات . انواعها المعروفة ستة منها الشرق الادنى واروية وبعض مناطق افريقية وامريكة الجنوبية || سوقها تحيلة . اوراقها لحمية مستطيلة . ازهارها حامي ضمي التجميع . ازهارها صغيرة خماسية البتلات والاسدية ، تبينة اللون . تنويرها ربيعي . اعرف انواعها واشهرها كُرْدَانَة السواحل .

٢٣٤٢٧ - كُرْدَانَة السواحل

Corrigiola littoralis (S). Corrigiolo du littoral (F).
نوع من الكورجولة . طوية في بعض مناطق الساحل اللياني ونها ضوحي يبروت || ساقها تحيلة مستطيلة . اوراقها رحيمة الشكل ، مستطيلة التصلال . ازهارها حامي . ازهارها الى الصفار الباهت . تنويرها ربيعي .

٢٣٤٢٨ - كُرْدَانَة

Base du cou (F).
Basis of the neck (E).

هو اصل العنق ارقادة ارتكازة .
Ferme, Métairie (F).
Farm, Lease, Land (E).

٢٣٤٢٩ - كُرْدَانَة

المخارة من المزارع . ج . كرف .

٢٣٤٣٠ - كُرْدَانَة ، عشبة السبع ، دَلْسَة

قائمة

Daphne tataronraia, Thymelaea tataronraia (S).
Daphné tataronraie, Tartaronraie, Herbe terrible (F). Silver leaved daphne (E). Tartaronraie (D). Laureola bianca, Salamandra (I).
نوع من الدفنة البرية السامة منهاها المواقع الكنسية الرطبة . شكلها يشبه الخلعج . ساقها فراء تمل نحو ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ضيقة ، نصلها جامد الصلصة ، باحت انفسار . ازهارها سبيلة التجميع ، هامة الارتكاز ، صغيرة القند ، يبيضه اللون .

٢٣٤٣١ - كُرْدَانَة

Cordana (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات . جربه الكندية اسطوانية قصيرة تعلوها كنانة صرلانية ضمية التجميع قنالية الخلية || انواعه قليلة العدد والاذى ، اعرفها كردانة الموز .



كردانة الموز



كردون



كردلس



كردلة



كردوم

٢٣٤٤٠ - كُرْدَهَان الْفَب

Codonopsis silvestris (S). *Codonopsiside des bols* (F).
نوع من الكردان. ساقه فرواه متسلقة متلغو نحو ١٥ سم. اوراقه متفكة قليلة الشكل، نصلها مبسر الزغب الجامد. ازهاره لا قياسية الايزكاز، كثيرة العدد، صفيرة اللد، فستقية اللون || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٣٤٤١ - كُرْدَهَان بَيْضِي الْوَرَق

Codonopsis ovata (S). *Codonopsiside à feuilles ovales* (F).
نوع من الكردان. ساقه متسلقة متلغو نحو ٨ سم. فرووها متفائلة قليلة الاستطالة. اوراقه بيضيه الشكل، خلية البشرة، طولها من ٢ الى ٣ سم. ازهارها طول نحو ٣ سم. لونها الى الزرقه الباهتة يملؤها توشيم عابق || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٢٣٤٤٢ - كُرْدَهَان مَرَحَانِي

Codonopsis dematidea (S). *Codonopsiside à dematide* (F).
نوع من الكردان. ساقه متسلقة متلغو نحو ١٢ سم. فرووها لا قياسية الايزكاز. اوراقه متفكة كاملة، السفل منها متفائلة والبليا متفائلة، نصلها خلية البشرة، بيضيه الصفحة اللينة عند زاهها الاخير. ازهاره طرفية الايزكاز، بيضاء اللون، مفضلة بالازرق || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٣٤٤٣ - كُرْدُونُس

Epiphyse (F). *Epiphysis* (E).
٢٣٤٤٤ - كُرْدُونْلَه *
Cordylura (S). *Cordylure* (F). *Cordylura* (E).
جنس حشرات قاتصة من فصيلة الطليحيات روية ذوات الجناحين. انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها هيفاء، طولها من ٨ الى ١٢ سم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة. حيوها ناشزة، متبادعة عند الشقين. قرونها الاستشعارية شديدة القصير، تنتهي بنسيلة دقيقة. اعطالها ضليمة، ملاسها صغيرة. بطونها صفية الشكل. كواسلها ويطونها ورؤوسها وقوائمها متكاثفة الحلب. رواشها ضيقة، ملونة. قوائمها نشطة || الحشرة الجمالانة قاتصة، البرقة قلابة واجبة.

٢٣٤٤٥ - كُرْدُونُم

Cardium (S). *Cardium, Bucarde* (F). *Cardium* (E).
جنس حيوانات نهريه وقماية من الرخويات صفيحيات اغنيائهم وفصيلة الكردوبيات. انواعها المعروفة كثيرة العدد معظمها نهري وبضها قماي يمش في مياه الاغوار || اصداها شبه قليلة الشكل، متساوية المصارع. اصداها ماسية او مخرطة او مفصلة. جميعها محززة ملونة عادية الاغشية. مفصلاتها رباعية الاسنان. مطاها ثنائية طليقة || تمش نشطة في الاسماك والبرمال.

٢٣٤٤٦ - كُرْدُونِيَّات

Cardilidae (S). *Cardilidae* (F). *Cardilidae* (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الاغنيائهم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منها البرية التي تمش في المياه العذبة ومنها البحرية ومنها القماية التي تمش عند مصبات الانهر || اصداها متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل القلبي. مصاريها متساوية الغلق

٢٣٤٤٧ - كُرْدَانَةُ الموز *

Cordana musse (S).
فطر مجهري يركب اوراق الموز فيؤذيها بغض النمل. مظهره الخارجى زلفه عديمة الشكل تركب النمل حل صفحته البليا. يهد سره، الاون ثم تنسرف الى الخلفي يحيطها حصار اشهب قائم || اخرها زهيدة لا تنسفي العنانية.

٢٣٤٤٨ - كُرْدَه

Kruberia (S). *Krubere* (F).
جنس نباتات شبيهة بيرة حولية من فصيلة انجسيات. انواعها المعروفة عديدة منها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. سوقها مستضخمة، غضة، لمساها الماء، فرواه، اوراقها محززة، متباينة التفصيل الريشي. ازهارها صيواني التجميع، طرفي الايزكاز، لاستساوي الاشمة عدد وطولها. ازهارها صفيرة، يضاء اللون او صفراء او ارجوانية || تنويرها ربيعي.

٢٣٤٤٩ - كُرْدُون *

Cordulia
جنس حشرات من فصيلة البسويات، انواعها المعروفة قليلة جميعها مفترسة تغذي على الحوام. طول اجسامها يراوح من ٤٨ الى ٥٠ سم. بسطة اجنتها يراوح من ٦٠ الى ٦٤ سم. ألونها الى الخضار الزرق. اناتها اصبق لونها من ذكورها.

٢٣٤٥٠ - كُرْدَالِيَس *

Corydalis (S). *Corydalis* (F). *Corydalis* (E).
جنس حشرات من فصيلة الكردوليسيات روية سادات الاجنحة. انواعها المعروفة عديدة موطنها الاقطار الامريكية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها غليظة، متسدلة التلطيط. حيوها صغيرة. قرونها الاستشعارية خيطية. تتميز بتأثيرها المستطيلة خاصة عند الذكور. اجنتها غشائية، شبه متساوية. ألونها تراوح من السمرة الى الكهبة || يرقاتها مفترسة تمش كليل طولها الكربي في الماء.

٢٣٤٥١ - كُرْدَالِيَسِيَّات *

Corydalidae (S). *Corydalidae* (F). *Corydalidae* (E).
فصيلة حشرات من روية سادات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، منتشرة في معظم اقطار البلاد الامريكية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل. رؤوسها مستطيلة يكثر فيها التلطيط. قرونها الاستشعارية خيطية. حيوها صغيرة جانبسية. اجنتها غشائية || مسرها دجوي. يرقاتها مائية مفترسة.

٢٣٤٥٢ - كُرْدُون

Cordylina (F).
هو القلب، جنس نباتات زنبقية، اطليه.

٢٣٤٥٣ - كُرْدَمَانَة

Garou (F).
نوع من الفئفة، اطلب مثان.

٢٣٤٥٤ - كُرْدَهَان

Codonopsis (S). *Codonopsiside* (F).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى يشبه الجرس. جنس نباتات حشوية مدمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها عديدة مظهرها بري وبضها تريبي. اعطالها بلاد الشرق. جنورها طية. سوقها متسلقة متفائلة او ملفة. اوراقها لا قياسية الشكل والايزكاز يندب فيها التقابل. نصلها محززة اللون. ازهارها جريسية متدلية || اشهر انواعها ما يتبع.

Cerasus (S).

Cerisier (F). Cherry tree (E).

جلس اشجار برية وزراعية شجرة من فصيلة الوردية .
انواعه وفروبه كثيرة العدد تحفظ باحجامها ومياكلها
وارتكاز اغصانها ونشر ثمارها واشكالها . ورق هذا النبات
في الاصم الجسورية فالصفات الشجرية الجنية
الرئيسية واحدة : جلور خمودية ثم حزية ، سوق مستقيمة ،
علاء ملساء ، غشب جلوي اللون ، اوراق متدقة ، مسنة
الحافة ، ناصفا بيضية الشكل او رمية . ازهار نوري
التجميع يضل من ٢ الى ١٢ زهرة . ازهار بيض ، خاسية
البتلات ، صديدة الاسدية . ثمار خسية ، مستطيلة الاذن ،
كروية الشكل ، ملساء القشور اللامعة ، لذيذة للهاب
النسم ، مستديرة البزور الصلبة || وهو من الاشجار
التي تألف المناطق الباردة في الاقاليم المعتدلة لكنه ينشئ
المواقع الممرضة قريبا من الحوض لانها تسبب اغلاص الازهار .
يوجد في جميع الارربة من القفيرة بالمولد اللذان الى الخمية
ومن الرولية الى الطنية غير انه لا يتصلل الارربة الشديدة
الانجماد ، المستحكة الرطوبة . وهو يتكاثر بالبزور
والنقلات وبالزقيد والتغصم . امنع واجود مطعاه المقلب
والبري والشرية وسناروشيه .

Cerasus avium (S).

Cerisier des oiseaux, C. des bois, Mériel (F). Gean
cherry, Hedge-berry, Sour-cherry (E). Süsskirsche
(D). Ciliegio visciolo, Cilegolo (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر . اليه ينسب أكثر واشهر
الفرروب الموصوفة المروفة ، اشجاره كبيرة اللد تملو من
١٥ الى ٢٠ م . سوقها واغصانها منقصة ، ثمارها مستديرة ،
كروية ، صغيرة ، سكرية الطعم ، مستحبة المذاق ،
لذيذة النكهة .

Cerise des Juifs (F).

هو الحبة الكاكنجية ، اطلها .

٢٣٤٥٥ - كَرَزْ غَادِي * كَرَزْ حَامَضُ

Cerasus vulgaris (S). Cerisier acide, Griotier, Bi-
garreaulier (F). Cherry tree (E). Sauerkirsch, Sauer-
kirschen (D). Ciliegio agerotto, Cileglio (I).

نوع من الكرز الزراعي المشر المديد الفرروب . ساقه
منقصة تملو من ٦ الى ١٢ م . اغصانها منفرجة مسترسلة .
ثمار كروية ، قليلة الحسة ، خيرة الماددة ، لذيذة الطعم ،
بينه الحفصة التي تتفاوت نسبها مع الفرروب وقد تكون
حامزة في الفرروب المروفة بالوشنة .

Cerasus padus (S).

Cerisier à grappes, Putier, Putlet (F). Bird-cherry,
Hach-berry, Hog-cherry (E). Gemeine Trauben-
kirsch (D). Pado, Ciliegio a grappolo (I).

نوع من الكرز البري المشر . ثماره صغيرة اللد ، عشقودية
التجميع ، حامزة الطعم مأكولة . منيته الاغصان والجبال
الصخرية . شجيرة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م . اغصانها
مسترسلة متدلية . اوراقها اعليجية ذرية مسنة الحافة .

٢٣٤٥٧ - كَرَزْ غَارِي * كَرَزْ الْغَارِ

Prunus lauro-cerasus (S). Laurier-cerise (F). Cherry
laural (E). Larbeerkirsche (D). Lauro ceraso, l.
mandorlo (I).

جلس نباتات برية وزرعية من فصيلة الورديات . انواعه
قليلة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنيات . سوقها

المفصلة والمنسنة الاطراف المنفرجة . جميعها ثنائية المذهب
الطليقة || احرف اجناسها واشهرها الكردوم .

Cardica (S).

Cardite (F). Cardica (E).

جلس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم
وفصيلة الكرديتيات . انواعها المروفة كثيرة العدد منتشرة
في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اصداها
شبه قلبية الشكل ، مسنة التعقيد . مباحية ثنائية ،
طليقة || تمش لاسقة بالسفون المدمورة القليلة اللور .
ليتها غزير الماددة اللشيلة .

Carditidae (S).

Carditidae (F). Carditidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشم .
اجناسها وانواعها صديدة . المعاصرة منها منتشرة في جميع
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اما القائرة فن
متحصرات الاثربة الديقوية || اصداها شبه قلبية الشكل ،
مدبية اللدن . خياشيمها لاسارية اللد ، حلطية الرباط .
ومصاديها متساوية ، منفرجة الاطراف || احرف اجناسها
واشهرها الكرديت .

Cardinalis (S).

Cardinal (F). Cardinal (E).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المروفة اربعة
موطنها بعض مناطق امريكا الشمالية والوسطى . يألف
الغابات . فوسه يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجا || اجناسها
صغيرة اللد . رؤوسها منوعة بفتازع شتائية الاحجام .
اثوابها حلوة يكثر فيها الاحمر والجلوي . تتميز بمناقيدها
الشبه غرولية الشكل القصيرة والفصلية . اذنانها مستطيلة ،
مقمرة الاطراف او مستديرتها || طيراتها خفيفة الحركة ،
معتدل الشوط ، كثير التصنيع والتبسيط . تتنقل على الارض
مخففة وحل الاغصان برشاقة || فونها ثمار التنية والبنور
واغبارها لا تصف عن ثمار الفاكهة والحلوب واللدة ||
اشهر انواعه كريدنال فيرجينية .

٢٣٤٥٠ - كَرَزْ بِنَالْ فِيرجينِيَّة

Cardinalis virginianus (S). Cardinal de virginie (F).
Cardinal tanager (E).

طائر من الكريدنال . موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية
اغصانها فيرجينية . يألف الغابات ويحب البلاد باستمرار
الا في زين الترميم . فوسه يعد من ٢٠ الى ٤٠ زوجا ||
جسمه صغير اللد . ريع القامة ، يطول نحو ٢٢ سم . بما
فيه الذنب الذي يطول نحو ١١ سم . ثوبه الى الحمرة
القرمزية تبت في الظهر وتعين في الجناحين والذنب .
جبهة الى الجولة وكشته كلك . زوره اسود . حلقه عينه
باقوية اللون يطوقها حنار جلوي || طيرانه خفيف
الحركة ، سريعها ، معتدل الشوط || يطن عشه في
الادغال مري الاشجار القليلة الارتفاع الملتفة الانداد
والاننان . الاثني تقص من ٤ الى ٦ فضات تحضنها وسعها
نحو ١٣ يوما بينا الذكر يوطن لها الغذاء .

Cône, Strobile (F).

Cone, Pine-cone, Strobile (E).

ثمرة اشجار الفصيلة السنورية وفيها من الثمار المخروطية
او المخروطية الشكل .



كرديت



كريدنال فيرجينية



كرز



كرز الطير



كرز حادي



كرز عشقودي

٢٣٤٥١ - كَرَزْ

٢٣٤٦٣ - كَرْسُوفَة ذَرِيْعَة

Botryodiplodia tubericola (S). Java black-rot (E).
نظر مجهرى يتطفل على ذرات البطاطا الملوة ليطفئها .
مظهره الخارصي احتلال يصيب الثياب والقشور قدسمر
وتسود وتسلخ ثم تتفتن ويملأ الففن || علاجه الرشيد
يقوم باجتناث الزواحة في المواقف الرطبة وفي الأثرية
المؤيدة مع تلكاكة بضرورة تطهير البارد قبل الزرع .

٢٣٤٦٤ - كَرْسُوف ، كَرْسُوف
Coton (F).
هو القطن ، اطبله .



كرز غاري

٢٣٤٦٥ - كَرْسُوفِيَّة ، عَنَقَلَال
Gnaphale (F).
جنس لبائات برية طلية من فصيلة المركبات . أنواعها
عديدة منها المشبية الحولية والخشبية المعمرة . سورها وأوراقها
زباء ، زغبها أبيض اللون . أوراقها متعاقبة لاطقة كاملة
صغيرة للقد ستانية التصل . أزهارها وريسات طرفية .
منظم أنواعها طبي يستعمل ضد السعال ويضع للصدر .
أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .



كرسفية جبلية

٢٣٤٦٦ - كَرْسُوفِيَّة جَبَلِيَّة * ، عَنَقَلَال جَبَلِي
Gnaphalium leontopodium (S). Gnaphale pied-de-lion (F). Lion's paw cudweed, Everlasting (E). Ruhrkraut, Ruhrpflanze (D). Canapicchia, immortali (I).
نوع من الكرسفية البرية الطلية منها الجبال العالية ،
زغبها لبد أغبر اللون . أزهارها ليلكية . تنيد السعال .

٢٣٤٦٧ - كَرْسُوفِيَّة حَمْرَاء * ، عَنَقَلَال أَحْمَر

Gnaphallium sanguineum (S). دم القَرَّال
Gnaphale rouge (F). Red cudweed (E). Roter Ruhrkraut (D). Canapicchia rosea (I).
نوع من الكرسفية البرية الطلية الحولية . تنيد في الأراضي
للحسان من ارتفاع ٤٠٠ م إلى ١٢٠٠ م . سطح البحر .
زغبها أبيض اللون برآق . أزهارها لال حمراء الجفيلة . تغيد
السعال والصدر .



كرسفية حمراء

٢٣٤٦٨ - كَرْسُوفِيَّة *

Ervum ervilia, *Vicia ervilia* (S). Ers, Ervillier, Lantille ervillière, Vesce noire, Faux orobe (F). Ers, Ervil, Bitter vetch (E). Stachelwicke (D). Ervo, Fragellini, Girlo, Lero, Moco, Vaggiolo (I).

نبات عشبي حولي علني من فصيلة البقوليات، يزرع لمحبه
رثته . وهو يعطي معلقاً للبهائم اعصها البقر والقمم إلا أن
كثرتته مستحقة لذلك يحسن الثروي في استعماله || جلونه
سطحية متعقبة الانشباب . ساقه عذوزة قليلة الأفرع
تقلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، شامية ،
مؤلفة من ١٠ أو ١٢ أو ١٤ زوجاً من الأوراق
الامتقابلة ، فصلها يبيح الشكل ، أسن السطح .
أزهاره صغيرة اللد ، بنفسجية اللون سطحية الزناد . ثماره
سنت صفار وكل سفة تحسن من حبيتين إلى ثلاث حبات
صغيرة القدر لا قياسية الشكل لونها في السرة البنية .
زراعتها بعلية وهو يحمده بعد الحطة أو الشمر . من جميع
الأثرية الخلفية والمتوسطة الانتاج ولا يخشى سوى المواقف
الرطبة || ينادر عاده في الكواكن لزوم الدثم رباح
من ١٠ إلى ١٢ كيلو .



كرسفة

٢٣٤٦٩ - كَرْسُوفِيَّات ، هي البقوليات ، اطبلها .

٢٣٤٧٠ - كَرْسُوعِي
Gréaire (F).
Gregarious (E).
صفة النبات الذي يعيش ويكثر سباعياً متجانساً .

منصبة ، أوراقها أبيدة ، اطليجية ، ستانية ؛ فصلها
جمادى الصلحة ، مشاربي الحافة . أزهارها عذوزية التجميع
ثمارها صغيرة اللد زيتونية الشكل ذربة اللب ، لونها إلى
الحمرة أو السوداء .

٢٣٤٥٨ - كَرْزَة
Cerise, Gulgne (F).
Cherry, Sweet cherry, Heart cherry (E).

هي ثمرة الكرز ، اشكالها وألوانها عديدة جميعها مستحبة
العلم المركب . لباب سورها يحوي نحو :

من الماء	٨٠,١٠٠ ٪
من المواد السكرية	١١,٩٠٠ ٪
من المواد الاستخلاصية	٣,٨٥٠ ٪
من المواد الأزوتية	٣,٢٥٠ ٪
من المواد الدهنية	٢,٢٥٠ ٪
من السليولر	٢,٥٢٠ ٪
من الرماد	٤,٤٢٠ ٪

وهو يحوي أيضاً بعض الحماض الضوية اعصها الحامض
التفاسي وما لا يستأن به من العناصر المعدنية كالبرناس
والفسفور والفلينزيرم والكبريت والكلسيوم والصوديوم
والحديد والنحاس واليود ... الخصف إلى ذلك نحو ١٥ ٪
من الفيتامين «د» وما لا يقل عن ٥٠٠ وحدة من الفيتامين
«أ» .

٢٣٤٥٩ - كَرْزِي
Bacciforme (F).
Bacciform, Berry-shaped (E).

ما كان شكله حبة العنب أو الكرز .

٢٣٤٦٠ - كَرْسُوف ، صَاغُورَة ، مَرَاك
Chèrreria (F). Goat-pan (E).

ملأى المازن المني المسقوف . والكرس هو ما تنيد من
البر والابل . ج . اكراس ومرج ويوصي .

٢٣٤٦١ - كَرْسُوفَة *

Botryodiplodia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يكتنداته
ضمية كثيفة تجمعها ونيسة غليظة شارة . بويقاته خطية
اللون ثنائية الخلية || أنواعه المؤذية قليلة ، يكثر وجودها
في البلاد الحارة ، أعرفها ما يتبع .

٢٣٤٦٢ - كَرْسُوفَة الكَاكَاو *

Botryodiplodia theobromae, *Lasiodiplodia theobromae* (S).

فطر مجهرى يصيب عدة نباتات مختلفة الفصائل اعصها
الككاو والفاي وابن الحماط والقطن والموز || هو على
الككاو أكلة تنثر الجذور فتدبل الأوراق بعد أن تمتلئ
السنخ يحمض من العفن الاسود وبد أن توشع لواء الساق
بعض أبقع المنخفضة السمراء اللون || وهو على الموز
عفن يركب قلب الأزوية ليلونها || يصيب الطرح فيوش
الأثار يبقع قفطرها وحققها نحو ٨ م . لونها إلى الأخضر
الزيتوني || وهو على الحماط ذبول على بقعة الصغيرة يبقع
سمراء واسوداد في لواء الساق || ويصيب الشاي وابن
فيلال اللتان والأنداد ويلونها || وهو في القطن يمس
يركب الغلظة فينصها من النسو بعد أن يركم ثيلها ويتجيب
يشجبه الاسود || يكافح بالتصاق وسرق الأضواء المؤيدة ،
بتطهير المروج ، وباستعمال أحد الفوطير الفسالة أما
نفساً على النبات أو تدفيراً على الأثرية والنباتات .

قصيرة وغلظة ، جلورها عمودية . أوراقها لاطفة متناهية مركبة . السفل منها قرصية الانشعاب مستطيلة الاعناق الفصليّة ، اما العليا فتباعدة وكثيرة التفريش . أزهارها صيوانية التجميع ، لونها ال ابيض الاصفر || وهي من النباتات الطبية تدر البول وتفتت الصدر وتحلل الورم وتفتح الحصى || تنكأثر بالزهر وترغب في الازرية الدالية الحصى .

* كُرْسِي الجَبَل * ٢٣٤٨٢

Athamanta oreoselinum, Petroselinum oreoselinum (S). Ache de montagne (F). Moutain parsley (E). Augen Wurz (D). Appio di montana (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الخيميات ، منبته الجبال الريفية . ساقه مغطىة بتعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقه مستطيلة الاعناق كثيرة التفريش والتفريش . أزهاره صيوانية التجميع صلبة القذ وريدة اللون .

* كُرْسِي الماء * ٢٣٤٨٣

Stum latifolium (S). Ache aquatique, A. d'eau, Berle (F). Water parsnip, Water parsley (E). Breiter Merk, Wasser Peterlein (D). Erba crociana, Sedano d'acqua (I).

ومن اسمائه أَس النّس وبرجبر الماء وهو نبات عشبي طبي معمر ، من فصيلة الخيميات ، يتكاثر في المنابع والأراضي الرطبة . أوراقه جلورها مضادة الحفر وريدة اللون . بذوره منفصلة كالحول وهي مهيبة لقوة الجسيمة وقد تكون شابة نظراً لما تحواه من النّسور والكلسيوم . وإذا رعت الماشية من غم وباعز ويقر كرها وبجاد صفه .

* كُرْسِي بَرِّي * ٢٣٤٨٤

Smyrniolus olusatrum (S). Maceron, Mac. potager, Ache large, Gros persil (F). Alexander's, Horse parsley, Wild celery (E). Gespenstgelbdoles, Smyrnerkraut (D). Macerone, Olusatro, Smirino (I).

نبات عشبي بري يغلي من فصيلة الخيميات . ينبت في معظم الاسواق المتحلة الحارة . قريب الشبه من البقدونس والكرفس ، أوراقه مأكلة مستحبة العرف والطعم .

* كُرْسِي رُؤْيِي * ٢٣٤٨٥

Persil (F). هو البقدونس ، اطليه .

* كُرْسِي لَفْيِي * ٢٣٤٨٦

Apium graveolens rapaceum (S). Céleri-rave, Céleri navet (F). Turnip rooted celery, Céleriace (E). Kohl-rabistelleri, Selleriak, Knoll-Sellerie (D). Sedano rapa (I).

شرب من الكرفس يزرع جلورها وأوراقه المأكولة . وهو نبات محلي يندر في الأكلاد ثم ينتقل الى مستقره . يرغب في الازرية الطوارة الحصى .

* كُرْسِي * ٢٣٤٨٧

Auchenoglossis (S). قال الفريق أمين الملويف : « الكرفس أو شال كرفس ، ملك سلوري ذكر منه بولنجه نوعين في التيل » .

* كُرْسِي كُرْزُول * ٢٣٤٨٨

Carvacrol سائل زيتي حاد اللون يتخلط من حطور الشفويات والسميويات ، انحصا حطور العصير والودنج والندج . ثقله النسبي عند ١٠°مغ = ٠.٩٨٥٦ . وهو يغلي عند ٢٢٦°مغ .

٢٣٤٧١ - كُرْسِي الجَزَاء

كربي الاجزاء مجسدة كواكب بالقرب من الجوزاء .

٢٣٤٧٢ - كُرْسِي

Souchet à nattes (F). هو سد الحصر ، اطليه .

٢٣٤٧٣ - كُرْسِي

Panse, Rumen (F). Bally, Paunch, Rumen (E). اكبر اقسام معدة الخيترات تتصل بالمريء وتشفل ثلاثة ارباع الجوف .

٢٣٤٧٤ - كُرْسِيَاب * ٢٣٤٧٤

Calyptra (F). Calyptra (E). هوقل الجراثيم الفطرية واشباهها .

٢٣٤٧٥ - كُرْسِيَاب * ٢٣٤٧٥

Calyptra نميد غشائي مركزه عند الزاوية الخلفية من قاعدة ظهران الحشرة .

٢٣٤٧٦ - كُرْسُول * ٢٣٤٧٦

Hertia cheirifolia, Othonna cheirifolia (S). Hertia, Othonne à feuilles de giroflée, Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E). Schleierkraut (D). Fiorrancio d'Africa (I).

نبات عشبي سبروتي معمر وحيد الجلس والنوع من فصيلة المركبات المشرقيات . شروبه التزيينية عديدة . سوقها مغطىة مسطحة ، فروصها متضيقة . أوراقها حرة وهي متناحية مشورة للشكل واللون نصلها حيك لتنجع الشبه للحصى . أزهارها وريسية كبيرة لثقة صفراء اللون . أزهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٤٧٧ - كُرْسَان * ٢٣٤٧٧

Oursin melon هو التوتياء ويحلى السفور نوع من الاغنيوس المأكول بكثير . حل الشاوي السخريفة اللبنانية .

٢٣٤٧٨ - كُرْسَانِيَات * ٢٣٤٧٨

Echinides, Oursins (F). Echinides, Sea-urchins (E). رتبة حيوانات بحرية شائعة الاعداد . فصائلها واجناسها وانواعها الحاية والمتثرة عديدة ، معظمها شائع على الشطوط البحرية في جميع اسواق العالم .

٢٣٤٧٩ - كُرْسَانِيَة * ٢٣٤٧٩

Echinocystis (S). Echinocysta (F). Echinocystis (E).

عجلة معمرة عارضة من فصيلة القرصيات . مهدا بعض مناطق امريكا الشمالية . ساقها تطول نحو ستة امتار . حولتها ثلاثية الشعب . أوراقها كفية ، خماسية الفصوص . أزهارها بيضاء اللون ، نجمية الشكل ، المتكية منها صغودية التجميع ، الملقية فردية . ثمارها بيضية الشكل ، لونها الى الاصفر ، اطول نحو ٥ سم ، وتعرض نحو ٤ سم . طعمها تافه الحار توكال مطبوخة .

٢٣٤٨٠ - كُرْف

كرف وكُرْف : تسم . يقال كرف الفحل او الحار عندما يشم طريقته ثم يرغ رأسه ويقلب جسطه .

٢٣٤٨١ - كُرْسِي * ٢٣٤٨١

Apium graveolens (S). Ache, A. des marais, A. douce, Céleri (F). Celery, Marsh parsley, Smalage (E). Sellerie, Echter Sellerie (D). Accio, Appio, Sedano, Seleno (I).

نبته بقلية عذوة من فصيلة الخيميات ، ساقها صلبة



كُرْسُون



كُرْسِي



كُرْسِي الجَبَل



كُرْسِي الماء



كُرْسِي بَرِّي



كُرْسِي لَفْيِي



كرنفة جينفا



كرنفة ذروية



كرک



كرکب



كرکند افريقى

صغيرة ، مخروطية الشكل ، ضيقة الاشداد . عينيا ماسحة . محاسرها متراكبة السيف . زانفانها الظهريه عبيقة مستطيلة . الذيلية فاخرة || اثوابها فضية يعلوها تيلبع مترص اسمر ورقه ممرار تمتد من الرأس الى شبح الظهر والذنب || لحومها جيدة الصفت مرطوب فيها .

٢٣٤٩٧ - كركش (F). *Chrysanthème matricaire*
هو قوقان منيات ، اطليه .

٢٣٤٩٨ - كركب * و كركسلا
Crassula (S). *Crassula* (F). *Crassula*, Thick-leaf (E). *Dickblatt* (D). *Crassula* (I).

جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة الخلدات ، انواعه زهاء ١٠٠٠ ، منها افريقية الجنوبية . معظمها بري وينضج زرعيا . اشهر انواعه الكركب القريري . ازهاره قرنيزية اللون ، لوردية التجميع ، جميلة الشكل ، فواحة الكرف الياسميني .

٢٣٤٩٩ - كركه
Alambic (F).
هي الامبيق ، اطليه .

٢٣٥٠٠ - كركج
Sarcelle d'été (F).
هو الخلد الصيني ، اطليه .

٢٣٥٠١ - كركندن * كركند ، هرئيس
Rhinoceros (S). *Rhinoceros* (F). *Rhinoceros* (E).
جنس حيوانات لبونة من الحافريات وفصيلة الكركنديات . انواعه خمسة ، موطنها البلاد الحارة ، منها ثلاثة اسبوية واثنان افريقيان . جنبها ضخمة الاجرام . قوائمها قصيرة ثلاثية الاصلابع . رؤوسها غليظة وكبيرة ، اذنانها قصيرة مستقيمة ، عيونها صغيرة . منها اشحن بالغ السك . تحمل قرنا او قرنان فوق انفها || وهي حية الطبع لكنها شرسة اذا هوجمت . تقيم قرب الماء . قويا الجلود والاصبان والراسخ والاشباب الغليظة . تعيش اوزاجا ذكر وانثى .

٢٣٥٠٢ - كركندن ابيض ، هرئيس
Rhinoceros sinus (S). *Rhinoceros camus* (F).
اكبر واضخم انواع الكركند وهو من ذوات القرنين . سفنه الى البياض الاخير . جسده تعلو نحو ٢٧٠ سم . وتعلو ١٩٠ سم . ذليه نحو ٧٠ سم . قرنه الكبير يطول من ١٢٥ الى ١٦٠ سم . والصغير من ١٨ الى ٢٢ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى اواسط افريقية وصفان بير الأوراج .

٢٣٥٠٣ - كركندن افرقي * عوريت
Rhinoceros bicornis (S). *Rhinoceros bicornis* (F).
كبير الجثة البليظة الضخمة . طوله نحو ٣٥٠ سم . وطوله ١٧٠ سم . ذليه ٧٠ سم . سفنه الى السرة الخشنة الداكنة . وهو من ذوات القرنين ، قرن كبير طوله زهاء ١٠٠ سم . وقرن صغير مستعرض للقاعدة طوله نحو ٢٠ سم . موطنه يمتد من الحبشة الى القطب . يرغب في اللقاح وضفان البحيرات .

٢٣٥٠٤ - كركندن البحر (F). *Licorne de mer*
هو سرخس البحر ، اطليه .

٢٣٥٠٥ - كركندن السنڊ ، كندك
Rhinoceros sondaicus (S). *Rhinoceros de la Sonde*, R. de Java (F).
كرکند وحيد القرن كبير الجثة . جرمه يصغر جرم الهندي .

٢٣٤٩٩ - كركفول ، كركفون
Carvol, *Carvone*
سائل زيتي مادم اللون يتصلخص من بطور الثيار والكراويا والكومن والبنج الجفهي والصمغري . ثقله النسبي عند ١٧ سم³ = ٩٦٠ ، وهو يغلي عند ٢٢٥ سم³ .

٢٣٤٩٠ - كركفة
Coque d'ouf (F).
Chell, *Empty egg* (E).
قشرة البيضة المليا اليابسة وتكفي القوة .

٢٣٤٩١ - كركفة
Corypha (S). *Coryphe* (F).
ج . كركف . جنس اشجار ريفية الجلاع المنصب الجالس من فصيلة النخلات . منها المناطق الاستوائية الاسبوية والافريقية . اوراقها هامة الاثكاز ليفة التركيب ، يشفرج منها نسج الكركف الذي يستعمل في صناعة القمبات وبض اللزائم المنزلية || وهي من الاشجار الزينة التي تعيش في بعض المزارع الخاصة من شواطئ المتوسط || اشهر انواعها الزينية ما يلي .

٢٣٤٩٢ - كركفة جينفا * كركفة مستديرة الورق
Corypha gebanga, *Gebanga rotundifolia*, *Tallara gebanga* (S). *Coryphe à feuilles rondes*, *Tallara* (F).

نوع من الكركف الزينية الشائع الاستعمال ، يوجد في جميع الاربة واقلاها خصبا اما لا يتحمل الطقس الشديد والمعرض الباردة التي يخفص فيها لقلر الى خمس درجات مع . فوق الصفر || تجتره تملو من ٤ الى ٦ امتار بمدة ٢٠ سنة . جعلها منتصب القوام ، مالى اللحاء ، ينهي فصوصه من الاوراق المستديرة المروحية والمستطيلة الجريفة المشوكة .

٢٣٤٩٣ - كركفة ذروية * شكلج
Corypha umbraculifera (S). *Coryphe parasol*, *Tailpot de Ceylan* (F). *Great fan-palm*, *Tailpot palm* (E). *Tailpotbaum*, *Gross Schirmpalme* (D). *Palma corifa*, *Corifa del Malabar* (I).

نوع من الكركف . جعلها اسطوانتي الشكل منتصب كالشمة يملو نحو ١٠ امتار . قشرته ماسلة . اليافه الخشبية شديدة الصلابة . اوراقها هامة مروحية كبيرة القند مستطيلة السنف جميلة الخشار الاالص .

٢٣٤٩٤ - كركفيات *
Coryphinées (F).
سبط اشجار برية وتزيينية من فصيلة النخلات . اجناسه وانواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . منها الاقاليم الاستوائية . يكثر وجودها في بعض مناطق الهند وجاوا وجزر الزابج وسولاو || سرفها منتصب ريفية . اغشائها حلبة تستعمل في البناء . اوراقها هامة الاثكاز صناعية الاستعمال || اشهر اجناسها الكركفة .

٢٣٤٩٥ - كركلة
وقف من اللي . يقال كركت اللدجاجة وهي كركة اذا ولقت من البيض .

٢٣٤٩٦ - كركلة *
Charax (S).
Charax (F). *Charax* (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسبوريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها مسطحة ، شبيهة بالثورن ، تعلو من ٢٥ الى ٣٥ سم . رؤوسها



كرَكَدَنْ الهَنْد

طوله نحو ٢٨٠ سم. وأرتفاعه ١٧٠ سم. اثناء جِءَ لَا قَرَنَ لَهَا. يقيم في الغابات الكثيفة قرب جداول الماء على ارتفاع ٢٠٠ م. من سطح البحر. موطنه الهند وبرمانيا وبنجاولا.

٢٣٥٠٦ - كَرَكَدَنْ سُونَمَرَا، لَشَان، لُونَشَان
Rhinceros sumatrensis (S). Rhinceros de Sumatra (F).

اصغر انواع الكركدن جرمًا وأقلها غلاظة. جسّته تطول نحو ٢٤٠ سم. وتصلو ١٣٠ سم. ذنبه ٦٠ سم. أما وزنه فلا يقل عن ١٠٠٠ كيلو. قرنه غليظ القناعة البطة. ذيل الطرب يطول نحو ٧٠ سم. موطنه صومترا وسيام وملقة...

٢٣٥٠٧ - كَرَكَدَنْ هِنْدِي * ، وَحِيد الْقَرْن، زَيْعَرِي

Rhinceros unicornis, R. indicus (S). Rhinceros unicornis, R. de l'Inde (F).

احفظ انواع الكركدن الاسيوية وسيدة القرن. وهو كبر الجملة لغلظته طوله نحو ٣٠٠ سم. وطوله ١٧٥ سم. أما ذنبه فنحو ٦٥ سم. وقرنه ٣٥ سم. وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو في موطنه مستنقعات الهند وضاف نهر الكنج.



كرَكَدَنْ

٢٣٥٠٨ - كَرَكَدَنْ لَيْبَت،
Rhincerosidae (S). Rhincerosidae (F).

فصيلة حيوانات لبونة من الحافريات. أشهر اجناسها الكركدن.

٢٣٥٠٩ - كَرَكَدِيَّات *
Palinuridae (S). Palinuridae (F).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل، طولها الاقل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. اعراف اجناسها واشهرها المقيص والجراد البحري المعروف ايضًا بالكركد او الكركند.

٢٣٥١٠ - كَرَكُر *
Fourreau (F). Sheath (E).

الكركر وهاء قصب الثور والقيص.

٢٣٥١١ - كَرَكُر *
Stercorarius (S). Stercoraire, Mouette pillarde (F). Jaeger, Skua (E).

جلس طير بحرية من كتيبات التدم. انواعه ثلاثة تجوب البحار من النرويج الى الجنوب. اجسامها هيفاء القد، حيلة الشكل، بلاء الثوب، مستطيلة الاذنان. بسطة جوارحها تراوح من ٨٠ الى ١٢٠ سم. مناقيرها طويلة منتفخة انثناءً في تطاير زيج الماء والخرخشة فتنازها ما يصيدان من سمك وقد ترهبها حل لفظه نلتفتها.

٢٣٥١٢ - كَرَكُر شَايِب *
Stercorarius catarractes (S). Stercoraire ravisseur, Labbe cataracte (F). Cataracta Skua (E).

نوع من الكركر. طائر بحري من كتيبات التدم وفصيلة النورسيات. اصنامه الجبار القلعية. مليته الحياتي فردي. لا تقرب الذكر من الاناث الا في زين الكوم والحفن. جسمه ابيض الشكل، مستطيل الذنب والجانح. طوله نحو ٥٧ سم. وبسطة نحو ١٠٠ سم. فروه الى السرة المايقة المضملة بالشعما السعفاء. بطنه الى السرة الرمادية.



كرَكَدَنْ

عيناه جؤونيا اللون. متفاد اسم القاعدة والجسم، اسود البهرة. ساقه الى السرة السوداء في قوته كل ما استطاع اقتراسه من اسماك. وحيوانات وطيور وحشرات. يطارد الزيج ويفرّها من طير الماء فينازعها ما تصطاد من سمك في يدن عشه في اخصوس يطنه بالخشيش والطحلب. الاثني قنص يصفان في اوائل شهر محوز. الحفن يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثني بمنارة الذكر. الفرخ يستقل بطيرانه ابتداء من اوائل ايلول.

٢٣٥١٣ - كَرَكُرُو *
Carcharodus (S).

جنس حشرات من فصيلة الحسريات. انواعه الفسارة قليلة تركب الخبازيات في فراشاته صغيرة القد طولها يراوح من ٢٨ الى ٣٢ م. اجسامها مخروطية الشكل، كسكية اللون. وراشها بنية يعلوها تمجذع وتبين وزرا كش غنلفة الاوان. تظهر من حزيران الى ايلول. تمتع مكها حل الوراق ينقث من رقات صغيرة القد مستنقة الجسم. رؤوسها سود، انوارها الى الزرقا يعلوها تحطيط وتمجذع اسمر.

٢٣٥١٤ - كَرَكْسَة مُدْبِيَّة *
Charaxes jasius (S). Charaxe jasius, Pacha à deux queues (F). Charaxes jasius (E).

حشرة من فصيلة البشوريات حشرقيات الاجنحة. موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها وأشعة قوتها مثر الزهار. سرفتها تمش على اوراق الخنثنيات في جسمها كبير القد يطول نحو ٢٢ م. بسطها نحو ٧٥ م. رأسها جؤوي اللون، عيناه كبيرتان. زباناها صولجياتان. مرفشها دقيق الجرم. وجوشها يطنها الى المرة الزبداء المولج في روشها الاناميان الى العصرة الحطية تملوها ينج وتزويق فيها الازرق والاسود والبرتقالي والاصفر الصنابي والاحمر. روشها الخلفيان الى السواد الازرق المولج تملو بفتح وتزويق كما في الزوج الاسامي وثلاث جدات الاولى بيضاء، الثانية متراكبة الاوان، الثالثة صفراء في لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل الاولى في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب. تسرح في النهار. تماطل بعد ظهورها بسنة اسابيع وتمتد الممكن لطنها على نصال اوراق النبات المائل في السرة تطول نحو ٦٥ م. جسمها اسطواني الشكل، مالمس القشار. ثوبها الى الخضار الاصفر يعلو الى السكتين الخامسة والسابعة بعثان مستديرتان مركزهما اسود يحوقه الاصفر ويطوقه اطار اسفر. رأسها سداسي الزواك القرنية الجلوية اللون. سكتها الشرجية مغلفة الطرف الاخاذ في طور الاكمال الذي يستمر في الجبل الاولى نحو ثلاثة اسابيع يستمر في الجبل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا.

٢٣٥١٥ - كَرَكُم *
Curcuma

جنس نباتات جذمورية صفولية عشبية معمرة من فصيلة الزنجبيليات. مهدا المناطق الاسيوية الحارة. انواعها قليلة اعرفها الكركم الاسود والكركم الزهراور والكركم الصياغي في اوراقها منتصبة مستطيلة الزناد سنائية الشكل الشاروف. ازهارها صفراء اللون ملبية التجميع تتصلع شراخ قصير في يستخرج من صافلها مادة نشوية مأكولة تدهي اردوت الهند ويستخرج من ازهارها ويطبخها مادة صبغية صفراء اللون ومادة طيبة تدهي كركين (Curcumine).



كركي



كر كند الزيتون



كركي رمادي



كركي مشعوبة

Grus (S).

Grus (F). Crane (E).

جنس طيور كبار من فصيلة الكركي ورتبة طوالب الساق. كتيه ابو حريان وابو حن وابو البزار وابو نيم وابو المصم. ج. كراكي. ١٢ انواده ١٢ جميعها من القواطع. طويلة اللقن والساق. قوية المخار الغريبي الممثل. انولها تختلف باختلاف انوارها يكثر فيها الابيض والرمادي. ورومها ملين او ثنائية القشرة || تألف المناقع وشطوط الانهار. قوتها الاعشاب والحبوب والارز والديدان والحشرات والسفاد والرحايات من عتاء وانها || تدفن في الفصوص رتيه في الادخال السرحه او بين الاعشاب الزينة. الانثى تقص من ٢ الى ٥ يبيضات تحضنها بتلوته الذكر || احرف انولها واشهرها ما يلي.

Grus cinerea (S).

Grus cinerea (F). Common grey crane (E).

نوع من الكركي، كبير الجثة، طوله يراوح من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. ثوبه اريد اللون. رأسه ويقدم عتاء الى السواد الازرق للمواج. حمراء وجانبها عتاء الى البياض الناعم. اياهرو وانتيكه وساقها الى السرة القصية اللامعة. متقار اسود اللون اخضر المواج. عتاء جثرويان مستديرتان. يآلف المناقع وانوار الابرار ويزورها. يحوب العالم في طلب الرزق ويمد مع البرد الى مشاء الذي يمتد من السودان الى الهند.

٢٣٥٢٧ - كُرْكِي مَشْعُوبَةٌ *

Grus viridirostris (S). Grue de Mandchourie (F). Demoiselle crane (E).

نوع من الكركي اكبرها جثة واجملها ثوباً. طوله يراوح من ١٤٠ الى ١٥٠ سم. ثوبه الى البياض العاصي جيته الى الحسرة. عتاء كاليقوت. قاعدة متقار ويقدم عتاء الى السواد الازرق للمواج. متقار الى الحسرة الزينة. اياهرو وانتيكه الى السواد المايق يطو مواج اخضر. ساقه الى الخضار الاصفر || مشاء بعض الاقاليم المشيئة. يكثر في مشعوبة. يآلف الشطوط النهرية والبحرية.

Gruidae (S).

Gruidae (F). Gruidae (E).

فصيلة طير من رتبة طوالب الساق. اجناسها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكركي والزنروق.

Camomille odorante (F).

هو ابابويلج البطر، اطليه.

Crocus (F).

هو الزعفران، اطليه.

Stapelia (F).

هي النلف، نبات من السقليات، اطليه.

Carlina (F).

جنس نباتات عشية برية طيبة معمرة من الحشرات ونفصيلة المركبات. انولها عديدة تكثر في الاربة القاحلة وفي الاراضي المنحاة وبين الصنوبر. سيقان قصيرة جعقة. لوراتها كبيرة مسطيلة مفرسة، شاذكة. انوارها روكسية ملونة، قفراها يراوح من ١٤ الى ١٥ سم. احرف انوارها واشهرها ما يلي.

٢٣٥١٦ - كُرْكُمُ اسود، جَدْوَار اسود

Curcuma caesia (S). Curcuma vert, Zedoaire noir (F). Black zedoary (E). Schwarze Zedoarwurzel (D). Zedoaria nera (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي صقولي معمر تكثر زراعته في الهند وسائر بلاد الشرق الاقصى. مساقله تشبه غذائية مأكولة ويستخرج منها وين الاثرار بعض المواد الطبية والعصبية.

٢٣٥١٧ - كُرْكُمُ زَدَوَار، زَدَوَار، جَدْوَار عَقِيد، سَطَوَال

Curcuma zedoaria (S). Curcuma zedoaria, Zedoaire (F). Zedoary, Setwall (E). Zedoarwurzel, Zittwer-kurkuma (D). Zedoaria (I).

نوع من الكركم تكثر زراعته في الشرق الاقصى ويستخرج من مساقله مادة تشبه غذائية تدعى اربوت الهند. انواره صباغة نقيها منه ويقت.

٢٣٥١٨ - كُرْكُمُ صِبْغِي، هَرْد، عَقِيد هندي، مَمِيرَان، اصماغ صَفَر

Curcuma longa, C. tinctoria (S). Curcuma long, Safran des Indes (F). Long rooted curcuma, Turmeric (E). Gilber ingwer, Gilbwurzel (D). Curcuma longa, C. di Levante, Croco Indiano (I).

نوع من الكركم وهو نبات طبي صقولي معمر. يته المضم ويدار البويل ويكثر افراز العايب ويفتح الشهية. يزرع ويحضر في الهند ويباع تحت اسم « كاري ».

Mélilot-bleu (F).

هو الحنطوق الازرق، اطليه.

Crocotemlis

جنس حشرات من فصيلة اليسويبات انولها قليلة العدد جميعها مفترسة تقضي على الحوام. ذكورها حرة، انثاها الى الضغار الخطي. اجسامها تطول من ٣٥ الى ٤٠ سم. وبسطة اجنتها تراوح من ٥ الى ٦٠ سم.

٢٣٥٢١ - كُرْكَنْد

هو الكركند وهو ايضاً الجراد البصري، اطليها.

٢٣٥٢٢ - كُرْكَنْد الزَيْتُون *

Oryctes nasicornis (S). Rhinocéros de l'olivier (F). خنفساء كبيرة القد من الجمليات. طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها الى الكستالي يعلو مواج احمر لامع. رأس الذكر مسلح بقرن منحنك الى الوراء. الانثى جاء لاقرن لها || يآلف الزيتون. يسرح من الغروب الى الشروق ويبعث في النهار. يمشي على الاشجار اليابسة وبين نشارة الخشب. يرفقه كبيرة القد، غليظة الشكل، حلزونية الجسم مقوية، خيرا اللون، ممرار الرأس، تركيب جلدو ازيزون قفليها.

Amethystes (S).

Amethyst (F). Amethyst (E). Amethystpflanze (D). Amethyst (I).

نبات عشبي حولي زراعي زيتوني من فصيلة الشفويات. يزرع ليزهر الازرق الجليل المستحب العرف. نبتته صغيرة القد، نحيلة الساق، قصيرة القروغ المستطلة || يتكاثر بالبذر. انوارها صبي.

Meinste (F).

طائر من الزواجر يبيض عتاء، اطليه.

٢٣٥٣٣ - كركلين اقشئ الورق *

Carlina scanthifolia (S). *Carline à feuilles d'acanthé*, Chardoussé (F).

نوع من الكركلين الملبلج في الجبال. ساقه جذعة تملو من هـ ١٠ سم. أوراقه كبيرة القند اقشئة الشكل. نصلها خيل البشرة على صفحتها السفلى. وريشتها قصيرة الزناد، قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. قناباتها صفراء اللون. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.



كركلين ساق

٢٣٥٣٤ - كركلين شائع *

Carlina vulgaris (S). *Carline vulgaire* (F). *Carline thistle* (E). *Kleine Eberwurz* (D). *Carlina vulgaris* (I).

نوع من الكركلين الملبلج يكثر في المراعي الجبلية وفي الاراضي المنخفضة. ساقه تملو من ٢٥ إلى ٤٥ سم. أوراقه كبيرة القند، شديدة التفريش، خالية الصفة السفلى رعاها المائية قبل الاذداد والهج. وريساته الزهرية ملونة، قطرها يراوح من ١٥ إلى ١٢ سم. قناباتها حنطية اللون. يقال انه من النباتات الطبية التي تقيد افادة الحرفش والاراضي شوكي.



كربوس المراعي

٢٣٥٣٥ - كركلين عديم الساق *

Carlina acaulis (S). *Carline scaule*, *Baromètre*, *Loque* (F). *Carline* (E). *Eberwurz* (D). *Carlina*, *Carlo pinto* (I).

نوع من الكركلين الملبلج. ساقه جذعة تملو من هـ ١٢ سم. أوراقه كبيرة مستطيلة مقرفة، نصلها اخضر اللون، مائل البشرة على صفحتها. وريشتها كبيرة القند ملونة، قطرها يراوح من ١٥ إلى ١٣ سم. قناباتها فضية. ازهارها يستمر من تموز الى تشرين وهو يتكشف عند وجود التيم ويبلغ مع اشعة الشمس.

٢٣٥٣٦ - كرم *

Vignoble (F). *Vineyard* (E).

ومن اسمائه الفردوس. كل ارض مفروسة كرم.

٢٣٥٣٧ - كرم *

Cépage (F). *Vine-plant* (E).

الضرب المعروف الموسوف من الكرمة.

٢٣٥٣٨ - كرم زيتون، يستعان زيتون، وكرين

Olivale, *Olivarale*, *Olivérale* (F). *Olive-plantation* (E).

كل ارض غرس فيها الزيتون.



كربوس النجيليات

٢٣٥٣٩ - كرميوس القراعي *

Crambus pratensis (S). *Crambe des prairies*, *Teigne des prairies* (F). *Crambus pratensis* (E).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة. موطنها معظم اقاليم البلاد المحتلة الحارة من الشرق الاوسط واوربية. فراشها واضحة قوتها رقيق الازهار وطلما. رشتها خاضعة تميش على اوراق النباتات المرعية. جسمها صغير قضيبي يطول نحو ٨ مم. يسطها نحو ٢٤ مم. رأسها صغير الجسم. عينها زيتيانه صيرتان. زباناها غيطيان. ملابسها دقيقة. مرشها معتدل الطول. جوشها ويطها الى الزمدة. وريشتها الاماميان الى السرة الكنتية يملوها زركضة متفرعة صفراء ورجة مستطيلة يضاء. وريشتها الخلفيان الى السرة الكنتية السوية. اهدابها الى التني. الانثى اميز قدا من الذكر واغلظ بطناً منه واطول مرشاً. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في النهار ويقيم في الليل. الانثى تلقي المكن ميساديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق. الطور



كرمة العنب

الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر والسرقة عند بلوغها الاذدادك تطلو نحو ١١ مم. جسمها اسطواني الشكل، واضمح التقسيم السكي، اريد اللون يملو تقطيع اخضر الس يتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود. مديها ورياجها الى السرة. طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة في الجلالة او تحت قشور الاشجار الحرجية القريبة من المراعي.

٢٣٥٤٠ - كرميوس النجيليات *

Crambus perillius (S). *Crambe perle*, *Teigne des graminées* (F). *Crambus perillius* (E).

حشرة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنحة. موطنها معظم الاقاليم المحتلة الحارة من الشرق الاوسط واوربية. فراشها واضحة قوتها رقيق الازهار وطلما. رشتها خاضعة تميش على النجيليات البرية والزرعية. جسمها صغير يطول نحو ٩ مم. يسطها تراوح من ٢٨ الى ٣٠ مم. رأسها معتدل الجسم. عينها زيتيانه، بارزتان. زباناها غيطيان. ملابسها دقيقة. مرشها معتدل الطول. جوشها ويطها الى الزمدة القضيبة المراج. وريشتها الاماميان الى الزمدة القضيبة يملوها خفيف متداخل الاخضر والازرق. وريشتها الخلفيان الى الزمدة السمراء المراج. اهدابها عاجية. الانثى اميز قدا من الذكر واغلظ بطناً منه واطول مرشاً. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في مطلع حزيران ويقيم حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. الانثى تلقي المكن ميساديا تغلفه مادة فروية تتبته على صفت النجيليات. الطور الاسروي يستمر نحو عشرة اشهر. والسرقة عند بلوغها الكال الجسوري تطلو نحو ١٢ مم. جسمها اسطواني الشكل، واضمح التقسيم السكي، اغبر اللون يملو تقطيع اخضر الس يتد من الكويل الى الشرج. رأسها اسود اللون. مديها ورياجها الى الطحلة. طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلجة تنسجها السرة بين فروع النجيليات او تحت اريشتها.

٢٣٥٤١ - كرمه *

Vitis (S). *Vigne* (F). *Vine* (E).

جنس نباتات معمرة عايشة من فصيلة الكرديات. اقوامها عديدة، معظمها بري وتزني ويضعها زراعي. اشهر اقوامها واعها زرمة واكرها غروباً واجزلا نلماً الكرمة النينية.

٢٣٥٤٢ - كرمه العيب *

Vitis vinifera (S). *Vigne commune*, *Vigne noble* (F). *Cultivated vine*, *Grape vine* (E). *Weinrebe* (D). *Vite* (I).

لوع من الكرمة ضرورها المعروفة زهاء ٢٥٠٠ مجها زراعية مشرة. سوقها عايشة لينة مخشوشة. جلورها حزنينة منسطة لا تضرب القور العميق. مرقها سفرة متعاقبة غيد اسطوانية مستطيلة السلايات. اوراقها مقففة متعاقبة عايلة تنمو على القند. نصلها كفي الشكل يكثر فيه التفصيص الخفسي وهو سنن الحافة، انقب البشرة على صفحتها او على الصفة السفلى. حوافها فارقة حلزونية تنمو قبالة الاوراق. ازهارها حنطية. ماثليتها تكون على عقد سلايات الزجون الحولي ازاء الاوراق. ازهارها صغيرة القند خضراء اللون وهي مركبة من كأس خفي الفصل وتوج خفي البيلات المندمجة التي تبدو كالصفيحة فوق الاسدية والمدة. والاسدية تنسج ذات مغلفين فوق يحسن كل منها يويشتان تصبمان بعد التاير والاصخاب

٢٣٥٤٨ - كُرْمِيس الزَيْتُون (F). *Kermès de l'olivier*.
هي قزمية الزيتون المخططة ، أطلبا .

٢٣٥٤٩ - كُرْمِيس السَّنْدِيَّان *Kermès du chêne*.
هي قزمية السنديان ، أطلبا .

٢٣٥٥٠ - كُرْمِيس الْوَرْد *Kermès du rosier* (F).
هي قزمية الوردة ، أطلبا .

٢٣٥٥١ - كُرْمِيسِيَّات *Coccidés* (F).
فصيلة حشرات مشهورة باسم مغفريات ، أطلبا .

٢٣٥٥٢ - كُرْمِيَّي *Vinicole, Viticole* (F).
Wine-growing (E).
كل ما هو مختص بالكرمة من زراعة وصناعة .

٢٣٥٥٣ - كُرْمِيَّات *Ampelidaceae* (S).
Ampélidacées (F). *Ampelidaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات سفلية الاسدية . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الكرمية .

٢٣٥٥٤ - كُرْمَات *Ampelidaceae* (S).
اصول الكرم التي تبقى في جذع اللتلة بعد قطع السنف .
الواحدة كرنافة . ج . كرايف .

٢٣٥٥٥ - كُرْمَب * *Brassica caulorapa* (S).
Chou-rava, Colrave (F). *Hungarian turnip, Kohl-rabi* (E). *Knollenkohl, Knollkohl* (D). *Cavolo rapa* (I).
نوع من الملفوف الزراعي المأكول . ساقه غليظة مستديرة تنمو على سلع التربة || يجود في جميع الاربة الزراعية .
يلو في الاكوال ثم ينقل الى مستقره حيث ينفس على ابعاد تراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم . بين السطر والسطر . وهو ينزق ويك .
قيته الغذائية لا بأس بها لذلك يكثر استعماله كمكاف الهائم اخصها البقر .

٢٣٥٥٦ - كُرْمَب الْجَمَل *Morandie* (F).
هو الحن ، اطلبا .

٢٣٥٥٧ - كُرْمَب الْمَاء *Nénuphar bleu* (F).
هو التيلوفر الازرق ، اطلبا .

٢٣٥٥٨ - كُرْمَب بَحْرِي * *Crambe maritima* (S). *Crambé maritime, Crambé, Chou marin* (F). *Sea cabbage, Sea kale* (E). *Echter Meerkohlrabi, Seekohl* (D). *Crambe maritima, Cavolo marino* (I).
بقلة معمرة من فصيلة الصليبيات تثبت برية على الشواطئ البحرية وتزرع في بعض البلاد اخصها اكثرها حيث يأكلونها بكثرة . طعمها كالقنبيط .

٢٣٥٥٩ - كُرْمَب عَنَكِي *Rutabaga* (F).
Swedish turnip, Swede (E).
نبات علفي يدهى رباغة ، أطلبا .

٢٣٥٦١ - كُرْمِيَّات *Pieridae* (S). *Pieridés* (F).
Pieridae, White butterflies, Sulfur butterflies (E). *Weisslinge* (D).
فصيلة حشرات من سرشقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منظها متوسط الحجم وبعضها كبير وسريع . انواعها

زبور الثمرة . والثمرة عننية مختلفة الاشكال والاحجام والالوان مركبة من قشرة خارجية ولباب ويزور . لبابها يولفت من ٨٥ الى ٩٠ ٪ من الثمرة وما تبقى فيعود الى القشرة واليزور . وهو يكون عند الادراك قليل الحموضة . كثير المادة السكرية ، لللب الطعم ، مستحب النكهة والعرف ، متوسط تركيزه :

ماء ٥٠ من ٧٥ الى ٨٠ ٪
سكر قابل الارتفاع ١٨٥٠٠ الى ٢٥٥٠٠ ٪
حوامض ملقية ترثرثوقنفساحية ٣٠ من ٤٥ ٪
بوتر ترات البوتاس ٥٠٥ من ٥٠٧ ٪
مواد ازوتية وعضوية عطرية ٥٠٢ من ٥٠٣ ٪
والكرية ترطب في الاتام الممتلئة التي تكون لها الحرارة الكافية لادراك الماء . هذا لا يعني انها لا تفيض في الاقاليم الباردة فهي تنبش وتفتح للفر الشهيد شرط ان تكون لها حرارة الصيف ما هي بحاجة اليه من السموات اللازمة لادراك النار . وهي تفضل السروج والمغصاب والمخاريط المنصبة على البقاع المنبسطة او المنعرة || وهي تجود في جميع الاربة يستثنى منها الريلة الصفراء والكلسية البست والطليسية المنديجة || اما تكاثرها فقد يتم على اربعة اشكال : باليزور والتعجيل والتزويد والتلصيص || فاليزور يستعمل حسادة للحصول على اسرام ارقاء جديدة . اما التعجيل فهو اشيع الطرق واسهلها واسلمها ، قوامه اسطفاة المغلة من زرعين بلغ الحبل شرط ان لا تقتل صغرها عن الاثنين . اما التزويد فيرتكز على لي وطر بعض سرور الجفنة الى ان تشرش وتفصل . يبقى التعظيم وهو اشهر من ان يعرف وقد كثر استعماله في الاجبان الأمريكية التي لا تحشى الفيلوكسره .

٢٣٥٤٣ - كُرْمَة بَيْضَاء *Bryonia blanche* (F).
هي الفاندا البيضاء ، أطلبا .

٢٣٥٤٤ - كُرْمَمْدَكَن ، هَشَان *Narthecium, Abama* (S).
نبات عشبي بري طلي معمر من فصيلة الزنبقيات . انواعه المعروفة اربعة . جذاميرها مفادة . اوراقها صفية الشكل مستعرجة النصل الجامد المتحد . شامخها الزهرية منتصبة مستطيلة تملوها اوراق صغيرة ذرية متعاقبة متباعدة . ازهارها عبقريه التجميع . انوعها صغيرة اللقد سداسية البتلات . يستخرج من جميع اعضائها مادة جعالية قفالة شديدة التلش .

٢٣٥٤٥ - كُرْمَمْدَكَن مَتَغِيي ، عَشْتِي كَدَاڤ *Narthecium ossifragum* (S). *Narthécis des marais, Anthracis des marais* (F). *Bastard asphodel, Bog asphodel* (E). *Echter Beinbrech, Beinbrechgras* (D). *Asphodelus bastardus* (I).
نوع من الكريدان وهو نبات عشبي طلي معمر يزور للزعين . يتكاثر بالقتل واليزور . اوراقه صفية مستطبة الاستطالة . نصلها جامد الصفصفا غائر التشديد . ازهاره صغيرة اللقد لونها الى الصفرة يعلوها مزاج اخضر . يستخرج من جميع اعضائه مادة جعالية قفالة يقال انها مشطية ومطيفة .

٢٣٥٤٦ - كُرْمِيس *Kermès* (F).
هي القزمية ، أطلبا .

٢٣٥٤٧ - كُرْمِيس التَفْحَاح *Kermès virgule* (F).
هي قزمية التفاح ، أطلبا .



كرب



كرب بحري

Cranchidae (S). ٢٣٥٦٦ - كُرْبِيَّاتٌ *

Cranchidae (F). Cranchidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل مزدوجات الخيشوم. اجناسها والنواصير الماصرة المرفوعة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل. تتميز برابطها الفضل الذي يجمع بين الرأس والجسم. زعانفها شرجية الاركاناز، خاصة الاصلع. عيونها كبيرة جاحظة || اشهر اجناسها الكرنشة.

Carnallite (F). ٢٣٥٦٧ - كُرْكَلِيَّتْ *

Carnallite (E).

ملح معاني يستخرج من الارض يستخلص منه البوتاس والمغنيزيوم.

Carnauba (F). ٢٣٥٦٨ - كُرْكُوبَة *

Carnauba palm (E).

كرنوبه هو الاتم البرازيلي. شجرة من التعلقات تدهي البتقوس تكثر زراعتها الصناعية في البرازيل. راجع بقوس.

Calebasse (F). ٢٣٥٦٩ - كُرْبِيْب

هو القرع الطويل، اطليه.

Chernetidae (S). ٢٣٥٧٠ - كُرْبِيَّسِيَّاتٌ *

Chernetidae (F). Chernetidae (E).

فصيلة دويبات من القمريات الكاذبة. | اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد، معظمها من دويبات المنطق الباردة || تتميز بصغر الجسم المغطى بالمقوّم الطراف وشياعها المستطيلة المسلسلة بلاقط طرفية قريبة الشبه بلاقط المقارب || تعيش في الموائل المظلمة وتحت قشور الاشجار وفي الليوت القليلة اعصها الخشبية السفوف || جميعها من الدويبات النافعة تقضي على الحشرات الصغيرة المؤذية.

Numenius (S). ٢٣٥٧١ - كُرَّوَانِ

Courlis (F). Courlis (E).

جنس طير من الكروانيات القرواط. | الانثى كروانة والجمع كرواوين وكروان. | انواعه ١٠ تتميز باستطالة دفة مناقيرها وسيقانها. | اجنحتها ذلقة. | اذنانها مستديرة. | ارساها تجعلها الجهة الامامية، سرديّة الخلفية || تألف الماء وتعيش قرب الشاطئ والبيئات والانهار. | قوتها الرخويات والديدان والحشرات والاسماك الصغيرة لتلتقط منه جزر البحر || اناثها تلتن في افخيس تنشد قمرها بالخيش وهي تقم من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وسدما ٣ اسابيع. | اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

Numenius tenuirostris (S). ٢٣٥٧٢ - كُرَّوَانِ اُرُودْ *، كُرَّوَانِ الْفَيْط

Numenius tenuirostris (F). Courlis cendré, Grand courlis (E).

نوع من الكروان، كبير الجثة طوله نحو ٦٥ سم. وبسطه ١٣٠ سم. | نويه الى الرينة الزمادية المرفوعة. | بطه الى البياض. | صياد صليتان، متقار اسم. | سقاء الى الوصاحي. | يألف مختلف مناطق حوض البحر المتوسط يحبوها مرتان في السنة.

Numenius tenuirostris (S). ٢٣٥٧٣ - كُرَّوَانِ اِفْرِيقِي *

نوع من الكروان، صغير الجثة طوله نحو ٤٠ سم. وبسطه

سوية الاولان يطولوا تجذيع ريقيج || يرقاتها شبه ملساء. | رباط خادراتها يميز اسطاهلها ويمنها من التتلي.

٢٣٥٦١ - كُرْبِيَّةُ الزُّعْرُور *، قَرَاشَةُ الزُّعْرُور

Aporia crataegi (S). Aporie de l'aubépine, le Gzézé (F). Black-veined white (E). Baumweibling (D).

حشرة من الكرنبيات وسيدة الجبل الحولي. | بسطها تراوح من ٦٠ الى ٧٠ م. | رواسها الى البياض العاجي، حرقها سود. | ريقها سمراء اللون، غير الملب، تعيش على اوراق الزهرود ورسائر الاجنهار المشعة. | يهاها الشنوي تقضيه داخل الاوراق التي تفتلها ويجمعها الى بعضها بحيط من الحرير حنطية اللون.

٢٣٥٦٢ - كُرْبِيَّةُ الْكُرْبِ *

Pteris rapae (S). Pteride de la rave (F). Small garden-white (E). Kleiner Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنبيات، بسطها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ م. | ذكورها يعيش الراس، سمم الزوايا الامامية والبقع الثلاثية. | اناثها عادمة الزوايا السمر، ثنائية البقع الصغيرة. | لها في الحول من جبين الى ثلاثة. | ريقها تعيش منفردة على مختلف اوراق الصليبيات البرية والزراعية اعصها الكرنب.

٢٣٥٦٣ - كُرْبِيَّةُ الْفَت *، قَرَاشَةُ الْفَت

Pteris napi (S). Pteride du navet (F). Green-veined white (E). Rapsweibling (D).

حشرة من الكرنبيات، بسطها تراوح من ٣٥ الى ٤٠ م. | رواسها الى البياض الاثير يطول موج اخضر. | ذكورها سمم الزوايا الامامية. | اناثها وذكورها ثنائية البقع السود المستطيلة الاشكال || ريقها خضراء اللون تركب الفت ورسائر الصليبيات. | اذاها يستمر من سزيان الى ايلول.

٢٣٥٦٤ - كُرْبِيَّةُ الْمَلْفُوف *، دُوْدَةُ الْكُرْبِ، قَرَاشَةُ الْمَلْفُوف

Pteris brassicae (S). Pteride du chou (F). Large garden-white (E). Grober Kohlweibling (D).

حشرة من الكرنبيات بسطها، تراوح من ٦٠ الى ٧٠ م. | رواسها الى البياض الاثير، زواياها الامامية سودا اطراف. | اناثها ثلاثية البقع السود || لها جيلان في الحول تمتص مكها على الصغمة السفل من لتصل. | مكها غزوي في الشكل، اصفر اللون، رزني التجميع، رزنته تده من ٣٠ الى ٥٠ مكنة || ريقها نمة مؤذية تلهم اوراق الملفوف ورسائر الصليبيات البرية والزراعية ولا تترك منها سوى الصلوق والمروق. | لوها الى الخضار الاكعب يطولوا تميمش اسود وثلاثة خطوط مستطيلة قاطية غيرا اللون.

٢٣٥٦٥ - كُرْكَشَة *

Cranchia (S). Cranchie (F). Cranchie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل وفصيلة الكرنبيات. | انواعها الماصرة المرفوعة ثلاثة. | اعطائها بحار البلاد الحارة. | ملجئها الحياتي جماعي. | اسرارها وافرة العدد. | جميعها يمة لا تقرب الشطوط. | سمرحها دبوي || اجسامها اسطوانية الشكل، صغيرة القد. | زعانفها صغيرة، خاصة الاصلع، شرجية الاركاناز. | ملاسها متنفعة معجمة اطراف.



كرنبية الزعور



كرنبية الكرنب



كرنبية الفت



كرنبية الملفوف



كروان اريد



كروان افريقي

٢٣٥٨٢ - كروان مدسي Gobie sangans (F).

هو القويون المدسي، سمكة بحرية، اطلبه.

٢٣٥٨٤ - كروان امونياك، كروان الامونياك، حريف الشكار

Crud ammoniac, Crude ammoniacque (F).

سماد كبري ازوتي يستعمل كحاشور وعشاب. وهو من مواليد صناعة غاز الانارة بحوى من ٢ الى ١٠ ٪. الازوت البطيء الانفعال والنتيجة الذي يستعمل لتحويله الى التربة من ٤ الى ٥ ٪ شهر ١١ اما غواصة اللعانية ان على الحشرات والديدان او حل الاصاب فسمية الفعول الجيد النتائج. وهو يستعمل في هذا السيلج بمعدل يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ كيلو لدم الهلج.

٢٣٥٨٥ - كروان البصل

Lilloceris mardigera, Lilloceris brunnea (S).

Cricàre de l'oignon (F). Onion-beetle (E).

حشرة غاصلة مؤذية من النضاريات ورتبة مفصلات الاجنحة. تألف البراري والمزارع وحول البصل. غنفسها ويرقاتها تعيش على اوراق البصل والكرات والكرات والكرات البري وزيتق الوادي ١١ جسمها صغير القليل من ٦ الى ٧ م. ٢. ثوبا الملوي الى الحشرة القرمزية الصنابية المروج. ثوبا السفلي الى السرة السوداء. رأسها مستعرض الجرم. عينها صغيرتان. زباناها غليظان. ظهرها مستدير الطرف اللاحق. غدها متباعدة التعزيز القاطب ١١ لها جيلان من الحول. تظهر الحشرة الجملة في اوائل نيسان. تسرح في النهار. تساهل بعد ظهورها باربعة اسابيع وتنتج المكن على نصال الازراق ١١ البرقة عند ادراكها الكال الجسوري قاطل نحو ٨ م. ثوبا الى الخلفي الاصفر المروج. رأسها ورواجها سيد.

٢٣٥٨٦ - كروان الزرع *، اوليسا الزرع

Ulama melanopus (S). Cricàre des céréales (F).

Cereal leaf beetle (E). Rothstiges Getreidehähnchen (D).

غنفسه من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٤ الى ٥ م. رأسها وغدها الى الزرقاة الالام. كوسلها الى الحشرة. تركب مع برقاتها نصف التجليات فتؤذي وتسي الى اللينات.

٢٣٥٨٧ - كروان الزنبق *

Crioceris lili, Lilloceris lili (S). Cricàre du lis (F).

Lily beetle (E). Lilienhähnchen (D).

غنفسه من النضاريات طويلا يراوح من ٧ الى ٨ م. رأسها وقواطها سيد. كوسلها وشمارها حر. مكها ناري اللون وشعي الشكل تمنحه الاثني على اوراق الزنبق فينتفج من برقات تقسط الازراق وتقرضها.

٢٣٥٨٨ - كروان الهليون *

Crioceris asparagi (S). Cricàre de l'asperge (F).

Asparagus beetle (E). Spargelhähnchen (D).

غنفسه من فصيلة النضاريات طويلا يراوح من ٥ الى ٦ م. رأسها لسيد اللون، ازرق المروج. كوسلها الى الحشرة يطو توشيع اسفع. غدها الى الزرقاة المابقة يحرقها اطار اصهب ويتنظها يتيج نمش مقابل لونه الى الصغار الاخير الخلفي ١١ تركب الحليين ويؤذي.



كروان الزيت



كروس البصل



كروس الزرع



كروس الزنبق



كروس الهليون

١٠٠ م. منقاره دقيق نحيل. ثوبه الى الرتبة القنبره المرقطة. بطنه واثنيكه وشمار جناحه للدخل الى البياض. شتاء افريقية الاستوائية. مصيفه يمتد من مراكش الى الصعيد وقد شوه مرارا في سقيلة.

٢٣٥٧٤ - كروان الجبل

Edicnème (F).

Stone curlew (E).

هو البرغيد، طائر من دجاجيات الارض، اطلبه.

٢٣٥٧٥ - كروان الهنسن

Numenius hudsonicus (S). Courlis du Hudson (F).

نوع من الكروان متوسط الجثة. طوله نحو ٥٥ سم. وبسطه ١١٠ م. ثوبه الى الرتبة المرقطة بالابيض والاسود. بطنه بني اللون وصدره واثنيكه كذلك ١١ يحوي امريكية الشمالية لكنه يكثر الاقامة في مناطق الهنسن انحصها الخليلج.

٢٣٥٧٦ - كروانيات

Numenius (F).

جماعة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها وانواعها عديدة تتميز بشكلها الرقيق الاهيف. مناقيرها مسطيلة، هلالية التفويص، مخددة الجرم. سيقانها دقيقة. ارسافها سرديّة، اصحابها ربابية ١١ اشهر اجناسها الكروان.

٢٣٥٧٧ - كروان

Croton

جنس نباتات حرجية من فصيلة البترقيات. اناؤه كثيرة العدد منها الاشجار والشجيرات والجنات والاشباب. معظمها من نبات المناطق الاستوائية ١١ اوراقها كاملة متعاقبة، مسطحة، رمحية. ازهارها حقويدي تاجي. ازهارها وبيدة للسكن. ثمارها جراه كروية او بيضبة الشكل. يزورها نفعية منها هدنية طيبة وسها صنابية. قنور بعض انواعها طيبة ١١ اشهرها ما يتبع.

٢٣٥٧٨ - كروان الزيت *، حبة السلاطين، خروان صيني

Croton tiglium (S). Croton cathartique (F). Croton-oil plant, Purging croton, Tiglium (E). Purgierkroton, Tiglibaum (D). Croton, Tiglio drastico (I).

نوع من الكروان، منته المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية. يستخرج من زروءه مادة زيتية غواصها خواص زيت الخروع وتستخدم استمدا.

٢٣٥٧٩ - كروان عنبيري، قشر عنبيري

Croton eluteria, Cascarilla elutia (S). Cascarille, Croton eleuthérie (F). Cascarilla-bark tree, Seaside balsam (E). Kaskarillenstrauch (D). Cascarilla, China aromatica (I).

نوع من الكروان، منته البلاد الاسيكية، يستخرج من لحائه مادة صناعية مرة زكية العرف العنبري المصطب، تستعمل ضد الحيات.

٢٣٥٨٠ - كروان

Gobie (F).

جنس اسماء بحرية مشهورة باسم قويون، اطلبه.

٢٣٥٨١ - كروان اسود

Gobie noir (F).

هو القويون الاسود، سمكة بحرية، اطلبه.

٢٣٥٨٢ - كروان الغبر

Gobie nébuleux (F).

هو القويون المشب، سمكة بحرية، اطلبه.

Sphérique (F). **كروية ، كروي**
Spherical (E).
ما كان شكله كالكرة او ما كان له صفة بالكرة .

Carvi ٢٣٦٠٢ - **كروية**
هي الكراويا ، اطلبها .

Micrococaceae (S). **كرويات**
Micrococées (F). Micrococaceae (E).
فصيلة من البكتريات ، اجناسها وانواعها التي هم لزراعة قليلة العدد تتميز باحجامها الذرية الكروية وبانقسامها التكاثري الذي يحصل في اتجاهات مختلفة يمكن حصرها بالاتجاه الفردي والاتجاه الثنائي والاتجاه الثلاثي || اعراف انواعها المخرصة ما يتبع .

Micrococcus tritici (S). **كروية التري**
Microcoque du blé, Maladie du blé rose (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه شديد اللون والرائحة حل بر الحنطة فينقبه ويغندده ويسببه ويشبهه بالحنطاب البردي اللون .

٢٣٦٠٥ - **كروية امبراطورية**
Micrococcus imperatoris (S). Microcoque impérial (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه شديد اللون على درنات البطاطا المبروسة والمحفوفة في اماكن رطبة عادمة البهوية لانه يهرجا ويسبب تلفها .

٢٣٦٠٦ - **كروية بيضاء**
Micrococcus albidus (S). Microcoque blanc (F).
مرض بكتيري من الكرويات يمرر البطاطا والقلناس والبيصل فيمنها ويهرجا .

٢٣٦٠٧ - **كروية ذهبية**
Micrococcus flavidus (S). Microcoque doré (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه يمرض على عذة الخنثوية المحفوفة فينسدا ويسبب تلفها .

٢٣٦٠٨ - **كروية فخرية**
Micrococcus pellucidus (S). Microcoque pellucide (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه يمرض على عذة نباتات بصلية ودقسية وقد يركب البطاطا ويسبب لها الجرب الدرري .

٢٣٦٠٩ - **كروية ينكورية**
Micrococcus phytophthorus (S). Microcoque noir, Maladie de la jambe noire (F).
مرض بكتيري من الكرويات ، نغازه شديد اللون على سوق البطاطا حيث يمرض بعض اقسامها فيسبب اسودادها وتلفها . وقد يصيب الدرن فينبو كيقع سود نحوها حالات يمر تجفف القشرة وتصلبها يتشققها ثم يهرج القلب .

٢٣٦١٠ - **كروي**
Curage (F). Cleansing (E).
اخراج الومل والحسا والاعشاب من القنوات والحساسيات

٢٣٦١١ - **كرويات**
Corpuscules du sang, Globules (F). Blood corpuscles, Globules (E).
الوحدة كرية . والكريات محمصة من الاجسام السائبة في الدم منها احمر والبيض ثم السلفية والهايدة او الخيولة .

Crossing-over ٢٣٥٨٩ - **كروين افر**
هو الحاصل الناتج من تشابك واتشاف النشب .

٢٣٥٩٠ - **كرولا لرجواني الصدر**
Querula rubricollis (S). Plauhou de Cayenne (F).
طائر من الطيور منيات الخنازير وطيولة القطنجيات . اعطاه بعض مناطق امريكا الاستوائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٢٥ سم . قويه ال السواد الاسفع . زور وصدره ارجوانيا اللون عند الذكر || ملجته الخياطي جماعي الا في زين السافغ والحضانة . يالف التناجات والحراج . قويه البلور والثار الباندة وبعض الحشرات اخصها النمل .

٢٣٥٩١ - **كروم**
Chrome (F). Chromium (E).
معدن اكهب اللون شديد الصلابة ثقله النسبي يراوح من ٦ الى ٨٠٠٠ ، ينصهر في ١٥٢٠ °سغ || درزه (كرو- Or) وزنه الاتوبي ٢٠٠١٠ وهو لا يتأثر بالهواء الجوي ولا يتأكسد الا في درجات الحرارة العالية ، يذوب في الحامض الكلوريدريكي والحامض الكبريتي || يوجد في الطبيعة مركبا مع بعض العناصر بلسب مختلفة . تحريره واستخلاصه من فقله يستوجب صهره في افران خاصة تشتمل الحرارة العالية || اشهر مركباته الطبيعية كرويات الرصاص . اما اشهر مركباته الصناعية فهي كرويات البيوتاسيوم وكرويات الصوديوم التي تستعمل في ديق الجليد وصباغها .

٢٣٥٩٢ - **كروماتيد**
Chromatida
هو من النشبة نصف شرطها الطولي وذلك عندما تكون في طور الميوته .

٢٣٥٩٣ - **كروماتيكي ، صيغتي**
Chromatique (F). Chromatic (E).
نمت تعريفي توصف به الاغضاء الصبغية في الاجسام الحيوانية والنباتية .

٢٣٥٩٤ - **كروماتين ، كروماتين**
Chromatine (F). Chromatin (E).
مركب آسي - حامضي - سفوري تتكون منه مادة النشب وقسم من الجلبة الخلية .

٢٣٥٩٥ - **كروموبلاست**
Chromoplaste (F). Chromoplastid (E).
مادة الالفة الملونة .

٢٣٥٩٦ - **كروموزوم**
Chromosome
هو النشبة ، اطلبها .

٢٣٥٩٧ - **كروموليست**
Chromoleucite
حبيبة المنصب في ذقة الخلايا النباتية .

٢٣٥٩٨ - **كروموسير**
Chromomère (F).
اصفر جزئيات تشتمل بالشكل والمركز في شعاع البتون الكروماتيكي .

٢٣٥٩٩ - **كرونيلا**
Coronille (F).
هو الامروس نبات من القرنيات ، اطلبه .

٢٣٦٠٠ - **كرونومتر**
Chronomètre (F). Chronometer (E).
آلة تستعمل في قياس الوقت لا يفرقها عن الساعة العادية سوى دقة الاداء والفضيل الفائق والتوقيف الجياري .



كرولا ارجواني الصدر



كروية البر



كروية ينكورية

٢٣٦١٢ - كُرْبَات يَفِي

Globules blancs, Leucocytes (E).
 حبيبات حيوية متحركة وظفيتها الرئيسية القضاء على
 الجيكروبات السابغة في الدم || الملبس المكعب من الدم
 يحوي نحو ٧٠٠٠ كرية .

٢٣٦١٣ - كُرْبَات حُمْر

Globules rouges, Hématies, Erythrocytes (F). Erythrocytes (E).
 حبيبات حيوية من ذوات النواة . وظفيتها الرئيسية حل
 الاكسين من الرقة الى جميع اجزاء الجسم وهي تيش
 بقصة اسايح ثم تنقسم وتفتت . نسبها الى الكريات
 البيض نسبة ٥٠٠ الى ١ || الملبس المكعب من الدم
 يحوي ما يراوح قدره من ٤ الى ٥ ملايين من الكريات
 الحمر . اما انبها الاخر فيض الى المادة الملونة الحمراء
 المروفة باهوجلوبين (Hémoglobine) .

٢٣٦١٤ - كُرْب

Rhizome de roseau (F).
 Rhizome of reed (E).
 الكعب من القصب او القنا تعريفه العامي وسلطونه .

٢٣٦١٥ - كُرْبِيْسِيْسِيْس
 جنس فطور مجهرية رية من فصيلة الزيفيات . انواعه
 قليلة شائعة ولاضرار . تركب خاء الاعصان والافناد اليابسة
 وينمت بجنية او عسبة الشكل ، تنفذ حصى ثم ترق .
 بويقاته شائعة ، بسيطة ، قوسية الشكل .

٢٣٦١٦ - كُرْبِيْتِرْك *
 جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة السويات . انواعه
 المروفة سبعة . اطولها تراوح من ٦ الى ١٠ سم . اقربها
 حنطية او عمراء اللون تعلوها تارويق وزراكن سود . تيش
 حل الحوز والصمصاف والبتولا . ريقاتها تسدب
 الانجار الفتية والجذوع المقطوعة اليابسة وقد تنفخوا حتى
 اقتلاها .

٢٣٦١٧ - كُرْبِيْتِرْك الصمصاف *

Cryptorrhynchus lapachi (S). Cryptorrhynque
 des saules (F). Cryptorrhynchus lapachi (E).
 حشرة خافضة غاشية مؤذية من فصيلة السويات ورتبة
 صمدات الاجسمة . تألف المواق الربطة والمنافع . خنافسها
 تيش حل اوراق البت والحمض . ريقاتها خاشية تركب
 الحوز والصمصاف والحوز وتسدب الانجار الفتية والجذوع
 المقطوعة وقد تخلجها حتى اقتلاها || جسمها صغير القد ،
 يطول نحو ٨ سم . ثوبا احمر اللون تملوه فطوس متراكبة
 وتارويق وزراكن فيها الاسود والخطي والكسني والاصهب
 والاشقق الصنابي . رأسها صغير الجرم . عينها صغيرتان
 زباناها صرغانيان ، مرقطتان . ظهورها مذهب المخضر
 اللامع . خمداها متشابكة التحزير الخلفي القاطب ||
 لها جيل واحد في الحول . تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها
 الشتوية في اوائل نيسان وتبقى حتى اوائل الحول . تسرح
 في النهار تزر المكان مباحدا في تقرب تخلجها بتكها في
 خاء الجلول || البقعة عند بلوغها الادراك تمام تطلي نحو
 ١٢ سم . جسمها اهليجي الشكل ، مكور الرأس ، مذهب
 الطرف ، حنطي اللون اسود الرأس والشرج .

٢٣٦١٨ - كُرْبِيْسِيْس

Cryptolite
 هو نسلات السيرير الطبيعي ، يكثر ويوجد في الاديوت
 الاخضر .

٢٣٦١٩ - كُرْبِيْتِرْك

Cryptomérite (F).
 شجرة من الطقوسيات تعرف بالسوي ، اطباها .

٢٣٦٢٠ - كُرْبِيْسِيْس

Coreopsis (S).
 Coreopsis (F). Calliopsis, Ticksaed (E). Schöngelst, Wuzzenblums (D). Coreopsis (E). Calliopsis (F).
 جنس نباتات عشية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة ،
 منها البرية والزرينية . اوراقها لاقسية الشكل والاركانز .
 ازهارها زردية ، ثمانية السينات الملونة . بزورها
 مستطيلة مبطلة متوجة بسنين او حكتين او سرفشتين .
 اشهر انواعه الازينية ما ينج .

٢٣٦٢١ - كُرْبِيْسِيْس اَيْشِي *

Coreopsis elegans, C. tinctoria (S). Coreopsis élégant (F).
 نوع من الكريبيس ضرره عديدة ، فوارها اوانها ، جميعها
 اصحاب زرينية حيلة تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها
 متقابلة مفرشة . فروعها قدية الشكل ، لثاية او خاسية او
 سباحية المدد . فصلها مائل البشره حايق الخضار .
 وريساتها الزهرية ملونة الغلاب والبيانات ، قطرها نحو ٤ سم .
 ازهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٣٦٢٢ - كُرْبِيْسِيْس بَحْرِي

Coreopsis maritima (S). Coreopsis côtière, C. maritime (F).
 نوع من الكريبيس وهو بجلة زرينية مسرة تملو نحو
 ٣٠ سم . تألف الشطوط البحرية الدافئة . ساقها غليظة
 قصيرة متشعبة . اوراقها متقابلة قدية التفريش الضيق .
 وريساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد سباحية الشكل ،
 قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طول
 فصل الخريف .

٢٣٦٢٣ - كُرْبِيْسِيْس كَبِير الزهر *

Coreopsis grandiflora (S). Coreopsis à grandes fleurs (F).
 نوع من الكريبيس وهو عشية زرينية مسرة تملو من ٣٠
 الى ١٢٠ سم . اوراقها متقابلة مفرشة . فروعها قدية
 الشكل لثاية او خاسية المدد . فصلها مائل الصلحة العليا
 خلي السفلي . وريساتها الزهرية مكسبة قطرها نحو ٥ سم .
 طبها الى المسفرة ، ليناتها رباعية التفصيص ذهبية اللون .
 ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٣٦٢٤ - كُرْبِيْسِيْس مَحْرَج

Coreopsis coronata (S). Coreopsis couronné (F).
 نوع من الكريبيس وهو عشية زرينية حيلة تملو من ٣٠
 الى ٥٠ سم . ساقها نحيلة مستقيمة . اوراقها متقابلة كاملة
 فصلها اهليجي الشكل ، مقطوع القاعدة ، دمل الصلحة
 المائلة . وريساتها الزهرية مسر الغلاب . ليناتها
 برتقالية اللون حنطية الخطار . قناياتها سنائية مهدبة .
 ازهارها يستمر من محوز الى تشرين .

٢٣٦٢٥ - كُرْبِيْسِيْس نَجْمِي

Coreopsis stellata, C. major (S). Coreopsis étoilée (F).
 نوع من الكريبيس وهو بجلة زرينية مسرة تملو من ٦٠
 الى ٩٠ سم . ساقها وروعها مزينة الجاه . اوراقها خسية
 الاركانز ، ثلاثية التفريش المعني . فصلها خلي البشره .
 وريساتها الزهرية صفراء اللون كبيرة القد نجمة الشكل
 مستطيلة السينات الناشرة || ازهارها يستمر من محوز
 الى آب .



كُرْبِيْتِرْك



كُرْبِيْتِرْك الصمصاف



كُرْبِيْسِيْس اَيْشِي



كُرْبِيْسِيْس كَبِير الزهر

المشوائية. ازهارها خالصة او سداسية التركيب. ثمارها غلظلة الاشكال تكثر فيها الاستدارة. سؤذها لباي المادة المأكولة || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٣٦٣٥ - كرزوفيلم إفريقي ٥

Chrysophyllum africanum (S). *Chrysophylla africana* (F).

نوع من الكرزوفيلم منته البلاد الافريقية الاستوائية. ثمرته تملو نحو ١٢ م. ثماره مأكولة يفضية الشكل مقبوة القاعدة تحوي من ٣ الى ٥ حبات .

٢٣٦٣٦ - كرزوفيلم كيمبو ٥* ، كيميت ٥

Chrysophyllum calmito (S). *Chrysophylla calmita*, *Calmitier* (F). Common star apple (E). Echter Sumpfelbaum (D). *Crisofillo calmito* (I).

اشهر انواع الكرزوفيلم واعمها زراعة . ضروره الشائعة . خة . اشجارها تملو من ١٥ الى ١ م. سؤفها منتصبه ، مشقة البهار . اغصانها فارشة . قننها فروع قلنسوية الشكل . اوراقها متعاقبة اهليلجية . نصلها جامد النسيج ، اخضر الصغمة العليا ، خلى النفل ، مذهب الحمل . ازهارها صغيرة اللد ، يفضا اللون ، خماسية التركيب ، مستطيلة الاذن . ثمارها كروية الشكل حبيها حجم التفاح . قشورها مالسة ملوقة ، لباها جامد المادة متوسط الصلابة السكرية الزجة .

٢٣٦٣٧ - كرزوفيلم مكوكو ٥

Chrysophyllum macoucou, *Aubletia macoucou* (S). *Chrysophylla de Macoucou* (F).

نوع من الكرزوفيلم الزراعي . ثمرته تملو نحو ١٠ اثمار . ثماره مأكولة اجاصية الشكل واللذ ، برقالية اللون سداسية المبهات .

٢٣٦٣٨ - كرزوفيلم وحيد العجمة ٥

Chrysophyllum monopyranum, *C. alviforme* (S). *Chrysophylla monosperma* (F).

نوع من الكرزوفيلم الزراعي . ثمرته تملو نحو ٨ اثمار . ثماره وحيدة المبهة يفضية الشكل والحجم . لوها الى التيفسي العابق . لباها لذيق العلم عند الادراك التام .

٢٣٦٤٠ - كرزوكوم ٥

Chrysocoma (F).

هو ذنب لقط ، اطليه .

٢٣٦٤١ - كرزويكسه ٥

Chrysomyxa (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزحاليات يشين لبناجته الوردية وبمسائله الشفافة الرقيقة . طوبه الاذني يتكون ويتفسي على اعداد الصنوبريات حيث يلو كالحوصلات المرصوة بمزارة الصلغ على جانبها الى انواعه الاقتصادية المعروفة قليلة منها كرزويكسه الايصة وكرزويكسه المعسل .

٢٣٦٤٢ - كرزويكسه وردى ٥

Coreopsis rose (S). *Coréopsis rose* (F).

نوع من الكريسيس وهو عشبة زينة مصرة تملو من ١٥ الى ٦٠ سم . اوراقها متعاقبة لاطلة . نصلها مائل البشرة وسيد البرق يطول من ٣ الى ٧ سم . ويخرج من ١ الى ٣ م . رؤسها الزهرية صغر الطياف ، يفض السينات قنطرها نحو ٢ سم . ازهارها يستمر من تجوز الى آب .

٢٣٦٤٧ - كرزيتة ٥

Butyrospermum parkii (S). *Karité*, *Si* (F).

شجرة مشرة من فصيلة الطلحيات . منبتها البلاد الافريقية الاستوائية ، تكثر في سباسب السودان وفضيا والشاطئ العاجي والذهب والفرنسا والكامرون وتغاد والابونى || ساقها غلظلة منتصبه نخبة البهار الرطبة . اوراقها خمسة طرفية . نصلها سناني الشكل ، مستطيل اللق ، بارز العروق المدينة . ازهارها خمسة التجميع ، طرفية الارتكاز ، عشوية . ثمارها برقالية للذ مأكولة الباب تخضص حبيتين لوزيتين لهما يحوي من ٤٠ الى ٥٠ ٪ من المواد اللينة الجامدة المعروفة باسم الكريته وهي تستخرج من الورز بد تحميمه ونفشه .

٢٣٦٤٨ - كزيرة ٥

Carriéra (F).

هي التوار الصبي ، شجرة زينة ، اطليه .

٢٣٦٤٩ - كزير ٥*

Conus (S).

Cône (F). *Conus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاصل وفضيلة الكزيرات . انواعه المعروفة نحو ٥٠٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اصداها غروطية حمزلة قرنية الشبه باكرار الصنوبر . مرادها سنتة . اسنانها نبال صغيرة ذرية لسها ذراي مؤذ .

٢٣٦٥٠ - كزيتيم ٥

Chrysanthème (F).

هو القنحان ، اطليه .

٢٣٦٥١ - كزيتيم البر ٥

Chrysanthème à carène (F).

هو قنحان المروج ، اطليه .

٢٣٦٥٢ - كزيتيم مختصل ٥

Chrysanthème des blés

هو القنحان اللحي ، اطليه .

٢٣٦٥٣ - كرزويكس ٥* ، سيميريس ٥

Chrysanthrix (S). *Salmiris* (F).

جنس قزود امريكية من فصيلة السيديات . انواعه ٣ موطنها امريكة الوسطى اصحابها البرازيل والبنان وكولومبيا وبوليفيا والبيرو || اجسامها صغيرة اللذ . وشقة القوام . قوامها دقيقة متوسطة الطول . اذنانها مستطيلة نخبة . ازهارها متباعدة الاالوان الزرافية . شمورها ناعمة ، لينة وثيرة . تألف الاجراج والنايات . مرتها الاشجار دون الحفص . قوتها البرام والاوراق والحشرات والمصافير .

٢٣٦٥٤ - كرزوفيلم ٥

Chrysophyllum (S).

Chrysophylla (F). Star apple (E). Sumpfelbaum (D). *Crisofillo* (I).

جنس اشجار ومجهرات برية وزراعية مشرة من فصيلة الطلحيات . انواعه عديدة . اصلاها البلاد الاستوائية . سؤفها منتصب . صانها حلابية المادة . اوراقها اهليلجية مستطيلة . نصلها جامد الصغمة ، كثير العروق النخبة



كرته (١)



كرته (٢)

(الشرة والبردة والزهر)



كزير



كرزور يكس



كرزوفيلم كيمبو

٢٣٦٤٢ - كريزيوميكه الأيسية

Chrysomyxa abietis (S). Rouille des aiguilles de l'épicéa (F). Needle rust of the spruce (E). Fichtennadelrost (D).

فطر مجهرى يتطفل على اهداب الابنية فيلبها ويسبب سقوطها || مظهره الخارجى يقع منخفضة متناحية متجانسة صفراء اللون تظهر في أواخر حزيران على ظهور سيارب الاهداب ثم تتطور وتزحف وتصيب كل بقعة من البقع قاعدة لحويصتين مستطيلتين لونها الى الصفرة الزاهية تقومان على جانبي شجج الحب || هو مركب الابنية في جميع المواسم اما يفضل الاشجار الفتية التي تراوح اعمارها من ١٠ من ٢٠ سنة .

٢٣٦٤٣ - كريزيوميكه القفص

Chrysomyxa rhododendri, Uredo rhododendri, Acidium abietinum (S). Rouille vésiculaire du rhododendron (F).

فطر مجهرى يتطفل على الصل في المناطق الجبلية التي تملو سطح البحر من ١٠٠٠ م. وما فوق || مظهره الخارجى يتور مستديرة او بيضية الشكل تركب الصل على صفحتي الصل يقابلها على البهفلة العليا يقع بنفس الحجم لونها الى الجوزة ثم تتحول الى الحنفى ترفخ بشرة النسيج وتغيرها وتسبب جفاف الصل وسقوط الورقة .

٢٣٦٤٤ - كزونيئات

Conidæ (S). *Conidés* (F). *Conidæ* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وميزات الاجهزة . اجسامها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الطبقة الطليانية والبعض الآخر معاصر || اصداها حلزونة اسطوانية الشكل او غرومية . قرونها مستطيلة مفردة الحمار . اسفلها قرنية المادة || احرف اجسامها واشهرها الكريز والزناطة .

٢٣٦٤٥ - كريزيلى

Cresyl (F). *Cresyl* (E). سائل مطهر غروبي اللون يستخرج من قفطان القزم الحبري .

٢٣٦٤٦ - كزينة الحما

Astragalus peregrinus (S).

نبات يدهى اسطوخودوس رسال ، اطلبه .

٢٣٦٤٧ - كريفلون

Pomelo, Grape-fruit هو ليمون الجنة ، اطلبه .

٢٣٦٤٨ - كريكة

Carychium (S). *Carychium* (F). *Carychium* (E).

جنس حيوانات برية من الرخويات مميزات الارجل وفضيلة الحفشيات . انواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاراضي الجوزية والطليانية . انواعها المعاصرة منتشرة في جميع اصقاع العالم . تعيش في المواقم الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداها شبه مدنية الشكل ، حلزونة النصف الخلفي ، مستطيلة الانقباض .

٢٣٦٤٩ - كريكة

جنس نباتات بحرية مصرية من فصيلة البالياتيات . مهدا البلاد الحارة الاستراية . سوقها اسطوانية منتصبة حراطة تحمل في زواياها الاخير ومنه قبا بعض الاوراق المزدنة الكبيرة الصل وبعض الابر الكبيرة القند || حمارها

ماكولة الباب نافسة تقيد اللمة وتتشط الحقم . لشور انولها ما يتبع .

٢٣٦٥٠ - كريكة الاله

Carica candamarcensis (S). نوع من الكريكة ، مهدا جبال الاند الامريكية اغصها الوالطة قرب خط الاستواء . شجرتها تملو من ٤ الى ٦ امتار . ساقها غليظة . اوراقها مستطيلة الزناد . نصلها ساهي التفصيص ، متناحية التفريض ، بحري اللون ، ازرق المواج ، خلى الصفحة السفلى || ثمارها اهليلجية الشكل ، خضراء ، ناعمة الصرة الدبيبة . تقشرها عند نضجها يرتقالية اللون لا تقل سماكتها من ١٠ سم . لبها رخو المادة ، حامد اللون . بلورها بيضية الشكل ، سمراء اللون ، حريفة الطعم ، لاذعة . تقشرها ولهاها لؤلؤ طازية ومطبوخة . تتكاثر بالبذر ، ترب في الارربة الخفيفة المتوسطة الاندماج . تعيش على الساحل الباني .

٢٣٦٥١ - كريكة بيتا

هي البياض الزراعي ، اطلبه .

٢٣٦٥٢ - كريكة بنتاغون

Carica pentagona (S). *التفصيع*

نوع من الكريكة السبروتية الشائعة الزراطة . تجود وتشر في معظم البلاد الحارة ، لكبا تحفى الصبيغ ولا تتصلب درجة الصفر اكثر من بقعة ايام . ساقها منتصبة نحلة حريضة تملو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها خضراء التفصيص ، نصلها مالى البشرة على صفحتي ، زائداة ثلاثي التفصيع . ثمارها مقطوعة القاعدة ، مدببة الطرف ، ظهروها نحو ١٢ سم . طولها يراوح الى ٣٥ من ٣٠ سم . لبها حامض اللذاق ، ابيض اللون ، مستحب العرف . ترب وتؤكل مطبوخة ومصورة .

٢٣٦٥٣ - كريكة صفراء السكات

Carica chrysopetala (S).

نوع من الكريكة ، مهدا البلاد الامريكية الحارة . ساقها اسطوانية منتصبة تملو من ٣ الى ٦ امتار . اوراقها مستطيلة الزناد الثلاثي الاصلع . نصلها خاسي التفصيص ، متقارب التفريض ، بحري اللون ، مالى البشرة . ثمارها اهليلجية الشكل ، مقطوعة القاعدة ، ناعمة التمل ، ساهية الصلوع طول نحو ١٥ سم . لونها عند نضجها يراوح من الفسنى الى الاصفر المايق . لبها تالط الطعم مستحب العرف يؤكل مطبوخا .

٢٣٦٥٤ - كريكة منتصبة الزهرة ،

كريكة كزونييا

Carica cestriflora, Vasconcelia cestriflora (S).

نوع من الكريكة ، مهدا كزونييا ورفناطة الجديدة . ساقها تملو من ٣ الى ٥ امتار : اوراقها ساهية التفصيص خلية الصفحة السفلى ، غليظة الزناد . ثمارها حطرية العرف ، مستحبة اللذاق ، تؤكل مع السكر . لبها اصفر اللون ، بطيخي التركيب || تتكاثر بالبذر . ترب في الارربة الخفيفة العميقة الغور . تعيش وتشر على الساحل الباني .

٢٣٦٥٥ - كزيم

Dicholopus (S). *Carlama* (F). جنس طير من طوارق الساق . انواعها المعروفة قليلة الحدم تجمع بين التعلق والرو . اخلاقها اخلاق القنق وبهي قربة الشبه منه . موطنها امريكة الجنوبية . اجسامها



كريكة

كريكة (١)
(الورقة والزهرة)

كريكة (٢) (المرقة)

سفه مركب الخوص المتقابلة . كافوره ابطي الارتكاز ، صغير القد ، ينشق من طلمة متدلية ، ثمان جوزية الشكل ولقد ، يستخرج من جارتها لباب كالساغو متوسط الصنف .

٢٣٦٦٣ - **كَرْبُوت**
Créosote (F).
Creasote, Creasotum, Créosote (E).

سائل مطهر كاو حدم اللون فواح الرائحة يستخرج من قلعان خشب الزان . يستعمل في علاج مرض السل ولتسكين ألم الإنسان .

٢٣٦٦٤ - **كَرْبُوتِيلِين**
Caryophyllène (F).
Caryophyllin (E).
هيدركربور سائل يستخلص من عطر القرنفل والدارسيني والكينية . ثقله النسبي عند ١٥° سغ = ٠,٩٨٥ ، ويغل عند ٢٦٠/٢٥٨ سغ .

٢٣٦٦٥ - **كَرْبُوتُكَار**
Caryocar
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الكريوكاريات . انواعه المعروفة ثمانية منها البرية والزراعية والتربينية . سوقها منتصب ، رطبة ، فروعها ، اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل ، بعضها مأكول والبعض الآخر دهنى الالبوب يستخرج منه دهن نباتي يستعمل استهلاك السن او الزينة || اشهر انواعه الكريوكار السني والحسني .

٢٣٦٦٦ - **كَرْبُوتُكَار عَسْفِي**
Caryocar nucifera (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية وتربينية منها امريكية الجنوبية وتعيش في المناطق المعتدلة الحارة . ساقها فروعها ، اوراقها متقابلة . اثمارها ارجوانية سوداء اللوان يطقها حنار احمر زاهي . اسديتها عديدة مستطيلة ذمعية اللون . ثمارها عسفية اي جوزية مأكولة الصلآم .

٢٣٦٦٧ - **كَرْبُوتُكَار سَمْنِي**
Caryocar butyracé (F).

نوع من الكريوكار ، شجرة زراعية يستخرج من البوب ثمارها الجوزية مادة دهنية دسمة شاملة الاستعمال كسمن نباتي .

٢٣٦٦٨ - **كَرْبُوتُكَارِيَات**
Caryocaraceae (F). Caryocaraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منها سطم اصفرار امريكية الحارة والاسيائية . نباتاتها اشجار وشجيرات مستنصبة القالب ، اوراقها متقابلة . ثمارها جوزية الشكل والقشور ، مأكولة الالبوب الوافر المادة الدهنية || اشهر اجناسها الكريوكار ،

٢٣٦٦٩ - **كَرْبُوتِيلُز**
Caryotylae (F). Karyotylas (E).
الكريوتيلز انحلال نواة الحبيبة او الخلية .

٢٣٦٧٠ - **كَرْزَا ، كَرْزَا ، تَيْتَانُوس ، تَيْتَانُوس**
Tétanos (F). Tétanos (E).
شوهار ، قسَل
مرض بحيث خطر تقتبض منه العضلات وتتشنج . مبيه تسم المراكز الدماغية بتأثير ميكروب خاص يدهي قصية نيكلولايت قدخل الجسم من طريق الجرح .

٢٣٦٧١ - **كَرْب**
Nothoscordon (S).
Nothoscorde (F).
جنس نباتات بصلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه

واعناقها مستطيلة ، وروسيها كثيرة متوجة الجيا بكثرة من الزنن المنتصب النقيق . متاقبها قوية مذبة الملاحظ الهدية الحادة . اجتنبها مزيلة . سيقانها وارباعها رطبة . غزالها غالب الجوارح || اعرف انواعها واشهرها الكرم المتوج .

٢٣٦٥٦ - **كَرْبَمُ مُتَوَجَّ * ، تَلْتَلِقُ الْاَلْقَاسِي**
Dicholopus cristatus (S). Carliama huppé, Cigogne des serpents (F).

طائر من الكرم ، كبير القد ، طوله نحو ٨٥ سم . لونه الى الكهبة ، كل ريشة من جسمه تليها خطوط دقيقة متعرجة شهاد اللون زاهية . ريش رأسه وصفه الى الربعة السوداء المراج . اقبينه ابيض الاطراف . حلقه عينه كبريتية الصفار . زقده ازرق . متقاده ورسده حر || موطنه امريكية الجنوبية . يألف الحفصاب النخلة والموثق الكثرة الحشب الرقيق . قوته الخشرات والنظام والاقلامي ويخلف انواع اللآر والفرزان || يبدن في الاشجار القليلة الارتفاع . عشه مزيج من القصبان والحشائش المنوعة بالطين . اثناء قنص صيغته تحضنها نحو ثلاثة اسابيع || يألف حياة الاسر ويهين بسهولة مع سائر الطيور الدواجن .

٢٣٦٥٧ - **كَرْبَمَة**
Cordmia (F).

٢٣٦٥٨ - **كَرْبَمَت ، كَرْبَمَتَس**
Coryanthes (S).
Coryanthe (F). Helmet orchid (E). Holmbiluma (D). Coriantio (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة السطحيات . انواعه عديدة منها البرية والزراعية والتربينية . اصنافها المناطق الاستوائية اصعبها الامريكية . اوراقها لحمية . ازهارها جميلة الشكل كرمة الرائحة .

٢٣٦٥٩ - **كَرْبَمَة**
Oosphère (F). Oosphere (E).
البيضة النباتية الاقوية الى ان تمتد بالذكورية تصبح النواة . راجع خلية .

٢٣٦٦٠ - **كَرْبَمَة * ، تَحْلَلَةُ الْجَوَز**
Caryota (S). Caryote (F).

جنس نخل منته يمتد من المند الى الكونشئين وجزر الزايج . انواعه المعروفة تسعة اشهرها الكريوت المندوبية وكريوت سقمطر والشمشاع . جلعه منتصب لسوق المسترسمة الحيد . جريدها مستطيل القد ، غليظ الكرب . سفها ثنائي التركيب متقابل الخوص الاقواسي الشكل ، كافوره مستطيل النتح صغير القد . اثمارها وسيدة المسكن في طلمة واحدة .

٢٣٦٦١ - **كَرْبَمَة سَمَسْمَر**
Caryota rumphiana, Saguaster major (S). Caryote des Célèbes (F).

نوع من نخل الكريوت مهده جزر الزايج . جلعه منتصب الساق يعلو من ١٢ الى ١٥ م . سفه مركب الخوص يطول من ٥ الى ٦ امتار . ثماره جوزية الشكل ، صغيرة القد ، حاضرة اللحم ، حريفة . يزود لاستخراج جوار واستعمال جلعه الصلب .

٢٣٦٦٢ - **كَرْبَمَة عَسْفُودِيَّة**
Caryota sobollifera (S). Caryota sobollifera (F). Fish-tail palm, Sage palm (E). Nusspalme, Brennpalme (D). Palma carlota (I).

نوع من نخل الكريوت . مهده حصاب ويرتفعات ملقة وبليزيه . جلعه منتصب الساق يعلو من ٨ الى ١٢ م .



كريم متوج



كربم

٢٣٦٧٨ - كزبرة مزروعة * ، نقدك

Coriandrum maculatum (S). *Coriandre cultivée* (F). *Coriander* (E). *Echter Korlander* (D). *Coriandro*, *Erba cimicina* (I).

نوع من الكزبرة وهو نبات عشبي، لونه أخضر اللبنة والمتمثلة كأفراجه . ساقه دقيقة فراء . أوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاته مفردة ، غليظة النسيج . أزهاره خضراء التجميع ، صغيرة القد ، ودية اللون ، حامية المراج . ثماره من كزبرة الرائحة المسجلة ليل جفائها تصبح بعد الجفاف ذكية الرائحة المستحبة المرق .



كزبرة البر

Fruits du tamaris (F).

Fruits of the tamarisk (E).

هو ثمر الطراز . يقال انه طيب نقيه يلد الصدر والامعاء.

٢٣٦٧٩ - كزبرة

Cisticola (S).

Cisticole (F). Fan-tailed-warbler (E).

فصية هو الاسم المصري . جنس طير من فصيلة الحفليات انولاه المعروف ٢٠ احطائها العالم القديم . جميعها صغيرة القد ، انولاه الى العطفة السمراء ، ظهورها واجنحتها ملجمة بالاسود . قوائمها بيضاء الاطراف او ربادية . نحوها يفس . جوارشها ونحوها الى الشفرة . مثاقيرها وسبقها الى السرة || تألف المنافع والمراعي والحقل المزودة . قوتها الحرام والذباب والاساربع الصغيرة . تدن في الاذنان وفي الاضباب التي تملو سطح التربة او الماء من ١٠ الى ١٢ سم . عشها جراب يرمي الشكل . تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة . حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات لونها الى البياض الاخير تملو ماجة ودية او زرقاء اللون .



كزبرة البر الجبلية

٢٣٦٨١ - كزبان مبدل * ، فسكة

Cisticola schachalia (S). *Cisticole ordinaire* (F).

فسكة هو الاسم اللبناني . طائر من الكزبان ، صغير القد ، طولها تراوح من ١٠ الى ١١ سم . قوته يختلف عن ثوب جلده بالتشبه الاسود الذي يملو اواسط ريش الظهر فقط . احطائه حوض البحر المتوسط . يألف المنافع وضراف الاثمار والمراعي والحقل المزودة اغصها حول القنب ولاده الصفراء || الانثى تحضن ثلاث مرات في العام الواحد . حضنتها اربع بيضات .



كزبرة مزروعة

Pupe (F). Pupa (E).

عذراء الحشرات من ذوات الجنانين وهي كالخادسة للحرشيات والحورية للصفديات .

٢٣٦٨٢ - كزبد

Casuar (F).

هو الشحم ع من الفواكس ، اطليه .

٢٣٦٨٤ - كزورينة بيهية

Casuarina torulosa (S). *Casuarine torulosa*, *Filao toruleux* (F).

نوع من الكزورينة ساقها تملو من ٢٠ الى ٢٥ م . تقشرها فليظة صلبة كقشور البش . غراسيها دقيقة . فسنتها تجمع من ٣ الى ٥ بانقا اسطوانية الهرم . خلية البشرة . اكزانها خلية الجراحات الناشئة || تربى كزفاها ، في الارابة الخفيفة الرطبة الساحلية وقد لا تتأذى من القتر العابر .



كزبان مبدل

قليلة ملبها شريط وهضاب حوض البحر المتوسط . يصلها صغير القد مستطيل . اولواها قرصية الانتساب ؛ تصلها مستطيل الصفة الفضية المستوية . ثمرانها الزهري يملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ينتهي ببيصوان من الزهر الابيض الموشع بالوردي || انزهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٣٦٩٢ - كزبرة * ، كزبرة ، كسبرة

Coriandrum (S). *Coriandre* (F). *Coriander* (E).

جلس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الخيميات . انواعها ١٠ منها حوض البحر المتوسط . جميعها طيبة تستعمل في عدة تركيب وعلاجات . وهي هاضمة ، مقوية ، مضادة للصداع والتشنج تنفع من ضغط الدم وتصلب الشرايين ، تمنع الملش والخفقان وتحبس البخار من الرأس . ويقال ان قليها مع البساق يفيد الزطاري . صوفها دقيقة فراء . اولواها مركبة متعاقبة ، انزهارها صغيرة القد ، خضراء التجميع || اشهر انواعها الكزبرة الممرقة المزروعة .

٢٣٦٩٣ - كزبرة البير * ، شعر الحين ، شعر

الفول ، شعر الأرض ، وعصيف ، برشاوشان

Adiantum capillus veneris (S). *Adiante capillaire*, *Cheveux de Vénus*, *Capillaire* (F). *Maidenhair*, *Venus's hair*, *Capillaire* (E). *Capillarkraut*, *Frauenhaar*, *Venushaar* (D). *Adianto*, *Capel-veneris*, *Capovenera* (I).

لبات عشبي بري جلدوري معمر من السراخس البسيبيات . يكثر في المواقع الرطبة الظليلة . يقال ان منافعها الطبية عديدة انما احقق منها هو انه مرقق وقايس . يراود يقوي الشعر ويطول || اولواته تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم . زنادها اسود اللون ثنائي الانتساب وكل شبة منه تعمل اربعة فروع لآشبية الطول ، مروحية الترتيب ، كلبية الوروق المتسعة الاطراف .

٢٣٦٩٤ - كزبرة البير الجبيلية *

Polytrichum commune (S). *Polytrichum commune*, *Capillaire doré* (F). *Bear moss*, *Golden maiden hair* (E). *Echter Widerton* (D). *Politricon* (I).

نبات عشبي بري معمر من الطحالب يكثر في الاماكن الرطبة الظليلة . ساقه اسطوانية دقيقة مستقيمة . اولواته هدية متراكبة جلدية الارتكاز . ثمره جراب يوفي حالي يكمل الساق || وهو من النباتات الصحية يستعمل استعمال اقشاي لكنه يمتح على النوم .

٢٣٦٩٥ - كزبرة البير المكسيكية

Adiantum tenerum (S). *Capillaire du Mexique* (F). *Brittle maiden hair* (E). *Capillir Kraut* (D). *Capel-venera de Mexico* (I).

نوع من كزبرة البير وهو نبات عشبي طيب بري معمر ينبت في المواقع الرطبة في ظل الصخور والاشجار . يقال انه يمنع الامراض الصدرية ويضيق النفس . يستنصر منه شراب يستعمل ضد السعال .

٢٣٦٩٦ - كزبرة العسل

Pimpinella sanguisorbe (F).

هي البلان الهجام ، اطليه .

Pigamon jaune (F).

هي الثليب الاصفر ، اطليه .

هي الثليب الاصفر ، اطليه .

* كُزُورِيَّةٌ كُنْبِيَّاتِيَّةٌ *

Casuarina equisetifolia (S). *Casuarina à feuilles de prêle*, *Filao à feuilles de prêle* (F). *Beef-wood tree*, *She-oak*, *Swamp-oak* (E). *Kasuarbaum* (D). *Casuarina* (I).

نوع من الكزوريت ساقها منتصبه تملو من ٣٠ إلى ٤٠ م. ،
بناتها دقيقة مثلية رباعية التضلع . غلف مقدها ماله
البشرة رباعية التنسج . منبها البلاد الحارة . تزرع لصد
الرياح والسياح . ترطب في الأرض الساحلية الرطبة وتبيد
قرب الشطوط البحرية .

* كُزُورِيَّةٌ مُنْتَصِبَةٌ *

Casuarina stricta (S). *Casuarina dressée*, *Filao dressé* (F).

نوع من الكزوريت . ساقها وأغصانها منتصبه تملو من
٦ إلى ٩ أمتار . غراحيها غليظة ، صمغها تجمع من ١٠
إلى ١٢ بقلية . بناتها منتصبه غنمة . غلف مقدها
سداية اللتين والتخثيد || تألف المناطق الساحلية الرطبة
الداخلة .



كزوريت كنبياتية

Casuarinaceae (S). *كُزُورِيَّاتِيَّةٌ*
Casuarinacées (F). *Casuarinaceae* (E).

فصيلة نباتية وسيدة الجنس من ذوات الفلقتين . أنواعها
نحو ٢٠ جميعها أشجار منتصبه سريعة النمو عادمة الأوراق .
ترطب في المراتق الرطبة أعصها الشطوط البحرية . غراحيها
وبناتها اسطوانية الشكل والترتيب والانتظام . أنزهرها
الذكري قدي التجميع ، مستطيل الحجم ، اسطواني
الشكل ، زهره وسيدة السداة . أنزهرها الانثوي قدي
التجميع ، قصير الحجم ، كتيث الأزهار ، زهرته وسيدة
المبيض والقلم القصير . نائية السمة الخيطية المستطيلة .
ثمارها أكواز صغيرة رنية الشكل .

* كُزُورِيَّاتِيَّةٌ *
Xeromys (S). *Xéromys* (F).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة القارئات . أنواعها
قليلة موطنها بعض جزر المحيط الهادي . أجسامها مستطيلة .
طرفها الكامل يراوح من ٣٠ إلى ٤٠ سم . رؤوسها ذلقة .
أذنها كبيرة . جرائنها قصيرة . أصابعها خاسية . أطرافها
سادة || تألف الأدغال والحقل . قوتها المواد النباتية
هل اختلاف مصادرها والحشرات والديدان .

* كُنْبِيَّاتِيَّةٌ *
Parosaurus (F).

هي النابتات ، أطليها .

* كُنْبٌ *
Tourteau (F). *Cake*, *Oilcake* (E).
ما يبقى من ثفل بعد عصر البزور البعينة كالقطن
والسم واللسنت السوداني ولكنك الخ .. منظم يستعمل
كغلف للثياب . راجع جدول الملف .

* كُنْبِيَّةٌ *
هي الكزيرة ، أطليها .

* كُنْبِيَّةٌ ، كُنْبِيَّةٌ ، أُوْفَرُوَّةٌ ، قُسْطَلَةٌ *

Châtaigne (F). *Chestnut* (E).

ثمرة الكستنة أو القسطل أو الشاحيلوط وهي مأكولة ملدبة ،
لبها يحوي نحو ٣٠ ٪ من الفيتامين « ث » ونحو ٩٠
وسدة من الفيتامين « ب » ولحمها عناصرها الغذائية راجع
كستنة ملدولة .

* كُنْبِيَّةٌ *
Castanea (S). *Châtaigner* (F).

Chestnut-tree (E). *Kastanie* (D). *Castagno* (I).

جنس أشجار حرجية وزراعية من فصيلة السميليات.



كستنة مبذولة

أنواعها المعروفة ١٥ أقليمها البلاد المعتدلة الحارة . تنمى
بضخامة سوقها واستطالة أعمارها التي تبلغ بصفة قرون .
أغصانها داخلة . أوراقها عابطة ، متعاقبة ، معنقة ،
بسيطة . نصلها نافرة العروق المتزاوية ، مشارية الحافة .
أنزهرها وحيدة المسكن . أنزهرها قدي التجميع ، شباره
مستطيلة منتصبه ، كثيرة الأزهار الذكورية المتعاقبة ، قليلة
الانثوية السلفية الارتكاز ، الفردية أو الثنائية أو الثلاثية
التجميع التي تكثفها بعد التضلع والأصابع فلاة كثيفة
الشوك البدق تحسن الثمرة أو الثآير || ثمارها مأكولة اللب الباب
التشوي اللادة .

* كُنْبِيَّةٌ أَمْرِيْكِيَّةٌ *

Castanea dentata (S). *Châtaigner d'Amérique* (F).

نوع من الكستنة الحرجية والأزراعية البريوتية . مهدا .
امريكة الثنائية . تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . ساقها غليظة .
أوراقها تطول من ١٢ إلى ١٤ سم . وتعرض من ٤ إلى ٦
سم . نصلها منشاري الحافة ، أملط الصفحة العليا ، أزهب
الغفل على ظهرها || ثمارها صغيرة اللد مأكولة .

* كُنْبِيَّةٌ حُمْرَاءُ *
Pavle (F).

هي القسطل الحدي ، أطليها .

* كُنْبِيَّةٌ صِيْغِيَّةٌ *
Castanea duclouxii (S). *Châtaigner de Ducloux*, *C. de Chine* (F).

نوع من الكستنة الحرجية والأزراعية مهدا الصين . تملو
من ١٥ إلى ٢٠ م . ساقها غليظة متوسطة الضخامة .
أغصانها فاشرة ، أوراقها متعاقبة اللتين المنشاري
المهدب ؛ نصلها شمع الصفحة ، قليل العروق الغائرة ،
أملط البشرة عل صفحتها || ثمارها صغيرة مبطنطة
مأكولة .

* كُنْبِيَّةٌ مَبْدُولَةٌ * ، قُسْطَلٌ ،

قُسْطَلٌ ، شَاحِيلُوطٌ ، أُوْفَرُوَّةٌ

Castanea vulgaris, *C. sativa* (S). *Châtaigner commun*, *Marronnier* (F). *Sweet chestnut* (E). *Echte Kastanie*, *Kastanienbaum* (D). *Castagno domestico* (I).

نوع من الكستنة الحرجية والأزراعية المبدولة . فروجها
كثيرة البدد ، منبها الشرق الأوسط وأوروپة الجنوبية والغربية .
شجرتها تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م . ساقها ضخمة عظيمة .
أغصانها غليظة قائمة . فروجها جاسلة ، قنثيا قارضة .
أوراقها أليلبية مسنة الحافة تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم .
وتعرض من ٧ إلى ٩ سم . نصلها قنثيا القاعدة . ذرب الطرف .
بارز العروق المتساوية الإبعاد ، لونه أل الخضر الاصفر .
أغصانها صناعية تفوق الستينان صفاً وصلابة وطناً .
ثمارها مأكولة غذائية . قشورها كستنية اللون لامة الصفحة
الخارجية خلية الداخلية لبها إلى البياض اللثني . نصلها
الكبادي يفيد أن ١٠٠٠ غرام من لباب الكستنة المحلولة
بالماء يحوي ٢٧,٧٦ ٪ من الوحدات الغذائية المنهضة ،
تتريفاها :

١,٥٦ ٪ مواد ازوتية

١,٧٢ ٪ مواد دهنية

٢,٤٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وأن ١٠٠ غرام من لباب الكستنة المشوية يحوي ٥٦,٤٠ ٪

من الوحدات الغذائية ، تتريفاها :

٢,٤٩ ٪ مواد ازوتية

٢,٢٥ ٪ مواد دهنية

٤,٩٦ ٪ مواد هيدروكربونية

وان ١٠٠ غرام من دقيق لباب الكستنة الخفيف المسحوق يحوي ٨٨,٩٩٪ من الرسيدات الغذائية، تعريفها :

٧,٥١٪ مراد ازوية

٥,٦١٪ مراد دهنية

٧,٥٨٧٪ مراد هيدروكربونية

اقلها البلاد الجبلية المعتدلة الحرارة. وفي غرب في الارضية الخفيفة العميقة الفور المشبعة بالعصر الربلي. وقد تنمر وقصب في الاربة البليوية المتوسطة الانساج لكنها لا تنمر كثيراً فيها. وهي تخشى الاربة الكلسية لان الكلس لا يوافق مزاجها الجسموري || تنكأ بالبر وقد تزور البذور اما في مستقرها مباشرة او في الشتل الى ان يبلغ ارتفاع النصب نحو ٢٠٠ سم. وقد يكون ذلك بعد البذر بستين فنخل اذ ذلك الى مستقرها.

٢٣٦٩٨ - كَسْتَنَة هِنْدِيَّة

الكستنة الهندية واو قرو الحسان يسقط الفرس ، ثلاثة اسماء لشجرة واحدة تعرف بالقندلي ، اطله .

٢٣٦٩٩ - كَسْتَنَة بِاتَالِيَّة Castanea crenata (S). Châtaignier du Japon (F).

نوع من الكستنة الحرجية والزراعية . مهدا اليابان . تملو من ١٠ الى ١٥ م. ساقها غليظة متوسطة الضخامة . افضانها قائمة . اوراقها صغيرة القد ؛ نصلها مرتفع الجانب كبير العروق الناشئة الاطراف ، لونه الى الخضرة الصفراء تملوها لمة سفراء || ثمارها متوسطة القد مأكولة .

٢٣٧٠٠ - كَسْتُونِيَّة Xestobium (S).

Xestobie, Vrillette (F). جنس حشرات صغيرة من فصيلة الغفريات . اناوله قليلة البد . رقاتها مؤذية تنخر الخشب وتعلب . اعرفها واعملها كستونة الخشب .

٢٣٧٠١ - كَسْتُونِيَّة الْخَشَبِ * ، غِفْرِيَّة الْخَشَبِ

Xestobium rufovillosum, X. tesselatum (S). Xestobie brunâtre, Vrillette opiniâtre, Horloge de la mort, Vrillette damier (F). Death watch (E). Bunzwürflicher Nagekäfer (D).

نوع من الكستونية طويلاً براوح من ٦ الى ٩ م. ثوبها سطلي . نمشة كوسلها وظهورها صفراء اللون || رقاتها مؤذية تنخر معطر انواع الخشب اليابس والمصنوع ان في الطبيعة او ضمن المنازل والمخازن .

٢٣٧٠٢ - كَسْتُونُ hor الحارود ، اطله .

Castor (F).

Porte-musc (F).

٢٣٧٠٣ - كَسْتُونُ

في ايل المسك ، اطله .

٢٣٧٠٤ - كَسْنَج Ravalement (F). Trimming (E).

قطع فروع الشجرة بنية تجديد شياها .

٢٣٧٠٥ - كَسْدُولَة Cassidula (S).

Cassidule (F). Cassidula (E).

جنس حيوانات من الرخويات مهديات الارابل وقصيلة الخضفيات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة البد اعطانا الهند ، بعضها قازب يعيش في المناطق التي تنكأ فيها احراج الشورى ، وبعضها بحري يعيش في رمال

٢٣٧٠٦ - كَسْمَر Fraction

كسر العدد . ج. كسور وكسورات .

٢٣٧٠٧ - كَسْمَة Pampille

الريش الابيض المجمع تحت ذنب الطائر .

٢٣٧٠٨ - كَسْمَرَة الْحِمَاوِي هي الشاترج ، اطله .

٢٣٧٠٩ - كَسِكَال * Quisqualls (S).

Quisque (F). Creeper (E). Sonderling (D). Quisque (S).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الاطليجات . اناوله اربعة اصنافها بعض المناطق الحارة الاسوية والافريقية . جميعها شجيرات عارية طول من مترين الى عشرة امتار . اوراقها متقنة متقابلة اطليجية . اثمارها متفردية التجميع طرية الارتكاز . اثمارها جميلة الشكل مستطيلة الانابيب يكثر فيها الابيض والاحمر والوردي . يزورها طليعة طاردة للدود .

٢٣٧١٠ - كَسْكُوس Couscous (F).

الكسكوس حيوان لين من الجرابيات الشاجرات يدعى كَسْتَنَجَر ، اطله .

٢٣٧١١ - كَسْكُول * ، كَسْكُول * Cassiculus (S). Cassicle (F). Cassiculus (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبيات . انواعه المعروفة عشرة جميعها من طيور اسويكة الوسطى والجنوبية . تألف الغابات ولا تقترب من الاماكن الآتية . نظامها الحياتي جماعي . فوجها يد من ٢٥ الى ٥٠ زويماً || اجسامها مغطاة طول من ٤٠ الى ٥٠ سم. متناحها غمرولية ذرية . رؤوسها متوسطة يتنازع قنقبي في الجاه وليس في قم الكؤوس . اجنحتها معتدل الطول . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . الواها تختلف مع الانواع إما يكثر فيها الاسود الخلف الاماكن || قوتها الحشرات على اختلاف فضائلها والثار والحبوب || اعرف اناوله واشهرها كسكول المكسك .

٢٣٧١٢ - كَسْكُولُ الْمَكْسِكِ * Cassiculus melanictus (S).

Cassicle du Mexique (F).

نوع من الكسكول . يكثر بجموده في المكسيك . يألّف الغابات . طليحه الحياتي جماعي . فوجه يد من ٢٠ الى ٣٠ زويماً || جسمه ابيض الشكل يطول نحو ٤٥ سم. ثوبه الى السواد اللامع يملو مزاج اخضر . تقوّمه جزوية القرن . هامش جناحه الى السرة . متقاده الى السرة الزينية . قائمته وغاليه الى الليرة القامة || قوته الحشرات على اختلاف فضائلها وانواعها والثار والحبوب والبنور || يدخن عشه في الاشجار الكبيرة الدالحة لان الفوج بكاسله يدخن في ذات الشجرة . الاثنى تحضن وسعها من يعضين الى ثلاث يعضات بينا الاكبر يعض لها الفداء .

٢٣٧١٣ - كَسْكِر * Excaecaria (S).

Excécaire, Excécario (F).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تربينية من فصيلة



كسوة الخشب



كسوة



كسكول



كسكول المكسك

الزيتية الطبية النافعة. وريقاتها حشوية الشكل والتركيب، متنامية الإزتكاز، بتنية اللون. أزهارها هامة، سفلية التجميع، قصيرة السبلة، يبهض اللون أو وردية || جميع أنواعها طفيلية، وحواليها جلودر الصنوبر والسرو والمائل والستديان.

٢٣٧٢٢ - كَسِيدِيَّات
Monotropaceae (S).
Monotropacées (F). **Monotropaceae (E).**
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة الفلقات. أجناسها ٤ وأنواعها ٢٠ منها البلاد المتعددة المنشرة نحو الحارة. معظمها طفيلي يعيش على جلودر الصنوبريات والسوليات. جميعها عشية. سوقها فردية الالتشاب عادمة الفروع. وريقاتها حشوية النصل. أزهارها سفلية هامة.

٢٣٧٢٣ - كَسُوف
Eclipse
 ظاهرة طبيعية تتميز باحتجاب ضوء الشمس عن الأرض وقد تحدث عندما يتوسط القمر بين الأرض وقمر الشمس. ولا يحدث الكسوف إلا إذا كان القمر في الحاقق وقد يكون كلياً أو جزئياً. فالكل يكمن عند احتجاب كامل قرص الشمس عن البصر والجزئي يكون عند احتجاب بعض قرص الشمس.

٢٣٧٢٤ - كَسِيَّة ٥ ، كَسِيد ٥
Polder (F)
Polder (E).
 اسم يطلق على الأراضي المنخفضة الممتدة من سواحل بلجيكية إلى هولندية وبولندية وقد صار استعمالها بعد تخصيصها بالمواجز وزعها من مساوي مياه البحر.

٢٣٧٢٥ - كَسِيد أَخْضَر ٥ ، كَسِيد الْخَرْشُف ٥
Cassida deflorata, C. viridis (S). **Casside de l'artichaut, C. vortis (F).** **Tortoise beetle (E).** **Artischokenschildkäfer, Grüner schildkäfer (D).**
 حشرة صغيرة القند من فصيلة النشاريات، جسمها يغطي الشكل فطاطخ، طولها يراوح من ٧ إلى ٨ سم. ثوبها أخضر اللون أسفح الخواج، مدنها أسود. لها جيلان في الحول. ريقاتها مستقيمة السبلة القرون الشرجية المنمكة على الظهر. تركيب هي وريقاتها أوراق الارضي شوكي وجميع أنواع الحرفش تلتصق بالشرة وتمشي على خلايا النسيج.

٢٣٧٢٦ - كَسِيد الشُّوْكَار ٥
Cassida nebulosa (S). **Casside nébuleuse, C. de la betterave (F).** **Clouded tortoise beetle (E).** **Nebiliger schildkäfer (D).**
 حشرة صغيرة مبططة من فصيلة النشاريات طولها يراوح من ٥ إلى ٧ سم. ثوبها إلى الصفرة الخطية الباهتة. غمداتها منقطان بالأسمر والأبيض. لها جيلان في الحول وهي تركيب مع ريقاتها أوراق الشوادر فتتفرخها وتمشي عليها.

٢٣٧٢٧ - كَسِيد نَبِيل ٥ ، كَسِيد السَّرْمَقِيَّات
Cassida nobilis (S). **Casside noble, C. des aisolacées (F).** **Casside nobilis (E).**

فروع من الكسيد، حشرة غاضلة مؤذية. موطنها يمتد من الشرق الاوسط إلى اوروبا وأفريقية الشمالية. تألف المزارع التي تكثر فيها السرمقيات. خنافسها وريقاتها تعيش على نصال الاوراق || جسمها صغير القند، يغطي اللون، عذوبود الصفحة العليا، يطول من ٦ إلى ٨ سم. ثوبها الملوي إلى الأخضر الاصفر يطوي في منطقة درز الظهران

الفربيقيات. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منها المناطق الاستوائية الاسيوية والامريكية || سوقها مالة بحرية اللون. اوراقها متعاقبة ممتعة. نصلها يرمية الشوزن. ازهارها سنبل التجميع || يستخرج من لحائها بالحز عصابة لينة يختلف تركيبها ويغوصها مع اختلاف الانواع. منها تيج البشر وتؤذي البين ان احابها ومنها طية تنقي الدم والاعلاط ومنها المشادة لداء السفلس ومنها الصناعية التي يستخرج من ثمارها مادة عذنية يبهض اللون شائعة الاستعمال المنزلي || اشهر انواعها الخمسة التالية :

***Ex. sebifera (S).** **كسيد الدهن**
Ex. syvestica (S). **كسيد حرجي**
Ex. spinosa (S). **كسيد شالكة**
Ex. hibernica (S). **كسيد فتوي**
Ex. agallocha (S). **كسيد يغشي البصر**

٢٣٧٢٨ - كَسَّان
Bradype, Al, Paresseux (F).
 هو الداب، اطلبه.

٢٣٧٢٥ - كَسَم
Habitus (F).
 هو الامود والباللة، اطلبه.

٢٣٧٢٦ - كَسْمُورِيَّة ٥
Cosmologie (F).
Cosmology (E).
 الكسولوجية علم قواميس العالم عامة أي لفظة معقلات العالم المجردة.

٢٣٧٢٧ - كَسْمُورِيَّات ٥ ، صَقْرَاءُ الْهَرَقِ
Xanthorrhiza (F).
 جنس جنيات برية وزييتية من فصيلة الشقيقيات. انواعها قليلة. سوقها فرماة تطول من ٧٠ إلى ٢٥٠ سم. اوراقها زنادية، متضيقية، مركبة، ثلاثية أو خمسية اللويقات المفردة الصفراء الدروق. ازهارها عقدوية التجميع، ابطية الإزتكاز، صغيرة القند، بتنية اللون، خمسية البتلات الصغيرة السنائية الشكل || ازهارها يستمر طول فصل الصيف.

٢٣٧٢٨ - كَسْمُورِيَّات ٥ ، صَقْرَاءُ الْقُرُون
Xanthocera (S). **Xanthocère (F).**
 جنس اشجار ونجيرات برية وزييتية من فصيلة السبنتيات. مهدها الصين، تتميز بالذرة قرنية الشكل مفردة الرحيق تنصبت بتلات الزهر. انواعها المعروفة قليلة العدد. سوقها تطول من ٢ إلى ٨ امتار. اوراقها عابلة متعاقبة وزية التركيب. ازهارها عقدوية التجميع. ازهارها متراكبة الاوان، كبيرة القند، نظامية، خمسية الفسل والبتلات، خمائية الاسدية. ثمارها تفاحية الشكل والقند غير مأكولة.

٢٣٧٢٩ - كَسْتَج
 جنس من الكماء ينبت في الوبال للذيد جداً (السان).

٢٣٧٢٠ - كَسُو هو الشار، اطلبه. **Cousso**

٢٣٧٢١ - كَسُوب ٥
Monotropas (S). **Monotrope (F).** **Ice plant, Indian pipe (E).** **Fichtenspargel, Monotrope (D).** **Monotropas, Erba da cera (I).**
 جنس نباتات عشبية برية طفيلية من فصيلة الكسوبيات. منها البلاد المتعددة الحرارة. انواعها نحو ٨ سوقها فردية لينة. لها صداع، صارت عادمة اللون تجفد بعض المواد



أنواعه المعروفة سبعة موطنها بعض مناطق أستراليا . تألف الحراج والبراري . ملجئها الحياتي جماعي . فوجها بدء من ١٠ الى ٢٠ زوجاً . أجسامها متوسطة الحجم ، قريبة الشبه بالصدرة وبالزجاج . مناقبها كبيرة ضلعية . أثوابها الى السمرة القاتمة يتخللها تبقيع ابيض . قريبا الحشرات والزروع والنظام والفئران والتساقير الصغيرة . طياعها مرسة كالصدرة . تتميز بالجمارة والشرابة ومن عادتها انها تسفد قصصها في اشواك الاشجار لتصدى لها حينما يليب لها . اعرف انواعه واشهرها الكسيكان الغرب .



كُسيك كُفَراني

كُسيك كُفَراني
كُسيك كُفَراني

٢٣٧٢٢ - كُسيكان مُعُزَّب * Cracticus torquatus (S). Cassican destructeur (F).

نوع من الكسيكان . موطنه شمالي أستراليا . فوجيه بدء نحو عشرة أزواج . يألف الانفصال والحراج المبشرة الاشجار . يصير افرس انواع الكسيكان وانهماء . جسمه معتدل الحجم يطول نحو ٢٧ سم . رأسه مستقيم الشكل . منقاده كبير وضلع . ذنبه متوسط الطول . مقطوم الطرف ، مستدير الزوايا . فيه ابيض اللون ، رأسه وظهوره وجناياه وذنبه الى السواد اللحي . عنقه وصدره وانفيكه الى البياض الاشر . قوائمه الى السمرة القاتمة . يذعن عنه في الاشجار الرقيقة . الاثنى تحضن من ٤ الى ٥ بيضات بيضا الذكر يتن لها الغذاء .

٢٣٧٢٣ - كُسيوز Xylose (F).

هو الخشوز ، اطلبه .

٢٣٧٢٤ - كُسيوية * Cassiop (S). Cassiopeta (E).

نبات معقود التعريف على اسم الملكة لفرافية كسيوية . جنس نباتات نجمية معمرة من فصيلة الخنثليات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من ثوبت البلاد الحارة . سوقها قصيرة فراء تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . اوراقها ابيدة ، صغيرة ، سنانية اتصال الجامدة الخلية البشرة . ازهارها فردية ، متدلية ، جلبةجية الشكل ، يضاء اللون او وردي . تنويرها يستمر من نيسان الى تموز .

٢٣٧٢٥ - كُسيوة * Vesture (F).

الكسيوة مجموعة الاعضاء الثانوية كازنبي والشوك والمناعس التي تلتصق بقشور النبات او جلود الحيوانات وذيها .

٢٣٧٢٦ - كُش * Androcée (F).

هو جهاز التذكير في النبات ، راجع جش .

٢٣٧٢٧ - كُشاة Défaut apparent (F). Visible défaut (E).

هو العيب الظاهر .

٢٣٧٢٨ - كُشاح Emprunte du fer rouge (F).

سمة بالانار في موضع الكشع وقد تخلق في كل سمة بالانار في اي موضع كان من الجسم .

٢٣٧٢٩ - كُشت Pueraria (S). Puderaria (F). Knollengrass (D). Pueraria (I).

جنس نباتات ليلية عارشة معمرة من فصيلة الفربيان القرفاشية . انواعه ١٠ مهددا الشرق الاقصى من الهند الى اليابان . جلدها غليظة درنية . سوقها تملو من ممر الى ١٠ أمتار . اوراقها عابطة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات الكبيرة .

جدة قاطبة للؤلؤة اللون لشاهها ماجة ذببية . ثوبها السفلي وبندبا الى السمرة . لها جيل واحد في الحول . تنهر الحشرة الجبلانة في اواسط نيسان . تسرح في النهار . تناشر الاثنى مع الككن بعد ظهورها بأسرع . وينتفج الككن بعد متحه ينحر عشرة ايام . البرقة عند بلوغها الكال الجسوري تليل نحو ١٠ سم . ثوبها الى الخضار الاصفر تملو بقبعة يضاء في مقدم الصدر . رأسها مكور الشكل . اسود . سكبنا الشرجية تحمل ثلاث زوائد منها اثنتان حولوانتان متمكفتان على الظهر واحدة سفلية جاسية . سرهما علوي الفتحة يلقى للبراز على الزايفتين . طور الاكمال يستمر من ١٢ الى ١٥ يوما وينتفضي لاصفاً ينصل النبات المائل بدء ان تملق فيه البرقة بزلاتها السفلية .

٢٣٧٢٨ - كُسيمة Pelote (F). Pad (E).

تضخم جلدي يحصل في اطراف بعض الحيوانات . وتضخم في الزوائد الخلية عنه بعض الحشرات .

٢٣٧٢٩ - كُسيك * Cassius (S). Cassique (F). Cassique (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبييات . انواعه المعروفة ٢٣ جميعها من طيور امريكة الجنوبية والوسطى . تألف الغابات وبعضها يقترب من الحدائق . نظامها الحياتي جماعي . اسرارها متفاوتة العدد منها الانواع التي لا يتجاوز عددها ١٠٠ زوج ومنها الارباب الوفرة العدد . اجسامها بين المتوسطة والكبيرة . اطرافها قراوح من ٢٦ الى ٤٠ سم . مناقبها مخروطية الشكل . مستعرة القواعد ، حادة الاطراف . رؤوسها متوجة يتنازع تخلفة الاحجام . اجنتها معتدلة الطول . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . افيها مختلفة الالوان ، يكثر فيها الاسود . اناثها اصغر قدراً من ذكورها . قوتها الثأر والحروب واليوترو والخبرات المختلفة الانواع والاجناس . اعرف انواعه واشهرها الكسيك كُفَراني .

٢٣٧٣٠ - كُسيك كُفَراني * Cassius cristatus (S). Cassique huppé (F).

نوع من الكسيك يكثر وجوده في البرازيل والفريان حيث يدعى «يايو» . يألف الغابات ويقترب من الحدائق والجنان والحقول . سره يراوح بين ٣٠٠ و ٥٠٠ زوج . جسمه كبير القد يطول نحو ٤٠ سم . قزخته كبيرة تمتد من المنطق الى القنن . ثوبه الى السواد الاسم الاسف . افيكه وذنبه الى الخمر . وقال ذنبه اجانية صفراء الين اما القزلان فالى السواد الاسم الاسف . منقاده اصفر اللون . حذقة صنة زرقاء . ساقه الى السواد الاسف الماوج . من ميزاته ان يتقلد ويردد الاصوات التي يسمنها فريد صياح الديك وثقاة الغن وصهيل الخيل ونبيق الحبر وصييح البقر ... قوته الثأر والحروب واليوترو والخبرات . يذعن عنه في الاشجار الرقيقة الكبيرة الاخضار القارية الاقفية الاستاد . عنه جراب مستطيل يملق في التنفس ويحك بالالايات والفتش اغصها الايات الباهرة والبركا . وقد يربد على الشجرة الواحدة من ٢٠ الى ١٠٠ عش . مدخلها جانبية عليا . الاثنى تحضن من بيضتين الى ثلاث بيضات بيضا الاكر يتن لها الغذاء .

٢٣٧٣١ - كُسيكان * Cracticus (S). Cassican (F).

جنس طير . من الجوامث سنيات المناقير وفصيلة الفربيان .



كُسيكان عرب

Reaumuria (S). Réaumurie (F). كَيْفُونَة - ٢٢٧٥٢

جنس نباتات نجمية برية معمرة من فصيلة الالديات .
أنواعه المعروفة خمسة ، منها بلاد الحارة اخصها
الصحراوية || سيقانها شديدة القصير ، كثيرة الفروع الجالسة
والمنفرجة . أوراقها متعاقبة ، متقاربة ، ضخائية النصال
أو لحميات ازهارها لاقسيات الانظام والارتكاز ، منها
المعقودية والمثلثي والاطفي والطر في السطيل الزناد القصيرة .
اشهر انواعه الثلاثة التالية :

R. mucronata (S).

كَيْفُونَة حَوْيَة

R. palestina (S).

كَيْفُونَة فلسطينية

R. hirtella (S).

كَيْفُونَة مهدية

Ribes (S).

كَيْفُونَة - ٢٢٧٥٣

Grossellier (F). Currant-bush (E).

جنس نباتات جنسية معمرة من فصيلة الالديات . أنواعه
نحو ١٥٠ مظهرها بري وبمفهما زراعي يزرع لثماره
المأكولة . أوراقه متعاقبة ، معتقة ، كفية ، فلجية ،
مسنة . ازهاره معقودية أو فردية التجميع . ثماره عنبية
سكرية وحامضة أو مرة . اشهر انواعه ما يلي .

Ribes rubrum (S). Grossellier rouge, G. à grappes, Castillier (F). Garnet-berry, Red-currant bush (E). Johannisseere, Rote Johannisseere (D). Ribes, R. vulgare, R. a grappoli (I). كَيْفُونَة أَحْمَر* ، كَيْفُونَة عُنُقُودِي

نوع من الكشش، ضروبه الزراعية كثيرة العدد جميعها
جنيات فروعها تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقه ثلاثية
أو خماسية الفلق المسننة . متناخلة الزهرية تجمع نحو ٢٠

زهرة لونها الى الخضار المشع بالاحمر . ثماره متصلة اللد ،
كروية الشكل ، حواء اللون ، للذلة الطعم ، مستحبة
المعرف || يبيد في جميع الاربية لا يخفى سوى المندجة
الموطاب . يتكاثر بالتمليط وينشر حل الافئدة الحاملة .

Ribes nigrum (S). Grossellier noir, Cassalier (F). Black currant bush, Quinay-berry (E). Schwarze Ribisel (D). Grossularia nera (I). كَيْفُونَة أَسْوَد* ، هَلْمُسُور

نوع من الكشش البري والزراعي . ضروبه قليلة العدد
تتميز ببندها الخنثية الطرية الصفراء اللون المبيضة حل

الاوراق والافانان والثمار . سيقانها تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم .
أوراقه خماسية لاقسيات التفتيش اللتين المنشاري .
ازهاره معقودية . ازهاره حواء اللون خلية القنابات .
ثماره كروية عطرية سوداء اللون .

Ribes grossularia (S). Grossellier à maquereau, G. épineux (F). Gooseberry bush, Cat berries (E). Stachelbeere, Stachelbeere-Ribisel, Stachelburen (D). Grossularia rosca, G. dei giardini (I). كَيْفُونَة شَالِك*

نوع من الكشش البري والزراعي الشالك الملبول . تكثر
زراعتي في انكلترا . ازهاره فردي الانتساب غسي التجميع ،
ضمت تجميع من زهرتين الى خمسة ازهار . ثماره رفيعة الشكل

مجموعة اللون مجزعة بالأخضر . وهي تتميز من المربطات
الصعية الشائعة في ألمانيا وانكلترا وهولندا وبلجيكا .

Grosselle (F). Currant (E). كَيْفُونَة - ٢٢٧٥٧

ثمرة الكشش .

ازهارها معقودية التجميع ، حواء اللون او زرقاء . ثمارها
حنثية . بزورها كالكوياب || اشهر انواعه ما يلي .

Pueraria tuberosa (S). كَيْفُونَة دَرَنِي - ٢٢٧٥٠

Pueraria tuberosa (F).

نوع من الكشش الزراعي ساقه منتصبه تملو نحو ١٠٠
سم . أوراقه منقسمة . ازهاره زرقاء اللون ، حنابلة مستطيلة
عنقية الفواصل تخضن بعض البذور . جلوره دنية
لها شوي المادة . بلوره وجلوره مأكولة تطبخ
كالكسوليا والبطاطا .

Pueraria hirsuta (S). كَيْفُونَة يَابَانِي - ٢٢٧٥١

Pueraria hirsuta, Koudzou (F).

نوع من الكشش الزراعي البروتي . ساقه تطلو نحو عشرة
امتار . فروعها خلية الماء ، وريقاتها مغلية الشكل
تطلو وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم . ازهاره الى الزرقعة
البفسجية الزهرية بالابيض . معقوده الزهرية بطول نحو ٢٥
سم . حنابلة مستطيلة ، زباد الغلاف || جلوره دنية
مأكولة . سيقانها ضخائية نسجية . بزورها وأوراقها طفيفة
يحمو من النباتات التي تزرع في المواقع المعرصة لعمت
لأنها تتشبه بالترية وتنشج انجرافها .

Huppe (F). Crest (E). كَيْفُونَة - ٢٢٧٥٢

شكل من اشكال القزعة .

Lichen (F). كَيْفُونَة الْعَجُوز - ٢٢٧٥٣

هي الحزاز ، اطليه .

Marquage au fer rouge (F). كَيْفُونَة - ٢٢٧٥٤

الكشش : الكي بالشار .

Galtonogamie (F). كَيْفُونَة كَشْر* - ٢٢٧٥٥

Galtonogamy (E).

هو في الحيوانات الاليفة والداجنة التصاب بين اقارب
من اصل واحد .

Haricot mungo (F). كَيْفُونَة - ٢٢٧٥٦

هو الماش ، اطليه .

Décorçage, Décorçation (F). Decorcication, Stripping off bark (E). كَيْفُونَة ، كَيْفُونَة - ٢٢٧٥٧

ازالة لحاء الاشجار او سقوطها طبيعيا وانتزاع قشور بعض
الثمار والبيزور كالجزور والوزر والاورز .

Emoussage (F). كَيْفُونَة الطُعْلَب - ٢٢٧٥٨

Removal of moss from trees (E).

نزع الطعلب من لحاء الاشجار .

Niquette (F). Nicking (E). كَيْفُونَة - ٢٢٧٥٩

الكشش في الخيل : اتواء في صيب الذنب .

Constat (F). كَيْفُونَة ، مَعَانِيَة - ٢٢٧٥٠

كَيْفُونَة - ٢٢٧٥١

كَيْفُونَة الخُجَارِيَة - ٢٢٧٥١

Désoperculation (F). Uncapping (E).

هو رفع الغطاء الشمعي من عين الشاهد عند جني العسل .



كشش احمر



كشش اسود



كشش اسود



كشش شالك



كشيشة التين



كشيشة



كشوش زكي الرائحة



كشوش فلسطيني

- Or. luteus (S). Orbe jaune (F). **كشيشة صفراء**
Or. aureus (S). Orbe dorée (F). **كشيشة ملهية**
Or. roseus (S). **كشيشة وردية ، بخرية ، بخرية**
Orbe rose (F).

٢٣٧٦٧ - كشيشة
Vicia fulgens (S).
Vesce brillante (F).
نوع من الباقليات وهو نبات عشبي حولي بري وريسي. ساقه
فرداء عارضة تملو من ٦٠ سم. ٢٠٠ سم. ساقه مستقيمة
ملشحة. أوراقه مركبة ، وريقاتها شفعية تعد ١٦
الى ٢٤. ازهاره عقودية التجميع. سداسية التصفيف ،
حراء اللون ، فضية اللونج اللامع || ازهاره يستمر من
أيار الى تموز .

- ٢٣٧٦٨ - كشوش ، كشوش ، كشوش ، كشوش**
Cuscuta (S). Cuscuta (F). Dodder (E). Selda (D).
Cuscuta, Carpaterra (I).

جاء من الكشوش في لسان العرب :
« هو الكشوش فلا اصل ولا ورق
ولا نسج ولا ظل ولا ثمر »
جنس نباتات طفيلية من فصيلة المحموديات. انواعه المعروفة
نحو ٨٠ معظمها امريكى النبات. جميعها من النباتات
المؤذية الماعدة الورق. ساقها مستقيمة ، فرداء ، كشيشة
التجميع ، غميطة الشكل ، صفراء اللون او شقراء ، تلتف
حل حاضيتها وتقتبب فيها مرافقها المماسية فتسترها نسجها
وتحيثها. ازهارها صغيرة الحجم بيضاء اللون او وردية .
أصفر أنوعه الشرقية والاروية ما يقع .

- كشوش السمر ، الصبيون**
C. epithymum, C. minor (S). Cuscuta du thym,
Petite cuscuta, Epithym (F).
كشوش الكتان C. epilium (S). Cuscuta du lin (F).
كشوش التفل C. trifolii (S). Cuscuta du trèfle (F).
كشوش زكي الرائحة C. suaveolens (S).
Cuscuta à odeur suave (F).
كشوش عربي ، شرين C. arabica (S).
Cuscuta d'Arabie (F).
كشوش خيطي C. racemosa (S). Cuscuta grosse (F).
كشوش فلسطيني C. palaestina (S).
Cuscuta de Palestine (F).
كشوش كبير C. major (S). Cuscuta grande (F).

- ٢٣٧٦٩ - كشيشة** شمة كلية القصب .
٢٣٧٧٠ - كشيشة صوت الحية مجلجدا .

- ٢٣٧٧١ - كطري ، كطري**
Dandrocitica (S). Dandrocitica, Pie vagabonde (F).
Dendrocitica (E).
كطري هو الاسم المحدث . جنس طير من الجوارث وفصيلة
الغرابيات . انواعه المعروفة عشرة موطنها الحد . تألف
الحراج المبهمة الاشجار . ملجئها الحيالي حامي . جماعاتها
قليلة العدد . قوتها البلور والحبوب والتار واغشتر ||
اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٨ الى ٤٦ سم . بما فيه
الذنب الذي يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم . تتميز بأذنانها
المستطيلة الشبه سهمية الشكل وبألوانها الخسطة القاتمة
الميلقة بالاسود والاحمر والاشهب .

- Cassia (F). **كشيشة سوداء**
Black-currant (E). **ثمرة الكشيش الآسود**.

٢٣٧٥٩ - كشيشيات
Ribésiées, Grossulacées, Grossulariées (F). Gros-
sulacées (E).
سبب من فصيلة الباقليات يشغل الكشيش والربياس
وبغيرهما . اجتماعه وانواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع
الاصقاع المعتدلة المنتشرة نحو الباردة من العالم القديم
والجديد .

- ٢٣٧٦٠ - كشيشة**
Androsacs (F).
هو الاندروزاس ، اطلية .

- ٢٣٧٦١ - كشيش**
Guérîte (F). Shelter (E).
٢٣٧٦٢ - كشيش
Truffe noire (F).
هو الكرم الاسود ، اطلية .

٢٣٧٦٣ - كشيشة
Kuehneola (S).
جنس فلور مجهرية من فصيلة الساميات ، يتميز بمشاكله
الزبدية التجميع التي تركب فصل الاوراق حل صفحاتها
المليا . فمائله صفراء اللون قلدية التجميع والشكل . ذكاته
عديدة متراففة . مسامه الاساسية شفعية التركيب ، وباعية
البريدات || انواعه المعروفة حتى الآن قليلة ، منها كشيشة
التيين وكشيشة القطن .

- ٢٣٧٦٤ - كشيشة التيين**
Kuehneola ficl, Physopelia ficl, Uredo ficl (S). Rouille
du figulier (F).

نظر مجهري يتطفل حل اوراق التيين فيؤذيها ويهيء الى
نمو الاثمار ونفج النار || مظهره الخارجي بقع مبهمة
صفراء اللون تركب فصل الاوراق حل صفحاتها السفلى
تقتسب جفاف التجميع ويؤذي ثم الاثمار الباكر الذي
يؤذي نمو الشجرة ويؤثر نفج النار || يكافح باستعمال
سائل بوريد الحليل ١٪ عند ظهور عوارض الوباء وبند
ذلك باسويين .

- ٢٣٧٦٥ - كشيشة القطن**
Kuehneola gossypii, Uredo gossypii (S). Rouille
du cotonnier (F).

نظر مجهري يتطفل حل اوراق القطن فيؤذيها ويسبب
سقوطها الباكر || مظهره الخارجي بقع صفراء اللون مبهمة
او متلاصقة تركب فصل الاوراق حل صفحاتها العليا
تقابلها حل الصفحات السفلى حالات بنية تمرقل سير التلغ
تفذل الاوراق بند ان تقضي حل نسجها التي تلوي وتموت.
يكافح باستعمال احد الفواطير التناسية الانتكاز الضعيفة
التركيز .

- ٢٣٧٦٦ - كشيشة**
Orobus (S).
Orobe (F). Orobe, Bitter vetch (E). Bergerbe (D).
Orobe (I).

جنس نباتات عشبية برية ممرنة من فصيلة الباقليات
الفراشية . انواعها نحو ٤٠ ساقها فرداء مستقيمة . ازهارها
معدنية يجرسها النحل . ثمارها سنية . بزودا مستدرة .
اشهر انواعها :

- كشيشة ريمية** Or. vernus (S). Orbe printanière (F).
كشيشة رطاه Or. variegatus (S). Orbe panschée (F).
كشيشة سوداء Or. niger (S). Orbe noire (F).

وصفته وأصل صدره وذنبه إلى السواد اللامع . قفنه قفري
الريش الاسود الارزق المراج . ظهره متساك إلى الجؤوة .
قوامه وأباهره إلى السواد المطروق بالأحر . سائر ريش
جسمه إلى الحمرة النارية . اثناء أقل تلوناً ولُمة ۥ يألف
القفص ويضاهي الحسون في التفرية .

٢٣٧٨٥ - كُفْرٌ مَبْدُولٌ *

Chrysomitris spinus (S). *Tarin commun* (F). *Common siskin* (E).

نوع من الكُفْر ، موطنه يشمل الشرق وأروبة وبعض مناطق
أفريقية الشمالية . يألف الجبال والبلاد الباردة في الصيف
ويجوب غابات وحدائق المناطق المعتدلة في الشتاء . وهو
صغير اللد ، جميل القرب يطول من ١١ إلى ١٢ سم .
الذكر منه متوج الرأس بالاسود . ظهره إلى الخضار الاصفر
يطول تجنيم أسمر . جناحه إلى السواد يمتزجها غطان
اصفران . حصره وزوره وصدره إلى الصفار الاصفر .
عقه أسود . منقاره سنطلي الجسم أسود الملمط . حذقة عينه
كستنية اللون ، ساقه إلى الوردية . الانثى أكثر بياضاً
وأقل حمرة واسوداداً . اما رأسها فإلى الخضار الالكهف
بدلاً من الاسود . اثناء تبويض وتحقق مرة واحدة في العام
وقد يكون ذلك في الوتيرة الاولى من حزيران ۥ وهو يألف
القفص بسرعة ويدين بسهولة .

٢٣٧٨٦ - كُفْرِيَّيْ ٥

Botrytite (F).
تعت تعريفه يطلق على ما كان شكله كزهرية القزديط
أو كالمعقود القصير المستدير .

٢٣٧٨٧ - كُفْرِيَّة ٥

Toile d'araignée (F).
هي الشح ، وأرجه .

٢٣٧٨٨ - كُفْرِيَّة ٥

Pézize (F). *Peziza* (E).
جنس فطور مقعرة من الكنديات . أنواعه عديدة منها
واحد يعم الاقتصاد الزراعي يدهى الكعكة الجرابية .

٢٣٧٨٩ - كُفْرِيَّة جِرَافِيَّة ٥ ، أَلُورِيَّة ٥

Peziza vesiculosa, *Aleuria vesiculosa*, *Ectocephalum
finetarium* (S). *Pézize vésiculeuse* (F).
فطر يعيش على المواد العضوية النباتية والحيوانية ۥ عسلاته
كبير اللد مركب من سدائ غليظة قدسية الشكل ملهقة
الحافة . قطر براوح من ٣ إلى ٩ سم . مواجه الخارجى أخير
خلى . سطحه التنكي امس البشرة داكن اللون الخشن
اضرار قائمة على ما يتلف من شتول تخلفها من التربة عند
شق طريقه نحو النور .

٢٣٧٩٠ - كُفْرِيَّات ٥

Pezizaceae (S). *Pézizacées* (F). *Pezizaceae* (E).

فصيلة فطور من رتبة الزقيات . اجناسها وألوانها عديدة
جميعها مقعرة ، بعضها عادم اللق . معظم اجناسها يعيش
على المواد النباتية والحيوانية المتحللة . منها الأنواع كبيرة اللد ،
لحية المصقلان ، ما كولة ۥ أشهر اجناسها الكعكة والاستيوله
والسركوسينا والاولتيدا ، الخ .

٢٣٧٩١ - كُفْر ٥

الكرم : « شوك ينسبط له ورق كبار امثال الذراع كثيرة
الشوك ثم تخرج له شمع وتظهر في رؤوس شعبة هنات
امثال الزاح يطيف بها شوك كثير طوال ، وفيها وردة
حراء مشرفة تجربها التنسل وفيها حب امثال الصفر الا
انه شديد السواد » (اللسان) .

٢٣٧٩٢ - كَيْطَامَة

Canal souterrain (F). *Underground duct* (E).

القناة غير الماء ملهقة ومقيبة تحت الارض .

٢٣٧٩٣ - كُفْر ٥

Carène (F). *Keel* (E).

كل اخمده يارز يملو احد اعضاء الحشرة أو الزهرة .
ويهم من دهان قارب وزورق .

٢٣٧٩٤ - كُفْرَان ٥

Capsules surrénales (F). *Suprarenal capsules*, *S. bodies* (E).

غدد فوق الكلا .

٢٣٧٩٥ - كُعْب ٥

Nœud (F). *Knot* (E).

المقعدة ما بين الانبوبين من القصب والقنا . ويقبل الكعب
هو طرف الانبوب الناشئ . ج كويوب وكعاب .

٢٣٧٩٦ - كُعْب ٥

Malléole, Talon (F). *Malleolus, Heal* (E).

هو عتب الرجل .

٢٣٧٩٧ - كُعْبُ الْفَرْكَال ٥

راجع سكايبوزا حقلي .

٢٣٧٩٨ - كُعْبِيَّة ٥

Nœud (F). *Knot* (E).

الكعيرة : حفلة انبوب الزرع ونحوه . ج كمار .

٢٣٧٩٩ - كُفْرِيَّيْ ، كُفْرِيَّيْ ٥

Radial

٢٣٨٠٠ - كُفْرِيَّيْ ٥

Capsule

هو الجرو ، اطلية .

٢٣٨٠١ - كُفْرِيَّيْ ٥

Capsulaire (F). *Capsular* (E).

تعت تعريفه يوصف به ما كان شكله كالكعبور .

٢٣٨٠٢ - كُفْرِيَّيْ ٥

Pirula (S). *Pirule* (F). *Pirula* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات سدنيات الاربيل
وفصيلة الخنثويات . انواعها المعاصرة المرفقة عديدة منتشرة
في المحيط الهندي والبحر الاحمر ۥ اصداها شبه اجاصية
الشكل ، رقيقة ، سريعة اللط ، كبيرة القويوات المستطيلة
القاطبة ، صغيرة الاعقاب الملونة اللدبية ، جملة الالوان
المنتشرة ۥ أشهر انواعها الكعكة الثنينة (*Pirula ficus*)
التي يكثر وجودها في البحر الاحمر .

٢٣٨٠٣ - كُفْر ٥

Chrysomitris (S). *Tarin* (F). *Siskin* (E).

جنس عصافير صغيرة اللد نائمة من فصيلة الشرشوريات .
انواعه المرفقة ٨ اولها متداخلة الالوان المركبة المتباينة . تألف
اذاها مستعرضة ذلقة ، مناليعها غروطية قصيرة . تألف
الغابات ويجاري الماء . تجوب البلاد في طلب الرزق والمضيف
والشح ، قوتها يزور النباتات البرية ونبوي الاوراق
والخضراوات الصغيرة على اختلاف فصائلها وانواعها .
تتمش في الاشجار الكثيفة اخضا السرو والصنوبر . اناها
تقع من ٣ الى ٥ . يبيضات تحضنها وحدها ١٢ يوما .
أشهر انواعها المبدول والقنبري .

٢٣٨٠٤ - كُفْرٌ قُفْرِيَّيْ ٥

Chrysomitris cucullata (S). *Tarin rouge à tête
noire* (F).

نوع من الكُفْر ، موطنه امريكة الجنوبية يكثر في البرازيل
وفنزويلا . طوله براوح من ١٣ الى ١٤ سم . رأسه وزوره



كعنة



كُفْر مَبْدُول



كعنة جرابية

الى الكسني الاحمر المواج . ملهبا ورواجها الى السرة الحالكة || طور الاكمال يشمر نحو ١٦ يوما وينقضي في الجفلة او في التربة حيث تنفس السرة ملتحقة بجلباب من الطين .

٢٣٨١٧ - كَفَّاشَة
Cautionnement (F).
Security (E).

هو العقد الذي يلتزم به الكفيل نحو الدائن المكفول له . وهو ايضا الدويمة المرتبة سواء كانت اوراقا مالية ام عقودا تستعيد تأمينا لدين احتمالي .

٢٣٨١٨ - كَفَّاشَة ، ضَمَان
Garantie (F).
Guaranty, Warranty (E).

شهادة خطية من البائع يان ما يبيعه من بلد وامددة وادوية وادوات وغيرها حائزة على التركيب المتفق عليه .

٢٣٨١٩ - كَفَّاشَة الْفَكْرِي
Ducreire
هو ان يلتزم الوسيط دفع عن المشتري الى البائع اذا لم يفعل الشاري ذلك .

٢٣٨٢٠ - كَفَّاشَة الْقَسَم
Caution juratoire (F).
Juratory security (E).

قسم قمتره الحكمة بمثابة كفالة .

٢٣٨٢١ - كَفَّاشَة قَامُولِيَّة
Caution légaie (F).
Common bail (E).

هي الكفالة التي تقدم تنفيذاً لنص القانون .

٢٣٨٢٢ - كَفَّاشَة قَضَائِيَّة
Caution judiciaire (F).
Judicial security (E).

هي الكفالة التي يجب تقديمها تنفيذاً لحكم المحكمة .

٢٣٨٢٣ - كَفَّة
Limite du feuillage (F).
Limit of the foliage (E).

كفة الشجرة : متنبى حدود دوحها حيث تنقطع اوراقها .

٢٣٨٢٤ - كَفَّة جَنُوبِيَّة
الكفة الجنوبية كوكب .

٢٣٨٢٥ - كَفَّة شَالِيَّة
الكفة الشالية كوكب .

٢٣٨٢٦ - كَفَّر
Bitume
هو الحجر الفروي ، راجع حر .

٢٣٨٢٧ - كَفَّرِيَّة
Keempferia (S).
Keempferia (F).

جنس نباتات جلمورية دقوصية معمرة من فصيلة الزنجبليات . انواحه نحو ٢٠ منبها المناطق الحارة . اوراقها كبيرة الله ، قرصية الانتشاح يتوسطها شراخ تملو زهرة كبيرة ، جميلة الشكل ، متباينة الالوان || جذاميرها طيبة يستخرج منها مواد ناعولية شديدة الفاعلية .

٢٣٨٢٨ - كَفَّان
Selaginella (S).
Sélaginelle (F). Resurrection plant (E). Auferstehungs-pflanze (D). Selaginella (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخلدريات . انواحه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات البلاد الحارة والمتدلة . سوقها نخيلة مدادة فرما . فرصها منتسبة فناء تكسوها الاوراق الصغيرة المترتبة الحرشية الشكل ،

عينها زيمتان . شيفافا صغيران ذويان . فكاهما كبيران مجهزان بشفاف حادة . جرانزا كبيرة مسطيلة . بطنها يضي الشكل ، سطلي اللون تملو نمشة سمراء واديع فقط سود || تألف البراري والمواقع النطلة . قوتها الحشرات والذباب . تسرح في الليل . ماراها سنة صغيرة قلنسوية الشكل تنسجها عند سوق النبات . يهاها الشفوي يشمر نحو خمسة أشهر تقريبا في مكتبة صلمية تنسجها بين الحياجرة ونحتها || تعتبر من الدويبات النافعة .

٢٣٨١٥ - كَفَّاشَة تَرَاوِيَّة
Calymnia trapezina, Cosmia trapezina (S).
Calymnia trapézoidale, Cosmie trapézoidale (F).
Calymnia trapezina (E).

فراشة من فصيلة الضفليات حرشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اروبة . فراشتها جولة قوتها رقيق الازهار . سرفها غاضلة تركيب اوراق الازهار الوريفة || جسمها يطول نحو ١٣ سم . بطنها قراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم . رأسها مستد الجرم ، نفاق الجبهة . عينهاا كبيرتان نافرتان . زباناها غيطيان . ملاسها نخيلة . مرشفا مستد الطول . جوشها وبطنها الى الخفي الامصر المواج || روشناها الامامية الى الخفي الاكلفت تملو مشعة عنابة ونفطان مفرشان اسمران . روشناها الخلفيان الى الخفي الامصر المواج يطوق حنار تني ينتهي بالامصر || لها جيل واحد في الخيل . تظهر الفراشة في ايار ويني حتى تموز . تسرح في الليل وتبيت في النهار || الانثى تلقي الحكن لطعا لامتلاوية الشكل تنلفها مادة غريبة تنسجها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٨ سم . جسمها مالمس اللشراء مستد القمم ، مستطيل المخفر الذي يبعد كسرب اللقطة . ثوبا الى البني الامصر تملو غطوط صفر مفرضة . رأسها كسني اللون . ملهبا ورواجها الى السرة القاتنة || طور الاكمال الذي يشمر من ١٥ الى ١٧ يوما وينقضي في التربة حيث تنفس السرة على عمق ٣ او ٤ سم . ملتحقة بجلباب خفيف من الطين ينقل عند انطلاق الفراشة في ايار .

٢٣٨١٦ - كَفَّاشَة مُوَاطِئَة
Calymnia affinis, Cosmia affinis (S).
Calymnia complice, Cosmia complice (F).
Calymnia affinis, Cosmia affinis (E).

حشرة من النسيقات حرشيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . سرفها غاضلة تعيش على اوراق السديان || جسمها صغير الله يطول نحو ١١ سم . بطنها نحو ٢٩ سم . رأسها الى الخفي . عينهاا كبيرتان . زباناها غيطيان . ملاسها دقيقة . مرشفا مستد الجرم . جوشها وبطنها الى الخفي الامصر المواج || روشناها ، عند الشقين ، الى الخفي الاكلفت تملو في الزوج الامامي ماجة صنيابة وضطوط سمر مفرضة ويقعدان الى الطلعة || لها جيل واحد في الخيل . تظهر الفراشة في حزيران ويني حتى آب . تسرح في الليل . تماثل يمد ظهورها بنحو ٤٥ يوما وتمتد الحكن لطعا مسطيلة الشكل على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الكمال الجسدي تطول نحو ٣٤ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالمس اللشراء . ثوبا الى الطلعة يملو مواج اخضر وضطوط سود مفرضة يمتثلها من الجانبين نقط غبراء اللون . رأسها



كَفَّاشَة تَرَاوِيَّة



كفريّة



كفمان

٢٣٨٣٨ - كُتُوبُ * Cactus, Plectolophus (S).
Cacatois, Cacatois (F). Cockatoo (E).

جنس طير من الببغاء. أنواعه قليلة العدد جميعها متسلسلة أصنافها فسيحة الأجزاء تمتد من الهند إلى جزر الزابنج وأستراليا. أجسامها كبيرة القدر. أظفارها إلى البياض الناصع. طوارها كبيرة فائقة لأنها يختلف باختلاف النوع، يراوح من الأبيض إلى الوردي والأصفر إلى وهي هنية الخلق تعيش في القفص وتقتبس العلم والكلام.



كففة مدادة

٢٣٨٣٩ - كُتُوبُ الطَّيَّان * Leomophicus clemetidis (S).

حشرة من الككجيات طويلة يراوح من ٢ إلى ٣ سم. قوياً إلى الخطي تملو مابة جزوية. كويلها حاد التسنين. زباناها صولجانية مهدبة || تعيش على سوق الطيَّان بعد يبسها.



ككج

٢٣٨٤٠ - كُتُوبُ المِخْزَن * ، كُتُوبُ سورينام Oryzaephilus surinamensis (S). Silvain (F). Saw-toothed grain beetle (E). Getreideschmalkfer (D).

حشرة من الككجيات قوياً إلى الخطي ذات جسمها مستط الشكل بطول نحو ٣ سم. كويلها مسن الحافة. زباناها صولجانية مهدبة || تركب مع رقاتها جميع الحبوب الخزونة والآبار الخفيفة والسكاكر والخبز. وقد تقوس وينيد رقات الككجندرا (Calandra).

٢٣٨٤١ - كُتُوبُ مُنْقَطَعَة * Uleiota planata (S).

حشرة من الككجيات جسمها مستط مقطع. طولها يراوح من ٤ إلى ٥ سم. قوياً إلى الصلبة يملو مواج قائم. كويلها إلى السرة ثنائي التسنين الطرفي الامامي. زباناها خيطية، مستطيلة مهدبة. || تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية اخضتها للتدبير.



ككجية الطيَّان

٢٣٨٤٢ - كُتُوبُ Cucujidae (S).
Cucujidae (F). Cucujidae, Flat bark beetles (E). Rindensckifer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة. اجسامها وانواعها عديدة اصنافها العالم. جميعها من الخنافس الصغيرة المستطيلة الشكل. قوياً الاستشارية غشوية أو صولجانية مركبة من ١١ فاصلة. أوسافها خاشية المقل || تعيش بين الاخشاب ويقت القشور وفي مخازن الحبوب حيث تفترس ما تقوى عليه من المزارع والغلات الصغيرة.

٢٣٨٤٣ - كُتُوبُ * Cucujidae (S).
Cucujidae (F). Cucujidae, Flat bark beetles (E). Rindensckifer (D).



ككجية الخازن

٢٣٨٤٤ - كُتُوبُ * Cucujidae (S).
Cucujidae (F). Cucujidae, Flat bark beetles (E). Rindensckifer (D).

مرض فتاك يصيب غرزة الأنوب، اطلبه

٢٣٨٤٥ - كُتُوبُ * Coccoloba (S).
Coccoloba (F). Coccoloba (E).

جنس الجبار وهجيرات برية من فصيلة البيلجيات. انزاهه للمروقة نحو ١٦ منها المناطق الاستوائية الامريكية. تتميز بصلاية ومناعة اغشائها الصامدة || أشهر انزاهه ما يتبع.



ككجية مغلطة

٢٣٨٤٦ - كُتُوبُ أَزْهَب * Coccoloba pubescens (S). Coccoloba pubescens, Boit de fer (F).

شجرة عطية دائمة تسلم من ٢٠ إلى ٣٠ م. خشبها احمر

الزيتونية اللون || تزود لثريين يستعملها الزمارون في صناعة ارياش وبقاات الزهر.

٢٣٨٤٩ - كُتُوبُ * Croupe (F).
هو الزود، اطلبه.

٢٣٨٥٠ - كُتُوبُ * Gléchome (S).
Gléchome, Gléchome (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الشفويات. انواعها قليلة بعضها طبي. سوقها لاقامية الشكل منها للمادة والمتنصة. اورثها متقابلة معنفة، تسلمها مستدير الصفحة المشادية الحافة. انزاهها ابطية الاركانز مختلفة الالوان منها الابيض والازرق والارجواني والبنفسجي. تعيش في المراعق الرطبة وفي الاقنية والسليجات.

٢٣٨٥١ - كُتُوبُ مَدَادَة * ، تِلَابُ أَزْهَب * Gléchome hederacea (S). Gléchome hederacea, Herbe de St. Jean, Rondelotte, Terrestre, Lierre terrestre (F). Ground Ivy, Hedge maida (E). Echter Gundermann (D). Corona di terra, Erba di San Giovanni, Edera terrestre (I).

لوع من الكففة المبلولة وهو نبات عشبي طبي بري معمر. ساقه تسلم نحو ٣٠ سم. اورثها بجيلة الخسار الموضح انزاهه ضمية التجميع، نحاسية، زرقاء اللون.

٢٣٨٥٢ - كُتُوبُ القَدَم * Palmipèdes (F).
Palmipeds (E).

رتبة من الطير تنتمي إلى قسم الجائحات، فصالها واجنتها وانواعها كثيرة العدد تتجمع إلى أربع رتبيات :
شاملات الكفوف منها البجع
صفحيات المنائر منها الوز والبط
طريلات الريش منها القلروس
مدجات الريش منها البطريق.

٢٣٨٥٣ - كُتُوبُ * Kéfir, Képhir (F).
Kefir, Kefyr (E).

مشروب كحولي حامض العلم يستحضر من مضارة اللبن بعد تخثيرها بجراثم فطرية خاصة تمتد من نشاط الحامض اللبي.

٢٣٨٥٤ - كُتُوبُ * Caution, Fidéjousseur (F).
Caution, Surety (E).
هو الذي يلتزم للدائن مع المدين الأصلي بتنفيذ الالتزام إذا لم ينفذه المدين.

٢٣٨٥٥ - كُتُوبُ * Garant (F).
Guarantor, Warrant (E).
هو الملتزم بالكفالة أو الضمان.

٢٣٨٥٦ - كُتُوبُ التَفَقَّاتِ التَّضَامِيَّة * Caution judicatum solvi
هو الكفيل الذي يغضن دفع التفقات التضامية.

٢٣٨٥٧ - كُتُوبُ مُتَضَامِيْن * Caution solidaire (F).
Binding on several caution (E).
هو الكفيل الذي تتألف للدائن من سن المطالبة بتجريد المكفول فاصح موقفه من الدائن موقف الشريك المتضامن في الدين.

طوله نحو ١٠ سم. وبسطه نحو ٣٠ سم. رأسه شبه مخروطي: عيناه صغيرتان، ماحتان. خنثاه، مقطوعتان، مقوستان. سباله متكلف مستطيل. أذناه مستقيمتان، كبيرتان. جناحاه عريضان. ذيله مدرج في النشاء الجليدي || يألف البيوت والكهوف والمغاور القريبة من مجاري الماء. يعيش جماعات متوسطة العدد. الذكر لا يفرق إلا في زمن الكرم. مرة في الحول || مسرعه يستمر من النقص إلى الجوع. قوته الحشرات على اختلاف أجناسها وأنواعها.

٢٣٨٥٥ - **كلادة***
Chelodina (S).
Chelodina (F). Chelodina (E).

نوع من السلاحف القاذبة المقترنة تنتمي إلى فصيلة الحسبيات. تعيش في المياه العذبة وحمل صفات الأنهر. قوتها الأسماك والرخويات والصفادع والوزغ والسحالي والحيات || جسمها يطول نحو ١٠٠ سم. منها ٤٢ سم. فراس والفتق رأسها مبسط الشكل، ذلق الخلع. صفها أسطواني مستطيل، ذنبا جذع. ذيلها شبه يشي الشكل، معتدل الإحديدياب، ويتكبر من ٢٥ فترة لامتسارية الحجر، لونه إلى السمرة الصفراء الكدرية || موطنها بعض مناطق أمريكة الجنوبية || لحما كاعن المصنف، ما كويل من بعض قبائل تلك البلاد.

٢٣٨٥٦ - **كلاد يون***
Cladium (S).
Cladium (F). Marsh shear-grass (E). Schneidegras (D). Panicastrella di padule, Serrazo (I).

جنس نباتات برية عشبية معمرة من فصيلة السدييات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطائها العالم. تألف المنافع والمواقع الرطبة. سوقها دقيقة قرصية التفرع، مستطيلة السليانيات، تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم || تستعمل في تغليف الخيم لأنها آمن وأبقى من قش الزروع.

٢٣٨٥٧ - **كلاركيا، إكلركية**
Clarkia (S).
Clarkia (F). Clarkia (E). Clarkia (D). Clarkia (I).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الإخندريات مهدعا البلاد الأمريكية. أنواعها قليلة جميعها صغيرة القد تزرع للزينة. أوراقها متعاقبة. أزهارها فردية التجميع، محورية الارتكاز، رباعية البتلات والسمات، ثمانية الإسدية. أحرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٣٨٥٨ - **كلاركيا رشيقة***
Clarkia elegans (S). Clarkia élégante (F).

عشبة تريبنتية سبوتية حولية تملو من ٨٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها أحليجية ذائقة، نصلها مسنن الحافة، مجري البون. أزهارها كبيرة القد عادية أو مكسية، بتلاتها مستديرة أو كلفة الشكل، مسنة الحمار التجميع. ألوانها تختلف مع الضروب منها الوردي والبفسجي والأبيض. أزهارها يستمر طوال الصيف.

٢٣٨٥٩ - **كلاركيا تحيفية**
Clarkia pulchella (S). Clarkia délicate (F).

عشبة تريبنتية سبوتية حولية تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ضروبها عديدة. أوراقها سنانية ذرية، نصلها حلالي البشرة. أزهارها كبيرة القد، منها البادية والمكسية، بتلاتها لاقامية التخصيص. ألوانها تختلف باختلاف الضروب منها الأحمر والأجواني والبفسجي والأبيض. أزهارها يستمر من موزران إلى أيلول.

الون شديد الصلابة نام الرقة يقاوم النشع يدرق بنشب الحديد.

٢٣٨٤٧ - **ككلوب كينو***، **ودن الفيل، عشب الشقة**

Coccoloba uvifera (S). Coccolobe à baquette, Bois baguette, Raisin des bords de la mer, R. à grappes (F). Sea-side grape, Kino tree (E). Gamaia Seerauba (D). Coccoloba uvifera, Uva di mare (I).
نوع من الككلوب وهو شجرة برية تألف الشطوط البحرية. ساقها تملو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها متعاقبة، معتقة، كبيرة. نصلها مستدير الصفحة الجائدة اللامة. أزهارها سليل التجميع، تناسي الارتكاز. إزهارها بلجولية الشكل، صغيرة القد، وردية اللون || يستخرج من ساقها باخر صاصرة لزنية، قابضة، مفراة اللون يطلق عليها اسم « كينو » (Kino).

٢٣٨٤٨ - **ككم***
Ierax (S).
Ierax, Faucon nain (F). Ierax (E).

جنس طير من عراة الصقور وفصيلة الصقريات. أنواعه جديدة جميعها صغيرة القد، ريمة القوام، طولها يراوح من ٢٠ إلى ٢٢ سم. لونها إلى الكلفة المرقشة يكثر فيها الأطلل والاسمر والأزرق الباق، ويش صندورها أفر. رؤوسها مستديرة. حنيتها جليلة وكبيرة. مناسرها مسنة ومنمقة. غالبها سادة || موطنها البلاد الآسيوية من تركيا إلى اليابان. تألف الأجام ويهاجر الماء. قوتها اللوديات والمغشرات أعصها الجنادب والسرابع والفراشات الكبيرة.

٢٣٨٤٩ - **ككلا**
FORAGE (F).
Fodder, Provender (E).
كل ما ترعاه الماشية من احشاب نخسر أو تتغلف من حشوش وصقال مخزونة كالطاطا والشولدر الخ.

٢٣٨٥٠ - **ككلا يابس**
Foin (F). Hay (E).
الككلا اليابس والثن والشائرة والقييب هو العشب المحشوش المجهف المحفوظ كلف للحيوان.

٢٣٨٥١ - **ككلاية**
Pâturin des prés (F).
هي تف المروج، أمليه.

٢٣٨٥٢ - **ككلاب**
Canidae
فصيلة حيوانية من الأواسم تعرف بالكليات.

٢٣٨٥٣ - **ككلاية***
Quillaja, Quilaya
جنس اشجار برية من فصيلة الورديات. أنواعها قليلة. أعطائها البلاد الأمريكية. سوقها وفروعها متسبة. أوراقها متعاقبة معتقة يشي النصل. أزهارها نوري. إزهارها ثنائية المسكن، أبطية وتناحية الارتكاز || أشهر أنواعها الككلاية الصابونية التي تتميز بسبابة قشور سوقها وأعضائها الفنية بمادة الصابونين.

٢٣٨٥٤ - **كككج، كككاش أسبل**
Vespertilio mystacinus (S).
Vespertilion mystacin, V. à moustaches (F).

الكككج والككلاية نوع من الخفاش، حيوان من فصيلة الخفاشيات. موطنه فسح الاربعاء يمتد من الصين إلى اربوة مروراً بالشرق الأوسط والاندل || ثوبه إلى الطحلة السمره تفتق في الرأس والظهر، وتفتق في البطن.



ككلوب كينو



ككم



كلادة



كلادة



ككلاديين



كلاركيا رشيقة

٢٣٨٦٨ - كَلْبُ الْجِبَار

كلب الجبار كوكب .

٢٣٨٦٩ - كَلْبُ الرَّاعِي

كلب الراعي نجم نيز من كوكبة الجبار ، يسمى أيضاً رأس الجبار ، أطله .

٢٣٨٧٠ - كَلْبُ الصَّيْد

Chien de chasse, C. courant (F). Pointer, Beagle (E). صرغ من الكلاب النشطة أحادقة الثم تستعمل في الصيد . هرقها عديدة تتميز باختصاصها واشكالها واثيرها .



(١) كلب

Ligne du dos (F). كَلْبُ الفَرَس
Line of a back (E). هو الخط الذي يوصل ظهر الفرس .

٢٣٨٧٢ - كَلْبُ الْمَاء

Lutra (S).
Loutre (F). Otter (E). هو القضاة والقتل والماء . جنس حيوانات لبونة قازية من فصيلة المرحويات . انواعها ثمانية اطلاقها العالم . تألف الجيبرات والانه والاعوار . قوتها الاسماك والقشريات والشفادع وبعض الثآليل والاشباب || اجسامها مستطيلة . وروسيها مشرشرة مفلطحة . اعطائها مقعولة . احتفائها غليظة . قوائمها قصيرة ، اسبابها خلسية ملتصقة . اذنانها مستطيلة . جلودها فروية فانعة الصنف || اجسامها دعائيز منحذرة الانفاق تبتئز تحت سطح الماء بمضيق او تنصبي على يده ٢٠٠ سم . رجعات مستندرة تملو مستوى الماء بنحو ١٠ سم . وتتصل مع الخارج بمراديب تزين الهواء والمرب عند الحاجة || اذنانها اصغر قدماً من ذكورها وفي تقص من جروين الى اربعة جراء . رخصها وزيها نحو ٥ شعور .

(٢) كلب

Courtlière (F). كَلْبُ الْيَّ
هو الخالوش ، اطله .

٢٣٨٧٤ - كَلْبُ مُطَدِّم

الكلب المتقدم كوكب .

٢٣٨٧٥ - كَلْبَان

الكلبان « نيجان صفيان كاللترين بين الثريا والهدبان » .

Chienne (F). She dog (E). كَلْبَة
انثى الكلب .

(٣) كلب

Canidae (S). Canidés (F). كَلْبِيَّات
Canidae, Dogs (E). فصيلة الكلاب من القوارض تشمل الكلب والذئب والذئب وابن آوى .. قوائمها الاسامية خلسية البرائن اما الخلفية فرباعية وبرائتها لا تتلفس كما في السانير يعني لا تتلفس الاطراف ولا تقبض على فريستها ببرائتها بل بانابها .Cynocéphales (F). كَلْبِيَّات الرُّؤُوس
Cynocephalus (E). هي القردايص جنس قرد من فصيلة المجرسيات . راجع قردوح .٢٣٨٧٩ - كَلْبُوم
هو الفيل والزلزليل ، اطله .

Collette (F).

٢٣٨٦٠ - كَلْبِيَّة

جنس نباتات برية معمرة من النقيات تدعى ميكة ، اطلها .

٢٣٨٦١ - كَلْب ، سَعَار ، سَعَر

Rage, Hydrophobia, Lyssa (F). Hydrophobia (E). مرض خبيث يصيب الكلاب والذئاب والثعالب والسانير ويسمى الى سائر الحيوانات كالغليز والبقير والقم والمناز والارانب . عدواً ياجر من العاب .

Canis familiaris (S). كَلْب *
Chien (F). Canis, Dog (E). جنس حيوانات شاردة واعلية من فصيلة الكليات . سلالات كثيرة البلد يجمع الى اربع فئات :Lupoides فئة الكلاب المبرورة
Braccoides فئة الكلاب الششية او البرجية
Molossoïdes فئة الكلاب الدوراسية
Graïoïdes فئة الكلاب السلوقية

انقله حشاربة الاطباء تحمل من ٦٣ الى ٦٥ يوماً وتضع من ٦ الى ١٠ جراء بجر الزور بعد وضعها بنسة ايام . وتفقد انسان الخليل يمس ثلاثة اشهر ويكمل تسليتها النهائي بمر ثمانية اشهر . والكلب خمسة اصابع في قوائمها الاسامية واربعة في الخلفية . اسبابه مبطنة قوية البرائن || وهو حيوان مستأنس اليف وفي يستخذه الانسان في الحراسة والصيد والرماية والطاردة .

le Petit chien (F). كَلْبُ اصْغَر
Canis minor, the Lesser Dog (E).

الكلب الاصغر كوكبة نجوم جنوبية المقع مركزها يده الكلب . الاكبر الى الشرق || نجومها قليلة العدد ، منها سبعة مزدوجة وكوكب اقود من غيره تسميه العرب « الشعرى الشامية » لانه يغيب في شق الشام . وتسميه ايضاً « الفمضاء » . وتسمى الكوكبين القدين على الذراع « الذراع المقبوض » او « مزمذم الذراع » .

le Grand chien (F). كَلْبُ اكْبَر
Canis major, the greater Dog (E).

الكلب الاكبر كوكبة نجوم جنوبية المقع مركزها خلف كوكبة الجوزاء وذلك تدعى كلباً || عدد نجومها تسعة وعشرون . والعرب تسمي النير الاظهر الذي على موضع الفم « الشعرى المبرورة » . وكان قوم في الجالية يعبدهون لانه يقطع الباء هراً دون غيره من الكواكب . وهي هبوراً لانه هب الهيرة الى سهيل . ويسمى ايضاً « الشعرى البانية » لان منبه في شق الين . اما الاريمة التي منها على كتفه وعلى ذيله وبا بينهما وعلى فخذيه فتدعى « المذارى » والاريمة المصطلة على الاستقامة تدعى « القرد » .

٢٣٨٦٥ - كَلْبُ الْأُرْكَار
Chien-terrier, Fox-terrier (F). Terrier (E).

سلالة من الكلاب النشطة الرشقة تستعمل في صيد الجرذان والثعالب والارانب وغيرها .

Requin (F). كَلْبُ الْبَحْر
هو القرش ، اطله .Emitsole (F). كَلْبُ الْبَحْر
سمكة بحرية ، كبيرة ، مفترسة تدعى سيجل ، اطلها .

٢٣٨٨٧ - كلزومة حرسية

Calosoma rugosum (S). *Calosoma rugueusa* (F).
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها نحو ٢٥ سم.
لونها اسود اللون. غمداء غمدان يدلونها موانع اخضر.
اسفح || تكثر في الصيف على الانجبار الحرجية وفي
الحادق والجنان حيث تقترس يرقات غيرها من الحشرات
اخضها يرقات فصيلة السفيقات .

٢٣٨٨٨ - كلزومة ماكركه

Calosoma sycophanta (S). *Calosoma sycophanta* (F).
European Calosoma beetle (E). *Puppenrüber* (D).
حشرة نافعة من فصيلة السلكوتيات طولها براوح من ٢٥
الى ٣٥ سم. رأسها وكسلاها الى الزرقه ، غمداء مستعرضان
الشكل ، لونها الى اخضر المذهب الاسفح الموانع .
تألف الغابات والحادق حيث تقترس على تيسر لها من
يرقات الحشرات اخضها اسارع القرزيات .

٢٣٨٨٩ - كلس ، جيجر
Chaux (F).
هو اكسيد الكلسيوم ، اطلبه .

٢٣٨٩٠ - كلسبورة
Calospora (S).
جنس فطور مجهرية من الرفيات . تتميز ببوغها المستطيل
القد ، الشفاف الجسم ، الشفوي الانقسام والوبري
المترس || له نوع واحد هم الاقتصاد الزراعي يدعى
كلسبورة الزيلة .

٢٣٨٩١ - كلسبورة الويكيلة ، لصف الويكيلة
شقران الزيلة

Calospora vanillae, *Gloeosporium vanillae* (S). *Anthracoze de la vanille* (F).
فطر مجهرى يركب اوراق وممار الزيلة فيعطها ويذوبها .
مظهره الخارجى على الاوراق نقط سمر توشم صفحة النصل
علما قطب النسيج وتمرقل على الجسموري . وهو على
البار قروح صغيرة مستديرة قمحية اللون تسبب القرن
في احد طرفيه او في وسطه فتسبب ذبوله وسقوطه || يكافح
فور ظهوره على الاوراق بمحلول بوردو المركز من ١
الى ١٥ ٪

٢٣٨٩٢ - كستوم
Callistemon (S). *Callistème* (F). *Callistemon* (E).

جنس اشجار وجنيات ميمنة من فصيلة الاريات ، اوراقها
المرفقة عديدة ، منها فسح الاجزاء ، يمتد من الشرق
الاسوط والاقصى الى امريكة واستراليا || سورها تملو من
مترين الى سبة اطار . اوراقها ايده ، متعاقبة ، متقاربة ،
مستدقة . نصالها سنانية ، جامدة ، ازهارها سبلي التجميع .
ازهارها مختلفة الخصب والعرف || اعرف انواعها واشهرها ،
التالية :

٢٣٨٩٣ - كستوم أنيق

Callistemon speciosus (S). *Callistème élégant* (F).
نوع من الكستوم . مجهرته تملو نحو سبة اطار .
اخصانها واغنداء واغناها حراء اللون . اوراقها تطلو نحو
١٠ سم . نصالها فواحة العرف العطرى ، خلية البشرة
في اول عهدها . سنايله الزهرية قرمزية اللون . مياس ازهاره
الى الصفار المايق الجميل || تنويره يستمر من آذار الى
حزيران .

٢٣٨٨٠ - كلجوم
Géophyta (F). *Geophyta* (E).
كل نبات تكون اعضاءه تكاثره المائية مدفونة في التراب
كالبساتات السفولية والنوصية والصلية .

٢٣٨٨١ - لسان المزمار

Salpiglossis (S). *Salpiglossa* (F). *Painted tongue*, *Vulvec flower* (E). *Trompetenzunge* (D). *Salpiglossa* (I).
جنس نباتات عشبية حولية تربيتية من فصيلة الباذنجانيات.
انواعه المعروفة خمسة اما غربه فكلترة العدد جميعها زياه
الاعضاء لزجة . سورها فراء منتصبه تملو من ٤٠ الى
١٢٠ سم . اوراقها معتقة لاجلجية ذرية . ازهارها قمية
الشكل ، كبيرة ، لقد تطلو من ٤ الى ٦ سم . اقلام مدقاتها
مباعدة . لوانها عديدة تختلف مع الفروب منها الاصفر
والاحمر والازرق والبنفسجي والابيض والموشح والمنج
والمرطق || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٣٨٨٢ - كلج
Férule commun (F).
هي القنة المبدولة ، اطلبها .

٢٣٨٨٣ - كلد
Cumuler (F). *To accumulate* (E).
كلد الشيء : جمعه ويجمع بعضه على بعض .

٢٣٨٨٤ - كلدكة
Terrain dur et compact (F).
هي التربة الصلبة المتندجة .

٢٣٨٨٥ - كلدودة مبدولة

Eupithecia vulgata (S). *Eupithecia vulgaire* (F).
Eupithecia vulgata (E).
حشرة ملبولة من الريفات حشرقيات الاجتحة . مطبها
معظم الاصمغ المتعددة الحارة من الشرق الاقصى الى
اروبه . فراشها جارية قوتيا رقيق الازهار . سورها
خاضعة قوتيا اوراق الصوانيات والشفويات والمركبات
جسمها صغير قصيف يطول نحو ٨ م . مطبها نحو ٢١ م .
رأسها حطلي اللون . صباها صنتريتان . زبانها مشطيان
عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . حوشها وبطنها الى
الحطلي الاكلف الموانع || وراشها ، عند الشقين ، الى
الحطلي الاكلف تملو في الزوج الامامي بقجنان ونقطة
مستطيلة الى الي الامام الموانع وسبع نقط بنية في الحار
الخارجي . وتلوه في الزوج الخلفي مشقة بنية وسبع نقط
صغيرة تتأخم الحار || لها جيل واحد في الحول . تظهر
القراضة في نيسان وتبقى حتى اواخر حزيران . تخرج
من العصر الى لعمه الليل . تماطل يد ظهورها بنحو ستة
اسابيع وتفتح الملكن مبيدات على الصفحات السفلى من
نصال الاوراق || الفترة تملو نحو ١٩ م . جسمها شبه
وشمي الشكل . لونها الى اخضر الزيتي تملو بقشة غراء
وسط بجي قالب اسمر وقصة خطوط جانبية وردية . رأسها
اسود . رواجها البطنية الوسطى ماسحة مما يجعلها تنقوس
عند الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٦٠
يوما ينقضي في الجلالة او بين فروع النبات التي تلاس
التربة فمن جراب غرولي الشكل ينفلق عند انطلاق
الفراشة .



كلس



كلدودة مبدولة



كلزومة ماكركه

٢٣٨٨٦ - كلزومة
Calosoma (S). *Calosoma* (F).
جنس غنفس نافعة من فصيلة السلكوتيات . انواعها
عديدة تقتلك يبيض الحشرات الفارة .

كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا

والاستوائية || معظم انواعها اشباح حولية او عمرة ، بعضها بري والبعض الآخر تزييني . اكثر انواعها زياه السماء خلية الوراثة . ازهارها رضية ، عديدة الالوان . تنموها ربيعي وصيفي || اشهر اجناسها الكليسر والطاقة والقلاذ .

Calcium

٢٣٩٠٦ - كَلْسِيُوم

عنصر فلزي غير ألين ، لين الجسم ، ثنائي التكافؤ . رمزه (Ca) وزنه الذري ٤٠.٠٨ ينصهر في ٨١٠°مغ ويغلي في ١٤٨٧°مغ . وهو من الاجسام الشرة التي تمتص الماء والغازات || يوجد في الطبيعة مركبا من بعض العناصر اهمها اكسيد الكليسر او الكلس الحلي . ثم كبريتات الكليسر الموجود الكليسر وهو ملح ابيض يوجد في الطبيعة حل هيئة رناعم او طباشير او جص . ثم كبريتات الكليسر الموجود في الطبيعة حل هيئة حصى ويرس . ثم فسفات الكليسر الذي يعتبر المادة الرئيسية في تكوين العظام وفي تكوين الانسجة النباتية .

٢٣٩٠٣ - كَلْسِيْسِيْن ، كَلْسِيْسِيْن ، سُوْرْتَجِيْن

Colchicine (F). Colchicin (E).

مادة قلوية بلورية متياصرة تستخرج من سورتجان الخريف ثقل منه ١٤٥°مغ . تلوب في الماء البارد والكحول والكلوروفورم .

Crevasses (F). Chaps (E).

٢٣٩٠٤ - كَلْع

قشب صقن يحصل في جلد اسراع الدواب .

Macule du soleil (F).

Sun-spot, Macula (E).

٢٣٩٠٥ - كَلْك

Galvanomètre (F).

Galvanometer (E).

٢٣٩٠٦ - كَلْكَلْتُوْمِيْر

مقياس القوة الكهربائية أي شدة التيار .

Phyllosticta (S).

٢٣٩٠٧ - كَلْفَةُ

جنس فطور مجهرية من الفصليات . بكتيدات غسبية التجميع تتلصق تحت ادمة التصل ثم ترق الى السطح . اشكالها متعددة ، الواحدة عابطة . مقه واضع الارتكاز ، شعيرات بسيطة ، قصيرة وشغافة || تركيب الوراق فريزم لسيجها ويؤديه || ازهاره عديدة . اغمرها ما يتبع .

٢٣٩٠٨ - كَلْفَةُ الْاِسْبَاحِيَّةِ

Phyllosticta spinacia (S).

فطر مجهرية . تركيب الوراق الاسبانج فيلوميا . مظهره الخارجي يقع كبيرة مستطيلة تملو فصل الوراق . تبو حنطية ألين ثم فبراه ، تسب ذيل التسج ويسلم . يكلفه بالقطاع الوراق المصابة عند ظهور الوبس .

٢٣٩٠٩ - كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا

Phyllosticta fusiformis (S).

فطر مجهرية يصيب الوراق الاكيدنا . مظهره الخارجي بتور مستدرة قطرها نحو ٣ م . تركيب التصل حل صفحته العليا . تبو حرار ألين ثم سمره || بكتيدات حكاكية ، قياسها نحو ٣٠٠ × ٨٠ ميكرون . شعيرات غليظة الجسم . يوردها مستطيلة قياسها نحو ٤ × ٢ ميكرون || يبري الاشجار الضعيفة دون سولها ، لذلك يجر الاحتناء بالتسميد .

٢٣٨٩٤ - كَلْسْتُمُوم جَلِيدَ الْوَرَقِ

Callistemon rigida (S). Callistème rigide (F).

نوع من الكليستوم . جنبته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها غسبية ، جامدة ، ذرية ، تملو من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ م . || سنبالها الزهرية حرار ألين ، قريزية الموج || تنموها يستمر من ايار الى تموز

٢٣٨٩٥ - كَلْسْتُمُوم سِتَافِي، الْوَرَقِ

Callistemon lanceolata (S).

Callistème à feuilles lancéolées (F).

نوع من الكليستوم . جنبته تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه سنانية ، غسبية ، تملو نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٨ م . نصلها جلدية ، حرار ألين في اول عهدا ثم خضراء . سنبالها الزهرية الى الحمرة اللودية || تنموها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٦ - كَلْسْتُمُوم فَصْصَالِي الْوَرَقِ

Callistemon saligna (S).

Callistème à feuilles de saule (F).

نوع من الكليستوم . مجرته تملو نحو ستة امتار . اوراقها سنانية تملو نحو ٨ م . وتعرض نحو ٢ م . نصلها جامدة ، مبررة اللدد الدهنية المطرة . سنبالها الزهرية صفراء ألين . ازهارها شديدة الصفر || تنموها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٧ - كَلْسْتُمُوم صَوْبَرِي الْوَرَقِ

Callistemon pinifolia (S).

Callistème à feuilles de pin (F).

نوع من الكليستوم . جنبته صغيرة اللد ، تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابرية كالوراق الصنوبر . سنبالها الزهرية كشيفة للتجميع ، لونها الى الخضار الاصفر المالح || تنموها يستمر من حزيران الى آب .

٢٣٨٩٨ - كَلْسِي، جِيْرِي، جِيْصِي

Calcaire (F). Calcareous (E).

ما كان جصي التركيب او ما كانت تظني على تركيبه مادة الجص .

٢٣٨٩٩ - كَلْسِيْت

Calcite (F).

Calcite, Calco-spar (E).

كربونات الكليسيوم الطبيعي للتيلور .

٢٣٩٠٠ - كَلْسِيْر

Calyca (S). Calycère (F).


جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية او عمرة من فصيلة الكليسيديات . انواعها المعروفة قليلة البد ، منبها لطوي بعض اصقاع البلاد الحارة ، اغصها الشيل والوبر || سوبها عفالية وبرية متكاثة الزغب . اوراقها صغيرة ، سنانية النصال الخشبية او المرطاه . ازهارها رويضية متراكبة التلات يكثر فيها الاحمر ثم الوردى فالازرق || تنموها ربيعي .

٢٣٩٠١ - كَلْسِيْرِيَات

Calyceraceae (S).

Calyceraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلغلين متحدة القملات . تربتها بين المركبات والديسيديات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البد ، منبها بعض اصقاع البلاد الحارة



كَلْفَةُ الْاِكِيدِنَا

عديدة ، مبهمة ، قصيرة ، سوداء اللون . بويغاته بيضيه شفافة ، قياسها ٢×٥ ميكرون .

٢٣٩١٦ - كَلْفَةُ عَابِلَةٍ *

Phyllosticta congesta (S). Blotch du prunier (F). Plum blotch (E).

وصم يصيب الخوخ سببه فطر مجهري يركب الاراق والابر || مظهره على الارواق بقع صغيرة تغطي النصل ، تبدو حطية ثم مبطاة واخيراً قضيّة اللون || وهو حلّ البار بقع قروية مستديرة لونها الى السمره يكتنفها اطراف مهدب || يكافح مكافحة كلفة التفاح . واهم من فصل الفواطر غير المرتكزة حل النحاس .

٢٣٩١٧ - كَلْتَن - *Galvaniser* (F). To galvanize (E).

٢٣٩١٨ - كَلْفَتَة وَ كَلْتَن - *Galvanisme* (F). *Galvanism* (E).

٢٣٩١٩ - كَلْتَنِي - *Galvanique* (F). *Galvanic* (E).

٢٣٩٢٠ - كَلْتَسَة - *Putois* (F). هي ابن عرس ، اطلبه .

٢٣٩٢١ - كَلْتَمَار - *Calmar* (F). *Calamary* (E).

جنس حيوانات بحرية مقرنة من الرخويات رأسيات الارجل . انواعه المعروفة عديدة . اعطاهنا بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي والهندي || اجسامها شبه اسطوانية الشكل متباينة الاحجام التي تطول من ٥٠ الى ٣٠٠ سم . وبها نوع جبار يبلغ طوله نحو ٧٥٠ سم . جميعها عشاقية الجرامز المستطيلة ، المعادة للفصل المنتجة بكل من المهاجم تمكّنها من القبض على صيدها || قوتها الاسماك والقشريات

٢٣٩٢٢ - كَلْتَمَبِلِيَّات - *Collemboles* (F). هي الكهليليات ، اطلها .

٢٣٩٢٣ - كَلْتَمَكْنِيَّة - *Ubiqité* (F). *Ubiquity* (E).

الكلمكانية الوجود في كل مكان وفي آن واحد .

٢٣٩٢٤ - كَلْتَمِيدَة - *Chlamydospora* (F).

اسم يطلق على بورغ بعض الفطور التي تتميز بارتكازها الطولي . والكليد يعتبر من البورغ المتخذ الذي لا ينتشر قبل انقضاء زمن بيانه .

٢٣٩٢٥ - كَلْتَنِيَّاس - *Callanthias* (S). *Callantias* (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القرشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطاهنا بحار البلاد المعتدلة الحرارة اجسامها رشيقة تطول من ٢٢ الى ٢٨ سم . زعانفها الظهرية مستطيلة مقطوعة . زعانفها الذيلية فاقرة دقيقة الاطراف . اثوابها تزاول من الشقعة الصنانية الى الوردي . ظهورها ابيض لونا من بطونها || لحويها مأكولة جيدة الصنف .

٢٣٩٢٦ - كَلْتَمُون - *Calandrinia* (S).

Calandrine, *Calandrinie* (F). جنس نباتات عشبية حولية بعمره من فصيلة الربليات . انواعه قليلة جميعها زينة اعطاهنا البلاد الامريكية الشمالية

٢٣٩١٠ - كَلْفَةُ التَّبَع * ، فِلِوسْتِيكَ نِكُولِيَّانَا

Phyllosticta nicotianae (S).

فطر مجهري من الصنديات ، بكتنياته غشية التجميع تنشأ تحت ادمة النصل ثم تزق الى السطح . مقه واضح الارتكاز شفافية بسيطة التركيب ، شفافة القد ، شفافة || يركب اوراق التبغ ليوم وثن النصل يقع مستديرة لاقياسه وراوح قطرها من ١ الى ١٠ م . تبدو صنانية اللون وتستقر على الحطلي الاسمر || اغمره زجدة لا تستوجب العناية .

٢٣٩١١ - كَلْفَةُ التَّبَع *

Phyllosticta solitaria (S). Blotch du pommier (F). Apple blotch (E).

فطر مجهري يصيب التفاح في اوراقه واغصانه وعماره . مظهر الخارجي على الارواق بقع صغيرة عديدة مقرنة الزوايا ، غبراء او مراء اللون ، تركب النصل فتغطي على نسجه الادمية || وهو حل الانداد قروح مستديرة او مستطيلة طولها نحو ٣ م . لونها الى الجلوة تركب البعد كالقشب جفاته وانصداع بقرته || وهو حل البار بقع لاقياسية الشكل والحجم ، لونها الى السمره يكتنفها اطراف اخر ، تتسع مع حجم الشرة فيبلغ قطرها نحو ١٠ م . || يكافح باستعمال سائل بورود الهلوي ١٠٠٪ حيث تنضج الاشجار على ثلاث مرات ، الاول بعد سقوط التويجات الزهرية باسبوسين ، والثانية بعد الاول بثلاثة اسابيع ، والثالثة بعد الثانية بثلاثة اسابيع || وبهم من سلفات النحاس مع ٠.٨٪ بورود الهلوي ٤٠٪ من سلفات النحاس مع ٠.٨٪ من الكلس .

٢٣٩١٢ - كَلْفَةُ الخَوْخ *

Phyllosticta prunicola (S).

وصم يصيب الخوخ والاجاص سببه فطر مجهري يركب الارواق فيطبا ويقودها الى الاحمال الباكر || مظهره الخارجي يثور مستديرة او بيضيه الشكل تملو النصل على صفحة العليا . تبدو حطية اللون ، رمداء الحور ، بنفسية الاطراف || يظهر في اوائل آب ويصل الارواق في اوائل تشرين .

٢٣٩١٣ - كَلْفَةُ الزَيْتُون * - *Phyllosticta oleae* (S).

فطر مجهري يمتري الزيتون بارواقه الفتية فيؤذيها بعض الشيء || مظهره الخارجي يثور مستديرة قطرها نحو ١ م . تركب النصل على صفحة العليا . تبدو حطية اللون ثم غبراء ، يحيطها اطراف اسمر || بكتنياته حكاكية الشكل ، شفافة ، قياسها ٣×٣.٥ ميكرون || لا يستوجب المكافحة نظراً لقلّة اذاه .

٢٣٩١٤ - كَلْفَةُ السِيَم *

Phyllosticta antirrhini (S).

فطر مجهري يصيب السيم في اوراقه وفروعه . مظهره الخارجي ، على الارواق ، يثور مستديرة قطرها من ١ الى ٢ م . لونها الى الصهبة يكتنفها اطراف اخر || وهو حل الفروع يقع قروية لونها الى الجلوة السمره || بكتنياته حلطية ، لاقياسية التجميع ، قياسها نحو ١٠٠ ميكرون ، بويغاته مستطيلة قياسها ٢×٥ ميكرون .

٢٣٩١٥ - كَلْفَةُ الصَلْبِيَّيَّات *

Phyllosticta brassicae (S).

فطر مجهري يصيب نباتات الفصيلة الصليبية . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٨ م . تركب النصل الارواق ، تبدو فاقمة الخضار ثم غبراء اللون || بكتنياته



كَلْفَةُ التَّبَع



كَلْفَةُ الخَوْخ



كَلْفَةُ عَابِلَةٍ



كَلْتَنِيَّاس



كلندرو

٢٠ مهدا المناطق الاستوائية . معظمها بري وبعضها
زينة . سقفا عشبية أو ليفية . اورانها متعاقبة ،
بيضية الشكل . نصلها جامد الصفحة المائلة البشرة .
انزهارها قلبي التجميع ، تاجي الارتكاز . انزهارها رباعية
التركيب بها البيض والصفير والحمر . ثمارها جراه رباعية
القلق || اورانها تنشق القروح وتندمل الجروح .

Calanus (S).

Calane (F). Calanus (E).

دوبية بحرية من القشريات مجذافيات الارجل وفضيلة
الكلنوسيات || جسمها صغير الحجم ، شبه مخروطي الشكل
مستعرض الضعراس ، وسيد العين ، عديم الحواف ||
تنشق حل الطوح . جماعها وافر العدد .

Calanidae (S).

Calanidés (F). Calanidae (E).

فضيلة دوبيات مائية من القشريات مجذافيات الارجل .
اجناسها قليلة العدد اما انواعها كثيرة ، معظمها بحري
يمش في مختلف بحار العالم وبعضها بحري يعيش في
الانهر والبحيرات والمخلفات .

٢٣٩٣٦ - كلوة ، كلية ، حكر

Rein (F). Kidney (E).

عضو في الجسم كلوي الشكل يفرز البول . هما كليتان
أو سقوان مركزهما من جانبي السلسلة الفقرية .

٢٣٩٣٧ - كلوة الماء ، لاجم الضفدع

Hydrocharis morsus-ranae (S). Hydrocharis, Hydro-
charidae, Morrus, Mors de grenouille (F). Frog-bit,
Frogs-bit (E). Echter Froschbiss (D). Favagello di
chiana, Mors di rana (I).

نبات عشبي بري مائي معمر وسيد الجنس والنوع من فصيلة
كلويات الماء . يعيش في المياه الراكنة وتزين به الاحراس .
سوقه سلبية متعاقبة المقد . جلوده ضمية التجميع تنشب
من المقد . اوراته مستطيلة الاعتاق كلوية الشكل تطول
وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها سميك الصفحة اغضر
اللون . انزهاره ثلاثية الفصل والبتلات البيض || انزهاره
يستمر من حزيران الى آب .

Chlore (F). Chlorine (E).

غاز سام اقل من الهواء لونه ال احمار الزيتي . رائحته
محرشة تثير السعال . وزنه الاتيني ٣٥,٤٦ رنزه (كل
جرام || يوجد في الطبيعة مختلطا بغيره من العناصر
المتطرفة اخضها ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) وهو
يتميز بجمه الشديد الى الاتحاد بالفلزات والالانزات
يحتوي من المظهورات المشهورة ويعتبر من تطهر مياه
الشرب . كما انه يستخدم في اغراض في احمها تبيض
للمسويات القطنية والكتانية وصناعة قنابل الفلزات السامة .

Chlorops (S).

٢٣٩٣٩ - كلوروس

ذباب اصفر اللون يعرف بضمفراء العين ، راجع خزياء .

Chloroplasta

٢٣٩٤٠ - كلوروبلاست
جسيمات الخلايا النباتية الملونة بالغضيب والتي يرتكز عليها
التفصيل الخفوي .

Chloroforme (F).

Chloroform (E).

٢٣٩٤١ - كلوروفرم
سائل عادم اللون اثره الرائحة ينتج عن الكلور مع الكحول
يستعمل في الطب كمنج يهتر الانصاب .

والجنينية . اورانها متعاقبة . انزهارها جملة الشكل ،
زاهية الالوان ، لاثامية التجميع والارتكاز || اعرف
انواعها واشهرها ما يلي .

٢٣٩٣٧ - كلندين خيمية

Calandrinia umbellata (S). Calandrinia umbellata (F).

جملة زينة عمرة تملو نحو ٤٠ سم . ساقها فناء جبوية
اللون . فرومها فاشية . اورانها صنية ضيقة تطول نحو
٢ سم . نصلها خلي البشرة حل صفحتي . انزهارها خيمية
التجميع ، تاجية الارتكاز ، كبيرة العدد ، صلبة
القد ، حراء اللون ، بنفسجية الموالج || انزهارها يستمر
من تموز الى ايلول .

٢٣٩٣٨ - كلندين زينة

Calandrinia discolor (S). Calandrinia discolor, C. elegante (F).

جملة زينة عمرة تملو نحو ٨٠ سم . ساقها متصبية قراء .
اورانها ملطية مقطعية . نصلها بحري الصفحة العليا ،
احمر السفلي . انزهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد ، قطرها
يرواح من ٤ الى ٦ سم . لونها ال البنفسجي الازرق الموالج .
انزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٣٩٣٩ - كلندين قاحيرة

Calandrinia spectabilis (S). Calandrinia remarquable (F).

عشبة زينة حولية تملو نحو ٩٠ سم . ساقها متصبية
قراء . اورانها مينية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم .
نصلها بحري اللون جامد الصفحة . انزهارها عنقودية
التجميع ، كبيرة القد ، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم .
لونها ال الازرق الموالج والمضلع بالاسد || انزهارها
يستمر من تموز الى ايلول .

٢٣٩٤٠ - كلندين كبيرة الزهر

Calandrinia grandiflora (S). Calandrinia à grandes fleurs (F).

جملة زينة عمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها متصبية
قراء . اورانها بيضية ذرية تطول من ١٢ الى ٢٠ سم .
وتعرض نحو ٨ سم . نصلها اغضر اللون ، سميك الصفحة .
انزهارها كبيرة القد لورية التجميع ، محورية الارتكاز ،
قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . لونها ال الوردي الموالج
بالاصفر والاسود || انزهارها يستمر من حزيران الى
تشرين الاول .

٢٣٩٤١ - كلندين هنري

Calandrinia menziesii (S). Calandrinia de Menzies (F).

عشبة زينة حولية متبسة . ساقها تطول من ٢٠ الى
٤٠ سم . اورانها الغل ملطية الشكل تطول نحو ٨ سم .
اورانها العليا سانية ضيقة . جميعها مائلة النصل الاغضر .
انزهارها عنقودية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية ،
صليرة القد ، ارجوانية اللون || انزهارها يستمر من
حزيران الى تموز .

٢٣٩٤٢ - كلندينيات

Calandrinieae (F).

Calandrinia (E).

سبط من فصيلة الرحليات يشمل بعض الاجناس والانواع
نواياه عشبية او مجالية ونباتية . معظمها امريكي المنبت .
انزهارها خشوية . ثمارها جراه ثلاثية القلق .

٢٣٩٤٣ - كلنكوة

Kalanchoe (F).

Kalanchoe (E).

جنس نباتات طيبة عمرة من فصيلة المخلدات . انواعه نحو



كلوة الماء

كيرثان. زباناها صولجانيان. جوشبها الى الطحلة الرصاصية الزرقاء المواج. يطلها اصغر القوب اسمر المواج || رواشتها، هته الشقين، الى الخشنى الاسمر الاسفع المواج يملو في الزوج الخلفي حثار صقيل اخبر وتنوعات حنطية تدير كزواك نديلية الشكل || لها جيلان في الجيل. تظهر فراشة الجبل الاول في مطلع ليسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تعاقل بعد ظهورها باربعة اسابيع وتضع المكن ميحاديا على الصفحات السفلى من لصل المائل || السرة تطول نحو ١٤ سم. جسمها مستطيل الرطب، مستطيل القدم والمخبر، كسني اللون يملو خطان جانبيين اصفران وعشرة اطواق جزوية. اما الطوق الصدري الاول فأسود كالأرأس. ملها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوما وينتضي مطلقا بافانث النبات، يستمر في الجيل الثاني نحو ٣٠ اسبوعا.

٢٣٩٥٠ - كلوريتة ° Kaloula (S).

٢٣٩٥٠ - كلوريتة ° Kaloula (F), Kaloula (E). جنس صفاد قازية من فصيلة الرانيات. انواعها المعروفة خمسة. موطنها الهند والصين وماليزية والفلبين || اجسادها مستدلة القد أو صغيرة. تتميز باصابعها الممددة المجهزة بمحالب طرفية. حطابها قليل الانبساط عند حسي اولائل الزم الثاني من الاصابح. انواعها السائدة الى السرة الزيتية يملوها بتفصيص اشهب اسمر ورقشة حنطية تمتد من مؤخر الرؤوس الى اطراف القوائم.

٢٣٩٥١ - كلومية ° Collomia (S). Collomia (F), Collomia, Queen Ann's thimble (E), Blumenschleimame (D), Collomia (I). جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القبيبات. انواعها قليلة، سيقانها وارلقها زباب لينة. ازهارها رويسية كثيفة التجميع. يستخرج من زورها غراء نباتي يدخل في عدة تركيب || احرف انواعها واخبرها ما يلي.

٢٣٩٥٢ - كلومية أزجوانية ° Collomia coccinea (S), Collomia écarlate (F). عشبة ترينيدية سبروتية تملو نحو ٥٠ سم. ساقها قليلة الفروع، زباب اللحاء. اوراقها بيضبة مستطيلة، نصلها ثلاثي او رباعي التفرع القدي. رويسياتها الزهرية مستطلة القد. ازهارها حمر الابواق صفر الانابيب || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢٣٩٥٣ - كلومية كبيرة الزهر ° Collomia grandiflora (S), Collomia à grandes fleurs (F).

عشبة ترينيدية سبروتية تملو من ٢٠ الى ٧٠ سم. ساقها فراء. اوراقها سنانية ضيقة تطول من ٤ الى ٥ سم. وتعرض من ٥ الى ١٠ م. نصلها غلي البشرة. رويسياتها الزهرية كبيرة القد. ازهارها مستطيلة، كوروسها مسننة الحافة، توتيجاتها تظهر صفراء اللون ثم تتصرف مع الادراك، الى الحمرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين.

٢٣٩٥٤ - كلوريات الماء Hydrocharidae (S). Hydrocharidae (F). جنس نباتات مائية من فصيلة الفلقه. اجسادها وانواعها عديدة. احرف اجنسها الاقطنان والظروق وكلفة الماء ووش الماء.

٢٣٩٤٢ - كلوريدات، هيدروكلورات Chlorhydrate (F), Hydrochlorate (E). هو ملح الخافض الكلوريدينيكي.

٢٣٩٤٣ - كلوريد ° Chlorides (S). Chloride (F). جنس شحات غارة من فصيلة الزمفقيات. انواعها ١٠ جميعها متوسطة القد خضراء الجسم. مستطيلة القرن الاستشارية الشارية الفواصل. اولونها زاهية. احمادها عتقدة يمتزجها بتجديد وتلصق. ريقاتها خاضلة أو ناعمة تركب بعض النباتات من مختلف الفصائل.

٢٣٩٤٤ - كلوريد البوتاسيوم، كلوريد البوتاس Chlorure de potassium (F), Chloride of potassium (E). حماد بوتاسي يحوي من ٤٦ الى ٥٠ ٪ من البوتاس الصريف وهو ملح ابيض اللون يتميز بسرعة ذوبانه في الماء ويهبط انفجالة وتركيبه في التربة.

٢٣٩٤٥ - كلوريد الصوديوم، كلوريد الصوديوم Chlorure de sodium (F), Chloride of sodium (E). هو ملح الطعام المعروف.

٢٣٩٤٦ - كلوريل ° Chlorelle (F). جنس نباتات مائية من الخفيات الخضر وحيادات الخليات المهيبرات. ميكالها كروي الشكل، قلعها نحو ٨ ميكرون. تعيش في المياه العذبة جماعات واقر المبد على المدارات والجذريات وغيرها || وهي وافر المواد الغذائية اغصها البروتينات والفولويد والدمم والفيتامينات والكثير من طفيف العناصر || تكاثرها الجنسي في المحيط الملائم يعطي اجدد النتائج. نتاجها الجاف وافر المواد الغذائية القيمة.

٢٣٩٤٧ - كلوزيات Clusiaceae (S). Clusiaceae, Guttifères (F). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الثعلات سفلية الاسمية. اجنسها وانواعها عديدة جميعا اشجار وشجيرات سوقها منصبة أو عارشة. اوراقها ابيدة جامدة النصل. ازهارها عتقودية التجميع، حمورية الارتكاز أو تاجية. ثمارها لوزية، تشجرها جلدية، لبهاا ضرير المصارة الراتنجية الصفراء اللون التي تصعب يلية بعد جفافها.

٢٣٩٤٨ - كلوزية Clusia (S), Clusia, Clusier (F). جنس نباتات عارشة مستقلة من فصيلة الكلوزيات. انواعها قليلة، سيقانها تطول نحو ١٠ امتار تركب الاشجار الحرجية فتتفص عليها || يستخرج من سوقها حليب اصفر اللون، دبق للمادة الراتنجية، يستعمل في تطبيق جروح الحيوانات اغصها الخليل والبقير.

٢٣٩٤٩ - كلوفريس القوسج ° Calliphrys rubi (S), Calliphrys des ronces (F), Calliphrys rubi (E).

حشرة من فصيلة القنقيات وريقة حوشليات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرقها تعيش على العوسج والوزاك والزان || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ م. يسطحها نحو ٢٨ م. راسها معتدل الحجم. عيناها



كلوريتة



كلوفريس القوسج

التجميع ، محورية الارتكاز أو تاجية . ثمارها عنبية لا مأكولة لأنها إلى الحمرة البنفسجية || أشهر أنواعها ما يلي .

٢٣٩٦٥ - كليكرية أرجوانية

Callicarpa purpurea (S). *Callicarpa pourpre* (F).
جنية ترينيه زهرة مهدبا اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها بيضيه الشكل طول نحو ٧ سم . نصلها انغص
الصفحة العليا ، ازغب السفلى . عتاقدها الزهرية رطلة ،
انزهارها أرجوانية اللون زاحية || انزهارها يستمر طوال
شهر تموز .

٢٣٩٦٦ - كليكرية أمريكية

Callicarpa americana (S). *Callicarpa d'Amérique* (F).
جنية ترينيه زهرة مهدبا أمريكا الشمالية . تملو من ١٠٠
إلى ٢٠٠ سم . ساقها فراء . أوراقها مستطيلة الاضلاع ،
نصلها خلي البشرة على صفحتيه . انزهارها تاجية . بنفسجية
اللون رطلة المتنايد || انزهارها يستمر من حزيران إلى
تموز .

٢٣٩٦٧ - كليكرية صينية

Callicarpa giraldiana (S). *Callicarpa de Chine, C. de Girald* (F).
جنية ترينيه جادة مهدبا الصين . تملو من ١٠٠ إلى
٢٠٠ سم . ساقها فراء نفا . أوراقها طول من ٥ إلى
١٠ سم . نصلها ازغب الصفحة السفلى زغبه نجى التركيب .
انزهارها تاجية كثيفة التجميع ودية اللون || انزهارها
يستمر طوال شهر تموز .

٢٣٩٦٨ - كليكرية يابانية

Callicarpa japonica (S). *Callicarpa du Japon* (F).
جنية ترينيه سبرونية مهدبا اليابان . تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها منقطة طول من ١٠ إلى ١٥ سم . وتعرض من
٥ إلى ٦ سم . نصلها لاص الصفحة العليا ، ازغب السفلى ،
متباعد التستين المشاري . عتاقدها الزهرية صغيرة القد .
انزهارها ودية اللون || انزهارها يستمر من حزيران إلى
تموز .

٢٣٩٦٩ - كليكنثس

Calycanthus (S).
Calycanthe (F). *Alaplice* (E). *Kelchblume* (D).
Calicanto (I).
جنس جنات ترينيه عطرية من فصيلة الكليكنثوسيات .
أنواعه ستة . سطها منتصبه تملو من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم .
أوراقها كاملة متعابلة . انزهارها فردية أو محورية أو هامة
الارتكاز ، جميلة الشكل ، جردية اللون ، فليحة العرف
الطري الشبيه بانفتاح والشام .

٢٣٩٧٠ - كليكنثوسيات

Calycanthaceae (S). *Calycanthaceae* (F). *Calycanthaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات المثلثين ، اجنسها وأزهارها عديدة .
نباتاتها أشجار ونباتات . سطها وفروعها مسطحة . أوراقها
متعابلة . انزهارها جميلة الشكل ، عطرية العرف .

٢٣٩٧١ - كليمنيه ، كليمنيت

Clymenia (S). *Clymenie* (F). *Clymenis* (E).
جنس حيوانات من الرضويات أزهارات الإبريل رباعيات
الحياض وفصيلة الثنائياتيات . أنواعها المعروفة نحو ٤٠
جميعها من متحشرات الحقة اللينوية || اصدها قرصية
الشكل ، معتدلة القد . اغصودها القوي يستمر من القرفة
إلى العقب .

٢٣٩٥٥ - كلى

Cosmos, Grandes tectrices (F).
من ريش جناح الطائر ما يكسو قواعد الإبرار . والكل
قسان صغيرة وكبيرة . الصغيرة تلتف الكبيرة والكبيرة
يكسو الإبرار .

٢٣٩٥٦ - كليكة

Rein (F).
هي الكوة ، اطلبا .

٢٣٩٥٧ - كليتريش

Calitrichis (S).
Calitriche (F).
جلس قردة أمريكية من فصيلة البوسيات . أنواعه ١٠
موطنها حوض الأمازون . اجسامها رشيقة . رورها
مستديرة . قوائمها متصلة الطول . اذناها كاسية مملقة لا
اخادة . اذولها قصيرة الشعر المتباين الألوان || تألف
الاسراج والذبابات . يرتها الاشجار تنقل بينها نخفة الطير .
قوتها التار والخراش والمصابير .

٢٣٩٥٨ - كليش أرخب

Clytus poilu (F).
هو الصملى الازغب ، اطلبا .

٢٣٩٥٩ - كليش أميف

Clytus étroit (F).
هو الصملى الأحيث ، اطلبا .

٢٣٩٦٠ - كليثوسيب

Clitocybe
جنس فلور مؤدية من الفاريفويات مركب بمشبه القدي
الشكل اربوات واساخ وجلور بعض النباتات الزهرية
منها الموز وقائعه والكريمة والكنيا والكرورينه وقت مركب
ايضا ، في ظروف خاصة ، التفاع والمشش والتشش
والجهميرة والياسمين || مشبه غزير المادة وافر القند
المتشبه . يتركز بين الماء والشكر او بين الجردة
والغضب فيطب الارضية والتسج حل اختلافه ثم يقضي حل
الباذل التسنى || يكالنج بقتلح الاشجار الموصولة ويظهر
التربة بالكلس الحراق .

٢٣٩٦١ - كليكة

Caliga (S).
Calige (F). *Calige* (E).
جنس دوبيات بحرية من القشريات الدنيا وفصيلة
الكليجمات . أنواعها المعروفة قليلة العدد . اجسامها
صغيرة ، وحيدة العين ، عادمة الحاف . تستقل على
الاممك .

٢٣٩٦٢ - كليجيات

Caligidae (S).
Caligides (F). *Caligidae* (E).
فصيلة دوبيات بحرية من القشريات الدنيا مجذبات
الابريل . اجسامها وأزهارها عديدة . جميعها طفيلية تعيش
على مختلف انواع الاممك اغصها القادسيات .

٢٣٩٦٣ - كليش

Callche (F).
هو ملح الثيل كما يستخرج من المناجم وهو يفسد بعد
استصلاحه وتكرره نيرات الثيل او نيرات الصودا الطبيعي

٢٣٩٦٤ - كليكرية

Callicarpa (S).
Callicarpa (F). *Besauty-berry*, *Mulberry* (E).
Schönfrucht (D). *Calicarpa* (I).
جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الساجيات . أنواعها
قليلة معظمها تريني . أوراقها متعابلة احليجية ، مسطحة ،
معتدلة الحافة ، غدية الصفحة السفلى . انزهارها عقودية



كليتريش



كليكة



كليكرية



كليكنثس



كليمنيه

٢٣٩٨١ - كَمَّءُ اسْوَدَّ * ، كُشْنُج

Tuber melanosporum (S). Truffe noire, T. de Périgord (F). Black truffle, French Truffle (E). Echte Trüffel, Schwarze Trüffel (D). Tartufo nero (I).
نوع من الكم المأكول الجيد الصنف . ذرته كبيرة القدح سمها قدر البيضة الصغيرة . ثوبها بارزة لونها الى الصبغة . لهاها اسود اللون اسفل الملوخ عند الادراك . تدرك في الخريف .

٢٣٩٨٢ - كَمَّءُ شَتَوِي * ، بَسَات الرَعْد

Tuber brumale, T. hiemale (S). Truffe d'hiver, T. hiemale (F). Winter truffle (E). Französische Trüffel (D). Tartufo brumale (I).
نوع من الكم المأكول المتوسط الصنف . ذرته مستديرة سمها سم الجوزة . ثوبها الى السرة السوداء . لهاها اسود اللون يضل بكنهه خاصة . تدرك في الشتاء .

٢٣٩٨٣ - كَمَّاء * Rabassier (F).

جامع الكم .

٢٣٩٨٤ - كَمَّاء * Truffe (F). Truffle (E).

واحدة الكم .

٢٣٩٨٥ - كَمَّاء الماء * Macre (F).

في المكر ، نبات من الانديديات ، اطليه .

٢٣٩٨٦ - كَمَّاح * Préfloral (F).

نشور أجزاء وأعضاء الزهرة داخل الزهرة أي البرعم الزهرية .

٢٣٩٨٧ - كَمَّاحة * Frein (F).

في الكباشه ، راجها .

٢٣٩٨٨ - كَمَّاح * Pampination (F).

الكبح نوبة برام الكمية وانتشارها .

٢٣٩٨٩ - كَمَّاحكة * Protérante (F).

كلخ م كاخة . نمت تعريفي يطلق على كل نبات يزهر قبل ان يورق .

٢٣٩٩٠ - كَمَّاد زَيْتُون * Germandrée officinale (F).

هو الطورقون الحزني ويدهي أيضاً غامادريوس .

٢٣٩٩١ - كَمَّاس * Kemas (S).

Céma (F). Kemas (E).

جنس حيوانات لبونة عاشية بحيرة من فصيلة الابلات . انواعه المعروفة اربعة موطنها يمتد من الهند الى الصين وشنودرة . تألف الحصاب والجبال من ارتفاع ١٠٠٠ م . حتى ٢٧٠٠ م . من سطح البحر . ملجئها احيائي جامي . اجالها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ١٠ اقطار || اجسامها قريبة الشبه باجسام الظفاد كما وانها تشبه الحزري . قرونها صغيرة متناوبة الحيد ، مستقلة الاطراف المنحرفة الى الوراء . رؤوسها صغيرة ذلقة الاعظام . اعناقها مستطيلة . قوائمها شديدة النشط . اثارها تختلف مع الانواع تكثر فيها السرة المتناوبة للمجات . هجوع انثاها ثنائية الاختلاف . يحبل الاثنى يوم نحو ستة اشهر تصعب في تمامه يهفورا واحداً || اعرف انواحه واشهرها كاس فورال .

٢٣٩٩٢ - كَلْبُوب * Calliopes (S).

Calliopo (F). Calliopo (E).

طائر من الجاليم وفصيلة الشروريات . موطنه بعض المناطق الشرقية من القارة الاسيوية . ملجئه احيائي زبتي باستثناء زين الطعاق حيث يتجمع الى اسراب وافرة العدد . يألف البراري والحراج . قوته الحشرات الصغيرة والبلور البرية || جسمه صغير القد ، قريب الشبه بالبع ، طوله نحو ١٦ سم . ثوبه الى السرة الزرقية المتفاوتة المجات . رأسه وجناحه اعلى من رذاه . زور اخر . منقاده مخروطي الشكل . ذنبه مستدل الجرم ، مقطوم الطرف || يلدن عشه على ارتفاع ٢٥٠ او ٣٠٠ سم . من سطح الارض . الاثنى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

٢٣٩٩٣ - كَلْبُوبَة * Cléome (F).

في الذرة ، اطليا .

٢٣٩٩٤ - كَلْبُوبِيم * Cléome (F).

في السبكة الصيدة ، اطليا .

٢٣٩٩٥ - كَمَّ * Buttage (F). Raising, Mounding (E).

الكم ويدهي التفتيح هو جمع التراب عند سوق الثبات . الغاية منه دم الساق وسبها على انقاس الجذرات وإيماد الماء ضها وزيادة تعريض التربة الى اشعة الشمس ، الخ .

٢٣٩٩٦ - كَمَّ ، كَمَّ * Périanthe (F). Perianth (E).

هو غلاف الزهرة أي جماع الكأس والتويج . وقد سمي كما لانه يستر ما ينشق عنه . ج . اكام وكلم واكة .

٢٣٩٩٧ - كَمَّء * Tuber (S). Truffe (F). Truffle (E).

الواحدة كماء والمثنى ككأتان والجمع كمء وأكوء وكأت . جنس طور ذرية من الزقيات وفصيلة الكشيات . تنبت وتتكاثر تحت الارض فتتغصها . غلافها جلدي التسج || قولول التركيب يحضن العلة انتاسلية البروية . لهاها سردي التركيب جامد المادة || انواحه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام والالوان اشهرها ما يتبع .

٢٣٩٩٨ - كَمَّء اَبْيَض * Tuber hiemale (S). Truffe blanche (F).

White truffle, False truffle (E). Weiss Trüffel (D). Tartufo bianco, T. del Piemonte (I).
نوع من الكم المأكول المادي الصنف . ذرته متوسطة القد مختلفة الشكل . لهاها ابيض اللون مسكي العرف . تدرك في الخريف .

٢٣٩٩٩ - كَمَّء احْمَر * Tuber rufum (S). Truffe rouge (F). Red truffle (E).

Rote Trüffel (D). Tartufo rosso (I).
نوع من الكم المأكول الفاخر الصنف . ذرته مستديرة متطوية القامة . ثوبها ناشرة لونها الى الجوزي الاسمر . لهاها اخر اللون مستحب الطعم ، تدرك في اواخر الخريف .

٢٣٩٨٠ - كَمَّء اُرْمَك * Tuber magnatum (S). Truffe magnate, T. grise (F).

Gray truffle (E). Lauch Trüffel (D). Tartufo bigio (I).
نوع من الكم المأكول المادي الصنف . ذرته بيضية الشكل مغلخلة . ثوبها مستديرة مبطلة رمادية اللون . لهاها اغبر . تدرك في الخريف .



كَلْبُوب



كَمء اخر



كَمء ارد



كَمء اسود



كَمء شتوي



كاشير



كالا



كالية البر



كالية فعبية

كالية المروج



كيدود

٢٣٩٩٩ - كَمْالِيَّةُ الْبَرِّ

Alchemilla arvensis (S). *Alchemille des champs*, *Percapierre des champs* (F). *Break-stone*, *Colic-wort*, *Persley plant* (E). *Feldsinn*, *Steinbrech* (D). *Spacapidra*, *Petricicolo* (I).

نوع من الكمالية تكثر في المراعي الجبلية .

٢٤٠٠٠ - كَمْالِيَّةُ الْمُرُوجِ ، كَمْالِيَّةُ مَبْدَلُوَّةُ

Alchemilla vulgaris (S). *Alchemilla commune*, *Mantelet de dame*, *Pied de lion*, *Porte rosée* (F). *Great sanicle*, *Lady's mantle*, *Lion's foot* (E). *Löwenfuß*, *Mantelsinn*, *Sinn* (D). *Alchemilla comuna*, *Ventaglina* (I).

نوع من الكمالية تكثر في المروج . أورثها طيبة شائعة موزعة .

٢٤٠٠١ - كَمْالِيَّةُ فَبِيَّةُ

Alchemilla argentea (S). *Alchemilla argentea*, *Satén* (F). *Alpine lady's mantle* (E). *Alpensinn*, *Alpenfrauenmantel* (D). *Alchemilla alpina* (I).

نوع من الكمالية الموزعة تكثر في أحياء الجبال العالية ، أورثها خلية البشرة فضية اللون .

٢٤٠٠٢ - كَمْامُ (F). HEADSTAIL, CURB (E).

ما يكس به في الحيران .

٢٤٠٠٣ - كَمْامُكَة ، مِفْطَمِيَّةُ

Mullière, *Muselière* (F). *Muzzle* (E).

أداة تلتف في الحيران تحمي من الرضاعة والأكل والعض .

٢٤٠٠٤ - كَمْبَرِي (F). CAMBRIAN (E).

اسم يطلق على الحفنة الأولى من الأياح القديمة . يقال الصخر الكمبري والحفنة الكمبرية ، وهي تتميز بأحجارها على أقدم صخر الكرة الأرضية .

٢٤٠٠٥ - كَمْبُودُ

Campodea (S). *Campodea* (F). *Campodea* (E).

جنس حشرات دامت من فصيلة الكمبوديات ورتبة لأختات الحثك . أنواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة || أجسامها صغيرة اللد ، مستطيلة الشكل ، معتدلة التبييط ، مبررة الحذب الثقيل الناعم ، تطول من ٦ إلى ١٠ سم . أقرانها إلى البيضاء القبيبة . رؤوسها شبه مكورة . شاكها لاحتة . قربها الاستثنائية شديدة . عيونها شديدة الصغر . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها عشارية الشكل ، قصبة ، أي سرعة السحب . قوائمها نحلة . أرساغها ثنائية العقل . أسرارها دقيقة مستطيلة || يكثر وجودها تحت الحجارة وفي المواقع الرطبة . قوتها المواد النباتية المنحلة .

٢٤٠٠٦ - كَمْبُودِيَّات (S). CAMPODEIDAE (F).

فصيلة حشرات من رتبة لأختات الحثك . أجسامها وأنواعها المعروفة متوسطة البدن ، منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة ، قصبة ، يضاء اللون . عيونها شديدة الصغر . حلقها الصدرية الأولى أصغر من الثانية والثالثة . بطونها عشارية الشكل . قوائمها الأولى مجهزة بزرزوك حوصلية تنفسي . سكبها الثانية والسابعة مجهزة بمزاريق صغيرة . أقرانها الشرجية ثنائية الأسلاك || أمرب أجسامها الكمبريد .

٢٣٩٩٢ - كِمَاسُ غُرُوكَل

Kemas goral (S). *Céma goral* (F).

نوع من الكماس . موطنه يمتد من كشمير إلى برمانية وأسام . يأنث الوصر للمواقع الكثيرة الصخور . يسرح من الحجر إلى نحو الساعة الثامنة ومن العصر إلى فحة الليل || جسمه ربعة بطول نحو ١٣٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه نحو ٨٠ سم . وزنه نحو ٧٥ كيلو . قوته بطول نحو ١٨ سم . عند الذكر وهو ١٤ سم . عند الأنثى . رأسه صغير الحجم ، ذلق الحظ . عيناه كبريتان مكشطان ومطوختان بخار أصفر . أذناه صغيرتان مستطيلتان الشكل . قوائمها شديدة النطف . ثوبه إلى السمرة الخضراء المزج يمتد في الرأس والظهر ويصل إلى تدريجياً إلى الفخذ في الصدر والبطن || أجهله بعد ثمة الفغار ، ذكر مالح وأربع اثاث وأربعة شواهد .

٢٣٩٩٣ - كِمَاسِيَا

Camassia (F).

هي الكشم من الزنايق ، أطول .

٢٣٩٩٤ - كِمَاسُ

Polycarpos (S). *Polycarpée* (F).

جنس نباتات عشبية حولية وبسرة من فصيلة النسيانيات . أنواعها المعروفة عديدة منها معظم الأصناف الحارة من العالم القديم || سطها مستطيلة متعابطة القنوع . أورثها متعابطة رحيمة النصال . أزهارها خماسية البتلات واللبال الضيقة الحادة الأطراف . لونها إلى البيضاء الأصفر الموح .

٢٣٩٩٥ - كِمَاسُشِير

Athamanta macedonica (S). *Athamante*, *Ache des rochers*, *Persil de Macédoine* (F). *Macedonian parsley* (E). *Macedonische Petersilie* (D). *Prezemolo di Macedonia* (I).

نبات عشبي بري معمر مبلول من فصيلة الحميات . أورثها مفرضة وبسرة نصلها على البشرة على صفحتها . أزهارها صيدانية وردية اللون . يقال أنه طيب يستعمل في معالجة العوارض المعوية .

٢٣٩٩٦ - كِمَافِيْطُوس

قال الانطاكي « هو الحامياطيس يعني صنوبر الارض لبنت كشي » العالم الصغير في تقتيل أورثها وامتلاكها بالوطوية وزركها له زهر أصفر يختلف حياً أصفر من زهر الكركس الأبيض الأصفر مر الطم يفتح السد ويدور وزيل الرياح ويواجه الظفر والمفاصل . »

٢٣٩٩٧ - كَمْالَةُ

Echinus Phyllipensis (S). *Kamela* (F).

جنية زراعية معمرة من فصيلة البترويدات . مهدا الحث . ساقها فراع . أورثها منقطة ، متعابطة ، يفضية النصل المذهب الطرف . أزهارها عقودية التجميع تاجي الأركان . ثمارها بلوطية الشكل تنلفها ثمل دقيقة تتحول إلى غبار يرتقي اللون خطي الموح يستعمل في سباج الألفه الخيرية ويستعمل أيضاً لطرد البتود البوسية . النشعة منه أروع من قرامين إلى ١٢ غراماً وذلك بالنسبة إلى عمر المرو .

٢٣٩٩٨ - كَمْالِيَّةُ

Alchemilla (S). *Alchimilla* (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الورديات . أنواعها قليلة منها الحولية والمزعة تكثر في المراعي والأحراج الجبلية . يحزن لها بعض الحواس الطبية ويقولون أنها شائعة وتؤثر أغشية البكرة تنفيع الرائي ففقد كمين .

بعض الإصقاغ الأمريكية أحصاه كليفوريه والمكسيك ||
جسمه كبير القد. طوله نحو ٧٠ سم. وبسطه نحو
١٠٠ سم. ثوبه إلى السواد اللامع. جناحاه مبلقان
بالأبيض. حدة عينه إلى الصفار الذهبي. متقاده وسقاء
وأصابعه إلى الزرقه الطحلاء || أخلاطه رضية لكنه يتجنب
الإنسان ويتخذ من الصبران. يسلك جلود الأشجار
قفرًا. طيرانه طويل الشوط كثير التجمعات والسفوف ||
قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وأجناسها ثم الأثمار
البرية والبلوط || يعيش ذكراً واثني لا يفرقها سوى الموت.
يذئن عنه في تجاويف الأشجار الرقيقة. الاثنى تبغض
من ٣ إلى ٥ يعضات تحضنها وسددها دون الذكر الذي
يؤنن لها الفداء.

٢٤٠١٩ - كمكامل أميرى *

Campophilus principalis (S).
Campéophile princier (F).

نوع من الكمكامل موطنه بعض مناطق أمريكا الشمالية من
فلوريدا إلى كاليفورنيا والتكساس || جسمه كبير القد
طوله نحو ٥٨ سم. وبسطه نحو ٨٢ سم. ثوبه إلى السواد
اللامع. جناحاه ومطاطاه متق مبلقة بالأبيض. حدة
عينه إلى الصفار الذهبي. متقاده عامي القرن. سقاء
وأصابعه إلى الزرقه || أخلاطه رضية لكنه كثير الرجيل.
قوته الحشرات والأساريج والنمل والثمار البرية والبلوط
والبلوط || يسلك الأشجار قفرًا. طيرانه معتدل الشوط
كثير التجمعات || يعيش ذكراً واثني لا يفرقها سوى
الموت. يذئن عنه في تجاويف الأشجار على ارتفاع بعض
الامتار. الاثنى تبغض من ٣ إلى ٥ يعضات تحضنها
وسددها دون الذكر الذي يؤنن لها الفداء.

٢٤٠٢٠ - كمككات *

Kumquat
هي ليمون ككات. شجرة ريفية مشرقة من الحمضيات.
لها خربان مشهوران هما :

٢٤٠٢١ - كمككات مُستديرة *

Citrus japonica madurensis, *Limonellus madurensis*
(S). *Kumquat à fruits ronds*, «Marum» (F).
فرب من الكمككات. اسمه الياباني «مارومي» فبرته
سرسة متوسطة القد تملو نحو ٤ أمتار. أوراقها معتقة
متعاقبة سنائية. نصلها جامد الصفحة الخضراء اللامعة.
ثمراها كروية صفراء اللون مائلة البشرة. قطرها يراوح
من ٢٠ إلى ٣٠ سم.

٢٤٠٢٢ - كمككات مُستطيلة *

Citrus japonica margarita, *C. margarita* (S). *Kum-*
quat à fruits oblongs, «Nagami» (F).
فرب من الكمككات اسمه الياباني «نagamى» فبرته سرسة
متوسطة القد تملو نحو خمسة أمتار. أوراقها متعاقبة،
معتقة، سنائية؛ نصلها جامد الصفحة المائلة، شديد
الخضار اللامع. ثمراها مستطيلة اجسامية الشكل صفراء
اللون طويلا نحو ٤٠ سم. ورضها ٢٥ سم.

٢٤٠٢٣ - كمككام

Essence de la marjolaine (F).
Oil of the sweet marjoram (E).
هو دهن الرو يستعمل في الطبخة. يستخرج بتقطير
الأزهار والأوراق بعد تقمها بالماء. وهو أصفر اللون
يغمض ويصح مع مرور الزمن. عرقه ذكي الرائحة، حامز
الطعم، يغلى عند ١٦٣° مسخ. ويذوب بالكافور في
الكحول حيار ٨٥°.

Cambium

٢٤٠٠٧ - كمكسيوم

هو القُلب الطبقة المولدة في النبات.

٢٤٠٠٨ - كمكة

هي الارسوة، اطلها.

Poire (F).

٢٤٠٠٩ - كمكثرة

هي الاجاصة، ثمرة الاجاس.

Poirier (F).

٢٤٠١٠ - كمكثري

هي ثمرة الاجاس.

٢٤٠١١ - كمكج

Bourgeonner (F). *To bud* (E).
كع الكرم اذا تحرك للبراق. واكمت الزمة اذا ما
ابيضت وظهر عليها ثمل كالقطن.

٢٤٠١٢ - كمكمر

Solive (F). *Girdler* (E).

٢٤٠١٣ - كمكر

الكمر من البسر : ما لم يربط على ثغله ولكنه سقط فارطب
في الارض. اما الثغلة لكمار.

٢٤٠١٤ - كمكش *

Camassia (S). *Camassie*, *Camash*, *Cyanotride* (F).
Camass, *Quamash* (E). *Quamassie* (D). *Camassia* (I).
من الاسم المحدث «كش». جنس نباتات بصلية من
فصيلة الزنبقيات. انموذاه المعروفة نحو ٨ منها البرية
والزراعية. اورقها قرصية الانتشاب شقيقة مستطيلة.
شارعها اسطوانية جيواف. ازهارها حنقوية التجميع
يكلل الشاربخ. ازهارها نجمة الشكل فارشة || اعرف
انموذاه وانهرها ما يلي.

٢٤٠١٥ - كمكش جيلتي *

Camassia hyacinthina, *C. fraseri* (S). *Camassie-*
jacinthe, *Camash-jacinthe* (F).

نوع من الكمكش البسروي الزنبقي. شارعها يملو نحو ١٠
سم. بلمات ازهاره لالاية العروق تملو من ٦ إلى ١٢ م.
لونها إلى الوردي يملو موانج ليكي || ازهاره يستمر
من نيسان إلى ايار.

٢٤٠١٦ - كمكش ليشتين *

Camassia leichdtni (S). *Camassie de Leichdtn*,
Camash de Leichdtn (F).

نوع من الكمكش البسروي الزنبقي. شارعها يملو نحو
٩٠ سم. بلمات ازهاره خاسية او سباعية العروق
تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. هروبه المشهورة اربعة تختلف
بالوانها منها الابيض والاصفر والازرق والبنفسجي.
ازهاره يستمر من نيسان إلى ايار.

٢٤٠١٧ - كمكش مأكول *

Camassie esculenta (S). *Camassie comestible*,
Camash comestible (F).

نوع من الكمكش البسروي الزراعي لماكول البصل. شارعها
يملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. ازهاره إلى الزرقه اللبلاء الموانج،
تلاتها خاسية او سباعية او قساعية العروق تملو من ٢٠
إلى ٣٠ م. مما يجعل قطر الزهرة يراوح من ٥ إلى ٧ م.
ازهاره يستمر من ايار إلى سزيان.

٢٤٠١٨ - كمكيل امبراطوري *

Campophilus imperialis (S).

Campéophile imperial (F).

طائر من فصيلة الفغايات وربة المتسلقات. موطنه



كش



كمكيل امبراطوري



كمكيل اميري



مستديرة
ككات



كليل



كهة مبدلة



كوكليت اربواني



كون



كون حيشي



كيشي

٢٤٠٣٣ - كُمَم * ، سَنَوَات

Cumina cyminum (S). Cumini (F). Cumin (E). Echter Römerkümmel (D). Cumino, C. domestico, Cimino dolce (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة الحبيبات . يزود من الاطراف وقد تستعمل في تطهير الخبز والخبز . ويستخرج منها مشروبات صحية نافعة || ولكن من منه للحمدة ، يحل الرغاب والارام ويخفف سوء الحمض ويحسن النفس والمغص . كان يستعمل في الطب القديم عقويا جليا بمزجه مع السمل والفلفل .

٢٤٠٣٤ - كُمُون اُرَمْسِي * Cumin des prés (F).

هو الكراويا ، اطبا .

٢٤٠٣٥ - كُمُون حَيْشِي * ، يَالِسُون بَرِّي

Carum (S). Ammi, Sison (F). Ammi, Bishop's weed (E). Herrenkümmel (D). Ammi, Sison (I).

جنس نباتات عشبية رية طيبة حولية من فصيلة الحبيبات . انواعه المرفوعة خسة اطباها حشيش ويبرز البحر المتوسط وينها نوع حشيش المنبت . اوراها تشبه اوراق الجزر . منافها الطيبة كنافع الكون .

٢٤٠٣٦ - كُمُون حُلُو Anis (F).

هو الانيسون ، اطبا .

٢٤٠٣٧ - كُمَمِيَات Tuberaceae (S).

Tubéracées (F). Tuberaceae (E).

فصيلة الاك من الفطور الزقية اجناسها وانواعها عديدة اكثرها مستحب العلم مأكول . فوراها الشكل والحجم والون والرائحة .

٢٤٠٣٨ - كُمَمْت Baj (F). Bay (E).

من الزوان اثواب الخليل للذكر والاثنى . ج ك ت . والبرس الكعيت اشد حرة من الاشقر ويكون عرقه وذنبه اسودين وقوامه كذلك . ولكميت قد يكون :

٢٤٠٣٩ - كُمَمْت Bal foncé (F). Chestnut (E).

هو الذي يعلو حوته سواد

٢٤٠٣٩ - كُمَمْت Bal cerise (F). Dapple-bay (E).

هو الذي تشبه حوته

٢٤٠٣٩ - كُمَمْت Bal clair (F). Light-bay (E).

هو الذي تعلوه صفرة

٢٤٠٣٩ - كُمَمْت Chémérops (F).

هو النول ، اطبا .

٢٤٠٤٠ - كُمَمِي * Palmadæa (S). Kamichi (F).

طائر من طوال الساق وسيد الجنس والفرع مهد البلاد الامريكية . وهو كبير الجثة طوله نحو ٨٠ سم . وبسطه ٣٠٠ سم . ثوبه الى السمرة الخضراء المواج . بطنه ابيض . عتقه مطوق بالاسود . راسه قديمي الجبهة مجازي القنفذ . يائف النفاق ويجاري الماء . قوته الحشرات والقشريات والاعشاب . يثن في الفصوص بخفة بين الادخال القريبة من الماء . انثاه تحفن من ٤ الى ٦ بيضات .

٢٤٠٤١ - كُمَم Calicula (F). Calice, Caliculus (E).

كأس اناسية تحيط بكأس الزهرة الاسلية كما في زهر القرنفل والشيلك .

٢٤٠٤٢ - كُمُول * Cythæa (S). Cythæe (F).

جنس نباتات سرخسية من فصيلة الكلويات . انواعه عديدة جميعها كثيرة القد تعلو نحو ١٠ امار . جالومها زباد الماء . اوراها متصبية ، مركبة ، ثنائية او ثلاثية الانقسام تطول من ٣ الى ٦ امار . فصوصها اهليلجية الشكل ، مفشارية التنسب ؛ نصلها جامد النسيج ، انثوية الصلابة العليا ، نفسي السفل || وهو يربط في الاثر المقيمة للهور المتوسطة الاندماج الكائنة في المراض الجنبوية الدافئة .

٢٤٠٤٣ - كُمُولِيَات Cythaceae (S).

Cythacées (F). Cythaceae (E).

فصيلة من البرانس الصبائية المستورات الزهر . انواعها نحو ٩٠ جميعها خسة اجناس . اطباها البلاد الحارة . تصلح للزينة انما تربى في المواقع الرطبة .

٢٤٠٤٦ - كُمَم * Aveugle de naissance

هو ذو الكمة أي المي يولده بالانتماء او الخولن .

٢٤٠٤٧ - كُمَم * Tanche (F). Tanch (E).

الواحدة كمة . ولكنه جنس اسماك نهريه من فصيلة الشبوطيات مفتوحات الفم . انواعه قليلة تتميز باجسامها الاهليلجية الشكل وبدينتها الفكيتين البتيتين . اعرف انواعه واشهرها الكمة المبلولة .

٢٤٠٤٨ - كُمَمَة مَبْدُولَة * Tinca vulgaris (S).

Tanche commune (F). Common tanch (F).

نوع من الكمة وهي سمكة نهريه تربي في المياه الراكدة انحصا مياه القنارن حيث تعيش في اسماها . طولها عند ادراكها التام يراوح من ٢٤ الى ٣٧ سم . وزنها من ٥ الى ٦ كيلو . فلوها صغيرة القد كفة . زناها الفورية والصدورية والبطنية والفرجية مستطيلة ومستدرة الاطراف . ذنبا مستعرض مقطوم . فوها الى الفشار الاسفل الموج .

٢٤٠٤٩ - كُمُولِيَت Quamoclit

جنس نباتات عشبية حولية عارشة من فصيلة اليليات . انواعه قليلة جميعها زينة . سقاها صفرة . اوراها متعاقبة . انعارها لاقامية التجميع والارتكاز || تتكاثر بالبرز وتجدد في جميع الارربة الزراعية || اشهر انواعه التريينية ما يلي .

٢٤٠٣٠ - كُمُولِيَت اُرْجَوَانِي * Quamoclit coccinea, Ipomæa coccinea (S).

Quamoclit coccinea, Ipomæa coccinea (S). Quamoclit écarlate, jasmín rouge des Indes (F). نوع من الكوكليت الزينة البروتي . ساقه تطول من ٣ الى ٥ امار . اوراته قلبية الشكل جميلة الخضار الزاهي . انعاره عتقودية التجميع كبيرة القد . بتلاها خسة الزوايا ، ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

٢٤٠٣١ - كُمُولِيَت رِيَشِي * Quamoclit pinnata, Ipomæa quamoclit (S).

Quamoclit pinnata, Ipomæa quamoclit (S). Quamoclit penné, Q. cardinal, Lisaron à feuilles incisées (F). نوع من الكوكليت الزينة البروتي . ساقه تطول نحو ٢٥٠ سم . اوراها كبيرة مفرجة متوازية التفرع المشطي الذي يبدو كالريش . ازهاره فردية التجميع ، كبيرة القد ، وردية اللون ، ارجوانية المواج || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٢٤٠٣٢ - كُمُون Latence (F). Latency (E).

الكُمُون حالة الشيء الكامن .

٢٤٠٤٨ - **كناريوم** * Canarium (S).

Canarion, Canari, Canarium (F). Almond, Elemi tree (E). Kanarienbaum (D). Canario (I).

جنس شجيرات برية من سبط البفوريات وفصيلة البطيانيات. انواعه المروفة نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الاطلسية، تفرز حصارا وراتنجية يضاء اللون ببطيئة الاشتعال قوية الهب، فواكه العرف المستحب. اعشاشها صلبة يضاء اللون لكنها لا تصلح للاستعمال الصناعي.

٢٤٠٤٩ - **كناس** Gîte (F). Lair (E).

ماوى الطير في الغاب بين الشجر يستتر فيه. ج. كنوس وكناس.

٢٤٠٥٠ - **كنشافة** ٥ ، **كنشع** Lignée (F).

Issue, Progeny (E). ج. كنشاث وكناشع. مية الاصل الموصفة المشتبة كأمهات لسلالات نباتية معينة.

٢٤٠٥١ - **كنشاهة** ٥ Tectonique (F). Tectonic (E).

علم يبحث في تكوين الأرض وتطورها.

٢٤٠٥٢ - **كتب** Cal (F). Callus (E).

نسيج دامل يغطي الفراغ الذي احده الجرح في الشجرة.

٢٤٠٥٣ - **كتب** Callose, Callosus

اندام في الجلد مظهره نقط رافعة متصلة او نتوءات جامدة.

٢٤٠٥٤ - **كتبات الحقل** Equisette (F).

هو الأسوخ، اطليه.

٢٤٠٥٥ - **كتبات الشتاء** Prêle d'hiver (F).

هو الأسوخ الشتوي، اطليه.

٢٤٠٥٦ - **كتبانيات** Equisetaceae (S).

Equisétacées (F). Equisetaceae (E).

هي الأسخيات، فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوضائية.

٢٤٠٥٧ - **كتبار** Chamaedora (S).

Chamaedorea (F).

جنس اشجار ليفية من فصيلة النخلات. انواعه المروفة ١٠ اصطناعا الاقاليم الحارة معظمها امريكي المنبت وبعضها افريقي. تزهر القزوين، جلوهها تملو من متر الى تسعة امتار، صفها يطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. كواثيرها عديدة، قنولتها لينة، ثمارها كرزوية الشكل رائحة ناضفة المادة للاستعملة || اشهر انواعه التريينية :

كتابار البق *

Ch. elegans (S).

Chamaedorea élégante (F).

Ch. elator (S).

Chamaedorea élevée (F).

Ch. gracilis (S).

Chamaedorea gracileuse (F).

٢٤٠٥٨ - **كتبث** ٥ Chenopus (S).

Chénopée (F). Chenopus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الاربل وفصيلة الكنبشيات. انواعه المروفة كثيرة العدد، المعاصر

٢٤٠٤٢ - **كسمكة** Caecum (S).

Caecum (F). Caecum (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الاربل وفصيلة الكنبشيات || انواعها المعاصرة المروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصداها صغيرة، انبوية الشكل، حلزونة الفتحة المقوسة. افواها دائرية. اسقاطها مدلكة، قرنية الغشاء. لولاسها عادية اللون.

٢٤٠٤٣ - **كسميات** ٥ Caecidae (S).

Caecidae (F). Caecidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الاربل اسميات الخياشيم ومدييات الاجهزة || اجناسها وانواعها المروفة مديية، معظمها من متحجرات الاياح الثالث. اما الانواع المعاصرة فنحو ١٠٠ تنتمي الى جنس واحد يدعى كية.

٢٤٠٤٤ - **كسكة** * Lepidogaster gouanli (S).

Barbier, Porte-écuelle (F). Sucker (E).

سمكة من فصيلة الرغفيات يكثر وجودها في المتوسط. تتميز بكبري وأنها وامتدالة زمانها الصدرية والظهرية. جسمها متوسط القد، ثوبها جميل الالوان الزاهية يغلب فيها الوردي للملح المواجه. بطنها فضي اللون. حصرها ويخرج ظهرها ممتدة التيلابح الاسمر. لحمها متوسط الصنف.

٢٤٠٤٥ - **كتاب** Callistoté (F).

هو الجساة، اطليا.

٢٤٠٤٦ - **كتار** * ، **كتاري** ، **حزكر**

Serinus canaria (S). Serin des Canaries, Canari (F). Canary (E).

نوع من النقر وهو صفور غريد اصفر اللون، انخسر الموج يرق في الانقاص. ضره وسلااله الحالية عديدة تختلف باختلاف القرب والحجم || موطنه الاصل جزر كتاربه وهو يألف الأماكن القريبة من الماء لانه يقتل كل يوم. قوته البزور البرية الصغيرة ولوايح النبات وبعض الانعام السكرية انحصا اثنين الناضج الساك. وهو في القفص يعيش نحو ٢٠ سنة هل يزو المكثس والبسيطة والذين والشلم المنقوع وانس والبار السكرية والخبز المنقوع بالخليب اللذي وصفار البيض || الانثى تحضن ثلاث مرات في الحول. حضانها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات صغيرة الحجم فبراء القشور المرققة بالجروي رخصها يستقم ١٣ يوما || وهي تساند النقر والحسن والكسر والخفيري والتفخيبي والقشور والوردي ... لتاجها لعل قوي الشكبة مراكب الالوان المتداخلة المرتكزة على الاصفر.

٢٤٠٤٧ - **كتارين** ٥ Canarina (S). Canarine (F).

جنس نباتات جنبية معمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها قليلة اصطناعا جزر كتارية. جلودها غليظة وشية. سيقانها تملو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. حصارها حلابية ديقة. اوراقها متقابلة، معنقة، رعيمة. نصلها مالمش البشرة، مسن الحافة، بحري اللون. انماها قمية الشكل، كبيرة القد، مستطيلة المنالين متدلية. لونها الى الصفرة الناعية هو رقها الى الحمر. ثمارها جنبية مأكولة.



كية



كنار



كناريوم



كنبار انيق

يفار الى ذلك باضافة « ١ » فيصح التعريف ان ذلك
كنا او كگا او كگا الخ.

٢٤٠٦٦ - كُنْبُجُوس ، كُنْبُجُوس (S). Cajanus

(F).

جنس نباتات ليفية خشبية معمرة من فصيلة القرنيات
القرنافية . اوراقها عديدة مطبها بري وبضها زراعي .
اصنافها البلاد الحارة والامراتية . سيقانها متضبة . اوراقها
متضبة ، مركبة ، ثلاثية . ازهارها نورية التجميع . ثمارها
قرون مطبحة مخضرة القواصل الحبية || اعرف انواعه
واشهرها الكنجوس الهندي .



كنب

٢٤٠٦٧ - كُنْبُجُوس هندي * ، كُنْبُجُوس هندي * ، كُنْبُجُوس هندي *

هندي * ، كُنْبُجُوس هندي *

Cajanus indicus (S). Ambrevade, Pois d'Angole, Pois
d'Angole (F). Doll, Pigeon-pea, Cajan-pea, Congo-
pea (E). Catjang, Angolische Erbsen (D). Cajano dell
Indie, Cicio dall India, Pisello d'Angola (I).

نوع من الكنجوس القرني ، فروعها عديدة شائعة الانتشار .
ساقها ليفية ، خشبية ، فروعها ، زياه ، تملو من ١٥٠
الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية ، وريقاتها اهلجية
التصل ، خلية البشرة حل صفحتها . ازهارها نورية التجميع ،
صفراء اللون ، موزعة بالاخر . ثمارها قرون مطبحة تقوئل
من ٤ الى ٧ سم . تقطف من ٣ الى ٥ حبات مستديرة
مفلطحة تقريبا قعر الحصة ، لونها يختلف مع القصر
منها الابيض والحلتي والاسمر والاخر والمقرش || قرونه
الحضر طليخ كالقوياء . حبه التامنج الجاف صلب
للادة يستعمل بعد سحقه وهو غزير العناصر الغذائية يحوي
ما قد :

من ١٩ الى ٢٠ ٪ من المواد الازوتية

من ٦٢ الى ٦٤ ٪ من المواد الهيدروكربونية

من ١٠ الى ١٢ ٪ من المواد للحمية



كثور الشوك



كنجوس هندي

٢٤٠٦٨ - كَنْتَبْ Anaphalis (S).

Anaphale, Anaphalide (F). Pearly everlasting (E).
Weisses Perikörbchen (D). Semprevia blanca (I).
جنس نباتات خشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه
المزودة قليلة . اوراقها متضبة مخضرة قطنية . رؤيساتها
الزهرية مقلية التجميع . ازهارها حامية الزائفة . ثنائياتها
فيقة . يزورها مستقلة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٠٦٩ - كَنْتَبْ النبت

Anaphalls nubiaga (S). Anaphalide du Tibet (F).

نوع من الكنجوب الزبيني يملو من ١٠ الى ٢٠ سم . ساقه
واوراقه مخضرة قطنية . اوراقه سنانية التصل وسيدة العرق .
رؤيساته الزهرية وسيدة ، ازهارها صغيرة مبكرة حامية
الون . ازهارها يستمر طوال شهر تموز .



كنجب ناعمي

٢٤٠٧٠ - كَنْتَبْ نُعْمِيَّ

Anaphalls margaritacea, Antennaria margaritacea
(S). Anaphalide nacrée, Immortelle blanche (F).

نوع من الكنجوب الزبيني يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه فيقة تقوئل من ١٢ الى ١٤ سم . وتعرض نحو ٥ سم .
تصلها اخضر الصفحة العليا بغير الشمل البياض الكثر .
رؤيساته الزهرية كبيرة القدة ثنائية اللون والعملة || ازهارها
يستمر طوال الصيف .

منها وقد يتجاوز ٤٥ يمشي في بحار شمال المحيط الاطلسي ||
اصنافها صغيرة القدة وشمية عازنة مثمنة الاولية . فوجاتها
مستدلة الانفرج ، رباعية الفلق للامتساوية التي تبدو
كأرباع التم شكلا وحطبا .

٢٤٠٥٩ - كُنْبِيَّات * Chenopodiidae (S).

Chenopodiidae (F). Chenopodiidae (E).

لفصيلة حيوانات بحرية من الرضويات معديات الارجل .
اجناسها وانواعها الموزعة عديدة بعضها من متحيرات
الاحتجاب الجردية والعلياشورية وبضها معاصر منتثر
في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اعرف اجناسها
واشهرها الكنجيب والدرتية والحريبود والفصجية .

٢٤٠٦٠ - كَنْتَبْ

Auvent (F).

Pent-roof, Porch roof (E).

سقيفة مسطحة لاقياس العلل والعرض والاعتدال ترتكز
على حائط او بناء .

٢٤٠٦١ - كَنْتَبْ

Enveloppe, Revêtement (F).

Covering, Facing, Revêtement (E).

كل مادة حاجزة توضع لوقاء الشيء وتستره .

٢٤٠٦٢ - كَنْتَبْ

Biblos (F). Curio (E).

ج . كتاب . هي الاشياء الصغيرة الفاعرة الصنع من تماثيل
وغيرها توضع لزين .

٢٤٠٦٣ - كَنْتَبْ

Cantharide (F).

هو الزناح ، الحلي .

٢٤٠٦٤ - كَنْتَبْ الشوك *

Agapanthia cardui (S). Agapanthie des chardons (F).

حشرة وائمة خاضلة من فصيلة القرنيات ورتبة مفدمات
الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقالم حوض البحر الابيض
المتوسط . تألف جميع انواع الشوك والقيهاء . خنافسها
تمش على الازهار . يرقاتها تسردب اربوتات النباتات
المائلة ولا تقف من سيقانها || جسمها صغير القدة ، اهيف
الشكل ، يملو من ٧ الى ١٢ سم . ثوبا الى الزرقعة العابقة
يملوها موانج سبروي وثلاثة خطوط عابية تقطع الكوسل ،
وعطشان اصفران يكتنفان الدرز الغدي . رأسها مشتمل
الجرم بقور يغطيه تحت الكوسل . عينها صغيرتان .
زبادانها خيطيان ، مهبان . ازهارها مهدب الحار . ثمدانها
معدلتان الصلابة ، متبابتان التحزيز القاطب . ارسافها
خاسية العقل || الاثن امين قدا من الذكر وابنت ثوبا
منه والسر زبانا || لما جيل واحد في الحول . تظهر
الحشرة الجمدنة في اوائل ايار وتبقى حتى اواخر آب .
تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة منه اذراكها
الكال المسجوري الذي يحصل بعد التقف بنحو ٣٨
اسبوعا ، تقوئل من ١٨ الى ٢٢ سم . جسمها دقيق الجرم ،
مستطيل الصدر ، مستدق السكة الشرجية ، سداسي
الرواجب . ثوبا الى السمرة الخفيفة البهراء الموانج يكتنفها
تقطين اسود يطوى بفسر الهلب .

٢٤٠٦٥ - كَنْتَبْ

هو حاصل التجميع انبل كان ام الشيب . يعرف عنه
عدالة بحرف « ك » اما السلالة الاولى فتعرفها كز
والسلالة الثانية كز والثالثة كز . واذا هجن الكنجين من
جديد مع احد طرفيه ، وهو ما يدعى التاثير او الدجلة ،

Gypsophila elegans (S). كُنْدُسْ أُنِيَق ٢٤٠٨٠
Gypsophile élégante (F).
 عشبة حولية تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. جلورها دقيقة ساقها قوية متضبة. أوراقها سنانية ذلقة، نصلها وسيد الوراق. أزهارها مستطيلة المالحق، بيضاء اللون أو وردية. أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨١ - كُنْدُسْ دَبْحِي الرَوِي
Gypsophila scorzonifolia (S). Gypsophile à feuilles de scorzonère (F).
 عشبة سبروتية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع المستطقة. أوراقها سنانية، نصلها قلبي القاعدية خلسي الوراق. أزهارها إلى الحمرة الجلمية، كلها أخضر اللون صغير القند يطول نحو ٢ سم. || أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٢ - كُنْدُسْ دَرَب
Gypsophila acutifolia (S). Gypsophile à feuilles aiguës (F).
 عشبة معمرة زياء تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فروع. أوراقها بحرية اللون خلية البشرة حل صفعتية. أزهارها وردية، كروصا إلى البياض الاخير تملو خمسة خطوط حر || أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٣ - كُنْدُسْ كَبِير الزَّهَر
Gypsophila floribunda (S). Gypsophile multiflore (F).
 عشبة حولية سبروتية تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. ساقها دقيقة الفروع. أوراقها صغيرة ذرية. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة القند، وردية اللون، كلها خلسي التفلق للسننة المتصولة بخطين ابيضين يتوصلها خط أخضر. أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين.

٢٤٠٨٤ - كُنْدُسْ لَوِيح
Gypsophila viscosa (S). Gypsophile visqueuse (F).
 عشبة حولية لزجة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها فروع. أوراقها سنانية؛ نصلها خلي البشرة الزيتية، ثلاثي أو خلسي الوراق. أزهارها وردية اللون قصيرة المالحق || أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٤٠٨٥ - كُنْدُسْ مَدَاد *
Gypsophila repens (S). Chalk plant, Cloud plant (E). Kriechendes Gipskraut (D). Gesso filo (I).
 عشبة سبروتية مبلولة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ساقها ليفية مدادة. أوراقها سنانية مستطيلة، نصلها بحري اللون وسيد الوراق. أزهارها كثيرة العدد، صغيرة القند، وردية اللون أو بيضاء || أزهارها يستمر من حزيران إلى ايلول.

٢٤٠٨٦ - كُنْدُسْ مَصْرِي *
Gypsophila struthium (S). Gypsophile frutescente, Saponaire d'Egypte (F). Egyptian soap root, Struthium gypsophila (E). Spanisches Gypskraut (D). Saponaria vera, Struzio (I).
 عشبة برية مبلولة معمرة تكثر في البلاد المصرية حيث تستعمل في النسيل. ساقها مدادة. جلورها متوسطة الخشانة. أوراقها شقيقة؛ نصلها خلي البشرة، بحري اللون. أزهارها صغيرة القند وردية اللون أو بيضاء.

٢٤٠٨٧ - كُنْدُسْ
Pie (F).
 هو المققن، اطليه.

٢٤٠٧١ - كُنْدُسْ *
Pterygode (F).
 الكندسية جناح زائد صغير القند، قلبي الشكل، يلمح الررش عند قاعدته في رتبة حشفتيات الاجنحة. وهما كندسيان، يعني ويسرى، تستعملها الفراشة لكسج ورفشها الاماميين.

٢٤٠٧٢ - كُنْدُسْ كَارَة *
Cantharus (S). Canthère (F). Bream (E).
 جنس اسماء بحرية من الاسبروديات الشاككات الزخائف الكيثريات القلوس. انواعها ثلاثة. اجسامها بيضيه الشكل، طولها يراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم. زخائفها الظهريه ثقبه السنام. تألف الغور الهيد ولا تقرب من الشاطئ، الا في بعض الاثمة.

٢٤٠٧٣ - كُنْدُسْ كَارَة مَبْدُولَة *
Cantharus cantharus (S). Canthère commun, Griset (F). Common sea-bream (E).

نوع من الكندارية. سمكة بحرية يبيض من فصيلة الاسبروديات ورتبة شاككات الزخائف. مسرعا الملاح، تألف الشطوط والاعوار وتدخل المواني. اعطاها البحر الابيض المتوسط || جسمها اعليجلي الشكل، معتدل التبيط، يطول من ٤٠ إلى ٥٠ سم. ثوبا إلى الشبهة الغضبية الملاح تشدد سبرتها في الظهر. جانبها مشيزان بخطوط قاطبة صفراء اللون. رأسها كبير الجرم، قصير أنف. فكها متعادلان. شفتها معتدل الانفرج. اسنابها رباعية الصقوف في الفكين. ميناها صغيرتان، تاذرتان. زخائفها الظهريه واسعة سنانية الشكل. زخائفها الليلية قاطبة || عموها متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٠٧٤ - كُنْدُسْ هو كركك السد، اطليه.
٢٤٠٧٥ - كُنْدُسْ هو الهان الذكر، اطليه.

٢٤٠٧٦ - كُنْدُسْ يَرْزُوم، مِيْشُوكُنْدُري
Chondriosomes, Mitochondries (F). Chondriosomes, Mitochondria (E).
 هي مجموعة الكناسج التي تتألف منها الحبيرة الحيوانية أو الخلية النباتية.

٢٤٠٧٧ - كُنْدُسْ يَرْزُوم
Chondriome (F).
 هي الهية، اطليه.

٢٤٠٧٨ - كُنْدُسْ
Gypsophila (S). Gypsophile (F).
 جنس نباتات عشبية من فصيلة القرنفليات. انواعها زهاء ٤٠ منها الحولية والمعمرة والبرية والزارعية. ساقها فروع. أوراقها صغيرة القند متطابقة. أزهارها خسية التجميع، قاطبة الاوتكاز، صغيرة الحجم. جلور يسطها صنابية يستخرج منها مادة الصابونين وتستعمل في خيل الانسية الصوفية والكاتانية والقلبية تنظفها من الاقذار وتكسها بعض الزهراء والورق || أدب. انواعها واشهرها ما يلي.

٢٤٠٧٩ - كُنْدُسْ الصُّخُور *
Gypsophila petraea (S). Gypsophile des rochers (F).
 عشبة سبروتية معمرة برية تعيش في الاثمة والصخور الكلسية. تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. جلورها غليظة. ساقها ليفية مدادة. أوراقها صغيرة القند، بحرية اللون، بنفسجية القاعدية والمتن. أزهارها متقاربة لونها إلى البياض الصافي. قناباتها بيضيه الشكل ثنائية التركيب || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.



كندارة



كندارة مبلولة



كندس الصخور



كندس مداد



كندس مصري



كندور

٢٤٠٩٥ - كُنْدَ Asterôide (F), Asterôide (E).
نمت تعريفياً يطلق على جميع السيارات الصغرى الدائرة حول الشمس بين المشتري والمريخ. ج. كُنْدُش ويُسمى أيضاً الجوّاري الكُنْدُش.

٢٤٠٩٦ - كُنْج Organite
كل عنصر من العناصر التي تتألف منها الخلية كاجلّة والسننورودوم ج. ك. كنج.

٢٤٠٩٧ - كُنْج Lignéa (F).
هو الكنافة، الخبثا.

٢٤٠٩٨ - كُنْجَ Consoude (F).
هي السوفولان، جنس اشباح برية طيبة.

٢٤٠٩٩ - كَنْكَلِيَّات Tringians (F).
عارة من فصيلة دجاجيات الارض. اجناسها قليلة. اعرفها الجبليل. جميعها من القواطع الصغريات اللند. متاخرها دقيقة خالية من التخذيد. ارساها تحيلة. الزوايا مرطبة وهي صيفية وشتوية تختلف عن بعضها برونق الالوان واقترب الرقعة او تباعدها.

٢٤١٠٠ - كَنْكَلِيَّات Conchite (F).
مادة متجمدة في داخل صفة.

٢٤١٠١ - كَنْكَعَد، كَنْكَعَت Germon (F).
هو كنجون الابيض اي الجبرون، سمكة بحرية من فصيلة الاسقمريات. قال جرير:

« قوم اذا جلول في صبرهم بصلا
ثم اشتروا كنداً من مالح جلولاً »

٢٤١٠٢ - كَنْف Holacanthus (F).
هو الطبق من الاسماك البحرية، اطله.

٢٤١٠٣ - كَنْف، كَنْفَ Blotop
هو المكان الموصوف المتحدود بطبيعتها ويناعه.

٢٤١٠٤ - كَنْك هو البان الذكر، اطله.

٢٤١٠٥ - كَنْكَلِي Terricola (F), Terricolous (E).
نمت تعريفياً يطلق على الديدان والحلوانات الدنيا التي تعيش داخل التربة.

٢٤١٠٦ - كَنْكُور Topinambour (F).
هو عباد الشمس السقولي، اطله.

٢٤١٠٧ - كَنْكَلِيَّة، كَنْمَرَلِي Combratum altum, C. micranthum (S).

Combrat élevé, Kinkeliba, Chigomier altier (F).
Vegetable-glue plant (E). Langfaden (D).

لوع من الاسم وكنكالية هو الاسم الافريقي. نبات حرجي طبي معمر من فصيلة الالهليجيات. منته يمد من جمهورية مالي الى سيراليون وشاطئ المايك ج. وهي شجرة فراء تعلق نحو اربعة امتار. ساقها شديدة الصلابة. فرودها متراكبة، مستطيلة، جلدية اللون ثم حلاوة. اوراقها متعاقبة، متتعة، اهليلية، تطول من ٥ الى ٩ سم. وتقرض من ٢ الى ٥ سم. نعالها مائة البشرة، حاكمة الخضار الجوزي المايك. ازهارها سنبل التجمد،

٢٤٠٨٨ - كُنْدُش جَوَال Plie vagabonde (F).
طائر من الجوارى يدعى كطري، اطله.

٢٤٠٨٩ - كَنْدَلَاء، كَنْدَلِي
نبت ينبت بماء البحر ويؤتى بالشوة. قشره يسي الايدع يدبغ به (اللسان).

٢٤٠٩٠ - كَنْدَم، جَوْر كَنْدَم Mangouste (F), Mangosteen (E).
ويدعى الجندم، هو ثمرة جلد مستفان.

٢٤٠٩١ - كُنْدُورُج Silo
شبه مخزن يشاد في الارض يفسره الثراب مخزن فيه الجيوب.

٢٤٠٩٢ - كُنْدُورُ، كَنْدُورُج، كَنْدُورُج
فصاح

Sarcorampus condor, S. gryphus (S). Condor des Andes (F). Condor (E).
طائر من النسور ينتمي الى فصيلة النوراجيات. جلته كبيرة. لبقه تطول نحو ١٦٠ سم. اما بسطة سقله فنحو ٣٥٠ سم. رأسه مستطيل الشكل يحمل على جبهته حرف اخر. منقرو كبير اللند، مريض الانتشاب، احسن البيرة الحادة. صقعه اغفر الريش كالرأس، مطوق بالابيض الاسفر المايك. ريشه اسط، غاليه كبيرة. قويه الى الطلبة المويجة بالاسود. قوامه يبيض. يألف المناطق العالية من ارتفاع في امريكا الجنوبية. يألف المناطق العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م. من سطح البحر. نظامه الحياتي خاص. سره يمد من ١٠ الى ٢٠ ذبياً. يلتصق قوته في راءة النبار، ورغب في الجنب وان تدر عليه ويوجد اسطاد الايايل والماعز وكل ما استطاع اليه سبيلاً. يمشي وكنه على الحضيض في اوقات المسحور للزففة او في تنوع الجبال الرقعة. اثناء تضع روتين كثيرين تحضنها وسدحا نحو ٤٠ يوماً.

٢٤٠٩٣ - كَنْدِيَّة، زَهْرَةُ المَرْجَان Kennedy (S), Kennédie, Kennédye (F). Coral creeper (E). Kennedie (D). Kennedia (I).

جنس نباتات ليفية عارضة برية وتربينية من فصيلة القرنيات القرشائية. انواعها ١٢ معظمها ترابي، سورها زياء تطول من متر الى عشرة امتار. اوراقها متعاقبة منعقة ثلاثية الفصوص. ازهارها كبيرة القذ فريدة او متعددة التجميع، عوروية الاكثار او طرية لونها الى الاحمر ومنها الوردي والاربعوني والقرنبي والياقوتي... || اشهر انواعها الترينية:

كندية هبية
Kennédie splendide (F).
K. rubicunda (S). كندية بالقوية
Kennédie rouge, K. à grandes fleurs (F).
K. nigricans (S). Kennédie noire (F). كندية سوداء
K. coccinea (S). Kennédie écarlate (F). كندية شقاراية
K. glabra (S). Kennédie glabra (F). كندية مزدا
K. prostrata (S). كندية مستلقية
Kennédie couchée (F).

٢٤٠٩٤ - كَنْس هو الشنقب، اطله.



كندية

٢٤١١٦ - **كُنْيَاك**، **كُونِيَاك**
Cognac (F).
Cognac brandy (E).
مشروب قنديدي شائع الاستهلاك يصنع من كحول العنب .
وقد اشتهرت بصناعته بلاد الكونيكيا في فرنسا .

٢٤١١٧ - **كُنْيَب**
Arbres desséchés (F).
Dried trees (E).
الكُنْب: اليبس من الشجر .

٢٤١١٨ - **كُنْيِدَا** ، **كُونِيدَا**
Conidia (F).
Conidium (E).
كل بويضة فطرية نشأت حل كاتب لا في زق تدعى كُنْيِدَا .

٢٤١١٩ - **كُنْيَة**
Locule (F). Loculus (E).
الكُنْيَة ، في علم التاريخ الطبيعى ، هي الحفرة الشديدة الصغر .

٢٤١٢٠ - **كُنْيُولِسِيُوم**
Coniothecium (S).
جنس تطور مجهرية من حمارة الزمانيات وفصيلة الطحنيات .
يتبين بخلوه من الجرب الكُنْيِيَة . كائناته مركبة مستطيلة .
بويضاته كروية جيرية التجميع || أنواعه عديدة جميعها
دمية تركب لحاء بعض الاشجار دون ان تؤذيها ، منها البندق
والحور والوخ والقصاف .

٢٤١٢١ - **كُنْيُورَاف** ، **كُونْيُورَاف**
Goniographe (F).
ويسمى مرمية الزوايا . آلة المسح تقاس بها زوايا الارض
فترسم مستلها على القور .

٢٤١٢٢ - **كُهَب**
Buffle âgé (F). Aged buffalo (E).
هو الجاموس للمسن لا يزال كاذر الحسم .

٢٤١٢٣ - **كُهَبَل**
Detarium (S).
Détar, Détare, Détarium, Ditah (F). Tallow-tree (E).
Detaripbaum (D). Detaria, Meli (I).
جنس اشجار افريقية المنبت من فصيلة القرنيات . له
نوعان نوع ثماره مرة الطعم ، سحالية المادة ، مؤذية .
ونوع ثماره مأكولة مستحبة الطعم يعرف بكهبل السنغال .

٢٤١٢٤ - **كُهَبَل السنغال**
Detarium senegalense (S). Détare du Sénégal (F).
Senegal tallow tree (E).
نوع من الكهبل شجرته تملو نحو ١٢ م . ساقها مستقيمة
اوراقها متعاقبة مركبة ، وريقاتها شفافة الانتظام .
الشكل ، نصلها جامد الصفعة . عايق الخضر .
عقريدي التجميع ، محوري الاذنكاز ، ثمارها مشعشة
الشكل والقه ، ليلب سؤذها ناشف المادة ، سكري الطعم ،
اغصن القر .

٢٤١٢٥ - **كُهَذَب الإحصاء** ، **أَكَارُوس**
Eriophyes pyri (S).
Phytopte du poirier, Eriophyes des poiriers (F). Pear
leaf blister mite (E). Birnblatt-Pockenmilbe (D).
حشرة من الكهديات المجهرية تركب برام الاجاص
تقتبب الاوراق الباكرك ثم تغطي على الاوراق فتضم النصال
بالبحور السمر او الحطبة بعد ان تقضي على خلايا النسج
الذي يصيح كالاسفنج بين بشرته العليا والسفلى .
يكافح مكافحة التناكب باستعمال الحواشير والمواكين .

محوري الاذنكاز . ازهارها صغيرة ، ودية اللون ،
تملوا رشفة نحاسية . ثمارها يزور بحرمية مجنحة صغيرة
تبدو في اول صيفها غصافه اللون ثم يتصرف اللون ، عند
النضج ، الى الوردية القلبية الواجبة .

٢٤١٠٨ - **كُنْيَلُوجِيَة**
Conchylologie (F).
Conchology (E).
هي علم الاصداف .

٢٤١٠٩ - **كُنْيَتَا** ، **كُنْيَا** ، **سِينْكُونَة**
Cinchona (S). Quinquina (F). Cinchona, Quinin bark (E).
Chinabaum, Fiebarindenbaum (D). China (I).
جنس اشجار وبجيرات برية وزراعية صناعية من فصيلة
الفويات . انواعه المخرقة ٢٠ اصلها المناطق الحارة
الرطبة . معظمها بري وبعضها زراعي صناعي طبي .
سوقها مستقيمة تملو من ٤ الى ٣٠ م . اوراقها متقابلة
معقنة ، نصلها يصفية او املجية الشكل . ازهارها
عقريدي او عثوكلي التجميع . ازهارها عشوية زيله
البشرة . ثمارها جبراه غروبية الشكل تحضن البند من
البزور الصغيرة النشائية المنح || يستخرج من قشورها
مادة قلوية يضاف اللون شديدة المارة تعتبر من أهم القلويات
المستخلصة من لحاء النبات وتعرف بالكينا .

٢٤١١٠ - **كُنْيَتِيَا**
Cinchonées (F).
سبط من الفويات يشمل نحو ٩٥٠ نوعاً من النبات
تنتهي الى ١٠٠ جنس لشهورها الكُنْيَتِيَا .

٢٤١١١ - **كُنْيَان** ، **لُيْبِد**
Alkana orientalis (S). Alkana, Alcanne, Alkan,
Grémil à fleurs jaunes (F). Yellow bogloss, Yellow
gromwell (E). Orientalische Perithrize (D). Al-
kana (I).
جنس نبات عشبي بري من فصيلة الحمصيات . اوراقه
ضيفة مستطيلة ، نصلها خال البشرة . ازهارها صغيرة القذ
يضاه اللون . بزوره مستديرة ، حطية ، قاسية كالحجر
لدر البريل وتفيد الحشم وتنشط الايلاج وتذيب البلم .
انواعه عديدة اصلها الجرد والبقاع الداخلية .

٢٤١١٢ - **كُنْيَان صِبَاغِي** ، **سُنْبَجَار الجَر** ،
عَسَّ الحَمَام ، **رجل الحَمَام**
Alkana tinctoria (S). Alkana tinctoriale (F). Al-
kanet (E). Alkanne (D). Alkana spuria (I).
نبات عشبي بري من فصيلة الحمصيات يشتخرج منه
صباغ احمر اللون شائع الاستعمال .

٢٤١١٣ - **كُنْيَهَل**
الكُنْيَهَل "جُر طام" . قال امرؤ القيس :
فاضى يسح الماء من كل نيفة
يكب على الاذنكاز دوح الكُنْيَهَل .

٢٤١١٤ - **كُنْهَر**
Fractocumulus
ضرب من البودم اللزجة المطر ويدهى الجلب ، اطلبه .

٢٤١١٥ - **كُنْود**
Terre improductive (F).
Unproductive soil (E).
ارض لا تثبت شيئاً . يقال هذه ارض كنود .



كنكينا



كهان صباغي



كهبل السنغال



كهذب الاجاص

٢٤١٣٤ - كُھَدَبُ المَنْجَا ، أكَارُوس المَنْجَا
Eriophyes mangiferae(S). Eriophye du mangar(F).
حشرة من الكهديات المجهرية تركب برام المنجا فتؤذيها
وقد تقتضي عليها .



كهذب البتوة

٢٤١٣٥ - كُھَدَبِيَّاتٌ
Eriophyidae(S). Eriophyidae, Blister mites, Gall mites (E). Gallmilben, Gallenmilben (D).
فصيلة حشرات صغيرة القد من رتبة الزفاديات . اجناسها
وانواعها عديدة جميعها مجهرية . اجسامها اسطوانية .
تطوي من خيلن الى اربعة خطوط من للميتير . جرابيها
رباعية طرفية تحيط باجزاء الفك || جميع حشراتها ضارة
تركب برام واوراق النبات فتؤذيها اشد الاذى وقد تسبب
تلها .



كهذب الزيتون

٢٤١٣٦ - كُھَدَلُ القطن ، قارضة القطن
Lepidocyrtinus incertus (S).
حشرة صغيرة من الكهديات . ذباب الجسم ، سرها اللون ،
مستطيلة الذنب ، تعيش على نباتات الاراضي الرطبة
انصها القطن والبرسيم والفاصة .

٢٤١٣٧ - كُھَدَلُ الموز ، قارضة الموز
Drapanura muscica, Entomobrya muscica (S).
Drépanure du bananier (F).
حشرة صغيرة من الكهديات فوجيا الى الصفرة ، تركب
الموز وقصب السكر . انمرارها زبيدة لا تستعيب
المكانة .



كهذب الكرمة

٢٤١٣٨ - كُھَدَلِيَّاتٌ ، كَلْبَنِيَّاتٌ
Collembolae (F). Collembola (E).
وسم من دعاما ، قافزت الذنب . رتبة حشرات علدية
الاجنة ناقصة التطور الاصلاني العربي . حشراتها
قارضة قاذرة مستطيلة الاذنان تحمل في حلقها البيئة
الاول جراب صغير القد يفرز مادة لزجة تاصمدا على
تسلق السطح الناعمة المائلة .

٢٤١٣٩ - كُھَرَابِي
Electrogène (F). Electrogen (E).
نمت تعريي يطلق على كل جهاز يولد الكهرياء .



كهذب القطن

٢٤١٤٠ - كُھَرَبَاءُ
Electricité (F). Electricity (E).
الكهرياء طاقة موكمة ، داسها تتبع على الطيحات .
هي تقسم الى فرعين الكهرياء الاحتكاكية والكهرياء
الديناميكية فالاحتكاكية هي التي تستعمل في توليد
الكهرياء . اما الديناميكية فهي لفظة بالتيار الكهريائي
والاجهزة التابعة له .

٢٤١٤١ - كُھَرَبَةٌ ، كُھَرَبُ
Electrisation (F). Electrification (E).
٢٤١٤٢ - كُھَرَبِيٌّ ، كُھَرَبَانِيٌّ
Electrique (F). Electric (E).



كهذب الموز

٢٤١٤٣ - كُھَرَبِيَّةٌ عِلْمِيَّةٌ
Electrogalvanisme (F). Electro-galvanism (E).
درس القوى الصادرة عن الصفائح الكهروكيميائية .

٢٤١٤٤ - كُھَرْمَانُ أَصْفَرُ
Sucin
هو المنبر الاصفر مادة راتينية عجمية ، صلبة ، شبه
شفاطة . لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر . لا تنوب
في الماء وتقصهر في ٢٨٧ °م . اشتغالها يولد الحامض
المنبري وزييت طيار مستحب الرائحة العطرية .

٢٤١٣٦ - كُھَدَبُ البُنْدُقِ ، أكَارُوس البُنْدُقِ
Eriophyes avellanae (S).
Phytopte du noisetier, Eriophye du noisetier (F).
Hazelnut gall mite (E). Haselnussgallmilbe (D).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب حرافل برام
البندق تسبب سقوطها واعلاص الازهار .

٢٤١٣٧ - كُھَدَبُ البَنَدُورَةِ ، أكَارُوس البَنَدُورَةِ
Eriophyes cladophthirus (S).
Eriophyes des tomates (F).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب سوق واوراق
البندورة فتقتلها ويحتملها وعتمتها عن الاثمار .

٢٤١٣٨ - كُھَدَبُ التين ، أكَارُوس التين
Eriophyes ficus (S). Eriophye du figulier (F).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق التين الطرفية
النامية فتؤذيها بغض الشيء .

٢٤١٣٩ - كُھَدَبُ الرَّمَانِ ، أكَارُوس الرَّمَانِ
Eriophyes granat (S). Eriophye du grenadier (F).
حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الرمان
تقتبب اصفرارها وحلها الباكر .

٢٤١٣٠ - كُھَدَبُ الزَيْتُونِ ، أكَارُوس الزَيْتُونِ ، فِيلَرُكْبِتُ
Phyllocoptes (S). Phyllocopte (F). Rust mite (E).
Kräuselmilbe (D).

حشرة من الكهديات تركب اوراق الزيتون اعصها
ورديتها الانان الثانية فتتمتها من القاذ حبيها الغليبي
وترققها بدور صفر تتسع تدريجيا الى ان تم الفصل
تقتفي عليه .

٢٤١٣١ - كُھَدَبُ الزَيْتُونِ ، أكَارُوس الزَيْتُونِ
Eriophyes tiliae (S).
Eriophye du tilleul, Phytocpte du tilleul (F).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الزيتون
قتشورها بالانابيب البشروية التي تقيمها على صفحات
التصل العليا .

٢٤١٣٢ - كُھَدَبُ الكَرْمَةِ ، أكَارُوس الكَرْمَةِ
Eriophyes vitis, Phytocptus vitis (S). Eriophye de la
vigne, Erinose de la vigne, Phytocpte de la vigne (F).
Grape bud mite, Grape erineum mite (E). Raben-
blattgallmilbe, Rebenpockenmilbe (D).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب اوراق الكرمة
فترققها بالبربر بمد القضاء على خلايا النسيج فيصح
النسيج بين البشريين كانه محروق لا ريباه منه .

٢٤١٣٣ - كُھَدَبُ الكَشْمِشِ ، أكَارُوس الكَشْمِشِ
Eriophyes ribis (S).
Eriophyes du grosellier, Phytocpte du grosellier (F).
Black-currant gall mite (E). Knospengallmilbe (D).

حشرة من الكهديات المجهريات تركب برام واوراق
الكشمش فتؤذيها وقد تسبب اعلاص البرام والازهار .

الزئافن . انواعه المعروفة اربعة تتميز برووسها المستضفة وباشداتها الكبيرة الفاغرة وباسنانها الحادة المنطقفة كانهاب الاناهي || اجسامها عريضة ، عادمة السهف ، مبدرة المناسخ . عيونها حلوية الاركانز تحتل قلة الرأس حيث يوجد ثلاثة اسلاك او ملاس غضروفية تسمى كنيوط مستطيلة تنتهي ببعض الاسمال المختلفة الاشكال يستعملها الكراخ لاجتذاب الاسمال الصغيرة ، ذلك لانه كسول قليل الحركة يقضي معظم اوقاته مستلقيا على بطنه فائما شقة بانتظار الفريسة || اشهر انواعه كواكة المحيط وكواكة المتوسط .

٢٤١٥٤ - كَوَاكِبْ المحيط الأطلسي °

Lophius budegassa (S).
Baudroie de l'Atlantique (F).
سمكة من الكواخ . اعطانها جناح واغواط وشطوط المحيط الاطلسي . يكثر وجودها في خليجان المراكشية والاسبانية والبرتغالية والفرنسية || جسمها شبه غرورفي الشكل طويل من ٧٠ الى ٩٠ سم . ثوبا يماثل الموقع الذي تعيش فيه لانها قليلة الحركة || لحمها جيد الصنف ابيض اللون مرغوب فيه .

٢٤١٥٥ - كَوَاكِبْ مَبْدُولَة ° ، كَوَاكِبْ

المَتَوَسِّط ° ، لُطْ بَحْرِي مَبْدُول °
Lophius piscatorius (S). *Lophie baudroie, Baudroie commune, Diable de mer, Crapaud pêcheur, C. de mer* (F). *Toad-fish, Sea-devil, Fishing-frog* (E).
نوع من الكواخ . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض اقالم المحيط الاطلسي . مسرحها اضواء الهامح والشطوط . تألف المواقع المأدلة التي يراوح عنها من ١٠ الى ٢٠ مترًا || جسمها ضفي الشكل ، يطول من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم . مسكها عادم السهف . ثوبا الى الخنطي الاسمر يبق في الصفحة العليا ويغير ويبيض في السفلى . رأسها ضخم غليظ . شفها رجب الانفراج . عيناها كبيرتان سطحيات . ويلعوا في قلة الرأس ثلاثة اسلاك غضروفية دقيقة مستطيلة ، الاول منها ينتهي بمزق صغيرة كالاسمال || زعنفتها الظهيرة الانامية مستطيلة المناسخ الشائكة || تتميز باستاطلة قواعده الزعنافت الصدرية الرقيقة الاركانز . وتتميز ايضا بالشدولة اي انها تمانق البيئة التي تعيش فيها || لحمها ابيض اللون ، متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤١٥٦ - كَوَاكِبْ حَيَات °

Lophilids (F).
Lophiidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شالكات الزعنائف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها المحيط والبحر الابيض المتوسط . تألف الهامح والشطوط . مسرحها الاغواط التي يراوح عنها من ١٠ الى ٢٠ مترًا . تتميز بالكسل والشدولة اي انها تمانق المواقع التي تعيش فيها || اجسامها صفية الشكل كالشرغ ، ضخمة الرؤوس ، مالة القشار الزج ، مبدرة المناسخ الحادة . اعطانها فطس . اشداتها كبيرة وعريضة . اسنانها حادة متعققة || عيونها رقيقة الاركانز تشرف عليها بعض الاسلاك الغضروفية المتوسخة بالاسمال || اشهر اجناسها الكواخ .

٢٤١٥٧ - كَوَاكِبْ °

Bulla (S).
Bulle (F). *Bulla* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاربيل

Hydro-électrique (F).
ما يختص بانتاج الطاقة الكهربائية المولدة من دفع الماء .

٢٤١٤٦ - كَهْرَمَانِي °

Spéléologue, Spéléologiste (F). *Speleologist* (E).
من كان اختصاصه الكهفنة .

٢٤١٤٧ - كَهْرَمَانِي °

Spéléologie (F).
Speleazology (E).
علم يبحث في تشيب الكهوف وفي سبر الاغوار ومجاري المياه الجوفية .

Aubergine (F).
هو الباذنجان ، الحلبه .

٢٤١٤٩ - كَهْرَمَانِي °

Chicoca angulifuga, C. brachista (S).
Cahinga, Cainga (F). *Chicoce tree* (E). *Trauben-förnige, Kainzawurzel* (D).
شجرة حربية طيبة مسمرة من فصيلة الفويات . مهدا بعض مناطق امريكا الاستوائية || ساقها عارضة متسلقة فروع . اوراقها معتقة ، متفالة ، اعليجية الشكل . نصلها جامد الصلصة ، جميل الخضار العاين للاعم . ازهارها عتقدي التجميع . ازهارها صغيرة وردية اللون ، عادمة اللرب . ثمارها حلوية ، مبطلة ، عاصفة الملاق ، لا تؤكل || عصارة الاوراق ولتأثير مقوية وقاينة .

Libonum rotundum (S).
Phalangide, Faucheur (F). *Harvester, Harvest-spider* (E).
حشرة عظيمة دابة من فصيلة الكهوليات ورتبة المهرديات . مسرحها معظم المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبه || جسمه صغير القد ، اعليجي الشكل ، ملحوم الصدر والبطن ، عادم المشن ، خيشومي التنفس . ثماناي البرامز المستطيلة الثقيلة . ثوبه اصهب اللون عند الانثى ويصتوف الى السرة الخنطية يعلوها تقبيج اسود عند الذكر . الذكر اصفر قدًا من الانثى التي يبلغ طولها نحو ٤ سم . || يألف جميع المواقع والمساكن الآهلة . يصرح في الليل . قوته اخشرات الصغيرة واساريعها ويرقاتها والذباب والحمام || يجتر من الدويبات النافمة لانه يقضي على المؤذية .

٢٤١٥٠ - كَهْرَمَانِي °

Phalangidae (S).
Phalangidæ (F). *Phalangidæ* (E).
فصيلة حشرات دابة من رتبة المهرديات وصف التناكب . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اعرف انواعها واشهرها الكهول .

٢٤١٥١ - كَهْرَمَانِي °

Electron
جزئي . عادم الجرم اللولوس يشمن الكهرباء السلبية .

Electron
جزئي . عادم الجرم اللولوس يشمن الكهرباء السلبية .

٢٤١٥٢ - كَوَاكِبْ ° ، عُنُجُوم البحر ، لُطْ

Lophius (S).
Baudroie, Lotte de mer (F). *Anglar-fish, Frog-fish* (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الكواخيات ورتبة شالكات



كهول



كواكة مبدولة

الجنوبية . تسرح في الصباح الباكر ويحب الغروب . قوتها
الأعشاب والحبوب والحويب . اجبرتها اتفاق مستطيلة
حديقة التماريح والهايزز المتفرعة || اشهر انواحه
مايلي .

٢٤١٦٩ - كُوَيَاي البركزويل *Cavia porcellus* (S).

موطنه البرازيل والفرنان وويليغيا والأوروغوي . طوله
نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الصبغة الصائبة . بطنه ابيض اللون .
يمش بجاذات عند افرادها نحو ١٥ . يألف الاماكن
الرطبة ويجاري الماء والطواف الاذغال والذبابات || اثناء
تضع من الدريسين الى الثلاثة مرة واحدة في العام .

٢٤١٧٠ - كُوَيَاي الجنوبي *Cavia australis* (S).

موطنه امريكة الجنوبية حتى مضيق مجلان . طوله نحو
٢٨ سم . ثوبه سوي اللون احمر الطهر اثير البطن . وبره
عش مستطيل || يألف الحشبات والاذغال . اثناء تضع
مترين في العام .

٢٤١٧١ - كُوَيَاي الهندي ، مختبر الهندي

Cavia cobaya (S), *Cobaya*, *Cochon d'Inde*, *Lapin*
d'Amérique, *Rat d'Amérique* (F).

هو الكويباي الداجن . مهده امريكة الوسطى . سلالته
الرئيسية خمس تختلف من بعضها باختلاف وبرها بين
الطول والقصر واخشنة والنعومة والقلعة والجلالة || طوله
يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبه حديد اللون التراكمة
للتباينة || طبعه طباح الارنب ويرى مثله . اثناء تلد
عدة مرات في العام الواحد .

٢٤١٧٢ - كُوَيَا *Cobra* (F).

Cobra, *Hooded-snake* (E).
الكويبا وانجا والصل اسماء مختلفة لاسم من الحيات الحبيثة
الاسمايت الاضاديد . اطلب نجا .

٢٤١٧٣ - كُوَيْك *Cobalt*

معدن ابيض اللون شديد الصلابة صعب الانصهار ثنائي
التكافؤ يريزه (كو-Co) وزنه الذري ٥٨.٩٤ ثقله
النقي ٨٩.٦ يذوب في الحامض النتريكي || لا يربط في
الطبيعة حرراً بل مركب مع بعض العناصر . اوبس استعماله
حديثة اعصها تلون القزاز والخرف .

٢٤١٧٤ - كُوَيْن * *Galeopithecus* (S).

Galeopithecus (F), *Galeopithecus* (E).

كوين هو الاسم الماليزي . اما الاسم العلمي فيني (هر-
قرد) . جنس حيوان لبني حاشر رابل متسلق من فصيلة
الكوينيات . له ثوبان كوين ماليز وكوين الفيلين .
الفارق بين الاثنين حجم ثوب . الماليزي يطول نحو ٦٥ سم .
بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٢ سم . بسطته نحو ٦٧ سم .
ثوبه العلوي الى الطحلة السوداء اشياطة الماجات . ثوبه
السفلي الى الصبغة السوداء . اطراف قوائم الى السوداء
التمش بالايض . الفيليني يطول نحو ٥٥ سم . وبسطته
نحو ٥٧ سم . ثوبه العلوي الى السوداء السوداء تملوها
بقشة ييضاء لامتساوية التوزيع ثوب السفلي اطراف
قوائم الى الطحلة التبراد يملوها موج اسمر || حليته الحياتي
جاهي . يسرح في الليل ويبيت في النهار متعلقاً بقائمتيه
الخلفيتين كالرولوط . قوته الحشرات والثرار ووراق النبات ||

وفصيلة الطاييات . انواحه الماصرة المعروفة عديدة منتشرة
في معظم بحار البلاد المتدلة الحرارة || اصداها اهليلجية
الشكل ، راحة الفلج المصراعي القاطب رقيقة الصفحة
الملونة ، حادة الحزلة والاريفة . اجسامها اهليلجية
مقطعية الرأس والعقب . رؤوسها قليلة الوضوح عادة
الواس .

٢٤١٥٨ - كُوَاة ، كُوَاة ، كُوَاة *Rucha* (F).

Hive (E).
هي ماوى النحل اى خليته حيث شاكها بالقبص او
بالقش .

٢٤١٥٩ - كُوَاَصِي *Rapaces* (F), *Rapacious* (E).

نعت تعريفى توصف به جوارح الطير .

٢٤١٦١ - كُوَاَصِر *Oiseaux de proie*, *Rapaces* (F).

Birds of prey (E).
رتبة من الطير تعرف بالجرارح . فصائلها واجنسها عديدة
تقسم الى فئتين كواس النهار وكواس الليل .

٢٤١٦١ - كُوَاَصِر الليل *Rapaces nocturnes* (F).

Nocturnal birds of prey (E).
هي جوارح الليل تشمل اليوم وصائر اجناس الطير الكواس
التي تسرح في الليل .

٢٤١٦٢ - كُوَاَصِر النهار *Rapaces diurnes* (F).

Diurnal birds of prey (E).
هي جوارح النهار وتنبس صباح الطير تشمل المغان
والصقور والسنور الع .

٢٤١٦٣ - كُوَاَكِب البحر *Asteriadae* (S).

Asteriadae (F), *Asteriadae* (E).
فصيلة من شوكيات البحر . اجناسها وانواعها عديدة
منتشرة في جميع بحار العالم .

٢٤١٦٤ - كُوَيْكَل *Copal* (F), *Copal-rasin* (E).

صمغ راتنجي يستخرج من شجرة الكنته يستعمل في صناعة
الطلاء .

٢٤١٦٥ - كُوَيْكَلِيَّة *Copala* (F).

Copala, *Housings* (E).
سرة فضفاضة توضع على ظهور الخيل لتوقيها .

٢٤١٦٧ - كُوَيْكَلِيَّة * *Cupania* (S), *Cupania* (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة السابديات انواحه
المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في جميع المناطق الاستوائية ||
جميعها اشجار وشجيرات قزواء . اوراقها متعاقبة مركبة ،
شعيرة التجميع ، سنائسة النصال . ازهارها محوري
الارتكاز ، عشقوي التجميع . ازهارها ضرية متباينة
الالوان ، يكثر فيها الابيض ثم الوردى . يزورها مأكلة
طعمها شبيه بطعم الكستناء .

٢٤١٦٨ - كُوَيْكَاي * *Cavia* (S).

Cobaya (F), *Guinea-pig* (E).
جنس حيوانات لبنة قاضية من فصيلة الشرفديات . انواعه
ثمانية . جميعها ربة الوجة ، صغيرة القد متناثلة الشكل .
رؤوسها غليظة . راسها لا مفلقة . اذنانها قصيرة فارزة .
قوائمها متساوية الطول . اذنانها جلدع || موطنها امريكة



كُوَاة



كُوَيْكَلِيَّة



كُوَيْكَاي



كُوَيْن

٢٤١٨٢ - **كوتنل** ، **أطماط** (S).
 Area (F). Area (E).
 جنس أشجار مشرة من النخلات . أنواعه عديدة متنبها البلاد الحارة . جلدها رقيقة مستقيمة . جريدتها ريشي السفن . ثمارها بيضية صناعية ، لبابها شائع الاستعمال الطبي لا سيما القلب البيطري || أشهر أنواعه كوتنل الكاشور .

٢٤١٨٣ - **كوتنل الكاشور** ، **أطماط الكاشور** (S).
 Area catechu (S). Area catéchu, Aréquier, Noiset de l'inde (F). Area-palm, Betel-nut palm (E). Pinangpalme, Arekapalme (D). Area, Palma area (I).
 نوع من الكوتنل جلده مستقيم ريش . ثمار بيضية الشكل والحليم ، يستخرج من لبابها مادة الكاشور .

٢٤١٨٤ - **كوتنل الحبشة** ، **كوتنل إفريقي** (S).
 Brucea antidysenterica, B. salutaris, B. ferruginea (S). Brucea d'Ethiopie, Ko-sam d'Afrique (F).
 نوع من الكوتنل . شجيرة برية من فصيلة السموريات . مهددا الحديقة وبعض مناطق إفريقية الوسطى والشمالية || ساقها تحلة فراء تملو من ١٥٠ إلى ٢٢٠ سم . أوراقها معتقة متعاقبة ، سنائية ، أبيض || تعتبر من النباتات الطبية . لحاء ساقها وجنورها تحوي بعض المواد الدعنية والحوامض العضوية ومادة الكوتينين || تستعمل في معالجة الزحار ودود الأمعاء .

٢٤١٨٥ - **كوتنل نحيل** (S).
 Brucea amarissima, B. gracilis, B. sumatrana (S). Brucea grêle, Ko-sam (F). Ko-sam seeds (E).
 نوع من الكوتنل . شجيرة برية من فصيلة السموريات . متنبها الطوي يستمد من جنوب الصين إلى ماليزيا والفلبين وإستراتل || ساقها تحلة فراء تملو من مترين إلى ثلاثة أمتار . أوراقها معتقة متعاقبة اهليلجية ، أبيض || تعتبر من النباتات الطبية . لحاء الساق والجذور مرة الحامض تحوي بعض المواد الدعنية والحوامض العضوية ومادة غلوكوزية تدعى كوتينين . ثمارها لوزية سوداء تفلح صجبات لوزية الشكل دعنية المادة خواصها خواص اللحاء || تستعمل كعشادة للميكروبات وفي معالجة الصفراء والزحار ودود الأمعاء .

٢٤١٨٦ - **كوتنل** (S).
 Psathyrella (F).
 جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريتوليات . أنواعه المعروفة قليلة المدد أعطائها بعض المناطق الجبلية المعتدة من الشرق الأدنى إلى أروبة . يعيش على اللبائل وعلى أرويات الأشجار الحرة أغصانها السنديان وسنه اللك واللؤلؤ والمدر والدرايم . يتميز بسوقه الفتحة الجاهدة ومجموعة لحية الأنواع المأكولة || أعرف أنواعه وأشهرها الثلاثة التالية .

٢٤١٨٧ - **كوتنل أمغر** (S).
 Psathyrella spadicea (S). Psathyrella bai brun (F).
 نوع من الكوتنل . يعيش مجموعات وأزقة العدد على أرويات اللك واللؤلؤ . ساقه دقيقة مملحة اللون . نكهته مقلية الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها إلى لظفة القاعة أو الكمية الاسمر . اطرافها إلى الكسفي الاخر الحواج || لحية كاعنة الصف ، غير مرغوب فيها .

يصلق الأشجار جفة وينقل بين أغصانها برشاقة ويقتر من جفرة إلى جفرة حلقاً في الفضاء كالظلل ، من أجل إلى أسفل ، مسافة ٦٠ أو ٧٠ متراً .

٢٤١٧٥ - **كوتنيات** (S).
 Galeocephalicidae (F). Galeocephalicidae (E).
 فصيلة حيوانات لبونة ، حشرة ، رابطة ، مفصلة ، مركزها في هرم البونات بين السيوريات والبولوطيات || أجسامها مكشوفة بنفخ أشعر ، يستمد من قاعدة البطن إلى الأطراف القوائم والذليل ، يقوم مقام المظلة فيسكنها الانتقال جيداً بين الأشجار على مسافات تراوح من ٦٠ إلى ٧٠ متراً || اصابع قوائمها مشطية الزنكاز ، لا متعاقبة . أظفارها حادة بحجة الأطراف || أنثاها ثنائية الاختلاف الصدرية ، تضع جرواً واحداً يتعلق بصنورها حتى النضام || لها جنس واحد يدعى كوتين وله نوعان .

٢٤١٧٦ - **كوتنية** هي الإيدانجية ، راجعها .
 ٢٤١٧٧ - **كوة** ، **مقل** (F).
 نافذة في جدار البناء لدخول الهواء والنور . فهو قانوني إذا كان يشرق منه على الطريق العام ما دام مطابقاً للأنظمة الإدارية ولكنه معطور إذا كان يشرق منه على ملك الغير ولم ترع المسافة القانونية في بدهه مع أنه ان يكون مرفقاً أو مقلأ مباحاً .

٢٤١٧٨ - **كوتنل منقطة البطن** ، **كوتنل** (S).
 Cleonus punctiventris, Temnorhinus punctiventris (S). Cléone piquéé (F).
 حشرة مؤذية من فصيلة السويات . موطنها بعض اقالم حوض البحر الأبيض المتوسط ومعظم اقالم حوض البحر الاسود . تألف المواق التي توجد فيها السميتيات . غنائفها تقضم الارواق . يرقاتها تركب الجلود فتتجها وتضوها || جسمها معتدل الحجم ، اهليلجي اللون ، بطول من ١٦ إلى ١٨ م . ثوربا العلوي إلى الكهبة يملو موج اشجع . ثوربا السفلي إلى الكهبة السمراء يملو تنقيط اخضر . رأسها يرمي الشكل ينقيط ينظم غروطي ناشز الكظف . زباناها مرفقيان ، وشيا الأطراف . الاثنى اميز قدماً من الذكر وطول عضله من ١٤ إلى ١٦ م .

الحشرة الجملانة من استكانتها الشعوي في اواخر نيسان . تسرح في النهار . تباهر متع لكن بدها ينمو عشرة ايام . قترته في التربة قرب استاخ النباتات الماعلة || البرقة مرقاة ، بطيئة النمو ، تبلغ الكوال الجسودي بعد الثفت ينمو حشرة اصابع . جسمها بطول نحو ٢٠ م . وهو اسطواني الجسم ، مقوس الشكل ، ابيض اللون ، تنهي الحواج . وأنها مستطلة ، مكدور ، اسمر || طور الاكمال يستمر نحو عشرة ايام وينقضي في التربة .

٢٤١٧٩ - **كوتنل** (F).
 Caoutchouc (F).
 هو المطاط ، اطليه .

٢٤١٨٠ - **كوتنين** هي البشريين ، اطلبها .
 ٢٤١٨١ - **كوتن**
 كوتن الزرع وكل نبات حولي : فاق الادياس وصار على اربع ورفات او حفا .



كوتن منقطة البطن



كوتنل الكاشور



كوتن أمغر



كُون كندول

متفتحة تلوح بالهواء فيفتت ويسقط || وهو حل الحفصيات يقع حطية لاقامية مسطحة تركب الهاء تقبب جفائها وتصلها والتصاقها بالشعب . وبعد ذلك نجسة أو ثمانية أسابيع تنقل الهاء باستطاعتها تقطير حل الشقوق ثنائيل فطرية رمية قفوها نحو الميسر لنها يراوح من الابيض الى الوردي || يكلف بالاستصصال وبهلاء الجروح بعد تطهيرها .

٢٤١٩٥ - كُوْدَاكَة رولفي * Corticium Rolfii, Sclerotium Rolfii (S).

فطر مجهرى يكثر ويوجد في المناطق الحارة رطوف حل العديد من النبات كالارز والبالذبان والباله والبنسج والتامول والحفصيات والحطبة والحظال والحجور والحلي والنجبر والوسر والدرق والسلق والشيلم والذائق والفاصوليا والفصل والفليفلة والفلو السين والقرع والقطن والفلقاس والمليفوف والتبجيل والطنش والتبيلج والحشيش ونبات الشس وسقو السبيد وكعب السكر || يصيب النبات في عهد عيه وقشره السريع فيعيش فوق بقع حطية الابيض . يفسح الحور ، كثيفة التجميع ، تبدو كالبقعة الواحدة ، تعزل التبادل السني وتسبب اصفرار الاوراق وبذولها || وقد شوه حل التبغ في زراعات الهند البريطانية كما انه يركب الحاد ورق الموز دون ان يقع بها شديد الاذى || يكلف باستجاب كثرة الرطوبة وبالأكار من الامصة الاثرية اعصها نيرات الجير وصفات الامويك .



كُون غبل



كوير

٢٤١٩٦ - كُوْدَاكَة سُولايي * ، رِيْزُوْكَوْنُ اُسُوْدَه Corticium solani, C. vagum, Hypochinus solani, Rhizoctonia solani, R. rapae, R. betae, R. napi (S). Rhizoctonia noir, Maladie des colerettes, M. des manchettes, Variole des tubercules, Chancres du pied (F). Black speck, Collar rot (E). Wurzelkötter-Krankheit (D).

فطر مجهرى يتطفل حل البطاطا وعلى أكثر من ٢٠٠ نوع من النباتات تقتضي الى ٦٦ فصيلة . يكثر للمساكن المعدلة الحرارة . يصيب الشتول في الاكواد فيلونها ويركها في الحقل فيعطل اعصها القطن والبنسج والبالذبان . مظهره حل البطاطا المزروعة وشاح متكوني غير اللون يكثف اللون والجذور والسوق حتى سطح التربة فيجيش ثم يقضي حل صلابتها فترتي وتسود وتذبل اوراقها وتيس . وهو حل دون البطاطا المقطوعة وشاح مشيبي ابيض اللون متكوني النواس تتخلله قروح لاقامية بشكل الحليم لنها الى السمرة تطبب التنسج البشري || يكلف باستمال مركبات سلفات النحاس او املاح الزئبق .



كودانة جاما




كودانة رولفي

٢٤١٩٧ - كُوْدَانِيَات * Corticaceae (S). Corticiaceae (F). Corticiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الاحمايات تتميز بفتحها القارص . تكتمها لماء السطح او زباد ، دقيقة الحلب اشقيتها فنية التركيب او شمية . بولها شفاة . اجناسها وانواعها قليلة المدد اعرفها الكودانة .

٢٤١٩٨ - كُوْدَانِيِيْن ، كُوْدِيْن Codéine (F). Codéin (E).

مادة قلبية بلورية متبصرة عادمة اللون تستخرج في الانيون . تغلي حن ١٥٥ مـغ . وهي قليلة اللوان في الماء . تلوب في الكحول والكلوروفورم واليزن وسلفور الكريون .



كودانة سولاني

٢٤١٩٨ - كُوْنُ كَنْدُول * Pachyrella candolleana (S). Pachyrella de Candolle (F).

نوع من الكون . يكثر ويوجد في بعض غابات اوروبية وتركية . يعيش حل النبال في المراعي الجبلية . ساقه دقيقة ، رفيعة ، غبراء اللون . تكثمت مظلية الشكل ، غبراء اللون يطولها موج اصفر تشتد صفوته وتسر عنه القراص ، قفوها نحو ٧ سم . اطرافها وردية اللون || لحيمته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٤١٩٩ - كُوْنُ مَحْمَكِي * Pachyrella velutina (S). Pachyrella veloutée (F).

نوع من الكون . يعيش حل النبال في المراعي الظليلة . ساقه دليقة ، عريضة ، سمراء اللون ، خلية الزغب حتى اواسط ازلام الرابع . تكثمت مظلية الشكل ، لامتساوية السطح اشمل الزغب ، قفوها نحو ٥ سم . لنوا الى الكسني الاصفر المروج || حيمته جيدة الصنف ، مأكولة .

٢٤١٩٠ - كُوْجَر * ، بُوْمَاء ، اُسْمَة اَمْرِيْكي Felis concolor (S). Puma, Puma concolor, Cougar, concolor, Lion argenté, Lion d'Amérique (F). Puma, Cougar, American lion (E).

حيوان مفترس وسيد الجلس والنوع من فصيلة السنوريات . اصطناعه البلاد الامريكية . شكله يشبه البقرة . طوله الكامل نحو ٢٠٠ سم . جسمه ١٤٠ وذيته ٦٠ لما ارتفاهه تنص ٦٥ سم . ثوبه الى العسل السوية المتأدية يمتد مع اقترابه من الظهر ويغير حن البعن . زوره ابيض اللون وشقه العليا كذلك || يألف الاسراج الكثيفة المائية . يساق الاشجار بجففة وقد يقضي وقت استراسته عليها || قوته ما استطاع اقترابه من الحيوان الطير . يسرح حن الغروب وفي اوائل الليل وحده الفجر || اناء تقعص حن جبر واحد الى حنة جبراء تبعر النور بعد وضعها بقعة ايام وتراقق اهما بمر ثلاثة اشهر .

٢٤١٩١ - كُوْد ، كُوْدَاكَة Manche à semis (F).

هي التربة او المسكية سطح ترابها ووقت حروفها وضمرت لاقبال البزور . ج اكود .

٢٤١٩٢ - كُوْد Entasser (F). To hoard up (E).

كود التراب . جمعه ويجمه كية مسطحة .

٢٤١٩٣ - كُوْدَاكَة Corticium

جلس فطور مجهرية من فصيلة الكودانيات . انواعه عديدة تتطفل حل مختلف اعصاء النبات وعلى الاشخاب الجافة المصنوعة || مظهره الخارجي لباد مشيبي كيث التصنيع يسلط الاعضاء الموسمية ثم يرضها بقروره الحطية اللون الغليظة النشاء || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٤١٩٤ - كُوْدَاكَة جَاوَا * Corticium salmolicolor, C. javanicum, Necator decreatus (S).

فطر مجهرى يعيش في المناطق الحارة . يتطفل حل عدة نباتات اعصها الحيفية والبن والكاكار والحفصيات والسقط والكتنا والمنفا ... || يركب الانفاد حن انتشاهل حل الاعضاء والانساهن حن انتشاهل حل الجلود حن للجمة السفلى المعرصة لاشمة الشس || مظهره الخارجي يشو مستديرة كثيفة التجميع تتحول الى قروح جافة صلبة

الرأس الى قاعدة الذنب . ويعلو من الحاروك الى الكفل تسمة خطوط مترعة ، يضاء اللون ، لامشوية الطول . عناء لوزيتان ، بارتزان . اذناه كيرتان . ويحصل في اهل قصبة الاناف حلال ابيض ينتهي عند المائي . قوائمه ضلعية . شديدة النشط || اجله يتألف من ذكرين مانين واربع اناث واربية شوان .

٢٤٢٠٧ - كُورُ العَبيد هو الشريط الحيفي ، اطلبه .

٢٤٢٠٨ - كُورَب Uranoscopus (S).
Uranoscopus (F). Uranoscopus (E).

جنس اسماء بحرية يرضع من فصيلة الترغونيات ورتبة شائكات الزعانف || انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها جمار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة || اجسامها صغيرة القند او متوسطة . تتميز برؤوسها المنصبة الاشداد ، وبنيتها الحامية الانكاكز الاقني وبزمانفها الشائكة المناعس الحادة || تعيش مدفورة في الرمال والاسمال لا يظهر منها سوى طرف الزعنفة الظهرية الاول وهي شائكة المناعس المسمة || اعرف انواعها واشهرها الكورب الاخش .

٢٤٢٠٩ - كُورَبُ الخُشن ، اشترَبُ اَبَيْش ،

رَسْكَاس Uranoscopus scaber (S).
Uranoscope raboteux, Rascasse blanche, Rat (F).
Uranoscopus scaber (E).

نوع من الكورب . سمكة بحرية بيوض من فصيلة الترغونيات . اعطائها البحر الابيض المتوسط || جسمها اعليجي الشكل بطول نحو ٣٠ سم . رأسها غليظ ، كبير ، مضغ ، منتصب الفك ، مستعرض الشدق ، متراكب الزوايق العلوية . عيناها اقنيتا ارتكاز تحتلان قنة الرأس . زعانفها كبيرة شائكة . زعنفتها الظهرية الاول ناشزة المناعس الصلبة الدرية المسمة . مناعس اسفله مسمة ايضاً || ثوبها العلوي الى الريدة السراء تملوها رقشة حشلية زاهرة . جانباها الى الريدة الفضية الموج . بطنها الى البياض الاغبر || لحمها كائن الصنف ، قل من يربض فيه .

٢٤٢١٠ - كُورَبِيل Courbaril (F).
هو الكنو ، اطلبه .

٢٤٢١١ - كُورَة Crò, Cru (F).
Growth, Country (E).
منطقة معينة تميزت بمجودة بعض صفات محاصيلها الزراعية . كور .

٢٤٢١٢ - كُورَنِل Pacrinia (S). Pacrinia (F).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الناريديات انواعه المعروفة ١٢ منها البري والزرني والهيل والمسر . سؤها فرجاء تملو من ٣٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مركبة متعاقبة . انماها نفاطية خشوية شكلوية التجميع . ثمارها يرضية الشكل ، مستديرة النفاث . اشهر انواعه .

كورنل الصفوف. P. rupestris (S). P. des rocaillies (F).
كورنل سيرة P. siberica (S). P. de Sibirie (F).
كورنل كعب للفرال P. scabiosaefolia (S).
P. à feuilles de scabieuse (F).

٢٤٢١٣ - كُورُس زَوَرِّي Coreua scapha (S).
Coreus esquif (F).
حشرة خاضلة من فصيلة الكورسيات . جسمها مترسط

٢٤١٩٩ - كُودَر * ، كُوسَان *

Pachyrhizus (S). Pachyrhiza, Pachyrrhiza (F).
كودو هو الاسم الهندي وكوسان الاسم الشائع في ملقة . جنس نباتات جنينة عارضة ومعمرة من فصيلة القرنيات الفرافية . انواعها المعروفة قليلة المدد مهدا احدث الصينية وملقة . تزرع كنبات حولي لجناء جلوريا || سؤها عارضة كالديباء . اوراقها معتقة مركبة من ثلاث وريقات قليلة الشكل . انماها عتقوي التجميع ، ابطي الارتكاز . انماها صورة بنفسجية اللون ، مستديرة القرب . سفاها مستطيلة ، معدلة التبطيط || حبوبها تتركز خضراء ومطبوخة . جلوريا شجيرة بالكربن وتوكل طازية ومطبوخة .



٢٤٢٠٠ - كودَكس Codex
مجموعة المقاتير الرسمية وهي تحوي وصف الادوية وتركيبها .

٢٤٢٠١ - كُودَن Bardos (F). Hinny (E).
هو البهل المشترك من احسان والأتان ومنهم من سماه النخل .

٢٤٢٠٢ - كُودَن * Croiser (F). To cross

٢٤٢٠٣ - كُودَكَة Croisement (F).
Cross-breeding (E).

٢٤٢٠٤ - كُودُو Strepsiceros (S).
Strepsicère, Coudou (F). Kudu (E).

جنس حيوانات لبيبة عارضة مجترة من فصيلة الايليات . له نوعان موطنها يتعد من الصومال الى الحبشة والزيبيز وبعض اصقاع اترقية الجنوبية || ملحيها الحياي جماعي . اجسامها كبيرة القند تنبذ . بقروها القلبية المستطيلة . اناتها جاء . ضرورها ثنائية الاخلاف . عيها يستمر نحو ستة اشهر تقص في تمامه مدفورة واحدا .

٢٤٢٠٥ - كُودُو الحِشَة Strepsiceros imberbis (S).

Strepsicère imberbe, Coudou de l'Abysinie (F).
نوع من الكودو . موطنه الحبشة والصومال . يألف الاجام والغابات التي يجتازها مجاري الماء . يسرح في النهار ويبيت في الليل في مواقع معينة قلما يغيرها || جسمه كبير القند بطول نحو ٢٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم . ارتفاعه نحو ١٢٠ سم . قرنه لويبي الشكل يرتفع نحو ٦٥ سم . ثوبه الى الشقعة السراء المتفاوتة الموج بين الرأس والظهر والصدر والبطن . وهو عادم المفرة والحلال الابيض في الجبهة انما يعلو من الحاروك الى الكفل خطوط مترعة يضاء مهدا ١٥ سنة الذكر ١١ سنة الانثى . قوائمه شديدة النشط وسرعة عذو تقوق سرعة كودو الرأس || اجله يتألف من اربعة ذكور مائة وثمان اناث وثمانية شوان .



٢٤٢٠٦ - كُودُو الراس *

Strepsiceros capensis (S).
Strepsicère du Cap, Coudou du Cap (F).

نوع من الكودو . موطنه يمتد من رأس الرجاء الصالح الى الحبشة والصومال . يألف الغابات والاحراج . يسرح في النهار ويبيت في الليل || جسمه كبير القند بطول نحو ٣٣٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . ارتفاعه نحو ١٣٥ سم . قرنه لويبي الشكل ، ارتفاعه المسوي نحو ١١٥ سم . والمسافة بين طرفي القرنين نحو ١١٠ سم . ثوبه الى الشقعة السراء . عفرته شديدة السمرة تمتد من قة

Coryza (F).

٢٤٢٢١ - كُورِيَّاتَا

هي التهاب غشاء الانف .

Chortzema (S).

٢٤٢٢٢ - كُورِيَّاتَا

Chortzema (F). Tango plant (E). Kōrisemapflanze (D). Chortzema (I).

جنس نباتات عشبية ونباتية من البذرليات وفصيلة القرنيات . أنواعه قليلة منتبهاً أستراليا ، بعضها زراعي تزييني اشتهر :

Ch. dicksonii (S).

كُورِيَّاتَا ديكسونيه

Ch. de Dickson (F).

كُورِيَّاتَا ليلية

Ch. cordatum (S).

Ch. en cœur (F).

كُورِيَّاتَا موشحة

Chorisia (S). Chorisia (F). ٢٤٢٢٣ - كُورِيَّاتَا

جنس اشجار حرجية من فصيلة الزيفيات . أنواعها المعروفة قليلة المدد ، منتبهاً بعض المناطق الاستوائية اخصها امريكا الوسطى والجنوبية || اشجارها كبيرة ، دائمة ، تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها زنادية ، مركبة ، خاسية الورقات البيضاء الشكل ، الجلمدة النصال . ازهارها خشوية ، خاسية البتلات ، عديدة الاندية . ثمارها حقية ، مستطيلة ، تحوى حبة بزور طفلة يشاهد زغب نام ، قصير اللبلة ، قلاً يصلح للقول . بزورها مأكولة بعد التخميس .

٢٤٢٢٤ - كُورِيَّاتَا هِي الصليب ، اقلية .

Courisque (F).

٢٤٢٢٥ - كُورِيَّاتَا

جنس طير من الببغاوات مشهور باسم امزونة ، اقلية .

٢٤٢٢٦ - كُورِيلُوس ، جِلُوزِيَّاتَا

Corylopsis (S). Corylopsis (F).

جنس جنبايات معمرة من فصيلة المشركات . أنواعه عديدة . اصطلحها الصين واليابان . دعوا جيلوزية لانها قريبة الشبه من الجلولز . سيقانها فراء . اوراقها حلابة . ازهارها سنبل التجميع يستبق الاوراق . ازهارها صفيرة ملونة حرفة الرائحة . اشتهر أنواعه ما يلي .

٢٤٢٢٧ - كُورِيلُوس سَبِيلِي

Corylopsis spicata (S). Corylopsis en épis (F).

جنية سبروية تزيينية منتبهاً اليابان تملو نحو ١٢٠ سم . ساقها وفروعها زياد اللحاء . اوراقها بيضيه النصل ، خلية الصفصعة السبل تملو من ٥ الى ٨ سم . ساقها سباحية او تساعية الازهار تملو نحو ٥ سم . || ازهارها يستمر طولاً شهر اذار .

٢٤٢٢٨ - كُورِيلُوس سِينِي

Corylopsis sinensis (S). Corylopsis de Chine (F).

شجيرة سبروية تزيينية منها الصين تملو من ٣ الى ٦ متر . ساقها فراء . فناء . ازراقها املبية الشكل ، نصلها يملو من ٨ الى ١٠ سم . ساقها سباحية او تساعية الازهار تملو نحو ٨ سم . || ازهارها يستمر طولاً الربيع .

٢٤٢٢٩ - كُورِيلُوس قَلِيل الزهر

Corylopsis pauciflora (S). Corylopsis pauciflora (F).

جنية سبروية تزيينية منتبهاً اليابان تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها قرصاء . اوراقها تملو من ٣ الى ٦ سم . وتعرض من



كُورِيلُوس



كُورِيلُوس



كُورِيلُوس سَبِيلِي

القد والتبليط ، شبه مربع البطن ، مزاني الكوس ، يملو نحو ١٣ م . رأسها محرم . غطها مستدل الطول . ازهارها نازلة . حيائها صخريتان ، بارزتان . زباناها مستطيلتان . كوسها مزاني الجانبين || ثوباها الى الخلفي الاسمر الجلودى المزاج . بطنها ملوح بالاسفر . الصفحة السفلى من صدرها وبطنها الى الخلفي اللبني المزاج || مسرحها الجباري حيث تكثر الاشباب والازهار .

٢٤٢٢٤ - كُورِيلُوسَاتَا

Coraidas (S). Coraidas (F). Coraidas (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفايات الجناح . اجناسها والوانها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق القطبية || اجسامها متباينة الحجم والاشكال . رؤوسها محرمة أو مربعة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . صفحات صدرها السفلى لاقبسية التغلبد للمد لاستيعاب الاخطام || جميعها من الحشرات الخاضعة القليلة الاذى .

٢٤٢٢٥ - كُورِيلُوسَاتَا

Eurypyga (S). Caurale (F). ٢٤٢٢٦ - كُورِيلُوسَاتَا

جنس طير من فصيلة الكورليات . أنواعه المعروفة قليلة المدد . ساقها يملو كامل امريكا الجنوبية . اجسامها رفيعة . مناقبها جالسة مستقيمة الاطراف . اجنحتها مستعرضة ذرية . اذنانها مستطيلة القد مرفوعة الرأف . ارساغها رفيعة وديقة . ارياشها رطلة . ثوبها متراكبة الالوان الزاهية || اعراف انواعه واشهرها كُورِيلُوس الشمس .

٢٤٢٢٦ - كُورِيلُوسَاتَا

Eurypyga helias (S). Caurale soleil, Héron soleil (F). طائر من الكورليات طوله نحو ٤٤ سم . قويه مؤرثى الالوان يجمع بين الالوان الاصفر والاحمر والاسود والابيض والاسمر والخطي . زوره ويصرعه مع غطها الى البياض الناصبي . عنقه مؤذن بالاسمر والاسود . ظهره مستطال مجملد بالالوان والاسفر . اذنيه وذنبه وقواديه واباهره وسناكه مغطاة بالابيض والاسود . صدره وبطنه الى البياض الخلفي . صدقة عينه حراء اللون . منقاده وساقه صفر || موطنه امريكا الجنوبية ، يآلف الاضوار ويجاري المياه . قوته الحشرات على اختلاف انواعها || يدرن في الاشجار المشدونة القضاء . يحملك منه بالخشيش ويطنه بالسلم والطين . انشاء تخفن من يهتئين الى ثلاث يضافات نحو ٣ لاسبوع .

٢٤٢٢٧ - كُورِيلُوسَاتَا

Eurypygidae ٢٤٢٢٨ - كُورِيلُوسَاتَا

فصيلة طير تجمع بين الخلف وطول الساق . رؤوسها واصنافها واجنحتها ولبشرتها الشكل ، مناقبها وساقها تغلدية . موطنها امريكا الجنوبية . تألف الاضوار ويجاري الماء . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها .

٢٤٢٢٨ - كُورِيلُوسَاتَا

Tige souterraine bulbeuse (F). Corm (E). نعت تعريفي توصف به الساق الفوصية الليماسية .

٢٤٢٢٩ - كُورِيلُوسَاتَا

Corydale (F). هي التبرية ، نبات من الخشخاشيات ، اقلية .

٢٤٢٣٠ - كُورِيلُوسَاتَا

Corydaline (F). مادة قلووية عادمة اللون مرشوبة البلورات تستخرج من جذور الكوريدال اتراروند . تفلت عنه ١٣٤ سمغ . وهي قليلة اللذونان في اللذ . تلوب في الكحول الساخنة وفي الكلوروفورم والايتر .

٢٤٢٣٨ - **كُوشَج** هو القرش ، اطليه .

٢٤٢٣٩ - **كُوشَجِيَّات** Scyllorhinidae (S).

الكوشيات فصيلة أسماك بحرية تدمي أيضاً غراليات ، اطليها .

٢٤٢٤٠ - **كُوشَل** Corselet, Pronotum
هو في الحشرات الحلقة العليا من مقدم الجوشن .

٢٤٢٤١ - **كُوشِي** Cucurbita pepo ovifera (S).

Courgette (F), Vegetable marrow (E), Elerkürbis, Kürbis (D), Zucca, Z. da mangiana (I).

نبات زراعي من فصيلة القرعيات ، فروبه وأصمارة عديدة ، زراعتها مرويّة . ثمارها مستطيلة تركل مطبوعة . وثمار الكوشى تحوي نحو :

٩٥,٠٠ ٪ من الماء
٨,٠ ٪ من المواد البروتينية
٣,٠ ٪ من المواد الدهنية
١,٤ ٪ من المواد السكرية
٣,٧ ٪ من المواد التشوية
٥,٠ ٪ من الألياف

وي تحوي أيضاً بعض الألاح المعدنية اعصها الكسيوم والجليد مع القليل من الفيتامين ١٥ والقليل القليل من الفيتامين ٥ ث .

٢٤٢٤٢ - **كُوشِي الفرتنجي** Chayote (F).

هو الكسيوم ، نبات زراعي من القرعيات ، اطليه .

٢٤٢٤٣ - **كُوش** Appariar (F), To couple (E).

كوش الطائر أثناء سفدها والكرش سداد الطائر .

٢٤٢٤٤ - **كُوش** Conyza dioscoroides (S).

Conyza, Conise, Conisa (F), Ploughman's spike-nard (E), Dörrkraut (D), Coniza (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة المركبات . يملكه تملون من ٤٠ الى ٨٠ سم . ساقها خشبية فراج . اوراقها متفكة اهليلجية ، نصلها أزغب البشرة على صفحته . ازهارها الى البياض الأخير || يستخرج منه بعض المواد الطبية الصحية وهو يحوي بعض العناصر الجسالية القمالة التي تفكك بالخرات اعصها البرايت .

٢٤٢٤٥ - **كُوشَاد ، جَنْشِيَّات ، جَنْشِيَّاتَا**

Gentiana (S), Gentiane (F), Gentian (E).

جنس نباتات جنينة وعشبية من فصيلة الكوشاديات . انواعه نحو ١٢٤ معلها بري وبعضها زراعي وزئفي وبعضها طبي . يستخرج من جذور أكثر الانواع مر الكوشاد ويحاصل الكوشاد وصباغ الكوشاد . يتطور بعضها تحوي نحو ١٥ ٪ من السكر الذي يستخرج منه بمد التضمير نوع من القنديل الجيد الصنف || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٤٢٤٦ - **كُوشَاد أُرْجَوَالِي**

Gentiana purpurea (S), Gentiane pourpre (F).

نوع من الكوشاد وهو بجلة جبلية مدولة تملن من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لاطئة متعاقبة سنائية ، نصلها بطول نحو ٢٠ سم . ويخرج نحو ٥ . ازهارها طريقة الارتكاز ، قصيرة الممايق ، أرجوانية اللون ، سفاه المراج . توجبها جري الشكل سداسي التضمير المستعرض || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٢ الى ٤ . سنايلها ثنائية او ثلاثية الازهار || ازهارها يستمر طوال شهر آذار .

٢٤٢٤٠ - **كُورِيلُوس مُسْتَعْرِض البتلات**

Corytopsis platypetala (S), Corytopse à pétales élargis (F).

جنينة زينة مهدا الصين تملن من ١٠٥ الى ٢٥٠ سم . سنايلها ميمرة القروع ، خلية الجعد . اوراقها يضيصة الشكل ، لصاحيا خلى الصفحة السفلى بطول نحو ١٠ سم . سنايلها خسية او سبانية الازهار بطول من ٣ الى ٥ سم . بتلات ازهارها نأسية الشكل مستعرضة || ازهاره يستمر طول فصل الربيع .

٢٤٢٣١ - **كُورِيلُوس** Loriculus (S), Coryllis (F).

جنس طير من التسلقات وفصيلة البهارات . انولاه المعروفة قليلة البعد موطنها ماليزية وجزر الزايج . ملجنها الحياتي جامعي الا في زمن التصادف والحفاضة . تألف الغابات . قوتها الثمار حل اختلاف اجناسها وانواعها || اجسامها صغيرة القد . اثوابها جميلة الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اذناها المستديرة الاطراف . ومن ميزاتها ايضا انها تعدل كالثفانيش عند النوم .

٢٤٢٣٢ - **كُوز** Strobila (F).

Scrobile, Pine-cone (E).

نمت تعريفي يطلق على الثآليل الكروزية الخروطية الشكل ، الورقية او اللبنة التشور .

٢٤٢٣٣ - **كُوز كَنْدَم** Mangoustanier (F).

هو جوز جندم ، اطليه .

٢٤٢٣٤ - **كُوزَن** Daine (F), Don (E).

في اثني الايل الاسمر او الاريل .

٢٤٢٣٥ - **كُوزُو** Trichosurus (S).

Trichosure, Kousou (F), Kousu (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الفشارجات وفصيلة الفلنجريات . موطنه استراليا . تألف الاخراج اعصها اخراج الاراكاليديوس . قوته الوراق والازهار وبيض الصافير والمصافير والخشرات . يسرح في الليل ويرقد في النهار || جسمه جميع جسم السور البري . رأسه مخروطي الشكل . اذناه فاشرتان . غلافه خلية الاصابع متحدة الارتقاء || اثناء رباعية الاختلاف . له نوعان التعلبي والتكلي .

٢٤٢٣٦ - **كُوزُو تَعْلِي**

Trichosurus vulpecula (S).

Trichosure renard, Kousou renard (F).


نوع من الكوزور شكله شكل التعلب ، حركاته حركات السنجاب . اذناه كيرتان قائمتان . ذنبه جل الصفوف المستطيل . ثوبه الى الصبهة الشهاب يطولها مواج صناعي يميل في الظهر ويغير في الاطراف والبطن .

٢٤٢٣٧ - **كُوزُو كَنْبِي**

Trichosurus caninus (S).

Trichosure canin, Kousou canin (F).

نوع من الكوزور لا يختلف من التعلبي الا باذنيه المدونين ويشكل الرأس الذي يشبه رأس الكلب وبذنيه القصير الصفوف . ثوبه خال من المواج الصناعي تملن مشعة سمراء .



كوشاد أرجواني

٢٤٢٧ - كُوشَاد أَصْفَر * ، جَنْتِيَانَا صَفْرَاء

جَنْتِيَانَا صَفْرَاء ، دَوَاء الْحَمِيَّة

Gentiana lutea (S). *Gentiane laune*, Grande gentiane (F). Yellow flowered gentian (E). Gelber Enzian (D). *Gentiana glabra*, G. maggiore (I).

نوع من الكوشاد وهو جنة ممررة جسامسة طيبة وصناعية تملو من ٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها لاطفة متقابلة تطول نحو ٢٠ سم. ويعرض ١٥، نصلها طسي الصفحة جبل الخضار. أزهارها غسمية التجميع، أبوية وتاجية الارتكاز، مستطيلة المالمين، خماسية أبتلات التجميع الشكل والتأشباح، لبها إلى الصفرة || جلودها وافر المرات الطيبة والصباغية والسكوية. أزهارها يستمر من حزيران إلى آب.

٢٤٢٨ - كُوشَاد رَيْسِي * ، *Gentiana verna* (S). *Gentiane printanière* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية برية مبلولة تملو نحو ١٥ سم. أوراقها صغيرة اللقد تطول نحو ٣ سم. ويعرض نحو ١ سم. أزهارها طرفية فردية مستنجية اللون، توتيجها غامي التخصيص يطول نحو ٣ سم. || أزهارها يستمر من آذار إلى تموز.

٢٤٢٩ - كُوشَاد صَلْبِيَّي الْوَرْد

Gentiana cruciata (S). *Gentiane croisetia* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية مبلولة ممررة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها غسمية رباعية متقابلة تبغو كالصلب. نصلها يطول نحو ١٠ سم. ويعرض نحو ٢ سم. أزهارها أبوية الارتكاز غسمية التجميع كثيرة المدد زرقاء اللون. توتيجها رباعي التخصيص || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

٢٤٣٠ - كُوشَاد لَبْنِي * ، جَنْتِيَانَا لَبْنِيَّة

جَنْتِيَانَا لَبْنِيَّة

Gentiana asclepiadea (S). *Gentiane-asclepiade* (F). Milkweed gentian, Willow gentian (E). Würgerenzian (D). *Gentiana asclepiade* (I).

نوع من الكوشاد وهو بجلة ممررة طيبة وصناعية تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها لاطفة متقابلة سنانية الشكل، نصلها يطول من ٥ إلى ٨ سم. ويعرض من ٢ إلى ٥ سم. عروقها بارزة ثلاثية أو خماسية المدد. أزهارها مستنجية اللون مرتقلة بالنفسي. جلودها وصفها غزيرة الصبغة القلبية الصناعية || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول.

٢٤٣١ - كُوشَاد مَكْرِي

Gentiana acaulis (S). *Gentiane acaule* (F).

نوع من الكوشاد وهو نجمة زرقانية مقرّة، فروجها تملو نحو ١٠ سم. أوراقها لاطفة متقابلة تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. أزهارها كبيرة اللقد، فردية التجميع، تملو من ٦ إلى ٨ سم. لبها إلى الزرقة المستنجية || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢٤٣٢ - كُوشَاد مَهْدَب * ، *Gentiana ciliata* (S). *Gentiane cilide* (F).

نوع من الكوشاد وهو عشية سبروتية تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. ساقها فراء رباعية التصلع. أوراقها لاطفة متقابلة، نصلها شيق الصفحة وحيد الفرق. أزهارها زرقاء اللون، طرفية الارتكاز، فردية التجميع، تطول من ٤ إلى ٥ سم. توتيجها رباعي التخصيص، مهدب الخمار والحلّة. أزهارها يستمر من آب إلى تشرين.

٢٤٣٣ - كُوشَاد بَات ، جَنْتِيَانَا بَات

Gentianaceae (S). *Gentianaceae* (F). *Gentianacées* (F). *Gentianacées* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القمالة. أنوارها نحو ٥٠٠ تلتقي إلى ٦٠٠ حباً. جميعها أشباه وسينات صغيرة اللقد. أوراقها لاقامية الشكل والانتظام. أزهارها عشوية لاقامية التجميع يكثر في ألوانها الأزرق والأرجواني.

٢٤٣٤ - كُوشَر * ، *Pluchea* (S). *Pluchée* (F).

Ovre-bla (E). *Ovralakorn* (D). *Pluchea* (I). جنس نباتات برية ممررة من فصيلة المركبات. ألوانها نحو ٢٠ أصنافها المناطق الحارة في جميع أمصاق العالم. نباتات عشية أو بجلية. أوراقها متعاقبة. أزهارها طفيفة التجميع.

٢٤٣٥ - كُوشَتَّة * ، *Dendrométrie* (F).

Forêt mensuration (E). تقدر أشجار الحرج مع أبعادها وأشكالها وأعمارها وسالتها الحاضرة والمستقبلية.

٢٤٣٦ - كُوشِيل ، *Cochenille* (F).

هي القرمزية، أطلها.

٢٤٣٧ - كُوشِيل أَسْتْرَالِيَّة

Cochenille australienne (F). هي القرمزية الأسترالية، أطلها.

٢٤٣٨ - كُوشِيل الْبُرْتَقَال الْبَيْضَاء

Cochenille blanche des oranges (F). هي قرمزية البرتقال البيضاء، أطلها.

٢٤٣٩ - كُوشِيل الْبُرْتَقَال السَّوَدَاء

Cochenille noire de l'orange (F). هي قرمزية البرتقال السوداء، أطلها.

٢٤٤٠ - كُوشِيل الْفُخَّاح

Cochenille du pommier (F). هي قرمزية الفخاخ، أطلها.

٢٤٤١ - كُوشِيل الْتِين

Cochenille du figuier (F). هي قمية التين، أطلها.

٢٤٤٢ - كُوشِيل الصَّبَار

Cochenille du nopal (F). هي قرمزية الصبار، أطلها.

٢٤٤٣ - كُوشِيل الْكَلَّة

Cochenille de la laque (F). أطلها.

٢٤٤٤ - كُوشِيل الْكُور

Cochenille de l'amandier (F). هي قرمزية الكور، أطلها.

٢٤٤٥ - كُوشِيل الْخَمِيل

Cochenille du dattier (F). أطلها.

٢٤٤٦ - كُوشِيل الْوَرْد

Cochenille du rosier (F). أطلها.



كوشاد اصفر



كوشاد ريسى



كوشاد لبني



كوشاد مهدب



كوش

٢٤٢٧٧ - كوشنيل سان جوزيه

Sabulicole (F).
نمت ترمي في طلق كل دوية او حشرة او نبات يعيش في كوشنيل الرمل وكتبانه .

٢٤٢٧٨ - كوشنيل طوطية

Cuphaea (S).
Cuphée, Cuphée (F). Cigar flower (E). Hückerkelch (D). Cufée (I).
جنس نباتات عشبية خشبية من فصيلة الخناثيات . انواعه نحو ٨٠ اصلها البلاد الحارة الامريكية . اوراقها صغيرة متقابلة ، انهارها محورية الاركان ملونة تتميز باحديداب كوشنيل وبكبر بتلاتها العليا || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٤٢٧٩ - كوشنيل بكتسية

Cuphaea cyanea (S). Cuphée violes (F).
نوع من الكوشنيل الازرق الممعة تملو نحو ٢٠٠ سم . ساقها زاه . اوراقها متقابلة بيضية ، نصلها ذات الزام الاعبر . كوشنيل انهارها خلية البشرة . ارجوانية الانتساب صفر الجسم . بتلاتها ثنائية ، كبيرة لثد بنفسجية اللون . انهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٤٢٨٠ - كوشنيل سلقونية

Cuphaea miniata (S).
Cuphée à pétales vermillon (F).
نوع من الكوشنيل الازرق الممعة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . نصلها زاه فراء . اوراقها متقابلة قصيرة الاضلاع . نصلها ضيق الصفحة ، خلي البشرة . كوشنيل الزهرية عشارية التستين طول نحو ٣ م . بتلاتها سلقونية اللون || انهارها يستمر طول الصيف والخريف .

٢٤٢٨١ - كوشنيل مستانية

Cuphaea lanceolata (S).
Cuphée à feuilles lancéolées (F).
نوع من الكوشنيل الازرق الممعة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها وفروعها منتصب . اوراقها سنانية ، متقابلة طول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها خلي البشرة ناشز المروق . كوشنيل الزهرية كثيرة الاحديداب ، بتلاتها مستديرة متحمية ودية او ارجوانية اللون || انهارها يستمر طول الصيف .

٢٤٢٨٢ - كوشنيل ناروية

Cuphaea ignea (S).
Cuphée rouge-feu (F).
نوع من الكوشنيل الازرق الممعة تملو نحو ٣ م . ساقها وفروعها مضطمة الزوايا . اوراقها متقابلة ، اعليجية ، مديبة . كوشنيل انهارها ناروية اللون ، سداسية التستين ، مستطيلة المالحين || انهارها يستمر طول الصيف .

٢٤٢٨٣ - كوشنيل * كوشنيل

Erythroxylon coca (S). Cocaier, Coca (F). Coca, Spadic busch (E). Cocastrauch (D). Coes (I).
نبات بري وزراعي من الكوكيات . مهد البلاد الحارة الاسيوية وهد حد زراعتهم بعض الاصقاع الحارة الاسيوية اعصها الهند وبرنديب . فربيه عديدة ، جميعها جنباية ممعة تعيش من ٤٠ الى ٦٠ سنة وتملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها يهاد الحاد . اوراقها متقابلة متعك اعليجية مديبة . نصلها بارز الضلع والمروق واضح الشرايين ، اخضر الصفحة العليا ، زيتي السفلي . انهارها محورية الاركان ، صغيرة لثد صفراء اللون . ثمارها ناروية مستطيلة الشكل حاوية الاحرار || يستخرج من اوراقها بعد قلعها ويغليها مادة قلوية غندرة طيبة كدسي « كوكاين » .

٢٤٢٧٧ - كوشنيل سان جوزيه

Cochenille de San José (F).
هي القرمزية للتاكة ، اطلبها .

٢٤٢٦٨ - كوشنيل طوطية

Cochenille floconneuse de la vigne (F).
هي قرمزية للكرم الحمر ، اطلبها .

٢٤٢٦٩ - كوشنيل حبراه

Cochenille farineuse de la vigne (F).
هي القرمزية للدواء ، اطلبها .

٢٤٢٧٠ - كوشنيل * كوشنيل

Kochia (S).
Kochia, Beivédère (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة السرمقيات . انواعه نحو ٣٠ مضطمة بري وبشها زيتي حربي الشكل . سوقها فراء فناء متحمية تملو من ٤٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متعكبة مشرقة غطية يكثر فيها الهليبي ، تلو خضراء اللون صفراء اللولج ثم تحمر مع الخريف . انهارها محورية الاركان ، صغيرة لثد ، قليلة اللند || وهي تستعمل في صناعة الكائن ولندو القز كالشع .

٢٤٢٧١ - كوشنيل حربية

Kochia-cyprès (F).
هي الجشم الحربي ، اطلبها .

٢٤٢٧٢ - كوشنيل

Cochytis (F).
هو اللندو ، اطلبها .

٢٤٢٧٣ - كوشنيل الكرمية

Cochytis de la vigne (F).
هو فائلة النيب ، اطلبها .

٢٤٢٧٤ - كوشنيل

Radius
هو السطح الاسفر من الزند الاصل .

٢٤٢٧٥ - كوشنيل

Colon (S).
Colon (F). Colon (E).
جنس حشرات من فصيلة الكوريات ودية عذبات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة تملو من ٣ الى ٤ م . رؤوسها مستديرة . عيونها صغيرة بارزة . تأثيرها وكوكها وبلانها نظامية . قرونها الاستعمارية صغيرة ، ديبسية الشكل . كولاسها عريضة . اجماعها لاسعة . كولاسها واماها كيفية العمل التام . قواها صغيرة . اثوابها تراو من السرة الى السواد القاتم || تآنت الحقل والفايات . تسرح في الليل . طيراتها غثيف الحركة . تعيش تحت الحجارة والجافة . بعضها قانس والبعض الآخر دامن .

٢٤٢٧٦ - كوشنيل

Colonidae (S).
Colonidae (F). Colonidae (E).
فصيلة حشرات من عذبات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة اللند ، نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، اعليجية الشكل ، تملو من ٣ الى ٤ م . رؤوسها مستديرة . عيونها بارزة . تأثيرها نظامية . قرونها الاستعمارية صغيرة ، ديبسية الشكل . كولاسها عريضة . اجماعها لاسعة ، خلية انتشار || جميعها مفترسة ودامة . تعيش تحت الحجارة والجافة . تسرح في الليل . طيراتها غثيف الحركة || اشهر اجناسها الكوير .





كوكال السباحات



كوكاليس



كوكال البحر



كوكلة كبيرة



كوكلة



كوكلة الشبحان

صغيرة. عرقها كثيرة القروع. عراجيدها متشعبة. اوراقها غليظة شبه متصالية يملؤها عجيب متتابع مستغلل الوسط الاجوف، مستغرق الاطراف، يبدو كجمجمة من الكوكاب.

٢٤٢٩٢ - كوكلة

Astrantia (S). *Astrance* (F). *Astrantia* (E).
جنس نباتات برية وزراعية معمرة من السنكليات ونسيلة الخبيثات. انواعها قليلة جميعها بجيلة وجنية. اوراقها مفصصة. ازهارها صوبانية التصنيع، ثلثو كالجمجم يضاء اللون او وردية. جلورها طيبة مسهلة. احرف انواعها وازهارها ما يلي.

٢٤٢٩٣ - كوكلة عرقية الورق

Astrantia helleborifolia, *A. heterophylla*, *A. pontica*, *A. trifida* (S). *Astrance* à feuilles d'Elleboré (F).
نوع من الكوكبية وهي بجيلة برية وريسية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اروتها مدادة. ساقها متصبية. اوراقها ثلاثية الفصوص السنانية المسنة المهذبة. قذاة صوبيا الزهري مؤلفة من ١٢ الى ١٣ قذاة مهدبة الاطراف. ازهارها وردية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٢٩٤ - كوكلة صغيرة

Astrantia minor (S). *Petite astrance* (F).
نوع من الكوكبية البرية البلولة وهي بجيلة صغيرة اللذ تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اروتها مدادة. ساقها مستقيمة. اوراقها خاسية او سباعية او تساعية الفصوص الضيقة التي تطلو من ٢ الى ٤ سم. وتقرض من ٨ الى ١٣ قذاة مهدبة الزهرية صغيرة اللذ تقطرها نحو ١ سم. ازهارها الى الياض الاخير. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٤٢٩٥ - كوكلة كبيرة

Astrantia major (S). *Astrance majeure*, *Grande astrance*, *Sancie de montagne*, *S. femelle* (F). *Larger astrantia*, *Master wort* (E). *Grosse Sternoldole*, *Mästerwurzel* (D). *Astrantia maggiore*, *Sanicola femina* (I).
نوع من الكوكبية الطيبة والريسية وهي جنية صغيرة اللذ تملو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. جلورها طيبة مسهلة. ساقها قوية متصبية. اوراقها كثيرة مستعرضة خاسية او سباعية او تساعية الفصوص الاحليلية الشكل المسنة الحار. اصوبها الزهرية كبيرة اللذ، ازهارها يضاء اللون، قنابها وردية. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٤٢٩٦ - كوكلة

Silquaria (S). *Silquaria*, *Ténagode* (F). *Silquaria* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغنيات الاربل ونسيلة الحنوبريات. انواعها المعروفة مهدبة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة. اصلها انبوية مستطيلة ملوكة. قطر الانبوب ودوره الاربوية واسطها تختلف مع الانواع.

٢٤٢٩٧ - كوكلة الشبحان

Cuculla absinthii (S). *Cuculla des armoies* (F). *Cuculla absinthii* (E).
حشرة من المستقيت وريسة حشرقيات الاجنحة. موطنها يتعد من الشرق الاوسط الى اطراف اوروبية. قراستها جارية قوتها رقيق الانظار. سرتها غامضة واشعة توشع على

٢٤٢٩٨ - كوكال

Centropus (S). *Coucal* (F).
جنس طير من فصيلة القزوييات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ اصنافها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسرائية. اجسامها متوسطة القدة او كبيرة. اطوالها تراوح من ٤٠ الى ١٠٠ سم. جميعها من الطيور المتسلقة القليلة الطيران. تتميز باصطالة اذانها وبالطواربا السفلى المولج. اجنتها قصيرة. منقادها قوية، عذبة الاثالة العليا. قوتها يشمل كل ما دب على الارض من احبث الاناعي الى الشفاء والعناكب والمقارب والديدان. ذكورها واناثها تتكاثر على سفن البهيس الذي يستمر نحو ١٥ يوما. اظهر انواعه كوكال السفال وكوكال السباحات.

٢٤٢٩٩ - كوكال السفال

Centropus senegalensis (S). *Coucal du Sénégal* (F).
نوع من الكوكال. اصنافه تمتد من السنال الى السودان. يأنث الادغال والاجام والقباض. ينساب بين الاحشاب ويتسلق الاشجار بشفة. جسمه يطلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسه وعنه والقسم الانامي من ظهره الى السواد الداس يملو سراج ازرق اسفع. جناحاها والقسم الخلفي من ظهره الى الصخرة الشفاء المولج. انفيكه وذنبه الى السواد المنشع بالاصهب. يطة الى الياض الاخير. قوته الحشرات والجنادب والغارب والافاعي الصغيرة.

٢٤٢٩٦ - كوكال السباحات

Centropus rufipennis (S). *Coucal des haies* (F).
نوع من الكوكال. اصنافه تمتد من شط العرب الى الهند والهند الصينية. يأنث المناطق الرطبة والاجام والغابات. يقترب من المزارع ويحجم على السباحات. يملو بسرعة ويتسلق شفة ويغير يطة. جسمه يطلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبه الى السواد الازرق المولج. يطة الى الصخرة الخلفية. انفيكه احمر. ذنبه الى الجورة. قوته الاناعي والشاء والوروز والمقارب والجراد. يذئن عشه بالخشيش الاخضر في الانهار القليلة الارتفاع.

٢٤٢٩٧ - كوكاليس

Cuculla (S). *Cucallida*, *Cucallier*, *Cucalline* (F). *Cucalls*, *Beer parsley*, *Hedge parsley* (E). *Hafudole* (D). *Cucalls*, *Lappolina*, *Saccla* (I).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخبيثات. انواعها المعروفة ١٨ منها البراري والاحراج.

٢٤٢٩٨ - كوكالين

Cocaine (F). *Cocaine* (E).
شبه قلوي نباتي يستخرج من اوراق الكوكا يستعمل في الطب لتشدير اللومسي.

٢٤٢٩٩ - كوكب افريقية

Aster d'Afrique (F).
هو الشبية، نبات زينة، عاظم.

٢٤٢٩٠ - كوكب البحر

Asterias (S).
كف مرتمة

٢٤٢٩١ - كوكلة

Antaria, *Etoile de mer* (F). *Asterias*, *Starfish* (E).
جنس حيوانات بائية من فصيلة كوكاب البحر. انواعه كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم.
٢٤٢٩١ - كوكلة، لومنتاريا
Lomentaria (S). *Lomentaria* (F).
جنس نباتات بحرية من الخبيثات الحمر. انواعها المعروفة ١٢ اصنافها بحار البلاد المعتدلة الحارة. كلالها

يتميز بقصر منقاره الاعطف الثلاثي التفرّض . اجنحته متوسطة القد متفرّجة . ذيله مستدير قصير || انواعه عديدة نحو ٢٠ موطنها البلاد الامريكية . تألف البطائح والسهول . قوتها الحبوب والثمار والخضراوات || انثاه تبويض من ١٤ الى ٢٠ بيضة تحضنها وحدها في اقموص تدثله بالخشيش بين الادغال والاشجار || اشهر انواعه ما يلي .

٢٤٣٠٤ - كُولَاة حَمِيل

Colin de Gambel. Caille à casque (F).

طائر من الكولان يتميز ببقعته المثلثة من ٦ ارباش . ثوبه متراكب الالوان فيه الابيض والاصفر والاحمر والاحمر والازرق والاسود || يألف المناطق الوعرة قرب مجاري الماء .

٢٤٣٠٥ - كُولَاة فيرجينية

Colin de Virginia (F).

طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . ظهره الى الجوزة المظفرة بالاسود والاصفر . رأسه عديم القترنة . يألف المراعي والحقول المزروعة وجوانب الرياض .

٢٤٣٠٦ - كُولَاة كليفورنية

Colin de California (F).

طائر من الكولان . ثوبه متراكب الالوان . رأسه ممتزج ببقعة مستطيلة الريش الاحمر القم || يألف الحشبات والادغال والحقول المزروعة .

٢٤٣٠٧ - كُولَاة مَسِينَا

Colin Masséna (F). طائر من الكولان . ثوبه اسود اقون يعلوه قوسم ابيض . يألف الرياض ومجاري الماء .

٢٤٣٠٨ - كَوْبَة

Cholæpus (S).

Cholæpe (F). جنس حيوانات بحرية من فصيلة الدبابات المتسلقة البطيئة الحركة . طولها يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم . قوائمها ثنائية الاظفار المتسلقة المنسقة . ثوبه كثيف الزبر لونه الى السبابة الماعقة . يعيش على الانجار . قوته البرام والتواشي والتهار . اثناء تقصير جروا واحداً ترشعه وتحمله حتى القمام || له نوعان كولب الامازون وكولب كولوبيو .

٢٤٣٠٩ - كَوْبَة

Calappa (S).

Calappe (F). جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذليل وفصيلة الكوليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها مجار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صلبة قلنسوية الشوزن محبة التدور حمرسة الالوان . ارجلها دقيقة . ملاقطها كبيرة مسطحة متائلة || لموها كاعنة الصنف لا تؤكل || اشهر انواعها الكولبية المحبسة .

٢٤٣١٠ - كَوْبَة مَحْبَسَة

Calappa granulata (S). Calappa granulé (F).

يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط . تعيش على رمال الشواطئ المدورة بالماء .

٢٤٣١١ - كَوْبِيَّات

Calappidae (S).

Calappidae (F). فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذليل الحمرسات . اجنتها وانواعها المعروفة

اوراق المركبات وازهارها واعصها الشبان || جسمها متوسط القد يعلو نحو ١٦ م . يستطها نحو ٤٢ م . رأسها حشلي الثوب . عينها كيرتان . زباناتها خيطيان . جريشها حشلي العين اصغر المواج . يعلها الى الحشلي الاشجع المواج يعلوه خط ثجيبي اسود يعطبه كامل البطن عند الذكر ويغطب نحو ثلثه عند الانثى || وراثتها عند الشقين الى الحشلي الاصغر تعلوه في الزوج الانثى زركفة وشفرة وتوازيان تراوح من الصباب الى الاسود || لها جبل واحد في الحول . تظهر القترنة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تقابل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع المكن لمطاعا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || تسرع تطول نحو ٢٢ م . جسمها اسطواني الشكل . ثوبا الى الخشبات الباحت يعلوه شمشج اربد ويحلبه منفرس اسود يجتد من السكة الثالثة الى التاسعة . رأسها اسود . منها الى اربعة الخشبات . وارجلها الى السبعة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنطفن السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٤٦٩٨ - كَوْكُو مُدَّهَب

Coccyus doré (F).

طائر مشهور باسم هوو ، اطلبه .

٢٤٦٩٩ - كَوْكُوْس

Coccyus, Cebatha (S).

Coquecuc, Cébathé (F). جنس نباتات عاشرية برية ممررة من فصيلة القريرات . انواعها نحو ٢٠ . جميعها طيبة مهذبة المناطق الاستوائية . سوقها متسلقة . اوراقها متعاقبة لاقامية الشكل . ازهارها معتوية التجميع ثنائية المسكن . ثمارها نوية لا قيمة لها .

٢٤٦٠٠ - كَوْكَبِيَّات

Erythroxylaceae (S).

Erythroxylacées (F). Erythroxylaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجنتها وانواعها قليلة العدد اشهرها الكوكا .

٢٤٦٠١ - كُولَا ، كَوْبَة

Stearculia acuminata (S). Colatier, Kolatier (F). Colanut, Kola-nut tree (E). Kolabaum, Stinkbaum (D). Cola, Noci del Sudan (I).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة البرازيات . انواعها قليلة اصلاها المناطق الاستوائية الافريقية . اشجارها تملو من ١٠ الى ٢٠ م . سوقها خيزاء اللون مشقة القشور . اجنتها متسقة السطحة . اوراقها مسقة متعاقبة اهليلجية ؛ نصلها جامه الصلبة . ياز البروق ، مسخيل المتى ، مدب الطرف . ازهارها ذكورية او شترية ، الخضرية معتوية التجميع ، محورية الارتكاز ، تتكون على الانثاء التي بلغ عمرها ثلاث سنوات او اكثر . ثمارها قرن نولية مبسطة تنلف من لوزتين الى عشر نوزات كلوية الشكل جامدة المادة اليابية التي يراوح لونها من الاحمر الى الابيض الاصفر ، وهي مأكولة مغذية تنشط القلب رتبته الاصاب وتغنى الشعب والهر .

٢٤٦٠٢ - كُولَان

Kaolin, Argile blanche (F).

Kaolin, Porcelain clay (E). هو الاسم الصيني والسلي للصلصال الحر الاقبر اللون الذي يستعمل في صناعة الخزف وفيرها .

٢٤٦٠٣ - كُولَان

Collins (F).

American partridges (E). جنس طير من عمارة الحجلبات وفصيلة الطيوريات .





كوكب أرنك

الطول ١٠ سم، الخطم الاخرى، اصفر الاسفل. ماله مستطلة الطول سواد اللون. حلقه صه الى الحرة القويضة || يأت الإخراج الكثيفة ويقرب من الاماكن الأكلة لكنه كثير الرجل والرجل || قوته الحشرات واساربعها والجراد والبراغ والنمل والثار والارباعية ومنها الكرز والين || الاثى تلتد عشها في الاشجار الرقيقة الارتفاع القل وتبين من ٢ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ٤٠ يوما.

٢٤٣١٨ - كوكب
Sallie, Colt, Monta (F).

زو ذكر الحيوان حل انشاء وقد شاع استعمالها في الحيوان والديويات.

٢٤٣١٩ - كوكب
Coulomb

Coumarouna odorata, Dipteryx odorata (S). Fève Tonka, Sarrapia (F). Tonka-bean tree (E).

شجرة برية وزراعية من فصيلة الفريزيات. مهدا الود الامريكية الحارة تكثر في نرويا واليونان. يستخلص من زودها الجافة، بعد تقمها بالورق، مادة الكوبرين الشائعة الاستعمال العطري واليتيني || وهي كبيرة القلدة فارشة الاضغان اولوقها متعاقبة مركبة. وورقها برية التجميع اذنيها؛ نصلها جامد الصفعة يضي الشكل. انزهارها عوروية الانكاز. ثمارها شامية الشكل لينة السود تحوي عصية مطلة طول من ٣ الى ٤ سم. وتعرض نحو ١ سم. ثمرتها قليلة الشائعة، سرية التجميع، لونها الى السمرة البنية الالامة؛ لياها جامد المكسر، اصفر اللون.

٢٤٣٢٠ - كوكب
Coumarine (F).

Coumarin (E).

هي لكتون الحامض الكوبريكي؛ مادة مثيرة يضاء اللون مستحبة العرف العطري تلعب في الماء والكحول. تستخرج من الكوبرون والحشوق ... وهي شائعة الاستعمال العطري تدخل في صناعة عطور وتجميل التبروغ الاخرية.

٢٤٣٢١ - كوكب
Cumul, Pluralism

الكوكلة هي الجمع من كوكب جمع وكلك كلك.

٢٤٣٢٢ - كوكب
Cumlinga (S).

Cumlingie (F). Cumlingie (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخواص فضيلة المتغيرات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة المدد اصطلحها بحار امريكية الجنوبية اعصابها الشيل والبريد || اصدافها شبه يرمية الشوزن، متشابهة المصارع لامتلاوية الاضلع، ماسة الطروح البيضاء اللون الموضحة بالجلوي.

٢٤٣٢٣ - كوكب
Coulomb

Coccyz americanus (S). Coucou, Coumier (F).

شجرة برية راتنجية دماعة من فصيلة النخلات. منبها حراج الفويان || ساقها مستطلة الارتفاع فراء. فرومها متصبية عوروة اوراقها متعاقبة، طلة، جامدة النصال المطاة. انزهارها عوروية الانكاز طرفية || يستخرج من ساقها بالخر عصارة راتنجية لها استعمالها الصناعي.

٢٤٣٢٤ - كوكب
Cometes (S). Cométes (F).

جنس نباتات عشية حولية برية من فصيلة التينيات. انواعها المعروفة قليلة المدد جميعها من ثبوت قيات الشرق الاوسط واقرية الشرقية || سيقها فراء، شكلها متقودي

متوسطة المدد. اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة القل، لانياسية الشكل تتميز بافراها المعروفة وبدرمها المحبة السطوح العلوية، وبملاطها الضليلة || اشهر اجناسها الكوكبة والذبابا والمتوتة.

٢٤٣٢٥ - كوكب
Phasciarctus cinereus (S). Phasciarctus cendré,

Koala cendré (F). Native bear (E).

حيوان لبون وحيد الجنس والنوع من الجرايات الشاجرات وفصيلة الفلجيرات. موطنه بعض مناطق استرالية اعصابها الشرقية. يأت الفنايات. يسرح في الليل ويبست في النهار. قوته اوراق الاشجار ونعماها وانعارها ونعماها || جسمه يطول نحو ٥٠ سم. ويرتفع نحو ٣٠ سم. رأسه اعطى القدم قريب الشبه من رأس الدب. قوائمه قصيرة، فحاسة الاصابع، كبيرة الاظفار المحبة الحادة الاطراف || ثوبه الى الركة، يمتد في الظهر ويغير في البطن. الاثى رباعية الاضلاع || لحمه مأكول وفروته مرغوب فيها.

٢٤٣٢٦ - كوكب
Coulomb

هو ما يصرفه بالتالية المجرى الكهربائي التي تبلغ قدرته ١ أمبير.

٢٤٣٢٧ - كوكب
Collybia (S).

جنس فلور من الفاريتويات. انولاه عديدة ركب هرفا جلور بعض النباتات الحرجية دون ان تتركها.

٢٤٣٢٨ - كوكب
Pasteurellosis avium (S). Cholera des poules (F).

مرض وبائي يصيب الدجاج فيفضي عليه اذا لم يكلف وقايا بالتلفيح بالانسان.

٢٤٣٢٩ - كوكب
Colisa (S).

كوكب هو الاسم المحدثي البنغالي. جنس امحاك نهرية من شاكات الزعانف وفصيلة الطيوريات. انواعها المعروفة عشرة اصنافها انهر الهند وميجرات ومنتامه || اجسامها شبه اهليلجية، صعبة، لا تتجاوز ٢٠ سم.

رؤوسها مستطلة الاضلاع الصغيرة الاشدق. زعانفها الظهرية والبطنية مستطلة، متائلة. زعانفها الخوضية شبه غشبية. للذيلية كبيرة مقطوعة. اوتوا الى الحشار الباهت يملو تجلج مغرض اريد اللون، نحاسي الموج. مطربها الى البياض الاشر || ذكورها تحضن السرة في عشاش شبه جرابية الشكل تحبها بين النباتات المائية || غودها مأكولة متوسطة الصنف.

٢٤٣٣٠ - كوكب
Coccyz americanus (S). Coucou, Coumier (F).

كوكب هو الاسم المحدثي البنغالي. جنس امحاك نهرية من شاكات الزعانف وفصيلة الطيوريات. انواعها المعروفة عشرة اصنافها انهر الهند وميجرات ومنتامه || اجسامها شبه اهليلجية، صعبة، لا تتجاوز ٢٠ سم. رؤوسها مستطلة الاضلاع الصغيرة الاشدق. زعانفها الظهرية والبطنية مستطلة، متائلة. زعانفها الخوضية شبه غشبية. للذيلية كبيرة مقطوعة. اوتوا الى الحشار الباهت يملو تجلج مغرض اريد اللون، نحاسي الموج. مطربها الى البياض الاشر || ذكورها تحضن السرة في عشاش شبه جرابية الشكل تحبها بين النباتات المائية || غودها مأكولة متوسطة الصنف.



كوكب



كوكب أمريكي



كوكبونه (حبة)



كوكب

العقريات. موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى الشرق الاوسط. ظهره واحالي الى الشبهة السوداء. بطنه وخوافيه الى الياض الاخضر. حنثه كاليافوت. منقاره اسود، ساقه الى الصفرة الخضراء. قوته القواض والحشرات يصيدها عند الشروق ويقرق القروب || يثن في الاشجار الرقيقة. انتاء تقصع من اثنين الى اربع تحضنها اربعة اسابيع.

Cautérisation (F). كتي - ٢٤٣٣٤
Cauterization (E). هو اسحق الجلد بمجديدة ونحوها.

Pâllan (F). كتي - ٢٤٣٣٥
هو الجيع، اطلبه.

Accommodat - ٢٤٣٣٦ كتيالة ٥
حالة حيوان أو نبات كتيها عوامل البيئة المفروضة دون ان تجعلها وراثية.

Myopotamus - ٢٤٣٣٧ كتيو * حارود المتافع
Myopotamus coypou, Coypou, Castor des marais (F). Myopotamus, Coypu (E).

حيوان لبين قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدانيات. موطنه بعض اصقاع امريكا الجنوبية اخصها الاناثام المعتدلة الحرارة. يأنث المتافع وضفاف البحيرات وبحاري الماء. ملجته الحياتي زوجي || جسمه يطول نحو ١٠٠ سم. يما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٥ سم. رأسه شبه مكور الشكل، مقطوع الطم. عيشاء واذنان صغيرتان، ستديرتان. سباله معتدل الكثافة مستطيل. قوامه قصيرة خالصة الاصابع. ذنبه مردي الشكل غليظ القاعدة، مستدق الطرف، طليبي الوبر في الزام الاول والثاني، حشيشي الخلفات في الزامين الآخرين. وبره ليد، قصير، ناعم. ثوبه في الرأس والظهر الى السرة الكستنية. وفي البطن الى السرة الخفيفة. خاصرته الى الشقعة || قوته المواد النباتية والاسماك والرخويات || حبره وجار يتحفر بالتربة. الاثن تقصع من ٨ الى ٩ ادراس كاسية باصرة تسرح وتفرس في الماء بعد اسبوع || فروته جيدة الصنف مرغوب فيها ولحمه كذلك.

Chitonellus (S). كتيون ٥ - ٢٤٣٣٨
Chitonelle (F). Chitonellus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الاربل امانيات الخياشيم مصصحات القشار وفصيلة الكيتونيات. انواحه المعاصرة المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهادي، من ماليزيا الى الاقليات واستراليا || اصداها مستطيلة ثمانية الصفيحات القرابية. اجسامها قريبة الشبه باجسام البازق. اطولها تراوح من ٣ الى ١٢ سم. رؤوسها وعيونها صغيرة. لولاسها رباعية، زوج مستطيل وزوج قصير. اوبنها قليلة الانفراج. تتكود عند الخوف فتبدو كالاكرة الصغيرة.

Chitonidae (S). كتيونيات ٥ - ٢٤٣٣٩
Chitonides (F). Chitonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مطيات الاربل، امانيات الخياشيم مصصحات القشار. اجسامها وانواها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الخمار والمعتدلة الحرارة || اصداها مؤلفة من ثمان صفيحات كلسية المادة، متراكمة، مفصلية، تغلف الطاهر ويمكن اللوية من التكوير كالمدرع، عند الحاجة || اشهر اجناسها الكيتون والحيدية.

الشوزن. اوراقها متعاقبة، وريجة اتصال الفصيلة المستعفة الاطراف || انهارها خالصة البتلات والاسدية، وودية اللون دقيقة الزناد المستطيل. تنويرها ديمي.

Hobereau, Falquet (F). كوتنج * - ٢٤٣٣٥
Hobby (E).

جنس طير من عارة الصقور وفصيلة العقريات. انتواه اربعة جميعها خفيفة الجناح ديمة الجسم طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. انوارها نعمة ظهورها وسراقتها الى السرة. بطنها الى الذنب || اما انتواه فهي الكوتنج النوبي والكوتنج الشائع والزمزم والبيوط.

٢٤٣٣٦ - كوتنج الدبسي
Falco columbarius, Hypotriorchis columbarius (S). Faucon-pigeon (F).

طائر من الكوتنج صغير القد طوله نحو ٣٢ سم. خفيف الجناح، شرس الخلق، حاد المزاج، شديد البطش يصيد الياض والصائير والقواض الصغيرة والجرذان والحشرات. وهو من القتراط التي تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي. سره في رجليه يمد بضم ثبات. يثن في الاشجار المالية وفي اوراق المسعود. انتاه تقصع من ٣ الى ٤ رفقات تحضنها وسحا اربعة اسابيع.

٢٤٣٣٧ - كوتنج شائع
Falco subbuteo, Hypotriorchis subbuteo (S). Hobereau commun (F). Common hobby (E).

طائر من الكوتنج حاد المزاج، خفيف الجناح، صغير القد، طوله نحو ٣٥ سم. الاثن اكبر حجماً من الذكر. وهو من القتراط يجوب البلاد الاسيوية والافريقية والاربية. يأنث الثنايات والاحراج الميمنة الاشجار. قوته الصائير والحشرات. يثن في الاشجار الرقيقة انتاه تقصع من ٣ الى ٤ رفقات تحضنها وسحا نحو اربعة اسابيع.

٢٤٣٣٨ - كوتنجي
Cosmique (F). Cosmic (E).
نمت تعريفه يطلق على بعض الاشياء المختصة بالكوتنج كالاشعة الكونية.

٢٤٣٣٩ - كونيالك
Cognac (F).
هو الكيالك، اطلبه.

٢٤٣٤٠ - كونيوية ٥
Cosmogonie (F). Cosmogony (E).

الكونية نظرية في تكوين العالم، والنظريات في التكون أو التكوين عديدة ومنها المقفودة الهابة واللامقودة.

٢٤٣٤١ - كونيديا
Conidia (F).
هي الكتيده، اطلبها.

٢٤٣٤٢ - كونييلة *
Cunila (S). Cunila (F). Dittang, Stone-mint (E). Kunel (O). Cunilis (I).

جنس نباتات برية نجبية مسرة من فصيلة الشفويات. انوارها نحو ٢٠ اصنافها البلاد الامريكية. مظهرها طلي. اوراقها معققة متعاقبة اعليجية الشكل. نصلها صغير القد على البرشة سطري اللوف يشبه النبتة. انوارها حلقى التجميع طرفي الاركانار. لقيح اوراقها وانوارها يفيد الاسماء ويقوي المعدة.

٢٤٣٤٣ - كونيي *
Elanus coroleus (S). Elanion blanc (F). Black-winged kite (E).

طائر من الزراويق ينتمي الى عارة الهاء وفصيلة



كوتنج



كونييلة



كوني



كوني



كيتون

بين الصنوبر. لحما مسحب العلم فاخر العنب.
اشهر انولمه الثلاثة التالية :

٢٤٣٦ - كَيْبَلَة الْأَطْلَس

Labrus bergytta (S). *Labre neustrius*, *Crahotte*, *Vras* (F). *Cockwing wrasse* (E).

نوع من الكلبم. تكثر في المحيط الأطلسي من شواطئ بلجيكا الى جبل طارق. طولها نحو ٥٠ سم. ثوبها مآكب الالوان الزاهية المتباينة.



كَيْبَلَة

٢٤٣٧ - كَيْبَلَة عَصْفَرَاء
Labrus viridis (S). *Labre vert* (F). *Cuckoo wrasse* (E).

نوع من الكلبم. تكثر في المتوسط. طولها نحو ٣٠ سم. لونها الى الخضار. ظهرها اسفع المراح. بطنها وردي اللون مسطح الماحة. الاثنى ثلاثية البقع السود الجانبية وهي اكبر بنة من الذكر.

٢٤٣٨ - كَيْبَلَة زُرْقَاء
Labrus merula (S). *Labre marie*, *Merla* (F). *Labrus merula* (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكلبليات ورثة شالكات الزعانف. اصلها من مغارة البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المهادس والحلاف. ملجأ الحياتي مرضي || جسمها احليجي الشكل، معتدل التبييط، يطول من ١٥ الى ٢٠ سم. ثوبها متباين الخصب بين القطين. اللون السائد هو الازرق يطوي في القسم الاقل من الجانبين والظهر ملاح جزوي واسود عند الذكر وملاح وردي عند الاثنى. ويطوي في القسم الاقل من الجانبين وفي البطن ملاح بنفسجي عند الذكر ويلبكي عند الاثنى. رأسها غروفي الشكل، مشعر الشعاع. فكاه متادلان. شفتها متوسط الانفرج. اسنانها كبيرة، متعقبة. عيناها مستديرتان، جاسطتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مسطيلة. زعنفتها الذيلية مقنونة الطرف || لحما جيد الصنف، مرغوب فيه.



كَيْبَل ثنائي الشفط



كَيْبَم

٢٤٣٩ - كَيْبَلَة مَقُونَة
Labrus mixtus (S). *Labre varié*, *Coquette*, *Conniet*, *Tenca* (F). *Sea-partridge* (E).

نوع من الكلبم. تكثر في شمال المتوسط طولها نحو ٤٠ سم. ثوبها متباين الالوان الزاهية فيها الوردي والحلي والبي والاحمر والاصفر والاسمر الداكن.



كَيْبَة زُرْقَاء

٢٤٣٠ - كَيْبَلِيَّات
Labridae (S). *Labridae* (F). *Labridae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكات الزعانف تشمل زهاء ١٠٠ نوع منتشرة في جميع بحار العالم.

٢٤٣١ - كَيْبَلَج
Terre de bruyère (F). *Heath-soil* (E).

هو التراب الحرجي الخشن، تركيبة الحكي يختلف باختلاف مناصره الاسيانية او دالية او طينية او جصية لكنه يتميز بوفرة المادة الدالية المنحلة التي تبعله من الجرد الاثرة الساحلة للزراعات التريينية والبيئية.

٢٤٣٢ - كَيْرُش
Kirsch (F). *Kirschwasser* (E).

هو خمر الكرز، شراب مسكر يصنع من قنديل الكرز.

٢٤٣٣ - كَيْرُوب
Choropus (S). *Chéropé* (F). *Choropus* (E).

حيوان جاس لاعم ورعي الجنس والنوع من فصيلة



كَيْرُوب

٢٤٤٠ - كَيْبَلِيَّة * مَشْطُورَة

Kigelia (S). *Kigélie*, *Arbre à concombre* (F). *Cucumber tree*, *Sacred tree of Nubia* (E). *Kigeliobaum* (D). *Kigelia*, *Albero di cetriolo* (I).

جلس اشجار برية وزينية من فصيلة البغنيات. مهدا البلاد الحارة. انولها اربعة. اولاتها متعاقبة مركبة. ازهارها صفوي التجميع. اعزاهما كبيرة القذ. جولة الشكل، مقنونة. ثمارها تشبه الخيار لكنها حاضرة العلم لا تؤكل.

٢٤٤١ - كَيْبَحَاء
Rhynchonella (S). *Rhynchonella* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفديات الارجل وفصيلة الكلبليات. انولها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات العصر السيلوري المائل الى الاياج الاول، اما المعاصرة منها فتنتشر في بحار الشمال والجنوب || اصداها مصرعية، متساوية، مروية الشكل، غندة الصفحات الحاربية، للؤلؤة الداخلية. تعيش شبه لاصقة بالصخور رابطها سلك ليفي المادة طولها من ١٥ الى ٣٠ سم.

٢٤٤٢ - كَيْبَحَالِيَّات
Rhynchonellidae (S). *Rhynchonellidae* (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفديات الارجل. اجناسها وانولها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاياج الاول || اشهر اجناسها الكبحاء.

٢٤٤٣ - كَيْبَحَن
Pipit roussette (F). *Tawny Pipit* (E).

طائر من فصيلة الذعريات يدعى جشة الحقل وطرسوم، اطلب جشة الحقل.

٢٤٤٤ - كَيْبَل ك ثنائي التبييط *

Adalia bipunctata (S). *Adalie à 2 points*, *Coccinella à 2 points* (F). *Adalia bipunctata* (E).

حشرة خاتلة نافعة من فصيلة الدعسقيات ورثة مفدات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى واروية. تألف البراري والحداق والجانن والباين والزراعات الصيفية. غناها ويزقاتها تعيش على الارق والقرين والقرن والوقت ... || جسمها صغير القذ، يبي الشكل، يطول من ٥ الى ٦ سم. ثوبها الذي يتميز بدمم الاستقرار يكون غالباً الى السود تملو في كل نم من غدية نقطة حمراء. رأسها صغير الجرم، ماصتان، زباناها صقيان. فكاه ذريان. تأثيرها وملاسها صغيرة || الاثنى اميز قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واكثر زبناً || ايجهاا الحولية ثلاثة. تسرح في النهار وتبيت في الليل. غنفساء الجيل الثالث تحمي فصل الشتاء غنيفة تحت الحجارة الى ان تدب الحرارة فتخرج من مكسها في اوائل فصل الربيع.

٢٤٤٥ - كَيْبَلَم *
Labrus (S). *Labre* (F). *Wrasse* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكلبليات انولها المعروفة ١٠ تتميز بالزوايا التراكبية الالوان الزاهية وباستطالة زعانفها الظهرية والشرية. رؤوسها صغيرة. اعطالها غروبية الشكل مشقوفة القفك || مرتها قرب الشواطئ

على القلب. ورفائله عديدة اخصها تأمين جريان الماء وادخار المواد الغذائية والمقاومة الميكانيكية.

٢٤٣٦١ - كَيْش * ، أبو مَالِك

Spatula clypeata (S). Canard souchet, Souchet commun, Rouget de rivière (F). Shoveller duck (E).
نوع من البط الرشي. طائر من التقاطع مشتهر البلاد الأفريقية الحارة وبمصر البلاد الباردة والأوروبية والاسيوية || جسمه كبير اللد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه وفتحة الى انخضار الالاس الاسف. صدره الى البياض الناصع. بطنه واطفله الى الشقمة الصنابية المواج. ظهره اسود اللون تملوه رقشة حنطية. جناحاه مزرقان بالابيض والازرق والاخضر والكسني. عينه صغرتان صليتان. متفاده صفيحي الشكل، ملحي الطرف، اسير اللون، اخضر المواج. جناحاه مستطيلان، لاسفان، ذنبه غمروقي الشكل، صغير اللد، ابيض اللون، يتوسطه الاسود. ساقاه قصيرتان لونهما الى الصفرة البرتقالية || قوته الحشرات اخصها المائية ودعبل الضفادع وبعض النباتات المائية || يدفن اضمحه بين الاسل على ضفاف البحيرات والمناقع والاهوار في المواق الصلبة الخال. الاثني تحضن من ١٦ الى ٢٥ بيضة. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع تقوم به الاثني دون الذكر الذي يؤمن لها الحماية والبقاء || تجبر من الطرائد المزيزة. لحمها فاخر الصنف.

Mouche de l'olive (F).

٢٤٣٥٤ - كَبْرُون

هو عرقة الزيتون، اطباها.

Calina moschata (S).

Calina, Canard de Barbary (F). Barbary duck (E).
طائر داجن من كليات القدام صفيحيات المنابر ينتمي الى فصيلة البطيات. موطنه امريكا الجنوبية || جسمها كبير اللد. عنقها اطول من عنق البط الاعلى جناحها كبير الحجم، ذلق الطرف، يكاد يلمس اللد. ذنبها صغير اجرم، مقطوع الطرف. ثوبها الى انخضار الالاس الاسف يطول تيجج ابيض || اغلافها شرسة تلتصق على غيرها من الطير الداجنة. لحمها متوسط الصنف لا يخلو من رائحة المسك.

٢٤٣٥٦ - كَيْش البَرْخ ، كَيْش العَبْرَات

Sporange (F). *Sporangium* (E).

هو الكيس الشري الذي يحضن بؤغ مستورات الزهر.

٢٤٣٥٧ - كَيْش الراعي * ، قَرْمَلَة

Capsella Bursa-pastoris (S). Capselle, Bourae à pasteur, B. de Capucin, Boursette (F). Mother's heart, Shepherd's burse (E). Hirtentäschel (D). Bors di pastore (I).

نبات عشبي بري حولي ميلول من فصيلة الصليبيات.

٢٤٣٦٢ - كَيْشَة

Embryon d'animal (F).

Embryo of animal (E).

هي النمرة، ملقحة الحياة التناسلية الكاشية في الحيوان.

٢٤٣٦٣ - كَيْفُور

Calophora (F). *Calophora* (E).

جنس نباتات عنبية برية وتزيينية من فصيلة اللوزيات. منها بعض مناطق امريكا الجنوبية. هليها حارق كالقراس سقها مدادة، عارضة. اوراقها لاقبسية الشكل. انهارها كبيرة اللد، حراء اللون || انواعها المخرقة قليلة العدد، اشهرها تالتية.

٢٤٣٦٤ - كَيْفُور اعْوَج الحَقِي

Calophora contorta (S).

Calophore à capsule cordue (F).

نوع من الكيفور. عشبة حولية تزيينية. ساقها عارضة تطول نحو ثلاثة امتار. اوراقها بيضبة مستطيلة الزام الاخضر. نصلها منشارية الحمار، باهتة انخضار يملؤها بعض الزغب والمحب. انهارها حراء اللون يملؤها بعض مواج يرتقالي || تنويرها يستمر طوال فصلي الصيف والخريف.

٢٤٣٦٥ - كَيْفُور فَرْمِي

Calophora coccinea (S). *Calophore écarlate* (F).

نوع من الكيفور. عشبة تزيينية ممرية. ساقها عارضة تطول نحو اربعة امتار. اوراقها معتقة، السفلى ناعمة ورشمة خمرية اما العليا فاعليبية. طولها يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. انهارها قرمزية اللون. غلة الرجيق فيها مستطيلة الخواطر المحببة الاطراف || تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

Kysta (F). *Cyst* (E).

دملة لاقبسية الشكل والحجم تتكون تحت الجلد او في بعض الننج.

٢٤٣٥٩ - كَيْسْكَال

Quiscalus major (S).

Quiscale majeur (F).

طائر من فصيلة الكاروجيات. موطنه بعض مقاطعات جنوب امريكا الشمالية. يالفت المناطق الجبلية وصفاف الاجار. سره وافر العدد || جسمه كبير اللد يطول نحو ٤٠ سم. متفاده اطول من رأسه وهو محدد الخطم العلوي البين التقويص. جناحه معتدل اللول. ذنبه صغير الطرف. حدة عينه جزوية اللون. ثوب الاكر اسود اسم يملو مواج جزوي في الرأس والذال ومواج اخضر في اللد. ثوب الاثني الى الكهية السراء الباقية في الرأس والرداء والجناسين والذنب والى الكسلة الحمراء المواج في الصدر والبطن || اغلافه رضية آتسة. قوته الحشرات من الجراد الى القراش والاسادع والضفادع والرخويات ولا يفت عن الحبوب والثار النباتية || يدفن عشه في الاجار الراتجعية اخصها الصنوبر. الاثني تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بنابذة الذكر نحو ١٥ يوما || عته جرابي الشكل، بالغ الطول، ليد الحيك يملقه بفتد الشجرة. طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم. قطر قمره من ٢٥ الى ٣٠ سم.

٢٤٣٦٠ - كَيْسَم

Xylem

هو في النباتات اغشية نسج الساق والجذور الذي يرتكز



كَبْرُونَة



كَيْس الراعي



كَيْسْكَال



كَيْش

صغيرة. اضمحلتها قليلة الانقراض. زمانها الظهيرة مستطيلة، الجزء الأول منها شفاف شالك، الجزء الثاني مغشى سرح. الظليلة منفردة، شبه فاقلة. انشائها الى البردية القليلة تلعها زخارف وتجاويف متباينة الزخاية سمراء اللون غصراء المراج || غويها مأكولة متوسطة الصنف .



كبكه

٢٤٣٧٣ - كيلوغرام Kilogramme (F).
هو ألف غرام يعرف منه عادة بكتلة كيل. وهو من المقاييس المترية الفرنسية التي شاع استعمالها، نظراً لسهولة كسورها، في معظم بلدان العالم.

٢٤٣٧٤ - كيلومتر Kilomètre (F). Kilometer (E).
من المقاييس السطحية قدره ألف متر.

٢٤٣٧٥ - كيلوات Kilowatt
من المقاييس الكهربائية قدره ألف واط. وهو يمثل وحدة كهربائية طاقاتها ألف جول بالثانية.

٢٤٣٧٦ - كيمافيل Chimaphila (S). Chimaphile (F). Chimaphila (E).
الاسم العلمي من اليوناني يعنى «حبيب الشفاء». جنس جنات سميرة مدادة من فصيلة الاغروسيات. منبتها يعض اقاليق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستطيلة مدادة قليلة القروع. اورقها متعاقبة، سنانة اتصال، صغيرة الحجم. ازهارها بيضاء اللون أو وردية || انواعه المرفوعة قليلة العدد، اشهرها التالية.



كبع امس

٢٤٣٧٧ - كيمافيل صيواني Chimaphila umbellata (S). Chimaphila en ombella (F).
نوع من الكيمافيل. ساقه تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. اورقها حيلة اغصان تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهاره صيوانية التجميع، صغيرة القدة، وردية اللون || تنويره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٣٧٨ - كيمافيل مسطخ Chimaphila maculata (S). Chimaphile maculé (F).
نوع من الكيمافيل. ساقه تطول من ٢٠ إلى ٤٠ سم. اورقها تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا الملطخة بالابيض، احر الصفحة السفلى. ازهاره كبيرة القدة بيضاء اللون، فواحة العرف العطري || تنويره يستمر طوال شهر حزيران.



كيس

٢٤٣٧٩ - كيميكاري Chimique (F). Chemical (E).

٢٤٣٨٠ - كيميايمي Chimista (F). Chemist (E).

٢٤٣٨١ - كيمُوع Terre arable (F). Arable soil (E).
هو التراب الزراعي. ويصير آخر هو طبقة التراب السطحية التي يتمكن منها المزارع أو التي تسير غروبها جنود النباتات الزراعية.



كيلودكيل

٢٤٣٨٢ - كيمُوس Chyma
مجموعة المواد اللدائية المائعة في اللمة بعد امدادها الارلي.

٢٤٣٨٣ - كيمُوع Géophage (F).
هو التراب، اسطلي.

٢٤٣٦٦ - كيمُي Empirique (F).

Empiric, Empirical (E).
هو ما ارتكز على المادة أو التجربة الشخصية وليس على القواعد العلمية الململة.

٢٤٣٦٧ - كيمُة Calca (S).

Calca (F). Calca (E).
جنس طير من المتطفلات وفصيلة الببغاوات. انشائها المعروفة سعة تنتمي الى حارة الدّر. موطنها معظم مناطق امريكا الجنوبية. ملينها الحياتي جماعي باستثناء زين التلساف والحفن || اجسامها ريمية تطول من ٣٠ الى ٣٦ سم. انشائها تختلف مع الانواع. الانشائها الملونة الى اغصان المتطارات الماجات. الانشائها السطحية تراوح من الزيمية الى المتفتية والسمراء، اجنتها ذلقة الاطراف، شبه رتاجية التركيب، لا تلعف كامل الذنب. انشائها مقطوعة الاطراف. ارسلها قصيرة، اصابعها كبيرة، شديدة السمرة || تألف القابات القرية من الممران. قوتها التار البرية والزراعية والحويوب.

٢٤٣٦٨ - كيمُة معايركة Jaugage (F).

Gauging (E).
طريقة الوصول الى تحديد المقدار او الحجم بها اشي. كقياس المياه الجارية ورسم الدّر وقطر الشجرة الخ.

٢٤٣٦٩ - كيمُة المساحة Levé superficiare (F).

٢٤٣٧٠ - كيمُة امس Obisium lubricum (S). Obisie lise (F). Obisium lubricum (E).

دوية نافعة من فصيلة الكرنيسيات ودوية المقرليات الكاذبة. جسمها صغير القد بطول نحو ٣ سم. صدرها جويوي اللون، مغطى الصفقة المائلة. مقنباها كيران يتنباها بملقطين كلافات المتقارب يملوها حلب دقيق الحبل. بطنها مغطى عادم الذنب اكهب اللون اسمر المولج. عنانها مركبات، صغيرة، جرماتها معتدلة الطول، متخيلة اللون || تألف الاجراج وتعيش تحت الجحالة والحجارة الصغيرة. مسرحها دجوي. قوتها الحشرات الصغيرة ويكتها ويزان التمثل دياه والديدان ... || تتمر نحو جنس سنوات بيائها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر. تبيض الاثني من ١٠ الى ١٢ مكنة تلعها كالثوية يصلجة حريرية النوار سمراء اللون. يتم التفت وتتلق الصلجة في اوائل تموز وتسمى الصغار طلبا للرزق بعد التفت بنحو ٤٨ ساعة.

٢٤٣٧١ - كيمُوس Chellinus (S). Chéline (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيميدات الشائكات الزعانف. انواعه المعروفة نحو ٢٥ اصنافها المحيط الهندي وجواره. تتميز باستقالة زانها الظهيرة والشرجية ويتسدى لونها المتباينة واغصانها ميكها البطني || جميع انواعه مأكولة اشهرها كيسل يشيل وهي سمكة كبيرة القدة تطول نحو ٦٠ سم. نوها الى السمرة يملوها مواج اخضر.

٢٤٣٧٢ - كيمُود كيمُوس Cheilodactylus (S).

Cheilodactyle (F).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات. انواعها المعروفة عديدة. اصنافها بحار الجنوب || اجسامها شبه اطيحية الشوزن تطول من ٢٥ الى ٣١ سم. وروشها

التجميع . ثمارها حبوب صغيرة مستطيلة مأكولة || زراعته رابحة وسهولة شائعة الاستعمال الغذائي .

٢٤٣٩٥ - **كَيْنُولَة** °
Phylogénèse (F).
Phylogeny (E). تاريخ تكوين ونشوء وتطور الانسال .

٢٤٣٩٦ - **كَيْنَيْت**
Kainite ملح بوتاسي طبيعي الحامضية تركيبة مزيج من كلوريد البوتاسيوم مع سلفات المغنيزيوم وبعض التي من كلوريد الصوديوم والمغنيزيوم . وهو من الاسمدة البوتاسية الحامضية الاستعمال بحوي من ١٤ الى ١٥ ٪ من البوتاس لكنه يسمح ذرات التربة السطحية ويلتقط انكاشها لذلك يحسن استعماله في الآتربة الرملية الخفيفة دون سواها .

٢٤٣٩٧ - **كَيْشِين**
Quinine الكينين اصل فاك يستخرج من لحاء شجر الكينينا ويستعمل في معالجة معظم الحيات .

٢٤٣٩٨ - **كَيْسَب** °
Prioscals (S). Prioscèle (F). جنس حشرات من عذبات الاجنحة مختلفات الاجزاء وفضيلة النشبات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من علم افريقية الاستوائية والاتالم المهاردة || اجسامها كبيرة ، مستطيلة ، معتدلة النبط . رؤوسها معتدلة الجرم . قرونها الاستعمارية صولجانية . تأثيرها عجيبة . كراتلها مجنية الشكل . اغامها لاحقة بحززة . جرائرها قصيرة ، مقبوسة . نشيطة . انوبها لماعة قليلة الالوان يكثر فيها الاسود وبالي الاسمر .

٢٤٣٩٩ - **كَيْسَلْتِ الثِين** °
Hypoborus fuscus (S). Hypobore du figuier, Scolyte du figuier (F). Hypoborus fuscus (E). Feigenborkenkäfer (D).

حشرة غاصلة غشائية مؤذية من فصيلة الكراشيات ورتبة منمدات الاجنحة . اعطائها اللبنانية تمتد امتداد اقلم الثين ، من السواحل الى ارتفاع ألف متر من سطح البحر . تركب الاناد المستضفة ولا تقرب من الريانة او البايبة || جسمها صغير القف يطول نحو ٢ سم . لونها الى السمرة الكستنية يملوها في ظهرها موج اريد . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها صولجانيات . فكهاا حليمان ذريان . ظهرهاا ذاق الموضر اللاصفت . غدهاها متانهاا التميزيز القاطب || اجسامها الحولية تراوح من ٢ الى ٤ . اربعة اجيال في المناطق الساحلية وجبلان في اعالي الروط || ويوجد الحشرة الجملدة والبرقة لا ينقطع في مناطق الساحل والوسط ، طوال مذار السنة || والحشرة من اي شق كانت تعمل في سبيل التكاثر وتأخذ حل عاتقها عالج السرداب الرئيسي وحجرة التصاقل ثم الانفاق الثانوية من البين واليسار . وقد يراوح عدد الانفاق الثانوية من ٣٠ الى ٤٠ .

٢٤٤٠٠ - **كَيْسِي** °
Apteryx (S). Aptéryx, Kiwi (F). Aptéryx, Kiwi (E). طائر رأس عدها وسيد الجلس والنوع من فصيلة الكيوريات . موطنه نيوزيلندا . جسمه متوسط القف ، جسمه حجم النجاسة . قويه الى السمرة السفهاء المراج . وهو اجدع الجناح ، حاد الذنب . خيبي الريش اللينق النام الذي يشبه الشعر . متقار مستطيل عذب . يصرح في الليل . قوته

٢٤٣٩٤ - **كَيْمُونُ نَنْتُس** ° ، **زَهْرَة الشِيَاء**

Chimonanthus (S). Chimonanthe, Calycout du japon (F). Winter flower, Japan allspice (E). Japonische Keichblume (D). Chimonanto (I).

جنس شجيرات برية ورتبية من فصيلة الكليكتسيات . انواعها قليلة البند . سورها تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها حابلة ، متعاقبة ، بسيطة ، نصلها سناني الشكل ، مالم البشرة ، زاهي الخضار || ازهارها متدلية انبوبية جرثومية الورد . الوانها تختلف مع اولوها منها الابيض والاحمر والاصفر والموشع || ازهارها يستمر من كانون الاول الى آذار .

٢٤٣٩٥ - **كَيْمِيَاء** ، **كَيْمَاء**
Chimie (F). Chemistry (E).

علم يبحث في تكوين المادة والتغيرات التي تلحق بها من جراء عوامل مختلفة تفقد الجسم مظهره الخاص وصفاته التي يتميز بها .

٢٤٣٩٦ - **كَيْمِيَاء حَيَوَانِيَّة**
Zoochimie (F). Zoochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات الانسجة الحيوانية .

٢٤٣٩٧ - **كَيْمِيَاء كَهْرَبَالِيَّة**
Electro-chimie (F). Electro-chemistry (E). قسم من علم الكيمياء يبحث في المناشع الكيائية التي تنيرها الكهرباء .

٢٤٣٩٨ - **كَيْمِيَاءِيَّة**
Biochimie (F). Biochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية .

٢٤٣٩٩ - **كَيْمِيَاء تَبَائِيَّة**
Phytochimie (F). Phytochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء خاص بالبائتا .

٢٤٣٩٠ - **كَيْمِيَت** راجع كروزفيلم كينتر .

٢٤٣٩١ - **كَيْنَا** هي الكينينا ، اطلها .

٢٤٣٩٢ - **كَيْنَتَة**
Cintoris هي مقر الاساس المرفح من الفرج وهي جلام مثلث الزردان او حجابها ، مركزها تحت الزرنية من داخلها .

٢٤٣٩٣ - **كَيْنَا جَوْ** °
Cercopites (S). Kinkajou (F).

حيوان من الراتنزيات وسيد الجلس والنوع . موطنه امريكا الوسطى يعيش في غابات مناطقها الاستوائية . جسسه طولي نحو ٤٠ سم . بذيله ٥٠ اما ارتفاعه من ١٦ الى ١٨ سم . وهو يستعمل ذنبه كالقوة للانفقال من ضمن الى حصن ومن مجرة الى اخرى . قوته الثار واللويبات الصغيرة والمصاير والبشيش والحشرات والمسل الذي يفتش عنه ويلتهم بشراهة .

٢٤٣٩٤ - **كَيْنُونَا** ° ، **أَلِيْنَة كَيْنُونَا**

Chenopodium quinoa (S). Quinoa, Petit riz (F). نوع من الاينة وهو نبات عشبي يجلى حولي زراعي مهدد ببلاد الشيلي والبيرو . ساقه متصببة قليلة الفروع . اوراقه معتقة متعاقبة سنانية التصل المرفرس . ازهارها سنيلي ليد



كيمونتنس



كينكا جو



كين



كيب



كين ثين



كِيوي

Œuf très petit (F).

Little egg (E).

هي البيضة اي البيضة الشديدة الصغر .

٢٤٤٠٢ - كِيِيَكَة

Micro-organisme.

Microorganisme (F). Micro-organism (E).

تعريف يطلق عل كل كائن حي شديد الصغر لا يشاهد بالعين المجردة بل تحت المجهر كالبكتيريا والفيروسات والخلايا والاعفان والاولاي .

٢٤٤٠٣ - كِيِيِيْن ٥


الحشرات والديدان والحويوب . يعيش ذكراً واثقاً . انثاه تحفن في الحول من مرتين الى ثلاث مرات . حفتها بيضة واحدة ترخها نحو ٢٤ يوماً .

Apterygidae (S).

Aptérygides (F). Apterygidae (E).

نصيحة طير من الموالدي تشتمل حالياً بنوع واحد ينحى كيري موطنه نيوزيلندا .

٢٤٤٠١ - كِيِيَوَات ٥



Electrode - ٢٤٤١٢ - **لاحب**
هو القطب الكهربائي أو المنفذ الكهربائي .

Lepismidae - ٢٤٤١٣ - **لاحسات**
فصيلة حشرات تعرف بالشحبيات ، اطباها .

Lépsma (S). - ٢٤٤١٤ - **لاحسة**
Lépsma (F). Lepisma (E).
جنس حشرات من فصيلة اللاحسات . انواعها عديدة تعيش على المواد العضوية والتشوية . راجع شحبية .

Lepisma saccharina (S). Lépsma du sucre. Petit poisson d'argent (F). Silberfish (E). Silberfischchen (D). - ٢٤٤١٥ - **لاحسة السكر**
حشرة صغيرة القند اطيحية الشكل فضية اللون من فصيلة اللاحسات مبدولة في البيوت تلتصق السكر وتقرض القرطاسية والكتب .

Cœlentérés (F). - ٢٤٤١٦ - **لاحشريات**
Cœlentérés (E).
هي الحيوانات ويدعونها في مصر « جوفويات » . شعبة من الحيوانات الدنيا تتميز بجلوها من الاحشاء والامتعاضة عنها أو الاكتفاء بتجوييف وحيد الفتحة يقوم مقام الدم والانس .

Zoophage (F). - ٢٤٤١٧ - **لاحيم ، واكيج**
Zoophagous (E).
ما كان قوته اللحم حيواناً كان ام دودية ام حشرة .

Carnassiers - ٢٤٤١٨ - **لاحيمات**
هي آكلات اللحوم ، اطباها .

Apétale (F). Apetalous (E). - ٢٤٤١٤ - **لايتكي**
هو النبات الذي لا قسالة في زهرته . وهي الزهرة العالمة البتلات .

Lactifère (F). Lactiferous (E). - ٢٤٤١٥ - **لايين**
نمت تمريني يطلق على الاوعية العضوية التي تنقل اللبن او المصارات اللبنية في الحيوان والنبات .

Nul ne plaide par procureur (F). - ٢٤٤١٦ - **لايتكاهي بالوكالة**
بدأ قانوتي فرنسي سري مسرى الاشغال ليعوله انه اذا وكل عمرو زيدا مقاضاة بكر يجب ان يذكر في صحيفة الدعوى وفي الحكم اسم الوكيل والاصليل .

Grémillet (F). - ٢٤٤١٧ - **لايتسني**
نبات تريني يدعى آذان الفأر المنقي ، اطليه .

Lathyrine (F). - ٢٤٤١٨ - **لايتيون**
هي الجلبانين ، راجعها .

Calcifuge (F). - ٢٤٤١٩ - **لاجتي**
نمت تمريني يطلق على النباتات التي لا تنمو في الارربة الكلسية او انها تنحاشها .

Frémteur (F). Brakesman (E). - ٢٤٤١٠ - **لاجيم**
نمت تمريني يطلق على الاصحاب والمضلات التي تستطيع قمع حركات بعض الاعضاء او اعمالها .

- ٢٤٤١١ - **لاجيم الفيلدع**
نبات يدعى كلوة الماء ، اطباها .



لاحسة السكر

٢٤٤١٩ - لا حيوي

Abiotique (F), Abiotic (E)

نقيض الحيوي .

٢٤٤٢٠ - لاصيب

Intensif (F), Intensive (E)

نمت تعريفي يطلق على كل ما يتميز بطابع الانتاج الوافر .

٢٤٤٢١ - لاعشبي

Abrachae (F)

Abbrachiate (E)

نمت تعريفي يطلق على الحليقات المادامات اغلياشيم .

٢٤٤٢٢ - لاذن ، لاذن

Ladanum

مادة صمغية رائحتها طيبة تقزمها سوق وارواق بعض النباتات اخصها نبات الاذن . لوئها يراوح من الاشهب الصناعي الى الجوزي الاسمر المالح ، وهي ذكية العرف طيبة الرائحة || كان لا يزال يستعمل في الطب ومنهم من استعمله للنبج وهو شائع الاستعمال المطري .

٢٤٤٢٣ - لاذن ، قستوس ، قستوس ، قستوس

Cistus (S), Ciste (F), Cistus (E)

جنس نباتات طيبة بوية وتربية من فصيلة الازدييات . انواعها المروفة ٢٠ منها الجنبات والجيلات والاعشاب . اصلها حوض البحر المتوسط . سيقانها قصيرة متضبة فرعاء . اوراقها ابيدة كاملة متقابلة صغيرة النصل . ازهارها لاقصية التجميع ، جميلة الشكل ، خلبية الزينات . ثمارها حقية خافية او عشارية الاخضبة || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٤٤٢٤ - لاذن اجعد

Cistus crispus (S)

Ciste crépu (F)

نوع من الالذن الممر وهو بجلة سريوية تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها لاطئة سنائية الشكل . نصلها اجعد الصفعة الخشنة الزيادة القفاصة العرف المطري . ازهارها ارجوانية اللون صغيرة الحجم قطرها نحو ٣ سم . || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٢٥ - لاذن اُرْهَب *

Cistus hirsutus (S)

Ciste hérissé (F)

نوع من الالذن الممر وهو جنبه سريوية تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . ساقها وفرعها كثيفة الزغب . اوراقها رهلة . نصلها لبد الخمل على مسطحه . ازهارها متكونية التجميع ، متوسطة القند ، لوئها الى الابيض المبيح بالأصفر || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٤٢٦ - لاذن إسباني ، قستوس لاذني

شقرامس ، قستوس

Cistus ladaniferus (S), Ciste ladanifère, C. lédon, C. d'Espagne, Ladanum d'Espagne (F) Gum-cistus, Ladanum-resin tree (E), Spanische Cistrose (D), Cisto ladanifero, C. di Spagna (I).

نوع من الالذن الممر ، يكثر في حصاب اسبانيه وبيجاها وهو جنبه بلولة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها لاطئة ثلاثية المروق . نصلها اخضر الصفعة العليا الخمر السفلى الكثيفة الخمل والزغب . ازهارها كبيرة القند قطرها يراوح من ١ الى ١٠ سم . لوئها الى الابيض يعلو ترشح وتبيح احمر || اوراقها وفرعها لزجة يستلقت منها الالذن المشهور . ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٢٤٤٢٧ - لاذن كرتيني ، قستوس الكرتيني ، عيتد

Cistus creticus (S)

Ciste de Crète (F), Cretan rockrose (E), Kretische Cistrose (D), Cisto di Creta (I).

نوع من الالذن الممر الجبل . جنبته تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها قصيرة الاصل ، صغيرة القند ذرية . نصلها يتقاطع المروق والاصحاب ، غثن الخمل ، ازغب البشرة على مسطحه . ازهارها قزمية اللون ، كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم . || اوراقها وفرعها وساقها لزجة يستلقت منها اجود اصناف الالذن || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٢٨ - لاذن طوطي ، برعين

Cistus villosus (S), Ciste cotonneux (F)

نوع من الالذن الممر . جنبته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها وفرعها مزينة . اوراقها معتقة ييشية . نصلها اغثن الصفعة المتضمة الزباء . زغبها لبد مستطيل يعلو كتيل القطن . ازهارها فردية خراء اللون ، قطرها نحو ٥ سم . || ساقها وفرعها وارواقها لزجة يستلقت منها الالذن || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٢٩ - لاذن عاري الورق

Cistus laurifolius (S), Ciste à feuilles de laurier (F)

نوع من الالذن الممر وهو جنبه سريوية تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فرعاء . اوراقها معتقة غارية الشكل . نصلها ثلاثي المروق ، مائل الصفعة العليا ازغب السفلى . ازهارها بيضاء اللون ، كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٥ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٤٣٠ - لاذن قروسي الورق

Cistus salvicifolius (S), Ciste à feuilles de sauge (F)

نوع من الالذن الممر وهو جنبه بلولة ترغب في الازربة الربلية ، تملو من ٦٠ الى ٢٠ سم . اوراقها معتقة قزمية الشكل عادمة المروق . نصلها ازغب البشرة على مسطحه ، ابيض الصفعة السفلى المشبهة الخمل والزغب . ازهارها الى البياض الاصفر . قطرها نحو ٥ سم . || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٤٣١ - لاذنيات

Cistaceae (S)

Cistacées (F), Cistaceae (E)

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القلمات ، اجناسها اربعة ، أما انواعها فكبيرة العدد . اشهر اجناسها الالذن والملاطين .

٢٤٤٣٢ - لار

Lar

هو جيون لار ، اطبه .

٢٤٤٣٣ - لارس ، مَلَر

Larix (S)

Larix, Mélèze (F), Common larch (E), Lärche, Lärchenbaum (D), Larice, Abeto larice (I).

جنس اشجار سرجية من التنزيات وفضيلة الصنوبريات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اجمارها كبيرة الحجم ، هريبة الشكل ، اقية الاغصان والفروع . غراخها مبررة ، بناتها جانبية الانتشاب ، قصيرة القند . اوراقها خطية ، غنية التجميع ، عابلة . ازهارها وسيدة المسكن ، الاثنية قدية الشكل . ثمارها اكواز صغيرة . اغشابها جزوية اللون صلبة ، قشورها تستعمل في الدفاعة ويستخرج من سيقانها بالخر مادة رائتجبة شائعة الاستعمال الصناعي || امرف انواعها واشهرها ما على .



لاذن ازغب



لاذن اسباني



لاذن كرتيني

صفحة العليا خضراء اللون غنّدة، صفحته السفلى خفيفة البنية، خضراء اللون. وأوراقها حده تشقّر عند اقترابها من الخريف فتبدو بلون الذهب. أكوازها مخروطية الشكل تطول من ٦ إلى ٧ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥. جرتها جوية اللون، هريّة الشكل، ناشرة.

٢٤٤٤٠ - لاروزد ، لاروزد

Lapis, Lapis-lazuli, Lazulita

حجر كريم مشهور، أجوده الصافي الشفاف الأزرق الشارب إلى حمرة وخضرة.

٢٤٤٤١ - لاروزد يّية

Cynanthus (S).
Cynanthus (F). Cynanthus (E).
عشبة معمرة، برية وتربّية من فصيلة الجريسيات. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها الحدائقية والمركبة في أكثر من قطر. ساقها قصيرة تملو نحو ٢٠ سم. جلويها درياء مستطيلة. أوراقها متعاقبة، بيضيّة النصال، صغيرة الحجم. أزهارها فردية، محورية الأركان، لاروزدية اللون. قطرها نحو ٣ سم. انتويرها يستمر من أواسط آب إلى أواسط أيلول.

٢٤٤٤٢ - لاشيق

Agame, Asexuel (F).
Agamous, Asexual (E).
كل ما هو عادم الشق أي عادم الأعضاء التناسلية في الحيوان وفي النبات.

٢٤٤٤٣ - لاشيتال

Lachenalia (F).
Dessev (F).
هي زينة البر، اطله.
نمت تمرّفي يطلق على التسع النباتية الحالية من المواد الصائفة.

٢٤٤٤٥ - لاصب

Plantain (F).
جنس نباتات عشبية كثيرة الأنواع اشتهرت باسم لسان الحمل، اطله.

٢٤٤٤٦ - لا طيس ، ليشر

Lates (S).
Lates (F). Lates (E).
جنس اسماك نهريّة من شالكات الزرافات وفصيلة الفرغيات. انواعه قليلة العدد اصطلحوا انهر البلاد الاسيوية والافريقية الحارة كالنيل والنيجر والكنج والفرات... جميعها كبيرة القد مستطيلة الجسم محدودة الظهر. انواها الى السمنة القصية يملوها موج مختلف باختلاف النوع. طولها مأكولة لكنها دون الوسط. اشهر انواعه ما يلي.

٢٤٤٤٧ - لا طيس النيل * ، حيمار البحر، فرخ

Lates nilotica (S).
Lates du Nil (F). Great Nile perch (E).
نوع من الاطس وهي سمكة كبيرة القد، طولها نحو ١٠٠ سم. تكثر في مياه النيل من منبه الى مصبه. وهي من الاسماك المأكولة المنتشرة الصنف. وكان المصريون من عهد الفرعنة الى عهد الرومان يقدسونها وبها سميت مدينة لا طولوس اي اسنا في المصيد.

٢٤٤٤٨ - لا طيس الهند

Lates des Indes, L. du Gange (F). Great Ganges perch (E).
نوع من الاطس وهي سمكة كبيرة القد خضنة، طولها نحو

٢٤٤٤٩ - لاريس أروبة * ، مئز أروبة

Larix europaea, L. decidua (S). Larix d'Europe, Mélèze d'Europe (F).

نوع من اللاريس منته جبال أروبة. شجرته تملو من ٣٠ الى ٤٥ م. غراصها صفراء اللون. أوراقها تطول من ١٥ الى ٣٥ م. وتعرض نحو ٥. وهي رطلة، كثافية الشكل، ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي. أكوازها الانثوية ارجوانية اللون. أكوازها تملو من ٣ الى ٤ م. وتعرض نحو ٢. جرتها سكية الشكل كثيرة العدد.

٢٤٤٥٠ - لاريس الصين ، مئز الصين

Larix chinensis (S). Larix de Chine, Mélèze de Chine (F).
نوع من اللاريس منته جبال الصين. شجرته سريوية، تملو من ١٥ الى ٢٥ م. غراصها زياء حطية اللون. ينالها خلية. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٢ الى ٣ م. لوها الى الخضار المايك يملو موج أزرق. أكوازها مخروطية تطول من ٣ الى ٥ سم. جرتها بارزة مشننة الاصغر.

٢٤٤٥١ - لاريس اليابان * ، مئز اليابان

Larix leptolepis (S). Larix du Japon, Mélèze du Japon (F).
نوع من اللاريس منته جبال اليابان. شجرته سريوية سريفة النمو تملو من ٢٥ الى ٣٠ م. غراصها جوية اللون لامة. ينالها خلية لبشرة، بحرية اللون. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ١٥ الى ٣٠ م. لوها الى الخضار الصافي الموج، أكوازها مخروطية صفراء اللون تطول نحو ٤ سم. جرتها لتسوية الشكل غائرة الخار.

٢٤٤٥٢ - لاريس أمريكة ، مئز أمريكة

Larix americana, L. pendula (S). Larix d'Amérique, Mélèze d'Amérique (F).
نوع من اللاريس منته أمريكة الشمالية. شجرته سريوية بطيئة النمو تملو من ٢٥ الى ٣٠ م. غراصها الى الحمرة البنيجية. ينالها بحرية اللون، ودية الطيل. أوراقها ثلاثية الصفحات، حيلة الخضار الزاهي تطول من ١٥ الى ٣٠ م. أكوازها جوية اللون تطول نحو ٣ سم. وتعرض نحو ٢.

٢٤٤٥٣ - لاريس سيريّة ، مئز سيريّة

Larix sibirica (S). Larix de Sibérie, Mélèze de Sibérie (F).
نوع من اللاريس منته سيريّة. شجرته سريوية تملو من ٣٥ الى ٤٠ م. غراصها سود الخار. أوراقها ثلاثية الصفحات تطول من ٤ الى ٥ سم. وتعرض نحو ١ م. انواها الانثوية الى الخضار الباهت. أكوازها مخروطية تطول من ٤ الى ٥ سم. جرتها بارزة، مشننة الزوايا، قليلة العدد.

٢٤٤٥٤ - لا رويس كاذب ، مئز كاذب

Pseudolarix (S). Faux-larix, Faux-mélèze, Sapin doré, Arbre d'or (F). Golden larch, G. pine (E). Echte Goldlärche (D). Abeto d'oro (I).
شجرة حرجية سريوية، سريفة النمو، هريّة الشكل، وسيدة الجنس والنوع من التنزيات. مهدا جبال الصين الشمالية. تملو من ٣٠ الى ٤٠ م. اغصانها انقية الانتشاب فارشة. أوراقها عابطة، ضمية التصنج. نصلها خطي الشكل يملو من ٥ الى ٨ سم. ويعرض من ٣ الى ٣ م.



لاريس أروبة



لاريس اليابان



لا طس النيل

تطول من ٨ إلى ١٠ م. تحله نصل أوراق التبغ الاخضر وتسرده بين بشرتيه فينبو شفاثا خاليا من المواد البتية الحمية. راجع جنس الباطا.



لاية

٢٤٤٥٨ - **لايحة التين** ° *Mineuse du figuier (F).*
هي قورمة التين ، اطلها .

٢٤٤٥٩ - **لايحة الزرع** ° ، *Agromyza ambigua (S).* *Mineuse des céréales (F).*
حشرة صغيرة من اللافحات . طولها يراوح من ٣ إلى ٤ م. رأسها ويطنها الى الجوزة البنفسجية . كسلها الى السواد الأزرق الملوخ . تكثر في اراثل نيسان . تمتع مكها حل حلف الزرع فينتف عن رقات تلم النسيج وتسبب ذبوله .



لاية الارضي شوكي

٢٤٤٦٠ - **لايحة الكرنتيم** ° ، *Phytomyza atricornis (S).* *Mouche des chrysanthèmes (F).*
حشرة صغيرة من اللافحات ، طولها يراوح من ٢ إلى ٣ م. لونها الى الزبداء السراء تملها بقع صفر . رقاتها تركب اوراق الكرنتيم فتلفها وتؤذيها أشد الأذى .



لاية التبغ

٢٤٤٦١ - **لايحة اللوبيا** ° ، *Agromyza phaseoli (S).* *التاصولي* ° *Mouche du haricot (F).*
حشرة صغيرة من اللافحات ، طولها نحو ٣ م. فوجها اسود لاح . تمتع مكها في اوراق اللوبيا قرب الفلفل فينتف عن رقات تعيش بين بشرتي الورقة ثم تنجس نحو الفلفل ويها الى الملقاق فاساق فالمرقة حيث تبقى الى ان يتم انسلخها وتتحول الى كزود .



لاية الزرع

٢٤٤٦٢ - **لايحة اوراق الأشجار المثمرة**
Mineuse des feuilles des arbres fruitiers (F).
حشرة مؤذية من حشرات الاجتحة تدعى رثاعة ملوطة ، اطلها .

٢٤٤٦٣ - **لايحة** ° *Euphorbe officinale (F).*
هي القريقين الخروني ، اطلها .

٢٤٤٦٤ - **لايحاتاري** ° *Invertébrés (F).*

Invertebrata (E).
الانقاريات قسم من الحيوانات لا فقار لها . فالاريا والاسفنجيات والمحيطيات والشوكيات والدوديات والرخويات جميعها من الحيوانات الانقارية .



لاية الكرنتيم

٢٤٤٦٥ - **لايحاتي** ° *Acotylédone (F).*
Acotyledon (E).
نمت تمرني يطلق على النبات الدائم الثقله .

٢٤٤٦٦ - **لايحة بوهية** ° *Zygospore*

٢٤٤٦٧ - **لايحاتيات** ° *Atracheates (F).*
Atracheates (E).

فئة من الحلييات تشمل الانواع العادة الرطاي ، الجلية التنفس . جميعها من الحيوانات الدنيا تتغفل على الحيوان او تعيش على المواد العضوية السائلة نحو الانحلال .



لاية الربابة

٢٤٤٦٨ - **لايحات النمل** ° *Fourmiliers (F).*
Ant-thrush, Ant-catcher (E).

مرتبة من الطير تنسب الى رتبة الجرام . فصائلها واجناسها

١٣٠ م. تكثر في مياه الكنج من منبه الى مصبه . فوجها الى السرة السحبية يملها موج جزوي يميل حته الطهر ويضو ويرو حته البطن .

٢٤٤٦٩ - **لايحات العيون** ° *Edriophthalmes*
شعبة من الحيوانات الثريات اللينات الصف .

٢٤٤٧٠ - **لايحات المتك** ° *Diploures, Eutotrophes*
رتبة حشرات مادية من هليات الانذاب . اجناسها وانواعها نحو ١٥٠ اطلها جميع المناطق الحارة والمعتدلة . تتميز بصغر مكها واحتجابها ، باستطالة قروها الاستشعارية البديدة الفواصل وباراسها الوحيدة الفاصل .

٢٤٤٧١ - **لايحات** ° *Sesilio (F).*
نمت تمرني يطلق على الاعضاء النباتية التي لا تقوم على دعائم بل تركز مباشرة على الهود كقوك ورقة لاطنة .

٢٤٤٧٢ - **لايحاتي** ° *Inorganique (E).*

٢٤٤٧٣ - **لايحة** ° *Lophospermum (S).*
Lophosperme (F).
جنس نباتات عارضة خلية لزجة من فصيلة الخنازريات . انواعها قليلة ، سيقانها فراء تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م. اوراقها متفكة قليلة خاسية التغميس . نصلها خلي البثرة مسن الحافة . اثمارها فردية ، محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، طويلة الزناد ، وريدية اللون موحية بالابيض والاصفر وهي مثوية التريج يحرسها النمل .

٢٤٤٧٤ - **لايحات** ° *Agromyzidae (S).*
Agromyzidae, Leaf miners (E).
Minterfliegen (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٥٠٠ . جميعها صغيرة القد ، رمادية اللون او بنية ، ملوثة الجناح . تطفر في الربيع . تمتع مكها على اوراق النبات وصاليجه فتنتف عن رقات دقيقة خيطية تدخل النصل فتلفه وتتمسك حللاه ، بين البشريين ، ثم تتحول بعد انسلخها الاخير الى كزود تحكث في مكها او تقيم في التربة كامل فترة بيائها الملوي .

٢٤٤٧٥ - **لايحة الارضي شوكي** ° ، *Agromyza andalusica (S).* *Mineuse de l'artichaut (F).*

حشرة صغيرة من اللافحات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. جسمها ازغب الكساء . فوجها الى السرة العابقة . اجناسها الحولية ثلاثة ، رقاتها تلمن هروق اوراق الارضي شوكي فتلفها .

٢٤٤٧٦ - **لايحة البهية** ° ، *Phytomyza liliis (S).*
Mouche du houx (F).

حشرة صغيرة من اللافحات . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. فوجها اسود اللون . رأسها وجرانها جملدة بالاصفر . رقاتها تركب اوراق البهيات فتلفها وتؤذيها .

٢٤٤٧٧ - **لايحة التبغ** ° *Phthorimaea operculella (S).* *Mineuse des feuilles de tabac (F).*
فراشة من فصيلة المنجوليات تدعى جنسها الباطا . حورياتها تحيلة فراء اللون محتلة الرأس هلية النقط الترجية الجانية .

٢٤٤٧٨ - لَامَة * ، جَسَلْ أَمْرِيكَة

Auchenla, Lama (S). Lama

جنس حيوانات لبونة عاشية من فصيلة الجمليات . أنواعها أربعة ، موطنها هضاب وجبال أمريكا الجنوبية . أجسامها رفيقة القوام ، طولها يراوح من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ سم . وارتفاعها من ٨٠ إلى ١٢٥ سم . أذناتها مسطيلة ، أوبارها صناعية جيدة الصنف تحميه القدر . قوتها الأعشاب . بعض أنواعها داجن يستعمل لدر الحليب ونقل الأقال .

٢٤٤٧٩ - لَامَسَاوِي الأوراق

راجع غير متساوي الأوراق .

٢٤٤٨٠ - لَامَسَاوِي البتلات

راجع غير متساوي البتلات .

٢٤٤٨١ - لَامَسَاوِيه الأجزاء

راجع غير متشابه الأجزاء .

٢٤٤٨٢ - لَامِيكِي

Atypique (F). Atypic (E).

Lamarkia (S). لا مَرَكِيَة ، قَد يُون . Lamarkia, Codion (F). Lamarkia (E).

جنس نباتات عشبية معقودة التعريف على اسم العلامة «لامارك» . وهي برية ، معروية ، حولية أو ممرمة من فصيلة النجيليات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، منها جوش البحر الأبيض المتوسط || سوقها شطئية فراء تملو من ٢٠ إلى ٥٥ سم . صفها متدل الطول ، قليل التعرض . ازهارها سبلي التجميع ، شبه غروطي الشكل ، سبيلاتها متدلية .

٢٤٤٨٤ - لَامِسَة

Tentacle (F). Tentacle, Feeler (E).

ج . لولس . زوائه لا مفصليّة قابلة الانعطاف والانكماش . توجد عند بعض الحيوانات تمككها من القبض على فريستها أو التماس طريقها ...

٢٤٤٨٥ - لَامَسِيَمِيَات

Aplacentales (F). Aplacentalia (E).

شعبة من صف الفصريات . فصائلها وأجناسها عديدة تجتمع إلى رتبين : الجرابيات ووحيديات المسالك .

٢٤٤٨٦ - لَامِعَات

Ganoides (F). Ganoids (E).

رتبة اسمك غضروفية تشمل بعض الفصائل أخصها الحفشيات .

٢٤٤٨٧ - لَامِعَة

هي القوتية ، نبات من الورديات ، أطبا .

٢٤٤٨٨ - لَامَصَلِي

Inarticulé (F). Inarticulate (E).

نمت وصفي يطلق على الاعضاء العادة المفصائل .

٢٤٤٨٩ - لَامِي

Amyride (F).

هو الأمريدي ، أطبا .

٢٤٤٩٠ - لَامِي البَكْسَم

Amyride gomifère (F). هو الأمريدي البلسي ، أطبا .

٢٤٤٩١ - لَامِي المَكْسِيَة

Amyride élémiphère (F). هو أمريد المكسيك ، أطبا .

وأنواعها كثيرة العدد معظمها من طيور افريقية وأمريكية . تألفت المناطق الحارة والامتوائية || أما فصائلها فهي الجليات وإكتانجات والقرناريات والمأنوريات والمختريات والفرصيات .

٢٤٤٩٦ - لَأَثَوْن مَنَقَط

Lacon punctué (F).

هو السائل المنقط ، أطبا .

٢٤٤٩٧ - لَأَيَسِي ، لَأَنَسَاكِي

Asymétrique (F). Asymmetrical (E).

نمت تعريفي توصف به الأشياء الشاذة من نظم القياسات المألوفة .

٢٤٤٩٨ - لَأَلَا

Renoncule d'Orient (F).

هي الحوذان الآسيوي ، أطبا .

٢٤٤٩٩ - لَأَلَة

Trillium (S). Trillie (F).

جنس نباتات عشبية سريرية من فصيلة الزنبقيات . أنواعها المعروفة عديدة . أنصاتها العالم معظمها أمريكي المهد . ترشب في المواقف الظليلة . أروبتها منادة ، سوقها قصيرة تنتمي بقسمه للأقية الأوراق تملوها زهرة ملونة ثلاثية البتلات . أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٤٤٩٩ - لَأَلَة الثلج

Trillium nivale (S). Trillie des neiges (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أرواقها مستطقة ، بيضبة ، صغيرة اللد . تصلها ثلاث المروق يطول نحو ٥ سم . أزهارها بيض ، قطرها نحو ٤ سم . أزهارها يستمر من آذار إلى نيسان .

٢٤٤٧٤ - لَأَلَة حَافِيَة

Trillium semile (S). Trillie sessile (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم . أرواقها حاشية ، تصلها ثلاث المروق اعليجي الشكل مذهب الزام الأخير يطول من ٧ إلى ١٥ سم . أزهارها قوزية اللون ، قطرها يراوح من ٥ إلى ٦ سم . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٤٤٧٥ - لَأَلَة كَبِيرَة الزَهَر *

Trillium grandiflorum (S). Trillie à grande fleur (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أرواقها حاشية . تصلها خماسي المروق اعليجي الشكل ذلق الزام الأخير يطول من ١٠ إلى ١٤ سم . أزهارها حادة العرف ، كبيرة اللد ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها إلى الأبيض أو الوردي . أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٤٤٧٦ - لَأَلَة مُنْتَصِبَة

Trillium erectum (S). Trillie dressée (F).

نوع من الالة . ساقها تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . أرواقها حاشية . تصلها خماسي المروق ، سناني الشكل ، مستطق الزام الأخير يطول نحو ١٢ سم . أزهارها جفر ، كبيرة اللد ، منتصبه الانكناز . يتلاتها إلى الخضار الأصفر يطولها حنار آخر وتغطيها ثلاثة خطوط جزوية . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

٢٤٤٧٧ - لَامَاكِي ، هَيْبِلَر

Anhydre (F). Anhydrous (E).

نمت تعريفي توصف به الأجسام الخالية من الماء أو البادئة الماء .



لَا تَة كَبِيرَة الزَهَر



لَا تَة

24500 - **لاهوآيَّة ، أنيروبيَّة** (F). Anseroble (F).

Anserobe (E).
صفة الكائنات الحية المجهرية التي تستطيع العيش منقطعة عن الهواء .

24501 - **لاؤدَّة**

في الخواص ، اطليا . ومنها الاصلي والذكر والحرسمة والحسنة .

24502 - **لايْتَحَلِّل ، لايدَوِب** (F). Indissoluble (F).
Undissolved (E).

24503 - **لَب** (F). Pulp (F).
هو ما في جوف الحبة واللوزة وغيرها من مادة جامدة مأكولة أو غير مأكولة .

24504 - **لَبَا التَصَرَّة ، ميزوكرَب**

Mésocarpe (F). Mesocarp (E).
هو البوق ، الجزء المتوسط من الثمرة ، وهو الجزء اللحمي في الثمار المأكولة .

24505 - **لَب التارجيل ، كُبَرَة**

Coprah, Copra (F). Coco-nut (E).
لب ثمر التارجيل الذي يستخرج منه بالصر دهن نباتي يدعى « سمن نباتي » .

24506 - **لَب يَتِي** (F). Brunissement interne (F).
Internal browning (E).

عارض يصيب ثمار التفاح الخزونة في البراد ، قوله عروق مستطيلة مستقيمة ومتعرجة لتشعب من وسط الشقة الى سطحها فتقطع الخلايا التي تغطيها وتسبب اختار عصيرها . يقال ان اسبابه تعود الى انخفاض درجة الحرارة قرب زرع ادراك الثمار وآل يهولها في البراد حتى درجة الصفر واستمرارها على هذه الدرجة بعض الوقت .

24507 - **لَبَا** (F). Arroser (F).
To water, To sprinkle (E).
لِبَا التمرسة : سقاها عند فرسها ، اذا فرست ليفة يجب ان تلبأها .

24508 - **لَبَا** (F). Amouille, Colostrum (F).
Beestings, Colostrum (E).

اول حليب عقب الوضع تدره البقرة والثنايا والاعرة . وهو غني بالمواد الاحية فقير بالزبد والسكر والماء .

24509 - **لَبَاب** (F). Pulp (F).
هو بويضة عام جاع المادة الدفنية النباتية الطبيعية . وهو بويضة غامض ما تبقى من الثمر بعد استخراج السكر ومن البطاطا بعد استخراج النشا .

24510 - **لَبَابِي ، لَبَوِي ، أَلْبُوِي ، لَحِيم** (F). Pulpeux (F).
Pulpeux (E).

24511 - **لَبَادِي ، لَبَادِي**
قال الجاحظ : « طائر على شكل البنان اذا اسفحل الارض لبه فلم يكد يطير حتى يطار » .

24512 - **لَبَان ، بَسْتَج** (F). Boswellia (S).
Boswellie (F).
جنس اشجار حرجية من سبط البخوريات وفصيلة البطيبيات انواعه الممرودة قليلة اصنافها جبال المناطق الاستوائية الهندية

24492 - **لاهيَّة الصَّفَصَاف** (F). Lamie des saules (F).

في ثمرتي الصفصاف ، اطليا .

24493 - **لاهيون** (S). Lamium (S).
Lamier (F). Dead-nettle (E).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الشفويات ، انواعه نحو ٤٠ جميعها احشاب تعملون من ٣٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، مخززة . ازهارها خضراء النجم ، ابطية الاينكار . تكثر في الاماكن الظليلة وفي السياجات وبجاري الماء . وهي من النباتات الممرودة التي تشتهجها الماشية . احرف ازهاره واشهرها ما يلي .

24494 - **لاهيون أبيض * ، قرص كذاب**

Lamium album (S). Lamier blanc, Ortie blanche, O. morte, Fausse ortie (F). White dead-nettle (E).
نوع من اللاهيون الطبي . عشبته تعملون من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه الى الحضار الاصفر المالح ، يطولها زغب مبهر نحل . ازهاره كبيرة اللد بيضاء اللون || ازهاره ربيعي يستمر من نيسان الى حزيران .

24495 - **لاهيون أرجواني * ، قرص احمر**

Lamium purpureum (S). Lamier pourpre, Ortie rouge, O. féide (F). Red dead-nettle (E). Rote Taubnessel (D). Lamio purpureo, Ortica fétida (I).
نوع من اللاهيون الطبي . عشبته كرجة الرائحة تعملون من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره أرجوانية اللون ، كبيرة اللد ، تطول نحو ٤ سم . ازهاره ربيعي .

24496 - **لاهيون أرقط * ، ثوقاس ، حَرَف**

Lamium maculatum (S).
Aبيض
Lamier maculé, L. tacheté (F). Spotted dead-nettle (E). Gefeckta Taubnessel (D). Lamio scitico, Dolcimele, Milzadella (I).
نوع من اللاهيون الطبي . عشبته تعملون من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه خلية الصفحة السفلى . ازهاره كبيرة اللد تطول نحو ٣ سم . لونها الى البياض المرقط بالاحمر || ازهاره ربيعي .

24497 - **لاهيون أصفر ***

Lamium luteum, L. galeobdolon (S). Lamier galeobdolon, Ortie jaune (F). Yellow archangel, Yellow dead-nettle (E). Gelbe Goldnessel, Goldtaubnessel (D). Lamio giallo, Ortica gialla (I).
نوع من اللاهيون ، عشبته تعملون من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مائلة البنية على صفحاتها ، ازهاره متوسطة اللد تطول نحو ٣ سم . لونها الى الصفرة الكبيرة . ازهاره ربيعي .

24498 - **لاهيبة * ، ملهتاب** (F). Lance-flammé (F).
Flame thrower (E).

جهاز آلي يرسل اللهب ويسده . يستعمل في القضاء على بعض الحشرات وفي تطهير التربة من بعض الاوسام والجراثيم

24499 - **لاهوآي ، أَلْبُوِي** (F). Anserobique (F).
Anserobic (E).

نعت تعريفي يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع الحياة بهذا عن الهواء .



لايون ابيض



لايون أرجواني



لايون أرقط



لايون اصفر

سوقها صارة صمغية رائحة تستعمل استعمال
البخور ، عرفها ليموني الزانحة مستحب .

٢٤٥٢٢ - لبَّاب

لب الحب : جرى فيه اللقيح وصار له لب يؤكل .

٢٤٥٢٣ - لبَّاب

Tilapia (S).

Tilapia (F). Tilapia (E).

جنس اسماك نهريه من فصيلة المشقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اصلها من بعض انهر الشرق الادنى وافريقية الشرقية || اجسامها صغيرة ، خيشه اهلجية الشكل ، متدلة التبطيط ، ذقمة المقدم ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . رؤوسها متدلة الجرم ، قصيرة الاعظام ، صغيرة الاسنان كبيرة العين . زعانفها الظهرية كبيرة ، قليلة المرض . الصدرية والخرسية والشرجية متدلة الجرم . الذيلية كبيرة ، مغطوية الطرف . اوثابا تراوح من الزبدية السوداء الى الزبدية الفضية يطولها ستة او ثمانية او عشرة اطواق متفرقة شدة السرة || من ميزات هذا الجنس ان اللجن ان الكور تحسن سره الاناث في تجاوب اصطامها حتى التفت اي نحو سبعة ايام || اعرف انواعه :

Tilapia orontes (S).

٢٤٥٢٤ - لبَّاب المعاصي

Tilapia de l'Oronte (F).

يكثر وجوده في نهري المعاصي والاردن .

Tilapia nilotica (S).

٢٤٥٢٥ - لبَّاب النيل

Tilapia du Nil (F).

يكثر وجوده في النيل حيث يسمنه غرضيل ويشط في حين ان المشط اي الخرشقي ينسب الى غير هذا الجنس .

٢٤٥٢٦ - لبَّاب

Trombidium holosericeum (S). Lepse automnal, Aoutat, Mite rouge, Vendangeur (F).

حشرة من الغاشيات ، طولها نحو ٣ سم . ثوبها الى الحرة تكثر في المراعي والحقول المزروعة وعلى اللوزيات . رقبها نحيلة دقيقة طولها يراوح من ١ الى ٢ سم . تركيب الاناث اذا جلس فوق الثشب وتدخل تحت بشرة الجلد فتحدث حكاكا مؤلما . يمينها البزنج .

٢٤٥٢٧ - ليتوثريوم

Leptothyrium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهاديكات . انواعه قليلة ، تتميز بكنياتها المجعينة الشكل ، السطحية الارتكاز ، السوداء اللون . بويضاته اهلجية او رشفية || اعرف انواعه ما يلي .

٢٤٥٢٨ - ليتوثريوم التفاح

Leptothyrium pomi (S). Maladie en crotte de mouche (F). Sooty blotch (E).

فطر مجهرية يمتري ثمار عدة نباتات برية وزراعية اصغها التفاح في بعض انواعه المتشابة || مظهره الخارجى رشفة رشفية تشبه ونم الذباب يبلغ متوسط عددها نحو ٤٠ ونم . تركيب بشرة الثمرة قرب ادراكها . تبدر حنطية اللون ثم تتعرف الى السرة الفحمية || يعيش البآر فيفسس قشبا التجارية دون ان يملها || يكالغ بامتلاء سائل يوردو الخلف قبل ادراك البآر باسويوم .

٢٤٥٢٩ - ليتوثريوم كاروفيلوم

Leptothyrium carpophilum (S). Fly speck (E).

فطر مجهرية يمتري بعض انواع الاجاص المتشابة . مظهره

والاريفية . يستخرج من سوقها بالخز صارة رائحة سمية الجفان فاحرة الصنف تسمى بخور اللبان || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٥١٣ - لبان حبشي ، بسنج حبشي ، طونس

Boswellia papyrifera (S).

Boswellia d'Abyssinie, Arbre à l'encens (F). Incense tree (E). Weihrauchbaum (D). Albero Incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته صغيرة القد ، موطنها بلاد الحبشة . يستخرج منها بالخز اخضر يتغير واخضر .

٢٤٥١٤ - لبان شامي ، صمغ البطم

Polx-résine (F). Shoemakers' wax (E).

مادة راتنجية صمغية تستخرج من سوق البطم .

٢٤٥١٥ - لبان هندي ، لبان ذكر ، بسنج هندي ، كندور

Boswellia serrata (S). Boswellia des Indes, Oliban (F). Frankincense, Olibanum tree (E). Echter Weihrauchbaum (D). Olibano incenso (I).

نوع من اللبان ، شجرته متوسطة القد ، موطنها بعض مناطق الهند . يستخرج منها بالخز بخور اللبان المشهور .

٢٤٥١٦ - لبان

Laitier (F). Milkwoman (E).

من تاطي بيع الحليب واللبان .

٢٤٥١٧ - لبانة

Andrachnes (S). Andrachné (F).

False orpine (E). Echter Burgel (D). Porcellana (I). جنس نباتات برية من فصيلة اليتوبيات ، انواعه عديدة منها الاشباب والجنات والشجيرات . جميعها معمرة ، اصلها المناطق الحارة والمتدلة في سائر اقطار العالم . سوقها متدنة او معرجة ، فروصها دقيقة ملتوية . اوراقها صغيرة القد معتقة متعقبة متقاربة . ازهارها ابطية فردية . ثمارها جراء تغلف نحو ٦ بزور آسية المادة || اشهر انواعها الطيبة ما يلي .

٢٤٥١٨ - لبانة المتوسط

Andrachnes telephoides (S). Andrachné téléphoïde (F).

نوع من اللبانة الطيبة ، مهدا تمام شرقي المتوسط من فلسطين الى اذير . ساقها نحيلة ، فروصها دقيقة وملتوية . اوراقها صغيرة ، بيضبة النصل ، تقريبا ينقي الدم ويدبر البول .

٢٤٥١٩ - لبانة الحنظل

Andrachné cadishaw (F).

نوع من اللبانة الطيبة ، مهدا الهند . اوراقها سطوة ناجبة قعدل الجروح وتشفى القروح الخفيفة .

٢٤٥٢٠ - لبانة مغربية

Euphorbe résinifère

هي المتجدد ، اطية .

٢٤٥٢١ - لبانة ، امني

Icica iccariba, Protium iccariba (S). Iciquier (F).

Elemi gum tree (E). Elemibaum (D). Elemi (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة البخوريات . انواعها عديدة ، اصلها المناطق الاستوائية والحارة بعضها يعيش في رمال الشواطئ البحرية والبرية . اوراقها مركبة متعقبة . ازهارها صغيرة القد يضاء اللون . ازهارها خشكوكة او عشقودي التجميع ، محوري الارتكاز || يستخرج من



لبان حبشي



لبانة المتوسطة



لبانة



كت



جنت



ليتوثريوم يوم التفاح

الخارجي رقيقة حنطية تركب البار فتصلب البشرة المنحارة وتثبت البار دون أن تنطبعها || يكالغ باستعمال سائل بوردو الخفيف أو السائل السلفوكليسي.

٢٤٥٣٦ - ليثورة مُنَطَّحة *

Leptura maculata (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ إلى ١٧ م . جسمها شبيه أسطواني الشكل اسمر اللون أطول المراج ، اسود الرأس ، ميمر الحلب الناعم الأبر الون .



ليثورة ذهبية
التجديع



ليثورة مدالية
ليثورة فضيتة

٢٤٥٣٧ - ليثورة مُنَطَّحة *

Leptura cerambyciformis (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٧ إلى ١١ م . رأسها وكسلها الى السواد اللامع . تمش على الصخرة المذرة تعلوها فقط سود طرية || تعيش في الاغلاوالخلائق الجبلية ، يكثر ويوجد من حزران الى آب .

٢٤٥٣٨ - ليثورة مُؤَلَّدة *

Leptura aurulenta (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ إلى ١٨ م . رأسها وكسلها الى السواد العايق ، تمداها الى الصفة المتباينة تترسها ثلاثة خطوط سمر يملوا حل مذهب اللون . تعيش على مختلف الاشجار الحرجية اغصانها السنتيان ، يكثر ويوجد من حزران الى آب . رقاتها مؤفة تسردب الشكير .



ليثورة مضبة

٢٤٥٣٩ - ليثوسيريات *

Leptoceridae (S).

فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البدن منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة والمنخفضة نحو اليابسة || اجسامها متوسطة القد ، فراء ، اجنحتها خراء اللون مهدبة الاطراف الخلفية ، تملوا بعض الزخارف ، ترتيبها واضح القريب ، قليل الاعصاب المتفرقة || ملجأ الحياتي جامي . اقواسها كثيرة العدد . تعلق فوق مجاري الماء خاصة بعد الظهور || اساريمها تعيش في المياه الجارية ملصقة بجلايب مخروطية منخقة كمنه الحسام || أشهر اجناسها :



ليثورة ملطحة

Leptocerus (S).

البوسيس

Trisnoides (S).

الترينيد

Mystacides (S).

المستسيد

٢٤٥٤٠ - ليثون *

الباف نطشة تحلة تظهر في الجبلية حتما تكين في اول طور المبرزة .



ليثورة منطحة
ليثورة مؤدة

Lepton (S).

٢٤٥٤١ - ليثونة *

Lepton (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات سفنجية الحاشيم وفضيلة اليرسويات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها صغير القد طول من ١ الى ٢ م . اصداؤها شبه بيضية الشوزن ، وريقة الصفة ، قليلة الاحديداب . يملوا ريس في الشكل || تعيش لاصقة بالصخور . ليفها غزير المادة .



ليثونة

٢٤٥٣٠ - ليثورة *

Lapeura (S). *Lapeura* (F).

جنس حشرات من فصيلة القرنييات . انواعها عديدة ، جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الجراميز والزابان ، زاجية الاالوان السوية أو المزركشة . تركب ازهارا مختلف النباتات اغصانها المشبية || رقاتها نمة تعيش تحت لحاء الخلود والاغصان الصلغة وقد تسردب الشكير || أشهر انواعها ما يتبع .

٢٤٥٣١ - ليثورة ذهبيّة *

Lapeura fulva (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٠ إلى ١٤ م . رأسها ويوشها وجفيتها سود . تمداها الى الصفرة الذهبية . تعيش على ازهار المركبات وانجنيات . تكثر في المروج المرعي من حزران الى ايلول .

٢٤٥٣٢ - ليثورة سُداسية التجديع *

Lapeura sanguinata (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ٩ إلى ١٠ م . ثوبها اسود اللون . تمداها سداسية التجديع الاصفر . تعيش على ازهار الخبيات . يكثر ويوجد من حزران .

٢٤٥٣٣ - ليثورة سيدانيّة *

Lapeura cordigera (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٤ إلى ١٦ م . رأسها ويقدم جوشها وحجبتها سود . تمداها الى الحجرة الكرزية يملوا حنة ملتقاة بمسد الزام الاول من القاعدة بقعة سوداء مستطيلة سدانية الشكل تمتد حتى طرف الفمدين || تعيش على ازهار الشوك والاراضي شوكي . يكثر ويوجد من حزران الى ايلول .

٢٤٥٣٤ - ليثورة فسّقيّة *

Lapeura virens (S).

نوع من الليثورة ، طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٠ م . ثوبها الى السرة يملوا حل دقيق كثيف اصفر اللون اخضر المراج . تكثر في اسراج الصنوبر . رقاتها نمة تسردب قشور وشكير الاشخاب اليابسة والمقلطومة .

٢٤٥٣٥ - ليثورة مُضَصَّبة *

Lapeura bifasciata (S). *Lapeura bifasciata* (F).

Lapeura bifasciata (E).

حشرة واحة غاصلة من فصيلة القرنييات ورتبة سمعات الاجنحة . تألف الحشايا والبراري . غناضها تعيش على بتلات الازهار . رقاتها غاصلة ناعمة تركب لحاء الاشجار الفتية وسوق النباتات الحرجية خلفها وتسردبها وتعلها || جسمها صغير القد يعل من ٧ إلى ١٠ م . ثوبها ثنائي اللون ، رأسها وكسلها وزبانها وبرامضا الى السواد العايق اللامع ، يطنها وظهورها الى البني الاسمر المراج يملو في الفمدين تمصيب اسود . رأسها صغير الجرم عينها كيرتان ناشرتان . زباناها دقيقان ، مستطيلان . ظهورها فارغ المشر لا يلحف السكة الشرجية . تمداها متتابع الصنوبر القاطب . اسرارها رباعية النقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملولة في اوائل حزران وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . تزر المكان في لحاء



لبنيد



لبن



لبن الجبل



لبنة الحمص



لبنة الزيتون



لبنة الكرز

٢٤٤٢ - لبنيد * *Lepidus brevipennis* (S).

Lepidus (F).

حشرة نصفية المنعد من فصيلة القرنيات. اصطناعها البلاد المحتلة الحارة من العالم القديم || طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم. ثوبها الى السرة الحطية الشبهاء. زباني ذكورها مستطيلة تلحف كامل الجسم. زباني انثاهما قصيرة تبلغ طرف الاقدام || قوتها جمع المواد الصلبة واعصاها الاغصان الينة التي تنخرها وتسددها وتقضي عليها.

٢٤٤٣ - لبنين * *Leptinus* (S).

Leptine (F). *Leptinus* (E).

جنس حشرات من فصيلة البتينيات ورتبة عديدات الاجنحة انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || اجسامها صلبة ، بيضيه اللون ، تطول من ٢ الى ٣ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. عيونها طامسة. تأثيرها ولكونها وملاصها صغرة. قوتها الاستشارية غيطة ، مستطيلة. كولاسها مستعرضة ، خلية القشار. احماها لاحقة يملوها خل قصير. قوتها نشطة. اولها الى السرة المختلفة المناجات، يكثر فيها الاصفر || تنطفل على مختلف انواع القوام. تعيش على الصفات التي يفرزها الجله.

٢٤٤٤ - لبنينيات * *Lepitidae* (S).

Lepitidae (F). *Leptinidae* (E).

فصيلة حشرات جلدية من عديدات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغرة ، مبطلة ، شبه بيضيه اللون ، تطول من ٢ الى ٤ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة. عيونها طامسة. تأثيرها ولكونها قياسية. قوتها الاستشارية صولطانية. كولاسها واحماها خلية القشار. احماها متباينة الشكل ، بعضها يملف كامل البطن والقيص. الاخر نصفه. اوساها وراعية العقل. اولها عادمة الشقاق || تعيش على فراء القوام الحية. قوتها الصفات التي يفرزها الجله || اشهر اجناسها البتين.

٢٤٤٥ - لبن * *Lapathum aquaticum* (F).

Potentilla aquatica (F). *Water dock*, *Water sorrel* (E). *Wasserampfer* (D).

Romice aquaticum (I).

نبات عشبي بري ممر من فصيلة البطاطيات. يكثر في الناقع وصل بجاري الماء. جذوره درزية ، ساقه فراءه تملن من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراته منقطة اعليانية مستطيلة ؛ نصلها باهت الخضر البحري ، متمتع الصفحة.

٢٤٤٦ - لبنج * *Lebbeck* (F).

جاء وصفه في البيزيا اللينج ، واجمعها.

٢٤٤٧ - لبنج الجبل * *Cocculus lebeba* (S).

Coquecul glabre (F).

نوع من الكوكوس من فصيلة القرنيات. وهو نبات عشبي طلي بري ممر. ساقه فراءه. فروعه ردة متدلية. اوراته منقطة متعاقبة بيضيه صغرة القد. نصلها مالمس البشرة على صفحتيه || وهو يستعمل في عدة مستحضرات طبية منها علاجات الحميات والبرقان والزنقة والكدب ...

٢٤٤٨ - لبنجة ، تصفة * *Cataplasme*, *Charge* (F).

Cataplasme, *Charge* (F). *Poultice* (E).

مستحضر قانع يوضع على مكان الألم من الجسم.

٢٤٤٩ - لبنيد * *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

هو الاصلي من ثوبت البلاد او صطناعها اي حيوئاتها.

٢٤٥٠ - لبنيدان * *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

هو الاصلي من ثوبت البلاد او صطناعها اي حيوئاتها.

٢٤٥١ - لبنيدان * *Aborigène* (F). *Aboriginal* (E).

هو السلق المضلع ، اطلبه.

٢٤٥٢ - لبنيدور * *Lepidurus* (S).

Lépidure (F). *Lepidurus* (E).

دوبية من القشريات عيشويات الاطراف تعيش في المياه قليلةية اينما تكاثرت الاغصان || جسمها صغرة القد ، مبطط الشكل ، يملو حاف مجني يلفظ الظهر. زباناها شديدة القصير. قوتها الصلبة كثيرة العدد.

٢٤٥٣ - لبنيدوي ، وثيري * *Tomenteux* (F).

Tomenteux, *Downy* (E).

نمت تمرني يوصف به كل عضو نباتي خلطه مستطيل وكثيف كالوبر.

٢٤٥٤ - لبنيدور * *Cylindrosporium* (S).

Cylindrosporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات. انواعه قليلة العدد والذى || كئانه غروطية الشكل تشقا منفردة ثم تتجمع. بويداته مستطيلة وقد تكون غيطة منقطة ، مؤثرة الاطراف || اشهر انواعه ما يتبع.

٢٤٥٥ - لبنيدور * *Cylindrosporium plati* (S).

Cylindrosporium plati (S).

فطر مجهرى يصيب الخصب وسوقه واوراته ورسائله. مظهره الخارجي يقع صفر او رمادية اللون، مرقنة الزوايا، تركيب السوق ثم الاوراق والحنايل قصب الجفاف واليباس.

٢٤٥٦ - لبنيدور * *Cylindrosporium platanoideis* (S).

Cylindrosporium platanoideis (S).

فطر مجهرى تركيب اوراق الدلب والقيقب. مظهره الخارجي يتور صغرة كثيفة شقراء اللون ، تركيب النصل بكامله قصب الذبول والاحبال.

٢٤٥٧ - لبنيدور * *Cylindrosporium olivae* (S).

Cylindrosporium olivae (S). *Cylindrosporiose des olives*, *Lebba des olives* (F).

فطر مجهرى يصيب الثمار يلفظي عليها بعد ان يجمعها ويحفظها. مظهره الخارجي يقع فسيحة مستديرة او بيضيه الشكل ، تلبو في ثشرين ، تركيب الاذن ثم تمتد الى الثمار ، تظهر بنفسية اللون ثم تنصرف الى السرة الباهتة قصب يباس اللب بعد تمجيحه وتشقيقه || تقلبات الحرارة الجريفة وارتفاعها بعض الايام يبلط هذا الوسم. يكافح باستعمال الاملاح النحاسية الخفيفة.

٢٤٥٨ - لبنيدور * *Cylindrosporium padi* (S).

Cylindrosporium padi (S).

فطر مجهرى يصيب ويملط اوراق الكرز || مظهره الخارجي يقع صغرة مستديرة او مرقنة الزوايا ، قطرها من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الصبغة الزاوية ، توسطها نقطة بيضاء ، تركيب النصل قصب يباس وانحنات النسيج المتحارة || يكافح باستعمال السوائل السلفركلية بعد تخفيفها نحو ٥٠ ٪ وعملها ٠,٦ ٪ من سلفات الحديد.

٢٤٥٩ - كَبَرَةُ المِيوزُويس

Cylindrosporium myosotidis (S).
فطر مجهرى يركب نصل أوراق المِيوزُويس || مظهره الخارجى يقع نسيجة مستطيلة ، طولها نحو ١٠ م. لونها الى السمر ، اطرافها اصفر الخصب ، اشقر الملوخ . تسبب اللبؤل والاصباح .

٢٤٦٠ - كَبَرَةُ

Lapeyrousia (S).
Lapeyrousie (F).
جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات . انزاعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها ترابي . منها البلاد الافريقية . جميعها صلبة القذ وحبدة الساق الشراعية . اوراقها مروحية التصنيف . ازهارها سبيلية التجميع . احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٤٦١ - كَبَرَةُ اسكيبية الورك

Lapeyrousia juncea (S). *Lapeyrousie à feuilles jonciformes* (F).
نوع من البروزيه . اوراقها اسلية الشكل ، مستطيلة النصل المهدب الخشار . شراعيها الزهري يملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ازهارها سبيلية التجميع . ازهارها متوسطة القذ ، كثيرة العدد ، وردية اللون || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٢٤٦٢ - كَبَرَةُ عذيقية

Lapeyrousia corymbosa (S). *Lapeyrousie en corymbe* (F).
نوع من البروزيه ، شراعيها يملو من ١٥ الى ٣٠ سم . ازهارها مغلي الشكل وهو بذلك يشذ عن سائر انواع الجنس . ازهارها الى الزقة الزاغية تنصطبها نجمة يفسد اللون بنفسجية الخشار . تنورها يستمر نحو ٣ اشهر ابتداء من شهر ايار .

٢٤٦٣ - كَبَرَةُ كَبَرَةِ الزهر

Lapeyrousia grandiflora (S). *Lapeyrousie à grandes fleurs* (F).
نوع من البروزيه ، اوراقها غنية الازتكاز . شراعيها يملو نحو ٣٠ سم . ازهارها سبيلية التجميع . ازهارها ارجوانية ، زاغية ، كبيرة القذ ، قطرها نحو ٥ سم . تنورها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

٢٤٦٤ - كَبَرَةُ مَبْطَظَةِ الساق

Lapeyrousia anceps (S). *Lapeyrousie à tiges aplatis* (F).
نوع من البروزيه ، شراعيها سبط الجسم ، ثنائي الزوايا ، يملو من ١٥ الى ٣٠ سم . ازهارها سبيلية التجميع . ازهارها بنفسجية اللون . تنورها يستمر طوال شهر ايلول .

٢٤٦٥ - كَبَرَةُ الورك

Luperus circumfusus (S). *Lupère des genêts* (F).
Luperus circumfusus (E).
حشرة ضاحلة من فصيلة التصاريات ورتبة مغذات الاجنحة . تألف البير والبراري والاحراج . غناصها ويرقاتها تموت على نباتات القرنيات الفرافشة واعضاها الورك || جسمها صغير القذ يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى الصفرة الصفاه الملوخ يطوقها الى الكليل والفسدين حشار اسود . رأسها مستد الجرم . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . عضلها مخروطي . فكها ذريان .

ظرفها مستدير المؤخر القارص اللامع . عمداها متتابعات التقيط الخفيف . اسافلها رباعية المقل الظاهرة || لها جبل واحد في الخيل . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر نيسان وتموت حتى اواخر حزيران . تشرح في الليل وتضاف بعد ظهورها بنحو ثلاثة اشهر . تجمع المكن رزقا تلتفها مادة خروية على نصال الاوراق وبها اللق والتضيق || البرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ٧ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، قليل التقوس ، سداسي الرؤوب ، سحلي اللون ، اسمر الملوخ ، اسود الرأس . ويملو الجسم ثلاثة خطوط قاطبة حاجية وعلب دقيق اشهب اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اشهر ينتهي في البرقة تحت الجلالة والليل .

٢٤٦٦ - كَبَرَةُ

Labeobarbus (S).
Labeobarbe (F).
جنس اسماك نهريه من مفتوحات النانة وفصيلة الببوبيات . انواعها المروقة ثلاثة ، اثنان يعيشان في انهر الهند واثنان وواحد يعيش في النيل || اجسامها شبه اسطيلية ، قليلة التقيط ، تطول من ١٠ الى ٧٥ سم . رؤوسها مستدلة الجرم . ميتها جاحظة . اشدها كبيرة ، خماسية الملبات الصغيرة . زعانفها الظهرية فردية ، شراعية الشكل . زعانفها الذيلية قاذقة . اوتها الى الخصار البحري . زعانفها الى الخصار الاصفر || لحوها متوسطة الصفه ، مأكولة || اما انواعها الثلاثة فهي :

Labeobarbus nagdia (S). ليريس النيل *
Labeobarbus jungha (S). ليريس اصنام
Labeobarbus macrolepis (S). ليريس كشمير

٢٤٦٧ - كَبَرَةُ

Labrella (S).
جنس نباتات مجهرية من فصيلة الهذيكيات ، انزاهه قليلة لا مؤدية . بكتباته مستفزة ، سواد اللون ، فرجية الانفلاق . يوفاته مستطيلة او وشية او كروية الشكل ، شفافة .

٢٤٦٨ - كَبَرَةُ

Senve (F).
هو الخردل البري او خردل الحقل وينمو الحشاء . وقد يتبر من الاحشاب القصارة نيا لو كثر في الزرع . ابادته ثم باستعمال احد المولايين القاطلة الكثيرة الوجود في هذا البصر .

٢٤٦٩ - كَبَرَةُ

Lampene commune (F).
هي الخفج ، اطليه .

٢٤٧٠ - كَبَرَةُ

Pralnaga (F).
عملية زراعية تتقدم غرس النصب . قوامها تقطيس جلور الاغراس بروبة مألوفة من الماء والحقول وبني القرب وذلك لتغطية الجذور وبروسها بشاه ناعم واق لا يتخلل من التناء يساعد على مقاومة حوامل البيت الجديدة ويحضرها ويحيا على اثنائ الجلدريات الحيطية وما يتبعها من عدة اصنام اللناء ، ايد الحاية والنشوء .

٢٤٧١ - كَبَرَةُ

Lobostemon (S).
Lobostémone (F). *Lobostemon* (E).
جنس جنات برية وتربينية معمرة من فصيلة الحمسيات . سيقها متصبغة فراء تلون من ٧٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها



ليريس الورك



ليريس النيل

٢٤٥٧٩ - بُبْسُ حَنْطِي* (Elops congicus (S).**Elops brun (F).**

نوع من الببس. أصله تحت من مصب النيل إلى الجزائر والمغرب. جسمه متوسط القد النسبي، ويطول نحو ٧٠ سم. قويه إلى الريدة الخطية المواج يمين في الظهر ويبيض في البطن || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

٢٤٥٨٠ - بُبْسِيَات (Elopidae (S).**Elopidae (F).**

فصيلة اسماك بحرية من العظييات مفتوحة الفمانيات. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة. مسرحها الاغواط والتفاف والمحاذ وبعض انواعها تدخل الاعوار والانهار || اجسامها اهليجية الشكل تطول، بالنسبة إلى الانواع من ٣٠ إلى ٢٠٠ سم. رؤوسها مخروطية كبيرة الاشدق تتميز بسنود نصل علمي المادة يتوسط الفك السفلي ويرتكز على جانبيه. ظهورها شبه مسطحة. بطونها محدبة. زعانفها الظهرية مقترنة. زعانفها الذيلية غائقة || اشهر اجناسها وازهرها الببس والسجاس.

٢٤٥٨١ - بُبْتُوس* (Leptosomus (S).**Courol, C. bicolor (F).**

طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة القيقويات. اعطاته قسيمة تحت من تمام البحر الاحمر إلى الحبشة وبغسفر بعض مناطق افريقية الجنوبية || الذكر اصفر قدماً من الانثى، وطوله نحو ٥٠ سم. ثوبه متباين الألوان. ظهره مع جناحيه وذنبه إلى الخضر النعاسي المواج. يمشي إلى الصعبة النبراء. رأسه إلى الصعبة الخطية طولها ثلثون سم. زنده كمرف الديك ثنائي الاكتساب || الانثى تطول نحو ٥٥ سم. ثوبها إلى الريدة الخطية طولها ثمة صناعية التقم سمراء الختار. وثوبها هذا يمين في الرأس والظهر والذنب ويغير في المق والصدر والبطن والافتيك || يألف الغابات والادغال. قويه الثأر والحشرات احصها الجراد والجنادب والزيزان || يذئن عشه في الاجمار المتراكبة الانفصان والاقتان. الانثى تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها بجناوبه الذكر نحو ٢٤ يوماً.

٢٤٥٨٢ - كِلَابِ (Convolvulus (S).**Lisaron (F). Convolvulus (E).**

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة البلبليات. انواعه ١٥٠ اعطائها المناطق الحارة والمعتدلة معظمها بري وبعضها طيب وزينى || احرف انواعه واشهرها مايلي.

٢٤٥٨٣ - كِلَابِ ارُضِي هو الكفة المادة، اطلبا.**٢٤٥٨٤ - كِلَابِ الحُقُول* ، كِلَابِ صَغِير ، طُرَيْشُ الْغُرَابِ**

Convolvulus arvensis (S). Lisaron des champs, Petit
Lisaron, Liset, Vrillet (F). Corn bind, Corn lily,
Lesser bindweed, Bearbine (E). Ackerwinde, Winde
(D). Convolvulus arvensis, Erba leprina, Vitechio (I).
نوع من الكلاب المبلول، يكثر في الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الصارة. ساقه مفصلة مزرقية تطول من ٢٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقه رقيقة مجتمعة || ازهاره وريدية اللون او بيضاء، قطرها يراوح من ٢ إلى ٣ سم. || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

لاطئة، متعاقبة، كاملة. ازهارها مختلفة الألوان منها الازرق والوردي والبنفسجي والاحمر || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٢٤٥٧٢ - كَيْسَمُونْ أُنَيْق ***Lobostemon formosus (S).****Lobostémone élégant (F).**

نوع من الببستين. ساقها تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. افتادها مزقية السهام. اوراقها سنائية الشكل. نصلها خلية الصفحات العليا، مسنة الختار. ازهارها وريدية اللون متدلية. قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٤٥٧٣ - كَيْسَمُونْ بِمَحْرِي الْوَرَقِ ***Lobostemon glaucophyllum (S).****Lobostémone à feuilles glauques (F).**

نوع من الببستين. ساقها قزما تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها بحرية الخضار، خشنة الختار. ازهارها معتدلة الحجم، بنفسجية اللون، فاشرة الاسدية || تنويرها يستمر من ايار إلى تموز.

٢٤٥٧٤ - كَيْسَمُونْ فِيْ ***Lobostemon argenteum (S).****Lobostémone argenté (F).**

نوع من الببستين. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. افتادها زباد السهام. اوراقها كاملة سنائية الشكل، نصلها مزقية على الصبطين، زفيا فني اللون. ازهارها معتدلة القد، قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى الزرق الجميلة || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز.

Radier en béton (F).**Concrete bed (E).**

تسميع لاسف، شائع الاستعمال في البناء الباطوني.

Elops (S).**Elops (F). Elops (E).**

جنس اسماك بحرية من فصيلة الببسيات. انواعها المعروفة خمسة. اعطائها مطر بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها اهليجية الشكل، شفاء الطلع، مسطحة الظهر، محدبة البطن. جامدة الحراشفت المتباينة الاحجام. اثوابها متراكبة الألوان تكثر فيها الريدة الرصاصية التي تدق في الظهر وتغير او تبيض في البطن || احرف انواعه واشهرها، الثلاثة التالية :

٢٤٥٧٧ - بُبْسُ اصَحَمَ**Elops ssurus (S).****Elops saurien (F).**

نوع من الببس. أصله البحر الاحمر والخليج العربي. جسمه كبير القد يطلو نحو ١٢٠ سم. ثوبه إلى الصعبة || لحمه متوسط الصنف، مأكول.

Elops lacerata (S).**Elops lézard (F).**

نوع من الببس. أصله الشواطئ الافريقية المعتدلة من المغرب إلى انكولا. جسمه كبير القد يطلو نحو ١٥٠ سم. ثوبه إلى الريدة الرصاصية || لحمه متوسط الصنف، مأكول.



ببس حنطي



لببوس



كِلَابِ الحُقُولِ

ردلة خلية البشرة القغصية المواج. أزهاره ثلاثية التجميع، زرق اختار، حر القاطعة، سفر الاسدية || أزهاره يستمر من تموز الى تشرين.

٢٤٥٩٣ - تِلَاب ياباني، تِلَاب اُرْغَب

Convolvulus japonicus, Calystegia pubescens (S). *Liseron pubescent* (F).

نوع من التلابل الممر. ساقه: باز عارضة تطول من مترين الى اربعة امتار. اوراقه خلية النصل، صغيرة القد، قصيرة الاعتناق. أزهاره كبيرة الحجم، مستطيلة المالحق، بيضيه التناهب، حراء اللون || أزهاره يستمر من ايار الى ايلول.



تلابل السجالات

٢٤٥٩٤ - تِلَابي

Hédéracé (F). *Hederaceae* (E). نمت تفرعي، وصي يطلق على السوك المنطقة التي تشبه التلابل.

٢٤٥٩٥ - تِلَابِيَّات، حُمُودِيَّات، سَكَمُولِيَّات

Convolvulaceae (S). *Convolvulaceae* (F). *Convolvulaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القنابة. اجناسها وانواعها عديدة. جمع نباتاتها غذاءة او مستطيلة. سيقانها غزيرة العصارة اللينة. اوراقها متناوبة مغرقة. أزهارها كبيرة القد لا قياسية التجميع والازدناز. ثمارها حقية تنفلق عن مصرايين او اربعة مصاربع. مصاريها لا قياسية الاخضبة التي يراوح صعداها من ١ الى ٤ وكل غياه يحسن حية او حيتان قشارها جلد الماد || اشهر نباتاتها السقونيا والبطاطا الحلوة والجلب والتريد.

٢٤٥٩٦ - تِلَابِيَّة

Cissolde (F). اسم يطلق على منمن خاص من المعادلة الثلاثية.

٢٤٥٩٧ - لَبْن، لَبْن، لَبْن

Torchis (F). *Cob, Loam* (E). المضروب من اللبن لبناء مرمبا كان او مستطيل. واحدته لبنة او لبنة.

٢٤٥٩٨ - لَبْن

Lait (F). هو الحليب، اطبله. واللبن بالعرف اللبناني هو الحليب الرائب.

٢٤٥٩٩ - لَبْن رُوب، لَبْن رُوب

Lait caillé, Yoghurt, Yahourt (F). *Curdled milk, Yaourt* (E).

هو الحليب غثر بالروبة فراب واستبانة سوامشه.

٢٤٦٠٠ - لَبْنَات، لَبْنَات

Lactate هي ملح الحامض اللبن.

٢٤٦٠١ - لَبْنَات، لَبْنَات

Lactane خيرة تحول اللبنوز الى غلوكوز وفلكتوز.

٢٤٦٠٢ - لَبْنَة

هي اللبن الرائب المقطوع الذي نضج مصله.

٢٤٦٠٣ - لَبْنُوز، لَبْنُوز

Lactose هو سكر اللبن. يشبه السكر البادي لكنه اقل حلولة، يذوب في اللبن والماء ولا يذوب في الكحول.

٢٤٦٠٤ - لَبْنِي، لَبْنِي

هي الاصطرك، اطبله.



تلابل نفسي

٢٤٥٨٥ - تِلَاب السجالات *

Convolvulus sepium, Calystegia sepium (S). *Liseron des haies, Grand liseron* (F). *Hooded bindweed* (E).

نوع من التلابل الممر الساقه تطول نحو ٥ امتار. اوراقه كبيرة القد مثلثة الزوايا مستطيلة الاعتناق. أزهاره كبيرة الحجم، بيضاء اللون، وردية المالحق || أزهاره يستمر من حزيران الى تشرين.

٢٤٥٨٦ - تِلَاب المجرس

هو الفيرونيكا اخضرية، اطبله.

٢٤٥٨٧ - تِلَاب زَيْتُونِي، لَوْرَق

Convolvulus oleaeifolius (S). *Liseron à feuilles d'olivier* (F).

نوع من التلابل الممر. ساقه غشوشة منتصبه تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه زيتونية الشكل، أزهاره نورية التجميع، صغيرة الحجم، وردية اللون || أزهاره يستمر طوال الصيف.

٢٤٥٨٨ - تِلَاب فُصِي، تِلَاب خَبِيْزِي، لَوْرَق، حَشِيْشَة مَهْبِيْلَة

Convolvulus althaeoides (S). *Liseron à feuilles de guimauve, Volubilis* (F). *Mallow bindweed* (E). *Kleine Kornwinde* (D). *Convolvolo argentino* (I).

نوع من التلابل البري الابلول. ساقه فرعاء زياد تطول نحو ١٠٠ سم. اوراقه خبزنية الشكل مفصصة، نصلها خلي البشرة على صفحتي. أزهاره كبيرة القد، ليلكية اللون، بيضيه الفصل. جفوره ذرية طيبة عديدة المنافع || أزهاره يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٤٥٨٩ - تِلَاب مُتَلَتِّ الأَثَوَان

هو شب النهار، اطبله.

٢٤٥٩٠ - تِلَاب مِصْرِي، لُوْبِيَاء تِلَابِيَّة

Dolichos lablab, Lablab vulgaris (S). *Dolique d'Egypte, Dolique lablab* (F). *Egyptian kidney bean, Hyacinth bean, Lablab* (E). *Agyptische Fasel, Gernale Lablab* (D). *Dolico Egiziano, Fagiolo d'Egitto* (I).

نبات زراعي حولي من فصيلة القرنيات. ساقه صفرة عارضة. اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات البيضية القرنية. أزهاره عطرية الرائحة، عشوية التجميع، بتفسجية اللون ونسها الابجولية والموتحة بالابيض. ثماره قرن مفلغلة، سقية، مقوية. بزورها يفسية مبطة بتفسجية اللون او جلوية نا أزهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٥٩١ - تِلَاب مُقْطَض

Convolvulus cneorum (S). *Liseron-camélée, Liseron argencé* (F). *Silvered bindweed* (E).

نوع من التلابل الممر. ساقه غشوشة منتصبه تملو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه ابيدة نصلها سناني الشكل، ملحق الطرف، خلي البشرة على صفحتي، بحري اللون، فصي المالحق. أزهاره متشكلة التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون، وردية التوشيح || أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

٢٤٥٩٢ - تِلَاب مُورِيَّانِيَّة

Convolvulus mauritanicus (S). *Liseron de Mauritanie* (F).

نوع من التلابل الممر وهو جنية ليفية غشوشة. ساقها قصيرة، فروصها دقيقة غذاءة، تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها بيضية الشكل قصيرة الاعتناق. نصلها

بمد صمغ بهشمة اباهم من برقات ذرية تنسج فوراً نحو الصفحات العليا من الاوراق وتقيم في اغاديده العروق حيث يتطور لها امتصاص الغذاء . ثم تتحول تدريجياً الى لبوة تسرح على النصال والافان والافان والسوق .

٢٤٦١٤ - لَبُوْدَةُ فُلُوْرِيْدَةِ

Ceroplastes floridensis (S). *Céroplaste de Floride* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها الاصل فلوريدة . وقد انتشرت في جميع الاصقاع الحارة . موطنها عديدة اعصاب الفار والكاكي . طولها يراوح من ٣ الى ٤ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . ظهرها مخدوب الشكل مقعر النتوء . ثوبها ابيض اللباص الاخير ، جيلها الحولي واحد . نقت مكنها فيم في اواخر حزيران . تركيب الاوراق على صفحتها العليا وقد تركيب الاصقان والسوق . تكاثرها بالزيت الشتوي .

٢٤٦١٥ - لَبُوْدَةُ لَيْبِيْنَةِ *Latlière* (F). *Milch* (E). صفة الاثني الحلوب .

٢٤٦١٦ - لَبُوْدَاتُ *Mammifères* (F). *Mammiferous*, *Mammalia* (E). هي الحيوانات البويرة المعروفة بالثدييات . واسمها لبون .

٢٤٦١٧ - لَبِيْزَاوُ *Lapiaz* هو الريبي ديار طبيعي لا يقياس العمق والاتساع بخندق سطح التندوز الجصي .

٢٤٦١٨ - لَبِيْكَهٗ *Lebia* (S). *Lébie* (F). *Lebia* (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة الليبيات ورتبة عمديات الاجتمعة . انواعها المعروفة كثيرة البعد منتشرة في معظم اقطار وقائم العالم . اجسامها صغيرة ، مبطلة ، تطول من ٥ الى ٨ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية . تأشيرها وتذكورها وملابسها نظافية . كاسلها صغيرة ، منحصرة . بطونها مفلطحة ، مستعرة . اعماؤها تساعية الاغاديده النحيلة القاطبة . قوائمها نحيلة . ألوانها متباينة الالوان الزاهرة ، تكثر فيها الزهرقة . الحشرة الجلجلة قانصة والبرقة ايضاً .

٢٤٦١٩ - لَبِيْجَا *Lippia* (F). هي اللوزة ، نبات من فصيلة وهي الحام ، اطلبها .

٢٤٦٢٠ - لَبِيْجَةُ الْمَيْسِ *Libythea celeis* (S). *Libythée du micocoutier* (F). *Libythea celeis* (E). حشرة من فصيلة الدشانيات ورتبة حرشيات الاجتمعة . موطنها معظم الاقاليم الحارة المنخفضة نحو المعتدلة . فرائسها جارية قوتها رقيق الاضمار . سرقتها تعيش على اوراق الانجيرييات ونبتا الميس . جسمها مدوني الشكل يطول نحو ١٧ م . بسطتها نحو ٤٦ م . رأسها صغير الجرم . عيناها كيرتان . زبابان صولجانيان . جونها وبطنها الى الجوزي الاشتم المواجه . في دراستها عنه الشقين اوراق الجوزي الخنطي المواجه يطوي في الزوج الاسامي تجذيع الكلف وبقتان عاجيتان وخس نقط بيض وسط حشاري ابيض . ويعطو في الزوج الخلفي جده قاطبة عاجية وسط حشطي بين الجدة والطرف . لها جيلان في الحيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في النهار . تعامل بد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويضع المكن ميسارياً على الصفحات

٢٤٦٢٠ - لَبِيْجَةُ *Lactée* (F). *Lacteous* (E). ما كان يشبه الحليب او كان تركيبه كالحليب .

٢٤٦٢١ - لَبِيْجَةُ اطبل لكاريوس .

٢٤٦٢٢ - لَبِيْوِي *Fécule* (F). *Faecula* (E). هو نشا البطاطا خاصة والنشا المستخرج من سائر المسائل النشوية المادة .

٢٤٦٢٣ - لَبِيْوِي *Libitina* (S). *Libitine* (F). *Libitina* (E).

جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطيريات ورتبة الرغويات صفحيات الخياشيم والاريل . انواعها المعروفة عديدة اصطناعها بحار البلاد الحارة من العالم القديم . يكثر وجودها في البحر الاحمر والمحيط الهندي . اصنافها شبه كلوية الشكل ، معتدلة الجسم ، متساوية الصاربع . مناجها صغيرة ، طليقة ، ثنائية . تعيش لاصقة بالصخور المشورة القليلة السم . لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٤٦٢٤ - لَبُوْدَةُ لَيْبُوْنَةِ *Lionne* (F). *She lion* (E). ويقال لها العرس ايضاً .

٢٤٦٢٥ - لَبُوْدَةُ الْبِيْنِ * *Ceroplastes rusci*, *C. nerii* (S). *Céroplaste du figier* (F). حشرة من القرمزيات ، موطنها حوض البحر المتوسط . تركيب الثوب والاس . جسمها كروي الشكل ، اسير اللون ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ م . فزرها الشمسي جامد التند التماسي الشكل ، ثنائي الصخائف الطويلة . تنجها اريد اللون يتجسمي المراج . ذكورها بمنجحة تطول نحو ٢ م . ثوبها الى الجوزة . رؤسها عاجية اللون مهدية الخمار .

٢٤٦٢٦ - لَبُوْدَةُ الْحُمْصِيَّاتِ *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hespérides*, *Cochenille plate de l'orange* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي يبيضة الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يظلم في البني والاسمر . تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق بين الاوراق الاخاديده العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل . تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٢٧ - لَبُوْدَةُ الزَيْتُونِ *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hespérides*, *Cochenille plate de l'orange* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي يبيضة الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يظلم في البني والاسمر . تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق بين الاوراق الاخاديده العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل . تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٢٨ - لَبُوْدَةُ صَيْبِيْهٗ * *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hespérides*, *Cochenille plate de l'orange* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي يبيضة الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يظلم في البني والاسمر . تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق بين الاوراق الاخاديده العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل . تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٢٩ - لَبُوْدَةُ صَيْبِيْهٗ * *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hespérides*, *Cochenille plate de l'orange* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي يبيضة الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يظلم في البني والاسمر . تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق بين الاوراق الاخاديده العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل . تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٣٠ - لَبُوْدَةُ صَيْبِيْهٗ * *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hespérides*, *Cochenille plate de l'orange* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي يبيضة الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يظلم في البني والاسمر . تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق بين الاوراق الاخاديده العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل . تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٣١ - لَبُوْدَةُ صَيْبِيْهٗ * *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hespérides*, *Cochenille plate de l'orange* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي يبيضة الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يظلم في البني والاسمر . تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق بين الاوراق الاخاديده العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل . تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .

٢٤٦٣٢ - لَبُوْدَةُ صَيْبِيْهٗ * *Coccus hesperidum*, *Lecanium hesperidum*, *Lecanium tessellatum* (S). *Pou des hespérides*, *Cochenille plate de l'orange* (F). حشرة صغيرة من القرمزيات ، موطنها جميع مناطق الحمصيات . طولها يراوح من ٤ الى ٥ م . وعرضها من ٢ الى ٣ . وهي يبيضة الشكل مفلطحة . طليها الخماري عادم الصلابة . قرونها الاستشعارية ثمانية القواصل . ثوبها يختلف باختلاف عمرها يظلم في البني والاسمر . تركيب جميع الحمصيات وقد تنفصل الاوراق بين الاوراق الاخاديده العروق لا فارق بين الصفحة العليا والسفل . تكاثرها باستمال الزيتون البيضاء او الزيتون النباتية المركزة من ١ الى ٢ ٪ .



لبوة اللبن



لبوة الحمصيات



لبوة صينية



لية



لبس النيل

الميل من نصال النبات المائل || السرة طول نحو ٢٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، خفي القشار، كسني الرب، مشاري الاطراف الحمر. رأسها الى الجفوة. رواجيها الى السرة السوداء || طول الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة.

٢٤٦٢١ - **لَبْسِيَّة** هو الكنهان، اطبله.

٢٤٦٢٢ - **لَبْسِيَّة** Clerge de Notre-Dame (F). نبات يندي بصير لبد، اطبله.

٢٤٦٢٣ - **لَبْسِيَّة** متوفاة Molène noire (F). هي البوصير الاسود، اطبله.

٢٤٦٢٤ - **لَبْسِيَّة** Labeo (S), Labéon (F), Labeo (E). جلس اسماك نهريه من فصيلة الشبليات. انواعه نحو ٢٠ اعطانها اهر وبجيرات البلاد الحارة من السام القديم. اجسامها طولها ٢٠ الى ٦٠ سم. اثنواها سوية الألوان يكثر فيها الاسمر والجفوي البني. جميعها كبيرة الزعانف. اهورها ليس النيل.

٢٤٦٢٥ - **لَبْسِيَّة** النيل Labeo niloticus (S), Labéon du Nil (F).

نوع من اللبس وهو سمكة نهريه تكثر في النيل. جسمها كبير القدر يطول نحو ٦٠ سم. ثوبا الى الخضار الاسمر. زعانفها كبيرة حراء اللون. لحمها مأكول متوسط الصنف.

٢٤٦٢٦ - **لَبْسِيَّة** Anagallis (S), Mouron (F). ويضي وأخالسي. جنس نباتات برية وتربسية، من فصيلة الربيبات. انواعه قليلة منها المشية وأخشوية واخوية ولمصرة. اوراقها متعاقبة او ضمية. ازهارها جويسية الشكل || اعرف انواعه ما ينتج.

٢٤٦٢٧ - **لَبْسِيَّة** الماء Samola (F). هو السوسل، اطبله.

٢٤٦٢٨ - **لَبْسِيَّة** المروج *، زهابيكة، حشيشة الخملكة، عشبة العلق

Anagallis arvensis (S), Mouron des champs, M. rouge, Morgeline (F), Red pimpernel, Poorman's weather-glass (E), Roter Gauchkal, Rote Müse-darm (D), Anagallide, Anagalli (I).

نوع من اللبس الحروي البري المبلول. ساقه جالسة مضلعة طول نحو ١٥ سم. اوراقه لائنة متعاقبة، نصلها يضي الشكل صغير القد. ازهاره حراء اللون زرقاء المواج. وهو يجت من الاشباق الضارة للوابج تلهفان في الزروع ام في الحقائق والنبات || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

٢٤٦٢٩ - **لَبْسِيَّة** الهضاب * Anagallis collina (S), Mouron des collines (F).

نوع من اللبس التربي المنصر. ساقه خشبية متضبة طول من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقه السفلى متعاقبة، اعليجية اتصل. اوراقه العليا ضمية ثلاثية التجميع، سنانية النصل الصغير. ازهاره كبيرة القد ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٦٣٠ - **لَبْسِيَّة** ضمي الورق

Anagallis verticillata (S), Mouron verticillé (F).

نوع من اللبس التربي المنصر. ساقه خشبية متضبة

٢٤٦٣١ - **لَبْسِيَّة** حريف Anagallis tenella (S), Mouron mignon (F).

نوع من اللبس البري المنصر، يكثر في المناطق ساقه متضبة طول نحو ١٥ سم. اوراقه متعاقبة متعاقبة، نصلها مستدير الشكل صغير القد. ازهاره ودية اللون، مستطيلة المالحق النسيلة || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٢٤٦٣٢ - **لَبْسِيَّة** مستعرض الورق *

Anagallis latifolia (S), Mouron à larges feuilles (F). نوع من اللبس للممر زرع كحولي. ساقه متضبة طول نحو ٣٠ سم. اوراقه متعاقبة متعاقبة. نصلها يطول نحو ١٥ سم. ازهاره الى الزرقاء الازوردية || ازهاره يستمر من جوز الى آب.

٢٤٦٣٣ - **لَبْسِيَّة** هي القريغ، اطبله.

٢٤٦٣٤ - **لَبْسِيَّة** Lepiota (S), Lépiote (F), Lepiota (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات. انواعه المعروفة نحو ١٢. اعطانها بعض اقالم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. تعيش على المواد النباتية المنسلية في الغابات وفي المواق الرطبة. تتميز ببزورها الابيض اللون وباطراسها الحادة الاطراف الطليقة، وطويك يكتنف اعالي الساق، تحت الاسوية. يكثر ريسوما في فصل الحريف || بعض انواعها لتزيد الطعم مأكول واكثر الآخر كامن الصنف غير مريض فيه وسها نوع جمالي المادة يظفي وقد يحيت.

٢٤٦٣٥ - **لَبْسِيَّة** ركيث *

Lepiota rhacodes (S), Lepiota déguenillée (F). نوع من البسوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه متدلة الارتفاع، مستطيلة القاعدة. ارسوت مظلة الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى البني الاحمر يطول موج اصفر عند النضج.

٢٤٦٣٦ - **لَبْسِيَّة** رفيع * Lepiota procera (S), Lépiote élevée (F).

نوع من البسوت المأكول. يكثر وجوده في حراج الصنوبريات. ساقه رفيعة، مستطيلة القاعدة، ارسوت مظلة الشكل، كبيرة القد، قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم. لونها الى البني الباهت الادمم الاحرار.

٢٤٦٣٧ - **لَبْسِيَّة** زلي البرق *

Lepiota metulaespora (S), Lépiote à spore en outre (F).

نوع من البسوت الكامن الصنف. يوجد في المواق الرطبة. ساقه رفيعة، متدلة الضخالة، حطلة اللون. ارسوت مظلة الشكل، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى الغلرة، وشامها اصفر البانج. يوهها ذي الشكل.

٢٤٦٣٨ - **لَبْسِيَّة** عادم النع *

Lepiota naucina (S), Lépiote sans valeur (F).

نوع من البسوت الكامن الصنف. يكثر وجوده في المراعي.



لبس الهضاب

لبس المروج



لبس مستعرض الورق



لبس رفيع

لبس ديث



لبس زلي لموج

Latania (S). ٢٤٦٤٥ - **لقانية * ، لانتيا**
Latania (F). Fan-palm (E). **Latanie, Fächer**
palm (D). **Latania (J).**

جنس اشجار زراعية من الثعلبات القاليات. أنواعه ٦
 منها المأكولة البآر والصناعية والزينة. جلوسها منتصبه
 سلبية. أوراقها حالية مروحية. أزهارها ثنائي الجنس.
 طلعها مهبل الشكل. جنباها متبصرة. أزهارها الكبيرة
 منفردة. كرووس وتوجيات أزهارها الانثوية ثلاثية الفصل،
 متناكها مهيمة، اسديتها عجيلية تمد من ١٥ الى ٣٢.
 جميعها من نباتات المناطق الحارة ترطب في الأتربة الخفيفة
 المسقية النور التي لا تتنقصها الرطوبة || احرف اولهاها
 ما يلي .

٢٤٦٤٦ - **لقانية أمريكية**
Latania americana (S). **Latania d'Amérique (F).**
 نوع من اللتانية، منبتها أفريقية الوسطى. زرع لاترين
 ويستخرج من أوراقها الياف لسيجية صناعية لا بأس بها
 شائعة الاستعمال المحلي .

٢٤٦٤٧ - **لقانية بوربونيه**
Latania borbonica (S). **Latania de Bourbon (F).**
 نوع من اللتانية الزيبينية. زرع في المراكن والحدائق
 التي لا تخشى البرد. أوراقها مروحية جميلة انفسار الزاهي،
 طويل وتعرض من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. جريدها متباعد
 الحسف الاخضر اللون || ترطب في الأتربة اللدالية
 الحوارة الممكن دجا .

٢٤٦٤٨ - **لقانية حمراء**
Latania rubra (S). **Latania rouge (F).**
 نوع من اللتانية الزراعية الصناعية، منبتها البلادواستوائية
 اولهاها كبيرة اللق تطلو وتعرض نحو ٢٠٠ سم. جريدها
 حطلي اللون بجوي الموج. غوصها احمر الضلع، اغضر
 الصلصة || يستخرج من أوراقها الياف صناعية شائعة
 الاستعمال .

٢٤٦٤٩ - **لقانية صينية**
Latania sinensis (S). **Latania de Chine (F).**
 نوع من اللتانية الزراعية، منبتها الصين تتميز بكثر
 كباسها وكثرة حديد الذي يراوح من ٦ الى ١٠، أما
 متوسط وزن الكيلة فنحو ٥٠ كيلو. ثمارها مأكولة يحي
 يضيها الفلح صفراء اللون قدرها قدر اليسر الصينى .
 اولهاها متوسطة اللق تستعمل في صناعة الحبال وفي بعض
 الانسجة الوطنية .

٢٤٦٥٠ - **ليثروس ***
Lethrus (S). **Léthre (F).** **Lethrus (E).**
 جنس حشرات من عديدات الانسجة صليحيات القرون
 وصليحة الجمليات. انواعها المرفوعة نحو ٢٠ اعطتها تمتد
 من الشرق الاوسط الى اربوة الشرقية والجنوبية. جميعها
 خاضعة راسمة تسرح في الليل || اجسامها شبه يضيحية
 اللون، تطلو من ١٨ الى ٢٢ سم. أثوابها الى السواد
 الاصفر او الحوارة السوداء. رؤوسها كبيرة. تكثرها
 ضليحة. عيونها صغيرة بارزة. قرونها الاستعمارية
 صليحيات الاطراف. كاسلها عريضة مقعرة الحماس
 الراسي جالسة الحماس الضفدي، اعماها مستديرة الاطراف
 اللافحة. قوائمها شديدة النشط، متكافئة الحلب .

ساقه متدلة الارتفاع لونها الى الحلطة. ارسوت قلسوية
 الشكل، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الحلطة السوداء.

٢٤٦٣٩ - **ليبوت مجعد ***
Lepiota cristata (S). **Lépiote crêpe (F).**
 نوع من الليبوت الجمالي المؤذي. يوجد في الاناثات كربه
 الرائحة عند اليسر. ساقه متدلة الارتفاع، سمراء اللون،
 طوقها ابيض اللون، اسمر الحلقه. ارسوتها بحمة الصلصة،
 مقعرة الوسط، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى السرة يطوها
 تنعيم اسمر .

٢٤٦٤٠ - **ليبوت هوبر ***
Lepiota hystrix (S). **Lépiote hérissée (F).**
 نوع من الليبوت المأكول. يكثر في المواقع الظليلة. ساقه
 مستقيمة، قصيرة، عادية الطول. ارسوتها شبه
 غروبية الشكل، مشطلة الصلصة، صغيرة الحجم،
 قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة الكستنية الموج .

٢٤٦٤١ - **ليبوت مستع ***
Lepiota excorista (S). **Lépiote excoriée (F).**
 نوع من الليبوت المأكول. يوجد في بعض المواقع الرطبة.
 ساقه مستقيمة القاعده، مشطلة المتق، غبراء اللون.
 ارسوتها شبه مظلية الشكل، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى
 البيرة يطوها تسنيج اسمر .

٢٤٦٤٢ - **ليبيديات ***
Lebidae (S). **Lebidae (F).** **Lebidae (E).**
 فصيلة حشرات من رتبة عديدات الانسجة. اجناسها
 وانواعها المرفوعة كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم
 اجسامها صغيرة، مبطلة تطلو من ٤ الى ١٢ سم. رؤوسها
 صغيرة. عيونها بارزة. تكثرها ونكوتها قياسية، عادية
 الحلب. قرونها الاستعمارية ضليحة، مركبة من ١١
 فصله، مهدبة ابتداء من الفصل الرابعة. كاسلها صغيرة،
 خضرة، يكثر فيها الشكل الخلفوني. اعماها تساجه
 الاغاديدي، حيلة الااليان الزاهرة، ارساغ القوائم
 الاسانية، عند الذكور، محجرة بصلين من الهامج ||
 جميعها مقعرة، تطير بصفة وتتقلل حل الارض برشاقة.
 تألف المواقع التي يكثر فيها الارق لاته من فراشها المفصلة ||
 اشهر اجناسها اللبينة والسيسنديس .

٢٤٦٤٣ - **لثات** ما فت من قشور الشجر .

٢٤٦٤٤ - **لتاسه ***
Latacia (S). **Latastie (F).** **Latastia (E).**
 جنس حيوانات زساقه ييبوتية من المظلاتيات وفصيلة
 الضبابيات. انواعها المرفوعة اربعة موطنها الجزيرة العربية
 وبعض المناطق الافريقية. تألف القسائي والباري
 والواحات، قوتها الحشرات والدوبيات والديدان ... ||
 اجسامها مستطيلة. اطوالها تراوح من ٢٧ الى ٣٢ سم.
 رؤوسها مستطيلة الشكل. قوائمها خاسية الاصابع .
 اذنانها اغشيتية، دقيقة الاطراف. أثوابها الى السواد
 الخليلية او الصهبة الصفراء || ذكورها اصغر قدأ من
 اناثها وألم ثوبأ منها. الاناثات تتمدن شلقها في الرمل حل
 عتق ٤ الى ٥ سم. يفتت يد خسة اصابع عن دوبيات
 نجيحة دقيقة تسمى الى القوت يد التفق ييبوتين .



ليبوت حاد الفع



ليبوت مجعد



ليبوت مزبل



ليبوت مستع



لتاسه



لتانية



تيس



تيس مداد



لثة

٢٤٦٦٠ - **لثة مَعْبِيَّةُ الرُّوقِ** (F). *Clethra alnifolia* (S).
Clêthre à feuilles d'aune (F).

نوع من اللثة وهي شجرة سريرية تملو من ٢٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها مفتحة الشكل طولها من ٨ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦ سم. نصلها بمجرى كثير المروق المتتابة المتوازية. أزهارها وردية اللون طرية المرف حنقودية التجميع || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢٤٦٦١ - **لثة مَعْبِيَّة**

Clethra canescens, *C. barbinervis* (S). Clêthre barbu (F).

نوع من اللثة وهي شجرة سريرية تملو من مترين إلى ٦ أمتار. أوراقها بيضبة مدببة ملتحية كثيرة المروق المتتابة الشارفة || نصلها غلي الصلصة السفلى، مجرى اللون. عتاقيد أزهارها ملشبية ولة، أزهارها كبيرة اللثة يشاء اللون || أزهارها يستمر من آب إلى ايلول.

٢٤٦٦٢ - **لثاقيات** (F).
Clethraceae (F). Clêthraceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين، كانوا يعتبرونها في التصنيف السابق جنساً من فصيلة الخنجات || أنواعها كثيرة العدد، معظمها بري وبعضها ترشني. جميعها شجيرات ونباتات. أوراقها متعاقبة، بسيطة، مسنة الحافة. أزهارها عتقودية التجميع أو سنبل، طرفي الارزكاز. أزهارها خماسية الفلصل والبلات، عشارية الاسدية، مقلوقة المآبر، خلقة السات || أشهر أنواعها اللثة الزباء والندبة والشجرة والفضية واللوق والملتحية.

٢٤٦٦٣ - **لثاقيات** (F).

Macroglossus (S).
Macroglosse, *Roussette klodote* (F).
جنس حيوان من فصيلة اللواطيات. أنواعه المعروفة خمسة جميعها يترأه صغيرة القد، طولها من ٦ إلى ٧ سم. بسطها من ٢٠ إلى ٢٢ سم. أنوارها إلى الربعة السوداء. فراطيسها ضيقة، ذلقة، مدببة. السنتها قابلة الانعطاف عارقة الطول || موطنها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية. تعيش بجاعات قليلة العدد. تألف مجاري الماء والادوية والكهوف والبيوت الخربة. قوتها الثمار حل اختلاف أنواعها.

٢٤٦٦٤ - **لثاقيات زغباء** (F).
Macroglosse minime, *Roussette klodote minime* (F).
Small Reed-bunting (E).

نوع من اللثا. حيوان لين ثامر من فصيلة اللواطيات || جسمها صغير القد، عادم الذنب، يطول نحو ٦ سم. وتبلغ بسطه نحو ٢٠ سم. قوتها إلى الربعة السوداء السوداء الخويج. رأسها مستعرض الثقف، غرطوي الشكل. فوطيسها ضيقة، ذلقة، أذناها صغيرتان، متصبتان، مدببتا الطرف. عتاقها مستديرتان كيرتان. قمها كبير اللثقف بجوي ٣٤ سنًا. لسنتها عارقة الطول يعمل في طرفه بعض الحاجاج الماصة || تألف جلعوج الاثجار والكهوف والمغاور والبيوت المهجورة. تعيش بجاعات قليلة العدد من الذكور والاناث || مسرهما دجوي يستمر من الدفوش إلى النجر. نباتات الشتوي يستمر نحو ١٢ اسبوعاً. محلي الاثني يدوم نحو ٣٨ يومًا تقص في تمامه جرراً واحداً يكثي ويسع ويهر بعد الوبع باسبوع ويتعلق بصد امه حتى التلظم، اي نحو سبعة أسابيع || قوتها الثمار الينة وأصعها السكرية. تعتبر من اللواطيد المؤذية الفارسة.

٢٤٦٥١ - **لثيس** (F).
سكة من السحليات مشهورة باسم قرلاس، اطلبها.

٢٤٦٥٢ - **لثيسين** (F). *Ononis* (S). *Ononis*, *Bugrane* (F).
جنس نباتات عشبية حولية وبعمرة من فصيلة القرنيات. أنواعه عديدة معظمها بري وبعضها طبي وزراعي || أشهر أنواعها مايلي.

٢٤٦٥٣ - **لثيسين القدماة** (F).
Ononis antique (F).
هو الشبارق، اطلبه.

٢٤٦٥٤ - **لثيسين مداد** (F).
Ononis repens (S).
Ononis des champs, *Bugrane rampante*, *Arrebauf* (F). *Rest-harrow* (E). *Kriechende Hauhechel* (D). *Bulimacola del campi*, *Serppegliante* (I).
نوع من اللثين البري الممر المليل. سكة منسطة مدادة مستطيلة السلاحيات، كثيرة الملقور المقنعة المشرنة التي تحمل النبات كاشبكة المظروسة الناضجة في التربة || يعتبر من النباتات الفارسة التي تؤذي النبات وتميق الاعمال الزراعية.

٢٤٦٥٥ - **لثا** (F).
Suc végétal (F).
Vegetable Juice (E).
ما يسيل من الشجر من عصارة مما كان نوعها.

٢٤٦٥٦ - **لثة** (F). *Clethra* (S). *Clêthre* (F).
جنس نباتات برية ونباتية من فصيلة الخنجات. أنواعه عديدة جميعها شجيرات ونباتات. أوراقها متعاقبة، بسيطة، مسنة الحافة. أزهارها عتقودية أو سنبل التجميع طرفي الارزكاز. أزهارها خماسية الفلصل والبلات، عشارية الاسدية، مقلوقة المآبر، ثلثة السات || اعرف أنواعها وأشهرها مايلي.

٢٤٦٥٧ - **لثة زباء** (F).
Clethra tomentosa (S).
Clêthre tomentoux (F).

نوع من اللثة وهي شجرة سريرية تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. قروصها زباء اللحاء. أوراقها احليجية ضيقة طولها نحو ١٠ سم. وتعرض ٤، نصلها غلي الصلصة السفلى الطحلل. اللون. أزهارها طرية كبيرة اللثة شجيرية التجميع || أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

٢٤٦٥٨ - **لثة مدببة** (F).
Clethra acuminata (S).
Clêthre acuminé (F).

نوع من اللثة وهي شجرة سريرية تملو من مترين إلى ٦ أمتار. أوراقها احليجية مدببة تطول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٦ سم. نصلها مدبب الحافة، أخضر الصلصة العليا، مجرى السفلى الحولية البشرة. أزهارها كبيرة القد، سلبية التجميع، يضاء اللون || أزهارها يستمر من تموز إلى تشرين.

٢٤٦٥٩ - **لثة مشجيرة** (F).
Clethra arborea (S).
Clêthre arboreuscent (F).

نوع من اللثة وهي شجرة تملو من ٤ إلى ٦ أمتار. أوراقها ابدة تطول نحو ١٦ سم. وتعرض نحو ٦ سم. نصلها جامد الصفحة، غلي البشرة السفلى الصفراء اللون. أزهارها عاجية، عتاقيد صغيرة القد لثة || أزهارها يستمر من آب إلى تشرين.

٢٤٦٧٢ - لآءة
Chelonia (S).
Chélone (F). Chelone, Sea-tortoise (E).
جنس سلاسل بحرية من فصيلة اللجنيات . انواعها عديدة، جميعها كبيرة القد تقبل نحو ٢٠٠ سم . وزن نحو ٥٠٠ كيلو . ذيلها قليل الاحدياب ، قعرها قرني المادة قياسي الترتيب . قوائمها زيتنية الشكل ثنائية المقاب . قوائمها الاحشاب البرية . تبيض على الشطوط الرملية ، لحماها ماكول ويبيها أيضاً .

٢٤٦٧٣ - لآءة خضراء *
Chelonia viridis, C. midas (S). Chélone franche, Tortue verte (F). Green tortoise (E).
نوع من اللآءة المأكولة للحوم . تكثر في المحيط الهندي وفي بحر العرب ، طوطا نحو المترين ، ذيلها الى الخصار الزيتوني .

٢٤٦٧٤ - لآءة سهفية *
Chelonia imbricata (S). Chélone imbriquée, Caret (F).
نوع من اللآءة المأكولة للحوم المنتشرة في جميع البحار . ذيلها اسمر اللون ، قعرها سهفي التركيب لؤلؤي الماجة .

٢٤٦٧٥ - لآءة
النسبة التي قل لها وقد يكون ذلك بعد تاجها بارية اشهر . ج . لآءة .

٢٤٦٧٦ - لآءة
Abyss (F). Abyss (E).
المنقح البعيد الفور في البحر ، يبتعد من حدود المنطقة الجبية اي على عمق ٥٠٠ م . من سطح الماء وما دون ذلك حتى القعر .

٢٤٦٧٧ - لآءة ملقوءة *
Ligdia adustata (S). Ligdie aduste (F).
Ligdia adustata (E).

حشرة من الافريات حشرغيات الاجسنة . موطنها يعد من الشرق الاوسط الى اوروبية المعتدلة الحارة . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الخصاص ولقات ... || جسمها صغير قصيف يطول نحو ٩ سم . بسطها نحو ٢٨ سم . رأسها الى الكتفي . عينها لاشتران . زباناها مشطيان عند الذكر ، عيطيان عند الانثى . جوشها الى الكتفي الاسود المواج . بطنها الى الطحلة السمر المواج || وراشها عند الشقين الى الشبهة الروردة المواج تملوها في الزرع الاسامي بقية قاعدية بلون الجوشن ، ويقة بنية ورقشة الى الطحلة . وتملوها في الزوج الخلفي رشة تراوح من الخطني الى الاسمر . اعداها بنية اللون || لها جيلان في الجيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . ترحر من مصر الى فسة اليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع وتضع المكن مصادياً على الصفحات السفلى من نصال النبات المائل || السرفة تطول نحو ٢٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مالمس القشار . ثوبها الى الطحلة الكدرا تملوها رشة زرقاء قائمة . رأسها الى الزرقه السوداء . مدنها الى الخطني الاخير . رواجها البطنية الوسطى ماصحة ما يحيلها تنقص عن الانتقال || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكيها السرفة في كل مكان .

٢٤٦٦٥ - لآءة *
Synanthérie, Syngénésie (F).
Syngenesia (E).
القائمة حالة الاسمية الملتصقة اي الملتصقة المآبر .

٢٤٦٦٦ - لآءة الاقائي *
Astica cracca, Toxocampa cracca (S).
Toxocampe de la vesce craque (F).
Astica cracca (E).

حشرة من النملقيات حشرغيات الاجسنة . موطنها بعض مناطق الشرق الادنى واروية الجنوبية والفرية . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الفريزات القرائية واعصها الاقائي والقساد || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ سم . بسطها نحو ٣٨ سم . رأسها كسني اللون جوي المواج . عينها كبيرتان . زباناها عيطيان . جوشها وبطنها الى الخطني الاكلس المواج || وراشها الاماميان الى الخطني الاكلس تملو جدة كسنية وبشفة حلالية سوداء ثم جدة اخرى خضراء وراشها الخلفيان الى الخطني الاكلس في الزواين الاول والثاني والى الكتفي الاسمر في الزواين الثالث والرابع || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في تموز ويبقى حتى ايلول . ترحر في اليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع المكن مصادياً على نصال اوراق النبات المائل || السرفة تطول نحو ٢٣ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالمس القشار ، اخضر اللون ، اطول المواج تملو خمسة خطوط نارية قاطبة منها خط ثبجي ينتهي عند السكة التاسعة . رأسها الى المرفة القائمة . مدنها ورواجها الى السمره || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلبة تحبكيها السرفة على مالمق الاوراق الذابلة القريبة من التربة .

٢٤٦٦٧ - لآءة
Rosée du matin (S).
Morning dew (E).
هو الندى وبهم من يقول ما سقط آخر الليل ، وأما الذي يسقط اوله فهو الندى . ويقال يوم لآءة اذا كان ساكن الريح كثير الندى .

٢٤٦٦٨ - لآءة
Recueillir un suc (F).
To gather a juice (E).
لآءة والى واتش : استقطر حصاره الاشجار من حلاب وصنع وما اشبه .

٢٤٦٦٩ - لآءة ، صاصع
Gommeux (F).
Gummeux (E).
ما كان صمغى المادة او كانت تملو مادة صمغية .

٢٤٦٧٠ - لآءة ، ملقوءة
Synanthérique (F).
Syngenetic (E).
اللقيد من النبات ما كانت مآبر ازهاره ملتصقة . ومن الازهار ما كانت مآبرها ملتصقة .

٢٤٦٧١ - لآءة يآءة *
Synanthèrese (S).
Synanthérèses (F). Synantherae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدة القائمة سفلية الاسمية الملتصقة المآبر . كائنا ، فيما مضى ، يعتبرونها صارة من فصيلة المركبات .



لآءة الاقائي



لآءة خضراء



لآءة سهفية



لآءة ملقوءة



لَجَفَةُ الحور



لَجَفَةُ السديان



لَجَفَةُ السط



لَجَفَةُ الصنوبر



لَجَفَةُ العليق



لَجَفَةُ اللؤلؤ



لَجَفَةُ النجيل



لَجَفَةُ خضلة

« Feuille morte du chêne » (F). Common lappet moth (E). Kupferglucke (D).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد، ثوبها إلى البني المائل، وراشها منشارية الحافة ثلاثية الخطوط السود. يرقاها تركب المائل والزعزور والنوخ.

٢٤٦٨٧ - لَجَفَةُ النجيل * و « Kuschel » (F). Cosmotriche potatoria (S). Cosmotriche, Buveuse (F).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد صفراء اللون، يرقاها تركب مختلف البتات النجيلية، من خصائصها أنهما ترشفت نقط الندى المتجمعة على زغب الأوراق قبل أن تقرض النصل.

٢٤٦٨٨ - لَجَفَةُ مُخَطَّطَةٌ *

Malsosoma neustria (S). Bombyx à livrée, B. à bagues, B. neustrian (F). Common lackey moth (E). Ringelspinner (D).

حشرة من اللبغيات صغيرة القد حنطية اللون حرراء المخرج تمتع مكها بالتتابع على الإخصان فيبدو كالطوق أو كالحزام. يرقاها تركب أوراق الأشجار الخضراء وأرجحية من إيار إلى حزيران.

٢٤٦٨٩ - لَجَفَتِيَّات * Laslocampidae (S). Laslocampidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرغيات الأجنبية. أجناسها وأولعها زهاء ١٢٠٠، جميعها متوسطة القد، كثيفة الحراشف، ضعيفة الرواشن، عادمة الطعم، شطية الزباني، أناثها أكبر حجماً وإفتح لوناً من ذكورها. يرقاها تحصل على جانبها خصل من الهلب الكفكي. غادراتها لتتحف بشرائق حريرية الخيط مثقوبة التسج.

٢٤٦٩٠ - لَجَم

و الجَم دويبة أصفر من العنابة. وقيل أكبر من شمة الأرض ودون الحرياء.

٢٤٦٩١ - لَجَن، لَجِين Mesh كل خليط من دقيق أو نخالة أو قث أو غيرها مع الورق أو التبن مروت بالماء لتتلفه الماشية.

٢٤٦٩٢ - لَجَنِيَّات، لَجَنِيَّات

Cheloniidae (S). Cheloniidae (F). Cheloniidae (E). فصيلة حيوانات بحرية بيوضة من رتبة السلاسل، أجناسها وأولعها عديدة معظمها كبير الجف. ذبلها عني التركيب قليل الإحدياد. زفها فسروني للمادة، فأولعها مبطلة زعتقية الشكل || أشهر أجناسها اللبأة والحفاء والقبض.

٢٤٦٩٣ - لَجِيَّ Abyssal, Abyssique (F). Abyssal (E).

نمت تعريفي يطلق على الكائنات البحرية المزودة في العجة أي في المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٥٠٠ م، تحت سطح الماء حتى القعر.

٢٤٦٩٤ - لَجِيدِيَّوم * Lagidium, Lagotis (S). Lagidium (F).

جنس حيوانات لوزنة قاضية من فصيلة الششليات. موطنها بوليفيا والبيرو والبيليز. أجسامها متوسطة القد، قدرها قدر الارانب. سبالها كثيفة الهلب الاسود الغليظ. أذاها كبيرة متعسبة. أذاها مستطيلة جثة طولا يبادل طول

٢٤٦٩٥ - لَجَفَةُ الرَّسِيم *

Laslocampa trifolia (S). Bombyx du tréfile, Laslocampe du tréfile (F).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد ثوبها إلى الجوزة الوردية المراج. يرقاها تركب البرسيم وجميع أنواع النفل وبعض القناعات.

٢٤٦٩٦ - لَجَفَةُ الحور *

Gastropacha populifolia (S). Gastropacha du peuplier (F).

حشرة من اللبغيات، متوسطة القد. يسطها نحو ٩٠ م. ثوبها إلى البني الزاهي. وراشها منشارية الحافة، خلسية الخطوط السود. يرقاها تركب الحور وتعيش على أوراتها.

٢٤٦٩٧ - لَجَفَةُ السندِيَّان *

Laslocampa quercus (S). Bombyx des chênes, Laslocampe des chênes (F). Oak moth (E). Eichen-spinner (D).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد كبيرة الرواشن المتناخلة الألوان. ثوبها إلى البني الأصفر المراج. يرقاها نمة تركب جميع أنواع السديان.

٢٤٦٩٨ - لَجَفَةُ السط *

Nadisia obsoleta (S). Bombyx du gommier (F).

حشرة من اللبغيات، متوسطة القد، يسطها نحو ٥٠ م. يرقاها تحصل في بعض طبقات حلقها البنية جيوباً مشبة بالهلب اللطيف الناعم اللزب ثقفه عند الحاجة دفاعاً عن الحياة. يهي تركب السط تعزير من الورق.

٢٤٦٩٩ - لَجَفَةُ السط المُرَّكَسَة *

Taragama acaciae (S). الميمُوزَا

Bombyx du mimosa (F).

حشرة من اللبغيات تتحلل بذات خصائص يرقاها السابقة إلا أنها أكبر قدًا وأغلظ جثة وأقوى ثوباً. وراشها مزركشة بالاسود والأعطل. يرقها تركب السط دون سواء.

٢٤٦٩٣ - لَجَفَةُ الصنوبر *

Dendrolimus pini (S). Dendrolime du pin, Bombyx du pin (F). Pine lappet, Pine moth (E). Kiefernspinner (D).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد يسطها نحو ٥٠ م. ثوبها إلى اللون الغبر المراج. وراشها مزركشة ومخططة. تسرح من عزم إلى آب. تمتع مكها على جلود وأغصان وأهداب الصنوبر فينفت من يرقات دقيقة تتأثر بالهلب الإهداب منه أنسلخها الأول. ومن قائل أن البرقة تآكل في أثناء دورتها الحياتية زهاء ١٠٠٠ هدية. وأنها تلهم أهدبة بظرف خس دقائق.

٢٤٦٩٤ - لَجَفَةُ العزَّعَر * Pachyopa lineaire (F).

فراشة مشهورة باسم بكلمة العزَّعَر، أظلم.

٢٤٦٩٥ - لَجَفَةُ العليق *

Macrothylaca rubi (S). Bombyx de la ronce (F).

حشرة من اللبغيات متوسطة القد بنية الثوب يسطها نحو ٥٠ م. تسرح من إيار إلى حزيران. يرقاها نمة تركب العليق وبعض النباتات البرية والزراعية أخصها الوردية.

٢٤٦٩٦ - لَجَفَةُ اللؤلؤ *

Gastropacha quercifolia (S). Gastropacha

٢٤٧٠١ - **تحلاح** * ، **فُصُون الجِمال**

Cnicus scarus, *Plicnomon scarus* (S). *Chardon acanthin* (F). *Cnicus*, *Thistle*, *Walted thistle* (E). *Schöne Distel*, *Sperdistel*, *Stacheldistel* (D). *Cardo acanthino*, *Scardaceione* (I).

نبات عشبي يري حولي شائك من فصيلة المركبات يكثر في الاراضي البر واصل جوانب الطرقات ويصعب من النباتات الضارة اذا كثر في الزروع .

Apogon (S).

٢٤٧٠٢ - **تلحج**

Apogon (F). **Apogon** (E).

جنس سمك بحرية من فصيلة الفرغيات شالكانت الزعانف . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها اميلجية الشكل تطلو من ١٥ الى ٢٥ سم . اذواها مختلفة الالوان . رؤوسها معتدلة الحجم ، قصيرة الخلف . اشدالها واسعة منفرجة . عيونها معتدلة القد ، مستديرة ، ماصحة . زعانفها الظهرية الثتان . زعانفها الذيلية غارقة || اشهر انواعه الصالح الاخر .

٢٤٧٠٣ - **تلحج آخر** * ، **تلحج مبدول** ، **يوزباشي**

Apogon ruber,

Ap. imbarbis (S). **Apogon rouge**, **Ap. commun**, **Roi des rougets** (F). **Apogon ruber** (E).

نوع من الملح - سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرغيات . اعطائها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط . مسرحها الكثاف الصخرية والاشفاف || جسمها اميلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم . حراشفها كبيرة . ثوبها الى الحمرة يطولها تنقيط اسود . زعانفها حراء الكون . رأسها معتدل الحجم ، رفيع المقدم ، قصير الخلف . شفتها واسع الانفراج اسناتها صغيرة ، متراصة ، ذرية . زعانفها الظهرية الثتان . زعنفتها الذيلية غارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٤٧٠٤ - **لحم** ، **لحم** ، **لحم**

Vlande (F). **Meat** (E). هو التسج المنسل في الحيوان والطيور وهو من الاطعمة الهامة المفيدة لاستهلاكه حل نسبة كبيرة من المواد الغذائية تلخص متوصلها في الجدول التالي :

نوع اللحم	ماء	مواد	مواد	مواد
	ازوتية	دهنية	معدنية	
ايقار عادية	٧٦,٣٧	٢٠,٧١	١,٧٤	١,١٨
ايقار مسمة	٥٣,٠٥	١٦,٧٥	٢٨,٢٨	٠,٩٢
حبول عادية	٧٨,٨٤	١٩,٨٦	٠,٨٢	٠,٥٠
حبول مسمة	٧٢,٣١	١٨,٨٨	٧,٤١	١,٣٣
فيم حادي	٧٥,٦٨	٢٠,٨٢	٢,٣٥	١,١٥
فيم مسمن	٥٣,٣١	١٦,٦٢	٢٨,٦١	٠,٩٢
خنزير مسمة	٤٧,٤١	١٤,٥٤	٣٧,٣٧	٠,٧٢

أما بيان المواد المعدنية المذكورة في الخانة الأخيرة من هذا الجدول فهو التالي :

حامض فسفوري	٠,٥٥ %
كلور	٠,١٠ %
بوتاس	٠,٥٥ %
صودا	٠,١٠ %

الجسم . جوامها الامامية قصيرة والخلفية طويلة جيمها رباعية الاصابع . وبر فراها كثيف التسجيم نام الملس ابيض القاعده اسهب الجسم صتالي الطرف || قوتها الاشباب والجلود والقحالب . اناتها تقص من ٤ الى ٦ ادراس حل ثلاث مرات في السنة || انزلها الثنان :

Lagidium pallipes (S).

Lagidium à pieds pâles (F).

Lagidium peruanum (S).

Lagidium du Pérou (F).

لجديدوم البرو

Ecorce (F). **Bark**, **Strip** (E).

اللحاء برجه عام هو قشر البرد والقصن والساق . واللحاء من البرجة الثانية هو احد التسج الثلاثة التي تتكون منها الخزم الرصائية . وهو يتكون من انسجة غرواية تمر بها المواد الغذائية ومن جيوب خلوية تخزن بعض المواد . واللحاء جسموريا يأتي بين القشرة والشكير وهو يلفف التسج القلبية التي تلتف الشكير .

٢٤٦٩٦ - **لحانة دجونة** *

Nomophila noctuella (S). **Nomophila nocturna**, **Teigne nocturne** (F). **Nomophila noctuella** (E).

حشرة من فصيلة اناريات حرشيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة لحرارة في جميع اقطار العالم . قراشتها رحالة قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاضلة تعيش ضمن غمد حريري التسج على الارواك التي تلتاس التربة من التيجليات والمركبات والقنريات || جسمها يطول من ١١ الى ١٢ سم . يسطها قزايوح من ٣٧ الى ٣٤ سم . رأسها شبه مكور الشكل . صنتها صغيرتان ، ناضرتان . زيانها خيطيان . ملاسها صغيرة . برشفتها معتدل الطول . جوشنها ويطنها الى الكسني || رواشتها الى الصناني تملوها ، في الزوج الامامي ، رفقة زرا كس كسنية تمتد من القاعده الى الختار الحاربي || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة في نيسان وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح وتضجل في الليل || طولها القراشي يستمر نحو سبعة اشهر تماثل في غلوه نحو ست مرات . والاقى تلقى المكمن بعد كل طرة زينا شقية الممد تغلفها مادة غروية تثبتها حل الصفحات السفلى من تصال الارواك التي تلتاس التربة || الطور الاسروي يستمر من ثمانية اسابيع الى عشرين اسبوعا لانه متوسط بموئل البيئة والحرارة والاختفاء . السرعة عند الادراك اتام تطلو نحو ١٤ سم . جسمها اسطواني الشكل ، حطلي الكون ، اسمر المراج . رأسها كسني الكون . مدنها ورواجها الى الخنطى || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن حلجة تسمجها السرعة تحت الاجنالة او بين اريويات ثنيتات .

Pointe (F). **Tip** (E).

لحاف الرقبة : اسفلها الابيض .

Protogénie (F). **Protogyny** (E). **٥** - **لحوب**

الحوب هو ادراكه اعضاء التماثل الانثوية في الزمرة قبل ادراكه الاعضاء الذكرية .

Ecorcer (F).

To strip, **To bark** (E).

Chalcide (F).

٢٤٧٠٠ - **لحكة** ، **لحكة** ، **لحكة** هي الحكة ، دوية تنوص في الليل ، اطلها .



لجديدوم



لحانة دجونة



لحاح



لحاح أحمر

اسمر ، يهلك الى الصفار الاخير . طبائعه صغيرة دقيقة
اربع منها تحلّي الفلك الاحل ولتتأني في الفلك الاسفل .
لحمه للذي الطعم مرغوب فيه .

كلس ٠٠١ %
مغنيزيا ٠٠٤ %
اكسيد الحديد ٠٠٥ %



لُحْ الفُدران

٢٤٧١٩ - نُحْم شَالِك
Cobitis taenia (S).
Loche épineuse, L. de rivière (F). *Groundling* (E).
نوع من اللُحْ، يعيش في المياه النهرية الراكدة . جسمه
يطول من ١٠ الى ١٢ سم . وهو مبسط الشكل متراكب
الارزان اللقطة والمائلة . طبائعه ست تحلّي الفلك الاحل
دون سواه . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٢٤٧٢٠ - نُحْمُوم
Omophage (F). *Omophagous* (E).
أكل اللحم النيء .

٢٤٧٢١ - نُحْمِي
Ganache (F). *Lower jaw* (E).
رما حيوان أي شيئاً فلك القفوس والبلبل والحمار ...

٢٤٧٢٢ - نُحْمِيَّة التَّيْس
Salsifis des prés (F).
هو سلسبيل المَرَج ، اطليه . قال الانطاكي : « هو
الموسطيداس نبت كوروك الكركراك لكن لا يرتفع حفص
حاد الرامحة يقطع الاسهال والنزف وقروح الرثة والكبدرة .

٢٤٧٢٣ - نُحْمِيَّة الحِمَار
هي كزيرة البير ، اطلبها .

٢٤٧٢٤ - نُحْمِيَّة احْمِيَّة
هي ذقن احية ، اطلبها .

٢٤٧٢٥ - نُحْمِيَّة العُتْر
هي الشناب البحري ، اطلبها .

٢٤٧٢٦ - نُحْمِيَّة الهَبَل
هي اللوتيا ، اطلبها .

٢٤٧٢٧ - نُحْمِيَّة
Volva, Volve (F). *Skin* (E).
هي غشاء الفطر ، شفاء شفاف ناعم لا تقياسي لؤلؤ .

٢٤٧٢٨ - نُحْمِيَّةَات الأَلْسِنَة
Crassilingua (F).
رقيقة من المغايات تشمل بعض الفصائل . تتميز بألسنها
الحمية السميكة القصيرة وغير الإغلازة .

٢٤٧٢٩ - نُحْمِيْس
قال الانطاكي : « اللحييس نبت بري وجبلي يرتفع نحو
ذراع له حب اسود مر الطعم في حجب اللحييس يتلف من
السموم خصوصاً المقرب ويحلل الرياح الغليظة ويفتح
السدد ويزيد الفواق واليرقان وشربته متقال » .

٢٤٧٣٠ - نُحْم
Loch (F). *Log* (E).
مقياس سرعة السفن .

٢٤٧٣١ - نُحْم ، كَنْبِيْت
Cobitis (S).
Loche (F). *Loach* (E).
جنس اسماك نهرية من الشبوطيات اللبانات الزواحف . انواحه
المعروفة قليلة . اصطلحوا مياه البلاد الممتدة . اجسامها
ضخمة مستطيلة . تتميز بكثرة طبائنها واسنانها البلعومية ،
بصفير فلوسها وضييق غياضها مما يجعلها تتراد طلع الماء
كثيراً || احرف انواحه واشهرها ما يلي .

٢٤٧٣٢ - نُحْمُ الفُدرَان
Cobitis fossilis, Misgurnus fossilis (S). *Loche d'é-
tang, Misgurne* (F).
نوع من اللُحْ، يعيش في سهل البحيرات والفُدران . جسمه
يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ثوبه الى الكهبة للبراء يعمل
حل جانبيه خطان اسودان قاطبان . طبائعه ١٠ ، ست
منها في الفلك الاحل واربعة في الفلك الاسفل ، لحمه متوسط
الصنف مأكول .

٢٤٧٣٣ - نُحْمُ حُرْ
Cobitis barbatula (S).
Loche franche, Dormille, Moutaille, Motelle (F).
Rock-ling (E).
نوع من اللُحْ، يعيش في الانهر والبسيورات والفُدران . جسمه
يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبه الى الكهبة يعلوها تزييح

٢٤٧٣٤ - نُحْب
Livistona (S).
Livistone, Rondier (F). *Fan-palm* (E). *Echte Schirm-
palm* (D). *Palma di cappelli* (I).
جنس اشجار ليفية صناعية وزيتونية من فصيلة النخلات .
مهددا المناطق الحارة والاستوائية . انواحه عديدة جميعها
رفيمة الجذع الجالس في اقاليمها الطبيعية ، قصيرته في
الاقلام المعتدلة ، اوراقها تستعمل في عدة صناعات احصاها
صناعة التبنات والسائر . الواحدة نلبة || اشهر انواحه
الزيتونية ما يلي .

٢٤٧٣٥ - نُحْب
Intensifier (F).
To intensify (E).
استعمل اسمن الطرق لاكثر الانتاج .

٢٤٧٣٦ - نُحْبَة أندُولِيْزِيَّة *
Livistona hoogendorpii (S). *Livistone de Hoogen-
dorp* (F).
نوع من اللُحْب الزيتوني يزرع في المراكم والحدائق . اوراقه
مستديرة ، جرائدها شائكة تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم .
غوصها مخروطي الشكل ، خاسي او سبامي الانحناء وهو
جابد الصفحة اخضر اللون اصفر اللولج .

٢٤٧٣٧ - نُحْبَة زَيْتُونِيَّة التَّسَر *
Livistona olivaeformis (S). *Livistone à fruits en
olive* (F).
نوع من اللُحْب الزيتوني يزرع في المراكم والحدائق .
اوراقه كلوية الشكل تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . جرائدها
شائكة جسمها احمر اللون ، متباد الاوتكار . غوصها حاقن
الانضغار محبين الاطراف . ثمارها زيتونية الشكل ولقده .

٢٤٧٣٨ - نُحْبَة مُخْمَشِيَّة
Livistona humilis (S). *Livistone bas* (F).
نوع من اللُحْب الزيتوني يزرع في المراكم والحدائق .
اوراقه قليلة الشكل تطول نحو ٩٠ سم . جرائدها مرسة .
غوصها ضيق الصفحة جميل الخضار الزاهي وهو ذرب الزام
الاخير ، حاد الحمة .

٢٤٧٣٩ - نُحْبَة مُسْتَدِيرَة الْوَرَق *
Livistona rotundifolia (S). *Livistone Biroo* (F).
نوع من اللُحْب الزيتوني والصناعي . اوراقه كبيرة القد
مستديرة الشكل قطرها يراوح من ١٠٠ الى ١٥٠ سم .
جرائدها مرسة تطول نحو ٢٠٠ سم . غوصها شديد الخضار
المابن يطول من ٥٠ الى ٧٥ سم .

٢٤٧٤٠ - نُحْم ، نُحْم
Requin (E). *Shark* (E).
هو القروش ، حيوان بحري جصور ، اطليه .



نُحْبَة أندُولِيْزِيَّة



نُحْبَة زَيْتُونِيَّة التَّسَر



نُحْبَة مُسْتَدِيرَة الْوَرَق

٢٤٧٢٧ - لحم أنيس

Caracharodon carcharias (S). Requin blanc (F).
White shark (E).

سمكة بحرية ولید مفترسة من فصيلة الشحيات. أصلها من معظم بحار المناطق المعتدلة الحارة أحصها المحيط الأطلسي. سرعتها المعادي يمي لا يتجاوز الألفاظ وتمسر سطح الماء وتؤكب السفن || جسمها كبير القد، وشبي الشكل، بطول نحو ١٢ متراً. ثوبها إلى الزرقاء البهية البيضاء الموج. بطنها أبيض من ظهرها. رأسها غروطي الشكل. عظمها شارب. لها لاطم مستعرض الشدك الكبير. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة الحجم مقعرة الشكل. زعنفتها الذيلية حلالية الشكل مستطيلة || تتميز بالثمن وبشدة البطش. قريباً كل ما استطاعت من الأسماك والحيوان || أثنائها معدلة التناثر. تضع في كل مرة ١٠ بين أوائل حزيران وأواخر تموز نحو ٤٠ مجراً.



لحن الاعشار المشوة

٢٤٧٢٨ - لحم لعتي

Alopias vulpes (S).
Requin renard, Renard (F). Fox shark, Thresher (E).

سمكة بحرية ولید مفترسة من فصيلة الشحيات. أصلها من معظم بحار العالم أحصها المحيط الأطلسي || سرعتها يمي ولا تخفى عبور المياه الإقليمية والاقتراب من المباحث عند ملازمتها أسراب الرنكة والسريدن والأسفري || جسمها وشبي الشكل، كبير القد بطول من ٤ إلى ٦ أمتار. ثوبها إلى المسلة الزرقاء الموج يمتد في الظهر وينتهي في البطن. رأسها غروطي. عظمها شارب. لها لاطم مستعرض الشدك. أسنانها مثلثة الرؤوس الحادة. تتميز بزعنفتها الذيلية الكبيرة التضخمة التي يبلغ طولا طول الجسم والرأس معاً || أثنائها معدلة التناثر تضع في كل مرة ١٠ بين أوائل أيار وأواخر حزيران نحو ٣٠ مجراً.

٢٤٧٢٩ - لحميات

Lamniidae (S).
Lamnidae (F). *Lamnidae* (E).

فصيلة أسماك بحرية وليدة مفترسة من السنفقيات ورتبة الاثلاخ. اجناسها وانواعها المعروفة نحو عشرة. أصلها من بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || سرعتها يمي غروطي وسطى || جميعها كبيرة الاجسام الوشيية الشكل. تتميز بشدة بطشها ونهمها وبأسنانها الحلقفة الرؤوس الحادة وبالفتحات الجسدي الكبير بين زعنفتها الظهرية || أشهر انواعها اللحم الأبيض والقلم الصليبي والحداد والياهي.

٢٤٧٣٠ - لحم

Sclerotinia (S).
جس فطور مجهرية من الزمفيات وفصيلة المشاريات. يتميز بدلائه اللطيفة الكبيرة القمية الشكل. تكاته غروطية مشتمية متشابهة القد، بوجه ثنائي أو شمسي التركيب. يركب غثفل الاجناس النباتية || أشهر انواعها واصرفها الثابتة مشر التالفة.



لحن الاكيدنيا

٢٤٧٣١ - لحم الأشجار المثمرة * ، لحم

لحم * مؤلفيوز * مليريوتا لحم

Sclerotinia laxa, *S. cinerea*, *S. oregonensis*, *Monilia Laxa*, *M. cinerea* (S). Rot-brun des arbres fruitiers, Moniliasis (F). Blossom blight (E). Monilia-spitzendürre (D).

فطر مجهرى يركب التفاح والاجاص والسفرجل والكرز والخوخ والدراق واللوز وللمشمش فيسبب انحلال الاثمار

وذبول النولي وانتشار لحاء الانداد والانفاد وعفن الثمار وتحتيطها || مظهره الخارجي: ينمو على التفاح والاجاص والسفرجل وذبول طارئ يسبب النوبة او بعض اثمارها فيصلبها ثم يركب الارقاق اللقريبية منها وينتقل الى الفين والفند فينوي الاول بعد ان يوشم الثاني ببقع عفنية تقضي على النسج العصاية وتسبب انتشار لحائها || ويكون على الفوخ والدراق واللوز والمشمش وذبول فحالي يعل بأوراق النولي فيذبلها ويصيب اقرب الارقاق من الثمار فيقضي عليها ثم ينتقل الى الانداد فيقهرها ويصيب انتشار لحائها. أما الثمار فانه يقتضيها على دمعين الارل عند الانمقاد، على اثر سقوط البتلات، فيلونها. والثانية قرب الادراك فيوشها بمرصاته الحلبية الحطية التي تعطب القشرة وتحميها بعد ان تسبب عفنا وعفن لها || وهو على الكرز ورم يصيب النور قبل انبلاج الزهر فيقضي على البتلات والحيجان والامن والاوراق والانداد، والنسو تلو الآخر. كما وانه يصيب الثمار عند ادراكها فيعطيها ويصلب فيها قلمه بثر الخوخ والمشمش والدراق || يكافح اولا في فصل الشتاء، من كانون الى شباط، بقطع جميع الاعضاء الموصية وسرقتها وينسخ الاجبار بلوب ملح الصودا المحلول ١ ٪ والمصاات اليه ١ ٪ من الصابون الخالي من البوتاس. ثم تنضع الاجبار مرة ثانية خلال شهر اذار اي قبل الاكاخ يسائل بورود المحلول من ٠.٨ الى ٢ ٪ بالنسبة الى نوع الاجبار والى ظروفها الخاصة، ومن الواجب ايضا قنضتها مرة ثالثة توتاً بعد القند.

٢٤٧٣٢ - لحم الأكيدنيا *

Sclerotinia mespili (S). Maladie du dessèchement des pousées de néflier (F).

فطر مجهرى يصيب الاكيدنيا في ثولها واثمارها واراقها وتماها الفتية || مظهره الخارجي عفن اصهب اللون كثيف المرصات يركب النولي فيلونها ويؤثر نموها ويركب الازهار فيسبب سقوطها ويصيب الارقاق تنضف وتسر ابتداء من صفتها بعد ان تكتسب رائحة عطرية سمية. واذا سطا على الثمار يقودها الى اليباس بعد صيف قشورها || يكافح باستعمال سائل بورود المحلول ١ ٪ بعد قطع الاعضاء الموبدة وسرقتها.

٢٤٧٣٣ - لحم البرقوق *

Sclerotinia pruni-spinosa (S). Rot-brun des prunelles (F).

فطر مجهرى يصيب الثمار والانفاد فيسقطها بطفه التني اللون الذي يسبب اثمارها بكاملها او جزء منها. وهو حل الانفاد عفن اخضر ثم اصفر يطب اللحاء ويسبب اليباس || يكافح كثيره من اللخن.

٢٤٧٣٤ - لحم البقول *

Sclerotinia minor (S).
فطر مجهرى ينشط ويتكاثر في البيئة الرطبة الباردة التي تراوح حرارتها من ٢ الى ١٠ درجات. يصيب حدة بقول اغصانها الحليين والجذر والكرنس واللوياب والحمس والبنندرة والطرطوف ... || مظهره الخارجي ببقع عفنية ليدة صموية مستديرة تركب مختلف اغصان النبات تنضفها بشور سود بعد ان تفل فيها الحركة اللغنية التي تسبب الذبول الذي يقبه اليباس || لم يكافح حتى الآن. ننصح باحتجاب زراعة البقول المعرصة لهذا الفطر في المواسم الرطبة الباردة.

عفن الحبل خلي يعلو الثَّارَ عند ابتداء الإزراق فينبثقها برصاتها ثم يركب التلوي والارواق الغنية والانتان فيؤذيها بعد ان يحول دون نموها || يكافح مكافئة لحن الثَّارِ .

٢٤٧٤٧ - لَحْنُ السُّوسَنِ

Sclerotinia convoluta, *Botrytis convoluta* (S).
فطر مجهري يفتك مجلدات السوسن . مظهره الخارجي يقع غنية حنطية اللون زغبية ، تركب الجلدات المحفوظة وفي الثَّارَ فتنطعها وتلفها || يكافح بتطهير الجلدات المحفوظة بالفرمول وباملاح الزئبق .

٢٤٧٤٨ - لَحْنُ السَّيْتَمِ

Sclerotinia tumulenta, *S. secalicola*, *Sclerotinia tumulenta*, *Phiala tumulenta*, *Endoconidium tumulenta* (F). *Maladie du seigle enivrant* (F).

فطر مجهري يصيب حب السيل وحب بعض الحنطيات العلفية والثَّارَ || مظهره الخارجي استطالة في الحب وتخلطد يبقها انحلال وتآكل المادة النشوية || اكل الحب المويود وبقية حبب في الانسان والحيوان مسا يسببه الزوران من عوارض استرخاء وسكر || يكافح بانتقاء البذار السليم او بغير الحب مدة ٣٠ دقيقة بالماء الساخن البالغة حرارته ٥٠ درجة ستفتراد .

٢٤٧٤٩ - لَحْنُ الْعَقْرِ * ، عَقْنُ أَشْهَبَ ، عَقْنُ عَنَكَبُوتِي

Sclerotinia fuckeliana, *Botrytis cinerea*, *B. vera*, *Polycystis cinerea*, *P. vera*, *Sclerotium durum*, *S. echinatum* (S). *Pourriture grise*, *Pourriture noble*, *Maladie de la tige* (F). *Grey mould* (E). *Botrytis-fuile*, *Graufuile* (D).

فطر مجهري يركب جميع الاعضاء الهوائية النباتية من الساق الى الثَّارَ كما وانه يركب المواد العضوية على سطح الثَّارَ فينشأ برصاتها واصلها التي تشبه نواس العنكبوت . مظهره الخارجي يختلف مع النبات المصاب . يبدو غالباً بشكل ونية حامدة طلاء اللون او حنطية تكتنف النبات . هو في الكثرة يقع غنية زغبية طلاء اللون تركب السروع القريبة من الثَّارَ و تركب حب الحنطية فضطه وتذله . وهو في الاجاص يقع غنية متناوبة قبية للشكل تركب الافناد فتؤذيها وتنبها || ويركب التين في اغصانه فيسبب يباسها وذبول الثَّارَ وجفافها || ويصيب النبات في الماشات فيفشي على الشئون الغنية من اي نوع كانت || يكافح بتطهير الثَّارَ وباستعمال اسعد العلاجات الاقتصادية للزنبعة الثمن .

٢٤٧٥٠ - لَحْنُ الْقُرْبَلِيَّاتِ

Sclerotinia elborioides, *S. trifoliorum* (S). *Maladie à sclérotis des légumineuses* (F). *Stem rot*, *Wilt of clover and alfalfa* (E). *Kleekrebs* (D).

فطر مجهري يركب بعض النباتات القولية اغصانها القبول والبقايع والبرسيم || مظهره الخارجي يقع حنطية مبترنة تركب نصل الارواق ثم تنتشر فتصبغ بالاحمر والنصل والجذات وتندل الساق فتذبلها وتلويها بعد ان تمطعها وبشاح من العفن الابيض الذي يفسد النبات والثَّارَ || يحسن تخفيض الثَّارَ الكثوم لصراف الماء القصار واجتناب الزراعة في الارربة الرطبة القوية الانسجام .

٢٤٧٥١ - لَحْنُ الْكَسْتَنَةِ * ، قُرُوم

Sclerotinia pseudo-tuberosa, *Rhacodilia castaneae*, *Marziella castaneae* (S). *Pourriture noire des châtaines* (F).

فطر مجهري يصيب ثمار الكستنة فنجها ويقضي عليها . مظهره الخارجي لونه طلاء او سرام اللون تملو القشرة

٢٤٧٥٢ - لَحْنُ الثَّيْبِ *

Sclerotinia nicotianae (S). *Maladie à sclérotis du tabac* (F).

فطر مجهري يصيب الثَّيْبِ في سوقه واوراته . يبدو على السوق لطم سمر طويلا نحو ١٠ سم . يمرضها ٦ . وهو على الارواق يقع صغيرة لا قياسية للشكل والحجم تبدو كالشوبر الحنطية اللون الى ان تركبها عرصات العفن الحبل الاثر || اصرار زغبية لا تستريب النابتة لان انتشاره منوط بكثرة الرطوبة الحقيقية وبشدة البرد .

٢٤٧٥٣ - لَحْنُ الثَّامَرِ * ، مُوَلِيْبِيَّة

Sclerotinia fructigena, *S. coryli*, *Monilia fructigena*, *Monilia fructigena* (S). *Rot-brun des arbres fruitiers à pépins* (F). *Brown rot* (E). *Monilia-fruchtfäule*, *Polsterschimmel* (D).

فطر مجهري يصيب اشجار وثمار التفاح والاجاص والسفرجل والا كيديا وقد شوهد في ظروف خاصة على ثمار الكرز والوجوح والمشمش والدراق || يصيب في بادئ امره بتلات الازهار ونباتاتها وانها ثم يند الى الانتان فيعطب الحباء والاصية ويشل الحركة النسبية بعد ان يمتلئ الاعضاء المصابة وبشاح من عوصات العفن الحبل الاصل || وقد يصيب الثَّارَ في مختلف ادوارها الحياتية فيعطبها بعد ان يكتنف كامل برشها || يكافح اولاً بقطع وحرق الاعضاء الملوثة والثَّارَ الجافة المختلة . ثم باستعمال سائل بودير الحبل ١٪ على اثر سقوط بتلات الزهر . وتنفخ الاشجار مرة ثانية بذات السائل وذات اللمدل عندما تصح الثَّارَ في تصف حببها او في ثلثيه .

٢٤٧٥٤ - لَحْنُ الثُّومِ

Sclerotinia porri (S).
فطر مجهري يركب اوراق الثوم فيؤذيها ويؤخر نموها . مظهره الخارجي يقع يفس ثم سمر صغار مستديرة تركب النصل فتشل نشاطه وتؤخر نموه .

٢٤٧٥٥ - لَحْنُ الْجَنُوتَيْنِ * ، عُرُوطُ الْجَنُوتَيْنِ

Sclerotinia bulborum (S). *Morve de la jacinthe* (F).
فطر مجهري يركب بصل الجون والاشقيل والزعفران . مظهره الخارجي اصفرار وذبول يملأ بالادراق فور سطوع الشمرخ الزهري . ثم يبور لبدة لا قياسية الحجم والشكل سمر الغلاف يفس الداخل تركب اسفاد البصل فتضها وتبرها || يكافح بانتعاج البصل المويود منه ظهور الورسم بتطهير الثَّارَ بالفرمول .

٢٤٧٥٦ - لَحْنُ الدُّبُوسِ

Sclerotinia draytoni (S).

فطر مجهري يصيب البصل المحفوظ ويتنقل معه الى الثَّارَ . مظهره الخارجي يقع غنية حنطية زغبية صرامة تركب اسفاد البصل وانقارصه فتعطبها وتبرها || يكافح بتطهير البصل عند حلقه وقيل زهره بالفرمول وباملاح الزئبق .

٢٤٧٥٧ - لَحْنُ الزُّعْثَرِ *

Sclerotinia crataegi, *Monilia crataegi* (S).

فطر مجهري يركب الارواق فيؤذيها ويصيب الثَّارَ فيلويها او يحول دون نموها || يكافح كغيره من اللحن .

٢٤٧٥٨ - لَحْنُ السَّكْرَجَلِ

Sclerotinia linhartiana, *S. cydoniae*, *Monilia linhartiana*, *Monilia necans* (S). *Maladie du dessèchement des jeunes coings* (F).

فطر مجهري يركب الثَّارَ في ابل جهدا فيسبب اتلاها ويركب الارواق والانتان فيؤذيها || مظهره الخارجي



لحن الثَّارِ



لحن العفن

لحمه يحوي بعض المواد السامة المؤذية . وقد يكون السبب مرضي المرجان .

Lychnis (S).

Lychnis, Lychnide (F). Campion, Lampflower, Maltese cross (E). Lichtnelke, Marienröslein, Pechnelke (D). Licnide, Croce di Malta (I).

جلس نباتات عشبية من فصيلة القرنفلوات . أنواعه نحو ٣٠ ، منها الحولية والمعمرة . أوراقها متعاقبة بيضية أو سنانية النصل . أزهارها كبيرة القد جميلة الشكل لا قياسية التجميع والأركانز يكثر لها الاحمر والابيض والوروش . اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٧٥٣ - لُغْنِسُ أَرْجَوَانِي ، لُغْنِسُ سَطَاح

Lychnis fulgens (S). Lychnide éclatante (F).

نوع من اللغْنِس وهو عشبة معمرة وريضة الساق تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها لاطفة سنانية ، نصلها مسن الحافة اذنب البشرة . أزهارها عتكرولية التجميع ، هامة الارتكاز ، بتلاتها أرجوانية اللون ، رباعية التجميع . أزهاره يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٥٤ - لُغْنِسُ الْحَدَلِق ، لُغْنِسُ مَشْهُورِي

Lychnis coronaria (S). Lychnide coronaire, Agrostemma coronaria, Coquelourde des jardins, Ceillet de Dieu, Passe-Flur (F).

نوع من اللغْنِس الزبني . وهو عشبة معمرة زباه تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . أوراقها بيضية لسنة . نصلها خلي البشرة حل صفحية . أزهارها مستطيلة الاذن كثيرة العدد . بتلاتها قليلة التشرح عديدة الالوان التي تختلف باختلاف القصر || أزهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٧٥٥ - لُغْنِسُ الشَّرْقِ الْأَدِي ، لُغْنِسُ خَلْدُ وَلِيَّة

Lychnis chalcadonica (S).

Lychnide de Chalcadonia, Croix de Jérusalem, Croix de Malte (F).

نوع من اللغْنِس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . شروبه الزراعية عديدة . سوقها وأوراقها مزيجية . أوراقها لاطفة بيضية ، نصلها مسن الحافة اصفر الخضار . أزهارها مختلفة الالوان ، ضمية التجميع ، هامة الارتكاز ، منها المكبنة والمعادية ؛ بتلاتها مقعرة تباد كالصليب مما جعلهم يدعونها صليب القدس أو صليب مالهه || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٧٥٦ - لُغْنِسُ الشَّخَرِي

Lychnis flos-jovis (S). Lychnide fleur de jupiter, Coquelourde fleur de Jupiter, Ceil de Dieu, Fleur de Jupiter (F).

نوع من اللغْنِس الزبني وهو عشبة زباه معمرة وريضة الساق تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . أوراقها لسنة ، نصلها خلي البشرة . أزهارها كبيرة القد ، بتلاتها ثنائية التجميع قرزية اللون || أزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٧٥٧ - لُغْنِسُ بَرِّي

Lychnide sylvestre, Compagnon rouge (F).

نوع من اللغْنِس وهو عشبة برية معمرة تكثر في المراعي والمروج زرعها الماشية بشية .

٢٤٧٥٨ - لُغْنِسُ كَبِيرُ الزَّهْرِ

Lychnis grandiflora, L. coronata (S). Lychnide à grande fleur (F).

نوع من اللغْنِس وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى

الخارجية نصلها . ثم يمتد الى لباب الثمرة فيسبب انحلاله وتحويله الى بؤرة من اللغْن الناشئ الاسود تنصله عروق صفري يسلط منها عند انفلاقها شبار كالمهاب || تفرز الثمار المطوية من السليبة بعد نحرها بالماء لان المطوية تنفطر والسليبة تنفطر .

٢٤٧٥٩ - لَعْنُ النَّجَسِ

Sclerotinia narcissicola, Botrytis narcissicola (S).

نظر مجهرى يركب الارواق عند ظهورها فوطيها ويصير الى نموها وأزهارها || مظهرها الخارجي حركات مجعرة طلاء اللون تركب نصل الارواق منذ ظهورها ثم تتحول الى وثاق سود تشو الارواق وتبقى نموها ونمو أزهارها وأزهارها .

٢٤٧٥٨ - لَعْنُ تَاهِم

Sclerotinia sclerotium, S. libertiana, Sclerotium compactum, S. varium, S. brassicae (S). Pourriture des racines (F). Collar rot (E). Rapaekrabe (D).

نظر مجهرى يركب معظم الانواع النباتية في غثفل اصفائها التربة والحواليات || مظهره حركات كالشجر صغيرة لينة تباد يضاء اللون ثم تتحول الى الزرقعة وتستقر على السمرة توشع سطح الاضواء المويضة أو تصيب السوق في مناطقها المكثية كما يحل في البطاطا والبنورة والتبغ . وهو حل كل حال لا يقرب الاضواء السليبة بل يركب القشور الخمدية ويصيب النبات في الحقل ولا يمتد في التار والدرنات الخمدية || يكالغ بتطهير التربة بواسطة الفرمول أو الحامض الخلي أو الاملاح الزنبيقية .

٢٤٧٤٩ - لَعْنَةُ

Chou (F).

هي الملفوف ، اسلب .

٢٤٧٥٠ - لَعْنَةُ

Lachnea (S).

Lachnée (F). Lachnea (E).

جنس ظهور من فصيلة الخشاريات ودبة الزيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . تعيش مجموعات في الموائل الظليلة على المواد النباتية المنصطة . مجموعتها تمد من زوج الى ثلاثة أزواج . سوقها مجعرة . تكاعها قصية الشكل أو ترسية ، قطرها من ١ الى ٣ سم . قوتلها الخارجية مهدية الكشار لونها الى الصفار الاسمر الباهت أو الى الحمرة البرتقالية . صلتحاتها الداخلية يضاء اللون . وأغتها كرجية مستجيبة || اعرف انواعها واشهرها :

لَعْنَةُ ترسية

Lachnea scutellata (S).

Lachnée en écusson (F).

لَعْنَةُ نصف دائرية

Lachnea hemisphaerica (S).

Lachnée hémisphérique (F).

٢٤٧٥١ - لَعْنُوم * لَعْنُومِيَس

Lachnolaimus (S). Lachnolème (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزانفان وفصيلة الكنيديات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك بحار جزر الانتيل || اجسامها شبه احليلية الشكل ، كبيرة القد ، تطول من ٧٠ الى ١١٠ سم . رؤوسها مخروطية . اشداقها متدلة الرحابة . زانفانها الظهرية والشرجية واللبيعية مجعرة بمناعس غسرية مستطيلة . اوقياها ثنائية الالوان منها الاحمر والمجوري والاعضر والاسمر والاعضر البحري . ظهورها اعين لونا من بطونها || لحمها متوسطة الصنف مأكولة (Lachnolaimus) مستشاه نوع واحد يدعى لحوم كليي (cactus) ثوبه الى الخضار الزيتي . طوله نحو ١٠٠ سم .



لغْن تاهم



لَعْنَةُ ترسية



لَعْنَةُ نصف دائرية



لغْنيم



لغْنيس الشرق الادنى



لغْنيس المشتري

صنيرة ، محرمة . ظهرانها كامل الحنجية ، شارب ، كسني الشباك . ووشاها غشائيات . بطنها صغير الجرم . قوائمها نشطة || مسرعا حراج السديان . قوتها نفع الارواق .



لُحْنَيْسُ نَرْج

٢٤٧١٧ - لَدَائِيَّات * *Ledridae, Scaridae (S).*

Lédridés, Scaridés (F). Ledridae, Scaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطلقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد أو صغيرة . رؤوسها ضخمة . اعطائها صغيرة . حيزها جانبية صغيرة . قرونها الاستعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل الانشائية . كوسلها عريضة ، مزودة باطناف متباينة الاشكال . اجنتها كبيرة ، شاذلة . ووشاها غشائية ، شفاطة . بطنها صغيرة مبعدة . قوائمها نشطة ، والخلقية منها مستعرضة الاقطار المستندة كاللشمار .

٢٤٧٦٨ - لَدَهَكَة ، لَسَمَكَة . *Piqore (F). Prick (E).*

هي المرة من اللدغ بالنم ومن اللس بالحق بالحق .

٢٤٧٦٩ - لَدِيد . *Côté (F). Side (E).*

جانب المتق وجانب الوادي . اللديان : جانب الوادي وصفحا المتق دون الاذنين . ولدينا الشيء : ناحيته ج الله .

٢٤٧٧٠ - لَدَابِيَّة سَوْدَاة * *Empis nigricans (S).*

Empis noirâtre (F).

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، كثيف الملب ، متوسط القد ، يطول من ٩ الى ١٢ م . ثوبها الى السرة السوداء يطولها في صدرها خسة خطوط سود . يطها شبه مخروطي الشكل ، خاسي الجهد . رأسها شبه مكور . خطها مستدل الطول . عيناها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، مفترقتان عند الانثى . زباناها صغيران ، اسودان . قوائمها الى السرة السوداء || تسرح حيث تكثر الاعشاب . قصها اللهاب والهوم .

٢٤٧٧١ - لَدَابِيَّة هِدَبَائِيَّة * *Empis muscaris (S). Empis gobe-mouches (F).*

حشرة قانصة من فصيلة اللدائيات . جسمها خلي القشار ، وشي الشكل ، صغير القد ، يطول من ٤ الى ٩ م . ثوبها الى السرة الخنطية . رأسها كبير الجرم ، شبه مكور الشكل . عيناها كيرتان ، متلاحتان عند الذكر ، فارتقتان عند الانثى ، لونها الى الحرة المرجانية . خطها مستدل الطول ، شديد التثبط . زباناها مرقبان ، اشقران . صدرها اسطواني الشكل ، كثيف الجلد . بطنها خاسي السكم ، مردي الشكل . قوائمها حطية || قوتها اللهاب والهوم تقتنصها طائفة .

٢٤٧٧٢ - لَدَائِيَّات * *Empididae (S).*

Empidés, Empididés (F). Empididae (E).

فصيلة حشرات خائفة من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، خلية القشار أو محرقة ، مبعة الملب . رؤوسها شبه مكورة . حيزها كبيرة . فائقة عند الاناث ، متلاحة عند الذكر . اعطائها دقيقة متباينة الاشجام والصلابة . الغذاءها

٥٠ سم . اوراقها لامعة يضيء الشكل . فصلها متبادح للتسعين جميل الخضار . انماها ضمية التجميع محورية وعاية الانكازان كبيرة اللد قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم . لونها الى الحرة القرميدية ونسها عاجية || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٥٩ - لُحْنَيْسُ نَرْج * *Lychnis viscaria (S).*

Lychnide visqueuse, Trape-mouches (F).

نوع من اللحنيس البري وهو عشبة معمرة تكثر في المراعي . اوراقها لينة . انماها اربوانية اللون .

٢٤٧٦٠ - لُحْنَيْسُ وَرْدِ السَّاءِ

Lychnis coriaria (S). Lychnide rose du ciel, L. facinosa, Coquelourde rose du ciel, Rose du ciel, Lamprette (F).

لوع من اللحنيس البري وهو عشبة حولية تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . ساقها وفروعها عادمة الزغب . اوراقها ضيقة جامدة النصل . انماها ساجوراء اللون مهدبة البتلات الكاملة . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٧٦١ - لُحْنَيْسُ وَرْدِي * *Lychnis flos-cuculi (S). Lychnide fleur de coucou, Fleur de coucou, Ceillet des prés, Véronique des jardins (F).*

نوع من اللحنيس وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها لامعة ، سنائية النصل ، بحرية اللون . انماها مكسية عديدة البتلات الراحية التشرج للوردية اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٤٧٦٢ - لُحْنَيْسِيَّات *Lychnidées (F).*

سبط من القرنفلات ، اشهر اجناسه اللحنيس .

٢٤٧٦٣ - لُحْنَيْات *Cobitidae (S).*

Cobitidae (F). Cobitidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة مفتوسات المثانة لينات الزعانف . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، كانت تتبع في التصنيف الماضي ، فصيلة الشبوطيات . اعطائها معظم انهر وبحيرات البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها ضيقة ، مستطيلة ، متباينة الالوان . قلوبها صغيرة ونحيلة . زعانفها الظهرية وحيدة تتوسط الظهر تقابلها الزعانف الخرسية من الجهة السفلى . وتكسيز بكثرة عذباتها التي يراوح عددها من ١٠ الى ١٥ ورأسها البومية ويضيق خياشيمها ما يحصلها تزاود سطح الماء بكثرة لاستنشاق الهواء الطلق || اشهر اجناسها الخ .

٢٤٧٦٤ - لَدَاكَة * *Rhodopaxille (F).*

هو البلك ، فطر من فصيلة الفاريقريات ، اطلبه .

٢٤٧٦٥ - لَدَاكَة *Malleabilité, Pliability (F).*

Malleability, Pliability (E).

القابلية الى الانواء . وهي ايضا القابلية الى التصفيح في بعض المادان .

٢٤٧٦٦ - لَدَوَكَة يَطْلَقَة * *Ledra aurita (S).*

Ledre attentive (F).

حشرة من فصيلة اللدريات . جسمها يطول من ١٤ الى ١٨ م . ثوبها الى الخنطى المنمش بالكسني والاسمر . رأسها مستعرض ضخم . عيناها صغيرتان . زباناها قصيران ، ثلاثيا الفصل . كوسلها مزود باطناف شاذلة . حجبها



لُحْنَيْسُ وَرْدِي

من ٢٠ الى ٢٥ م. يستخرج من جذعها بالخز عصاره صمغية ولاتنجية تعرف بالبخور المادي. اوراقها حادة الحرف المسنن. لونها الى اخضر الازرق المائل. ثمارها كروية الشكل جلوية اللون، طرياً يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. وعرضها من ٨ الى ١٠، احشائها صناعية جيدة الصنف.

٢٤٧٧٩ - لَزَان ، لَزَان ، سَيْسِسْ

Cytisus (S), *Cytisus* (F), *Broom* (E), *Klastrauch* (D), *Citiso*, *Avornello* (I).

جنس جنبات برية وتربيتية من فصيلة الفريثيات الفرشية. انواعه نحو ٣٥ معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات. ازهارها عقدية جالسة او متدلية يعلب فيها اللون الاصفر. ثمارها سنطية. يزورها عسيدة الشكل تحوي بعض المواد المتصرية الجعالية، يلفها شديدة الغمالية || احرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٤٧٨٠ - لَزَان اَبْيَضْ

Cytisus albidus (S).

Cytis blancâtre (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. بجمته قزواء فناء متدنية تملو نحو ٥٠ سم. فروصها وفانها شاكلة الاطراف. اوراقها مركبة صغيرة الوريقات المنقطة. ازهارها بيضاء اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

٢٤٧٨١ - لَزَان اَرْجَوَانِي *

Cytisus purpureus (S).

Cytis à fleurs pourpres (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. جنبتة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها منقطة. وريقاتها اهلبيجية النصل مائلة البشرة. ازهارها ارجوانية اللون فردية التجميع المحوري والطرفي || ازهاره يستمر من ايار الى كيب.

٢٤٧٨٢ - لَزَان عَطِيطِي الزَّرَقِ

Cytisus linifolius (S), *Cytis à feuilles linéaires* (F).

نوع من اللزان البري المجلول. بجمته تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. وريقاتها لاطنة عطيطية خالية البشرة طول نحو ٣ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ سم. ازهارها كثيفة التجميع طرفية الزنكاز صغيرة القند صفراء اللون || ازهاره يستمر من آذار الى ايار.

٢٤٧٨٣ - لَزَان سَبِيلِي *

Cytisus nigricans (S).

Cytise en épis (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. جنبتة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها قزواء زبا، زغبها اسفر اللون. اوراقها منقطة. وريقاتها سنائية النصل طول نحو ٢٠ سم. وتعرض نحو ٨. ازهارها سنطية متدلية تملو من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الصفرة الزاهية || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران.

٢٤٧٨٤ - لَزَان كَنْتَارِيَّة

Cytisus canariensis (S).

Cytise des Canaries (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. بجمته صغيرة القند متدنية. ساقها قزواء فناء. وريقاتها بيضوية النصل طول نحو ٧ سم. ازهارها طرفية صفراء اللون مستحبة الحرف || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٢٤٧٨٥ - لَزَان مَدِينَا

Cytisus maderensis (S).

Cytise de Madère (F).

نوع من اللزان البري والتربيتي. جنبتة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها منقطة. وريقاتها اهلبيجية النصل طول من ٢ الى ٣ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥.

وطايبها منخسبة حادة بمجزة الخلف. الجهاز التناسلي عند الذكور خارجي الزنكاز || انثاها اكبر قدماً من ذكورها. تبيض مكثاً في التربة وفي جنوح الاشجار النخرة || يقاتها ديدوية، شبه اسطوانية، خامية السم، شاكلة الخيد. رؤوسها صغيرة قاصحة. تكثيرها ذرية. جميعها دامت او وانجة تعيش في التربة او في جنوح الاشجار النخرة، وبعضها قازب يسرح في ابحال واولال المناقع ويحاري الماء.

٢٤٧٧٣ - لَدَاج *

Hémaphysage (F).

Hematophagous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان يقتل بالدم او قوته الدم.

٢٤٧٧٤ - لَزْدِيَزْبَال *

Lardizabal

جنس نباتات زراعية ليلية عارشة مسرة من فصيلة اللوزديزاليات. مهمها امركية الجنوبية. لها ثومان لوزديزالي الشيلي ولوزديزالي البرو || اوراقها متعاقبة. ازهارها بتفسيجية مابقة. ثمارها لحمية غشوية تستقيت اللون مأكولة يصورها في بلاد الشيلي (كوفيل).

٢٤٧٧٥ - لَزْدِيَزْبَالِيَّات *

Lardizabaleae (S).

Lardizabaleae (F).

فصيلة نباتات ثنائية الفلقة مستقلة القمالة مرتفعة المبيض، قريبة الشبه من البربريسيات والقمريرات || تتميز بنباتها الوسيد المسكن والبروشة || اجتمها وانواعها عديدة معظمها من نباتات البلاد الامريكية. اشهرها اللوزديزالي واللاتي.

٢٤٧٧٦ - لَرْمُوسْ *، لَرْمُوسْ

Larimus (S).

Larime (F).

جنس اسماك بحرية من شاكلات الرمانف وفصيلة البهاريات. انواعه المعروفة ثلاثة اصطناعها بحار البلاد الحارة || اجسامها اهلبيجية الشكل معتدلة التيطيط طول من ٢٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها كبيرة، قصيرة الاصطام، رسية الاشداق. عيونها كبيرة جاحظة. زعانفها الظهرية مستطيلة، ثنائية التركيب. زعانفها الذيلية مزوانية. اثوابها الى الرتبة الفضية تميز في الظهور ويملوها تسليج اسيد يمتد الى ما يقارب ثلثي الاطاول. يطونها الى الشبهة الفضية الشديدة القمان || اجسامها جيدة الصنف، مرقوب بها.

٢٤٧٧٧ - لَرْمُوسْ *

Larimus (S).

Larin (F).

جنس شحرات خاضعة من مخدات الاجنحة وفصيلة السويات. انواعه المعروفة عديدة اصطناعها المناطق الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم. تألف البراري التي تكثر فيها المهرشات احصاها الاقنوس || اجسامها شبه بيضوية الشكل، صغيرة القند، مستقلة المقدم والمؤخر. قرونها الاستعمارية رقيقة، ديدوية الاطراف. كولسها واغدادها ملحقة بقشاه من الطيلس الاصعب الابن || ازوارها متباينة الالوان والاشكال الهندسية تكثر فيها السرة والطلحة.

٢٤٧٧٨ - لَزَابْ *، عَوْقَر زَبِيع

Juniperus excelsa (S).

Génévrier de Tauride, *G. en arbre* (F).

Greek juniper (E), *Moher Wacholder* (D).

Ginepro di Crimea (I).

نوع من المرمر اصطناعه تمتد من البلقان الى حلايا. يكثر وجوده في بعض جرد لبنان. ثمرته كبيرة القند تملو



لرموس



لزاب



لزان ارجواني



لزان سنيلي

٢٤٧٩٦ - لَزِينِيَّات (Neritidae (S).

Nérítidae (F). Neritidae (E).

فضيلة حلازين من الرخويات المدييات . اجناسها وانواعها عديدة معظمها بحري وببعضها بحري ونهرى .

٢٤٧٩٧ - لَزِيم (Homophylle (F).

Homophylous (E).

نمت ثمرتي يطلق كل كل نبات سائل الأوراق المتشابهة .

٢٤٧٩٨ - لَزِيْودَرْمَه (Lasioderme (F).

هي الثفيرة ، اطليها .

٢٤٧٩٩ - لَزِيْوسْتَرُومَه (Lasiostroma (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات . وبنيتها نصف كروية تنشأ ضمن النسيج المتشامة ثم تنبثق الى سطحها . بكتينها كروية الشكل ، تحيط بالثقب . يوفاته يضيء او مرقية || له نوع واحد يهي لزيوسترية الاجاص (Lasiostroma pisorum) يركب ثمار الاجاص المحفوظة ، عند ارتفاع الحرارة ، فيقرصها ويطنها .

٢٤٨٠٠ - لَس (Déprimage (F).

رعي المثالية اولاً نبات المرج .

٢٤٨٠١ - لَسَّاس (Luzula (S).

المشب ما دام صغيراً لا تستمكن منه الرماية .

٢٤٨٠٢ - لَسَّاس (Luzula (S).

الساس شبة عشة كلان الثور وليست به ، (المحيط) .

٢٤٨٠٣ - لِسَان (Lange (F). Tongue (E).

عضو فضلي متحرك الجسم ، ثابت القاعدة ، مركزه الفم . وظيفته المصغ والمص والبلع وتكييف الصوت .

٢٤٨٠٤ - لِسَان (Lange (F). Tongue (E).

سمكة تسمى اللسان ، اطليها .

٢٤٨٠٥ - لِسَان (Lange (F). Tongue (E).

« شبة من الجنية لها ورق متفرش اعشن كانه المساحي يسمنه وسطها قضيب كالفرع طولاً في رأسه ثورة كعلاء » (اللسان) .

٢٤٨٠٦ - لِسَانُ الْبَحْرِ (Potamot (F).

نبات يهي جدار البحر ، اطليها .

٢٤٨٠٧ - لِسَانُ الْفُحْل (Potamot (F).

« نبات كثير الفروع مربع طويل الاوراق فيه عشوة » (ابو حنيفة) .

٢٤٨٠٨ - لِسَانُ الثَّوْرِ الْحَمَلِيَّ (Buglossae officinale (F).

هو الانشودة الحزنية ، اطليها .

٢٤٨٠٩ - لِسَانُ الْحَمَلِ (Plantago (S). Plantain (F).

جنس نباتات عشية برية من فصيلة الحلييات . انواعها نحو ٥٠ منها الحولية والمعمرة جميعها مرقية . اوراقها قرصية الانتشابة متفحة او لاطة . انجازها شبيهة بالتجميع يحملها غشاء مصمت دقيق || اكثر انواعه من الاغشاب الطبية تنفع من السعال والربو وتفتت الدم وقروح الفم واللثة

انجازها طرية التجميع صفراء اللون || انجازها يستمر طوال فصل الشتاء .

٢٤٧٩٦ - لَزَان مُسَهَّل (Cyclus purgans (S).

Cyclis purgatif (F).

نوع من الازان الطلي البري المينول . يملك ثقل ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لاطة بسيطة ، نصلها لسن الصفحة البحرية اللون . انجازها الى الصفرة . يزورها ويجوزها مسلة || انجازها يستمر من ايار الى تموز .

٢٤٧٩٧ - لَزِيْمَه (Visqueux (F). Viscous (E).

ما به لزوج اي تخط وتعد ويك يعلق باليد ونحوها .

٢٤٧٩٨ - لَزِيْمَه (Viscosité (F).

Viscosity (E).

٢٤٧٩٩ - لَزُوْق (Empilâtre (F). Plaster (E).

دواء يلزم الجرح او الصدغ حتى يبرأ .

٢٤٧٩٩ - لَزُوْقَه (Luzula (S).

Luzule (F). Wood-rush, Cuckoo grass (E). Hasenbrotmarbel, Marbel (D). Luzula, Luziola, Glunco peloso, G. secco (I).

جنس نباتات عشية برية مرعوية علفية معمرة من فصيلة الاسمايات . انواعها المعروفة ٣٥ ، اصطناعها البلاد الممتدة الحرارة من المابين القديم والجديد . جذورها مدادة . سوقها فردية منتصبة . اوراقها متناوبة عصفية ، نصلها خلى البثرة ، مهدب الحافة ، غير المواج . انجازها حشوية التجميع ، طرية الانتكاز . ثمارها حبة . تستعمل لتثبيت الأراضي الجبلية المنحدرة التي يخشى عليها من انجراف التربة .

٢٤٧٩٩ - لَزِيْنِيَّ (Falco erythropus (S).

Kobez (F). Red-legged falcon (E).

جنس طير من عمارة الصقور وفصيلة الصقريات . انواعه قليلة جميعها من القواطع التي تجوب البلاد في طلب المصيف والشي . عدد افراد سربها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ وهي صغيرة القدر ريمه القامة طولاً يراوح من ٣٠ الى ٣٢ سم . انواها نمر . مناسرها وجفون حبيبا وسيفاتها الى الحمرة . ذكرها سمر الرووس والاحتناق والصدور . اناتها حمر الرووس والصدور || قوتها الحشرات حل اختلاف انواعها واشكالها . تدفن في الانجار العالمية . اناتها تضع من ٤ الى ٩ فنان تحضنها اربعة اسابيع || احرف انواعها ما يلي .

٢٤٧٩٩ - لَزِيْنِيَّ الْهَرَق (Falco erythropus amurants (S).

Kobez oriental (F). نوع من اللززين يحوم الشرق حتى روسيا ويمتدح خة شهور في الحظيرة او مصر والسودان حيث يدفن ويبيض .

٢٤٧٩٩ - لَزِيْنِيَّ الْهَرَب (Falco erythropus vaspertinus (S).

Kobez vaspéral (F). نوع من اللززين يحوم آسيه الصغرى واروبه ويمتدح نحو خمسة شهور بين جبال الاطلس والسنتال حيث يدفن ويبيض .

٢٤٧٩٥ - لَزِيْمَه (Nerita (S).

Néríta (F). Nerita (E).

جنس حلازين بحرية من اللزيبات . انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ جميعها قبيية الشكل مطنها بحار وشواطئ البلاد الحارة .



لزرة



لزيق



لزيفة

٢٤٨١٧ - لسان العصفور الحبلي

Cérinthe retournée (F). هو السرته المغلوبة ، اطليه .

٢٤٨١٨ - لسان العصفور الصغير

Cérinthe petica (F). هو السرته الصغيرة ، اطليه .

٢٤٨١٩ - لسان العصفور المُرّ

يمرط باسم حلق ، اطليه .

٢٤٨٢٠ - لسان الفَرْزَال * Botrychium (S).

Botryche, Botrychie, Botrychion (F). Moon-fern, Moonwort (E). Echte Mondraute (D). Lunaria del grappolo, Sfera cavallo (I).

جنس نباتات عشبية من السراخس . انواحه نحو ٢٠ اعطائها البلاد الباردة والمعتدلة . تعيش في المواقع الرطبة . تتميز باكياس يوفها السبيلية التجميع الباعدة الفتوح .

٢٤٨٢١ - لسان الفَرْزَس Langue de cheval (F).

هو السقتر اللسن ، اطليه .

٢٤٨٢٢ - لسان الكتف * ، آذان الأرنب ،

Cynoglossum (S).

Cynoglossum, Langue de chien (F). Gipsy flower, Hound's tongue (E). Echte Hundszunge (D). Cinoglossa, Lingua di cane, Erba vellutina (I).

بجلة برية معمرة من فصيلة الحمحميات . ساقها زياه تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها مقعقة لسنة . تصلها ذرب الزمان الاخير ، حلي البشرة على صفحتها . ازهارها عذوقية التجميع ، متجنوية اللون ، بيض الحمار || يقال ان جميع اجزائها طبية قابضة تنفع الانهال والمفص . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٤٨٢٣ - لسان الزمكار

هو الكلم ، اطليه . هو الكلم ، اطليه .

٢٤٨٢٤ - لسان الوَحْل Langue de cerf (F).

هو السرخس الحزني من النباتات الطبية ، اطليه .

٢٤٨٢٥ - ليستوس أزرق * Leisteus caeruleus (S).

Leiste bleu (F). Leisteus caeruleus (E).

حشرة قابضة من فصيلة التيريديات وربة عذبات الاجنحة تألف الاحراج الظليلة والمواقع الرطبة والجائان والحدائق . خنافسها وورقاتها تعيش على ما تقتنصه من حشرات وهوام || جسمها صغير اللثة يطول نحو ١٠ سم . ثوبها الى الزرقة الجميلة رأسها صغير الجرم . تكاها ذربان . زباناها عظيميان مستطيلان . عينها صغيرتان بارزتان . ظفراها متوسط الاحدياب ، مستدير الطرف اللامع ، ثماني التحزيز الغندي . ارساغها خماسية المثلث || الاثنى عشر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجميلة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار . تساهل في الليل . تجتمع المكن تحت الجفالة والطحالب والعليل || البرقة عنه تمام ادراكها تطول نحو ١٦ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مداسي درواوب . ثوبها الى السمره ، رأسها وشرجها ودواجيبها الى السواد الفحشي || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يوماً ينقضي في بيض عودوي النور تحفر البرقة على غق ه او ٦ سم .

والطحال والكل وسرقة البول والنفث شرباً والاورام ملاء والقروح عباداً ، وتمنع المرح وذاه القيل || اشهر انواحه ما يلي .

٢٤٨١٠ - لسان الحمل السبائي * ، آذان الكتف

Plantago lanceolata (S). Plantain lanceolé, Oreille de lièvre (F). Great ban plant, Rib-grass, Ribwort (E). Sotzweigerich (D). Plantagine lanceolata, Lingue di botta (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبلول . اوراقه سنانية لسنة . ازهاره الى الياباس البني . مناته القوية عديدة كتافع راقه .

٢٤٨١١ - لسان الحمل القربي * ، قرن الأبل

Plantago coronopus (S). Plantain corne de cerf, Coronopa (F). Buck's-horn plantain, Star of the earth (E). Hirschwegerich (D). Plantagine corno di cervo, Minutina (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبلول ، اوراقه سنانية مسطيلة مطقة الحمار او منقطة . ازهاره الى الصفرة الباهتة . مناته القوية منافع راقه الا ان مادته المنصرية اقل فعالية .

٢٤٨١٢ - لسان الحمل الكبير * ، لسان حمة ،

لسان الكتف ، مصاصة

Plantago major (S). Plantain majeur, P. des oiseaux, Grand plantain (F). Greater plantain, Waybread (E). Grosser Wegerich (D). Plantagine maggiore, Arnoglossa, Pentsterni (I).

نوع من لسان الحمل وهو مبلول في المواقع الرطبة . اوراقه بيضيه النصل ، مقنطرة القامعة ، مسطيلة النقي ، بحرية الخشار . ازهاره الى الصفار الاخير . يزوره ذبقة ترغ فيها المصابير . وهو من النباتات الطبية ، اوراقه الخضراء تقيده من التزيف والحروق والكدمات والحمره . تقطير قه الزهرية ينفع اللين . وصميره خلائص الحرارة ملطف الحوضه مفاد تلغ الهوام والحشرات .

٢٤٨١٣ - لسان الحمل المتوسط * ، مصاصة

صغيرة

Plantago media (S). Plantain moyen, P. bâlard (F). Lamb's tongue, Hoary plantain (E). Mittlerer Wegerich (D). Plantagine mezzana (I).

نوع من لسان الحمل الطبي المبلول ، ازهاره ودية اللون . اوراقه قابضة مجففة تضمد بها الجراح المزمنة والحالية . واذا اكلت مطبوخة مثل يبلع اذنان في قرصة الامعاء والانهال المزمن . والمضغطة يملئ اوراقه تشفي قروح الفم واللثة الدامية . واحساح حصره في صلبه يشفي قروح الرسم والروبووات التي تسيل منه (الانطاني) .

٢٤٨١٤ - لسان الحية * ، لكيكة

Ophoglossum (S). Ophoglossa, Herbe sans couture, Langue de serpent (F). Adder's tongue, Adder's spear fern (E). Echte Natterzunge (D). Lingua serpentina, Luccia, Erba senza nervi (I).

نبات عشبي طبي بري ممر من السراخس ، صغير اللثة يطول نحو ٣٥ سم . اوراقه حادثة المروك . يتكرر في المناطق والمواقع الرطبة . جلوده طيبة تظم الجروح ورفيد الكبح .

٢٤٨١٥ - لسان الفصبة

هو شوك فرياس ، اطليه .

٢٤٨١٦ - لسان العصفور

اسم شائع لا يجوز امثاله لانه يطلق حل عدة نباتات مختلفة انصها الدردار والمران والمائق والسرته .



لسان الحمل السبائي



لسان الحمل الكبير



لسان الفَرْزَال

لسان الحية



لسان الكتف



ليستوس أزرق

الاستوائية || نباتات اثمار وحبيرات . اورثاقا ابيدة ، متعاقبة متعقة ، قلبية النصال ، ازهارها سهل التجميع ، ازهارها خماسية البتلات ، عديدة الالوان ، حيلة الاكلان الزاهية . ثمارها نورية || اشهر اجناسها السيتيم .

٢٤٨٣٤ - **لُسَيْتِيَّة** هي العلوك القرني ، الحله .

٢٤٨٣٥ - **لُسَيْن** Ligule (F). Ligula (E).
هنة في ورق التيجليات بين فصل العصفه ونحوها .

٢٤٨٣٦ - **لُسَيْن** Actinella (S). Actinelle (F).
جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة جميعها حرة الرائحة مرة الطعم . اورثاقها لا قياسية الترتيب والتجميع منها المتعاقبة والفسيحة والجالية . ازهارها صفراء اللون رؤسيتها الزهرية عديدة اللبنيات ، تحترق عريانة . بزورها مذبة الشلور || احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٤٨٣٧ - **لُسَيْتِيَّة** Lingula (S). Lingule (F). Lingula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفديات الارجل وفصيلة السيتينات . انواعها الممارسة المعروفة قليلة العدد تعيش لاصقة بالصخور المعقورة وبالنباتات البحرية || اصداقها متساوية المصارع ، يفيضة اللون ، مستطيلة بسيطة ، مقطوعة الرأس ، مذبة القلب . مفصلاتها عادية اللبنتين . لورثاقها كثيفة الحلب الناعم الخفيف .

٢٤٨٣٨ - **لُسَيْتِيَّة حَطْبِيَّة الزَوْج** Actinella linearifolia (S). Actinelle à feuilles linéaires (F).
نوع من اللبنين المحول . ساقها متعقبة فراء تملو من ١٥ الى ٤٠ سم . اورثاقها بسيطة خطية النصل . رؤسيتها الزهرية صغيرة القد تحمل عشر لبنيات اهليجية الشكل . تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٤٨٣٩ - **لُسَيْتِيَّة كَبِيرَة الزَهْر** Actinella grandiflora (S). Actinelle à grandes fleurs (F).
نوع من اللبنين المحمر . ساقها مزغبة اللحاء متعقبة تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اورثاقها ريشية شمرة . رؤسيتها الزهرية كبيرة القد ، يراوح قطرها من ٨ الى ٨ سم || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٤٨٤٠ - **لُسَيْتِيَّة تَجْمِيَّة** Actinella scaposa (S). Actinelle aculea (F).
نوع من اللبنين للممر البادم الساق . اورثاقها جذعية الانكاز ، ضيقة التجميع ، مساوية النصل . رؤسيتها الزهرية مستطيلة اللبنيات المنفصلة الى الحجاج || تنورها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٤٨٤١ - **لُسَيْتِيَّات** Lingulaceae (F). Lingulés (F). Lingulaceae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفديات الارجل اللاصقة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة ، جميعها بسيطة كالسان ملتصقة باصداقها يسوقات طيبة مستطيلة قابلة الانعاط || اشهر اجناسها واغربها السيتية .



لُسُون



لَبِي

٢٤٨٣٩ - **لُسَيْتِيَّة** Lasthenia (S). Lathénie (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة . سوقها فراء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اورثاقها متعاقبة سنانية النصل . ازهارها رؤسية التجميع . ثباتات قنادلها ملتصقة تشكل اقفاً احفنا حولة من ١٥ سم . ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر . تنورها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٤٨٣٧ - **لَسَد** Téter (F). To suck (E).
رفع . يقال لسد الظل انه ولدنا : رفع جميع ما في فمها .

٢٤٨٣٨ - **لَسَكَة** راجع لدغة .

٢٤٨٣٩ - **لُسُونِيَّات** Licina (S). Licine (F). Licinus (E).
جنس خنافس جاسة مفترسة من غديات الاجنحة وفصيلة السنويات . انواعها المعروفة ١٢ موطنها حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها تطول من ١٢ الى ١٨ سم . يكثر فيها الشكل الاهليجي . احداها لافحة ، مخددة وعجيبة . اثارها الى السواد الفضي او الكسني الاسمر الاسبق || تعيش تحت الحجارة او في افاق تحللها قرب جلود النبات . تسرح من اواسط الربيع الى اواسط الخريف . قوتها كل ما تستطيع قتله من دويبات ويرقات وديدان .

٢٤٨٤٠ - **لُسُونِيَّات** Licinidae (S). Licinidés (F). Licinidae (E).
فصيلة خنافس جاسة مفترسة من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اصلاها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة او متوسطة القد ، شبه اهليجية الشكل . رؤسها مخددة . قرنها الاستشعارية مركبة من ١١ فصلة . احداها لافحة . قوتها نشطة . من ميزاتها ان ازهارا لامتدادة وغالباً مشرورة . جوارسها ثنائية الفلق المخمصة . تكثيرها قصيرة وشقيقة . ملاسها الشفوية جزلة || اشهر اجناسها اللسونس .

٢٤٨٤١ - **لُسُونِيَّات** Phaneroglossae (S). Phaneroglossae (F). Phaneroglossa (E).
مرتبة حيوانات من رتبة البتر ، عديمات الذنب ، تشتمل على اثنين وعشر فصائل || جميع حيواناتها من مختلف الفصائل والاجناس تشتمل بوجود الالبان || لها اعضاء عيشات والوكسيتات .

٢٤٨٤٢ - **لُسَيْتِيَّات** Lacistema (S). Lacistème (F).
جنس نباتات حرجية من فصيلة السيتيمات . انواعها المعروفة ١٥ اصلاها امريكية الاستوائية . جميعها اثمار وحبيرات . سوقها متعقبة فراء . اورثاقها ابيدة ، متعاقبة ، متعقة ، جامدة النصال القلبية الشكل . ازهارها منبيل التجميع ، طرفي الانكاز وصوري . ازهارها صغيرة ، يكثر فيها اللون الاصفر . ثمارها نورية لا تكوكل انما يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال الهلي .

٢٤٨٤٣ - **لُسَيْتِيَّات** Lacistomaceae (S). Lacistomacées (F). Lacistomaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اصلاها بعض مناطق امريكية

انيلابها فتبدو زاهية اللون شائعة ثم خضراء زيتونية وتنتهي بالون الاسمر . أما الثآليل المصابة فتبدو كأنها موشمة بتلون لا قياسه الشكل والحجم تحفظها الزوان مختلفة قبل ان تستقر على الاسمر الذي يمتد الخلف مع الادراك .

٢٤٨٥٣ - لُصْفُ الْعَلَقِ ، لُصْفُ الْمَوْسَجِ

Echino veneta, Plectodiscella veneta, Gloeosporium venetum, G. necator, Phyllosticta rosarum (S). *Anthracoze du framboisier, A. des ronces* (F).
وصم يصيب الموصج والعلق في الفروع والأوراق والثآليل فيؤذيها ويضعف بها الاضرار . سببه فطر مجهري من الفطريات . مظهره الخارجي يقع حراء اللون او بنفسجية ، ظهرها من ٣ الى ٥ سم . تركيب الأوراق فتعطيها تركيب الفروع فتشوها ، أما الثآليل فيصيرها ٥ يكافح باستعمال سائل يوردر المخلول ١ ٪ في اوائل الربيع .

٢٤٨٥٤ - لُصْفُ

Cateplasma هي البقعة توضع على مكان الألم من الجسم .

٢٤٨٥٥ - لُصُوفُ

Gloeosporium (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات . انواعه عديدة معظمها مؤلف ٥ مشجبه ينمو تحت الطبقة الادمية حيث ينتشر في اللون ثم يتوسع ويصل الى اريمة تقوم عليها الكتانة . قصباته قرصية او سرفولية . يورفاته وسيدة الخلية ، شائعة ، مستطيلة ، مستقيمة او منعققة ٥ وصحة متفاوت الاضرار والأذى يمتري الأوراق والثآليل والانتفاخ ٥ اعرف انواعه ما يتبع .

٢٤٨٥٦ - لُصُوفُ الْإِسْبَاحِ

Gloeosporium spinaciae (S). فطر مجهري تركيب أوراق الإسباح فيؤذيها ببعض البقع المستدرة المتلاصقة السوداء اللون التي تشوها وتدمر من قيسها التجارية ٥ يكافح باستعمال احد مركبات النحاس .

٢٤٨٥٧ - لُصُوفُ الْبَيْنِ

Gloeosporium coffeanum (S). فطر مجهري تركيب أوراق البن فيؤذيها ويصيب الاذنان فيقرحها ٥ مظهره على الأوراق قطع حطية اللون مستطيلة تركيب حافة التصل فتعطي على خلايا النسج الادمية . وهو على الاذنان قروح مستطيلة حراء اللون تعطب اللحاء وتعيها ٥ يكافح بالقطع الاضواء الموضوعة وينضج الاثمار عدة مرات ببعض الوسائل المركزة على املاح النحاس .

٢٤٨٥٨ - لُصُوفُ الْبَنْدُورَةِ

Gloeosporium phomoides (S). فطر مجهري تركيب ثمار البندورة عند اقترابها من الادراك . يبدو كالبقع الحطية او السوداء اللون يسببها مشجج الفطر الذي ينتشر في الطبقة الادمية وتتسع معه البقع السطحية حتى الصداها الذي يعطي فيه من الحريان ٥ يكافح باستعمال احد الفوطير المركزة على الكبريت والنحاس .

٢٤٨٥٩ - لُصُوفُ الْجَوْزِ

Gloeosporium epicarpi (S). فطر مجهري يصيب لباب الجوز فيعطيه . مظهره الخارجي يقع مستدرة او بيضية الشكل طلعاء اللون حراء امراء التركيب لباب الشرة . فان حصلت الإصابة في اثناء النمو اطاحت بالثمرة وان رقت ثمرة الادراك سبت حفن اللباب ٥ اضراره غالباً محدودة لا تستوجب المكافمة لانها لا تفوق ٣ او ٥ ٪ .

٢٤٨٥٩ - لُصْفِيَّةُ الزَّهْرِ

Liguliflores (F). فطر من فصيلة المركبات .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

اللس هو السباق او ثوره .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Echenels (S). *Echénide, Remora* (F). Sucking fish, Remora (E). جنس اسماك بحرية من شالكاكات الزعانيف وفصيلة الكشكاكات . انواعه نحو ١٠ اجسامها مستدقة ، طولها يراوح من ٢٩ الى ٣٢ سم . تتميز برووسها المكلفة بمجسات بيضية الشكل مغطاة شائعة تمكثها من الالتصاق بالاسماك والاشياء التي تريد ا . وهي تلتصق بالحويت والبال والدلفين واللبانة والبلواسر .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Homochromie (F). *Procrapsis* (E).

خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات ، تمكثها من الاختصاص بلون الاشياء التي تحيط بها .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Oxyria (S). *Oxyria* (E).

جنس نباتات عشبية برية ممررة من فصيلة الطبايطات . منها جبال حوض البحر الابيض المتوسط .

٢٤٨٥٩ - لُصْفِيَّةُ

Lachensalie (F). هي الزيجيل من الزنايق ، اطليه .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Zygocne (F). *Zygoten* (E). دور التطور الميزوي الذي يتميز بتلاصق النشب المتشابكة .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Fluorescence (F). خاصة تمكث بعض الاجسام من تحويل الاشعة الضوئية التي تنقلها الى اشعة ضوئية اطول موجة .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ

Claprier commun (F). هو الكبر الشائك وهو ثمر الكبر .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ الثَّمَارِ وَالْإِجَاصِ

Elsinoe piri, Plectodiscella piri, Sphaeloma, Phyllosticta rosarum (S). *Anthracoze du pommier et du poirier* (F). وصم يصيب الثمار والاجاص والسفرجل في الاذنان والأوراق والثآليل . سببه فطر مجهري من الفطريات ٥ مظهره الخارجي يقع صغيرة كثيرة العدد مشورة بدون ترتيب على نصل الأوراق وطول الاذنان ويشتر الثآليل . وعنده البقع التي يعل فطر الواحدة منها نحو المليمتر الواحد تبدو كاسطوانة مستطيلة حراء اللون توضعها نقطة يضاء ٥ يكافح باستعمال احد الفوطير المناسبة .

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ الثَّمَارِ وَالْإِجَاصِ

Elsinoe fawcetti, Sphaeloma fawcetti, Sporotrichum citri, Cladosporium citri, Sphaeloma citri (S). *Scab des agrumes, Maladie des verrues* (F). وصم يصيب اكثر انواع الحمضيات في اثنائها واوراقها وثمارها . سببه فطر مجهري يعيش ويتكاثر على التلمي الغنية عندما يكون معدل الحرارة نحو ٢٠ درجة ستيفراد . لذلك فهو نادر الجوز في القلم حوض البحر المتوسط . مظهره الخارجي يقع صغيرة تملأ نصل الأوراق الغنية عند

٢٤٨٥٩ - لُصْفُ الثَّمَارِ وَالْإِجَاصِ

Elsinoe fawcetti, Sphaeloma fawcetti, Sporotrichum citri, Cladosporium citri, Sphaeloma citri (S). *Scab des agrumes, Maladie des verrues* (F). وصم يصيب اكثر انواع الحمضيات في اثنائها واوراقها وثمارها . سببه فطر مجهري يعيش ويتكاثر على التلمي الغنية عندما يكون معدل الحرارة نحو ٢٠ درجة ستيفراد . لذلك فهو نادر الجوز في القلم حوض البحر المتوسط . مظهره الخارجي يقع صغيرة تملأ نصل الأوراق الغنية عند



لشك



لصف الثمار والاجاص



لصف الحمضيات



لصف البندورة

٢٤٨٦٠ - نُصُوفُ الزَّيْتُون * ٥

Gloeosporium olivarum (S). Lèpre des olives, Galla (F).

فطر مجهرى يظهر في آب ويبلغ أوج انتشاره في أواخر أيلول، يركب الثآليل فيشوها ويصطبها || مظهره الخارجي بقع مستديرة تركب غلاف الثمرة فتسبب انغراس السطح ثم الصداع البثرية وغيرها جادة لزجة يرتفالى تنصرف إلى السمرة مع الرطوبة || يكافح باستعمال أحد المبيدات الحماية.

٢٤٨٦١ - نُصُوفُ القُرَيْيَات * ٥

Gloeosporium caulivorum (S). Anthracnose des légumineuses (F).

فطر مجهرى واسع الانتشار يصيب بعض نباتات الفصيلة القرنية، أخصها النفل والبرسيم والقمصة والعرن || يركب السوق ويمالئق الأوراق فيوشها بنقع حطية ثم سمراء اللون تصدع البشرة بمد ارتفاع التسقيج وانفلاحة || يكافح بتطهير البذار بمحلول سلفات النحاس المركز ١ ٪ بمد تغيير موقع الزراعة.

٢٤٨٦٢ - نُصُوفُ الكَرْمَةِ * ٥ ، سُودِيدُ الكَرْمُون

Gloeosporium ampelophagum (S). Anthracnose de la vigne (F).

فطر مجهرى يتطفل على الأوراق والسروع والمناقيذ فيصطبها ويقع بها أثنه الأذى || مظهره الخارجي بقع صغيرة، مستديرة ، لا قياسية التصنيع ، تركب فصل الأوراق. قتل حطية، قطرها من ١ إلى ٤ م. ثم تتسع فينحرف لونها إلى البياض الاخير تحرق حالة فصية السمرة بنفسجية المواج ، تقضي حل التسقيج المتخارفة فتلونها وتغتها || وهو على السروع يقع مستطيلة مبيضة تركب اللحاء فتحرقها وتقتور فيها حب الشكير والذكاك || وهو في المناقيذ يقع مستديرة متخلخلة تركب الحب فتبلو حطية اللون مبيضة تكثر في المنطقة المايمة ثم تتسع فينحرف لونها إلى السمرة يحيطها إطار ضيق أسود || يكافح باستعمال سائل بورديو المخلوط ٢ ٪ أو السائل البورفوني المخلوط ٢ ٪. ومن الضروري اقتطاع وحرق السروع الموصية.

٢٤٨٦٣ - نُصُوفُ اللُّوز * ٥

Gloeosporium amygdalinum (S). Anthracnose de l'amandier (F).

فطر مجهرى يصيب اللوز في اثنائه وأوراقه وتثماره. يبدو على الثآليل قروح لثولية صغيرة ، حطية اللون تلوح بالزغب ثم تنخفض وتقتور إلى الداخل || وهو صلب الاثنان مشج يمحج لسمم اللحاء ثم يحف على حين فرة قبل اكتمال نمو الأوراق || وهو على الأوراق يثور مبيضة سمراء اللون تجف وتثمت بسمرة || يكافح باستعمال سائل بورديو أو أحد المبيدات الفطوكسية.

٢٤٨٦٤ - نُصُوفُ اللِّيمُون * ٥

Gloeosporium limeticolum (S). Anthracnose du citronnier (F).

فطر مجهرى يركب بعض أنواع الليمون أخصها الليمون الحلو والدارنج || يبدو على ثوبى الاثنان بقع حطية مستطيلة يتمايلها من نصل الأوراق بقع شديدة الغضار الاسمر تطفن النصل وتقوده الالابوك فييبس مع الاثنان. ويركب الاثران يطلوح بها. ويصيب الثآليل فيشوها ويؤلف ثوبا يمد ان يوشها ينقط حطية اللون تكلم القشرة وتقتور فيها || يكافح باستعمال سائل بورديو المركب ٣/٣ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الزيت قبل الاثران وبمد الانتقاد.

٢٤٨٦٥ - نُصُوفُ الطَّطَا * ٥

Gloeosporium albobructum (S). Anthracnose de l'hévéa (F).

فطر مجهرى يصيب المطاط في أوراقه وجذوعه فيؤذيه أثنه الأذى || مظهره على الأوراق القليلة بنقع كبيرة لاقياسية الشكل ، لونها إلى الكهية يميلوا مواج زرق. وهو على الأوراق البالغة يقع فسيحة سمراء اللون ثم حطية تنصطبها نقط سود تقضي على الأوراق فتصطبها || وهو على الجلوخ يلخ حطية مستطيلة تنصطبها بقع خضراء اللون ، قطرها نحو ٣ م. تسبب تقصين اللحاء واسوداها ثم انصداع البشرة وشلل النسج مع المصاصة || يكافح عند ظهوره باستعمال الاملاح النحاسية كما وأنه يحسن استعمال الاسمدة المعدنية التي تنشط النمو الخضري فتتولد دون انتقاد الروص.

٢٤٨٦٦ - نُصُوفُ المُرَّ * ٥

Gloeosporium musarum (S). Anthracnose de la banane (F).

فطر مجهرى يصيب الموز في ثماره النامية وللدركة فيحطبها. مظهره الخارجي بقع مستديرة أو مستطيلة سمراء اللون تركب القشرة ثم تقور فيها فتصطب الب || يكثر في المراتع الرطبة الخلة. || يكافح عند ظهوره باستعمال الفطاطير المركزة على الاملاح النحاسية.

٢٤٨٦٧ - نُصُوفُ بَمْعُورِ صَرِيم * ٥

Gloeosporium cyclaminis (S).

فطر مجهرى يركب الاثران في اثنه ثوبها فيوشها او يلونها || مظهره الخارجي بقع حطية تركب التوبج فتقبله وتركب زناد الزهرة فتقصره وتجصته. وهو على الأوراق يقع حطية لا قياسية الشكل والحجم تركب النصل فتصعبه وتشل فيه حركة التبادل التنسي || يكافح باستعمال اوكسيكلورور النحاس المركز ١ ٪.

٢٤٨٦٨ - نُصُوفُي * ٥ هو الغاليلون الايض ، اسطيه .

٢٤٨٦٩ - نُصَامَةٌ * ٥

Indhiscence (F).

Indhiscence (E).

صفة الثآليل والبلور التي لا تطلق تلقائيا عند الادراك

الناس .

٢٤٨٧٠ - نُصِيم * ٥ Indéhiscant (F). Indéhiscant (E).

نعت تعريفى يطلق على كل ثمرة أو بذرة لا تطلق تلقائيا أي طوعيا عند الادراك النام .

٢٤٨٧١ - لُطْ * ٥ Lecythis (S).

Lécythis, Marmita de singe, Quazalé (F). Monkey-pot tree, Sapumala-nut tree (E). Topfbaum (D). Maudorio dalla Colombia (I).

جلس اشجار وشجيرات من الشليات واصله الاكبات. انواعه نحو ٥٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية الافريقية والامريكية. اوراقها متعاقبة معقنة اعطليجية. ازهارها تاجية. ثمارها جراد حليه مستطيلة صميكة الجوانب. سداداتها قلسوية تنفتح من فوق تحوى حدة زرق مررة الطعم تأكلها القردة وتستهمل في بعض العلاجات الصديرية.

٢٤٨٧٢ - لُطْ * ٥

Lota (S).

Lotte (F). Lote, Eel-pout (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة النامسيات. انواعه قليلة نائف السميرات وبيضاء الانهر الزاكمة. اجسامها تطول من ٣٥ الى ٧٥ سم. حراشيفها صغيرة دقيقة لزجة. الثوبها



نُصُوفُ الزَّيْتُون



نُصُوفُ الكَرْمَةِ



نُصُوفُ البَمْعُون



لُطْ



لُطْ

متناقية معتقة كاملة أطيحية تصغر عند تجفيفها ويستخرج منها ومن لحاء السوق مادة غضائية صفراء اللون . أزهارها خاسية والفصل والبنتلات ، عديدة الاسدية ، ثمارها عنبية ، صغيرة القدة ، حلوة || اعرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

٢٤٨٨٠ - لُطْر الصَّبَاغِين (S) Symlocos tinctoria

Symlocos des teinturiers, Lotur des teinturiers (F).
نوع من اللطر البورني . مهدد البلاد الآسيوية . تجمرته تملو من مَرنين إلى سبعة أمتار . افتادها وإفانها إلى الصهبة . أزهارها عابلة ، نصلها سميك الصفحة سكري الطعم . أزهارها ضمية التجميع ، صفراء اللون ، فواحة العرف العطري . ازدهارها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٤٨٨١ - لُطْر اليابَان (S) Symlocos japonica

Symlocos du Japon, Lotur du Japon (F).
نوع من اللطر الأترشي مهدد اليابان . جنبتة تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أزوارها أبيضة مألسة . أزهارها عقودية التجميع ، لونها إلى الصفرة الباهتة . ثمارها حمراء اللون . ازدهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٤٨٨٢ - لُطْر عَشْكَوِي (S) Symlocos paniculata, S. crataegoides

Symlocos paniculé, Lotur paniculé (F).
نوع من اللطر البورني . مهدد الشرق . تجمرته تملو من ٤ إلى ١٢ م . ساقها فراء . أفانها زباء . أزوارها عابلة ؛ نصلها مسن الحافة ، خلي البشرة على صفحته السفلى . أزهارها عشكوية التجميع ، محورية الارتكاز وتاجية . لونها إلى الأبيض أو الأصفر . ثمارها كروية ، قطرها نحو ٨ سم . لونها إلى الزرقاة || ازدهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٤٨٨٣ - لُطْر عَشْكَوِي (S) Symlocos en grappes

هو الايلاك يستخرج منه مادة قوية تدعى لطرين .

٢٤٨٨٤ - لُطْرِيَات (S) Symlocaceae

Symlocacées (F). Symlocaceae (E).
فصيلة ثنائية كانت في التصنيف الماضي سبطاً مسن الاسطرقيات . أشهر أجناسها اللطر .

٢٤٨٨٥ - لُطِّيَات (F) Lécythidées

سبط من فصيلة الآسيات ، نباتاته لا قياسية الانتظام الوردي تتميز بملوحها من الجيوب الانحرافية .

٢٤٨٨٦ - لُطِيْسَكَة (S) Lepas

Lépas, Anafie (F). Lepas (E).
جنس دوبيات بحرية ونهرية من القشريات الدنيا هدايات الارجل وفصيلة اللطيسيات . أنواعها المحروقة عديدة منتشرة في معظم بحار وأبهر العالم || أجناسها صغيرة . صوبها مزندة . الحفتها خاسية القطع . ارجلها الصدرية هداية || جميعها تتصلق بانابيب كلسية المادة تشبه التوالق تشديداً على الصخور المغفورة وعلى وحاف المرجان وعلى الاعشاب العائمة والمراكب .

٢٤٨٨٧ - لُطِيْسِيَّات (S) Lepadidae

Lépadides (F). Lepadidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات هدايات الارجل . أجناسها قليلة العدد أما أنواعها فكثيرة منتشرة في جميع بحار العالم || تتميز بمعانيها التي تنشب في كل شيء مدفون من الصخور إلى الاصمأك .

إلى الصفرة تملوها زراكل مخففة . سمره اللون . تسراً في الشتاء من كانون الأول إلى شباط || لحما جيد الصنف مستحب الطعم مرغوب فيه .

٢٤٨٧٢ - لُطْ بِحَرِّي مِيدُول (F) Lotte de mer vulgaire

سمكة بحرية تدعى كواضة مبدولة ، اطلابها .

٢٤٨٧٤ - لُطَّاس (F) Molothrus

جنس طير من فصيلة الكاروجيات . أنواعه المعروفة نحو ١٢ . جميعها من طيور القارة الآسيوية . تألف السباب والمراعي وصفات مجاري الماء . نظامها الحياتي جماعي . تجميعاتها لاقياسية العدد منها الفوج ومنها السرب || أجناسها تطول من ١٧ إلى ٢١ سم . مناقبها مخروطية ، صغيرة وقوية . اجنحتها محتالة الطول . أفانها مستديرة الأطراف . أرساها معتدلة الارتفاع . أثقابها متباينة التضييق . أنثاها أصغر قدماً من ذكورها وأبهر غضابياً . وهي لا تحسن البيض بل تقصه في أعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد أكثر من بيضتين . يرفع أجناسها تبيض في موسمها الحمول من ١٢ إلى ١٤ بيضة || قويا الحشرات المختلفة وبعض البذور البرية || اعرف أنواعه وأشهرها لطلاس الماشية .

٢٤٨٧٥ - لُطَّاس المَاشِيَة (F) Molothrus pecoris

Molothrus des troupeaux (F). Cowbird (E).
مائل من اللطاس . موطنه بعض مقاطعات أمريكا الشمالية . يألّف المراعي وصفات مجاري الماء . فوجه يمد من ٢٠ إلى ٤٠ زوجاً || جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٨ سم . ثوبه أسود اللون يعلو موج أزرق في الظهر والصدر . حلقه عينه سوداء . مناقده ورساها إلى السرة السوداء . الاثنى عادته الملاج الأزرق || اخلاطه مرسة ، حنسية . قوته الحشرات وبعض البذور البرية . يرافق قطعان البقر والبيسين فيجثم على ظهورها ويقضي على الاساريع والكرزود التي تكثف جلودها || الاثنى تضع البيض في أعشاش غيرها من الطير .

٢٤٨٧٦ - لُطَّحَاتِيَّات (F) Dématiées

عمارة بطور مجهرية من فصيلة الكنتريات . تتميز ببهرها الملون الشديد السمره || أجناسها ثلاثة : الحشف والزريعة والاشابة .

٢٤٨٧٧ - لُطَّحِيَّات (F) Dematiaceae

Dématiacées (F). Dematiaceae (E).
لفصيلة بطور مجهرية من مرتبة الهيفانبات ورتبة الكروصيات . تتميز بهيئها وكنائدها السمره اللون ، بويغاتها ثنائية الخلية ، مشبيها لرحي اللؤلؤ || أجناسها عديدة تجميعها أربع حمارات : الفخيات ، الرديانبات ، الزحاميات والزاناسيات .

٢٤٨٧٨ - لُطْحَة (F) Macule

Macule, Stain, Spot (E).

٢٤٨٧٩ - لُطْر (S) Symlocos

Symlocos, Symploques, Lotur (F). Lohd tree (E). Lotbaum (D). Simploco (I).
جنس اشجار ونجيرات برية وزيينية من اللطريات . أنواعه نحو ١٦٠ . جميعها من نباتات المناطق الحارة . أزوارها



لُطَّاس المَاشِيَة



لُطْر



لُطِيَة

الطول . ميناها صغيرتان ، ناشرتان . زباناها دقيقان كسولها قمي الشكل . حنجرتها صغيرة . حنجرتها ظهورها مشحنتان بالأحمر والأسمر . ظهرها يماذي اللون ، أصفر المروق . ريشها شفافان . يبطا إلى الخلفي الأسمر . يطوقه حمار مصدق . قوائمها نسيطة ، حنطية ، سمره المولج || تألف الزوج والحفول والبساتين . قوتها ثلاث الإزهار والأوراق الفتية .



لستوم

٢٤٩٠٢ - **لُجْدَد**
Lagopède (F).
هو الجند ، الحلبه .

٢٤٩٠٣ - **لُغْرِيسُ الرُّقُوقِ**
Lyris du prunellier (F).
فراشة مزرققة مشهورة باسم أرقية الخوخ . الحلبه .

٢٤٩٠٤ - **لُكُسْتُوم**
Lagostomus (S).
Lagostome (F).

حيوان لين قاضم سجد الجنس والنوع من فصيلة الشفطيات . موطنه فياني امريكة الجنوبية . جسمه ربع القامة يطول من ٥ إلى ٦ سم . وذنبه نحو ١٨ . ظهره مقوس الشكل . رأسه عريض القامة . مقضه قصير مقطوم . سباله كثيفة الحلب الجامد . اذنانا معتدلتان بارتتان . جروانه الامامية قصيرة ثلاثية الاصابع والخلفية طويلة رباعية الاصابع . اطافره قوية حادة || جسمه قسح الحلب الاربعه يتألف من اربع رداء متراكبة فوق بعضها . مداعله ومخاربه انفاق عديدة تُمَرَّضها دهايز متصالية ، تجتمع فيها الاناث من ١ إلى ٢٠ يحافظ عليها ويحميها ذكر واحد . قوته الاشباب والجُلُود وجميع المواد النباتية يتغذى الى مدخل جحره || يعيش جماعات كبيرة العدد . تبلغ مساحة قوته في بعض مناطق الارض نحو ٤ كيلومترات مربعة .



لغوريش

٢٤٩٠٥ - **لُعْلُع**
هو اللُعْلُع الاسود ، الحلبه .

٢٤٩٠٦ - **لُغُو**
هو نباح الكلاب .

٢٤٩٠٧ - **لُغُوْرِيْش**
Lagothrix (S).
Lagothriche (F).

جنس قرد امريكية من فصيلة السبويات موطنها البرازيل والبنين وكولومبيا والبيرو || اجسامها تطول نحو ٧٥ سم . واذنانها كذلك . التواها الى الكفة السوداء المولج . شمارها ناعمة لينة ورفيرة || له نوحان بالالفان الثابت والاسراج الحبلية . قوتها الجار .

٢٤٩٠٨ - **لُغُوْلِيَا**
Lagocela (S).
Lagocle (F).

نبات عشبي بري طلي من السكيات . يطول نحو ذراع . اوراقه مركبة ، مشطية ، بحرية اللون . ازهاره خيمية النسيج لونها الى الزرق . زهوره طيبة وهي دقيقة مستطيلة حنطية اللون مرة الطعم حريفه تقيد الصدر وتقي البلغم وتقضي على الريح والمخس .



لغوليا

٢٤٩٠٩ - **لُفَّاح**
Mandragera (F).
Mandragera (E).

هو اليربوع ، الحلبه . ويدي السابرك . قيل وينسي المقد . قال الانطاكي : « وهو يسكن غليان اللهم والصفراء وسرة البول والخفغان ويقطع الاسهال والدم شرابا ويسكن الصدغان مطلقا وكذا الصداع دلاء ويبيت فيمنع السهر والقلق » .

٢٤٨٨٨ - **لُعَاب ، لَعَم ، لُعَام**
Saliva (F).
Saliva, Spit (E).
اللُعَاب واللعم غليط حاصل من افراز الفم اللعابية والخطاطة للفم . وهو نوحان : اللعاب التكني او المضمي واللُعَاب الليلي . أما اللعاب اللعابية فهي حل ثلاثة انواع : اللعابية والفكية واللعابية || أما اللعاب فهو زبد الجبل يتغذى من فيه .

٢٤٨٨٩ - **لُعَابَات**
Racines de mandragore (F).
Roots of the mandrake (E).
جذور الفلاح غراسها كثيرة النفع تستعمل في الصيدلة .

٢٤٨٩٠ - **لُعَادَاة**
Ethologie (F).
Ethology (E).
درس حياة الحيوان ونشاطه الجسموي والخلقي في محيطه الطبيعي .

٢٤٨٩١ - **لُعَانَة**
Légume tendre (F).
New green (E).
كل نبات لين من احرار البقول . واللُعَانَة ايضا ج لعاع . وفي القول المأثور « أما الدنيا سامة وبتاعها لعامة » اي قليل البقاء كالنبات اللين .

٢٤٨٩٢ - **لُعْلُ ، يَاقُوتُ أَحْمَر**
Rubis (F).
Ruby (E).
حجر كريم من الالوين المبلور الشفاف ، لونه الى الحمرة الصنائية الزاهية . اجدوه ما جاء من التبت والهند .

٢٤٨٩٣ - **لُعْلُ**
هو الحالبه ، الحلبه .

٢٤٨٩٤ - **لُعْلُع**
Réfringent (F).
Refringent, Refracting (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما تحل خصائصه كسر الاشعة الضوئية اي تغيير اتجاهها .

٢٤٨٩٥ - **لُعْلُعَة**
Réfringence (F).
Refringency (E).

اللمعة خاصة تتميز بها الاجسام الشفافة بكسرها للاشعة الضوئية .

٢٤٨٩٦ - **لَعَم**
Saliva des reptiles apodes (F).
Saliva of apodous reptile (E).
القلم لعاب الزحافات المرقطة أي العادة الاربع كالحيات .

٢٤٨٩٧ - **لُعُوَة**
Chienne (F).
She dog (E).
هي الكلبة وبهم من خصها بالكلية الحائل . قالت العرب : اجبر من لوعة واضع من لوعة .

٢٤٨٩٨ - **لُعُوس**
هو اللعاب ، الحلبه .

٢٤٨٩٩ - **لُعِيْش**
Labé (F).
Labiate, Lipped (E).
نعت تعريفي يطلق على كل زهرة مغلفة التويج كالشفتين .

٢٤٩٠٠ - **لُعَارِيْصَة ، لُؤْهَارِيْصَة**
Logarithme (F).
Logarithm (E).
علم انساب الاعداد .

٢٤٩٠١ - **لُعَاسُ المُرُوجِ**
Lygus pratensis (S).
Lygus des prés (F).

حشرة غاصلة من فصيلة الضفصيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٧ م . ثوبها متراكب الشقعة والصفرة وممشج ابيض واسمر وآخر . رأسها صغير عرم . غطوها مثل

وهو على الدورات وشاح أسمر اللون ويلحف البشرة بكاملها أو يمزج منها فيطليها ويتلفها || يكافح باستعمال احد الفواطير الحديثة أو لحول بورديو المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو
كلس حراق ٣ كيلو
مساه ١٠٠ لتر

ومنهم من فضل محلول « بوردينيون » المركز على الشكل التالي :

سلفات النحاس ٣ كيلو
كربونات الصودا ٣ كيلو
مساه ١٠٠ لتر

٢٤٩١٨ - لَفْعَةُ الْبَيْضِ *

Phytophthora nicotianae (S). Black shank (E).

وصم يسيبه فطر مجهري يركب البتخ في المشط وفي الحقل. مظهره الخارجي على شتول المشط يبدأ باسوداد ويقتل السخنج والجذور ثم ينتهي بالمريان والاصفرار || وهو على شتول الحقل، في اول عهد، يبقظ تظهر على الاوراق بيضية الشكل ، لا قياسية الحبيبي . لوها اشد اخضراراً من النسيج الذي يحويها ثم يتحول تدريجياً الى الشقرة فالصبغة الفاسدة ضمن إطارات خفيفة فاصلة قليلة الوضوح . وفي دوره النهائي يذبل الاوراق ويمطب السوق ويسبب اسودادها من السخنج وصاعداً على ارتفاع ٢٠ او ٣٠ سم. وعند شق او فلق الشتل المصابة يبدو مكها جافاً متفصلاً متقطعاً اسود اللون || يكافح في المشاتل باستعمال الفواطير المركزة ضد النحاس او الزنك ويكافح في الحقل باجتناب الزراعة في المواعيد الرطبة .

٢٤٩١٩ - لَفْعَةُ الشَّمْسِ * Coup de soleil (F). Sun scald (E).

عارض يسبب لهاء الاجنار في خلايا نسيجها البشرية والبياتية سببه اشعة الشمس الحارقة التي ترشفها وتستهويها قسراً لهاء السوق الممرضة الى الجنوب ثم يدركها البرد القارس فبجأة ينمطها ويسبب يباسها || يكافح بلسلي السوق بالكلس لان اللون الابيض يمنع تخزين الحرارة .

٢٤٩٢٠ - لَفْعَةُ الصَّبَّارِ ، لَفْعَةُ النَّفَمِ *

Phytophthora cactorum, Ph. omnivora (S). Pourriture du collet, Maladie des semis du hêtre (F). Crown-rot, Omnivorous phytophthora disease (E). Kragenfäule, Keimlingsfäule (D).

وصم مقل يسيبه فطر مجهري يركب مختلف النباتات الحسنة ومشاتل النباتات الحرجية ويمتري النشم بمصفه فيسببه . مظهره الخارجي يبقظ شقر ثم سم ، لا قياسية الشكل والحجم تقلب فيها الاضطالة ، تلعب بالنسج فتصيبها || يكافح كثيره من تطور اللعنة بمركبات النحاس او الزنك .

٢٤٩٢١ - لَفْعَشْ * ، لَفْعَاشْ *

Diethodius (S). جنس اسماك ثورية من مفتوحات المثانة وفصيلة السلسميات. انواعه المعروفة قليلة العدد اجسامها مستطيلة ، ملامحها محدبة ، اعطائها مقلقة . سهها صغير القد برياني الطرف . اشهر انواعه لفش التيل الذي يطول نحو ٦٠ سم. ثويه الى الخضار اللقيح الموج .

٢٤٩٢٢ - لَفَّالُونَ *

Cuscute (F). هو الكشوث ، الحلبه .

٢٤٩١٠ - لَفَّاشَةٌ *

Salmo salvelinus (S). Omble, O. chevalier, Salvaïn (F). Char (E).

سمكة ثورية بيض من السلسميات ، اعطائها منظم بجيرات اريوية وتركيا || جسمها كبير القد ، يطول نحو ٨٠ سم. ثوريا ، عند اكثال نموها ، ثنائي الين ، ظهرها والقمم الاكبر من جانبيها الى الربعة الخضراء . بطنها وما تبقى من جانبيها الى الصغار البرتقالي يملو موج ردي يبق عند حافة البطن . اما ثوريا في طور النمو فكثير النقط البيض || لحمها فاخر الصنف يعتبر من اجود لحوم اسماك المياه العذبة .

٢٤٩١١ - لَفَّالَةُ الْوَرْدِ *

Blennocampa pusilla (S). Rouleuse des feuilles, Tenchrade des feuilles du rosier (F). Rose leaf sawfly (E). Kleinste Rosenblattwespe (D).

حشرة من الفطريات، جسمها صغير القد اسمر اللون . يرقاتها مستعدة ليراء اللون تميش على-ورق الوردة فتلفه وتلتصق به ثم تدوده وتقتي عليه .

٢٤٩١٢ - لَفَّافِيَةٌ *

Diptosiene (F). جنس ثنائيات جنبيه من السليبيات تدعى عيته ، اطليا .

٢٤٩١٣ - لَفَّتْ *

Brassica rapa (S). Rava, Navet (F). Rape, Turnip (E). Wasserrübe, Welsche-Rübe (D). Rapa (I).

بقلة زراعية من فصيلة السليبيات . جذرها مستدير الشكل مقلطم ، يؤكل طرياً ومطبوخاً وغلاً ، ومنه ضرب علفية كبيرة تأكلها الابقار والخنازير || جذره زيتية طيبة تحوي بعض الفسفور والمواد الحرجية المحببة . وقد شاع استعمالها للاعطاء منذ زين الفراعنة الذين اطلقوا عليها اسم (دجم) اي زر اللقت او زيت زر اللقت.

٢٤٩١٤ - لَفَّتْ بَرِّي *

Raponce naine (F). هو الفتيوه الرشيمة ، اطليا .

٢٤٩١٥ - لَفَّتِيَّة *

Napiforme (F). Napiform (E). تمت تعريفه وصي يطلق على الجذور القصيرة المستطلة التي تشبه اللقت .

٢٤٩١٦ - لَفْعَةٌ *

Phytophthora جنس فطور مجهري من مارة الرصليات وفصيلة الصنائيات تتميز بنمطها البولية الناجية الاكثاز والتشمب || انواعها عديدة . اشهرها واغبرها للاقتصاد الزراعي لفعة البطاطا ولقعة البتخ ولقعة النشم .

٢٤٩١٧ - لَفْعَةُ الْبَطَاطِ *

Phytophthora infestans, Botrytis infestans, B. devastatrix (S). Mildiou de la pomme de terre (F). Potato blight (E). Kraut-und knollenfäule der kartoffel (D).

وصم وريح المادية يسببه فطر مجهري يمتري معظم نباتات الفصيلة الباذنجانية واعصها البطاطا والبننور || يركب الورق والسوق والجذور والدرنات . مظهره الخارجي على الارواق يبقظ لا قياسية الشكل والحجم تبدو خطية اللون ثم تتحول الى السرة يقابلها على صفحة النصل السفلي غبار ابيض فسجاني ، يطو حثار البقع فيمدها ويستقر بعض الرقت ان او يشمل القليل كامل النصل فيطوح به .



لَفَّاشَةٌ



لَفَّالَةُ الْوَرْدِ



لَفَّتْ (١)



لَفَّتْ (٢)



لَفْعَةُ الْبَطَاطِ



لَفْعَةُ الْبَطَاطِ



لَفَشْ



لقوت المتوسط

Pompilus (S). ٢٤٩٢٩ - لِقْ - * ٥ ، لِقْة *

Pompil, Centrolophe (F).
جنس حشرات من فصيلة اللقيات . أنواعه عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها متوسطة القد هيئات الجسم تطول نحو ٣ سم. ألوانها إلى السواد اللامع يعلو تجلج معرق أحمر اللون أو أصفر. تتميز بقصبتها وتهدرها الناكب التي تدورها في مكانها كذا لبنها الخديث النقب .

Inoculum (F). Inoculum (E). ٢٤٩٣٠ - لِقَاح

الجرثومة النقية الصالحة للتلقيح .



لقية

Vaccin (F). ٢٤٩٣١ - لِقَاح ، طْعَم

Vaccine matter (E).
نوعية محدودة الفاعلية النسبية تحقن في جسم الحيوان لوقايتها بعد حدوث اللقطة المقصودة .

Eteules, Glanure (F). ٢٤٩٣٢ - لِقَاط ، لِقَاعَة

Gleanings (E).
ما يخطئه الحاصد من السبليل تحتلظه الناس .



لقير

Colaptes (S). ٢٤٩٣٣ - لِقَاط * ٥

Colaptes (F). Flicker (E).
جنس طير من فصيلة القناريات ورتبة المتسلقات. أنواعه المعروفة ستة جميعها أمريكية المهد إلى أجسامها معتدلة القد تطول من ٢٧ إلى ٣٠ سم. جسمها مخروم من ٤٠ إلى ٤٥ سم. ألوانها إلى السمر والبغلة والمروقة بالأصفر والاحمر والأشهب. تتميز بتقيدتها المستمرة القواعد وباراسها المستطيلة في قوتها الأسرع والديان والتمل وأغشحات وتلار البرية والبلور والباطور . وهي من الطيور الخازنة التي تجمع البلوط في تجاويف الأشجار ويحبونها قوتن بذلك مونة فصل الشتاء . أنثاها تمث في تجاويف الأشجار وفي صلعونها وتبيض من ٦ إلى ٧ بيضات على مرتين في الحول . الصغار تسرح في طب القوت بعد التفنق بأسبوعين . أشهر أنواعه المعروفة :

Colaptes chilensis (S).

Colaptes du Chili (F).

Colaptes mexicanus (S).

Colaptes du Mexique (F).

Colaptes auratus (S).

Colaptes doré, Pic doré (F).

لقاط الشيلي

لقاط المكسيك

لقاط ملعب

٢٤٩٣٤ - لِقَاعَةُ الْعُلْجُومِ *

Hypoderma bovis (S). Hypoderme du bœuf, Varron (F). Ox warble fly, Cattle grub (E). Dasselfliege (D).
حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ١٢ إلى ١٥ سم. وهي كبيرة الرأس ، قصيرة الطعم ، مستطيلة المزد. تتميز بكبها على ظهور البقر فيتنف عن رقات غريبة حليية تنقلها البقرة بلسانها من جلد البقر إلى حلقها فليتها حيث تنسل وترتي حتى التسج الجلدية تنقب الجلمع مع انتهاء دورها البرقي وتنسقل على الأرض تختبئ في التراب وتنسل إلى كروم ثم إلى حشرة تلمد سيرتها الأول .

٢٤٩٣٥ - لِقَاعَةُ الْعُلْجُومِ *

Lucilia bufonivora (S). Lucille du crapaud (F).
حشرة من الصيديات ، طولها يراوح من ٨ إلى ٨ سم. ألوانها إلى الخضار القاتم تكثر في الأماكن الرطبة . رقاتها طفيلية تركب جميع الضفادع أصحها العُلجوم .



لقاعة البقر

Lophotes (S). Lophote (F). ٢٤٩٢٣ - لَقُوت *

جنس املاك بحرية من فصيلة المتصليات. أنواعه المعروفة قليلة العدد اصطناعا بحار البلاد الحارة والمعتدلة . أشهرها لقوت المتوسط .

٢٤٩٢٤ - لَقُوتُ الْمَتَوَسِّطِ *

Lophotes capedianus (S). Lophote de la Méditerranée (F).

لوع من اللقوت وهو سمكة بحرية مأكولة لها متوسط الصنف . جسمها مبسط الشكل يطول نحو ١٥٠ سم. زعنفتها الظهرية تمتد من قلة الرأس إلى طرف الذنب وتلحي عند الرأس بقرن عذب غرويطي الجسم عظمي المادة . ثوبها إلى الخضار الرصاصي تلوو رقعة بيضاء .

٢٤٩٢٥ - لَقِيعُكَة *

Laphygma toxigus (S).
فراشة من فصيلة الليليات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. جسمها نحو ٢٥ سم. جسمها وروشتها الأصباغين إلى الرمادي العايق . ورشاتها الخلفيان إلى البياض الأفر ، اطارها وأعصابها سمر . الأني أكبر قدأ من الذكر تمتد مكبها الذي يد نحو ٥٠٠ كتأ متفرقة لا قياسية الشكل والعدد على صفحات أوراق القطن المغل فيتنف به منته بثلاثة أو أربعة أيام من رقات تسلم خمس مرات . طولها البرقي يدم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وقد يطول أكثر من هذا في الشتاء . ثم تتحول في البرية إلى حوراء . أجسامها الحولية مدنية ، الصبي يدم نحو ٣ أسابيع وللشوي من ٤ إلى ٦ أسابيع . رقاتها تدعى دودة القطن الخضراء ، الملهبا .

٢٤٩٢٦ - لَقِيعُكُوز ، لَقِيعُكُوز

Lévilose (F).
Levilose (E).
ضرب من السكر ينشئ إلى فئة الفلوكوز يوجد في معظم ثمار الفاكهة وفي اللسان واللسل .

٢٤٩٢٧ - لَقِيعُوم ، هَوَيْسَة ، أَمْ هَوَيْس

Lophomyia imhausi (S). Lophomyia d'imhaus (F).
حيوان لبون قاصم من فصيلة القميبيات . موطنه يمتد من حوض البحر الأحمر إلى الحبشة . يألف الزير والأفدال والحراج المتجاودة الأشجار . ملجته الحيائي جامي . جماداته قليلة العدد إلى جسمه مستطيل الشكل ، يطول نحو ٤٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. يتميز بكشف في ألوير المستطيل الخشن تمتد من قطن الرأس إلى أواخر الزام الثالث من الذنب . رأسه صغير القد ، مخروطي الشكل ، مبسط الجرم . سباله كثيف مستطيل . مينا وأذناه صغيرة. قوائمها قصيرة ، خاصة الأصابع . ثوبه إلى الكلبة السوداء مملعوا تمسح الفير في الرأس والظهر والبطن . طرف ذيله أمرط عادم الزير . مسرجه دهوي . يتسلق الأشجار بشفة السنباب . قوته الجلود والأوراق والحبوب والبلور .

٢٤٩٢٨ - لَقِيعُومِيَّات *

Lophomyiidae (S). Lophomyiidae (F).
فصيلة حيوانات لبونة من رتبة القرواصم . اجتماعها وأنواعها قليلة العدد . اصطناعا يمتد من حوض البحر الأحمر إلى أفريقية الشرقية والحبشة والسودان وأفريقية الوسطى . أجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، كثيفة الزير ، مستطيلة السبال والأذنان الكاسية . قوائمها قصيرة ، خاصة الأصابع . حادة البرائن القليلة التنجيم . جميعها شاجرة . قوتها الجلود والأوراق والحبوب والأمار وبعض البلور .

Glanage (F). Gleaning (E).

لَقَط ٢٤٩٤٦
اللقط واللقاط هو جمع السنايل التي يغطها الحاصد فتبقى في الحقل بعد الريجاد .

٢٤٩٤٧ - **لَقَطَكَة**

و بقلة طيبة تبعها الدواب هـ ج . لقط .

Défaut apparent (F).

Visible default (E).

٢٤٩٤٨ - **لَقَع**

العيب الظاهر .

Happer (F). To snatch (E).

٢٤٩٤٩ - **لَقَفَ**

Parol (F). Coat (E).

٢٤٩٥٠ - **لَقَفَ**

القف جانب البئر والحوض هـ ج القاف .

Ciconia (S).

٢٤٩٥١ - **لَقَلَقَ - لَقَلَقَات**

Cigogne (F). Ciconia, Stork (E).

للقلق ج . لقلق . جلس طير من فصيلة اللقلقيات ورتبة طوالب الساق . صوته لقلقة . أنواعه خمسة جميعها من القواطع طويلة السيقان والاذنات والناظير . قوتها الاقاعي والبرذآن والخشرات والجيف والنايات || اشهر انواعه .

٢٤٩٥٢ - **لَقَلَقَ اَبْيَضَ * ، بَلَارَاجَ ، اَبُو حُدَيْج**
Ciconia alba (S). Cigogne blanche, C. commune (F). White stork (E).

نوع من اللقلق ابيض الثوب ، اسود القوائم ، اجر الساقين والمنقار . طوله نحو ١١٠ سم . وبسطه نحو ٢٣٠ سم . مسرعه يمتد من ايران الى العراق وآسية الصغرى وأروبة وإفريقية الشمالية والجنوبية والشرقية حيث يعطي فصل الشتاء ثم يجر البحر الى ايران والعراق .

٢٤٩٥٣ - **لَقَلَقَ اسْوَدَ ، تَلْعَلَعَ ، عَنَزَ ، اَبُو سَعِيد**

Ciconia nigra (S). Cigogne noire (F). Black stork (E).
نوع من اللقلق طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢١٠ سم وهو اسود الثوب ، ابيض الكتفين والذنب والصدر والبطان والاذنات ، اجر الساقين والمنقار . مسرعه يشغل الهند ومنشورة وآسية الصغرى وأروبة وإفريقية .

٢٤٩٥٤ - **لَقَلَقَ اَلْاَقَاعِي**

هو الكريم المتوج ، اطلبه .

٢٤٩٥٥ - **لَقَلَقَ حَمَلِيَّ * ، عُنَاز**

Ciconia abdimii (S). Cigogne d'Ethiopia (F). Ethiopian stork (E).

نوع من اللقلق ، طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه نحو ٢٠٠ سم . ثوبه الى السواد الابيض المواجه . بطنه ابيض . رأسه وقوامه سود . حقه ومقار وساقاه حر . يكثر في الجبفة ويحجب معظم الاقطار الافريقية .

٢٤٩٥٦ - **لَقَلَقَ مَسْرُوجَ المِيطَلَر**

هو الكثير الاثري ، اطلبه .

٢٤٩٥٧ - **لَقَلَقِي**

هو الطير هـ اطلبه .

Ciconiidae (S).

٢٤٩٥٨ - **لَقَلَقَات**

Ciconiidae (F). Ciconiidae (E).

فصيلة طير من طوالب الساق ورتبة باشويئات الشكل . انواعها المروفة ١٧ بعضها ابد اعطانه البلاد الاستوائية وحارة والبعض الآخر قاطع يحجب البلاد في طلب المصيف والمشي || ملجئها الحيائي زوسمي وجاهي . قوتها الصفاد

٢٤٩٦١ - **لَقَاعَةُ حَمَلِيَّة**

Lucilla sericata (S).

Lucille soyeuse (F).

حشرة من الصدينيات ، طولها براوح من ٧ الى ١٠ مم . جسمها خلي البشرة يكثر ويبدوها من اذار الى تشرين الثاني . رقاتها هواكة وثائلة وقد تكون وانجة وطفيلية .

٢٤٩٦٧ - **لَقَاعَةُ قِصْرِيَّة**

Lucilla caesar (S). Lucille impératrice (F).

حشرة من الصدينيات ، طولها براوح من ٧ الى ١٢ مم . تظهر من نيسان الى تشرين تكثر على الازهار والاقطار المعرضة لاشعة الشمس ، رقاتها وانجة وهواكة . تركيب الحيوانات القفارية .

٢٤٩٦٨ - **لَقَاعِيَّات**

Calliphoridae (F).

هي الصدينيات فصيلة حشرات ذبابية من ذوات الجناحين .

٢٤٩٦٩ - **لَقَلَقَات**

Freluche (F). Butterfly-net (E).

جيب ، غمرطي الشكل ، من النسيج الناعم اللين ، يستعمل لاقتراس الحشرات والذراشات .

٢٤٩٦٠ - **لَقَاعَة**

Phagocytosis (F).

Phagocytosis (E).

عمل ارتشاف المحتامات والجراثيم التي تقوم به بعض الحبيريات الحيوانية .

٢٤٩٦١ - **لَقَاعَة**

Phagocyte (F). Phagocyte (E).

اللقاعة حبييرة في الجسم الحيواني وظيفتها القاعة . وتسمى راعية وقافوسيت وعضامة .

٢٤٩٦٢ - **لَقَاعِيَّات**

Phagocytaires (F).

Phagocytic (E).

نمت ترميمي يطلق على كل ما هو خاص بالقاعة .

٢٤٩٦٣ - **لَقَعَة سَوْدَاء**

Centrolophus nigrus (F).

سمكة بحرية تدعى رطمة ، اطلها .

٢٤٩٦٤ - **لَقَس**

Epinephelus (S).

Epinephelus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصراثيات ورتبة شالكاك الزنائف . انواعه المروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اجسامها اهليلية الشوزن ، متوسطة الحجم ، مستطيلة الرؤوس ، مقطوعة الاضلاع ، مسنة الزنائف الاسامية في الظهر والبطن . اثنائها كسنتية اللون تملوها رقشة ملونة وبعض الاماجات الزاهية والمابقة || اشهر انواعه القس الجبار والصغري والردي .

٢٤٩٦٥ - **لَقَسُ جَبَّار * ، مَرَّانَ جَبَّار**

Epinephelus gigas (S). Epinephelus géant, Serran géant, Marou (F). Epinephelus gigas (E).

سمكة بحرية يمرض من القس . اعطائها البحر ابيض المتوسط . جسمها كبير القد اهليلي الشكل ، يطول نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الجوزة المنطية السمره المواجه تملوها رقشة لبراه منسوبة التوزع تكتنفها من الراس الى الذنب || رأسها مخروط الخيل الاضلس . فكاهها كيربان .

شدها رجب . حينها كيربان ، صفدات الشوزن . زعانفها الظهرية والمنزجية مستطيلة يعلوها في اقسامها الاول منامس حادة ، زعنفتها الذيلية متفرجة الطرف المستدير || لحمها متوسط الصنف ، ما كويل .



لقاعة قيصرية



لقس جبّار



لقلق ابيض



لقلق حشي

حايقة. تحمل في مؤخر اجنحتها الخلفية زوائد دقيقة. مكبا مستدير الشكل. ذري القند. رقابها قصيرة غليظة تستطيع اخفاء رؤوسها تحت حلقائها الصدرية الا انزل. غادرتها عاريات. بيائها لا يقاسي النمط والشكل يختلف مع الاجناس. فيه التندب المائلة بلمرورها والمطوقة المائلة بيائها والمنطقة والسليمة. البع.



لقمة الحمل الحبيفة

٢٤٩٦٧ - **لِقْمِيَّةُ الْبَازِيلَا** * *Lycaena baetica* (S).
Licène des pots (F).
حشرة من القنليات كثيرة الانتشار وسعيدة الجبل الحولي. اقلها حوض البحر المتوسط. يستعمل نحو ٣٠ م. ثوبا الى الزرقاء الجسدية يملو موج خلي واطار اغبر في الذكور، اسر في الاناث. قرونها الاستشعارية دقيقة، قوسية الشكل، صقبة الطرف || رقابها عند اكبال تطردسا تطول نحو ٢٠ م. ثوبا الى الخضار المائل يملو موج بني لا يخلو من الاحمر وسط اسر قاطب وتطوط جانبية متعرجة غيرا اللون || تركيب البالزا والباقي و اكثر القنليات. تموش لدخل السقات تلهم الحب وتقضي عليه.

٢٤٩٦٨ - **لِقْمِيَّةُ الصَّعْتَر** * *Lycaena arion* (S).
Licène arion (F).
حشرة من القنليات صغيرة القند، زرقاء اللون، مزرقة الرواشن. اناثها اكبر تما من ذكورها واهي لونا وقل زواكش || رقبها دقيقة الجسم سمراء اللون وودية المروج. تركيب الصعتر حتى السلاخها الرابع ثم تقسم قري السل قتلهم الرصع.



لقمة النجمة

٢٤٩٦٩ - **لِقْمَةُ** * *Aigle femelle* (F). She eagle (E).
الغاب الاثني.

٢٤٩٧٠ - **لِقْمِيَّات** * *Leucosilides* (S).
Leucosilides (F).
فصيلة دوبيات بحرية من القنليات عشاريات الانجل بحرجمات الاقواء || اجناسها وانواعها قليلة العدد، نحو ٥٠، منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صغيرة بيضية الشوزن او مكورة. معدودة الطهر، مفرصة القفم والخضر. ملاصقتها دقيقة، مسطيلة، سننة الشفار الداخلية.

٢٤٩٧١ - **لِقْمُوطَة** * *Leucothoe* (S).
Leucothoe (F).
الاسم العلمي من الميثروبييا الافريقية. جفس جنبات برية وزراعية تربيته من فصيلة الخنجات، منها بعض الاصناف الامريكية. سوطها متصبية تلو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقتها متعاقبة، سننة الخمار. ازهارها خاسية الفسل، اسطوانية التويجات، مشارية الاسدية، يكثر فيها اللون الالبيش || انواعها المعروفة عديدة، اشهرها التالية.



لقمة البازيلا

٢٤٩٧٢ - **لِقْمُوطَة حَسَفَة** * *Leucothoe catesbaei* (S).
Leucothoe spinulose (F).
نوع من القوطة التربيته. ساها غراء تلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. اوراقتها متعاقبة. انتالها الى الحمر. نصالها اهلجية ذرية سننة الخمار، مسطيلة الانسان الحسفة الشاككة. ازهارها غمي التجميع، محوري الارتفاع. ازهارها بيضاء اللون، نلثة العرف التله || تنويرها يستمر طوال شهر ايار.



لقمة الصعتر

والغذاء والشعابين والاسماك والقنريات والقنويات الصغيرة والحشرات. بعض انواعها، اخصها الكثير، يعيش على الجف وقد يمتد في النور التي تخشاء عندا تصيب جيفة || اجسامها عصبية متباينة الهجوم، منها الوسطى والكبيرة. تتميز باستطاعة القنويات والمنقذ الكبرية، المستقيمة، الدرية، الوشيبة الشكل. جميعها بكية، عادة الهاز الصلوت || تدلن اعشاشها في المواقع الرطبة وفي اعالي الانجار الباسقة. اناثها تقص من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوية الاكور من ٣ الى ٥ بيضا.

اشهر انواعها القلق الالبيش، والاسود، والخبثي، وتلقن الافاعي المعروفة بالكرم المتوج، والكثير، والسظام، والارطل المعروف بابي من.

٢٤٩٥٩ - **لِقْمَةُ** * *Condyle* (F).
نوع المفاصل او حيد مستدير في الطام.

٢٤٩٦٠ - **لِقْمَةُ الْحَمَلِ، لُوتِي، تَمُول** * *Alternanthera* (S). *Alternanthera* (F). *Chaff-flower* (E). *Weckelskölbchen* (D). *Alternanthera* (I).
جنس نباتات برية وزراعية بقلية من فصيلة القنليات. انواعها نحو ١٠ جميعها اعشاب حولية او معمرة. اوراقتها كثيرة العدد لا يقاسية الشكل والجمع. ازهارها مزرورة عمادة العلالرة يكثر فيها اللون الالبيش. اوراقتها صحية تنفع المدة.

٢٤٩٦١ - **لِقْمَةُ الْحَمَلِ الْعَفِيَّة** * **لِقْمَةُ** * **الْفَرْكَل** * **تَمُول لَاطِي** * *Alternanthera sessilis* (S). *Alternanthera sessile*, *Brède-chevratte* (F). *Sessile flowered globe amaranth* (E). *Garnelekrout* (D). *Alternanthera* (I).
نوع من لقمة الحمل اوراقتها كبيرة القند لافطة. توكول مطبوخة. تنفع المدة وتفيد النضر.

٢٤٩٦٢ - **لِقْمَةُ الْقَاضِي** * *Ottelia* (F).
هي اذن الشيطان، اطلبها.

٢٤٩٦٣ - **لِقْمَةُ التَّمْجَة** * **كَبَاش** * **مِخْبِطَة** * *Plantago ovata* (S). *Plantain* (F). *Spogel plantain* (E). *Spogel Wegerich* (D). *Lingua d'angelino* (I).
نوع من لسان الحمل وهو نبات عشبي، مقري، بري، طبي، معمر، يكثر في المواقع الرطبة.

٢٤٩٦٤ - **لُقْن** * *Lutage* (F). *Luting* (E).

٢٤٩٦٥ - **لِقْمَة** * *Lagune* (F). *Lagoon* (E).
القنة كل بحر قريب اللآح وقد تكثر فيه الحشاش والخورم. ج ليقنا.

٢٤٩٦٦ - **لِقْمِيَّات** * **هَرْمِيَّات** * *Lycaniden* (S). *Lycaniden*, *Lycinidés* (F). *Lycaniden*, *Hainstreake*, *Gossamer wings* (E). *Blau-linge* (D).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. اجسامها متوسطة القند، قوامها الانامية ناقصة التركيب. اسراع ذكورها صيدة القلة. قرونها الاستشعارية تفلظ مع ابتعادها عن الرأس. انواها

Chêne chevelu (F).

٢٤٩٨٢ - لُكَاك

هو السديان الأشعر ، اطلبه .

٢٤٩٨٣ - لُكَاك ، لُكَاكَة

دله يأخذ الثمن في اشتها ولفها وهو مثل القرح .

٢٤٩٨٤ - لُكَاك

للكاك : الحجر البراق الاملس يوجد في الجص .

Lachesis (S).

٢٤٩٨٥ - لُكَاكَة

Lachésis (F). Lachesis (E).

جنس حيات سرلوة سامة من انبويات الاحادية وفضيلة الالفيات . انواعها المروفة نحو ٤٠ موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى اخصها المناطق الاستوائية || اجسامها كبيرة تغطي من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . رؤوسها غليظة شبيه برؤوس ذوات الاجراس وتحتل مثلها بنقر واضحة بين العين والاذن . احوالها دقيقة واذناتها كذلك . اذناها تحمل من ١٠ الى ١٢ صف من الحراشف الشاذكة المنقطة كالكلاليب . احوالها تختلف مع الانواع معظمها مرقط بالاصفر والاحمر والاشقر والاشهب || اشهر انواعها الكَاكَة الصاعدة والكَاكَة السانبة .

٢٤٩٨٦ - لُكَاكَة سَيَايِيَّة * ، سَيَايِيَّة الرُوم *

Lachesis botrops (S).

Lachésis lancolé, Fer de lance (F).

نوع من الكَاكَة . موطنها جزر الفيليبين . تألف الغابات والمواقع الرطبة . يكثر ويصيدها في زراعات المصان والموز . قوتها القتران والجردان والصفاد والظاء والتانير الصغيرة والعير || جسمها يغطي نحو ٢٠٠ سم . ثوبها الى الصفرة النحاسية الموج . سمها ناعم . لدغها تقضي على الانسان باقل من ثلاث ساعات .

Lachesis mutus (S). ٢٤٩٨٧ - لُكَاكَة سَامِيَّة *

Lachésis muet (F).

نوع من الكَاكَة . موطنها بعض مناطق امريكا الاستوائية . تألف الغابات الرطبة ولا تقترب من الاماكن الآمنة . قوتها كل ما استطاعت اليه من حيوان وطيء || جسمها يغطي نحو ثلاثة امتار . ثوبها يراوح بين البرتقالي والاربعوني تلويع تزاويين سود ورفقة شهاب . سمها زائف . لدغها تقضي على الانسان باقل من ساعة .

Odynerus (S).

٢٤٩٨٨ - لُكَاك *

Odyneré (F). Odynerus (E).

الواحدة لكَاكَة . جنس حشرات قاضية وثامة نافعة من الحمولات غشائيات الاجنحة المحصورة وفضيلة الدغاسيات . انواعها المروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم . || اجسامها متوسطة القد وحوادثها كذلك . احوالها ملونة يكثر فيها الاسود المجلع بالاصفر او الالواني او البرتقالي وبعضها جلوي مجلج بالاصفر الذهبي ومنها الاحمر القرميدي المجلع بالاصفر الكبريتي والاسود || تصفن في التربة والحيطان والاشجار النخرة وفي سلايات القصب . اصنافها رداء رحيمة خروطية المداخل المستطيلة || قوتها الاساريخ وللدغاصيص ققتنها فتفخدها وتنقلها الى اصنافها زائد لها وليفاتها .

Rhapis (S). Rhapis (F). ٢٤٩٨٩ - لُكَاك * ، رِيَسِي *

الواحدة لكَاكَة . جنس نباتات زربية من فصيلة النخلات .

٢٤٩٧٣ - لَقَوَظَة حَوَرِيَّة الورق *

Leucothoe populifolia (S).

Leucothoë à feuilles de peuplier (F).

نوع من القوَظَة الزربية . ساقها فراء تملو من مترين الى اربعة امتار . لفتادها عادة الحبل والزنب . اوراقها نازقة المروق على الصفحات السفلى ، طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . ازهارها حنقودي التجميع . ازهارها مستطيلة المعلق ، متدلية ، لونها الى اليباض العاصبي || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٤٩٧٤ - لَقَوَظَة سَلِيَّة *

Leucothoe racemosa (S). Leucothoë à épis (F).

نوع من القوَظَة الزربية . ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها عابلة . يضيئة النصل ، ذلقة الزمان الاخير ، تغطي نحو ٧ سم . وتعرض نحو ٣ سم . ازهارها سنبل التجميع . ازهارها صغيرة القد ، يضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

Lesciothoe Lobbi (S). ٢٤٩٧٥ - لَقَوَظَة لُوبِي *

Leucothoë de Lobbi (F).

نوع من القوَظَة الزربية . ساقها تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها اميدة ، جلدية النصل ، مسنة الحمار ، تغطي نحو ٧ سم . ازهارها حنقودي التجميع ، طرفي الازتكاز . ازهارها يضاء اللون || تنويرها يستمر طويلا شهر حزيران .

Pompilidae (S).

Pompilidés (F). Pompilidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة . اجسامها وانواعها عديدة منتشرة في جميع الاسواق الحارة والمعتدلة . قوتها ما تقتربه من الحشرات والموام . تحفر مكاهي في التربة على اصقاع تراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تنشب عنها عدة سراديب تنهي رداء مستطيلة مسحة الازنار تقع في كل ردة منها ٤ الى ٨ مكات تنقف بعد ٩٦ ساعة . اشهر اجناسها الق اطلبه .

٢٤٩٧٧ - لَقِيَس * هو ما طال زين نعيم . راجع قصب .

٢٤٩٧٨ - لَقِيَط *

Dracunculus muscivorus, Helicodicerus muscivorus (S). Serpentinaire attrape-mouches (F).

نبات عشبي اردبي بري وزيتي من فصيلة النخلات . ارضه صقوليقة مقطعة . اوراقه برتلية مستطيلة الزناد ، وريفاتها وربة التجميع نصلها ثنائي الصفحة المزركشة والمجنية بالاحمر والاصفر . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . شراخه خلي الصفحة الداخلية جلوي اللون متوسطه فية حجة تكسوها لياث شمرة الشكل .

٢٤٩٧٩ - لَقِيَطَة ، لَقِيَطَة (F).

Ophloglosse (F).

٢٤٩٨٠ - لَقِيَطِيَّات *

Ophloglossaceae (S). Ophloglossacées (F).

فصيلة من البراميس تشمل بعض الاجناس والانواع اشهرها القيققة ولسان النزال .

٢٤٩٨١ - لُك * Laque, Gomme-laque (F).

Lac, Gum-lac (E).

حصارة وراتنجية صمغية صنعتها قترنزا بعض الاشجار تلقائيا بعد حوها او بواسطة الحشرات .



لَقِيَط



لُكَاكَة سَانِيَّة



لُكَاك



لُكَاك

٢٤٩٩٧ - لُكْتُارِيُوسُ حَرِيفٌ *

Lactarius acris, *L. sanguifluus* (S). *Lactaire acro*, *L. à lait rouge* (F).
من الفطور الجعالية المؤذية يكثر في الأجراف والنباتات الغليظة في الصيف والخريف. عصارته حمراء اللون حريفة المذاق. ساقه تملو من ٤ إلى ٥ سم. حشيتة يعلوها توشيح طويلاً أحمر الملمح. قطرها يراوح من ٥ إلى ٦ سم.



لُكْتُارِيُوسُ حَرِيفٌ

٢٤٩٩٨ - لُكْتُارِيُوسُ سَامٌ *

Lactarius torminosus (S). *Lactaire vénéneux*, *L. aux tranchées*, *L. à toison* (F).
من الفطور الجعالية المؤذية يكثر في الأجراف والنباتات. عصارته بيضاء اللون حريفة المذاق. نكتة أظفئة الصفعة الملهدة، طويشة التشنيد، زهاب الحمار والحانة، لونها إلى الوردي يعلو موج أصفر وتوشيح غائب.



لُكْتُارِيُوسُ رَتَقَالِيٌّ

٢٤٩٩٩ - لُكْتُارِيُوسُ لَذِيذٌ *

Lactarius deliciosus (S). *Lactaire délicieux* (F).
من الفطور المأكولة اللذيذة الطعم. يكثر في ظل الأجراف الصنوبر والسرور. عصارته حمراء اللون سكرية المذاق. ساقه تملو من ٤ إلى ٧ سم. نكتة تجلو محمية ثم مستوية أظفئة وتنتهي مقعرة. قطرها يراوح من ٥ إلى ١٥ سم. لونها إلى الحمرة البرتقالية تملوها رقعة خضراء وأطراف مابطة.



لُكْتُارِيُوسُ حَرِيفٌ

٢٥٠٠٠ - لُكْتُارُ
هي البنات ، اطلبا .

Lactase (F).

٢٥٠٠١ - لُكْتُورُ
هي البنوز ، اطلبا .

Lactose (F).

٢٥٠٠٢ - لُكْتُوسٌ *

Lycet (S).
Lycet (F). *Lycet* (E).
جنس حشرات مؤذية من غديات الاجنحة وفصلية الكوتويات. أنواعه المروفة نحو ٢٥ منتشرة في معظم أقطار العالم || اجسامها صغيرة القدد ، مستطيلة الشكل ، وحيدة اللون السوي || يرقاتها غاشبة لكنها لا تقرب من احشاش الفصلية الصنوبرية || احرف انواعه واشهرها الكتوس الاسمر والعيطي والهند .



لُكْتُارِيُوسُ سَامٌ

٢٥٠٠٣ - لُكْتُوسُ أَسْمَرٌ *
Lycet brunneus, *Xylotrogus brunneus* (S). *Lycet brun* (F).

حشرة غاشبة من الكتوس. طولها نحو ٣ سم. قوفا إلى السمرة الحظيفة المابطة || يرقاتها تبنية اللون ، حمراء الرأس ، مستطيلة المقدم. تركيب الكتوس من الاحشاش وبنيها التبنية فتتفرها وتعضها. وعندما تتصمم من القرموس. فلها تفصله كل فذاء .



لُكْتُارِيُوسُ لَذِيذٌ

٢٥٠٠٤ - لُكْتُوسُ عِطِيٌّ *
Lycet linearis (S). *Lycet linéaire* (F).

حشرة غاشبة من الكتوس. تألف الحراج والمنازل المسقوفة بالخشب. طولها نحو ٤ سم. قوفا إلى السمرة الكستنية || لها جيل واحد في الحول. يرقاتها مقوطة ، مستطيلة المقدم ، مستعقة الخصر ، مائلة القشاش. سداسية الرؤوب ، تبنية اللون ، سوداء الرأس. تسردب مع خنافسها الشكير تحت الحما وتنتشر الاضاعة والاخشاش المصنوعة لكنها لا تقرب احشاش الصنوبريات .

انواعه قليلة العدد اصطلحها المناطق الحارة. جلوسها عنه وجودها دائمة منتظمة كثيرة ائمد ضمية التجميع تكسوها بشرة من اللين الاسمر. اوراقها مستديرة الشكل ، غوصها جبل الغفار الزاهي ، كرها مستطيل الجرم سرح الصفعة أو شالك الجوانب || والكاع يعيش في اقل الحفصيات حيث يزرع في المراكب في الحدائق الخاصة التي لا تحصى القر. يتكاثر بالفسل. اشهر انواعه التزينية ما يلي .

٢٤٩٩٠ - لُكَاةٌ قَرْمَةٌ

Rhaphis humilis, *R. strobilata* (S). *Rhaphis nain* (F).
نوع من الكاع. ساقها جمعة. تتكاثر بالفسل. تعيش في المراكب. اوراقها رقيقة الشكل. كرها منتف الشوك الاسمر المتباعد الارتيكار.

٢٤٩٩١ - لُكَاةٌ مَرُوحِيَّةٌ

Rhaphis flabelliformis (S). *Rhaphis en éventail* (F).
نوع من الكاع. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مروحية الشكل. غوصها جبل الغفار الزاهي. كرها قليل الشوك الحظي المتباعد. تزرع في المراكب والحدائق. ترطب في الارربة الدبالية اختصوة الرطوبة.

٢٤٩٩٢ - لُكَاةٌ نَاشِطَةٌ

Rhaphis major (S). *Rhaphis major* (F).
نوع من الكاع. ساقها مستندة تملو نحو ١٢٠ سم. اوراقها مستديرة. غوصها فسفي اللون. كرها سرح الصفعة. تزرع في المراكب والحدائق. ترطب في الارربة الدبالية الحفصة.

٢٤٩٩٣ - لُكَاةٌ

« شوكية تحطب لها سوقة قدر شبر لينة كائنا سير ولما فروع ملوطة شوكاً وبى خلال الشوك وريقة لا بل بها تنقيش ثم يبقى الشوك فاذا جفت ايشت » (اللسان).

٢٤٩٩٤ - لُكْتُارِيُوسُ ، لُتَبِيَّةٌ

Lactarius (S). *Lactaire* (F).
جنس فطور من الفاريتونيات انواعه عديدة منها المأكولة والجعالية جميعها دماة اذا جرت. عصارته لينة لزجة حلوة الطعم او حريفة المذاق. لونها تختلف باختلاف الانواع ، منها الابيض والاصفر والاحمر والاريد والبنفسجي || احرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٤٩٩٥ - لُكْتُارِيُوسُ أَشْفَحٌ *

Lactarius rufus (S). *Lactaire roux* (F).
من الفطور المؤذية يكثر في الصيف والخريف يعيش في ظل الصنوبر والسرور. عصارته بيضاء اللون حريفة. ساقه تملو من ٥ إلى ٦ سم. نكتة أظفئة الصفعة الملوية قطرها يراوح من ٦ إلى ٩ سم. لونها إلى الشفعة .

٢٤٩٩٦ - لُكْتُارِيُوسُ بُرْتُقَالِيٌّ *

Lactarius volemus, *L. lactifluus* (S). *Lactaire orangé*, *L. à lait abondant* (F).
من الفطور المأكولة اللذيذة الطعم. عصارته كالحليب لونا وزرنية وتنبهقا. ساقه تملو من ٦ إلى ٨ سم. نكتة تبنو قلندرية في اقل مهادا ثم أظفئة وتنتهي مقعرة بتوسطها تملو غليظ. قطرها يراوح من ٨ إلى ٢٠ سم. لونها يستمر حل الصفرة البرتقالية حتى تتغير فينصرف أذ ذلك إلى الجروي وهو يربد في النباتات الغليظة الرطبة في حمز إلى آب .

فراء اللون يملأها مزاج ذهبي، قطرها نحو ٤ سم. اطرافها مستدلة الكثافة بنسجتها اللون || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١١ - **لُكُوسَةٌ شَحِيحَةٌ** * (S). *Laccaria laccata* (F).
 Laccare laqué (F).

نوع من الككة. توجد في المواقع الرطبة. ساقها رفيعة، شقراء اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الشفحة الصفراء اللامعة، اطرافها بلون الساق || لحيتها جيدة الصنف، مأكولة.

٢٥٠١٢ - **لُكُوسٌ بَلَسْتِيدٌ** (F). *Leucopaste* (F).
 Leucoplast (E).
 هي البوصية الماددة اللون اي مواد الخلية الماددة اللون.

٢٥٠١٣ - **لُكُوسَاتٌ** (F). *Phytolaccaceae* (F).
 Phytolaccaceae (F).
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها ١٧ وانوعها ٩٠. امكانها المناطق الاستوائية والحسرة. معظم انواعها حولية ومعمرة. اوراقها بسيطة. ازهارها خشوية او ثنائية المسكن. لا تقياسية التجميع والارتكاز. ثمارها عنبية يستخرج منها صبغات اريوانية. عصارة جذورها حلابية دقية لكبة صناعية.

٢٥٠١٤ - **لُكُوسَةٌ** * (S). *Phytolacca* (S).
 Phytolague (F). Dyer's grapes, Poke (E). Gewohnliche kermesbeere (D). Fitolacca, Amaranto (I).
 جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اللُكُوسَات. انواعها قليلة منها الاشجار والجنابت والاعشاب. اوراقها كاملة متعاقبة يمشية النصل او اهليلجية. ازهارها عقنودي التجميع صغيرة القند، ملونة. ثمارها نورية غزيرة العصارة الحمراء تستعمل في سبائك الحمر. جلونها طيبة || اشهر انواعها ما يتبع.

٢٥٠١٥ - **لُكُوسَةٌ ثُنَائِيَّةُ الْمَسْكَنِ** (F). *Phytolacca dioica* (S). *Phytolague dioique*, *Belombrs* (F).
 نوع من الككة الشائعة. ثمرتها تملو من ٦ الى ١٥ سم. ساقها فراء فناء، قلقسوية القند ورافة الطل. اوراقها بيضية داكنة طولها نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٧ سم. نصلها اخضر الصفحة الجامدة ينفض في كانون. ازهارها ثنائية المسكن، مستطيلة المتناظرة الاكبرية والاثورية || تنورها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٥٠١٦ - **لُكُوسَةٌ عَشَارِيَّةُ الْأَسَدِيَّةِ** (F). *Phytolacca decandra* (S). *Phytolague à 10 étamines* (F).

نوع من الككة التزيينية. ساقها منتصبه فراء تملو من ١٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها اهليلجية سنائية، نصلها يطول من ١٠ الى ٤٠ سم. ويعرض من ٣ الى ١٠ سم. وهو رطل النسيج اجر الصفحة. ازهارها عقنودي التجميع مستطيل الشكل. ازهارها عشارية ثنائية الاسدية تلبو بيضاء اللون ثم تتشرف الى الازرقواني. ثمارها بنسجية عشارية الاصطبل || تنورها يستمر من حزيران الى اواسط الخريف.

٢٥٠١٧ - **لُكُوسٌ** * (F). *Donovania* (S). *Lachésis* (F).
 جنس حيوانات بحرية مقرنة من الرخويات مديات الاربل وفصيلة المريقيات. انواعها الممارسة المعروفة قليلة

٢٥٠٠٥ - لُكُوسٌ مُخَدَّدٌ *

Lycet unipunctatus (S). *Lycte canaliculá* (F).
 حشرة غاشية من اللُكُوس. طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الشبهة الخطية السمراء المزاج، تتبع في الرأس واللُكُوس وتزهر في غمبات المحدثين || يرقنها غيرة اللون، جزوية الرأس. حلطية الصدر، مستدلة المؤخر، تركيب معظم الاغشاب الصلبة ومنها المصنوعة، باستثناء العنوبريات.

٢٥٠٠٦ - **لُكُوسِيَّاتٌ** (S). *Lycidae* (F). *Lycidae*, *True powder-post beetles* (E). *Splintkäfer*, *Holzmehlkäfer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة طفديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد. اعطائها جميع مناطق بلاد العالم || حشراتها صغيرة القند، مستطيلة الشكل، ضيعة الانحدار الخطية، ضيقة الزباني، خاسية الفحل الرينية || يرقنها غاشية تنخر وتوردب جميع انواع الاغشاب اعصها الصلبة.

٢٥٠٠٧ - لُكُوسٌ مُسْتَطِيلٌ *

Lixus elongatus (S). **مُسْتَطِيلٌ** (F). *Lixus elongatus* (E).
 حشرة غاشية مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف زراعات الشوندر والمواقع التي يكثر فيها السرق. خنافسها تعيش على ما تقتضيه ويخصه من عصارة نصل الارواح. يرقنها تخليج الاسناخ وتوردبها فتعطها || جسمها متوسط القند يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ثوبها الى الككة السمراء يملأها طيليل جزوي. رأسها صغير الحجم ينتهي بمخك قاصر ثابت وراش. عينها صغيرتان. زباناتا مرتقبتان صولجائتان ظهرانها مستطيل الشكل، مستدير المؤخر للاش. شداهما متاهتتا التميزيز الدقيق الغالب. ارضانها رباعية المقل الفاهرة || الاثنى اكبر قدماً من الذكر ورايت ثوباً منه واطول سرماً ويتكا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع. تسرح في التبار. تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وترز المكن ميسادياً في اسناخ الشوندر وفي سوق السرق || والريقة عند بلوغها الكمال تطول من ١٤ الى ٢٢ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستدق المؤخر، عادم الرواج، مبهر الحلب، حطلي اللون، اسمر الرأس والشرج والمذبل || طور الكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة قرب النبات المائل.

٢٥٠٠٨ - **لُكُوسٌ** (F). *To prick* (E).
 لكع ولدغ ولسب واسع ونخس ونس.

٢٥٠٠٩ - **لُكُوسَةٌ** (S). *Laccaria* (S). *Laccare* (F).
 جنس فطور من فصيلة الفاريفونيات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بعض غابات وحراج مناطق البلاد المعتدلة الحاررة. جميعها مأكولة لذيلة الطعم، مستحبة المذاق.

٢٥٠١٠ - **لُكُوسَةٌ بَتَسْجِيَّةٌ** * (F). *Laccaria amethystina* (S). *Laccare amethyste* (F).
 نوع من الككة توجد في حراج السديان. ساقها رفيعة، عوياء، ليلكية اللون. اروسيتها شبه صاجية الشكل،



لُكُوسٌ مُخَدَّدٌ



لُكُوسٌ مُسْتَطِيلٌ



لُكُوسَةٌ بَتَسْجِيَّةٌ



لُكُوسَةٌ شَفْحَةٌ



لُكُوسَةٌ



لُكُوسٌ

۲۵۰۲۳ - **لَمَاجِيَة تَائِبَة** *
Clubiona erratica (S).
Clubiona erratique (F). *Erratic clubiona* (E).

هوبية من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ، سداسية الأشقان تنتمي إلى فصيلة الهابيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم . جسمها صغير القد بطول نحو ٨ م . عند التكب ونحو ١٢ م . عند التكبنة . صدرها مسطلي الشكل . أحر اللون ، أحر المروج . صينها زيمتان . شيفها ضليمان . فكها ديقان . جرازها مستطيلة ، نحيلة ، كثيفة الحب . بطها اسمر اللون ، أحر المروج ، مابك التزيم . تألف البراري والمواقع الدغلة . تسرح في النهار . مخدعها مئة بقلية الشكل والقد تسجها حيث تبث لانها جولة لا تستقر في مكان معين . قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان . بيئاتها الشتوي يستمر من ١٨ إلى ٢٠ أسبوعاً تقصيا في مكعبة جوزية الشكل ، غبراء اللون ، جامدة الحلك تسجها تحت الحجارة وفي كل مكان أمين . ملجئها الحيائي لا يختلف من ملجئ سائر العناكب . تعتبر من الدوبيات النافعة .



نم

۲۵۰۲۴ - **لَمَاجِيَة رِيْبِيَة**

Clubiona nutrix, *Chiracanthium punctator* (S).
Clubiona nourrice (F). *Nutrix clubiona* (E).

نوع من العناكب الساعية القانصة ثنائية الروايا ، سداسية الأشقان تنتمي إلى فصيلة الهابيات . موطنها المناطق الحارة من حوض البحر الأبيض المتوسط . جسمها متوسط القد بطول نحو ٢٠ م . عند التكب ونحو ٢٤ م . عند التكبنة . صدرها اسمر اللون ، أحر اللون . صينها زيمتان . شيفها ضليمان . فكها ديقان . جرازها مستطيلة مهدبة . بطها وفي الشكل ، حنلي اللون ، جوي المروج تملو رشة سوداء . تألف الإذغال والسيابجات حيث تكثر النباتات الشائكة . تسرح في النهار . قوتها الحشرات واساريعها . بيئاتها الشتوي يستمر من ١٨ إلى ٢٠ أسبوعاً . مألوها مكعبة صلبة الشكل لا غنقة الوسط ، ومتينة الحلك ، مدخلها من الجهة السفلى . تعيش نحو ثلاث سنوات . الاثنى تموت بعد تقف المكان وضن الصغار ، أما الذكر فيبد الكرم إذ تقص على الاثنى . نشتها مقلية . سمها شديد الفاعلية يؤذي الانسان .



لَمَاجِيَة

۲۵۰۲۵ - **لَمَاجِيَة مَرْكَبَة**

Clubiona compa (S). *Clubiona parde* (F).

نوع من الهابية الساعية القانصة . موطنها بعض المناطق الحارة من العالم القديم . جسمها صغير القد بطول نحو ٨ م . عند الذكر ونحو ٨ م . عند الاثنى . صدرها مسطلي الشكل ، اسمر اللون ، اخضر المروج . صينها زيمتان . شيفها مجهزان ببقاف عجنه نحو الدابل . فكها صغيران . جرازها نحيلة مستطيلة ، كثيفة الحب . بطها احليجي الشكل ، اسمر اللون . أحر الراكش . تنتهي برزائتين صغيرتين . تألف المروج والمراعي والاراضي تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة . مخدعها مكعبة بلطية الشكل ، حريرية التماس ، يضاء اللون ، تحبها تحت قشور الاشجار . تعتبر من الدوبيات النافعة .



لَمَاجِيَة مَرْكَبَة

۲۵۰۲۶ - **لَمَاجِيَات**

Clubionides (S). *Clubionides* (F).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجسامها وانواعها

الندد ، اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اصلها غرطية عازلة يطوها تخنيد قاطب ويمزج مترص يمتد من الفوية إلى القب . فويتها احليجية الانفراج ، جالسة الاريفة العادمة التضخيم .

۲۵۰۱۸ - **لَم** *
Uria (S). *Lumme*, *Guillemot* (F). *Guillemot* (E).

جنس طير من عارة القيات وفصيلة البيرقنيات . انواعه المعروفة ثلاثة اعطائها المناطق الباردة والقطبية ، تزوح عنها في فصل الشتاء والجلد إلى المناطق المعتدلة الحرارة . ملجئها الحيائي جامعي الب . جاعاتها اسراب لا يحصى لما عدد . قوتها الاسماك والقشريات والدعاصيص . اجسامها كبيرة مناقبها مستطيلة جالسة مهدبة الاطراف المفروسة . مناقشها كاسية ، ضيقة ، نافذة من جانب إلى جانب . اجنحتها معتدلة الجسم ، ذلقة ، اذناها قصيرة ، مستديرة الاطراف الضيقة . اسرارها قصيرة ، سرية التشبيك . احطيتها تحيط بكامل الاسباع . وكناتها نقر في الوانز القضاة المشرفة على البحر . الاناث تحض بمنوبة الذكور . يبيضها اجامشي الشكل والحجم بطول من ٨ إلى ١٠ م . الحصة بيضة واحدة والترخيم يستمر من ٣٠ إلى ٣٥ يوماً .

۲۵۰۱۹ - **لَم اَدَجَمَل**

Uria troile (S).
Lumme à capuchon, *Guillemot à capuchon* (F).
Common foolish, *Common guillemot* (E).

نوع من الطير موطنه يمتد من الناروج إلى جزر القطب . يزوح في الشتاء إلى بعض المناطق المعتدلة الحرارة اصحابها الجزر البريطانية والخطوط الفرنسية والاسبانية والايطالية في المتوسط . جسمه بطول نحو ٢ م . ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر والبطن والركبي . منقاد إلى الرعدة السوداء المراج . حذقة عينه إلى الشفحة السوداء . رساء إلى السمرة الخطية .

۲۵۰۲۰ - **لَم اَعَمَس**

Uria grylle (S).
Lumme grylle, *Guillemot grylle* (F).
Black-throated diver (E).

نوع من الطير . موطنه بعض المناطق القطبية . يزوح في الشتاء نحو مجادح البليكي . جسمه بطول نحو ٥٠ م . ثوبه اسود الرأس والعنق والرداء والجناحين والذنب ، ابيض الصدر ، ابيض البطن ويعلمو في مناقب الجناح والاباهر والكل تخنيد مترص ابيض . حذقة عينه حطية اللون . منقاد اسود . رساء إلى البسة .

۲۵۰۲۱ - **لَم حَرْقَنْدَة**

Uria Mendit (S).
Lumme de Mandt, *Guillemot de Mandt* (F).
Bridled Guillemot (E).

نوع من الطير . موطنه لوازه غرلندة ومجادهها . يزوح في الشتاء نحو جنوب كندا . جسمه بطول نحو ٤٥ م . ثوبه إلى البياض الناصع تملو في الظهر رشة جهورية ويعلمو في الرأس تقيج اسود احر المراج وضمان جوروبان اين وايس يمتدان من الشدق إلى الظهر . حذقة عينه متابية اللون . منقاد ادحم ورساء كذلك .

۲۵۰۲۲ - **لَمَا**

Raja limma (S).
 سمكة من فئتين البحر اعطائها جنوب المتوسط تكثر في المناطق الرملية القاع .

٢٥٠٣٧ - **لَمَفَا ، لَمَفَا ، لَمَفَا**

Lympe (F). Lymph (E).

إخلاط صفراء اللون أو عادية تنقلل مصحوبة بالكريات البيض في الاوعية اللمفاوية .

٢٥٠٣٨ - **لَمَكْسِيلِيَّات**

Lymexyliidae (S). Lymexyliidae (F). Lymexyliidae (E).

فصيلة حشرات غاشية من رتبة لمفديات أو الجنابة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل تتميز بقلعة صلابة القشور وباستعراض الرأس وبكبر العينين الجاحضة وباستطالة الزنابق المركبة من ١١ فصلة . احمادها قصيرة لا تلتصق كامل البطن . ارباضها خماسية التركيب || يرقاتها تعيش على الاثمار اليابسة او السائرة نحو الياس وحول الاغصان المصنوعة || اشهر اجناسها المكيول .

٢٥٠٣٩ - **لَمِنَارِيَّات**

Laminariaceae (S). Laminariaceae (F). Laminariaceae (E).

فصيلة نباتات بحرية من الخفيات السفى .

٢٥٠٤٠ - **لَمِنَارِيَّة**

Laminaria (S). Laminaria (F). Laminaria (E).
جنس نباتات غشية من فصيلة المناريات تعيش على الصخور البحرية المنورة بالماء ، اوراقها قدية محززة تطول عدة امتار ، فصلها اصفر اللون اسمر الماراج . منها انواع مأكولة واخرى علفية وصناعية يستخرج منها اليود والصودا . جيمها سدادية تغيد التربة والنبات .

٢٥٠٤١ - **لَمِنَارِيَّة سَكْرِيَّة**

Laminaria saccharina (S). Laminaria saccharina, Baudrier (F). Devil's-apron, Sweet-tangle (E). Zuckerrentang, Zuckertang (D). Cinture di Nettuno (I).

نوع من المنارية المأكولة والمالية . اوراقها سكرية الطعم تأكلها شعوب البلاد الشالية .

٢٥٠٤٢ - **لَمِنَّة**

Limnaea (S). Limnée (F). Limnaea (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة اللينات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم ومنها انواع تعيش في المياه العذبة كالبحيرات والخلجان || اصداؤها غشوية المادة ، شبه غلرؤية الشكل ، محلزنة ، مدببة الاقباع ، شداء القلب . اجسامها مستطيلة . لولبية ، مستعرضة الرؤوس ، مسطحة الياس السانانية الشكل . عينها قاعدية الاركاناز . ارجلها فردية ، مبططة ، مستديرة الطرف الامامي ، مستديرة الخلفي .

٢٥٠٤٣ - **لَمِنُورِيَّة**

Limnoria (S). Limnoria (F). Limnoria (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدوبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ، مبططة ، بيضية الشوزن ، نحيلة القوام المعتدلة الطول || اعرف انواعها واشهرها لمنورية ثاقبة الخشب Limnoria terebrans (S). Limnoria perce-bois (F). مشهورة بالاضرار التي توهمها في اغصان السداد واهوافض السفن غير المعالجة ضد هذه الافات .

عديدة تناهز المئة ، منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جميعها مقترنة ، صغيرة القد ، ثنائية الروايا ، سداسية المشاقن ، شياستها مجهزة بقفص مجعنة نحو الداخل || اثارها تراوح بين الصلبة والشفقة . تعيش في متكادب بلووية الشكل ، حريرية النراس ، بيضاء اللون ، تحبها تحت قشور الاشجار او تحت الحجارة وبينها || اشهر اجناسها الياجة والكفامة .

٢٥٠٣٧ - **لَمَاس**

Tactile

صفة التي الذي يتحسس باللمس .

٢٥٠٣٨ - **لَمَاسَات**

Palpigrades (F). Palpigrades (E).

فئة من المنكرويات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، ففة من كها ، عادمة الجهاز التنفسي ، تطول نحو ١ م . اجسامها لثنية ، حقيقة ، قصيرة || تعيش تحت الحجارة وفي الماور الرطبة .

٢٥٠٣٩ - **لَمَاعَكَة**

Lemna (S). Lemna (F). Lemna (E).

في القباب اللحية ، اعطبا .
عروض تمهدي لانيات قسية .

٢٥٠٣٩ - **لَمَام**

Lemna (S). Lemna (F). Lemna (E).

هو النتع الاغضر ، اعطبا .

٢٥٠٣٢ - **لَمْبَرْتِيَا ، لَمْبَرْتِيَا**

Lambertia (S). Lambertia (F).

نبات مقدود التعريف على اسم العالم الانكليزي ا.ب. لبرت (١٧٦١ - ١٨٤٢) وهو جنبة معمرة برية وريثية من فصيلة القصبيات مهندا استراليا . ساقها قرعاء تملو نحو ١٢٠ سم . اوراقها سنانية تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٥ سم . فصلها ملت الحافية ، شائك النقصه لامع الصفحة العليا خلي السفل . ازهارها مستديرة التجميع صغيرة القد ارجوانية اللون . ثماره جزائية الشكل مسلمة بقرنين مستطيلين . تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٥٠٣٣ - **لَمْبَرُوش**

Lambertia (S). Lambertia (F). Lambertia (E).

هي كربة لبروش ، اعطبا .

٢٥٠٣٤ - **لَمْبِيد السَنَف**

Lampides baeiticus (S).

فراشة من فصيلة اللقيات . اعطباها فسيمة الارباء تشغل البلاد الاسيوية والافريقية . جسمها احمر اللون ازرق المواجه . ذكرها يطول نحو ٣٤ م . رواشه على الزرقه البنفسجية يعطها تمشيع سلق حاق وبوطها اطار اسمر || انتاعها تطول نحو ٣٨ م . رواشها ازرق الانتشاب خطية اللون يعطها تمشيع اغير || يرقاتها تركب سف نباتات الفصيلة القرنية وتقرض البور قبل ادراكها .

٢٥٠٣٥ - **لَمَّة**

مجموعة افراد نباتية من صرم واحد تتميز بصلفات خاصة ثابتة . والمة لا تأتي الا عن طريق التمثيل والتفصيل . واذا تكاثرت بالبرر فقدتها صفاتها المميزت ولم تعد لة .

٢٥٠٣٦ - **لَمَدُور**

Limodorum (S). Limodore (F).

جنس نباتات طفيلية من السطيليات . انواعها المعروفة قليلة . اوراقها متراكبة حشوية الشكل والدة ، زرقاء النصل . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون || منبتها الادوية والمواقع الظليلة الرطبة .



لَمِيد السَنَف



لَمْنَارِيَّة سَكْرِيَّة



لَمْنَة

الناشة . تنبت برؤوسها الجزلة وبقوائمها الامامية الشديدة النطق المجهزة لما السطفت كما في البرصوة أو القيقص كما في المغرب بواسطة اطرافها المثلثية الشكل || جمع اجناسها غائلة تعيش من قنصها . اشهرها البعيدة .

٢٥٥٥ - تَمِيكَة
Gnathopode (F).
Gnathopodite (F).
زائفة متكية أو ضفوية تكون عند بعض القشريات .

٢٥٥٦ - تَمِيكَة
Limulus (S).
Limule (F). Limulus (E).

جنس حيوانات بحرية من المفصليات وفضيلة العظيديات . انواعها قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه مستديرة الشكل ، ملحوفة الظهور بدروع مجننة يتصل بها في مؤخرتها سراديب مستطيلة حادة الاطراف . واجسامها هله تتكون من جزئين ، جزء امامي ملحوف يحمي نصف دائري يغلظ الصدور والبرص والبرص والبرص ورسه ازواج من القواس التي تحرق اللحم . زوائدها الصدرية تستعمل كجهاز للانتقال والرك . اما الجزء الثاني ففلاحة شبه محرم الشكل ينتهي بمجموعة حاد الطرف . وهو عند قاعدته يلفس حبة ازواج من الجرامز المعدة للعباسة || بعض انواعها مأكول . اخصها لينة انثونسية ويتكاثر نوع آخر كبير القد يطول نحو ٢٥٥ سم . يكثر وجوده في بحار شمال الولايات المتحدة .

٢٥٥٧ - تَمِيكَة أُنْدُونِسِيَّة
Limulus moluccanus (S). Limule des Moluques (F).
نوع من الليمطة يكثر وجودها في مياه انثونسية . جسمها كبير القد ، يطول من ٩٥ الى ١١٥ سم . بما فيه المروء || لحها مأكول ، مرغوب فيه .

٢٥٥٨ - لَمِيْطِيَّات
Limulidae (S).
Limulids (F). Limulidae (E).
فصيلة من المفصليات الشبيهة بالمرسويات . اجناسها وانواعها القليلة كانت عديدة وقد انقرضت ولم يبق منها سوى بعض الانواع تنتمي الى جنس واحد يلحق لينة .

٢٥٥٩ - لَمِين
Lemmus (S). Lemming
جنس حيوانات ليلية قافسة من المفصليات وفصيلة القواريات . انواعها عديدة بعضها صغيرة القد بعضها البلاد الباردة تجبرها من الجنوب الى الشمال || اجسامها ربعة ، طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم . وذانها من ٢ الى ٣ سم . مقاسها مقنونة . اذنانها صغيرة . جرامزها خامة الاصاب . انظروها حادة جامة . اذواها الى الفردة الصفراء يعلوها تبيج اسمر . يطونها الى الصفراء الرلي . جرامزها وذانها صفر || قوتها الاشباب والجلود والحزاز .

٢٥٥٩ - لَمِين
Lanaria (S).
Lanaria (F). Lanaria (E). Lanaria (D). Lanaria (I).
جنس نباتات عشبية جسمية مادة معمرة من فصيلة التريسيات . انواعها قليلة تنبتا افريقية الجنوبية . لزوع لثريين .

٢٥٥٩ - لَمِين
Semnophthèque (F).
نوع من القروء المقتصة يدهى حيار ، اطبخه .

٢٥٥٧ - لَنْجِيْطِيَّات
Lonchitis (F).
هو القسم ، من النباتات الطيبة والثرينية .



لينة



ليمدة



لينة



لمين

٢٥٥٩ - لَمِينِيَّات
Limnidae (S).
Limnidae (F). Limnidae (E).
فصيلة حيوانات مائية من الرضويات مغذيات الاصيل ورتبة الرلويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار ومحيطات العالم . قوتها التوت المائية والفرص || اصنافها لاحقة ، شبه خلروفية الشكل . غلظة الاطراف ، سدفاً الولب || اعرف اجناسها واشهرها اللينة واللام واللولب والافليل .

٢٥٥٩ - لَمُونِيَّات
Lemonia (S).
Lemonia (F). Lemonia (E).
جنس حشرات من فصيلة اللوليات ورتبة حشرقيات الاجنحة . انواعها المعروفة ٢٥ بعضها يألف الاقاليم الباردة وبعضها الآخر يعيش في المناطق المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها كبيرة ، عضلية ، يفرها الخمل . بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها مزوانية الشكل . حيويتها صغيرة ، بارزة . اخطائها وبلاستها قصيرة . قرونها الاستدمارية مشطية . اجنتها كبيرة ، ملونة ، مجنحة ومتقطعة . اذواها قليلة الزخرفة || اسارها مثاقط يعلوها طب دقيق . تألف البراري جميعها عاصلة تعيش على معظم ثبوت فصيلة المركبات واعصها المتحدب .

٢٥٥٩ - لَمُونِيَّات
Lemoniidae (S).
Lemoniids (F). Lemoniidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، معظمها شبيهة بالاصطن وبعضها يألف المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها كبيرة ، عضلية ، يغلظها خمل مستطيل . بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . حيويتها صغيرة . اخطائها شديدة القصير . ملاسها صغيرة . قرونها الاستدمارية مشطية مزدوجة . اجنتها كبيرة عادمة الزخرف . اذواها زخرف || اسارها مثاقط التفتار يعلوها بعض الحلب || اشهر اجناسها القمونة .

٢٥٥٩ - لَمِينِيَّات
Uriens (F).
عمارة طير من فصيلة البطرقيات . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها من طيور المناطق القطبية والباردة || تتميز باجسامها الكبيرة ، بريشا البسة ، بارساها البردية ، وريشها المائلة الافلاك المعتدلة الاحدياب ، القليلة الانضغاط والارتفاع || اما اجناسها فهي الخم والمرغول والرخيلان .

٢٥٥٩ - لَمِينِيَّات
Phymata (S).
Phymate (F). Phymata (E).
جنس حشرات قافسة من فصيلة الليمديات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة تطول من ٦ الى ١٥ سم . اشكالها مستغربة لأمأثرة . رؤوسها جزلة شاذة . اخطائها قصيرة شديدة النشط . قوائمها الامامية مجنحة للخطف || اذواها متباينة الالوان تكثر فيها الشقعة والسمرة || جمع انواعها ناعمة لانها تنقص على الحشرات الضارة .

٢٥٥٩ - لَمِينِيَّات
Phymatidae (S).
Phymatids (F). Phymatidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطيفة تصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة البد مغذيات من علم المناطق الحارة || اجسامها صغيرة غريبة الاشكال

Lennos

٢٥٠٦٣ - تنورا

جنس نباتات عشبية طفيلية من فصيلة النورات . أنواعها المعروفة ثلاثة منتها بلاد المكسيك .

Lennosaceae (S).

٢٥٠٦٤ - تنويات

Lennosaceae (F). Lennosaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متعددة العقالات . أجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد . أعطائها بعض مناطق المكسيك || جميع نباتاتها عشبية طفيلية . أوراقها سهقية . أزهارها صغيرة ، سننية الأرتكار || أشهر أجناسها التنورا .

Lignodes (S). Lignode (F). لينغود

جنس حشرات خاشطة من مخدبات الاجنحة رضية السويبات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . يكثر وجودها على المران واليالك والباسم ، خاصة في زعن الأزهار || أجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشونن ، تطول من ٤ إلى ٦ سم . أنبوبها إلى الشقعة السفلى ويلوحها ، في بعض الأنواع ، تبيض أصود متفاوت الرصاة يكتنف الامداد .

Lanio (S).

٢٥٠٦٦ - لينون

Lanlon (F). Lanlo (E).

جنس طير من الجوارح مخروطيات المنابر وفصيلة التنفريات أنواعها المعروفة خمسة موطنها المناطق الاستوائية من البلاد الأمريكية . تألف الإخراج . ملجئها الحياتي . جماعي باستثناء زنن التسامد والحضانة والتعليل ، جماعاتها قليلة العدد . قوتها الحشرات والبرود والثار النبتية البرية والزراعية || أجسامها رمية تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم . رؤوسها معتدلة القد . مناديقها مخروطية . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة . أذناها مقعرة شبه مفروقة . أنبوبها تختلف مع الأنواع فيها الأصفر والأحمر والأبيض والأخضر الاسم ، جميعها مبلقة أو مبيضة بالاصفر || تدثن أعشاشها في الأدغال القريبة من سطح الأرض . الإناث تحضن صعدا من ٥ إلى ٧ بيضات بينا الذكور تؤذن لها الحماية والقداء .

Epiglottae (F). لينساك ، لينساك المزمار

Epiglottis (E).

القها أو لسان المزمار سقاط لبلي - غشرفني يقع في الجزء العلوي من الحنجرة .

٢٥٠٦٨ - لهاسة الجردود

Xanthorhoe montanata (S). Xanthorhoe des montagnes (S). Xanthorhoe montanata (E).

فراشة من فصيلة الازليات ردية حرشليات الاجنحة . موطنها بعض جبال حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية الناحية . قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاشطة تدث على اوراق النبات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٣ سم . بسلتها نحو ٣٧ . رأسها سطلي اللون . صينها صغيرتان . زباناها مشطبان عند الذكر ، عيطان عند الانثى . جوشها وبطنها في الحنطي الاشعع المالح || وراشها عند الشقير إلى الحنطي الاكثف يملو في الزوج الامامي تحفج ابيض واخر وبقجة وسطى شديدة السرة تنتهي بشفيتين متصلتا نقطة سمراء . ويلمو في الزوج الخلفي تحفج اسمر وعضان من الزراكش . اهدائها إلى الشقعة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في

Landolphia (S).

٢٥٠٥٨ - لندلفية

Landolphia, Vahé (F). African rubber tree (E). Kanschuklane (D). Landolphia (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البفليات . منتها افريقية افريقية ومغسفر . سوقها جالية ، مائبة سمراء اللون . أوراقها متعاقبة ، تضلها لامع الصفعة الجامة . أزهارها تالية || يستخرج من جلونها بالحز عصارة مطاطة صناعية تستعمل استعمال المطاط .

Lanztees

٢٥٠٥٩ - لنزيت

نظر من السيات ركب الاشخاب المقطوعة من فصيلة الصنوبريات . مظهره الخارجي قطر صغير القد لونه إلى الجلوة ، نكتة مفلطحة ، قطرها نحو ٣ سم . سطحها الاصل مستدير التخذيد ، تملو احاديده حراشف ورر هيفية متناسبة البعد شبهاء اللون . لبابه قليل السابة ، لبني التركيب ، سطلي اللون . بوفاته اسطوانية الشكل قياها نحو ٣٨٨ ميكرون || مشبيه بئري الاشخاب المقطوعة فيسب عنها وانحلاها يد ان عتلقها بوشل كندف القطن لونه إلى الصفرة البرتقالية ثم يتحول إلى الحنطي || يكاتب عرق الاشخاب المصابة ويصطبر السلطة بأحد المركبات القعالة كالفيتول والكرينول .

Linsang (S).

٢٥٠٦٥ - لينسان

Linsang (F). Linsang (E).

جنس حيوانات لاحمة مفترسة من فصيلة الزباديات . أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها الهند الصينية وجزر الزايج . تألف الثابات والرايض . ملجئها الحياتي صري الذكر يكوم عدة اناث والاثى تحاطط عدة ذكور || أجسامها مستطيلة الشكل هيفاء تطول من ٦٥ إلى ٨٥ سم . بما فيه الذنب . رؤوسها صغيرة ، شبه مخروطية الشكل . أذناها صغيرة ، كاسية . صينها صاخة ، حادة البصر . أذناها مستطيلة ، سداسية أو ثمانية الاطواق ، بالنسبة إلى النورح . فرائها قصيرة اللوير اليد النام . أنبوبها سبيقة ، مرقشة ومندرة || أناتها ثنائية الإثداء والجراة ، تضع على مرقين في الحول . المرة الأولى في أواخر شباء والثانية في أواسط آب || صرورها دجوي . قوتها الطير والحيلوان الصغير || أما أنواعها الثلاثة فهي :

Linsang pardicolor (S).

لنسان أحمر

Linsang pardicolora (F).

Linsang gracilis (S).

لنسان أليل

Linsang gracieux (E).

Linsang maculosa (S).

لنسان ملطخ

Linsang maculé (F).

Ammodysse lanceolatus (S). ٢٥٠٦١ - لنشون

Lançon (F).

سمكة بحرية من فصيلة الرماليات . أعطائها مظهر شطوط بحار البلاد المعتدلة الحارة || جسمها شبه اسطواني الشكل قليل التبطيط يطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم . رأسها صغير الجسم مستطيل الحنط . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعننها الظهرية قاطبة يتقدمها متخس حاد . زعننها الشرجية تمتد من أواسط البطن إلى الذيل . زعننها الذيلية فارقة ، ثوبها إلى الرقعة القفصية يسر ويميق في النصف العلوي || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٢٥٠٦٢ - لنشف هي اللسا ، اطلبا .



لندلفية



لنسان



لنسون



لنيدود



لنيدود

٢٥٠٧٨ - **لَهْوِيَّة لَاطِفَة** (S). *Uvularia sessilifolia* (S).
Uvularia à feuilles sessiles (F).
 نوع من اللهوية تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها لاطفة أحليجية
 نصلها بطول من ٤ إلى ٨ سم. صفته السفل إلى الخصار
 الأزرق للملج. أزهارها تولمية الانتشاب صغيرة القد
 تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. لونها إلى الصفرة الباهتة .
 أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .



لهوة

٢٥٠٧٩ - **لَهْوِيَّة مُتَقَوِّية** (S). *Uvularia perfoliata* (S).
Uvulaire perfoliée (F).
 نوع من اللهوية تملو من ١٥ إلى ٥٠ سم. أوراقها متقوية
 تحفرها السوق وهي متعاقبة سنائية الشكل، نصلها بطول
 من ٤ إلى ٨ سم. وهو مائل الصفحة، أخضر العليا،
 باهت السفل. أزهارها تطول من ٢ إلى ٣ سم. يتلونها
 مدنية الاطراف لونها إلى الصفرة الجليسة || أزهارها
 يستمر من أيار إلى حزيران .



لهوة

٢٥٠٨٠ - **لَهْوِيَّة مُهْدَبَة** (S). *Uvularia puberula* (S).
Uvulaire à feuilles ciliées (F).
 نوع من اللهوية السروية تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها
 متعاقبة سنائية، نصلها جامد الصفحة، أخضر اللون،
 مهذب الحافة، بطول نحو ٥ سم. أزهارها مقطوعة البتلات
 تطول نحو ٢٥ سم. لونها إلى الصفرة الكبريتي || أزهارها
 يستمر من أيار إلى حزيران .

٢٥٠٨١ - **لَهَائِب ، حَمِيرَاء**
Ruticilla, Phoenicurus (S). *Rouge-queue* (F). *Redstart* (E).
 جنس طير من فصيلة الشروريات. أنزاهه كثيرة العدد
 أصطبا العالم القديم تكثر في البلاد الاسيوية || جميعا
 صغيرة القد، رشيقة القوام، قصيرة المتنار، مستطيلة
 الجناح، ونية الراس، دجلة الريش، جميلة اللون.
 أثواب أناتها أقل زركشة وزاه من أثواب ذكورها.
 قوتها الحشرات على اختلاف أنواعها. تنش || غذائيت
 الصغور وتجاوليف الأشجار || أشهر أنواعها ما يلي .



لهيب أسود الرأس

٢٥٠٨٢ - **لَهَائِب أَسْوَد الرَّاس** ؟
Ruticilla tithys, Phoenicurus ochrurus (S). *Rouge-queue tithys, Rouge-queue noir* (F). *Black redstart* (E).
 طائر من اللهب طول نحو ١٦ سم. ثوبه ثوب اللهب
 الاسود الأزور باستثناء الرأس الذي يمه السود والألأهر
 المنقبة بالأبيض. تغريده في الإحان. حصفته تراوح
 من ٥ إلى ٦ بيضات تقوم بها الأنثى دون الذكر.

٢٥٠٨٣ - **لَهَائِب أَسْوَد الزُّور** *
Ruticilla phoenicea, Phoenicurus phoeniceus (S). *Rouge-queue à gorge noire, Rouge-queue à front blanc, Rouge-queue de muraille* (F). *Common redstart* (E).
 طائر من اللهب طول نحو ١٥ سم. ثوبه جميل الألوان
 المتراكبة، وأسه إلى الكهية الزرقاء تتوسطه بقعة بيضاء
 تمتد إلى الجبهة. زوره اسود، ظهره إلى الكهية الرمادية
 يطوها موج أزرق. جوش وإيلاؤه وذكاه وذنبه إلى
 الصهبة الصنابية الزائجة. ريشه عزالانه وقوامه جناحه إلى
 السرة الخفيفة، أباهره إلى الصهبة. حدة عينه سنائية
 اللون. منقاره ويبرله إلى السرة السوداء || أثناء تحضن
 مرتين في العام، الأولى في أواست نيسان والثانية في أوائل
 حزيران. حصفته تراوح من ٥ إلى ٨ بيضات .



لهيب أسود الزور

أوائل حزيران وتبقى حتى أواخر تموز. تشرح من البصر
 إلى قصبة الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة أسابيع
 وتتمتع لكن ميحادا على الصفحات السفلى من نصل
 الإزراق || السرة تطول نحو ٢٨ سم. جسمها اسطواني
 الشكل، كثيف الحلب القصير. ثوبا يماثل البيت التي
 تقيس لها وهو يبراح من الخصار البصري إلى الريفية
 والقهية الصفراء بملو ثلاثة خطوط قاطبة إلى الجفوة.
 رواجها البطنية الوسطى ماصة مما يجعلها تنقص عند
 الانتفال || طود الإكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما
 ينقضي في الجافة.

٢٥٠٦٩ - **لَهَائِب**. *Taureau blanc* (F). *White bull* (E).
 البهاق: الثور الأبيض. وكل أبيض فاق وفاق. بقرة
 فاق ولفة. ثور، ملهق اللون: أبيضه .

٢٥٠٧٠ - **شَجَة ، نَحْطَة**
Emphysème pulmonaire (F). *Pulmonary emphysema* (E).
 تعريف أيضا بارتفاع الرئة، داء يصيب الهائم في صدورها
 لا تكاد تسلم منه، وهو في الخليل من السيوب المبطة
 للبح .

٢٥٠٧١ - **لَهْم**
 اللحم هو اللحم من الحيوان ولخصها حيوان القنصاية
 كالبقر والغنم والماعز. ج. لوم.

٢٥٠٧٢ - **لَهْم**
Lehm (F). *Loam* (E).
 من الأمير مصطلح الشهي. تربة مكنية في غرين وبل
 وصلصال بنسب متعادلة لا يسد فيها عنصر حل آخر.

٢٥٠٧٣ - **لَهْوِب**
 قابل للإلتهاب أو سريع الاشتعال أو الاحتراق.

٢٥٠٧٤ - **لَهْوِيَّة**
 في قابلية الإلتهاب أو الاشتعال .
Inflammabilité (F). *Inflammability* (E).

٢٥٠٧٥ - **لَهْوَرَة** *
Isothecium (S). *Isothecium* (E).

جنس طحالب من جانبيات اللحاء. أنزاهه المعروفة نحو
 ٣٠ مبتها المناطق المحتلة الحارة من العالم القديم. تعيش
 على الصخور في المواقع الرطبة || سوقها دقيقة، نخيلة،
 مدادة. أوراقها متراكبة شديدة الصفر. ضباطها جرابية
 مستطيلة المالحق المنصبة .

٢٥٠٧٦ - **لَهْوِيَّة** *
Uvularia (S). *Uvulaire* (F).
 جنس نباتات جلمورية عشبية زربنية معمرة من فصيلة
 الزنبقيات. أنزاهه المعروفة ستة. سوقها دقيقة، نخيلة
 فزاه. أوراقها لا قياسية الشكل والانتظام. أزهارها
 فردية أو تولمية الانتشاب، أبعية الانتكاز، سدنية
 البتلات المستطيلة المتدلدة، لونها إلى الصفرة || أصرف
 أنزاهها ما يتبع .

٢٥٠٧٧ - **لَهْوِيَّة كَبِيرَة الزَّهَر**
Uvularia grandiflora (S). *Uvulaire à grande fleur* (F).
 نوع من اللهوية السروية. تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم.
 أوراقها متعاقبة سنائية، نصلها بطول من ٦ إلى ١٠ سم.
 وهو مائل الصفحة العليا الخضره، خلى السفلى الطحلاء.
 أزهارها كبيرة القد تطول من ٣ إلى ٤ سم. لونها إلى الصفرة
 الجليسة || أزهارها يستمر من نيسان إلى حزيران .

٢٥٠٨٩ - **لَوَابِ الْمَوَسَطِ** *، **لَوَابِ مُسَلَّحِ** *
Lupa hastata (S). Lupa armée (F).

نوع من اللواب. اطلانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط جسمه صغير القد بطول نحو ٣ سم. ويمرض نحو ٦ سم. ثوبه متداخل الالوان فيه الاصفر والاديس والاصفر والاشعث والاصفر ويملو في القسم الخلفي من دربه ثلاث نقط مستديرة جوية اللون.

٢٥٠٩٠ - **لَوَابِ الْهِنْدِ** *
Lupa des Indes (F).

نوع من اللواب. اطلانه شطوط الهند الجنوبية. جسمه كبير القد بطول نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٣٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الجسيلة فيه الازرق والاحمر والبزقالي والاصفر والاشعث والصفاني.

٢٥٠٩١ - **لَوَابِ**

Carnassiers, Carnivores, Fauves (F). Carnivorosa, Fallow-deer (E).
رتبة من الحيوانات البرية آكلات اللحوم. فصائلها عديدة اشهرها السنوريات والكلبيات والذبيات والضببات والسموريات والزباديات ...

٢٥٠٩٢ - **لَوَاكُة** *
Loasa (S). Loasa, Loase (F).
Loasa (E). Loasa, Nesselinie (D). Loasa (I).
جنس نباتات شبيهة حولية برية وتربيتين من فصيلة اللوزيات. انواعها قليلة جميعها زباء. زهبا حارق كالقفراس. اوراقها متناوبة، مفرصة. ازهارها فردية، محورية الارتكاز، تقابل الاوراق وهي خماسية التركيب، جميلة الشكل، نارية اللون تصاحب بعض الثوقت. ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٥٠٩٣ - **لَوَاكِيَات** *
Loasaceae (S).
Loasacées (F). Loasaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القائلات اجناسها. وانواعها قليلة، معظمها اشعاب حولية ومحولة. اطلانها امريكية الاستوائية.

٢٥٠٩٤ - **لَوَاب** *
Abelles (F).
اللواب هو النسل والاراب ايضاً.

٢٥٠٩٥ - **لَوِيْبَا** *، **لَوِيْبَاة**

Dolichos unguiculatus (S). Dolique, D. asperge (F). Black eyed dolichos, Asparagus bean (E). Riesen Spargelbohne (D). Dolico asparago, Fagiolo dall'occhio (I).

نبات حشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفرفاشية. ضروره كثيرة العدد زرع لقرونها الخضراء القليلة او ليزورها الجافة || وهي تجود في جميع الارربة الثقيلة الانساج الممكن رعا. يزودها وأفرة المادة الغذائية تحوي مسا قدره:

من المواد الارزوية	٢٣,٢٤ %
من المواد الدهنية	١,٣٠ %
من المواد الهيدروكربونية	٥,٦٨٠ %

٢٥٠٩٦ - **لَوِيْبَاة بَلْدِيَّة** *
Dolic de China (F).
هي الدجر الصيني، اطليه.

٢٥٠٩٧ - **لَوِيْبَاة سَوْدَانِيَّة** *
Ambrevade (F).
هي البسلة الهندية، اطلبا.

٢٥٠٨٨ - **لَهَيْمَة** *
Crenilabrus (S).
Crénilabre (F). Crenilabrus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الكيدييات شائكات الزعانف. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها فيه اطليجية الشكل، طولها من ١٥ الى ٣٥ سم. رؤوسها اسطوانية. زعانفها الظهرية مستطيلة. زعانفها الذيلية مقطوعة. سوافنها ملسة. الارباب جميلة الالوان المراكبة الزاجية تتركز على الريدة الفضية تعلوها خطوط ومجاذيب ومعييات ترواح في الاحمر الى الاصفر والاصفر || اسماك هذا الجنس تسرا في وكناث من الحث وتتفقد السر، وتحافظ عليه حتى التقف || لحومها متوسطة الصنف، مأكولة.



لهيمه طاروسية

٢٥٠٨٥ - **لَهَيْمَة طَارُوسِيَّة** *

Crenilabrus pavo (S). Crénilabre pavo (F).
Crenilabrus pavo (E).

نوع من الهيمه. سمكة بحرية بيوض. اطلانها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك الجاذب وحشاش || جسمها اطليجي الشكل، محتدل التبيط بطول نحو ٣٥ سم. ثوبها متراكب الالوان القسطانية الجسيلة. الذكر اكبر قداً من الانثى واكثر تزويفاً وللم خصياً. رأسها مخروطي الشكل. فكها قويان، متماثلان شفهيا محتدل الانترجاج. عينها كبيرتان، جاحطتان، باتوتيتان، زعنفتها الظهرية مستطيلة، لامتساوية الارتفاع. زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف والزوايا || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.



لهيمه مبدولة

٢٥٠٨٦ - **لَهَيْمَة مَبْدُولَة** *

Crenilabrus melops (S). Crénilabre common, C. mélopa (F). Crenilabrus melops (E).

نوع من الهيمه. سمكة بحرية بيوض. اطلانها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي تعتبر من اسماك الجاذب وحشاش || جسمها اطليجي الشكل محتدل التبيط، بطول نحو ١٨ سم. ثوبها متباين الخصب بين الذكر والانثى. اللون الجوزي يمسد عند الذكر والاصفر الخفني عند الانثى. ويملو عند الشقين حلال اسود رءاه كل حين وبقيعة سوداء قرب قاعدة الزعنفة الذيلية. رأسها مخروطي الشكل، ذلق الحظ، محتدل الشفق. عينها كبيرتان، جاحطتان. زعانفها ملونة. الظهرية مستطيلة والذيلية مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.



لواب المتوسط

٢٥٠٨٧ - **لَوَاة** *
Torcou (F).
طائر من النقاويات يعرف بابي لوي، اطلبه.

٢٥٠٨٨ - **لَوَاب** *
Lupa (S). Lupa (F). Lupa (E).

جنس منوع من الفشاريات حشرايات الارجل قصيرات القليل وفصيلة الخيتليات. انواعه المعروفة قليلة العدد اطلانها بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اجسامها متغايرة القد، شديدة التباين الجسمي. تتميز بدروعها المصمتة وبامتداداتها الجانبية التي تأخذ شكل الاسنة او الحرايب. حمار دروعها الاسمية منشاري الشكل. ارجلها الخلفية عملاقة الفصل الطرفية. ملاقطها مستنة شبيهة || اشهر انواعها لواب الهند ولواب المتوسط.



لوبيه

٢٥١٠٧ - **لُوبِيَلِيَّةُ زَرْقَاءُ** ، **لُوبِيَلِيَّةُ السُّفْلِس**

Lobelia syphillicida (S). Lobélie syphilitique, Cardinale bleue (F).

بجلة طيبة وزرنيّة معمرة تملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها سنائية ذلقة طول نحو ١٥ سم. تصلها مالم الصفحة المسنة الحافة. أزهارها سبيلية التجميع تاجية الأبركانز طول نحو ٣ سم. لونها ال أزرق ال البنفسجية المواج || أزهارها يستمر نمو ال ثشرين. كانوا ولا يزالون يستعملون أزهارها وزهورها وجذورها في معالجة السفلس.

٢٥١٠٨ - **لُوبِيَلِيَّةُ سَاطِعَة** ، **Lobelia fulgens** (S). **Lobélie éclatante** (F).

بجلة زرنيّة معمرة تملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. ساقها قليلة الفروع. أوراقها لاطئة لسة تصلها مسن الحافة ، أصغر جوي اللون خي البشرة ، أزهارها كبيرة القد ، خلية القنابات الدرية ، برتقالية اللون || أزهارها يستمر من أيار ال أيلول.

٢٥١٠٩ - **لُوبِيَلِيَّةُ قَانْعَرَة** ، **Lobelia splendens** (S). **Lobélie splendide** (F).

بجلة زرنيّة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فراء. أوراقها لاطئة لسة تصلها مسن الحافة ، أصغر الصفحة ، جوي المختار. أزهارها كبيرة القد ، أرجوانية اللون ، برتقالية المواج || أزهارها يستمر نمو ال ثشرين الثاني.

٢٥١١٠ - **لُوبِيَلِيَّةُ قَرَعَاء** ، **Lobelia ramosa** (S). **Lobélie ramifiée** (F).

بجلة زرنيّة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها أسطوانية زياء. أوراقها السفلى ريشية غمرية. أوراقها العليا سنائية مدببة الزام الأغير. تصلها خي البشرة اللون. أزهارها كبيرة القد لونها ال أزرق || أزهارها يستمر نمو حيزان ال آب.

٢٥١١١ - **لُوبِيَلِيَّةُ لِرْهَزِيَّة** ، **Lobelia cardinalis** (S). **Lobélie cardinale** (F).

بجلة زرنيّة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها قليلة الفروع ، أوراقها لسة سننة. تصلها مالم الصفحة يطول من ٥ إلى ١٥ سم. أزهارها قرمزية اللون لا متشاربة القنابات || أزهارها يستمر من أيار ال أيلول.

٢٥١١٢ - **لُوبِيَلِيَّةُ كَرْلِيَّة** ، **Lobelia amana** (S). **Lobélie de la Caroline** (F).

بجلة زرنيّة معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٤٠ سم. ساقها فراء. أوراقها أحليبية سنائية تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. تصلها مالم الصفحة المسنة الحافة. أزهارها سبيلية التجميع ، تاجية الأبركانز، لونها ال أزرق الباهتة. أزهارها يستمر نمو ال أيلول.

٢٥١١٣ - **لُوبِيَلِيَّةُ مَحْرَقَة** ، **Lobelia urens** (S). **Lobélie brûlante** (F).

بجلة برية طيبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. تعيش في المناطق والأراضي الرطبة ، مهدها الحد. يقال أنها جميلة المادّة قلّتها تغيد المدة ، كثرها مؤذية. ساقها زياء اللحاء. أوراقها مزغيرة. زغبها محرق قارس. أزهارها وردية اللون.

٢٥١٠٨ - **لُوبِيَلِيَّةُ عَسْفُولِيَّة** ، **Dolique balbeux** (F). **هي الثامر ، أطليه .**٢٥١٠٩ - **لُوبِيَلِيَّةُ لَهْلَابِيَّة** ، **Dolice lablab** (F). **هي اللباب المصري ، أطليه .**٢٥١١٠ - **لُوبِيَلِيَّةُ سِيكَات** ، **Dolique à osif noir** (F). **هي الحجر ، أطليه .**٢٥١١١ - **لُوبِيَزَة** ، **Lopezia** (S). **Lopézia** (F). **Lopezia** (E).

جنس نباتات عشبية برية وزرنيّة من فصيلة الأعدريات. مهدها بعض مناطق أمريكا الجنوبية والمكسيك || ساقها ترتفع من ٣٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها متعاقبة ، مختلفة الأشكال. يكثر فيها السنائي. أزهارها عتودي التجميع. أزهارها لانظامية ، متباينة الألوان ، رباعية الفصل والبلات اللانسواية ، ثنائية الأسدية المستعرضة الاطراف || أنوعها المعروفة قليلة العدد ، أشهرها التالية :

٢٥١١٢ - **لُوبِيَزَة زَرْجَنْجَرِيَّة** ، **Lopezia miniata** (S). **Lopézia cinabre** (F).

نوع من القويزه. جنبية سبروتية معمرة. مهدها المكسيك. ساقها خشبيّة تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة أحليبية سسة للتصل. أزهارها عتودي طري. أزهارها ال الحرة الزنجفريّة اللامة || تنويرها يستمر نمو ال ثشرين الثاني.

٢٥١١٣ - **لُوبِيَزَة كَثِيرَة الزَّهَر** ، **Lopezia grandiflora** (S). **Lopézia à grandes fleurs** (F).

نوع من الرويزة. جنبية سبروتية معمرة. مهدها غواتالا. ساقها منتصبه فراء تملو من ١٠٥ إلى ١٦٠ سم. أوراقها متعاقبة أحليبية التصل تطول من ٥ إلى ٩ سم. تصلها خلية مهدية الاطراف. أزهارها فردية ، محورية ، قطرها من ٢ إلى ٣ سم. لونها ال الحرة السفقاء المواج || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف وأخرهف .

٢٥١١٤ - **لُوبِيَزَة مُتَوَجَّهَة** ، **Lopezia coronata** (S). **Lopézia couronnée** (F).

نوع من الرويزة. عشبية سبروتية زرنيّة حولية. مهدها المكسيك. ساقها مضطعة موزانية تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها متعاقبة ، بيضيه التصل المسن المختار. أزهارها عتودي طري. أزهارها ال الوردي الأرجواني المواج || تنويرها يستمر نمو ال أيلول.

٢٥١١٥ - **لُوبِيَلِيَّات** ، **Lobeliaceae** (S). **Lobéliacées** (F). **Lobeliaceae** (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متشعبة القعالات. اجناسها وأنوعها كثيرة العدد ، أشهرها اللوبيلية .

٢٥١١٦ - **لُوبِيَلِيَّة** ، **Lobelia** (S). **Lobélie** (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة اللوبليات. أنوعها نحو ٢٠٠ منها بري وبعضها طبي وزرني. أوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل. أزهارها لا نظامية التجميع والأبركانز ، جملة الشكل مختلفة الألوان || احرف أنوعها وأشهرها ما يتبع :



لوبيلة

٢٥١٢٣ - **لَوْتُ** (E). Polluer (F). To pollute (E).

وسخ الشيء باخافه الإقذار عليه كتلوث مياه الأنهر ببعض المواد الكيماوية .

٢٥١٢٤ - **لَوْتُدِيَّات** (F). Eupaléodictyoptères (F). Eupaleodictyoptères (E).

رقبة حشرات منقرضة من طبقة المفكيات . أحافيرها تعود إلى الحقبة الرابعة من الأياض الأولى المعروفة أيضاً بالحقبة الكربونية || جميع حشراتنا كبيرة القدر فاحصلة أو دامة .

٢٥١٢٥ - **لَوْبِيَّة** (F). Lucina (F). Lucina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة اللوبنيديات . أنواعها المعروفة نحو ٣٥ بعضها من شجيرات الحقبة السيلورية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || أصدانها متباينة الأشكال والألوان منها القمية والبغية والمالسة والمهددة والمخلصة . جميعها ثنائية المخالب الطليقة المستطيلة || تعيش في الرمال المغسورة بالماله قرب الشواطئ والجبالح .

٢٥١٢٦ - **لَوْبِيَّات** (S). Lucinidae (S). Lucinidae (F). Lucinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة ، من غابرة ومعاصرة ، عديدة . الثابتة تجوز العصر السيلوري أما المعاصرة فنشأت في معظم بحار العالم || أصدانها لاقباسة الشكل والحجم يكثر فيها البيضي الشكل . الخراف مصاريفها مستتة الخنار أو مائلة || أعرف اجناسها وأشهرها اللوبنية والكربيس .

٢٥١٢٧ - **لَوْحَة** (F). Planché à dessin (F). Drawing-board (E).٢٥١٢٨ - **لَوْحَس كِبْرِيَّي** (F). Cosmia fulvago (S). Cosmie jaune soufre, Calymnie jaune (F). Cosmia fulvago (E).

حشرة من فصيلة الفسيقيات حرشيات الإحنة . موطنها بعض الأقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الأوسط والأردن . فراشها جارية قوتها رحيق الأزهار . سرقها تعيش على أوراق النباتات والأشجار الخرجية || جسمها مدني الشكل يطول نحو ١٢ سم . بسطها نحو ٣١ سم . رأسها كبريتي اللون . عينها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشها وبطنها إلى الصفار الكبريتي || روشنها الإماميان إلى الصفار الكبريتي يطو تبيح عنائي وتشبيك بني . روشنها الخلفيان إلى الشبهة الصفراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى أيلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو خمسة أسابيع وتمتد المكان لطفاً على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرة تطول نحو ١٨ سم . جسمها أسطواني الشكل ، مائل القشعر ، اسفر اللون . اسود الملاق . رأسها اسود . منها ورواجها إلى السرة || طول الأكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنفخ السرة ملتصقة بجلباب من الطين .

٢٥١١٤ - **لَوْبِيَّةِيَّة هَانِكَة**

Lobelia heterophylla (S). *Lobelia heterophylla* (F). عشية حولية تزيينية تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . ساقها مفصلة سرسة قليلة الفروع . أوراقها السفلى ريشية مفردة ، أوراقها العليا اعليجية أو سنانية النصل . أزهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القدر ، خلية البصرة ، لونها إلى الزرقة يملوها موج وردي أو أبيض || أزهارها يستمر طول فصل الصيف .

٢٥١١٥ - **لَوْتُ** (S). Sciaena (S). Sciaena (F). Sciaena (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البحاريات . أنواعها نحو ٢٥ جميعها مفترسة ، قوتها الزنكة والسردين . معظمها من اسماك المحيط الاطلسي . تتميز بكبر اجسامها وزمانتها الظهرية . اقربها إلى الكهبة السراء يملوها موج اصفر || أشهر أنواعها لوت المتوسط .

٢٥١١٦ - **لَوْتُ المَتَوَسِّط ، لَمَطَرَاك**

Sciaena aquila (S). *Sciaena algie, Mègre, Persèque* (F). *Mègre* (E).

نوع من اللوت الميزل في المتوسط . مسرعه ضمن المياه الاقليمية ، جسده كبيرة القدر تطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم . ثوبه إلى الريد الطملاء الصفراء الموج . لحمه لذيذ الطعم جيد الصنف .

٢٥١١٧ - **لَوْتُس** (F). Lotus (F). Lotus (E).

هو اللوتس ، الطبل .

٢٥١١٨ - **لَوْبِيَّة لَحْيَة المَهْبَل**

Anthyllis barba Jovis (S). *Anthyllide barbe de Jupiter, Barbe de Jupiter* (F). *Jove's beard, Jupiter's beard* (E). *Jupitersbart, Silberbart* (D). *Antillide, Barba Giova* (I).

عشبة برية مرموعة من القرنيات الفراشية تكثر في الاراضي الحشاه ، ساقها فروع مستقيمة . أوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها ريشية متقاربة . أزهارها ابطية وطفرة الارتكاز مستحبة العرف ، مفترية .

٢٥١١٩ - **لَوْبِيَّة نَافِلَة** ، **حَشِيَّة الجِرْح** ، **حَشِيَّة اللَّب**

Anthyllis vulneraria (S). *Anthyllide vulnéraire, Trèfle jaune* (F). *Kidney-vetch, Layd's fingers* (E). *Heiter Wundklee, Gelber Hasenklee* (D). *Vulneraria, Trifoglio giallo delle sabbie* (I).

عشبة برية طيبة ومرموعة من فصيلة القرنيات الفراشية ، تكثر في الاربة الرملية القاحلة . ساقها مستقيمة . أوراقها مركبة متعاقبة ، وريقاتها ريشية متبادلة الارتكاز . أزهارها مستقيمة المالحق صفراء اللون وريدة الموج . أوراقها طيبة تلم الجرح بعد ان تقضي على الالتهاب .

٢٥١٢٠ - **لَوْبِيَّيُوم**

Lutécium (F). *Lutecium* (E).

٢٥١٢١ - **لَوْبِين**

Lutène (F). *Lutein* (E).

٢٥١٢٢ - **لَوْتُ**

هو نول النحل من الهجرة الثانية والثالثة . أما النول من الهجرة الاولى فيسمى ديسماً .



لوت



لوتيا لية المبل



لوتيا نامة



لوتية



لوحس كبريتي

٢٠١٢٩ - لَوْحَسْ مُدَّهَب *
Cosmia surago (S). Cosmie dorée, Calymnia

dorée (F). Cosmia surago (E).

حشرة من السليقات حشرغيات الاجنحة . موطنها بعض
الانعام الممتدة الحرارة من الشرق الاوسط والاندلس واروپة .
فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرتها تمشي على
اوراق وتبارق الزان والميل || جسمها مستطال لده يطول
نحو ١٣ م . بسطها نحو ٢٢ م . رأسها الى الخلفي المذهب
المزج . عيناها كبيرتان . زبالها خيطان . جوشها
وبطنها الى الصغار المذهب المزج || ريشها الاماميين
الى الصغار الكبرى يملؤ تقطيع وتبيض عتاي . ريشها
الخلفيات الى الشهية الغراء تملؤها شمة تبارج بين الخلفي
والاندلس || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب
وتبقى حتى اواخر الخريف . تسرح في الليل . تعامل يد
ظهورها بنحو خمسة اسابيع . وتضع المكن لطفاً مستطيلة على
الصفحات السفلى من نصال الازهار || السرعة تطول نحو
٢٠ م . جسمها اسطواني الشكل . مالم القشار غروني
الون . زيتي المزج . رأسها الى الجوزة . منها الى السرة .
وراجها الى السرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر
نحو ٥ يوم ويتقضي في التربة حيث تنفخ السرعة ملتصقة
بجلباب من الطين .

٢٠١٣٠ - لَوْحَف *
Parmophorus (S). Parmophore (F). Parmophorus (E).

جنس حيرلانات بحرية من الرغويات مبيات الارجل
وحيدات الاجهزة وفصيلة القيرويات . انواعه المعروفة قليلة
البد اعطائها البحر الاخر وبض البحار الاسيوية .
تمشي على المذيق قرب الشواطئ ؟ جميعها سرية وتختفي
التور تنفخ في الحصىا وتحت الرمال || اصدانها شبه
المطليحة الشكل . مقنطرة المقدم . مستديرة المؤخر .
ناشرة التيج . قالية الارتفاع . تلتفت كامل الظهر .
رؤوسها تنتهي باخظام اسطوانية . لوامسها شبه مخروطية
الشكل . عيونها جاسطة قاعية . عياشها ظهريه
الاكتزاز تقوم في تجويد خاص يلامس البق || اشهر
انواعه لوفقة البحر الاخر .

٢٠١٣١ - لَوْح *
Cluytia (S). Clutia; Cluytia (F). Cluytia (E). Clutia (D). Clutia (I).

ليات حشري ليني زبيني من فصيلة السوسيات مبهدة البلاد
الاستوائية . ساقه كدلة . اوراقه خلية جميلة الخضار الاطحل .
انعامه زائفة الالوان البنية || يزدهج في المراكب والمصارى .

٢٠١٣٢ - لَوْحَس *
Claviger (S). Clavigère (F). Claviger (E).

جنس حشرات من فصيلة اللوحسيات ورية غدييات
الاجنحة . انواعه المعروفة سبعة اعطائها تمتد من الهند
وايران الى اروبى . تعيش مع بعض انواع النمل اعصها
الكبار || اجسامها صغيرة تطول نحو ٣ م . رؤوسها
ضيقة . مستطيلة الشكل . عيونها طامسة . قرنها
الاستشارية صرطانية . تأثيرها وفكرها صغيرة .
ملاصها نحيلة . كواشها صغيرة . ش بضيبة الشكل .
بطونها اجاصية . امحادها قصيرة تلتفث لثك البطن .
اثنائها الى الصخرة المسفاه المتفاوتة للمجاث || تعيش
مع النمل في قراء غديتها ويلصق . ما تنفخه مسام بطونها .

٢٠١٣٣ - لَوْحَسِيَّات *
Clavigeridae (S). Clavigeridae (F). Clavigeridae (E).

فصيلة حشرات من غدييات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم انظار العالم لانها
تمشي في قري النمل مع اكثر اجناسه || اجسامها صغيرة
تطول من ٢ الى ٤ م . رؤوسها صغيرة . ضيقة . مستطيلة
الشكل . عيونها طامسة . قرنها الاستشارية صرطانية .
سداسية الفص . تأثيرها وفكرها صغيرة . كواشها
بضيبة الشكل . صغيرة الحجم . بطونها اجاصية الشكل .
امحادها قصيرة تلتفث لثك البطن || تعيش مع النمل
الذي يطنها بالفلس والذي يلصق ما تنفخه مسام بطونها
من مواد مائعة || اشهر اجناسها اللوحس .

٢٠١٣٤ - لَوْو *
Coregonus lavaretus (S). Coregonus (F). Gwyniad (E).

سمكة نهريه وبحيرية من فصيلة السلوسيات . جسمها
اهليجي الشكل يطول نحو ٤٥ سم . لوبها الى الريدة
الزرقاء يطولها موج فضي وتكت سود تكتنف الظهر من
جانبيه . ترطب في المياه المسقية . تسرا في تشرير الثاني .
لحمها لذيق اللحم جيد الصنف .

٢٠١٣٥ - لَوْرَاسِيَا *
Laurasia (F). Laurasia (E).

اسم يطلقه علماء الجيولوجيا والجيغرافية على المهنمة القارية
التي كانت . قبل تجزئها . تتألف من آسيا واروپة
وامريكا الشمالية .

٢٠١٣٦ - لَوْرَس *
Mouetta (F).

هو زج الماء . اعطيه .

٢٠١٣٧ - لَوْرُوس *
Lorocera (S). Lorocère (F). Lorocera (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة القورويات ورية غدييات
الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق
البلاد الممتدة الحرارة || اجسامها خفاه تطول من ٧ الى
١٠ م . رؤوسها كبيرة . ناشرة . كبيرة . قرنها
الاستشارية عقدية الفصل المجهزة بعض الحلب المستطيل .
تأثيرها ضلبيية . كواشها محدودة . منحسورة . امحادها
لاحة . نحيلة التخديف القاطب . قواشها نقشية . مبهدة
الحلب . اثنائها الى السرة السوداء المتفاوتة للمجاث ||
الحشرة الجملانة قانصة . تألف المواقع الرطبة اعصها
ضفاف المنابع . البقرة والجم .

٢٠١٣٨ - لَوْرُوسِيَّات *
Loroceridae (S). Loroceridés (F). Loroceridae (E).

فصيلة حشرات من رية غدييات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد
المتدة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل . رؤوسها
كبيرة . عيونها كبيرة . ناشرة . قرنها الاستشارية
وكوكها مستطيلة الحلب الشالك . تأثيرها بارزة الاطراف
الخارجية الممكدة . برارجها مائدة الزناد . امحادها نحيلة
التخديف القاطب الذي يمد ١٢ لعدود . قواشها مستطيلة
الطول . مبهدة الحلب || مكها شبه اسطواني الشكل .
عين الطرف اللقيق . تنصه الاثنى افراديا في التربة .
يرقاتها سداسية القوام والمقل . حورياتها تنحور في
التربة داخل اربعة انبوبية الشكل مسطوية الرأس والمقل ||



لوحس مذهب



لوحف



لوح



لوروس



لور



لوروس

٢٥١٤٤ - لَوْرَجَرَّ Olivier du Maroc (F).
هو الأركان ، اطلبه .

٢٥١٤٥ - لَوْرَجَهْند Amandier des Indes (F).
هو الاميلج اللوزي ، اطلبه .

٢٥١٤٦ - لَوْرَجَلُو

Prunus amygdalus communis, Amygdalus communis, A. dulcis (S). Amandier commun (F). Common almond tree (E). Echte Mandel (D). Mandorlo comune (I).

هو اللوز المشهور المأكول الثمار غشوية كثيرة العدد تقسم الى فئتين : فئة الضروب ذات النواة الصلبة ، وفئة الضروب ذات النواة الطرية الممكن فقشها بالاصابع .
انجار غليظة السوق تملو من ١ الى ١٢ م . ثمارها مأكولة اللوب تحوي ما يراوح قدره :

من ٥٠ الى ٥٥ ٪ من المواد الزيتية

من ٢٣ الى ٢٥ ٪ من المواد الاضية

وهي شائعة الاستعمال في صناعة السكاكر ويستخرج منها زيت اللوز .

٢٥١٤٧ - لَوْرَجَرَّ، هَزَج

Prunus amygdalus amara, Amygdalus amara (S). Amandier amer (F). Bitter almond tree (E). Bittere Mandeln (D). Mandorlo amaro (I).

نوع من اللوز ثمرته سبروتية نشطة تملو من ٦ الى ١٥ م .
زراعتها صعبة لانها تستعمل كطعم لفضوب اللوز الحلو .
ثمارها صلبة . لوبها مر الطعم يحوي بعض المواد الجعالية اعصابها الايفيدالين (Amygdaline) التي ينشأ عنها الحامض السينيديريكي او الحامض البروسي الشديد الفعالية السامة . ثمارها تستعمل في الصناعة فيستخرج منها زيت اللوز المشهور وهو طيب ، عادم الاذى ، خصال من العناصر السامة . أما الكسب لثناج من عصره فهو سام ميت .

٢٥١٤٨ - لَوْرَجَة Amande (F). Almond (E).
هي ثمرة للوز منها الحلوة والمرّة .

٢٥١٤٩ - لَوْرَجَة الوُهاب

هي اللدة اللامبية ، اطلبه .

٢٥١٥٠ - لَوْرَجِيَّة

Loeselia (S).
Loesélie (F). Loeselia (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وتزيينية من فصيلة القهسيات معقودة التعريف على اسم العلامة «لورج» .
مهدا بعض مناطق المكسيك . سيقانها تستعمل من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها بيضبة الشكل او ستانية .
ازهارها زرقاء اللون او قرمزية . قناباتها مسنة ١١ انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٥١٥١ - لَوْرَجِيَّة زَوْقَاة Loeselia corules (S).
Loesélie bleue (F).

نوع من الوردلية . عشبة حولية تزيينية . ساقها تملو من ٥٠ الى ٧٠ سم . فروعها نخيلة صلبة ، خلية السام . اوراقها بيضبة الشكل ، صالها مسنة اخضر . ابرها زرقاء اللون . قناباتها صاملة وسردية ١١ تنويرها صيفي .

تميش حل صفات الالهر واليعبروات والمناقع . معظم انواعها قانص ويضمها غاصل ١١ اشهر اجناسها الوردس .

٢٥١٣٩ - لَوْرَجَتْس Loranthé d'Europe (F).
هي البلتويه ، اطلبه .

٢٥١٤٠ - لَوْرَجِيَّة Laurencia (S).
Laurencia (F). Laurencia (E).

جنس نباتات بحرية من اخيات الحمر . انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطائها معظم بحار العالم ١١ بعضها فضروني المادة واليغس الآخر حلايب . لوانها تاروح من الاصفر الى الاحمر ١١ بعض انواعها القفرونية حورية العلم تستعمل استعمال التوابل في بعض مناطق اوروبا الشمالية .

٢٥١٤١ - لَوْرِي Domicella (S). Lori (F).

جنس طير من الملققات وفضيلة البيفات . انواعها المعروفة ٢٢ موطنها يمتد من الهند الصينية الى ماليزية والفيليبين . جلها الجاني جماعي الا في زمن التصاد والحفلة . تألف الثبات والمروج وصفات مجاري الماء . قوتها حبيب التيجليات وثار ١١ اجسامها مستدة اللد ، قربة الشبه بالهام . اوانها متباينة الالوان القراكية يكثر فيها الاحمر الابيضوي ثم الاصفر فالاصفر فالازرق فالعناي . اجنتها ذلقة ، اذنانها متوسطة الحجم ، مستديرة الاطراف .

٢٥١٤٢ - لَوْر Amandier (F). Almond tree (E). Mandel (D). Mandorlo (I).

جنس اشجار مشرة برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها اثنان : لوز سلو ولوز مر ، فالخلو هو الزراعي وهو كثير القروب ولز هو البري . وبجرة للوز من اي نوع كانت تستعمل بذات الشؤبة الجنية . جلورها وتديته تنور في القربة على اعماق بيضة . ساقها مستقيمة غشنة . اغصانها متفرجة كثيرة الاتقاد . افتادها فناد . قنتها مستدة الشموخ ، قصيرة الذروة . اوراقها عابلة ، معتقة ، رمية ، ذلقة . فصلها يهر اخضر اللون في اول عهد ثم ينحرف الى الطحلة ويستقر عليها حتى اللول والامال . انهارها لوزية التجميع ، يضاء اللون ، ودية المروج . تتكون على الاتقاد الحولية والولة . وهي تنور في اراسل الشتاء فيلج زهرها ، في لبنان ، خلال الربوة الثانية من شباط وذلك قبل ابراق بعض البت . ثمارها

لوزية مستطيلة مدهية المقصة تتكون من غلاف لحمي اخضر اللون احمل البشرة الكيفية الخمل يحف مع الادراك وهو يحسن عصمة غشبية النشاء تغلف نواة لوبها ابيض اللون جامد المكسر واخر المادة الزيتية ١١ واللوز يتكاثر بالبلور ومن المستحسن وضع البلور في مستقرها مباشرة دون اللجوم . ذلك لان نقل النمرة من المثلث الى مستقرها يوجب قطع الجذور البتدية الصل الذي يتسبب مع سبوات هذه الشجرة ١١ وهو يمش ويزدهر في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة لا يذوي سوى الصقيع لانه يسبب اغلاص الزهر او القند ١١ وهو يحد في جميع الاثربة انما يرجع المتوسطة الانساج التي لا تقتصر الى الكلس كما وانه لا يصر كثيرا في الاثربة الغنية المندجة .

٢٥١٤٣ - لَوْرَجِيَّة Cacaoyer (F).
هو الكاكاو ، اطلبه .



لورنية



لوري



لوز سلو



لوب

نحو ١٠٠ مظهر نبات عشبي وبمضغ جنبي. اورلقها مركبة، ثلاثية، اذينية. ازهارها لا قياسية التجميع والارتكاز جميعها مقرنية || اكثر ازهارها علفية زماما لاثنية بينها الطليعة المديدة القنواله، اشهرها.

٢٥١٦١ - لُوطُس اُرْجُولِي * ، لُوطُس زُرْكَاسِي حُفْنَس سَكْرِي

Locus tetragonolobus, Tetragonolobus purpurens (S). *Lotier cultivé, L. pourpre, L. rouge, Pils café.* (F). *Garden winged pea (E). Rota Spargelherba (D).* *Loto cultivato, L. rosso, Vaccia pisella (I).*

نوع من اللوطس البري والزراعي، وهو عشبة سرورية حولية تملأ من ١٥ الى ٤٠ سم. ساقها منتقية رفراء. ورقاتها واذايتها بيضيه الشكل. ازهارها فردية او ثنائية التجميع، ابطية الارتكاز، حراء اللون، سفلتها رباعية الاصلع. ازهارها يستمر من آذار الى ايار.

٢٥١٦٢ - لُوطُس اَصْفَر * Nalumbo lutea (S). Nélonbo jaune, Lotus jaune (F).

نبات عشبي مائي جنموري من فصيلة النيلوبريات. جذاميره صفولية نشوية المسادة المأكولة. اورلقها زنادية كبيرة مستطرفة قطرها براوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ازهارها صفراء اللون ملامحة البرف قطرها براوح من ١٥ الى ٢٥ سم. ترتكز على شاربخ طولها من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٢٥١٦٣ - لُوطُس النِيل ، لُوطُس مِصْرِي ، عُرُوس النِيل ، وَرْدَةُ النِيل

Nelumbium speciosum, Nelumbo nucifera (S). *Lotus sacré, L. du Nil, Fève d'Egypte, Rose du Nil (F).* *East Indian lotus, Pythagorean bean, Sacred bean (E).* *Lotus blume, Agyptische bohne, Nillilie (D).* *Loto sacro, Fava del Nilo (I).*

نبات عشبي مائي جنموري مداد من فصيلة النيلوبريات. اطعانه مياه البلاد الحارة المهدية والافريقية. اورلقها زنادية كبيرة مستطرفة، تصلها يوم على سطح الماء قطرها براوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. أما زنادها فيطول من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ازهاره كبيرة القده وردية اللون قطرها براوح من ٢٠ الى ٣٥ سم. وهي ذكية البرف الطوي. تمارة كروية الشكل نشوية الماددة المأكولة || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٢٥١٦٤ - لُوطُس فِلِسْطِينِي * ، عَفِيرَة

Lotus palestinus (S). Lotier de Palestine (F). *Four winged pea (E). Garten Spargelherba (D).* *Loto di giardino (I).*

نوع من اللوطس البري المرموي المسمر. اطعانه تشبه يلد شرق البحر المتوسط. ساقه منتقية رفراء. ازهاره ابطية ومقرنية الارتكاز صفراء اللون. يزوره ما مأكولة تقبر من المقرنيات الماددة المقبول الرجعي.

٢٥١٦٥ - لُوطُس قَرْنِي * ، قَرْنُ القَزَال ، كُنْهَكَة

Lotus corniculatus (S). Lotier corniculé, L. commun, Trêfle cornu, Corne du diable, Pied-de-poule (F). *Bird's foot, Bird's-foot trefoil (E).* *Geheimer Hornklee, Schotenklee (D).* *Loto corniculato, Baccellina, Ginestrina salvatica (I).*

نوع من اللوطس الطلي البري العلي المعسر. ساقه منتقية رفراء. ازهاره الى الصفرة زنادية يعلوا تبقيج احمر، وهو

٢٥١٦٢ - لُوزِيَّة قِرْمِزِيَّة *

Loessia coccinea (S). Loessia écarlate (F).

نوع من اللوزية. عشبة حولية تزينية. ساقها تملأ من ١٠ الى ١٠٠ سم. اورلقها سنانية الشكل. نصلها مسنة الخمار، بجلة الخمار اللامع. ازهارها قرمزية اللون تطل نحو ٢ سم. ثنائياتها عاملة || تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٥١٥٣ - لُوزِيَّات

Arbres à noyaux (F).

Stone-plants (E).

هي الاشجار اللوزية البزور، اغلب حبيبات.

٢٥١٥٤ - لُوزِيَّات

الوزين غلوكوزيد يوسد في لب عصيات الوز المر والدراق والكرز ... القرزين تموي في الماء وتصل الى غلوكوز وحامض سياليدريك والهديد يزدويك. وهي، في مدة الانسان، تصل الى كما في الماء تقسب عارض تسم قد يكون ميته.

٢٥١٥٥ - لُوسِيَّت

Leucite

جسم يتكون في ودة انخلايا النباتية. ج. لوسيات.

٢٥١٥٦ - لُوتَب

Otocyon (S).

Otocyon, Chien oreillard (F). Otocyon (E).

حيوان لام مقرن وسيد الجنس والنوع من فصيلة الكنيبات. موطنه بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية. يأنث الاذلال والاحراج البمشرة الاشجار. ملجته الحيات زوجي || جسم قريب الشبه يحم اين ادى، طوله نحو ١٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٨ سم. رأسه معتدل الهرم، ذلق الخطر. عيناه صغيرتان حادتا البصر. اذناه حريصتان كبيرتان. ذنبه كذنب الثعلب. ثوبه الى الكعبة الموضحة بالحنطي. قوائمه الى الكعبة السوداء وهي خاسية الاصابع في القاعنتين الاماميتين، ورباعيتها في الخلفيتين || يسرح في الليل ويبيت في النهار. قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والشرار اعصها الجراد.

٢٥١٥٧ - لُوتَبَة *

Paralepis (S). Paralépis (F).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الفوسيات. انواعها المرفوعة ثلاثة، اثنتان تمشان في البحر الابيض المتوسط واحدة في بحار الشمال || اجسامها وشعبة الشكل، مستطيلة. رؤوسها مخروطية، ذلقة، عادمة السهف. ميزانها كبيرة صامتة. اطعانها ربيبة الاشداد. زمانها الظهريه صغيرة القده، خلفية الارتكاز. زمانها الدالية فائقة || انواعها الى الشبهة القفصية تسمى في الظهور ويملوا موزج براوح من الرودي الى اليلكي في البطن || لحوبها جيدة الصنف، مغروبه ليا.

٢٥١٥٨ - لُوتَسِي

Proscolie (F).

الفرق فدة مغنية ساقها شديدة الزوجة يلسق قطع عده السحليات.

٢٥١٥٩ - لُوطُس

هو اللاطس، اطله.

٢٥١٦٠ - لُوطُس ، لُوطُس

Lotus (S).

Lotier (F). Lotus (E).

جنس نباتات برية وزراعية من القرنيات الفرافرية. انواعه



لوما



لوطس ارجواني



لوطس اصفر



لوتس فلسطيني



لوطس قرني

Arum maculé (F).

٢٥١٧٣ - **لَوْفٌ مُبَكِّعٌ**
هو الاروم ، اطلبه .نبات طبي يلم الجرح ويضع من البواسير . تقيع اذناه
يفضي على التهاب العين .

Luffa acutangula (S).

Louffa anguleux (F).

نوع من اللوف الزراعي . هذه الهند . ساقه تطول من ٣
الى ٦ امتار . اوراقه شديدة الخضار خضاسية او مسابية
التفصيص القلبي الشكل . ازهاره ثلاثية الاسدية . ثماره
مستطيلة ، عشارية الاصلع البازرة تطول من ١٥ الى
٣٥ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . ليدها شائع الاستعمال .

Locés (F).

٢٥١٦٦ - **لَوْطِيَّاتٌ**

سبط من فصيلة القرنيات القرنية ، اشهر اجناسه اللولس .

٢٥١٦٧ - **لَوْطَانِيَّاتٌ ، سَبَجِيَّاتٌ**

Loganiaceae (S), Loganiaceae (F), Loganiaceae (E).
فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة متحدة الفلقات . تشمل
٣٥٠ نوعاً من النباتات الشبية والنباتية والشجرية .
اوراقها بسيطة ، كاملة ، اذينية ، متقابلة .
ازهارها صغيرة القد ، لا قياسية الايزكان . ثمارها كرابل
مزدوجة ، متفلفة . اكثرها من نباتات البلاد الاستوائية
والحارة . معظمها جمالي يحوى بعض الناممر السامة
اخصها السركتين والبروسين .

Lophyrus pini (S).

Lophyre du pin (F). Pine sawfly (E). Gemeine
Kiefernblattwespe (D).

حشرة من اللشاريات ، طولها يراوح من ٩ الى ١٠ سم .
اجيالها الحولية ثلاثة . ذكرها اسود اللون . انثاها ملطقة
بالاصفر ، تمتع مكثها على بناتل الصنوبر فينقت عن
يرقات دقيقة همة تلثم الاهداب النامية وتقضي عليها .

٢٥١٦٨ - **لَوْفٌ ، لَيْفٌ ، قَيْلَجُوشٌ**Luffa (S). Louffa (F). Towal gourd (E).
Schwammkürbis (D). Luffa (I).

جنس نباتات عشبية حولية عارضة من فصيلة القرنيات .
انواعه ١٠ ينبتا المناطق الحارة ، بعضها متفلفة ، حولتها
منشعبة . اوراقها متعاقبة ، منقطة ، قليلة الشكل ، خضاسية
او سباسبية التفصيص . ازهارها وحيدة المسكن ، كبيرة
القد ، صفراء اللون . ثمارها غبارية الشكل مستطيلة .
نسجها عشن اللبب الخاوي الاسفنجي التركيب || اشهر
انواعه ما على .

٢٥١٦٦ - **لَوْقَاسٌ**

هو اللابيون الرقيق ، اطلبه .

٢٥١٧٧ - **لَوْقَانِيَّاتٌ**

Leucaenidae (S). Leucaenitidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها
وانواعها كثيرة المدد جميعها متوسطة القد او صغيرة . اطباها
العالم . تمش على الاحشاب البرية والزراعية اخصها
التجليات .

Leucania (S). Leucanie (F).

جنس حشرات حرشفية من فصيلة اللوقانيات . انواعها
عديدة منتشرة في معظم اسواق العالم . اجناسها صغيرة
القد . وراشها قليلة الزراكش والاهداب يتكرر فيها الاسمر
وشبقتها || اشهرها واضرها لوقائية التجيل .

٢٥١٦٩ - **لَوْفٌ اسْطَوَانِيٌّ * ، لَوْفٌ مَصْرِيٌّ**

Luffa cylindrica, L. aegyptiaca, Poppla fabiana (S).
Louffa cylindrique, Eponge végétale, Pétrole, Tor-
chon (F). Egyptian towel gourd, Rag-gourd, Vege-
table sponge (E). Aegyptische Schwammkürbis (D).
Luffa d'Egitto, Petola, Pecuola, Spugna vegetale (I).

نوع من اللوف الزراعي الشائع الاستعمال . ساقه تطول من
٣ الى ٧ امتار . اوراقه خضاسية التفصيص الكلوي الشكل .
ازهاره خضاسية الاسدية . ثمار اسطوانية تطول من ١٥ الى
٣٥ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ليدها شائع الاستعمال
المزلي .

٢٥١٧٩ - **لَوْقَانِيَّةُ التَّجِيلِ * (دودة الذرة)**

Leucania forey (S). Leucanie du maïs (F).

حشرة من اللوقانيات ، طولها نحو ١٧ سم . ثوبها حنطلي
للون اسمر الموج . وراشها الى السيرة الوردية . رقبها
دقيقة الجسم تطول نحو ٣ سم . رأسها الى الجلوة . ثوبها
حنطلي اللون وردي الموج يطوق تحطيط اسمر قاطب ويمعرض
تنفخه نقط سود نظامية الايزكان || تركيب التجليات
البرية والزراعية اخصها الذرة والقمح والحلطة نفوذ
المصنف وقد تقضي عليه عند كثرتها .

٢٥١٧٠ - **لَوْفٌ الْحَبَّةُ ، اُذُنُ الرَّاهِبِ**

Arum dracunculus, Dracunculus vulgaris (S). Ser-
pentaire commune, Gouet serpentaire (F). Common
dragon, Snake plant, Dragon arum (E). Drackenwurz,
Schlangenkraut (D). Aro sarpone, Dragonte, Serpentina (I).

نبات حشبي ارموي بري ورتبي من فصيلة القلقاسيات .
اروسه عشولية مبطة . اوراقه برتية مستطيلة الزناد .
وريقاتها ورتية التجميع ، فصلها ساني الصفحة الخضراء
المزركشة والمبجبة بالاسمر والاحمر والاصفر . ثمرها
يطول من ٥٥ الى ١٠٠ سم . ينبت بفرشاف يحوى السبة
لونه الى الجلوة المابقة .

٢٥١٨٠ - **لَوْقَانِيَّةُ دِكْسَكَة**

Leucania impura (S). Leucanie impure (F).

حشرة من فصيلة اللوقانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة .
موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق
الداخلية للناخا . فراشها جارية قوتها رقيق الازمار .
سرفتها تمش على عصف التجليات البرية || جسمها
متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . بسطها نحو ٣٣ سم . رأسها
اكلس اللون اصعب الموج . عينهاا كبيرتان . زبابها
خيطيان . جرشها وبعطها الى الكلسة الصهباء الموج ||
وراشها عند الشقين الى الكلسة تملوها مشقة سراء عند
الذكر ، شهبا عند الانثى || لها جيل واحد في الحول .
تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تشرح في

٢٥١٧١ - **لَوْفٌ جَعْدٌ**

هو الاروم الايطالي ، اطلبه .

٢٥١٧٢ - **لَوْفٌ عُسْطَرِيٌّ**

هو الزاونه الثعباني ، من النباتات الطبية ، اطلبه .



لوف اسطواني



لوفر الصنوبر



لوقائية التجيل



لوقائية دسنة

قسمين ، القسم العلوي رسامي المراج ، مبهر الحلب المشعب للثالث ، وقسم سفلي أخير المراج يملو جميع أسود يكتنف قواعد الروابي . رأسها أسود اللون . وأرجوها سمراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع ينقضي ضمن جراب تملقه في النبات .

٢٥١٨٨ - **لُوم** هو التلرج المتولي ، اطليه .

٢٥١٨٩ - **لُوماسية** *Lomatia* (S). *Lomatia* (F).
جنس نباتات جنية برية ووطنية من فصيلة الفصيات .
أنواعها المعروفة كثيرة منها بلاد امريكية واسرائيلية .
نوعها اوراقها لا قياسية الشكل منها البسيطة والمسننة والمقرضة .
انوارها متعدي التجميع ، طرفي رصوري الارتكاز .
انوارها جميلة الشكل ثلوية التركيب لونها الى الصفراء الاخير || اشهر انواعها حلقية ما يتبع .



لُومَة البنج

٢٥١٩٠ - **لُوماسية بهيئة الورق** *Lomatia ilicifolia* (S). *Lomatia ilicifolia* (F).
نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين .
اوراقها بيضيه وأهليجية وسنانية الشكل .
نصلها اخضر اللون على صفحتيه ، مغرض الحلقه أو سنبلها .
عناقيده الزهرية مستطيلة رهلة .
تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩١ - **لُوماسية حد يدية** *Lomatia ferruginea* (S). *Lomatia ferruginea* (F).
نوع من اللوماسية جنبها تملو من مترين الى ٣ امتار .
اوراقها مستطيلة الاعناق ثلاثية التفريض .
نصلها ماس الصفرة العليا خلي السفلى خله حديدي المراج متناقدها الزهرية متوسطة الحجم والكثافة معظمها طرفي الارتكاز .
تنورها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٥١٩٢ - **لُوماسية صباغية** *Lomatia tinctoria* (S). *Lomatia tinctoria* (F).
نوع من اللوماسية جنبها تملو من متر الى مترين .
اوراقها متوسطة القد لا قياسية التفريض .
نصلها لاح البشرة على صفحتيه .
عناقيده الزهرية صغيرة الحجم كثيفة التجميع .
زورها صباغية تنصب المله بالاحمر الوردي .
تنورها يستمر من تموز الى آب .

٢٥١٩٣ - **لُوهف** *Serrasalm* (S). *Serrasalm* (F).

الواحدة لوهفة .
جنس اسماك نهريه من مفتوحات المئاته وفصيلة القرصانيات .
انواعها المعروفة قليلة العدد يكثر وجودها في بعض انهر امريكية الاستراية || اجسامها مسطحة ، بيضيه الشوزن ، متجانبة الاسجام .
رؤوسها مقطوعة ، واسمة الاشدق ، مرصوة الاسنان الحادة .
اثوابها الى الخصار البحري المتفاوت المبادج تكثر فيه الفرقة .
زناقتها القليلة ثابتة || تتميز بجسامها القافضة اذا اذ تقسم كل ما تشاهد في الماء وكثيرا ما ترق شباك الصيادين || لحمها فاخرة الصنف مرغوب فيها .

٢٥١٩٤ - **لُومحقي** هو البازي ، اطليه .

٢٥١٩٥ - **لُوميزه** *Lippia* (S). *Lippia* (F). **لُوميزه** *Lippia* (S). *Lippia* (F).
جنس نباتات خشبية برية وزيتية من فصيلة رعي الحام .
انواعها زهاء ٩٠ اصنافها المناطق الاستراية والحارة .
اوراقها كاملة ، صغيرة ، دقيقة السنن .
انوارها لا قياسية التجميع يكثر فيها السننل والتكولي || اشهر انواعها الزراعية ما علي .



لوهف

الليل .
تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكان لعلها تل الصفحات السفلى من نصال المصف || السرعة تطول نحو ٤٥ سم .
جسمها اسطواني الشكل ، ماس القشار تملو نغط سون نظامية الارتكاز .
رأسها الى الحزوة ثوبها حطلي اللون ، اخير المراج يملو تحطيط احمر قاطب ويمتد .
ملها الى السرعة .
رواجها سون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في الفترة حيث تغمر السرعة ملتصقة بجلباب من اللبن .

٢٥١٩١ - **لُولاية** *Grand Nacré* (F).
فراشة تدعى ارجينيس البرادي ، اطليها .

٢٥١٩٢ - **لُوتسب** *Vis* (F). *Screw* (E).
قطعة اسطوانية معدنية او خشبية مفروسة حلزونية تستعمل في اغراض تشي .
اشهر الالاب :

Vis d'Archimède (F).
لُوب ارجيس
Vis sans fin (F).
لُوب لا نهائي
Vis multiple (F).
لُوب مضاعف
Vis tangente (F).
لُوب ماس
Vis hollandaise (F).
لُوب هولندي

٢٥١٩٣ - **لُوتسب سلاسي** *Cycle mérial* (F).
هو الدورة السلاسية ، اطليها .

٢٥١٩٤ - **لُوتسبي** *Spiral* (F).

٢٥١٩٥ - **لُولولة** *Perle* (F).
هي الدرة .
ج لؤلؤ ولؤلؤ .

٢٥١٩٦ - **لُوليات ، مطبقة الأجحة** *Plecoptera* (S). *Plécoptères* (F). *Plecoptera*, *May flies*, *Ephemeral flies*, *Shad flies*, *Lake flies* (E).
Eintagfliegen (D).
رنية مشترات من طبقة مستقيبات الجناح .
انواعها عديدة زهاء ٧٠٠ تجمعها بعض المتشابهات والاجناس .
تتيز بعيناتها الفاخرة الثلاثية التركيب وبانطباع اجنحتها الى الوراء عند الراحة والهمود ||
رقباتها مائية تعيش عاقلة على الصخور المنصورة بالماء .

٢٥١٩٧ - **لُولوية البنفسج** *Boloria selene* (S). *Nacré des violettes* (F). *Boloria selene* (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورنية حشرشيات الاجنحة .
موطنها يشمل الاقاليم المتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية .
فراشها واحة قوتها رحيق الازهار .
سرفها تعيش على اوراق البنفسج البري والزراعي ||
جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ سم .
يسطها نحو ٣٨ سم .
رأسها كروي .
عينها كبيرتان .
زبانها صلبتان .
مرشها دقيق الجسم .
جوشها وبعنها الى الكسني ||
رواشنها عند الشفق الى الصبورة الصناعية يطولها جميع ونقيع وتنظيف وثمة جميعها الى الكسني الحطلي المراج ||
لها جيلان في الحول .
تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر آب .
تسرح في النهار .
تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتص المكان ميعادها على نصال اوراق النبات المائل ||
السرعة تطول نحو ٣٢ سم .
جسمها اسطواني الشكل .
ثوبها الى العسلية الخفسرا يطولها غطان بجانيبان اسودان يفضلان الجسم الى

٢٥٢٠٤ - **ليكاح** *
Acinopus picipes (S).
 حشرة من فصيلة الهربولويات ، طولها يراوح من ١٢ إلى ١٧ سم . جسمها مخدوب الظهر . ثوبها إلى السواد الفحشي . تعيش في الأتربة الرملية الرطبة تقيم تحت الحجارة والاختساب . تسرح في الليل . قوتها البلور والحبوب وقد تصقب الديدان القارضة وتقتربها . يرقاتها غامضة قليلة الاذى .

٢٥٢٠٥ - **ليكاح أسود** *
Acinopus picipes (S).
 حشرة دهوية غامضة وناقصة من فصيلة الهربولويات ورتبة غدييات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد المتدلة الحارة من الشرق الأدنى وأروبة . جسمها صغير القد ، محصور الشكل ، مخدوب الصفة العليا ، عادم الجناح ، يطول من ١٥ إلى ١٧ سم . ثوبها إلى السواد الفحشي . رأسها كبير القد ، مستدير الشكل ، قصير الخنم . فكها ضليخان . زباناها عظيميان دقيقان . عيناها صغيرتان . الاثني اصغر قدأ من الذكر وأكـد ثوباً منه واقصر زبانا واضخم بطناً . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران وتبقى حتى اوائل ايلول . تسرح في الليل وتبيت في النهار تحت الحجارة . قوتها البلور والحبوب وتصقب الديدان القارضة وتقتربها .

٢٥٢٠٦ - **ليكاس**
Lias
 طبقة ارضية توجد في اسفل الاراضي الجورية .

٢٥٢٠٧ - **ليطاط**
Mortier (F). *Mortar* (E).
 غليظ من التلكس والريل او من الاسمنت والريل يضاف اليه الماء اللازم ويستعمل في البناء لتاسك الحجارة فيما بينها .

٢٥٢٠٨ - **ليبرالولا** *
Libratula (S).
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة الغلويويات . انواعها المعاصرة المحروقة قليلة العدد . موطنها غلجان جزر اقيانا . تعيش بين رسات المرجانيات . اصداؤها شبه بيضية الشكل ، ثنائية المصاريع تلتصق في مدافع المرجان وتستقر عليها .

٢٥٢٠٩ - **ليبيريللا** *
Libertella (S).
 جنس فلور بحيرية من فصيلة الرغيفيات . انواعه قليلة العدد والاصغر اتركب السوق والافصان اليابسة . ونبتته لا قياسية الشكل والشكل والحجم ، مشبهة عصير حلامي التركيب ، اصفر اللون او وردي . بويذاته خيطية ، حلالية الشكل ، شفافة .

٢٥٢١٠ - **ليبيريتيه** *
Libertia (S).
 جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسنيات . جلورها لينة . سورها منصبة معتدلة الارتفاع . اوراقها ضيقة النصال ، ثنائية التصنيف . ازهارها حرضية التجميع ، رتاجية الترتيب تبدو كالكسابل وهي يبيضاء اللون او زرقاء . تزورع التزيين في المرائن والحدائق . انواعها المحروقة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٥٢١١ - **ليبيريتيه جميلة** *
Libertia formosa (S). *Libertia belle* (F).
 نوع من الليبريتيه . عشبة تزينية معمرة . ساقها منصبة

٢٥١٩٦ - **لوزية سكرية** ، **ليته سكرية** *
Lippia dulcis, L. *asperifolia* (S). *Lippie sucré* (F).
 نوع من اللوزة وهي عشبة سبروتية تزينية معمرة تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فروع . اوراقها سكرية الطعم ، متعاقبة ، معتقة . نصلها يضي الشكل ذات الزام الاخير يطول من ٣ إلى ٤ سم . ازهارها عثكولي التجميع ، ابلي الارتيكاز او طرفي . ازهارها صغيرة القد يبيضاء اللون فواحة العرف الطري . تنورها يستمر طوال الصيف .

٢٥١٩٧ - **لوزية ليمونية** * ، **ليته ليمونية** *
Lippia citradora (S). *Lippie citronnelle*, *Citronnelle* (F). *Herb Louisa*, *Lemon verbena* (E). *Citronnenkraut*, *Lemonkraut* (D). *Cedrina*, *Cetrina*, *Erba limoncina* (I).
 نوع من اللوزة الازينية وهي جنبه سبروتية معمرة تملو نحو ٣٠٠ سم . ساقها منصبة فروع . اوراقها معتقة ثلاثية او رباعية القمة . نصلها سناني الصفحة يطول من ٨ إلى ١٠ سم . . ازهارها هري الشكل . ازهارها بنفسجية اللون . اوراقها وازهارها فواحة العرف الطري القريب الشبه من الليمون وهي تستعمل استهلاك الشاي . تنورها يستمر من تموز إلى آب .

٢٥١٩٨ - **لوزية ثوروية العبد** * ، **ليته ثوروية العبد** *
Lippia nodiflora, L. *canescens* (S). *Lippie fleuri aux noeuds* (F).
 نوع من اللوزة وهي عشبة تزينية معمرة . منبها الاصفاق الحارة . ساقها مستقيمة معادة . قروصها تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها صغيرة القد ، اهليجية الشكل ، نصلها سنن الحلقه . ازهارها عثكولي التجميع ، صفدي الارتيكاز . ازهارها صغيرة القد تملو من ٣ إلى ٥ سم . وهي عادمة العرف وردية اللون او ليلية . تنورها يستمر من ايار الى ايلول .

٢٥١٩٩ - **لوتيق**
Aicernanthare (F).
 نبات يضي لفة الحمل ، اطليه .

٢٥٢٠٠ - **لشفاعة** *
Innocuité (F). *Innocuousness* (E).
 اللثامة كون الشيء غير مضر او خلوص الشيء من الضرر .

٢٥٢٠١ - **لوتيق**
Hérison (F).
 هو القندل ، اطليه .

٢٥٢٠٢ - **ليكاح** * ، **قصص** ، **بليك**
Lamia (S). *Lamie*, *Touille*, *Nasilang*, *Requin-mar-souin* (F). *Lamia*, *Porbeagle*, *White shark* (E).
 سمكة بحرية مفترسة وحيدة الجنس والنوع من السنطليات القرشيات . جسمها مردي الشكل يطول نحو ٨ امتار . غطها خروطي يشرف على الفم . نياها شقيقة مستطيلة . ثوبها رصاصي اللون يمين وزرق مع القزايه من ثوج الظهر وبدر ويبيض عند البطن . حياتها بجاهية سربها يراوح من ٥ إلى ٢٠ زوجاً . تألف البحار الباردة والمتدلة ، ويبد منها في المتوسط . قوتها الاسماك من اي نوع كانت . لحمها مأكول . نجست منها واحدة حل الشاطئ اللبناني قرب نهر الكلب ، في ضيه ، وذلك في اواخر شهر شباط عام ١٩٥٨ .

٢٥٢٠٣ - **ليكاح** *
 اللباه : الارض البعيدة عن الماء .



لوزة ليمونية



لوزة ثوروية العبد



لياه



لياح



لياح أسود

ترتفع نحو ٤٠ سم. أوراقها ثنائية التصفيف ، ضيقة التصل . أزهارها شبه سنبل التجميع . أزهارها بيضاء اللون ، فواصة البرف أسطر || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

٢٥٢١٢ - ليبرييه رشيقة *

Libertia pulchella (S). *Libertia graciosa* (F).
نوع من الليبريه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها خفيفة ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم . أوراقها شبه سنبلية الشكل تطوي من ٨ الى ١٥ سم . أزهارها شبه سنبلية التجميع . أزهارها مستطيلة الاذن ، بيضاء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

٢٥٢١٣ - ليبرييه زرقاء *

Libertia corulescens (S). *Libertia bleutea* (F).
نوع من الليبريه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٣٠ الى ٦٠ سم . أوراقها مستطيلة ، ضيقة ، جامدة التصل . أزهارها شبه سنبلية التجميع ، سنبل التريب . أزهارها صغيرة الجرم زرقاء اللون يعلوها تمسح اطول || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٤ - ليبرييه كبيرة الزهر *

Libertia grandiflora (S).
Libertia à grandes fleurs (F).
نوع من الليبريه . عشبة تزيينية معمرة . ساقها صلبة ترتفع من ٦٠ الى ٩٠ سم . أوراقها كبيرة اللحد تطوي من ٣٠ الى ٧٥ سم . أزهارها سنبلية التجميع . أزهارها كبيرة الجرم بيضاء اللون || تنويرها صيفي .

٢٥٢١٥ - ليت *

Erythraea (S). *Palmier bleu* (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النخلية . أنواعها قليلة . أصلها البلاد الحارة والاستوائية . أجسامها منتصبة مستقيمة . أوراقها مدورة ثنائية . غوصها ثنائي التخليل جامد التصل المنتصب || اعرف أنواعها واشهرها ما يلي .

٢٥٢١٦ - ليت سرح *

Erythraea edulis, *Brahea edulis* (S). *Palmier bleu inerme* (F).
نوع من الليت الزراعي . شجرته شجرة تلو من ١٢ الى ١٥ م . برهتها كثيفة الأوراق . أوراقها مستطيلة أطرافها كبيرة اللحد ، قطرها يراوح من ١٥٠ الى ١٨٠ سم . غوصها جامد التصل . جيل الخفسار البحري الزاوي . ثمارها بلحية التركيب ، بيضية الشكل ، صغيرة اللحد ، سكرية الطعم ، مأكولة .

٢٥٢١٧ - ليت شالكة *

Erythraea armata (S). *Palmier bleu piquant* (F).
نوع من الليت الزراعي التريبي . شجرته تملو من ٤ الى ١٢ م . برهتها مستعدة الكثافة . أوراقها الخفسار الاذرق اللضي المراج . قطرها يراوح من ٥٠ الى ١٢٠ سم . غوصها جامد التصل ، جرائدها تطوي من ٧٠ الى ١٥٠ سم . وهي شائكة الدرز ، غليظة الحنف الاسود المحة .

٢٥٢١٨ - ليت *

Spire (F).
Single turn, *Whoral* (E).
الية دورة الخط الحلزوني .

٢٥٢١٩ - ليت *

Lela (S). *Lela* (F). *Lela* (E).
جنس حشرات من فصيلة القرضيات ودية ذات الجناحين . أنواعها المعروفة ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد المنتدة الحارة || أجسامها خفيفة تطوي من ٤ الى ٨ م . رؤسها صغيرة . عينها متباعدة عند الشقين . قرونها الاستشعارية خفيفة . ملابسها رطابية العقل . مرافقها نسيطة . كواسها شبه بيضية الشكل . بطونها احليجية . أطوارها ملونة . رؤسها قسطانية التخصيب يعلوها تجليل وتيتير . قوائمها مستطيلة . ظنايبها مجزأة بخاصة قوية || تألف المراج والقابات والمروج وصفات مجاري الماء ، فتها طلع الازهار ورحيقها . اساربها خاضعة او دائمة ويصفها عار .



ليت نافلة

٢٥٢٢٠ - ليت نافلة *

Lytta vesicatoria (S).
Cantharide du frêne (F). *Green cantharide* (E). *Spanische Fliege* (D).
حشرة طيبة نافلة من فصيلة الملويدات ، قوبها ذهبي اللون صناعي المراج . جسمها يطوي من ١٥ الى ٢٥ م . الذكر اصفر قدًا من الانثى . مرتها الاشجار الحربية اصعبا الحران يقد تنويه بالهاها اوراق . رقاتها تعيش حل بعض النباتات المشرية || كانوا وما زالوا يتلصونها لتجنبها وصحتها واستمال مسوحها كنافط وتامط .

٢٥٢٢١ - ليت و لشر *

وسلة المكابيل المتوفرة وهو عبارة عن ديسيت مكعب . مضطافته الكاليتري (١٠ ليت) والمكوكيتري (١٠٠ ليت) اما اجزاء فهي الليتير والستيليتير والليلير .



ليني اصفر

٢٥٢٢٢ - ليتشي *

Litchi (S).
Litchi, *Ponceau* (F). *Litchi* (E).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الصابونيات . مهها البلاد الاستوائية الاسوية . انواعه قليلة . أوراقها متعاقبة مدعقة احليجية . أزهارها حلقى التجميع ، محوري وثاني الاذنكاز ، أزهارها صغيرة اللحد بيضاء اللون ، ثمارها ذكية العرف توكل وتستهمل في استحضار بعض التشنجيد والمشروبات الروحية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٥٢٢٣ - ليتشي اصفر * ، وسبوتان *

Nephelium lappaceum (S). *Néphélion*, *Ramboutan* (F). *Rambutan*, *Rampontan* (E). *Rampontan-Frucht* (D). *Nefelio* (I).
نوع من الليتي الزراعي . ثماره قليلة الشكل صفراء اللون مأكولة ويستخرج من صلبها بعد تحميره وتقطيره قنيد كحول شائع الاستعمال في الشرق .



ليتشي صيني

٢٥٢٢٤ - ليتشي صيني *

Litchi chinensis (S). *Litchi de Chine* (F). *Litchi*, *Loechee* (E). *Litchisbaum* (D). *Litchi* (I).
نوع من الليتي الصيني مهده الصين حيث تكثر زراعتها الاستوائية . ثماره بيضية الشكل والحجر اللين ماكولة ويستخرج من صلبها بعد تحميره وتقطيره قنيد كحول لاذع شائع استعمال .



ليتوب

٢٥٢٢٥ - ليتة هي قوية الثقلير ، اطليا *

٢٥٢٢٦ - ليتوب *

Lichobius (S). *Lichobie* (F).
Lichobius (E). *Brauner Steinkriecher* (D).
جنس دويبات من فصيلة الليتريات . انواعه كثيرة العمد

أَبُو عَوْيَفٌ ، أُمُّ عَوْيَفٌ ، أُمُّ قَيْسٍ
Fourmil-ion, Myrméleon (F). Ant-lion, Myrmeleon (E).

جلس حشرات من عصبيات الجناح. أنواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحساسة وفي بعض مناطق البلاد المعتدلة. حشرات مرتقة تعيش على رقيق الاثمار ، أما دعاميسها لفترمة تصيد الحشرات الصغيرة اغصها النمل.

٢٥٢٣٣ - لَيْثَمِمْ
Licmetis (S). Licmetis (F). Licmetis (E).

جلس طير من المتسلقات وفصيلة البهارات. أنواعه المعروفة ثلاثة موطنها استرالية ونيبانية وجزر سليمان. تألف العنايات والمواقع الربطة. ملجئها الحيواني جاهي. افواجها قليلة العدد. قوتها البذور والبصل والمساقل وبعض الحشرات والاساريع || اجسامها مستدلة القد ، طولها من ٤٥ إلى ٥٥ سم. تتميز بتقاعدها الحسنة الذرية التي طولها من ٥ إلى ٦ سم. ويقتصر اذناها المستديرة الاطراف. انثواها الى البياض الماسي يعلو موج اصفر او اخضر ويشمل القصعة السفلى من الجناح ويمتد الى الاطيان والانفك. رؤوسها وحاسرها وكشاتها الى الحمرة التي تختلف ملامحها مع اختلاف الانواع.

٢٥٢٣٤ - لَيْثُوم
Lithium
فلزات قوية تبيد في الطبيعة وفي بعض النباتات اغصها النخج || وهو ابيض اللون ففي الرهبة اصلب من البوتاسيوم والصوديوم. نقله النوبي ٥٩٠. ينصهر في ١٨٠ درجة مع.

٢٥٢٣٥ - لَيْثِيَّة
Ligia (S). Ligie (F). Ligia (E).
جنس دويبات بحرية من القشريات متساويات الارجل وفصيلة الظرومليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم. تألف القطيوط البحرية || اجسامها صغيرة ، اهليجية الشكل ، معتدلة التبيط. رؤوسها صغيرة. عيونها جاحضة. قرونها الاستعمارية مستطيلة ، مركبة. ملامسها الشريفة فارة الاطراف المستطيلة.

٢٥٢٣٦ - لَيْثِيَّة
Liche (F).
سمكة بحرية تسمى سمندره ملساء ، اطلمها .

٢٥٢٣٧ - لَيْثِدَة
Lyde (S). Lyde (F).
جنس حشرات من المشاريات غشائيات الاجنحة. انواعه نحو ٥٠ اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة ، ملونة. اجنتها خفيفة. رفاقها مستطلة همة تركب الانجار الحرجية والمثمرة اغصها الصنوبر والتوتوب والدراق والاجاص فلتهم الارواق وتقتفي عليها || اشهر انواعها واغرها ما يلي .

٢٥٢٣٨ - لَيْثِدَة الْإِجَاص
Neurotoma flaviventris (S). Lyde du polier (F). Pear web-spinning sawfly (E). Gesellige Birnblattwespe (D).
نوع من الديدنة وحيدة الجبل الحولي ، جسمها يطول من ١٢ الى ١٤ سم. لونه الى السمرة يطولها يتبع متعرج اصفر يمتد من الرأس الى الشرج || رقتها براقالية اللون ، سوداء الرأس ، عديمة الارجل البطينية تظهر في الربيع . تركب اوراق الانجار المثمرة اغصها الاجاص .

منتشرة في معظم اصقاع العالم . اجسامها مركبة من ١٥ حلقة تحمل ١٥ زوجاً من الجرايم منها ثلاثة ازواج صغيرة القد .

٢٥٢٣٧ - لَيْثُوب مَبْدُول
Lithobius forcipathus (S). Lithobie à tenailles (F). Lithobius (E).

دويبة مفترمة مبدولة من فصيلة الليثوبيات ورتبة اللنداعيات شقويات الارجل ، موطنها يشمل معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من المئين القدم والجلد جسمها قريب الشكل بهجم الحريش ، مبسط الشكل ، مستطيل . مركب من ١٥ سكة . الذكر اصغر قدماً من الانثى يطول نحو ٣٥ م. والانثى تطول نحو ٦٠ م. رأسها صغير الحجم ، مستعرض الشكل . حناها زحميتان . شيفها ضليان ، مقصوص ينتهيان بكاشتين قويتين . زباناها مستطيلان اعرجان . جرابها نسيطة . ثوربا الى الشففة الحظية الملاج . مدنها وجرابها الى الطلعة الثبراء || تألف الاراضي الزراعية والملاحة . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والرخويات الصغيرة . غصتها مؤلة لكنها قليلة الاذى .

٢٥٢٣٨ - لَيْثُوبِيَّات
Lithobiidae (S). Lithobies (F). Lithobiidae, Lithobius (E). Steinläufer (D).
فصيلة دويبات من اللنداعيات الشقويات الارجل . اجسامها وانواعها عديدة ، اشهرها الليثوب .

٢٥٢٣٩ - لَيْثُوفَانَة سَمْرَاء
Lithophana semibrunnea (S). Lithophane semibrune (F). Lithophana semibrunnea (E).

حشرة من النسيقات حرشيات الاجنحة . موطنها بعض اسراج الشرق الادنى . فراشتها جارية قوتها رقيق الاثمار . سرقتها تعيش على اوراق السديان || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ م. بسطها نحو ٤١ م. رأسها فاسي الشكل ، اسمر اللون . عيناها كبيرتان . زباناها غيطان . جوشها اسمر اللون ، حطلي الملاج . بطنها حطلي اللون اسمر الحيد || رؤسها الاناميان الى الحطلي الاسمر يطول تقيج اسمر قائم . رؤسها الخلفيان الى الحطلي الاخير يطول تقطيط اسود في اختار الخارجي . اهدابها حطلية || لها جبل واحد في الحول . تظهر القراة في ايلول وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تمتع الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات التسلق من نصال اوراق السديان || السرعة عند ادراكها الكمال الجسوري تطول نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل ، مشددة القشار ، ارمد اللون ، اسمر الملاج يطول نحو ثلثي ابره وتسعة خطوط جانبية متعرجة صفراء اللون . رأسها مخروطي الشكل ، اسود . مدنها ورواجبها الى السمرة || طول الاكمال يستمر نحو ثلاثة اشابيع ويتقضي في التربة حيث تنضج السرعة ملتصقة بجلباب من العن .

٢٥٢٣٠ - لَيْث
Lion (F).
الليث هو الاسد . ج. ليوث .

٢٥٢٣١ - لَيْث الليث : نبات ملتص (اللسان) .

٢٥٢٣٢ - لَيْث عَفْرِين ، بَقَرَة بَنِي إِسْرَآئِيلَ ،



ليثوب مبدول



ليثوبان سمراء



ليث عفريين



ليث



ليدة الاجاص



ليدة الدراق



ليدرك سوني البرف



ليدك شتم



ليدك حرايا



ليدك مسيك



ليشة

انواعه المعروفة خمسة منها حوض البحر الابيض المتوسط
وجزر كنارية || جميعها نباتات نجمية قراءه. اوراقها
مركبة ، وقرية ، ثلاثية الوريقات ، غفلة الشكل .
ازهارها عقدي طرقي . ازهارها صفراء اللون او ارجوانية .
ثمارها قرينة مبطنة خلية القشار || اشهر انواعه اللبب
المخشب واللبب اليوناني .

٢٥٢٤٦ - لَيْدَبْ صُشْعَبِ

Adenocarpus divaricatus (S).
Adenocarpus divariqué (F).

نوع من اللبب . طوي في جبال لبنان . فروه مزينة
الساه . وريقاته السفلية بيضيه النصال . اما العليا
فسنانية || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٥٢٤٧ - لَيْدَبْ يُونَانِي

Adenocarpus graecus (S).
Adenocarpus de Grèce (F).

نوع من اللبب . طوي في جرد لبنان . فروه وكزوس
ازهاره مزينة وخليه || تنويره صيفي . ازهاره صفراء اللون .

٢٥٢٤٨ - لَيْدُون

هو الاسلخ ، نبات بري طوي ، اطلبه .

٢٥٢٤٩ - لِيُونْدُون

Liriodendron (F).

هي شجرة التوليب ، اطلبه .

٢٥٢٥٠ - لِيْسَر

Lysa (F). *Lysin* (E).

اسم تعريفي يطلق على الامخلل السنجي الذي تحبه
بعض الدوامل المنصوبة المعروفة باليزين .

٢٥٢٥١ - لِيْزُول ، لِيْسُول

Lysol
سائل دهن كئيف المادة، جوزي اللون، اسمر المايه، مركب
من الكريوزيت والقطران والشمق والصابون . وهو من
المطهرات الفعالة الشائعة الاستعمال الزراعي .

٢٥٢٥٢ - لِيْسِين

Lysine (F). *Lysin* (E).

اليزين مادة عضوية مجهولة الطبيعة تملك خاصية تلويب
الكربات الحمر ومحيرات النسيج والبكتيريات .

٢٥٢٥٣ - لِيْسْكَوِين

Leycesteria (S).
Leycesteria (F).

جنية معمرة برية وتربنتين من فصيلة المانيات . منها
الباد الاسيرة الحارة . ساقها منتصبة فراءه جفاء تملو
من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها عابطة متعاقبة ، نصلها
بيضي الشكل ذات الزرام الاخير يطوي نحو ١٦ سم . ويعرض
نحو ٩ ازهارها جيلة القالب ، يسهام اللون ، وريدة
التنويح ، ارجوانية القنابات ، عقودية التنجيم ، متدلية .
ثمارها حنينة جلوية || تنورها يستمر من آب الى ايلول .

٢٥٢٥٤ - لِيْسِن

Chrysopogon (S).
Chrysopogon (F).

نبات عشبي بري مرعوي حولي من النجيليات . يكثر
في الاراضي الجبلية الملحاة . وهو من نباتات لبنان الطوية .

٢٥٢٥٥ - لِيْشِيَّة

Lichia amia (S). *Liche amia* (F).

مسكة بحرية من الاسقمريات . جسمها اهليبي الشكل ،

٢٥٢٥٦ - لَيْدَكَة الدَّرَاقِين

Neurotoma nemoralis (S). *Lyde du pècher* (F).
Apple web-spinning sawfly (E). *Gesellige Pflsch-*
blattwespe, *Steinobet-Gespinnstblattwespe* (D).

نوع من الليدة وحيدة الجيل الحولي ، جسمها يطوي من
٧ الى ٨ سم . لونها الى السمر السوداء . رأسها مبطع بالاصفر
يطها جمعد بالابيض . تظهر في اواخر نيسان ، تمتع
مكثها على سطوح الاوراق السفلى فينثف من برقسات
منطقة نمة لونها الى الخضرة المابقة لملوحا خطوط سمر
قائطة ، تركب بعض الاشجار الممررة انحصها الدراق
واللوز فتلثم الاوراق بعد ان تمتطها ينزلها المنكوتي
الدقيق .

٢٥٢٤١ - لَيْدَكَة ، لَيْدَاكَة

Rhodopaxillus (S). *Rhodopaxille* (F).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الداريقيات
انواعه المعروفة قليلة العدد اصطناعا النباتات والحراج الجبلية .
تميز بالونها الزاهية . جميعها مأكولة مستحبة الطعم
والرطب || اعرف انواعها واشهرها الاربعة التالية :

٢٥٢٤١ - لَيْدَكَة سُوْسِي الْعَرَف

Rhodopaxillus irinus (S). *Rhodopaxille iris* (F).

نوع من اليدك . يعيش على الدبال والمواد النباتية المتحللة .
يوجد عند اطراف الغابات وفي منطقاتها . ساقه غليظة ،
مستضخمة القاعدة ، معتدلة الانتعاش ، غبراء اللون .
نكتة قلنسوية الشكل ، سوسية العرف ، ليلكية اللون
يطولها موج صناعي ، قطرها نحو ٧ سم . اطراسها اصفر
اللون || لحيتها مأكولة ، فاعرة الصنف .

٢٥٢٤٢ - لَيْدَكَة شَمِيْم

Rhodopaxillus saevus (S). *Rhodopaxille sinistre* (F).

نوع من اليدك . يعيش على الدبال في المراعي . ساقه
قصيرة ، مستضخمة ، بضعجية اللون . نكتة كبيرة القند
قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البني الاسفع يزوه عند
الحافة . اطراسها الى الصفرة البنية الموج || لحيتها جيدة
الصنف ، مأكولة .

٢٥٢٤٣ - لَيْدَكَة حَرْبَان

Rhodopaxillus nudus (S). *Rhodopaxille nu* (F).

نوع من اليدك . يعيش على المواد النباتية المتحللة . ساقه
معتدلة النلاخلة والارتفاع ، مستضخمة القاعدة ، ليلكية
اللون . نكتة صاجية الشكل ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها
الى البشجي يطوي موج كسني اسفع . اطراسها ليلكية
اللون || لحيتها مأكولة فاعرة الصنف .

٢٥٢٤٤ - لَيْدَكَة مَسِيْك

Rhodopaxillus sordidus (S).

Rhodopaxille sordide (F).

نوع من اليدك . يعيش على الدبال في حواشي الغابات ،
ساقه معتدلة اجرم بنضجية اللون . نكتة منتشة الصلحة
المنتدرة ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى البشجي ،
اطراسها الى الليرة اليلكية الموج || لحيتها جيدة الصنف ،
مأكولة .

٢٥٢٤٥ - لَيْدَبْ

Adenocarpus (S).

Adenocarpus (F). *Adenocarpus* (E).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة القرنيات الفراقية .

من عضوية ومعنية || أنواعها المعروفة كثيرة أشهرها الثلاثة التالية :

٢٥٢٦٢ - ليكوريديس بهي *
Lycoris radiata (S).
Lycoride rayonnante (F).

نوع من اليكوريدس . عشية دوفضية سرقية منبتها الصين واليابان . شراخها يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها قديمة الشكل تبرز نحو ٢ سم . تصلها إلى الخضر البحري . أزهارها قصيرة الكؤوس منبسطة البتلات النجمية الشكل ، قطرها نحو ٤ سم . لونها إلى الأحمر القرمزية يطوقها إطار ابيض || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٢٦٨ - ليكوريديس مذهي *
Lycoris sanguinea (S). *Lycoride rouge-sang* (F).

نوع من اليكوريدس . عشية دوفضية سرقية . منبتها اليابان . شراخها يعلو من ٣٥ إلى ٥٠ سم . أوراقها صغيرة نحيلة ، تظهر على الأزهار ، لونها إلى الخضر الالامس . أزهارها مستدلة الجرم تطول من ٤ إلى ٦ سم . قطرها نحو ٤ سم . لونها إلى الأحمر الدامية اللامعة || تنويرها يستمر من تموز إلى آب .

٢٥٢٦٩ - ليكوريديس مذهب *
Lycoris aurea (S). *Lycoride dorée* (F).

نوع من اليكوريدس . عشية دوفضية جادة مطلية . منبتها الصين . شراخها يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها قديمة الشكل ، تصلها إلى الخضر البحري . أزهارها مائدة البرف تطول نحو ٨ سم . لونها إلى الصفار الذهبي || تنويرها يستمر من تموز إلى ايلول .

٢٥٢٧٠ - ليكوس *
Lycus (S). *Lycus* (E).

جنس حشرات من فصيلة اليكوسيات . وربة مخدمات الاجنحة . انوله المعروفة عديدة ، منتشرة في بعض المناطق الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، هبلة ، تطول من ٧ إلى ١٢ م . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكرها نظامية . ملابسها صغيرة . قرونها الاستشعارية خيطية . كواسلها شبه مربعة الشكل . المهادها لاسفة . قوائمها نشيطة . اناوبها ملونة || الحشرة الجلجلة خاضعة وواضحة ، اما البرقة ففترسة .

٢٥٢٧١ - ليكوسيات *
Lycidae (S). *Lycidae* (E).

فصيلة حشرات من مخدمات الاجنحة . اجناسها واناوعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض اصقاع البلاد الاستوائية والحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة النحيط ، تطول من ٩ إلى ١٥ سم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكرها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها صغيرة ، المهادها لاسفة . رشفة . ارساها خاسية القفل || أشهر اجناسها اليكوس .

٢٥٢٧٢ - ليكوفوسيه أرجوانية *
Lycophotia porphyrea (S). *Lycophotia pourpre* (F). *Lycophotia porphyrea* (E).

حشرة من الفسقيات حرشفات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية

كبير القدح ، يطول نحو ١٠٠ سم . تتميز بمشطها الثاني الانسان الذرية الحادة الذي يتقدم الزمعة للظهرية . اصلاها شرق البحر المتوسط . يكثر وجودها في العنق . شها مأكول متوسط الصف .

٢٥٢٧٦ - لبطة
Pellicule (F). *Pellicle* (E).

اللبط : قشر القصب اللازق به . الواحدة لبطة .

٢٥٢٧٧ - لبثيات
Lypoidae
فصيلة حشرات من تصفيات الجناح تنمي ايضاً طريات .

٢٥٢٧٨ - لبث
هو اللوف ، اطلة .

٢٥٢٧٩ - لبثاني *
Filamenteux (F). *Filamentous* (E).

ما كانت نسجه لبثية التركيب .

٢٥٢٨٠ - لبثية *
Fibre (bot.)
اللبث خلايا مستطيلة مردنية الشكل ، خشبية الجدران تجتمع على شكل نسج لبثي .

٢٥٢٨١ - لبثين *
Byssus (F). *Byssus* (E).

مادة لبثية شديدة التمدد تفرزها بعض الرغويات للاتصاق بالصخور المعنونة بالماء . وقد يحاك منها نسيج اتم من الحرير لونها إلى الخيطي اللبني المواج .

٢٥٢٨٢ - لبثسي *
Byssogene (F). *Byssogenic* (E).

نمت تبرعني يطلق على كل ما له صلة باللبثين كاللدة اللبثية وغيرها .

٢٥٢٨٣ - لبثسي
Ligneux (F). *Ligneux* (E).

نمت تبرعني يطلق على النباتات الخشوية السوق والقروخ .

٢٥٢٨٤ - لبثين
Fibrine
هي القبرين ، مادة آسية حيوانية أو نباتية تستخرج من الدم في الحيوان على شكل خيط يبيض .

٢٥٢٨٥ - لبثكتس *
Lycate (S). *Lycate* (F).

جنس نباتات معمرة نارية أو آسية من فصيلة السحليات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ جنسها امريكية المهد وقد انتشرت زراعتها المركبة الآريينية في معظم اقطار المعمورة || سرها دوفضية تطول من ٤ إلى ٨ سم . أوراقها قليلة العدد معتقة ، كبيرة التصل تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أزهارها وصيدة كبيرة قطرها يراوح من ١٢ إلى ٢٠ سم . تركز على شراخ دقيقة لبثية تملو من ٢٥ إلى ٤٠ سم . ألوان أزهارها عديدة أكثرها الابيض والاحمر والاصفر والابيض الموشق بالجلودي والاصفر المرسط بالكتني ... تنويرها يستمر من تشرين الثاني إلى اواخر آذار .

٢٥٢٨٦ - ليكوريدوس *
Lycoris (S). *Lycoride* (F). *Lycoris* (E).

جنس نباتات عشية دوفضية من فصيلة الترجسات . منبتها الصين واليابان . شراخها مصتة . أوراقها نبيقة التصل . أزهارها شبه قمية الشكل صفراء اللون أو حمراء || تزود للزئين ضمن البيوت وفي الحدائق . قارب في الالوية المنسوبة التركيب المنصري الوافرة المواد النفاذية



ليكاس



ليكوس



ليكوفوسيه ارجوانية

الكورن الرباعية التسعين . بتلاتها رباعية التخصيص . اسديتها ثنائية التركيب . ثمارها جراء ثنائية المصارع . اعرف انواعها وراشرها ما يتبع .

٢٥٧٦ - تيلك اوزق ، تيلك مبدل

هو الأفران ، اطليه .
Lilas commun (F).

٢٥٧٧ - تيلك اوزب

Syringa pubescens (S).
Lilas pubescent (F).
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . فروعهما مجزوة اللين . اوراقها بيضيه ذرية ، نصلها خلي البشرة على صفحته . ازهارها مستطيلة الشكل ، ارجوانية اللون ، ياسمينية العرف المستحب || ازهاره يستمر طوال شهر ايار .



ليكوفوبه ناهمة

٢٥٧٨ - تيلك حماريا

Syringa emodi (S).
Lilas de l'Himalaya (F).
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها اهلينية الشكل نصلها اسم العروق ، خلي البشرة الشغل . ازهارها ذرية ، غبراء اللون ، كريمة الرائحة || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٥٧٩ - تيلك ريشي

Syringa pinnatifida (S).
Lilas à feuilles pennées (F).
نوع من اليلك التريبي جنبته تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها مركبة ويشية . وريقاتها سباحية او تساعية العدد ، نصلها ازغب المقصعة الشغل . ازهارها ودية اللون خاتبة العرف || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٥٨٠ - تيلك صيني

Syringa chinensis (F).
Lilas de Chine (F).
نوع من اليلك التريبي تجرته تملو من ٥ الى ٦ أمتار . اوراقها سنائية النصل مستطيلة الانحاء المجزوة اللين . ازهارها الى البياض كالحلي كريمة الرائحة || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٨١ - تيلك عريش القوق

Syringa oblata (S). Lilas à larges feuilles (F).
نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها مستعرضة تعطي وتعرض نحو ١٢ سم . نصلها لامع البشرة على صفحته ، شديد الخشاش الباقي . ازهارها ليكية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره قصير الامة يلمو نحو ٢٠ يوما ابتداء من النصف الثاني من نيسان .



ليك

٢٥٨٢ - تيلك قارسي

Syringa persica (S).
Lilas de Perse (F).
نوع من اليلك التريبي ، جنبته تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اثمارها واثنائها نخلة . اوراقها سنائية ، نصلها جامد المقصعة زاهر الخشاش يملو نحو ٤ سم . ازهارها بنفسجية اللون فواحة العرف الطري || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٨٣ - تيلك ياباني

Syringa japonica (S).
Lilas japonais (F).
نوع من اليلك التريبي ، شجرته تملو من ٧ الى ٨ أمتار . اوراقها سنائية ذرية ، نصلها خلي المقصعة الشغل ، بحري اللون ، ازهارها حادة العرف ، لونها الى البياض الثلجي ، قندما كبير القد يملو نحو ٣٠ سم . ويعرض نحو ٢٠ سم . تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

قوتها رقيق الازهار . سرفتها تمشي على اوراق الخلفيات واخصها السوم || جسمها متوسط القد يملو نحو ١٢ م . يسلها نحو ٣١ م . رأسها فاسي الشكل . عينها كبرتان . زباناها عيطان . مرفها معتدل الجرم والليل . جنبها وبطها الى الكلفة المشيرة بالاريجولي || ورشها الاماميان الى الخمرة الابرجوانية تملوها زركشة يضاء وتزاويق سود ورققة سطية . ورشها الخلفيان الى الكلفة يملوها موج اشع وجدار اسمي يستيق الاهداب البنية || لها جليل واحد في الحول . تظهر . القراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الجبل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح الممكن مجامدا على الصفحات السفلى من نصل الوراق || السرعة عند بلوغها الادراك التام تطلو نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . قوتها الى الخشاش الاطسل تملوها ثلاثة عطلون غبراء اللون يتوسطها الجزوي الاسود الموج . رأسها الى المجرة . مدتها الى النملة . رواجها سود || طور الاكمال الذي يشتر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين يلحف السرعة .

٢٥٧٣ - ليكوفوبه ناهمة

Lycophotia saucia (S). Lycophotia polyphage (F).
Lycophotia saucia (E).

حشرة من فصيلة النسيقات حشرقيات الاجنحة . موطنها عند من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشالية والبلاد الاريقية . فراشها جارة قوتها رقيق الازهار . سرفتها خاضعة ناهمة تمشي على اوراق النباتات المختلفة من القبول الى النباتات الزراعية والصناعية والتريبية والنجار الحشرة || جسمها متوسط القد يملو نحو ١٨ م . يسلها تراوح من ٤٠ الى ٥٠ م . رأسها فاسي الشكل . عينها كبرتان . زباناها عيطان . مرفها معتدل الجرم والليل . جنبها وبطها الى الخلفي الاسود الموج || ورشها الاماميان الى المجرة السنائية الموج تملوها زركشة وتزاويق سمراء اللين . ورشها الخلفيان الى البياض الاخضر يطفو حشار سطلي || لها ثلاثة ابيال في الحول . تظهر فراشة الجليل الاول في نيسان وفراشة الجليل الثاني في حزيران وفراشة الجليل الثالث في ايلول . تسرح في الليل وتماطل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتفتح الممكن مجموعات متباعدة العدد على الصفحات السفلى من نصل الوراق التي تتلاشى التربة || الطور الاسروي يستمر نحو ستة اسابيع في الجليلين الاول والثاني ونحو ٢٧ اسبوعا في الجليل الثالث . والسرعة عند ادراكها الكمال الجسوري تطلو من ٤٥ الى ٤٥ م . جسمها مستدق المقدم مستطيل المؤخر . قوتها متعادل السرعة والكهبة يملوها خط لبيبي اسود متعرضة نقط صفر . رأسها منقط بالاسود || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع ، في جميع الاجيال ، ينقضي في التربة ضمن جلباب من الطين .

٢٥٧٤ - تيل

Courtilson (F). Whimbrel (E).
الليل هو فرخ الكروان . يفاك فلان اجين من ليل .

٢٥٧٥ - تيلك * ولسنج ولسنج

Syringa (S). Lilas (F). Lilac, Pipe tree (E). Lilac, Flyeder (D). Lilac, Siringa, Lilas, Serenella (I).
جس نبتات برية وتريبية من فصيلة التريبيات . انواعها عديدة منها الجنيات والنجار . اثمارها واراقها متقابلة . ازهارها قوتها التجميع ، ناهي الارتكاز . ازهارها قصيرة

الكهبا اللون بين تكون الصفحة اليسرى يضاء اللون غبراء المواجه. وهي من الاسماك المأكولة المتسببة الطعم.

٢٥٢٩٣ - ليمنوغال عفتاس

Limnogaes mergulus (S) *Limnogaes plongeur* (F). حيوان لين حاشر من فصيلة المظاليات. موطنه جزيرة مدغشقر. يألف صفاط مجاري الماء. قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القند مكروم بطول نحو ٢٦ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٣ سم. رأسه فيه غمرقوي الشكل مستطيل الخطم. هيئته وأذناه صغيرتان. جوارحه قصيرة. جميع أصابعه مخفية عما يساعده على السباحة والغوص ثوبه الى الشققة السمراء. وبره دقيق ناعم || الاثنى ثنود تضع في كل ربح من ٨ الى ١٠ جراء.

٢٥٢٩٤ - ليمنوفيليات

Limnophiliidae (S). *Limnophiliidae* (F). فصيلة حشرات من رتبة جلولويات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة المنتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متباينة الحجم. اثنواها تراوح من الطفلة الى السمر. ملابسها الفكية ثلاثية الاجزاء عند الذكور و ثنائيتها عند الاناث. رثامها مسووجة. اجنتها الامامية رقيقة يعطوا بعض الحمل المبهر. قوائمها الامامية مجعزة بمنحس ظنبوي الارتكاز. قوائمها الوسطى ثلاثية المنحس || اساريمها تمشي في الماء ملحوقة بجلايب مختلفة الاشكال منها الاسطوانية والمروية والمهرسة والمبطلة.

اشهر اجناسها :

<i>Limnophilus</i> (S).	الليمفيل
<i>Anabolia</i> (S).	الانابوليا
<i>Grammatolus</i> (S).	الغرامتولوس
<i>Colpotaulus</i> (S).	الكولتولوس
<i>Mesophylax</i> (S).	الميزوفلاكس
<i>Halesus</i> (S).	الهلسوس
<i>Drusus</i> (S).	الدروسوس
<i>Enoclyia</i> (S).	المنكليل

٢٥٢٩٥ - ليمور

Lemur (S). *Lémur* (F). *Lemur* (E). جنس حيوانات لاحة صغيرة من الليموريات. انواعها المعروفة اربعة. مهددة هضاب ومرتفات جزيرة مدغشقر. جميعها مستطيلة الشكل. مستطيلة الاجسام الرشيقة والاذناب المطولة || تألف الغنايات. تسرح في الليل او في النهار. قوتها الحشرات والمغاة وتختلف الزخافات والطير والثمار.

٢٥٢٩٦ - ليموريات

Lémuriens, Prosimiens (F). رتبة حيوانات لبونة من القربيات الليمبات تشمل في فصائل تضم بعض الاجناس والمند من الانواع. جميعها صغيرة القند، رشيقة القوام، مستطيلة الاذناب.

٢٥٢٩٧ - ليمون

Citrus (S). جنس اشجار وتجويرات مشمرة زارعية من الحمضيات. انواعها عديدة اعطانها البلاد الحارة. سوقها متسبة فراءه، قنار، حشفة. اوراثها معقنة. نصالها مستطيلة لامة الخضار. ازهارها غنثرية مشرقة عطرة. ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام والالوان. يغلب فيها الاخضر الاصفر

٢٥٢٩٤ - ليمبات

هي التفتيات، فصيلة حشرات، اطليها.

٢٥٢٩٥ - ليمبة

هي التفتية من الحشرات، اطليها.

٢٥٢٩٦ - ليمبة الجنبجل * هيمبال الجنبجل

Haplatius humilis (S). *Héptale du houblon, Phalène du houblon* (F). *Ghost swift moth* (E). *Hopsfenwurzelbohrer* (D).

حشرة من الليمبات، جسمها غليظ الشكل حشفي اللون، بسطها تراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. الاثنى اكبر حجماً من الذكر. روائثها الى الصفرة النورية يعطوا تقيج اخر. روائث الذكر فضية اللون جزئية الاهداب. جيلها الحولي واحد. يكثر وجودها من حزيران الى تموز. تمشي ريثها على جلود الجنجل تسطها وتؤذيها.

٢٥٢٩٧ - ليمبة قارضة

هي فرقة النودة القارضة، راجعها.

٢٥٢٩٨ - ليمبية

Laelia (S). *Lélie* (F). *Laelia* (E). جنس نباتات شتية امنية من فصيلة السطليات. شاربها لاقحاسية الارتقام. اوراثها مسيكة النصال القاسية. ازهارها متفوي، التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها كبيرة بعضها عطري المرف || انواعها المعروفة قليلة، اشهرها التالية :

٢٥٢٩٩ - ليمبية خراشبية

Laelia furfuracea (S). *Lélie furfuracée* (F). نوع من الليمبية منها المكسيك. ساقها رقيقة تملو نحو ٧٠ سم. اوراثها عديدة الالحجية النصال الخراشبية الصفحات العليا. ازهارها كبيرة القند عطرة، قطرها نحو ١٢ سم. لونها الى الياض الماني، يعاها في وسطها بقعة مستديرة صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف.

٢٥٢٩٠ - ليمبية قزعة

Laelia pumila (S). *Lélie naine* (F). نوع من الليمبية. ساقها دقة مستطيلة متسبة تحمل ورقة واحدة الالحجية النصل. زهرها واحدة كبيرة القند، وردية اللون، قطرها نحو ١٠ سم. وهي فواحة المرف الطل، تركيز على خراج يرتفع نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر عدة اسابيع بين ايلول وتشرين الاول.

٢٥٢٩١ - ليمبية مستطيلة الزهوان

Laelia peduncularis (S). *Lélie à long pedoncule* (F). نوع من الليمبية. منها المكسيك. ساقها خراشبية قصيرة تحمل ورقة واحدة الالحجية النصل المقطوم الطرف. ازهارها وردية اللون مبقجة بالبنفسجي || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٥٢٩٢ - ليمبندة

Limnanda vulgaris (S). *Limnande, Lime* (F). *Dab* (E). سمكة بحرية من اللساوات الجانيبات الموم تنتمي الى جنس اسماك موسى. جسمها بيضي الشكل مبطل القالب يعطو نحو ٣٠ سم. وهي تتميز باختلاف لون صفحي جسمها وبارتكاظ منها الواسدة فوق الاخرى على الصفحة اليسرى



ليمبة الجنجل



ليمبية خراشبية



ليمبندة



ليمور

منها الحلوة ومنها الحامضة ومنها الحامضة المرة. اشهر انواعها ما يلي .

٢٥٢٩٨ - **لَيْمُونُ اَصِيَالِيَا *** ، **بَرْغَمُوت** ، **زُبُون**
Citrus bergamota, C. bergamia (S). Bergamotier, Bergamotier (F). Bergamot orange (E). Bergamot-tenzitron (D). Bergamota (I).

نوع من الليمون الزراعي المجهول المهد. تكثر زراعته الصناعية في بعض مواسل المتوسط انحصاها السواحل الايطالية حيث يستخرجون من قشور ثماره عطر اليرغوث. ثمرته صغرية القد، اغصانها متفرجة. اثمارها ولونها خضراء اللون. اوراقها مستطيلة الاضلاع. ازهارها بيضاء اللون، فواحة العرف المطري. ثمارها برعمية الشكل مقطوعة الرأس. قشورها كثيفة الجيوب العطرية غزيرة المادة. عصارة حمورها حامضة.

٢٥٢٩٩ - **لَيْمُونُ اَلْهِنْدِي *** ، **يُوسُفُ اَلْهِنْدِي *** ، **يُوسُفِي** ، **هَمْدَرِين**

Citrus nobilis, C. nobilis deliciosa, C. deliciosa (S). Mandarinier (F). Mandarin orange (E). Mandarine, Jericho Orangenbaum (D). Mandarina (I).

نوع من الليمون الزراعي المشهر. حمروه واصرامه حلوة، مهدا الصين وقد عمت زراعتها معظم المناطق الحارة انحصاها البحرية. اجماره صغرية القد تملو من سترين الى سبعة اثمار. سوقها منتصبة، اغصانها متفرجة، انتادها فناء. اثمارها دققة مستطيلة، اوراقها متعاقبة، معتقة، بسيطة. نصلها احليجي الشكل، ذات الزام الاخير، لونه الى الحمرة الباقية. ازهارها بيضاء اللون خافتة العرف. ثمارها مستديرة منتفخة القطبين ترض من ٥ الى ٧ سم. قشورها مشطلة وافقة تقيضة لا تلصق بالحموص. وهي غيرة المسواد العطرية الذكية العرف. لونها عند الادراك يراوح من الاصفر الاخضر المالح الى الاصفر الصناعي الاحمر التوشيح. لباب حمورها مستحب النكهة، سكري الطعم غني ببعض الملوحيات الصمغية الناعمة. (راجع جفول القيتنين). . . اشهر اصرامه الحالية واعها زراعة التسبوسه (Satsuma).

ثمارها زاهية اللون الاصفر الصناعي، حامدة البلور، معتلة العرف والنكهة. ثمرتها متوسطة القد تتحمل الصقيع خاصة اذا كان طعمها ليمون بري || وايوبي يرضع في الارربة المبيضة الفودر، الحصى والقليلة الانتداج. متطلياته الغالبية لا تقل من متطليات البرتقال لانه شمه يستلوث العناصر القشورية والمعدنية بمره.

٢٥٣٠٠ - **لَيْمُونُ الْبَحْرِ ***

Ximenia americana (S). Ximénie, Prune de mer (F). سببة مشمرة من فصيلة الازيتيات. مهدا المناطق الاستوائية الارريقية والاسيكية. ساقها فراه. فروصها افقية الاذنكاز قصيرة القاب. اوراقها متعاقبة، سائنية النصل الجلمد ثمارها خضوية الشكل والقد، حامدة الطعم، مأكولة.

٢٥٣٠١ - **لَيْمُونُ اَلْجَنَّةِ *** ، **كُوبُورُوت** ، **كُوبُورُون**
Citrus decumana paradisi, C. paradisi (S). Grapefruit (F). Grape-fruit (E). Lederorangenbaum (D). Pomei (I).

فرب من الليمون الهندي الزراعي. ثمرته تملو من ٨ الى ١٠ اثمار. ساقها وانتادها قليلة الحصف القصير، اغصانها فاققة. اثمارها قليلة الكثافة. اوراقها كبيرة الدقة يضيضه. ثمارها كثار الليمون الهندي شكلا وصمما ولونا الا انها اجود عصارة واقل مرارة وحوضة وهي تركز مع السكر.

٢٥٣٠٢ - **لَيْمُونُ بَرْتُغَالِي**
Orange هو البرتقال، اطيحه.

٢٥٣٠٣ - **لَيْمُونُ بَرِّي**
Citrus trifoliata, C. triptera, Poncirus trifoliatus (S). Citronnier à 3 folioles (F).

نوع من الليمون مهد الصين واليابان. ثمرته صغرية صغرية القد تملو نحو ٣ اثمار. ساقها منتصبة حصفة فراه. فروصها قليلة الانفرج متوسطة الانداد والانتان. اوراقها مركبة ثلاثية الورقيات. وروقها احليجية النصل المسن المقطوم الطرف. ازهارها كبيرة القد يضاء اللون خافتة العرف. ثمارها مجسم التفاحة الصغرية وهي حامضة مرة لا تؤكل. قشورها رقيقة لونها الى الصفار الباهت. وهو شائع الانتداج كالتارنج لانه يفرس لتطعم نظرا لشاذه وبناعته وسرعة اثماره وقوة احتاله الصقيع.

٢٥٣٠٤ - **لَيْمُونُ حَامِض**
Citrus medica (S). Citronnier, Umonier (F). Lemon tree, Common lemon (E). Limonenitzrone (D). Citreno, Limone (I).

نوع من الليمون الزراعي السبوري. مهد المشرق الهند الصينية وجوراجا. حمروه واصرامه عديدة. اجمارها تملو من ٣ الى ٦ اثمار. سوقها وفروصها حصفة. حصفها حاد الحمة بطول نحو ٣ سم. اغصانها فاقرة. اثمارها ولونها موحدة باللينسي. اوراقها متعاقبة معتقة. اغصانها حامدة الجناح، نصلها يضيضه الصغرة المستطيلة للشارة الحلاقة. ازهارها خماسية النصل، فواحة العرف المطري، لونها الى البياض تشوبه ماجة ارجوانية. ثمارها يضيضه مستطيلة تنتهي بنذلة صغرية حامدة الطعم. عصارة حمورها حامضة الطعم حامدة المرارة.

٢٥٣٠٥ - **لَيْمُونُ حُلُو**
Citrus aurantium aurantifolia, C. limetta, C. limonium dulcis (S). Limettier doux, Limonier doux (F). Sweet lemon tree (E). Süsse Limone (D). Limone douce (I).

نوع من الليمون الزراعي المأكول الثار. ثمرته تملو من ٤ الى ٧ اثمار. ساقها وفروصها حصفة. اغصانها متوسطة الانفرج. اثمارها ولونها غشبية اللون. اوراقها مجتمعة الاضلاع. نصلها يضيضه الصغرة، حصفة الحلاقة. ازهارها عطرية، يضاء اللون، صفراء المالح. ثمارها مستديرة تنتهي بحليمة مطوقة. قشورها ماسية، باحة الصفار. حمورها غزيرة العصارة الحالية من الحامض الليموني.

٢٥٣٠٦ - **لَيْمُونُ كَمُكَات *** ، **كَمُكَات ***
Citrus japonica (S). Kumquat (F).

نوع من الليمون الزراعي المشهر، مهد اليابان وفومونا ثمرته تشبه ثمره الربي، اوراقها سائنية النصل العبايق الخفصار. ثمارها تؤكل بكاملها عند الادراك وهي صغرية الحجم كروية الشكل او مستطيلة. قشورها ماسية صميكة اللباب، حمورها دققة لا تتخلو من الحموضة || اقليمه اقليم اليوبي وقد يستره شامة وانتادها اظم الى الليمون البري. حمروه المشهورة انتان الحشدر والتستيل. رائج كمكات.



ليمون اصيليا



ليمون اهندي



ليمون البحر



ليمون الحفة



ليمون حامض



ليمون حلو



ليمون كمكات

٢٥٣٠٧ - **لِيمُون مَالِح * ، لِيمُون مَعْرِي ،**

بَشْهِير Citrus limonum puella (S).
Limon d'Egypte, Petit limon d'Egypte (F). Egyptian small lime (E). Ägyptische kleine Limonenzitrone (D). Limone piccolo, Limoncello calabrese (I).
نوع من الليمون الحامض . أصله البلاد الحارة تكثر زراعته في مصر والهند وبعض المناطق الأمريكية . ثمرته صغيرة القذ تعلو من ٣ الى ٥ أمتار . أصلها منسوجة . انتداه فناء . أوراقها بحرية اللون ، مجنحة الاوراق ، بيضيه النصل . أزهارها صغيرة القذ بيضاء اللون ، ثمارها صغيرة شبه كروية . أزهارها مالحة رقيقة ، حصوصها غزيرة الصارة الشديدة الحسوة .



ليمون مالح

٢٥٣٠٨ - **لِيمُون هِنْدِي * ، قَرَاكِين**

Citrus decumana, C. maxima (S). Pamplemoussier, Chaddouk (F). Pomelo tree, Shaddock tree (E). Pampelmusorangebaum (D). Pompa di Genova, Pampelmo (I).
نوع من الليمون الزراعي ، هذه القدر جزر الزايج . ثمرته تعلو من ١٥ الى ١٥ أمتار . ساقها وأصنافها حشفة . أثمارها زباد اللحاء . أوراقها كبيرة القذ تعلو نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٥ أمتار مجنحة ، نصلها بيضيه جامدة لامة الخضار . أزهارها صفودي التجميع يفم من ٦ الى ١٠ أمتار كبيرة القذ ، يضاء اللون ، مستحبة العرف الطري . ثمارها مستديرة ، متخففة الرأس والعقب . قطرها براوح من ١٠ الى ١٥ سم . قشورها مميكة خشنة لونها الى الصفرة . حصوصها كبيرة الحجم ، متوسطة الصارة الحامزة المرة المأكولة مع السكر .

٢٥٣٠٩ - **لِيمُونَات ، لِيمُونَات**

Citrate
٢٥٣١٠ - **لِيمُونَة** Citron (F). Citron, Lemon (E).
هي ثمرة الليمون الحامض .

٢٥٣١١ - **لِيمُونَة حَنُوزَة** Lime (F).
٢٥٣١٢ - **لِيمُونَة هِنْدِيَة** Lime (E).

Pompoléon, Pomélon, Pamplemousse, Shaddock (F).
هي ثمرة الليمون الهندي أي الفراسكين .

٢٥٣١٣ - **لِيمُونِيْت ٥ ، هِيْمِيْت أَسْمَر ٥**

Limonte, Hémate brune (F). Limonte, Brown haemate (E).
معن حديدية اسم اللون يعرف كياويو بأكسيد الحديد الهيدراتي الطبيعي . وزنه براوح من ٣٥ الى ٤ وصلابته من ٥ الى ٥٥ وهو نثري عدم التبلور والانتظام . أشكاله عديدة أحصاها الكيميوت أنري اللون والليوسيت البطل المعروف بالمرقة الصفراء والليوسيت الشاكي والليوسيت المجهب .



ليمون هندي

٢٥٣١٤ - **لِيمُون الْجِلْدَة**

Malacoderme (F).
٢٥٣١٥ - **لِيمُون الْعَظْم** Malacodermatous (E).
نعت تمرطفي يطلق على كل حيوان لين الجلد أن من الرغويات أو غيرها .

Osteomalacia (F).
٢٥٣١٥ - **لِيمُون الْعَظْم** Osteomalacia (E).
شاقية تصيب البشر الحلوب سبها نقص في الفسفور يمو الى قلة نسبته في الاغصان والاحلاف التي تتجسمها الايقار .

٢٥٣١٦ - **لِيمُونَا الْحَقُوز** هي نصارية الحور ، اطلبها .

٢٥٣١٧ - **لِيمُونَات الزَعَالِيَة** Malacotérygiens (F).
٢٥٣١٨ - **لِيمُونَات الْهَكَدَة** Malacostraca (E).
٢٥٣١٩ - **لِيمُونَات الْهَيْدَة** Malacodermes (F).
٢٥٣٢٠ - **لِيمُونَا كِيَة ، حَبَابِيَة** Linaria (S).
٢٥٣٢١ - **لِيمُونَا كِيَة أَرْجَوْنِيَة** Linaria (F).

٢٥٣١٨ - **لِيمُونَات الْهَكَدَة** Malacostraca (E).
صنيف حيوانات من القشريات .

٢٥٣١٩ - **لِيمُونَات الْهَيْدَة** Malacodermes (F).
٢٥٣٢٠ - **لِيمُونَا كِيَة ، حَبَابِيَة** Linaria (S).
٢٥٣٢١ - **لِيمُونَا كِيَة أَرْجَوْنِيَة** Linaria (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النكازيريات . أنواعه نحو ١٢٠ منها الاشباب والجنبات الحولية والمعصرة . أوراقها وأزهارها لا قياسية الشكل والتجميع والانتظام والارتكاز || اعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٥٣٢٢ - **لِيمُونَا كِيَة** Linaria purpurea (S). Linaria pourpre (F).
نوع من الليناريه المصرة وهي جملة جامدة تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها خفيفة خطية . السفل منها غمية التجميع والعليا متعاقبة . أزهارها صفودية أرجوانية اللون صغيرة القذ || أزهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٢٥٣٢٣ - **لِيمُونَا كِيَة** Linaria spartea (S). Linaria jonciforme (F).
نوع من الليناريه الحولية وهي عشبة سرطية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها خفيفة مسطيلة اسلية الشكل ، السفل منها غمية التجميع ، أما العليا فتعاقبة وهي برية اللون قليلة العدد . أزهارها الى الصفار الباهت ، قواطعها برتقالية الموج . يزورها عذدة عادمة المناخ || أزهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٥٣٢٤ - **لِيمُونَا كِيَة** Linaria pallida (S). Linaria pâle (F).
نوع من الليناريه المصرة . ساقها مدادة تعلو نحو ٨٠ سم . أوراقها متعاقبة منفعة كبيرة القذ . نصلها مستدير الصفة ، سبالي القصوس . أزهارها سطرية العرف تعلو نحو ٢ سم . لونها الى الزرقة الباهتة || أزهارها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٥٣٢٥ - **لِيمُونَا كِيَة** Linaria elatine (S). Linaria élatine, Muffier élatine, Velvete, Véronique femelle (F). Cancerwort, Pointed leaved toad-flax (E). Spießleinkraut (D). Elatine, Linaria veronica, Veronica femina (I).
نوع من الليناريه المصرة وهي جملة خضراء تعلو نحو ٦٠ سم . ترطب في الآخرة الطينية . أوراقها ستانية ، خفيفة ، متعاقبة . أزهارها صفراء اللون صغيرة القذ . أزهارها يستمر طوال فصل الخريف .

٢٥٣٢٦ - **لِيمُونَا كِيَة** Linaria pilosa (S). Linaria velue (F).
نوع من الليناريه المصرة . ساقها مدادة تعلو نحو ١٢٠ سم . أوراقها كبيرة القذ كثيرة التفصيص . نصلها خلي البشرة الحبل اللون . أزهارها متوسطة القذ لونها الى الزرقة الخيشية || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٥٣٢٧ - **لِيمُونَا كِيَة** Linaria purpurea (S). Linaria pourpre (F).
نوع من الليناريه المصرة . ساقها مدادة تعلو نحو ٨٠ سم . أوراقها متعاقبة منفعة كبيرة القذ . نصلها مستدير الصفة ، سبالي القصوس . أزهارها سطرية العرف تعلو نحو ٢ سم . لونها الى الزرقة الباهتة || أزهارها يستمر من ايار الى تشرين .

٢٥٣٢٦ - لينتارية دلماسية

Linaria dalmaica (S). *Linaire de Dalmaie* (F).
 نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٦٠
 إلى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. أوراقها
 لائفة متعاقبة. نصلها سائي الشكل، مستعرض القاعد،
 بحري اللون. أزهارها كبيرة القد تطول من ٣ إلى ٤ سم.
 لونها إلى الصفرة الزاوية || أزهارها يستمر من تموز
 إلى آب .

٢٥٣٢٧ - لينتارية صنجابية ، حجاب الشجر

Linaria cymbalaria (S). *Linaire cymbalaire*, *Cymbalaire*, *Ruines de Rome*, *Lierre des murailles* (F).
Cymbalaria, *Ivy leaved toad-flax*, *Kanilworth-ivy* (E). *Zimbelkraut*, *Gemeines Zimbelkraut* (D). *Linaria cymbalaria*, *Rovine di Roma* (I).
 نوع من اللينارية للمعمرة، تعيش بين الصخور وعلى الجدران
 القديمة. ساقها منتصبة تطول نحو ٨٠ سم. أوراقها متعاقبة
 مستعرضة خماسية الفصوص. نصلها أحر الصغمة السفلى.
 أزهارها بليكية اللون صغيرة القد || أزهارها يستمر من
 أيار إلى تشرين .

٢٥٣٢٨ - لينتارية عادية * ، حجاب مبدل

Linaria vulgaris (S). *Linaire commune*, *L. vulgaire*,
Muffier bâtard, *Lin sauvage* (F). *Butter and eggs*,
Dragon-bushes, *Toad-flax* (E). *Flackskraut*, *Frauen-*
flachsleinkraut, *Leinkraut* (D). *Linaria comune*,
Abrotano salvatico, *Urinaria* (I).
 نوع من اللينارية البرية الطيبة الميالة المعمرة ، تكثر
 في البور وعلى حافة الطرق. مجملتها تملو من ٣٠ إلى
 ٧٠ سم. أوراقها متعاقبة ، نصلها ضيق الصغمة ثلاثي
 القروء بحري اللون . أزهارها إلى الصفار الباهت بملها
 عند قواعدها مروج اسف || أزهارها يستمر من حزيران
 إلى أيلول . أوراقها وأزهارها كرية الرائحة تستعمل ضد
 البواسير .

٢٥٣٢٩ - لينتارية كبيرة الزهر

Linaria grandiflora (S). *Linaire à grandes fleurs* (F).
 نوع من اللينارية المعمرة وهي جنية سريرية تملو من ٧٠
 إلى ١٤٠ سم. أوراقها غنية التجميع ، نصلها عظمي الشكل
 بحري اللون . أزهارها نورية ، كبيرة القد تطول نحو ٤ سم.
 لونها إلى البنفسجي يملو بتجميع أرجواني ومشمعة صفراء.
 أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول .

٢٥٣٣٠ - لينتارية كركهانية

Linaria amethystea (S). *Linaire amethyste* (F).
 نوع من اللينارية الحولية وهي عشية مثنونة تملو نحو ١٥
 سم. أوراقها خطية لا قياسية التجميع والانتظام لونها إلى
 الأخضر البحري . أزهارها كركهانية اللون يملوها عند
 قواعدها مروج بنفسجي || أزهارها يستمر من تموز
 إلى آب .

٢٥٣٣١ - لينتارية مراكشية

Linaria maroccana (S). *Linaire marocaine* (F).
 نوع من اللينارية الحولية وهي عشية سريرية تملو من ٢٥
 إلى ٣٥ سم. أوراقها عدية لا قياسية التجميع والارتكاز.
 نصلها غزل البشرة المحلل اللون . أزهارها كبيرة القد
 بنفسجية اللون أرجوانية المخرج || أزهارها يستمر طولا
 فصل الصيف .

٢٥٣٣٢ - لينتارية مقدونية

Linaria macedonica (S). *Linaire de Macédoine* (F).
 نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سريرية تملو من ٥٠
 إلى ١٠٠ سم. ساقها منتصبة قليلة الفروع. أوراقها
 لائفة، نصلها ينحني الشكل ذات الزوايا الأخرى . أزهارها
 مستطيلة الأذن ، متوسطة الحجم ، لونها إلى الصفرة الزاوية .
 أزهارها يستمر طولا فصل الصيف .

٢٥٣٣٣ - لينتارية ورقية

Linaria genistifolia (S). *Linaire à feuilles de genêt* (F).
 نوع من اللينارية المعمرة وهي بجلة سريرية صغيرة القد
 تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها لائفة ، متعاقبة ، نصلها
 كالزوايا وهو جامد الصغمة بحري اللون . أزهارها
 مستطيلة القد ، قصيرة الأذن باعثة الصفار || أزهارها
 يستمر من حزيران إلى آب .

٢٥٣٣٤ - لينتارية ، لينت

Lignita
 هو أغلب المتخصص والمقيم الأذكن . نوع من الفقم
 الحجري الحديث العهد المتوسط الصلابة .

٢٥٣٣٥ - لينت

Lignine
 هي الخشنتين ، للمواد الكيماوية الطبيعية ، التي تملو الصلابة
 والقررة في النج النهائية الخشنة .

٢٥٣٣٦ - لينت

Alstroemeria ligta (S).
Liuto (F).
 نبات عشبي زراعي من فصيلة الأرجسيات . أصله البلاد
 الأمريكية . تكثر زراعت في البيوت والشالي . ذواته
 مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم يستخرج منها لبون
 ينحني « فونو » لذية الطعم شائع الاستعمال فيبه المرعى
 وأصحاب المدة والأسماء الضعيفة لانه سريع المضم عديم
 الانفصال مع أي طعام كان .

٢٥٣٣٧ - لينت عفيرين

Myrmelionides (F).
Myrmelionides, *Ant-lions* (E).
 هي الميرفيات ، فصيلة حشرات من صمليات الجناح .

٢٥٣٣٨ - لينت

Liods (S).
Liods (F). *Liods* (E).
 جنس حشرات من فصيلة اللينويات ذرية عديدات الاجنحة
 ازدها المعروفة قليلة ، نحو ١٢ ، أصلها تشمل معظم
 اقالم النصف الشمالي من الكرة الأرضية || أجسامها
 صغيرة ، محدبة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ٤ إلى
 ٦ م. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عينها صغيرة ،
 بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . ملاسها قصيرة .
 قربها الاستشعارية صولتانية . كواسلها مستعرضة .
 الحادها لائفة ، تحلة التخديد القاطب ، قوائها نشطة
 مهدبة . أثوابها ملونة لماة || تعيش على الفطور الأدابة
 وفي الاعشاب النخرة .

٢٥٣٣٩ - لينويات

Liodidae (S).
Liodidae (F). *Liodidae* (E).
 فصيلة حشرات من عديدات الاجنحة . أجسامها وأثوابها
 الممرقة عديدة ، منتشرة في معظم اقالم العالم || أجسامها
 صغيرة ، محدبة ، تطول من ٢ إلى ٦ م. رؤوسها صغيرة ،
 مستعرضة . عينها بارزة . تأثيرها وفكوكها قياسية .
 ملاسها قصيرة . قربها الاستشعارية صولتانية . كواسلها



لينارية عادية



لينت



ليود

فرعاء تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ايّدة بقسيّة الشكل ،
تطول من ٥ الى ٦ سم. نصلها جامدة ، مائلة الصفحات
اللامعة . ازهارها حلقى التجميع ، طرفي الارتكاز .
ازهارها بيضاء اللون ، متاكها ارجوانية ، كمابرها ثلاثية
المصاريع || تنويرها يستمر من نيسان الى أيار .

مسترمسة . اغمارها لاحقة . اثارها ملوئة لماعة || تميش
على القطور الذائبة والمتملة وفي الاعشاب النخرة والفردى
وتحت الحاء || اشهر اجناسها الاسود والفيّليل .

٢٥٢٤٠ - ليوفيل بقسيّ الورق °

Leiophyllum buxifolium (S).

Leiophylle à feuilles de buis (F).

جنبه برية وتزيينية ميمرة من فصيلة الخلنجيات . ساقها



٢٥٣٤٨ - ماءث Diluer (F). To dilute (E).

ماءث اللّيه اذابه . ماءث اللّيح في الماء . ماءث الكلس في الماء .

٢٥٣٤٩ - ماءث Candélabre (F).

Pyramidal fruit-tree (E). شكل من اشكال التشذيب خاص بالشجر المست ويسمى شمعدان .

٢٥٣٥٠ - ماءث، هواج Reflet (F). Reflection (E).

٢٥٣٥١ - ماءث، زهرة المجذ

Clanthus (S). Clanche (F). Glory-pea, Parrot's-bill (E). Prachtwicke, Ruhmesblume (D). Clanto (I). جنس نباتات ترابية معمرة من فصيلة القرقيات القرابية . انزلها المعروفة قليلة . اعطانها جزر المحيط الهادي . ساقها خشبية ، اوراقها وريزة التركيب مشطية . ازهارها كبيرة القد ، جميلة الشكل . سميت زهرة المجد لان ساقها يمجذ الخالق || اعرف انزلها ما يلي :

٢٥٣٥٢ - ماءث، جنة

Clanthus speciosus (S). Clanche de Dampier (F). نوع من الماجة وهي جملة سرولية تملو نحو ٦٥ سم . ساقها فروع . وريقاتها سنائية الشكل . نصلها نام المس ، فني البثرة . ازهارها خلية او سداسية التجميع ، كبيرة القد ، تطلو من ٨ الى ١٥ سم . لها الى الانحر الانبواني يطوها عنه قاعدة الزاية بقمة جلوية لامة . ازهارها يشمر طول الصب .

٢٥٣٥٣ - ماءث، عارشة

Clanthus punicens (S). Clanche ponceau (F). نوع من الماجة وهي جنة سرولية عارشة تملو نحو ١٢٠ سم . ساقها مشقوة القروع . وريقاتها احليلجية .

٢٥٣٤١ - ماء Eau (F). Water (E).

جسم مائل عادم اللون والطعم والرائحة . نقله النبي ١ وزله الاتيني ١٨ يجمد عنه بلونه درجة الصفرة وما فوقها من المقياس الستيرادي ويغلي عنه بلونه نحو ١٠٠ سم في الضغط الجوي العادي || وهو من اكثر مواد الكون انتشارا . يوجد في الطبيعة على ثلاث حالات : حالة بخار في الجو . وسالة جراد في المواقف الباردة فيكون جليداً عنه القطبين والجليا في الجبال العالية . وسالة سائل في البحار والانهار والينابيع || والماء كيمياً هو نتيجة تآلف هيدروجين ب٢ بين الاكسجين والهيدروجين بنسبة ١ الى ٢ .

٢٥٣٤٢ - ماء التجميع Eau résiduelle (F).

Residuum water (E). هو الماء الناتج من معادل السكر والفا والتقطير .

٢٥٣٤٣ - ماء الجنين Eau fontale (F).

سائل لزج خاص يشمر الجنين في الرحم .

٢٥٣٤٤ - ماء الرئس Eau aux jambes (F).

وصم يصيب الغرل في راسها وسوقها فيحدث فيها تشقاً تسيل منه مادة مائعة كريمة الرائحة .

٢٥٣٤٥ - ماء المتعاقب Eau d'égoûts (F). Sewage, Sullage (E).

هو ماء المنازل والقوارع .

٢٥٣٤٦ - ماء التراخيص Eau-vannes (F). Sewage (E).

هو خليط من الماء والابك والرجيع الصادر عن الكنف .

٢٥٣٤٧ - ماء المتراكل Porin (F). Dung-water (E).

سائل مركب من بول الحيوانات والماء المستعمل من الزيل .



ماءث



ماجة جنة

Substance (matière) (F). **مَادَّة** - ٢٥٣٣٢
Matter (E).

Article (jur.) **مَادَّة** - ٢٥٣٣٤
تقسم القوانين والمراسم والقرارات والمعقود الى مواد. والمادة هي النص الواضح الذي المقصود.

Corps du délit (F). **مَادَّةُ الْجَرِيْمَةِ** - ٢٥٣٣٥
Corpus delicti (E).
هي الوقائع المادية التي تدل على الجريمة وصفتها.

Adjuvant **مَادِدٌ** - ٢٥٣٣٦
المواد المادحة، مواد قليلة تضاف الى بعض الادوية او الشحات الغذائية لزيادة نفعها الغذائي.

Némétocide (F). **مَادِدٌ** - ٢٥٣٣٧
Nematocide (E).
كل مادة تستعمل في القضاء على الديدان الثعبانية.

Matérialisme (F). Materialism (E). **مَادِّيَّة** - ٢٥٣٣٨
المادية ملتبس القائلين بانها لا يوجد في هذا الكون سوى مادة وسرعة، وان الجيلة والحياة والضمير ما هي الا مناشع يفسرها تحطيل المادة والحركة.

Madia (S). Madi, Madie (F). **مَادِيَّة** - ٢٥٣٣٩
Madi, Turweed (E). Olmadie (D). Madia (I).
نبات عشبي ينتمي صناعي من فصيلة المركبات، مهدد الاصل بلاد الشيل زرع لزوره التي يستخرج منها مادة دھنية تستعمل في صناعة الصابون. وقد زرع ايضا لاستعماله كسبب خضري.

مَادِّي - ٢٥٣٣٧
المادي: السِّلَ لايبس او الجديد او عائلته.

Capra falconeri (S). **مَارْحُور** - ٢٥٣٣٩
Bouquein markhor, Markhor, Chèvre de Falconer (F). Markhor (E).

اسم فارسي يعني آكل الحيات لانهم زعموا انه يأكلها.
وهو نوع من اليربوع ضروبه المروفة اربعة اعطائها اسراج ومزخرفات التبت والافغان وكثير... يتميز باستطاعة وانتصاب قروته الخضرية الضخمة. جسمه يطول نحو ١٣٥ سم. ويبلغ نحو ١٠٠ سم. الاثنى اصفر جنة وقرنا من الكبر. خالفه ثنائي الضرع وهي تقع من جدي الى جنين || والمارخور يعيش جماعات اجلها يد من ٢٠ الى ٥٠ و ٧٠ نفراً وهو يتصالح مع الماخر وتناجه بحسب السيلة.

Canna des Indes (F). **مَارْزُون** - ٢٥٣٣٩
هو قننا الهند، اطبخه.

مَارْزُونِيَّات ، قَنُونِيَّات - ٢٥٣٣٩
Cannaceae (S). Cannacées (F). Cannaceae (E).
فصيلة نباتية من سبديات الفلقة عديدة الاجناس والانواع اشهرها المارزوان.

Enrymère (F). **مَارْغ** - ٢٥٣٣٩
مارغ او مارقة نمت تمرض يطلق على كل حشرة تركب النبات في جميع اعضاءها اغصنها الهوائية من الساق الى الورقة والشرية.

تصلها خيل البشرة، حريري الملمس، فضي اللون. ازهارها تخامية او سداسية التجميع تطول من ٨ الى ١٢ سم. لونها الى الازرقاني، قاعدة رايها بيضاء || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

Majidae (S). **مَحَبَّات** - ٢٥٣٥٤
Majidae (F). Majidae (E).

فصيلة من الثشريات حشرات الارجل. قصيرات الليل. اجناسها وانواعها المروفة عديدة جميعها بحرية اعطائها بحار البلاد المروفة الحارة || اجسامها متباينة القد، تطول من ١٢ الى ٢٤ سم. تتميز بدموعها اللينة الشائكة الاطراف وبملامحتها الكثيرة الضخمة || بعض انواعها مأكلة، مستحب الطعم.

Jaune d'oeuf (F). **مَحَاح** - ٢٥٣٥٥
Yolk of an egg (E).
المح: صفرة البيض.

Improductif (F). **مَحْاحِل** ، **مَحْاحِل** - ٢٥٣٥٦
Unproductive, Idle (E).
ماحل ومحال كل ارض لا تحسب قط.

Manettia (S). Manettie (F). **مَحْأُور** - ٢٥٣٥٧
جنس نباتات جنينية عارضة ممرية من فصيلة القنويات. انواعها قليلة معظمها بري وبعضها زرع. سوقها دقيقة متشعبة. اوراقها ابيضة متعاقبة متقنة. ازهارها قمية الشكل محورية الارتكاز او تاجية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

Manettia ignita (S). **مَحْأُور قَرْمِزِي** - ٢٥٣٥٨
Manettie rouge feu, M. à fleurs vermillon (F).
نوع من الماحور الزرع. ساقه دقيقة لولية تطول نحو اربعة امتار. اوراقه اهلالية الشكل، تصلها مقطوم القاعدة ذلق للزام الاخير. ازهاره محورية ونتيجة الارتكاز، قمرية اللون، لامعة الموج. قطر قمعها نحو ٤ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

مَحْأُور قَلْبِي الْوَرَق - ٢٥٣٥٩
Manettia cordifolia (S). Manettie à feuilles en coeur (F).

نوع من الماحور الزرع. ساقه دقيقة تطول نحو خمسة امتار. اوراقه قلبية القاعدة مستطيلة النصل الذروب في زامه الاخير. ازهاره كبيرة القد، ابيضانية اللون السوي، قطر قمعها نحو ٥ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

مَحْأُور مَرْدُوحِ الْوَرَق - ٢٥٣٦٠
Manettia bicolor (S). Manettie bicolore (F).

نوع من الماحور الزرع. ساقه دقيقة نحيلة تطول نحو اربعة امتار. اوراقه متباينة مستطيلة الاضلاع، تصلها ذروب القاعدة والطرف. ازهاره قمرية الانبوب، ابيضانية القسم، صفر الحمار والحافة. قطر اقاعها يراوح من ٢ الى ٣ سم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

Makairo (F). **مَحْأُورَة** - ٢٥٣٦١
سكة بحرية تدعى سارية، اطبخها.

Amouillante (F). **مَحْأُيْض** - ٢٥٣٦٢
About to calf (E).
الانثى من الحيوان ان سحير او بقره او ناقة او نمجة او حن وضعها.



مَحْأُور



مَادِي



مَارْشُور



ماره



ماروت



مارش



مازيون



مازيون هندي

Bois Joli, B. gentii (F). Mezereon, Dwarf laurel, Spurge olive (E). Echter Seidelbast, Kellereibals (D). Laureola gentile, Biondella, Mezereon (I).
نوع من الدفنة عديد القلوب يعلو من ٧٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه متعاقبة مستطيلة، نصلها مائل لبشرة يطول نحو ٨ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. أزهاره طرفية، غنية بالتجميع محورية الإرتكاز، تسبق الأوراق. البتلات تختلط مع القلوب منها الأبيض والآخر والوردي || ثماره عنبية لونها إلى الحمر. يستخرج منها ومن الأوراق مادة غالية سامة يقال أن القليل منها ينفع من الاستسقاء واليرقان وضعت لكل.

Daphné alpestris (F). - **مَارُزُون جَبَاسِي**
أطبل دفنة ألبية.

Daphné camélie (F). - **مَارُزُون مَكَمَّس**
نبات من الدفنة، أطبل دفنة صغيرة.

٢٥٣٨٩ - **مَارُزُون هِنْدِي * هُجْج ، بِطْرِيَّة لِرَبَات**
Clitoria ternata (S).
Clitorie de Ternate (F). Blue clitoria, Butterfly-pea (E). Blau Clitoriblueme (D). Fagfelo Indiano, Fior celaste (I).

نوع من البطرية من فصيلة القرنيات القرشية. وهو نبات عشبي زراعي متسلق يعلو نحو ٩٠ سم. أوراقه مركبة ثلاثية، وريقاتها بيضبة لسة أزهاره كبيرة اللد زرقاء اللون تتميز بعدم انتظام بتلاتها. وهي تستعمل في الهند لتلوين الرز المطبوخ وبعض الحلويات. أما ثماره فسنفية دقيقة مستطيلة، يزورها صفيحة مستديرة ممره اللون.

٢٥٣٩٠ - **مَارُزُونِيَّات**
Thymelaeaceae (S).
Thymélacées (F). Thymelaeaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الثمارات. أجناسها وأزهارها كثيرة العدد معظمها عشبي وبعضها جنبي منه الطيبي والمهبلي والراتنجي.

٢٥٣٩١ - **مَارُون**
Œufs de fourmis (F).
Eggs of the ants (E).
بيض النمل.

٢٥٣٩٢ - **مَارُوت**
Mazout (F). Oil fuel (E).
سائل وقود تشجع من تقطير النفط الخام.

٢٥٣٩٣ - **مَارُور**
Dacelo (S). Martin-chasseur (F).
جنس طير من المازوريات. أنوعه عديدة أطولها فسيحة الأرجاء تشعل معظم خطوط المحيط الهادي. جميعها مستعمرات المتأثير الكبيرة المتتالية الصلصة السفلى. أجسامها ريمية. أجنحتها متندلة الطول، أذنانها مستعمرات، أصابعها قصيرة بقوة || يألث الحياة الجبلية. أسراه تمه من ١٠ إلى ١٠٠ || أعرف أنوعه واشهرها المازور الجبار.

٢٥٣٩٤ - **مَارُور جَبَّار ***
Dacelo gigantea (S).
Martin-chasseur géant (F). Laughing jackass (E).

طائر من المازور، قال فيه الجاسط: « طائر مبارك يتبين به اصحاب المقنع طوله يراوح من ٤٧ إلى ٥٥ سم. يسلط نحو ٦٥ سم. ثوبه هابك اللون. رأسه مستطيل الريش اللدب الاسمر. يحصر مستعرض الحلق الاسود. ظهره إلى السمرة. يسلط إلى الصهبة يطولها ملح اسود. جناحاه إلى الزرقه العابقة. فؤاده إلى السواد الكاسع. ذنبه إلى الجلوده

Dolichotis patagonica (S). - **مَارَه ***

Mara, Lièvre de Patagonie (F).
حيوان لبون قاضم ويهد الجلس والنرح من فصيلة الثورديات. موطنه الهول والمراي الايريكية القائمة بين مندوزا ومضيق بجان || جسمه متوسط اللد طوله نحو ٥٠ سم. ارتفاعه ٤٠ سم. وذنبه ٤ سم. رأس صغير القد. عيناه مستطيلتان اذناه كبيرتان. عنقه طويل. كفته غليظة مستديرة. قوائمه رفيعة دقيقة. برأته قوية حادة. ثوبه إلى الصهبة الربداء يعلوها توشم ابيض. بطنه حاجي. وبره دقيق وكثيف. شديده اللون. نام الملس || يعيش جماعات يراوح عدد افرادها من ١٠ إلى ٣٠ يسرح في النهار. قوة الاشباح البرية أحصاه النفل || أثناء تقص مرتين في العام وتنتج كل مرة جروين. جبره ردهة كبيرة يحفرها حل عمق ١٠٠ سم. مدخلها ويخرجها نفق واحد طوله نحو ٥ امتار.

٢٥٣٩٦ - **مَارُوت * شَمَر الكُتَب ، بَابُونج قَتَن**
Maruta (S).

Maroute, Camomille puante (F). Mayweed, Dog-fennel (E). Stinkhunds-kamille (D). Maruta (I).
نبات عشبي بري حولي من المركبات وهو نوع من الاقحوان يكثر بين الزروع فيصح من الاشباح الفارة وهو كريح الرائحة عند اللمس. أزهاره صفراء اللون.

٢٥٣٩٧ - **مَارُوم ، مَارُون**
Marum (F).
هر صخر المر، أطبله.

٢٥٣٩٨ - **مَارِيَّة**
Oryx (F).
في الارخ، أطبله.

٢٥٣٩٩ - **مَارِيَّة اِفْرِيقِيَّة**
Oryx beisa (F).
في الارخ الافريقي، أطبله.

٢٥٣٨٠ - **مَارِيَّة البَادِيَّة**
Oryx callotide (F).
في ارخ البادية، أطبله.

٢٥٣٨١ - **مَارِيَّة الجَزِيرَة**
Oryx beatrix (F).
في ارخ الجزيرة، أطبله.

٢٥٣٨٢ - **مَارِيَّة الصَّحْرَاء**
Oryx gazelle, Passan (F).
في ارخ الصحراء، أطبله.

٢٥٣٨٣ - **مَارِيَّة سُوْدَانِيَّة**
Oryx de Nubie (F).
في الارخ السوداني، أطبله.

٢٥٣٨٤ - **مَارِيَش ***
Bryopsis (S).
Bryopsis (F). Bryopsis (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضراء. أنوعه المعروفة نحو ٢٥. أطولها تشعل معظم مجار العالم || كلالها صغيرة. سوها دقيقة، شبه أسطوانية الشكل متتامة الانحدار المتراكبة الرقيقة المتصل.

٢٥٣٨٥ - **مَارَتَكَة**
Nitrière (F). Nitrebed (E).

المكان الذي يصنع فيه الأزوت او يتحول فيه إلى نترات والماتة قد تكون طبيعية كما في شيلي او اصطناعية كما في مصانع الأزوت.

٢٥٣٨٦ - **مَارُزُون * دَفْنَة سَكَمَة ، أُم**
Daphne mezereum, Thymelaea mezereum, Meze-reum officinal (S). Daphné mézéréon, D. jolibois,

٢٥٤٠٤ - **مَاشِيَّة ، بُهْم ، تَعَم ، مَال**
Betail, Bestiaux (F). Cattle, Livestock (E).
الابل والبقر والغنم والماعز . اشخصها ما كان منها للسل
والقنية . سميت ماشية رصياً وهي تمشي وقيل لكثرة سنها ،
ج. مؤنثي .

٢٥٤٠٥ - **مَاصِيَّات**
Cyclostomes, Siphonophores (F). Siphonophores (E).
هي الحفليات الافواه رتبة من الاسماك .

٢٥٤٠٦ - **مَاصِيَّة**
Pipette (F). Pipet (E).
اداة مخبرية تستعمل لشفط السوائل ، واسع شفاطة .

٢٥٤٠٧ - **مَاصِر**
Enclos (F). Enclosure, Close (E).
الماصر هو الحاجز توضع به الخيل والبقر والمواشي لحصرها
في مكان معين ومنعها من ارتياد غيره .

٢٥٤٠٨ - **مَاصِيَّة** البقرة التي ولي لبها .

٢٥٤٠٩ - **مَاصِرِيَّة**
Cephalosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الماصصيات وفصيلة البوطيات .
انواعه عديدة معظمها يبي يعيش ويتكاثر على المواد
النباتية المتحللة . امثالبها حويطة مدهاة تركب سطوح
حوائلها .

٢٥٤١٠ - **مَاصِرِيَّات**
Céphaosporiées (F).
Cephalosporiées (E).
عمارة فطور مجهرية من فصيلة البوطيات . اجناسها ثلاثة
وهي التريكويدية والفلويدية والمناشوع .

٢٥٤١١ - **مَاصِر**
Acescent
لست تمريني يطلق على جميع المواد الممكن ان تحبس .
فالبقول والارز والحليب تعتبر من المواد الماصرة لأنها قابلة
للتخمير .

٢٥٤١٢ - **مَاصِر**
Pliqué (F). Sour (E).
بعض ماصراً كل مشروب يصير نحو التخليل او الفساد .

٢٥٤١٣ - **مَاصِر ، مُصْطَر ، شَات**
Pluvieux (F).
Rainy, Wet, Pluvieux (E).

٢٥٤١٤ - **مَاصِر**
Ovis capra (S).
Chèvre (F). Goat (E).
الماعز الذكر والانثى ج. معز ومعز ومعز . ويقال
للذكر تيس والانثى مَازِ . والماعز حيوان مجتر داجن من
فصيلة التفتيات . انواعه عديدة تمت بلوات الشعر تميزاً
لها عن ذوات الصوف وهي الغنم . وهي تتميز ايضاً بقصر
اذنانها وقوة قوائمها وصلابة اظفارها التي تمكها من تسلق
الصخور . انثاها اصغر قدماً من ذكرها . ضرورها ثنائية
الحلف . يحلبها بدم ١٥٤ يوماً تقبع عند تمامه من جدي
الى ثلاثة جهاد || والماعز يربي لحليبهم وشعره . اشهر
الانواع ما يتبع .

٢٥٤١٥ - **مَاصِر التَّيْت**
Chèvre de Thibet (F).
Tibetan goat (E).
نوع من الماعز الموصوف بشعره انعام الاله لكنه يأتي
بعد الكثير من حيث الجودة .

الحفلة بالاسود . أما طرف الريش فأبيض || يأتي
الشطوط ويجاري الله والاذفال ، قوة الاسماك والظاه
والرزق والفقر والحفريات والحيات || انتهاء تضع من
٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

٢٥٣٩٥ - **مَازُونِيَّات**
Dactyloctenium (F).
عمارة طير من القرليات تشمل المازور والقيش والقيون
والهامل . اصلها البلاد الاسيوية والافريقية وجزر
اقيانية || طيورها تتميز بمناظرها المستمرة القاعدة ،
الهوية الصفحة السفلى ، اللحية الملقط . وبشها متوسط
الكثافة ، الواهب معتدلة الزحام واللثة || تألف الاجراع
والمناع والشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها التبدن
والخيرات والقتريات والاسماك . تدن في تجاوب جلود
وافغان الانجار اليابسة .

٢٥٣٩٦ - **مَاس**
Diamant (F). Diamond (E).
هو السامور المشقول حررت صفحاته بالنت .

٢٥٣٩٧ - **مَاصِح**
Arpenteur (F). Land-surveyor (E).
الماسح والمساح والاردي هو الذي يمسح الارض ليرسمها
ويقسم طولاً وعرضها الخ .

٢٥٣٩٨ - **مَاسِكَة**
Jonchais, Jonchère, Joncherat (F).
Bed or plantation of rushes (E).
مقبع وما اشبه كثر فيه الأصل .

٢٥٣٩٩ - **مَاسِ**
ماش المطر الارض : سمها نهر مطر مئيش .

٢٥٤٠٠ - **مَاسِ * كَشْرِي**
Phaseolus mungo, Ph. radiatus (S). Haricot d'Angola,
H. mungo (F). Green gram, Black gram (E). Mungo-
bohne, Schwarzebohne (D). Fagolo a zigzag (F).
نبات عشبي زراعي حولي من الفاصوليات وفصيلة القرنيات
الفراسية . زراعته منتشرة في جميع بلاد الشرق . ساقه فروع
قائمة . اوراقه متفكة مركبة ثلاثية . وريقاتها بيضيه
التصل المنسج المذهب القمص . ازهاره خفية للجميع ،
زنادية الازتيكاز ، صفير اللون ، خضر اللولج . ثماره
قرون اسطوانية ضيقة مستطيلة . بذوره كروية الشكل
سمراء اللون او خضراء مغطاة بالاسود . تحوي من العناصر
الغذائية مسا قدره :

٢٢,٨٠ ٪ من المواد الازتية

١,٤٦ ٪ من المواد السعنية

٦,٢١٥ ٪ من المواد اللشوية

زراعته مروية يبلر عمادة على صقير الحنطة بعد تريض
المزدرد وسره . يدار الدم يراوح من ١٣ الى ١٥ كيلو
وانتاجه من ٩٠ الى ١٢٠ كيلو .

٢٥٤٠١ - **مَاسِ شَرِي**
Dolce de Chine (F).
هو الدجر الصيني ، اطليه .

٢٥٤٠٢ - **مَاصِرِيَّات**

Mandibulatas (F).
نفة من المفصليات تشمل الحيوانات المهزلة يتأثير وزباني .
اشهر مضطها القشريات والرخساعات والحفريات .

٢٥٤٠٣ - **مَاصُوط**
Chelmatoble (F).
حشرة مؤذية تنمى ارضية الشتاء ، اطليها .



مازور جبار



ماش



مازِ التوية



ماعز انقرة



ماعز سوري



ماعز كشمير



ماكلاك الغات



ماكلاك بولون



ماكلاك ريس

وربة التهنيع . وريقتها لا تقياسه البدن الذي يراوح من ١٩ الى ١٩ ، تصلها ايليحي الشكل ، مالم الصفحة العليا خالي السفل . اذهرارها معنوي التجميع ، اذهرارها صليوة لينة يضاء اللون خضراء اللولج || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٥٤٢٦ - **ماكلاك** (S). **Macacus** (S). **Macaco**, **Macques** (E). **Malaken** (D).

جلس قروء ذائلة من فصيلة المبرسات . انوامه ١٩ ، موطنها مختلف المناطق الاسيوية . اجسامها متوسطة او صغيرة القد . اعطلمها بارزة افعالها وسية . قوتها قوية . اياها طرية . اذناها لا تقياسه . اثارها تخلف مع الانواع || تعيش جماعات متوسطة او كبيرة البدن . تألف الاجراج والمضارب الصخرية والشلوط . قوتها البار والحبوب والخشرات والنع والظاء والصفاد || اناتها تمجر جررا واحداً يبلغ كمال شغلها بصره ١٢ سنوات .

٢٥٤٢٧ - **ماكلاك الثيب** (S). **Macacus thibetanus** (S). **Macaque du Thibet** (F).

موطنه ارجاع التبت الشرقية وبنشورية . جسمه متوسط القد ، رفيق القوام بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ١٥ سم . ثوبه جل الشعر المستطيل ، لونه الى الكهية السوداء زرقه عند البطن وتبقى عند الظهر || يعيش جماعات كبيرة تد من ٦٠ الى ١٢٠

٢٥٤٢٨ - **ماكلاك الغات** (S). **Macacus silenus** (S). **Quanderou** (F). **Wanderou** (E).

موطنه تها ميلبار والغات . جسمه بطول نحو ٧٥ سم . وذنبه ٢٧ سم . ثوبه اسود اللون ، جل الشعر المستطيل . حار وبه افرق الجبهة ، ابيض اللون || تألف لجانبات لكثيفة البائية ، جماعت تألف من ذكر وخص او ست اناث ويض الصغار .

٢٥٤٢٩ - **ماكلاك بولون** (S). **Macacus cynomolgus** (S). **Macaque de Buffon**, **M. crabler** (F).

موطنه مناطق وادغال الهند الصينية . يكثر قرب مصبات الانهر . يتسلق الاشجار ويسبح ويغوص || جسمه بطول نحو ٩٥ سم . وذنبه ٤٨ سم . ثوبه ينحرف من الخطي الملعب الى الالكهية الاسمر . حار وبه افرق البياض . جماعت قليلة البدن تألف من ذكر وخص اناث ويض الصغار .

٢٥٤٣٠ - **ماكلاك ريس** (S). **Macacus rhesus** (S). **Macaque rhesus**, **Rhesus** (F).

موطنه فصح الاربياء يمتد من الهند الى اناام والصين ، جسمه متوسط القد ، معصوري الشكل ، كليل الشعر ، بطول نحو ٩٥ سم . ويرفع نحو ٤٥ . ثوبه الى الكهية الصفراء ينحرف الى الجلالة مع اترايه من فيج الظهر . وجهه واذنه الى السرة الصفراء . ذنبه بطول نحو ٢٥ سم . قوته البار والحبوب والحشرات على اختلافها يتسلق الاشجار ويسبح ويغوص || يعيش جماعات كبيرة البدن .

٢٥٤٣١ - **ماكلاك شائع** (S). **Macacus sinicus** (S). **Macaque commun**, **Bonnet chinols** (F). **Bonnet macaque** (E).

موطنه مناطق الهند الجنوبية حتى يمي . تألف الجانات لكثيفة ويغزو الحقل والمزارع والمساكن . طوله نحو

٢٥٤٣٢ - **ماعز النوبة** * ، **ماعز الحبشة** (F). **Chèvre de Nubie** (F). **Nubian goat** (E).

نوع من الماعز الافريقي . اجسامه كبيرة القد تمل من ٦٠ الى ٦٥ سم . يميز برؤوسه ابلج المفلطحة الماعدة اللحي وبقصة افة الهودية وبقصر شعره . الاثني جيدة الدرع فصرها متوسط الحجم . مجموع درها الحلوي يراوح من ٢٥٠ الى ٤٥٠ ليتر .

٢٥٤٣٧ - **ماعز انقرة** * ، **ماعز** (F). **Chèvre d'Angora** (F). **Angora goat** (E).

نوع من الماعز المشهور باستمالة شعره الابيض الناعم . منه ضرب اسود الرأس والنعق ، غث اللحية موصوف بيرة شعره الناعم .

٢٥٤٣٨ - **ماعز سوري** * (F). **Chèvre de Syrie**, **Ch. mambrine** (F). **Syrian goat** (E).

نوع من الماعز موطنه جبال لبنان وسورية . جسمه بطول نحو ٧٠ سم . وهو اضلع الرأس ، اكث اللحية ، كبير الاذن المتدلية الغارسة . الاثني جاء افراس كبيرة الفرس . متوسط مجموع درها الحلوي يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ ليتر .

٢٥٤٣٩ - **ماعز كشمير** * (F). **Chèvre de Cachemire** (F). **Cashmirian goat** (E).

نوع من الماعز الموصوف بشعره الناعم الحريري اللولج . يكثر في بلاد كشمير حيث يستخرجون شعره .

٢٥٤٤٠ - **ماعز** (F). **Miauler** (F). **To mew** (E).

ماع النور : ماء ومغا .

٢٥٤٤١ - **ماعل** (F). **Polycarpique** (F). **Polycarpic** (E).

ماعل م . ماعلة نعمت ترميني يطلق على كل ليات ممر يهز ويشر اكثر من مرة في الحول .

٢٥٤٤٢ - **ماعطوط** (F). **Vermicide** (F).

هو كل مادة تستعمل للقضاء على الديدان .

٢٥٤٤٣ - **ما قبل الحيوان** (F). **Protérozoïque** (F). **Proterozoic** (E).

اسم يطلق على الحقبة الثالثة من اياج ما قبل الكمبري ؛ ذلك لان آثار المتحجرات والاحافير المكتشفة حتى الآن ، بالإضافة الى المادارج الجيولوجية المعروفة ، تنفي وجود حياة حيوانية حتى اواخر هذه الحقبة .

٢٥٤٤٤ - **ما قبل الكمبري** (F). **Précambrien** (F). **Precambrian** (E).

اسم يطلق على الاباج البدالي من تاريخ تكوين ضفرو الارض . وهذا الاباج الطويل الاسد الذي تم فيه تنسيد الصخور ، والذي يمثل خسة اساس هر الارض ، يقسم الى ثلاث حقبة : حقبة التكوين ثم الحقبة السحيقة ثم حقبة ما قبل الحيوان . راجع حياة .

٢٥٤٤٥ - **ماليكية** (F). **Masckia** (S). **Masckie** (F).

نبات معقود التصريف على اسم اليوناني الرومي « ماسك » (١٨٢٧-١٨٨٦) وهي شجرة برية وحدائقية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة القرنيات . ساقها تمل من ٥ الى ١٥ م . خشبها صلب القود اسمر اللون . اوراقها عابلة ، مركبة ،

Rouleau (F). Roll (E).

الماتى والمسلقة: معدلة أسطوانية تستعمل في حذل التربة أو تلمسها. راجع ملاءة.

Propriétaire (F).

Proprietor, Owner, Holder (E).

٢٥٤٤٣ - مالك

هو الذي له حق الملكية.

Héron (F). Heron (E).

٢٥٤٤٤ - مالك الخيزرين

هو البيلشون، أطلية.

Courtlière (F). Mole-cricket (E).

٢٥٤٤٥ - مالوش

حشرة مؤذية تدهى الحاروش والمنجوس، أطلية.

Mammoth

٢٥٤٤٦ - ماموث

هو الصنجانة، أطلية.

Glaucium (S).

٢٥٤٤٧ - ماميتكا، ماميتكا

Glaucia, Glaucière (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخشخاشيات. أنواعه قليلة منها الحولية والمصرى، أوراقها حاشنة، متعاقبة، كبيرة اللثة مقرصة. أزهارها كبيرة الحجم، فردية التجميع. ثمارها حقية. بزورها دهنية يستخرج منها مادة زيتية عادمة الخواص تستعمل في الطب كزيت الخشخاش. وهو ينفع من التلصص والرطوبات واسترخاء الجفن وضعت البصر كسلا، والارام والفاصل الحادة ملاء ويقطع الدم والاسهال مطلقاً. ووجهه يسمن جداً وهو يضر اللحال ويصلحه اللوز.

٢٥٤٤٨ - ماميتكا حمرارة، عخشخاش فينيقي

Glaucium corniculatum (S). Glaucium cornue, G. à fleurs rouges, Glaucienne (F). Red horned poppy (E). Roter Hornmohn (D). Papavero cornuto piccolo (I).

نوع من الماميتا الحولية ساقها حليلة اللحاء تملحو من ٥٠ سم. أزهارها حمراء اللون، كبيرة اللثة، قطرها نحو ٥ سم. ثمارها مبعثرة الحشف، حقية الشكل، تظل من ١٠ إلى ٢٠ سم. || زرع القزوين ولاستخراج الزيت من بزورها. أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٥٤٤٩ - ماميتكا صفراء، عخشخاش مقترن

Glaucium flavum (S). Glaucium jaune, G. à fleurs jaunes, Pavot cornu (F). Sea poppy, Yellow horned poppy (E). Gelber hornmohn (D). Papavero cornuto giallo, P. marino, Parallo (I).

نوع من الماميتا الحولية. ساقها مراء تملحو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أزهارها إلى الصفار اللذهب. قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ سم. سقاها مقوس الشكل يظل من ١٥ إلى ٣٠ سم. || ترطب في السواحل الرملية. زرع القزوين ولاستخراج الزيت من بزورها || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب || الماميتا الصفراء شديدة الرائحة والمرارة، قابضة، كانت تستعمل في الاكحال. ويصير زهرها قطرة قيرين.

Curcuma (F).

٢٥٤٥٠ - ماميركان

اطلب كركم صباغي.

Renoncula ficarofide (F).

٢٥٤٥١ - ماميركان صليبي

هو الخيوان النبي، أطلية.

٢٥٤٥٢ - مكال

هو القرحمان، أطلية.

٥٥٠. وذنبه ٥٥٥. ثوبه إلى الكهبة الخضراء يعلوها موج اسمر. وجهه وأذناه ويده إلى السمرة العابقة || جماعته تعد من ١٢ إلى ٥٠.

٢٥٤٣٧ - مأكلك متوج * Macacus pileatus (S).

Macaque couronné (F).

موطنه جزيرة سريلنبا. يألف الغابات الكثيفة ويأخذ الحقل والحدائق. جسمه ربع الوجة. طولهُ نحو ٥٠ سم. وذنبه ٥٥٠ سم. ثوبه إلى الصبغة الصفانية. بطنه وباطن قوائمهِ إلى البياض الأثير. حمار جبهة منتصب الشعر، تاسي الشكل، جماعته تعد من ١٠ إلى ٢٥.

٢٥٤٣٣ - مأكلك ميمون * Macacus nemestrinus (S).

Macacus malmon, Singcochon (F). Pig tailed macaque (E).

موطنه برمايه ولفقه ويجزو الزايغ. جسمه يطلو نحو ٤٦ سم. ويرتفع ٤٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، مستطيل الخلف. قوائمهِ قوية ولفظية، ذنبه مقوس يطلو نحو ١٨ سم. ثوبه إلى السمرة يعقب مع اقترابه من ثوب الظهر.

Comestible (F).

٢٥٤٣٤ - مأكول

Edible, Estable (E).

هو الصالح للأكل.

Ovicida

٢٥٤٣٥ - مأكون

المأكون هو كل دواء يقضي فصل مكن الحشرات، ج. موكين.

Aristotelia macaqui (S).

٢٥٤٣٦ - مأكبي

Maqui de Chili (F).

نوع من الأريستوتلية، جنسية زراعية من فصيلة اليزونديات. ساقها منتصبه تملحو نحو ثلاثة أمتار. أثمارها حمر القلاء. أوراقها أبيض، متعاقبة، بيضية الاتصال اللدنة المسنة الخفاف، تظل من ٦ إلى ١٢ سم. وتقرض من ٣ إلى ٦ سم. أزهارها عنقودي التجميع، محوري الأركانز. أزهارها صغيرة، بيضاء اللون. ثمارها عنبية أبيضانية اللون مأكولة تنبت من المرطبات الناعمة.

Machine (F).

٢٥٤٣٧ - ماكينة

Machine, Engine (E).

كل جهاز آلي هدفه الاقتصاد يسمى ماكينة. لذلك فالماكينات كثيرة الممد أشهرها الصناعية والكهربائية والزراعية والتجارية.

Blens (F). Weals (E).

٢٥٤٣٨ - مكال

المال ما ملكته من جميع الاشياء. يقال هو المال وهي المال. قال الشاعر:

و المال تلدي بقولم ذوي حسب

Malata

٢٥٤٣٩ - مالات

ملح حفص التلخ.

Maltine (F).

٢٥٤٤٠ - مالتين

هي الملتين، أطلية.

٢٥٤٤١ - مأكلة * Biocnosa (F). Biocnosa (E).

منج سلكي تتبته بعض الحشرات في كامل دورتها الحياتية أو في جزء منها.



ماكك شائع



ماكك متوج



ماكك ميمون



ماميتا حمراء



ماميتا صفراء

وغاباتها || تنبت بجبال وفال اذئاب الذكور وبقلة الطيران وبسرعة النمو . سفوحها متدلة الارتفاع . اصابعها نشيطة . غالبا جالسة || اعرف اجناسها واشهرها المانور والعرلون .

Mahogon (F).

٢٥٤٩٠ - مأكون

هو الاكاجو ، اطلبه .

Mahonia (S).

٢٥٤٩١ - مأكونية *

Mahonia, Mahonie (F). Mahonia (E).

جنس نباتات جنينية مسمرة من فصيلة البرباريسيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي وتربي . اوراقها ابيدة مركبة . وريقتها وريثة العدد ، متشعبة الحافة . ازهارها متفردة التجميع ، صفراء اللون ، مستحبة العرف . ثمارها نووية الشكل ، باذخانية اللون ، مأكولة وترب || اعرف انواعها واشهرها ما لي .

٢٥٤٩٢ - مأكونية بهشية الورق

Mahonia aquifolium (S). Mahonia à feuilles de houx (F).

جنس سرقية تملو من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . وريقات اوراقها بيضة الشكل تمد من ٣ الى ٩ ، نصلها ضيق الصفحة الامة المستطيلة . ازهارها الى الصفرة الموشة بالاحمر . متفردا الزهرية تطول من ٨ الى ١٠ سم . || ازهارها يستمر طوال شهر اذار .

٢٥٤٩٣ - مأكونية حزمية

Mahonia pinnata, M. fascicularis (S). Mahonia fasciculé (F).

جنس سرقية فرعاء تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٧ الى ١٣ ، نصلها يضي الشكل ، جامد التسنين الثالث . متفردا الزهرية كيفية التجميع تطول نحو ٨ سم . ازهارها صغيرة الله صفراء اللون || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

٢٥٤٩٤ - مأكونية ركبانية العروق

Mahonia nervosa (S). Mahonia nervé (F).

بجلة سرقية مثقوبة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٩ الى ١٧ ، نصلها يمتد الحصار رديهي العروق البارزة . متفردا الزهرية تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهارها الى الصفار الكبيرتي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٩٥ - مأكونية مدادكة

Mahonia repens (S). Mahonia rampant (F).

بجلة ركوبية مدادة تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٣ الى ٧ ، نصلها يضي الشكل ، مغرم القاعدية ، يجري الصفحة الماعدة الامة . ازهارها الى الصفرة السوية || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٥٤٩٦ - مأكونية نباتية

Mahonia nepalensis (S). Mahonia du Népal (F).

جنس سرقية شائعة تملو من ٣ الى ٥ امتار . وريقات اوراقها تمد من ١١ الى ٢٥ ، نصلها ضيق الصفحة ، جميل الحصار الاعم . متفردا الزهرية تطول نحو ٣٠ سم . ازهارها كبيرة الله بجلة الصفار اللهب || ازهارها يستمر طوال فصل الربيع .

٢٥٤٩٣ - مأكس

جنس حيوانات لبونة من القرد . اسمها الشائع ام قرقه . اما مأكس فهو ترجمة الاسم العلمي .

Fort (F).

٢٥٤٩٤ - مانع

نمت تمريني يطلق على كل تبغ يتحل بسورة مائة مركزها التسميني دون العالفة ولفق الناطقة .

٢٥٤٩٥ - مانع

عائق يحول دون ايجاد حمل ما كازواج مثلا وذلك لانعدام إحدى الشرائط القانونية المطلوبة . وللمانع قد يكون :

مانع حاصر

مانع معطل ، مانع فاسح

Invalidating impediments (E).

٢٥٤٩٦ - مأكور

Menura (S). طائر البشيرة

Menure, Oiseau-lyre (F). Menura, lyre-bird (E).

جنس طير من فصيلة المانوريات . انواعه المعروفة ثلاثة ، اصطناعيا بلاد استرالية حيث تالف المراج والنباتات || اجسامها متوسطة الله . متفردا قوية ، قليلة الاسدياب والتسنين . اجنتها قصيرة . ارفاقها متوسطة الطول حبيبة البشرة . ازقادها حمراء || ذكورها كبيرة الاذنان البشيرة الشكل . انثاهما ماعدة الزينة . اما انواعها الثلاثة المعروفة فهي :

مانور ألبرتي

Menura Albirdi (S).

مانور لكتوريا

Menura Victoriae (S).

مانور ميلون

Menura superba (S).

نخص منها بالوصف المانور المبلول ، اطلبه .

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور أثيق

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل

٢٥٤٩٧ - مأكور مبدل



مانور ميلون



ماهونية

- Râperie (F). **مَبْرَشَة** ٢٥٤٨٤
معمل لبرش الجذور وتقطيعها أو سحقها .
- Orangerie (F). **مَبْرَكَة** ٢٥٤٨٥
Orangery (E). هي بستان البرتقال .
- Sardine (petite) (F). **مَبْرُوم** ٢٥٤٨٦
Plichard (small) (E). للبروم السردين الصغير لا يتجاوز طوله ٥ سم .
- Porte-graines (F). **مَبْرُوكَة ، مَبْرُوكِيَّة** ٢٥٤٨٧
هي البهزرة ما يزرع من البقول ويختلف النباتات العشبية المسمول على يزرعها . ج. مبرزات و بزارى .
- ٢٥٤٨٨ - **مَبْرُوكَة**
المبسطة أو القدم المبسطة نجم ثمر من كوكبية برج التولمين مركزة على الركبة اليسرى من التولم المتقدم .
- Omnivore (F). **مَبْشَار** ٢٥٤٨٩
Omnivorous (E). نمت تعريفي يطلق على كل حيوان قوته اللحم والنبات .
- Racle (F). Scraper (E). **مَبْشَرَة** ٢٥٤٩٠
Oignonnière (F). Onionbed (E). **مَبْشَلَة** ٢٥٤٩١
هي حقل البصل .
- Canardière (F). **مَبْشَرِي** ٢٥٤٩٢
Duck-pond (E). غدير شمس ياليط أو غدير حفر لصيد البط البرى .
- Melonnière (F). **مَبْشَطَة** ٢٥٤٩٣
المبشطة حقل للقيام .
- Culture du pastèque (F). **مَبْشَخَة** ٢٥٤٩٤
هي حقل البطيخ .
- Jardin potager (F). **مَبْشَلَة** ٢٥٤٩٥
Kitchen-garden (E). هي البستان الممد لزراعة الخضار .
- ٢٥٤٩٦ - **مَبْشَكَر ، مَبْشَكَل ، مَبْشُور ، مَبْشُورِي**
Hatif, Précoce (F). Early, Precocious, Forward (E). صفة النبات السريع النمو والقريب الإدراك .
- Drosomètre (F). **مَبْشَل** ٢٥٤٩٧
Drosometer (E). المبالل جهاز يستعمل في قياس ما يسقط من سلى وندى في وقت معين ؛ غالباً من الغروب الى الشروق .
- ٢٥٤٩٨ - **مَبْشَقِي**
Accrescent لمت تعريفي توصف به مختلف اعضاء الزهرة ، دون المبيض ، التي تتابع نموها بعد الانحساب .
- Houssale (F). **مَبْشَهَة ، مَبْشَهَة** ٢٥٤٩٩
Holly-grove (E). منبت البشية .
- Mabouya punctué ٢٥٥٠١ **مَبُونِيَّة مُنْقَطَعَة**
هي الحكانة المنقطعة ، اطليا .
- Mahonia japonica (S). **مَاهُونِيَّة بَابَانِيَّة** ٢٥٤٩٧
Mahonia du Japon (F). جنبة سرونية فرعاء تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . وريقات اوراقها تمد من ٩ الى ١٩ ؛ نصلها غسيق الصفحة ؛ ذرب الزام الاخضر ، يطول نحو ١٢ سم . عناقيدها الزهرية مستدلة الكثافة تطول نحو ١٥ سم . ازهارها متوسطة القد جميلة الصفار الزاهي . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .
- ٢٥٤٩٨ - **مَاهُونِيَّة**
Métaphysique (F). هي الميتافيزيك ، اطليا .
Metaphysics (E).
- ٢٥٤٩٩ - **مَالِك**
Liquide (F). Liquid (E).
- ٢٥٥٠٠ - **مَالِي**
Hydraulique (F). Hydraulic (E).
- ٢٥٥٠١ - **مَاهَا**
Rache (F). Hivo (E). الهامة والكمرة والقدير هي مأوى للثعلب .
- ٢٥٥٠٢ - **مَاهَاة الركامير**
Guépier (F). هي خلية الزناير .
Wasps' nest (E).
- ٢٥٥٠٣ - **مَاهَاة ، مَاهَاة**
Coéchangiste, Copermutant (F). Permutor (E). هو احد الطرفين في عقد الديل أو المفاضة .
- ٢٥٥٠٤ - **مَاهَاة**
Réciprocity (F). Reciprocity (E). هي الاتفاق على موضوع معين .
- ٢٥٥٠٥ - **مَاهَاة**
Concours (F). Concourse (E). هو الاشتراك في عقد قانوني .
- ٢٥٥٠٦ - **مَاهَاة زراعية**
Concours agricoles (F). Cattle show (E). مسابقات تقويمها الحكومة أو الجمعيات والزراعية توزع فيها الجوائز المالية والشهادات . وهي تتناول الحيوانات والانتاج والمصنوعات والآلات الخ... الخ .
- ٢٥٥٠٧ - **مَاهَاة**
Cisailles (F). مقص ، مقص ، مقصير ، مقصير في جنات كبير يستعمل في جز الخضير وبتر الانثان الزائدة في جنات وانجار الكروين .
Shears, Clipper (E).
- ٢٥٥٠٨ - **مَاهَاة**
Evaporimètre (F). مقياس القوة المبخرية في الجو .
Evaporimeter (E).
- ٢٥٥٠٩ - **مَاهَاة**
Convertible مآلة تستعمل في ثمر البدار أو الاسمدة .
- ٢٥٥١٠ - **مَاهَاة**
Semoir (F). مآلة تستعمل في ثمر البدار أو الاسمدة .
Seed-bag, Sowing-machine, Drill (E).
- ٢٥٥١١ - **مَاهَاة**
Cénolide (F). Czenolide (E). لمت تعريفي يطلق على الاجسام التي تملو اطرافها الطليقة بعض الاحداث الدلبة الشائكة كما في بعض الاسماك .
- ٢٥٥١٢ - **مَاهَاة ، مَاهَاة**
Fulgurimètre (F). مقياس قوة الكهرباء الجوية .
Fulgurimeter (E).
- ٢٥٥١٣ - **مَاهَاة**
Râpe (F). Grater, Rasp (E). آلة تبرش الجذور المسقولية كالشوندو والجوز...



مِبْرَش حَرْشَة الْفَرْخ



منح

٢٥٥١٥ - **مُتَبَاعِد** ، **مُتَبَاعِدِي** Divergent
ما كان مختلف الاتجاه .
٢٥٥١٦ - **مُتَبَاعِدِي** Cellier (F).
Cellar, Store-room (E).

٢٥٥١٧ - **مُتَبَاعِدِي** Volatil (F). Volatile (E).
٢٥٥١٨ - **مُتَبَاعِدِي** Fissuré (F). Cracked (E).
٢٥٥١٩ - **مُتَبَاعِدِي** Dispersé (F). Scattered (E).

٢٥٥٢٠ - **مُتَبَاعِدِي** Toubatière (F).
كل تربة تزرع تباً عدة سنوات متتالية . ج متابع ،
والذي يصطلي زراعة التبغ يدعى تباعاً .

٢٥٥٢١ - **مُتَبَاعِدِي** Fenil (F). Hayloft (E).
مقبة لحفظ الحشيش ولتين .

٢٥٥٢٢ - **مُتَبَاعِدِي** Homoptars (S). Homoptères (F). Homopters (E).
رتبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصائلها وأنواعها
عديدة مظهرها صغير القدر يجمع ويغصا علم الجناح .
تطورها تدريجي . أعضائها ثابتة مامة تمكها من ارتفاع
النسج . أشهر فصائلها الأرقيات والحماطيات والغفريرات
والزيريات ...

٢٥٥٢٣ - **مُتَبَاعِدِي** Poudre (F).
To lay (E).
يقال بآخر الطير ورأ السلك ويصح الحشرات .

٢٥٥٢٤ - **مُتَبَاعِدِي** Endosmètre (F).
Endosmometer (E).
مقياس التماس أو التناقد .

٢٥٥٢٥ - **مُتَبَاعِدِي** Fossiles (F). Fossils (E).
هي الاساتير ، اطباها .

٢٥٥٢٦ - **مُتَبَاعِدِي** Homofocal
٢٥٥٢٧ - **مُتَبَاعِدِي** Monadelph (F).
Monadelphous (E).

٢٥٥٢٨ - **مُتَبَاعِدِي** Concentrique (F). Concentric (E).
٢٥٥٢٩ - **مُتَبَاعِدِي** Gamosépale (F). Gamosepalous (E).
صفة الزهرة الملصقة الفصلات الكاسية .

٢٥٥٣٠ - **مُتَبَاعِدِي** Gamopétale (F). Gamopetalous (E).
صفة الزهرة الملصقة اللسانات اي الوحيات والبلات .

٢٥٥٣١ - **مُتَبَاعِدِي** Réductible (F). Reducible (E).
مكن تحليه .

٢٥٥٣٢ - **مُتَبَاعِدِي** Acidifiable (F).
لعت ترميلي يطلق على كل مادة قابلة التسميس .

٢٥٥٣٣ - **مُتَبَاعِدِي** Focométre (F). Focometer (E).
جهاز يستعمل لتحديد المسافة البؤرية .

٢٥٥٣٤ - **مُتَبَاعِدِي** Cellier (F).
Cellar, Store-room (E).

٢٥٥٣٥ - **مُتَبَاعِدِي** Diagramme (F). Diagram (E).
هو البيان ، اطباها .

٢٥٥٣٦ - **مُتَبَاعِدِي** Léchifère (F).
Léchiferous, Deadly (E).
لعت ترميلي يطلق على الممارات النباتية والادوية الخاشورية
التي تقتل على الحياة .

٢٥٥٣٧ - **مُتَبَاعِدِي** Ovaire (F). Ovary (E).
المبيض في الحيوان هو العضو الذي يتكون فيه البيض
او البويضات || والمبيض في النبات هو الجزء الأسفل
للتطعيم من الملقح ، يحوي من بويضة الى عدة بويضات
ويصير ثمرة بعد الاخصاب .

٢٥٥٣٨ - **مُتَبَاعِدِي** Mûrse, Mûrserie (F).
Mulberry plantation (E).
بستان التوت .

٢٥٥٣٩ - **مُتَبَاعِدِي** Odomètre (F). Odometer (E).
آلة تقاس بها المسافة .

٢٥٥٤٠ - **مُتَبَاعِدِي** Gynécée (F).
Gynaeceum (E).
هو مجموع اعضاء التأنيث في الزهرة وهو مؤلف من المبيض
يطولو قلم أنثوي ينتهي بالمققة .

٢٥٥٤١ - **مُتَبَاعِدِي** Métaaldéhyde (F).
Metaldéhyde (E).
مادة كباوية فعالة تستعمل في القضاء على جميع أنواع
الزهرات التي تركب المزروعات . تحضر بمعدل ٥ %
وليس أكثر مزوجة بالمخالة او بمخاضة الخشب وتنتشر على
الترية حيث الحارون والبرايق وغيرها تغطي عليها جميعا .

٢٥٥٤٢ - **مُتَبَاعِدِي** Méthane (F). Marsh gas (E).
غاز ملتبس عديم اللون .
٢٥٥٤٣ - **مُتَبَاعِدِي** Phaneroptera falcata (S).
Phanéroptère (F).
حشرة من الجنادب ولصيلة القبريات . جسمها صغير
القد ، أخضر الزيت ، اسمر النصف والشفرة ، يطول عند
الذكور من ١٢ الى ١٥ سم . ويطول عند الاناث من ١٦
الى ١٨ سم . جناحها بطولان من ٢٥ الى ٢٣ سم . وبناها
من ١٨ الى ٢٢ . مرز الاثى غليظ الحجم احسن الشكل
يميل الطرف المستند يطول من ٥ الى ٦ سم . || اناتها
تمتص السرة في حجار الاوراق والمصنف داخل اللون فينفذ
عن يد نمة ثورده حافة التصل قبل ان تمسكن من السير
والنشد .

٢٥٥٤٤ - **مُتَبَاعِدِي** Consistance (F). Consistence (E).
٢٥٥٤٥ - **مُتَبَاعِدِي** Figuerie (F).
المثانة كرم التين او المكان الذي تكثر فيه الجهار التين .



منان

أزواجها المرفوعة قليلة المدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهادي. تعيش على الصخور المنصورة قرب الشواطئ || اصداؤها شبه هرية الشكل وحيدة المصارع. سفاط اصداؤها يتطور مع العمر ويصبح كالنفسوة. اجسامها مخروطية. رؤوسها شبه اسطوانية. ميوزها قاعدية. لواسها انبوبية قليلة الاستطالة. خياشيمها نظامية. ارتباطها وحيدة بسيطة.

Isométrique (F). **مُتَسَاوِي الأبعاد** ٢٥٥٤٨

Isometric (E).

Isotrope (F). **مُتَسَاوِي الاتجاه** ٢٥٥٤٩

Isotropic (E).

Équilatéral (F). **مُتَسَاوِي الأضلاع** ٢٥٥٥٠

Equilateral (E).

Équidistant ٢٥٥٥١ **مُتَسَاوِي البُعد**

٢٥٥٥٢ **مُتَسَاوِي الزوايا**

Equiangle, isogonex (F). Equiangular (E).

Isomorphe (F). **مُتَسَاوِي الشكل** ٢٥٥٥٣

Isomorphic (E).

Isobare (F). **مُتَسَاوِي الضغط** ٢٥٥٥٤

Isobaric (E).

Isocèle (F). **مُتَسَاوِي الضلعين** ٢٥٥٥٥

Isosceles (E).

Isodynamique (F). **مُتَسَاوِي القوة** ٢٥٥٥٦

Isodynamic (E).

Isopoda (S). **مُتَسَاوِيات الأرجل** ٢٥٥٥٧

Isopodes (F). Isopods (E). Asellin (D).

رتبة حيوانات من القشريات.

Grimpeurs (F). **مُتَسَلِّقات** ٢٥٥٥٨

Climbers (E).

رتبة من الجوسحيات طيورها صغيرة القد أو متوسطة تتميز بتسلقها الأشجار. ضالها عديدة اشهرها البينسارات والبقليات والطرفونيات والطرقانيات والتقويريات والنقاريات.

Grimpante (F). **مُتَسَلِّقة** ٢٥٥٥٩

Climbing, Twining (E).

النباتات المتسلقة والمبارية التي تتميز سورها حسن الانتصاب بدون عائل.

٢٥٥٦٠ **مُتَسَلِّم**

للتسلق أو القايض هو من يترقب المفود عليه أو الملكية.

٢٥٥٦١ **مُتَسَاوِيَة ، مُتَسَاوِيَة ، مُتَسَاوِيَة**

Homologue (F). Homologous (E).

٢٥٥٦٢ **مُتَسَاوِي الأجزاء**

Isomère (F).

Isomeric (E).

٢٥٥٦٣ **مُتَسَاوِي الخواص**

Isotope (F).

Isotopic (E).

٢٥٥٦٤ **مُتَقَرِّص**

Démagogue (F).

Demagogue (E).

المتشرف من يتظاهر بخدمة الشعب لاسئله اليه.

٢٥٥٦٥ **مُتَشَقَّق ، مُتَشَقَّق**

Lésardé (F).

Cracked (E).

Converti (F). Converted (E). **مُتَحَوِّل** ٢٥٥٣٣

٢٥٥٣٤ **مُتَح**

متح الجراد : اذا رز ذنبه وفرد ليبيض.

٢٥٥٣٥ **مُتَحَوِّل**

Hibernant (F). Hibernating (E).

صفة الحيوان الذي يبيت زمن الشتاء متخلداً باستمرار النوم.

٢٥٥٣٦ **مُتَحَوِّلَات**

Catamétopes (F).

Catometopa (E).

لغة من القشريات حشريات الارجل تنتمي الى مرتبة فصار الدليل || اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة المدد. اعطائها بحار البلاد المحدلة الحرارة || اجسامها صغيرة القد أو متوسطه. تتميز بدورها شبه المربعة والقليلة الاسدياب.

٢٥٥٣٧ **مُتَحَوِّل**

Intercabaire (F). Intercalary (E).

صفة الاشياء المتخللة. راجع تع.

٢٥٥٣٨ **مُتَحَوِّل الفصوص**

Interlobaire (F).

Interlobular (E).

٢٥٥٣٩ **مُتَد**

Adaptation

هو الابداء والازداد.

٢٥٥٤٠ **مُتَر**

Mètre (F). Metre (E).

وحدة قياسية وضمتها الثورة الفرنسية وقد شاع استعمالها الآن في جميع اقطار العالم باستثناء البلاد الانكليزية والامريكية || يعتبر طول المتر مساوياً لجزء واحد من العشرة ملايين جزء التي تولدت زام الحاضرة أو المسافة بين القطب وسط الاستواء || اجزاء المتر هي السيمتر اي عشر المتر، والسنتمتر اي جزء من متر، والمليمتر اي جزء من ألف. اما مضاعفات المتر فهي الديكاسمتر اي عشرة امتار والميكسومتر اي مائة متر والكليكمتر اي ألف متر.

٢٥٥٤١ **مُتَر**

Métrer (F). To measure (E).

قاس بالمتر.

٢٥٥٤٢ **مُتَر مَرَبَّع**

Centiare, Mètre carré (F).

Hundredth part of an are (E).

وحدة مساحة قياسها الطولي والمربعي متر واحد.

٢٥٥٤٣ **مُتَر مَكْمَب**

Mètre cube (F).

Cubic meter (E).

وحدة حجمية قياسها الطولي والمربعي والارتفاعي متر واحد.

٢٥٥٤٤ **مُتَرَاوِج**

نمت تعريبي يطلق على كل حبوب من بقرة ونسجة ومنزلة ينقطع دوماً بسرعة. تقول بقرة منراج. ج متاروج.

٢٥٥٤٥ **مُتَرَاوِج ، مُتَوَالِج**

Conjugué (F).

Conjugata (E).

٢٥٥٤٦ **مُتَرَاوِجَات الأَسنان**

Opocérodonates, Typhlopléas (F). Typhlopléas (E).

مرتبة من الحيات تكمن أسنانها إما في الفك الاعلى أو في الفك الاسفل.

٢٥٥٤٧ **مُتَرَوِّلة ***

Mitrularia (S).

Mitrulaire (F). Mitrularia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الارجل اماميات الخياشيم وحيوانات الاجهزة وعضلية المينيسيات.



مترولة

٢٥٥٦٦ - مُتَصَرَّف (F). Settlor (E). مُتَكَلِّف

هو من يملك الثبر تبرعاً سواء جبة في حياته ام بوصية بعد موته .

٢٥٥٦٧ - مُتَصَلِّب ، عَيْن ٥ Sciaerophyta (F). Sclerophyta (E).

نمت تعريفى يطلق على كل نبات اوراقه عروية جامدة تصلب الثغنين .

٢٥٥٨٢ - مُتَوَلَّوَن Multicolore (F). Multicolour (E).

كثير الالوان المختلفة .

٢٥٥٨٤ - مُتَوَالِيَن Amétole, Homomorphe (F).

نمت تعريفى يطلق في علمي الحيوان والنبات على الاضواء او الاجزاء المتشابهة للشكل .

٢٥٥٨٥ - مُتَوَالِيَن الاجزاء Métamériss (F).

نمت تعريفى توصف به الاجزاء المتتالية في كامل الجسم او في قسم منه .

٢٥٥٨٦ - مُتَوَالِيَن الاصابع Homopode (F).

نمت تعريفى يطلق على كل حيوان اصابعه متماثلة المند في قوته الأربع .

٢٥٥٨٧ - مُتَمَاتِلَات الاسنان ٥ Denticles, Odontocites (F).

مرتبة حيوانات بحرية لبوية من رتبة الحويقيات تشمل الحيتان من ذوات الاسنان المتتالية غير قابلة التجديد || اجناسها المعروفة ٢٤ تنحصرها اربع فصائل : الجبلديات والنفليقيات والنبريات والقيقيات .

٢٥٥٨٨ - مُتَمَكِّس ، مُتَدَمِّج Compact

٢٥٥٨٩ - مُتَمَمِّج ، حَزْرُوِيَّة Spirille (F). Spirillum (E).

نمت تعريفى شامل يطلق على البكتيريات والميكروبات الخيطية الشكل من اي نوع كانت .

٢٥٥٩٠ - مُتَمَكِّب ٥ Tropicalis (F).

نمت تعريفى يطلق على كل مادة صار احضامها الى القلبة .

٢٥٥٩١ - مُقَنَّ Châtré (F).

To castrate, To geld (E). من المحصن والثور والكبش والنعيس ... قن صغسبا واستخرج خصلاها .

٢٥٥٩٢ - مُقَنَّ الحنن ٥

الحنن : ما ارفع من الارض واستوى . والمقن نبات يعرف بالادونيس . وبين اللغة اصولا والفاظها وبطرقها . وبين الكتاب ما جاء فيه دون الشرح والحواشي . وبين الطريق جادتها . ويقال اليوم ركب من طائرة او باخرة .

٢٥٥٩٣ - مُقَنَّ القوس ٥

من القوس نجم ثير من كوكبية نجوم القوس الاعظم .

٢٥٥٩٤ - مُتَنَابِب طَرْدًا

Directement proportionnel (F). Proportional directly (E).

٢٥٥٩٥ - مُتَنَابِب عَكْسًا

Inversement proportionnel (F). Proportional inversely (E).

٢٥٥٦٨ - مُتَمَكِّبَات Rudistas (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات فصليات الخياشيم عادات الرخوس || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، جميعها من متحجرات الاباج الثاني . من ميواتها سماكة الاصدان والثغارات البين في مصاريها واحجامها || اعرف اجناسها واشهرها الخلفة .

٢٥٥٦٩ - مُتَمَارِف Axlome (F). Axlome (E).

٢٥٥٧٠ - مُتَمَكِّبَات Organismes (F). Organisme (E).

٢٥٥٧١ - مُتَمَهَّد Soumissionnaire (F).

Tenderer (E). الشهد المتكامل باجراء أمر .

٢٥٥٧٢ - مُتَمَهَّد هو المأزوم او المقاول .

٢٥٥٧٣ - مُتَمَهَّد اِذْن التسلُّم Filériste (F).

هو الذي يتعهد تداول الاذن من بائع الى آخر ثم يسوي الحسابات الي استوجبها هذه البيع .

٢٥٥٧٤ - مُتَمَفِّح Pommérie (F).

Apple-orchard (E). في يستأنف التناح .

٢٥٥٧٥ - مُتَمَكِّل ، مُعَيَّن Tâcheron (F).

One working by the job (E). عامل اجرته منوط بما يقوم به من عمل .

٢٥٥٧٦ - مُتَقَطَّع Discontin (F).

Discontinuous (E). هو الذي لا يستمر على حال .

٢٥٥٧٧ - مُتَك ٥ Anthère (F). Anther (E).

هو في النباتات الجزء العلوي من البصو الذكري في الزهرة . واجبع الثغرية .

٢٥٥٧٨ - مُتَكَّك Rostre (F). Rostrum (E).

هو في الحشرة مقدم الرأس عندما يكون على شكل الجلم . وهو الأرج أو الكباد .

٢٥٥٧٩ - مُتَكَبِي ٥ Stamini (F). Staminate (E).

صفة الاثمار الوسيطة التي المجهزة بسداة ويشير اي متك .

٢٥٥٨٠ - مُتَالَايِم اليمار Gymnocarpe (F).

Gymnocarpus (E).

٢٥٥٨١ - مُتَالَايِم ٥ Billonneur (F). Ridger (E).

محرث ذو مقلين يقلبان التراب يمنة ويساراً فصنع التلالاً .



متك



متك

دون سولما . تثنى في تجاويف الاشجار . اناتها تبيض مرتين في العام، المرة الاولى في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران . ذكرها تقتناب مع اناتها في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين .

٢٥٦١١ - مَتَوَقِّلُ الْغَابِ (S). *Certhia familiaris* (S). *Grimpeur des bois* (F). *Tree-Creeper* (E).

طائر من المتقلات . اطائه تشمل الشرق الادنى واروپا . يأنف المناطق الجبلية واصفها اخرج الترنب والترينين || جسمه صغير اللد بطول نحو ١٤ سم . يحضه نحو ١٦ سم . ثوبه متداخل الالوان . رأسه ورديا وظهوره وصفر الى الشقعة السمره تعلوها رقعة بيضاء . جناحه جلدان بالابيض . زوره وصدره وبعته الى البياض المعاني تشوبه مشعة قهراء . ذنبه متوسط الطول زاهي الرش ، اسمر اللون ، اشجع المواج . متفاده بين الاحديداد اسمر اللون . رسده قصيرتان ضحيتان . خالبه صبيحة ، حادة الاطراف ، سيواء اللون || يأنف معطر اخرج الجريد . يتسلق ساق الصخرة حتى القنة ويرتبي منها الى الارض ثم يتسلق غيرها متقبيا عن الحشرات ويرقاتها ومكثها . طيراته قصير الشوط وانتقاله على الارض حرقصة حرقاء || يثنى عشه في تجاويف الاشجار . الاثى تبيض مرتين في الدم الاول في اواخر اذار والثانية في اواسط حزيران . الذكر يتنارب الاثى في حضان البيض الذي يستمر نحو اسبوعين . بيضها حاجي اللون تملو رقعة جروية تتكاثف عند الغيب || قوته الحشرات ويرقاتها ومكثها لذلك فهو من الطيور الجزئية النفع .

٢٥٦١٢ - مَتَوَقِّلَات (S). *Certhidae* (S). *Certhidés* (F). *Certhidae* (E).

فصيلة طير من الجواثم رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة جميعها من الطيور النافعة . قوتها الحشرات .

٢٥٦١٣ - مَتَوَنِي (F). *Métoune* (F). *Metonic* (E).

من متون (*Méton*) اسم علم . نعت تعريفى يطلق على دورة فلكية مدتها ١٩ سنة ، تدعى الدورة المتونية ، يقع بعدها كل من ايام الاسابيع في التاريخ ذاته من الاشهر . والدورة المتونية تشمل ٢٣٥ هلة او شهر قري او ٦٩٢٩٧ يوما و ٧٠ ٪ من اليوم .

٢٥٦١٤ - مَتَبَّاصِر (F). *Lévogyre* (F). *Levogyrate* (E).

ما كان سطح استقطابه متجها الى اليسار .

٢٥٦١٥ - مَتَبَّاسِين (F). *Dextogyre* (F). *Dextogyre* (E).

ما كان سطح استقطابه متجها الى اليمين .

٢٥٦١٦ - مَتَبَّزَكَة (F). *Mutisia* (S). *Mutisia* (F).

جس نباتات جنينة مدمرة عارضة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة ٣٠ اصنافها بلاد امريكا الجنوبية . اوراقها متعاقبة لا لقياسة التركيب منها البسيطة ومنها المركبة التي تلتبي بمواقي دقيقة مستطيلة . ورققاتها شفعية متعاقبة . ازهارها كبيرة اللد متراكبة السيدات الثلاثية التسنين . بزورها مخروطية مسطيلة تدنبي بقنازع ريشية || اشهر انواعها التزيبية ما يقع .

٢٥٥٩٦ - مَتَبَّة (F). *Sapinière* (F). *Fir wood*, *Fir-grove* (E).

مفرس تنوب او حرجة تنوب .

٢٥٥٩٧ - مَتَبَّج (F). *Récensif* (F). *Recessive* (E).

نعت تعريفى يطلق على الصفات الوراثية المسودة .

٢٥٥٩٨ - مَتَبَّة (F). *Oryx belia* (F).

هي الاربع الافرنجى ، اطبله .

٢٥٥٩٩ - مَتَبَّذَرَج (F). *Hydrogéné* (F). *Hydrogenated* (E).

مركب مع الهيدروجين او يحوي بعض الهيدروجين .

٢٥٦٠٠ - مَتَبَّه (F). *Inculpé* (F). *Defendant*, *Accused* (E).

هو من وقع عليه الاتهام .

٢٥٦٠١ - مَتَوَاكِل (F). *Parallèle* (F). *Paraleil* (E).

مُتَوَاكِلِي الْخَوَاكِرَة (F). *Isotherme* (F).

مطابقة درجة الحرارة في اماكن مختلفة .

٢٥٦٠٣ - مَتَوَاكِلِي السُّطُوح (F). *Parallélipèdre* (F). *Parallelepiped* (E).

مَتَوَاكِلِي السُّطُوحِيَّات (F). *Parallélipède rectangulaire* (F). *Rectangular parallelepiped* (E).

٢٥٦٠٥ - مَتَوَاكِلِيَة (F). *Progression* (F). *Progression arithmétique* (F). *Arithmetical progression* (E).

او متوالية حسابية .

٢٥٦٠٦ - مَتَوَاكِلِيَة (F). *Matuta* (S). *Matuta* (F). *Matuta* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل قصيرات الذيل المهرمات وفصيلة الكوليبيات . انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها بحار البلاد الحارة اعصها شواطئ البحر الاحمر والمحيط الهندي || اجسامها صغيرة القد رافعة الدروع المعبودة المجهزة بسنين جاليتين كبريت . ارجلها الخلفية والاسامية ملقحة الاطراف . ملاقطها كبيرة ونشطة || غلوها كاعنة الصنف لا تتوكل .

٢٥٦٠٧ - مَتَوَجَّج (F). *Doit* (F). *Débit* (E).

هو المطلوب من صاحب الحساب .

٢٥٦٠٨ - مَتَوَسِّطُ الطُّول (F). *Médioligne* (F).

نعت تعريفى توصف به بعض سلالات الحيوان والطير كالخيل والابهار والاشنام والناج والنجال المستطيلة الطول .

٢٥٦٠٩ - مَتَوَسِّطُ لِسَبِي (F). *Moyenne proportionnelle* (F). *Geometrical mean* (E).

المتوسط النسبي والمتوسط المناسب والمتوسط التناسبي واحد .

٢٥٦١١ - مَتَوَقِّل (F). *Certhia* (S). *Grimpeur des bois* (F). *Tree creeper* (E).

جس طير من فصيلة المتقلات . انواعه عديدة جميعها نفعه . تألف المناطق الجبلية اعصها المخرجية . قوتها الحشرات



مَتَبَّة



مَتَوَقِّل



مَتَوَقِّلُ الْغَابِ



مَتَبَّة

levkoje Matthiole (D). Violaccioco (I).

نوع من المتيولا الأريينية. ضروريا عديدة، جميعها حولية أو حولية تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم. سوقها فراءه. أوراقها بحرية اللون حنايقها الزهرية كبيرة القذ. أزهارها مكسبة مختلفة الألوان يكثر فيها الأحمر والبنفسجي. جميعها فواحة العرف المستحب || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع.

٢٥٦٢٦ - مَكْبَة الشا، هو القرائس.

٢٥٦٢٧ - مَكْبَة Emblavement, Emblavage (F).
Wheat-sowing (E).

هو الحقل وكل مزروع سم وكرب ويلد وأثير.

٢٥٦٢٨ - مَكْبَة هو السب، الطهب.

٢٥٦٢٩ - مَكْبَة، مِيُولَة Vessie (F). Bladder (E).
عضو رئيسي في الجهاز البولي. والثلاثة تتكون من جراب عضلي يستلوي البول ويصمغ بعض الوقت.

٢٥٦٣٠ - مِيزَة Fixateur (F).
Fixing solution (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تتميز بخامسة التثبيت. ج. مثابت.

٢٥٦٣١ - مِيزَة، مِيزَة Limnimètre, Limnomètre (F). Limnimeter (E).

جهاز يستعمل في تقدير ارتفاع مستوى البحيرات والاهوار.

٢٥٦٣٢ - مِيزَة Mixtion
مِيزَة التي: خلطه.

٢٥٦٣٣ - مِيزَة، مِيزَة Siphon
مِيزَة، مِيزَة Siphonées (F). Siphoneae (E).

نصيلة من الخفيات الجفهر.

٢٥٦٣٥ - مِيزَة Tarière (F). Auger, Drill (E).

هي البريمة، أداة تستعمل للقب.

٢٥٦٣٦ - مِيزَة Trematoda (S). Trématodes (F). Trematode (E).

صف من الديدان المريفات.

٢٥٦٣٧ - مِيزَة Trypanosoma (S).
Trypanosomes (F). Trypanosoma (E).

حيوانات دنيا طفيلية من الالزالي السوطيات.

٢٥٦٣٨ - مِيزَة Orbicole (F). Orbicool (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان أو نبات يستطع الالتباد في مختلف أقاليم المسورة.

٢٥٦٣٩ - مِيزَة Perversité (F). Perversity (E).

الطبة عيب خلقي أو فساد في الاخلاق. مثالب الحكم والقضاء.

٢٥٦١٧ - مِيزَة حَبْلَة الْوَرْق

Mutisia linearifolia (S). Mutisia à feuilles linéaires (F).
نوع من الميزة. ساقها قصيرة تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها عطية الشكل. نصلها ملتصقة الاطراف تنتمي عوائل مستطيلة. أزهارها ثمانية اللبنيات، كبيرة القذ، قرمزية اللون || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٥٦١٨ - مِيزَة مَسَاخِيلَة Mutisia decurrens (S).
Mutisie décurrente (F).

نوع من الميزة، ساقها دقيقة فراءه تطلو من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها مسعدة كاملة، نصلها سناني الشكل بحري اللون ينتمي بطفة فراقه || أزهارها برتقالية اللون تطلو من ١٥ إلى ١٢ سم. أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢٥٦١٩ - مِيزَة مُسْتَعْرِضَة الْوَرْق

Mutisia latifolia (S). Mutisia à feuilles larges (F).
نوع من الميزة، ساقها تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها مسعدة لاطفة قلبية الشكل، نصلها مسن الحافة ثلاثي الأذنيات. أزهارها وردية اللبنيات، صفر الاقراص، مرفية القلائد، مسعدة القنابات الفارشة || أزهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

٢٥٦٢٠ - مِيزَة مَلْعُونَة Mutisia clamatensis (S).
Mutisie clématique (F).

نوع من الميزة، ساقها دقيقة تحيلة تطلو من ٦ إلى ١٠ اعمار. أوراقها مركبة، وريقاتها شفعية التجميع ثمانية أو عشارية الازواج. نصلها احليجية الشكل، خلية البشرة. حوافها ثلاثية الانحناء. أزهارها كبيرة القذ، حمراء اللون، مستطيلة الاضلاع، متدلية || أزهارها يستمر من الصيف الى الخريف.

٢٥٦٢١ - مِيزَة مِيزَة Matisia (S). Matisie (F).

جنس الجبار برية وزراعية من فصيلة الجباريات مهددا بعض مناطق امريكا الاستوائية || اشجارها كبيرة دائمة. سوقها منتصبة تملو من ١٢ إلى ١٥ م. أوراقها متماقية، مدقة. نصلها سناية الشكل، جامدة الوتل، ناشرة اللروق السباحية الازواج. أزهارها ضبي التجميع. أزهارها مستطيلة الاضلاع، بيضاء اللون، وردية المواج ثمارها نووية، بيضبة الشكل، خامسة الخلود، مأكولة مستحبة الطعم القريب من طعم المشمش.

٢٥٦٢٢ - مِيزَة Matico (F).
هو التامبول الضيق الورق.

٢٥٦٢٣ - مِيزَة Méchylène (F). Mechylene (E).

كحول مستططر من الخشب.

٢٥٦٢٤ - مِيزَة Matthiola (S). Matthiole (F).

جنس نباتات حشوية وجسنية من فصيلة الصليبيات. انواعها عديدة، معظمها بري منه المفسر والجول والحوالي. جميعها قريبة الشبه من الخيري، سوقها وأوراقها زياء. أزهارها عقرودية، طرفية، عطرية. ثمارها غردلية ثنائية الجدر. زهورها دقيقة مبطلة سنطيلة اللون.

٢٥٦٢٥ - مِيزَة مَكْبَة * Matthiola bicornis (S). Matthiole à 2 cornes, Giroflée des jardins (F). Night scented stock (E). Garten-



مِيزَة



مِيزَة مَكْبَة

Fruterie (F). Fruit-loft (E). **مُثْمَرَة** ٢٥٦٥٤
المكان المذ لفظ الثمار .

Jardin fruitier (F). **مُثْمَرَة** ٢٥٦٥٥
Orchard, Fruit-garden (E).
هي بستان الاشجار المثمرة الفاكية .

Octogone (F). Octogon (E). **مُثَمَّن الزَوَايا** ٢٥٦٥٦

Cystite (F). Cystitis (E). **مُثَن** ٢٥٦٥٧
التهاب المثانة او وجعها .

٢٥٦٥٨ - **مُثَنَان** * ، كَرْمَدَانَة ، ذَنْفَة لاحفة
Daphne gnidium, Thymalea hirsuta (S). Daphne
gnidium, Garou, Thymelae, Salnbols (F). Gnidium,
Spurge flax (E). Furgierstrauch, Rispenblütiger Seidelbast (D). Barbosa, Ditticinella, Laureola lupina (I).
نوع من الذفنة تنمو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. فروعها
مستقيمة عديدة. اوراقها منتصبه لاحفة الغرغ والقد .
تصلها جلدي التسجج ، جامد التركيب ، مستطيل القد .
ازهارها عقودية التجميع ، هامة الازتكاز ، بيضاء اللون ،
فواحة الريح || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .
يستخرج من لحائها وجلودها واوراقها بعض المواد الفعالة
الشائعة الاستعمال الصني والطبي .

Periculture (F). **مُثَنَة** ٢٥٦٥٩
المثنية هي قرية التجمع وغيره من اعمار الخول في احواض
خاصة بمنتجات معينة لاستخراج الثروة الذي يتكون في
اجرافها بعد سبع او ثمان سنوات .

٢٥٦٦٠ - **مُجَج** ، **مُجَاج** حب اللان .

Pigeonneau (F). **مُجَج** ٢٥٦٦١
Young pigeon (E).
الحج : فرخ الحمام .

Suc (F). Juice (E). **مُجَاجَة** ٢٥٦٦٢
مُجَاجَة الشيء : عصارتها .

Culture de noyers (F). **مُجَاجَة** ٢٥٦٦٣
الحجازة : زراعة الجوز والارض الكثيرة الجوز .

Champ (F). Field (E). **مُجَال** ٢٥٦٦٤

٢٥٦٦٥ - **مُجَال مَغْنَطِيسِي**
Champ magnétique (F). Magnetic field (E).

Vesicaria (S). **مُجَال** * ٢٥٦٦٦
Vésicaria (F). Bladder-pod, Bladder-seed (E). Blas-
enschütchen (D). Vescicaria (I).
جنس نباتات عشبية برية وتربنتية من فصيلة الصليبيات .
انواعها المروفة نحو ٢٥ اعطائها حوض البحر المتوسط .
وبعض مناطق اسريكة الشالية . سيقانها منتصبه وقالباً
فردية . اوراقها كاملة متعاقبة اطولاجية ، تصلها لزج البشرة .
ازهارها عقودية التجميع ، طرفية الازتكاز ، صفراء اللون
او ارجوانية .

Exhibitionniste (F). **مُجَالِع** ٢٥٦٦٧
Exhibitionist (E).

نمت تعريفي يطلق على كل امرء به علة تتسلط على جهازه
المعيبي فتحمه وتدفعه على عرض شواربه .

Terné (F). Tornado (E). **مُثَلَّت** ٢٥٦٤٠
نمت تعريفي توصف به الاعضاء النباتية الثلاثية الاجزاء
او التركيب .

Triangle **مُثَلَّت** ٢٥٦٤١
شكل هندسي ثلاثي الاضلاع والزوايا .

Tribasque (F). **مُثَلَّت الأساس** ٢٥٦٤٢
Tribasic (E).
مثك الأساس او مثك القاعدة كل حاشي فيه ثلاث
ذرات هيدروجينية تستبدل بلمرات قاعدية .

Trilateral (F). **مُثَلَّت الاضلاع** ٢٥٦٤٣
Trilateral (E).

Triangle austral (F). **مُثَلَّت الجنوبي** ٢٥٦٤٤
Triangulum australe (E).
مثك الجنوب كوكبة نجوم موعها الجنوبي تمتد بين المذبح
المربع والحك ومائير الفردوس والملاووس || نجم الزاوية
العليا من المرتبة الثالثة والستيان الاخريتان من المرتبة
الرابعة .

Triangulaire (F). **مُثَلَّت الزوايا** ٢٥٦٤٥
Triangular (E).

Triangle boréal (F). **مُثَلَّت الشمال** ٢٥٦٤٦
Triangulum borealis (E).
مثك الشمال كوكبة نجوم تمتد بين سربوس والمرأة المسلسلة
والحمل || ارجل نجمها تشكل مثلاً قائم الزاوية لامتلاوي
الاضلاع .

٢٥٦٤٧ - **مُثَلَّت قائم الزوايا**
Triangle rectangle (F). Right-angled triangle (E).

٢٥٦٤٨ - **مُثَلَّت مُتَسَاوِي الضلعين**
Triangle isocèle (F). Isosceles triangle (E).

٢٥٦٤٩ - **مُثَلَّجَة ، مَجَلَّدَة** *
Glacière (F).
Ice-house, Freezing-machine, Ice-cave (E).
المكان المخصص لحفظ الدريك . والمكان الجبل المذ لحفظ
الدوم والوسائل الدرية الاختيار . وآلة المدة لاصطناع
الصنيع .

٢٥٦٥٠ - **مُثَلَّكَة** *
Sphaerulites (S).
Sphérulite (F). Sphaerulites (E)
جنس حويطات بحرية من الرضويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة المتصلبات . انواعها المروفة قليلة المند جميعها
من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصدافها بطولية
الشكل ، غشدة ، مثلمة ، ترتكز على قواعد اسطوانية
مجموعة تفلط مع اقترابها من القمة واطراف الجملون .

٢٥٦٥١ - **مُثَلِّي**
Fongible (F). Fungible (E).
المثليات او الاشياء المثلية هي كل موزون او مقس او
يكل يصلح بفضه بديل من البض الآخر . وان لم تكن
كللك فهي قيمة (Non Fongibles) .

٢٥٦٥٢ - **مُثْمِر**
Fructifère (F). Fructiferous (E).

٢٥٦٥٣ - **مُثْمِر**
Fruiter (F). Frute-bearing (E).
فر ثمر .



مثلمة



مُثَنَان



مُجَال

2٥٧٠٧ - مِجَسَّةُ الحَقُونِ (E). Sirloln (F). Aloyau

2٥٧٠٨ - مِجَسَّةُ الخَصِيرَةِ (F). Travers

2٥٧٠٩ - مِجَسَّةُ العِجَازِ (E). Breadth

2٥٧١٠ - مِجَسَّةُ رَأْسِ الكَتِفِ (F). Shoulder-blade, Chuck (E). Avant-cœur, Paleron

2٥٧١١ - مِجَسَّةُ رَأْسِ الوَلَدِ (F). Edge (E). Bord

2٥٧١٢ - مِجَسَّمُ مِرْبَعِ الوُجُوهِ (F). Tetrahedron (E). Tétraèdre

2٥٧١٣ - مِجَسَّمُ لَائِصٍ (F). Ellipsoid (E). Ellipsoïda

2٥٧١٤ - مِجَسَّوْسِيَّةٌ ، مِجَسَّوْسِيَّةٌ (F). Palpabilité (E). Palpabilité

2٥٧١٥ - مِجَسَّاصٌ (F). Gypsometer (E). Gypsometer

2٥٧١٦ - مِجَسَّادَاتٌ (F). Exosceas (E). Exosceas

2٥٧١٧ - مِجَسَّادَةٌ (F). Exosceas (E). Exosceas

2٥٧١٨ - مِجَسَّافٌ (F). Séchoir au feu (E). Séchoir au feu

2٥٧١٩ - مِجَسَّالَةٌ * (F). Stove (E). Stove

2٥٧٢٠ - مِجَسَّكَةٌ * (F). Arillé (E). Arillé

2٥٧٢١ - مِجَسَكٌ (F). Arillé (E). Arillé

2٥٧٢٢ - مِجَسَّالَةٌ * (F). Ovoscope (E). Ovoscope

2٥٧٢٣ - مِجَسَّالَةُ الحَوِيرِ (F). Sérimètre (E). Sérimeter

المُجَلَّدَانِيَّةُ الشَّكْلُ . فصائلها وأجناسها وأناهبها كثيرة العدد . أصلها جمع البحار والمياه المذبة تفيض متطفلة على الأسماك .

Multiple - مِجَلَّور
المجلور : الحاصل من ضرب عدد في نفسه .

Fœtus (F). Fœcus (E). - مِجْجُر
المج : ما في بطون الحوامل من اللحم وفيها من فوات الظلف .

Blef (F). Reasch, Leval (E). - مِجْجَر
قناة معطمة لجر الماء .

2٥٦٩٤ - مِجْجَرَامٌ ، هِلِيُومِتَرٌ
Héliomètre (F). Heliometer (E).
جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الأجرام السماوية .

2٥٦٩٥ - مِجْجَرَةٌ ، شَرْجُ السَّيَّارِ
Vole lactée (F). Galaxy, Milky way (E).
بياض يرى في السماء يتكون من ألوف النجوم المتقاربة التي تلمس نور بعضها بعضاً فصارت كأنها سحب أبيض .

وي ترى في الشتاء أول الليل في ناحية من السماء . وترى في الصيف أول الليل في وسط السماء . وهي تلور حورية بحوية تراهها نصف الليل متدة من المشرق إلى المغرب وفي آخر الليل من الجنوب إلى الشمال .

2٥٦٩٦ - مِجْجَرَةٌ (F). Hoc (E). Houe d'entrée
أداة زراعية تستعمل لرفع التراب وترتيبه .

2٥٦٩٧ - مِجْجَرِي مَاءٍ (F). Courant d'eau (E). Current, Stream
مِجْجَرِي مَاءٍ

2٥٦٩٨ - مِجْجَرٌ (F). Shearer, Clipper (E). Tondeuse
أداة يذوية أو آلية تستعمل لجز صوف الدواجن .

2٥٦٩٩ - مِجْجَرَاكَةٌ (F). Balsamine des jardins (E).
هي البسما من النباتات التزيينية ، أصلها .

2٥٧٠٠ - مِجْجَرَاغِيَّاتٌ (F).
هي البسمينيات ، أصلها .

2٥٧٠١ - مِجْجَرَاغَاتٌ (F). Contre-espallier (E). Espallier facing another (E).
هي الأشجار المثمرة القائمة على الأسلاك وقد صارت تشذيباً وفقاً لقناة .

2٥٧٠٢ - مِجْجَرَكَةٌ ، شَبَكَةٌ (F). Flet (E). Dash (E).
الشبكة يصاد بها السمك .

2٥٧٠٣ - مِجْجَسٌ ، مِجَسَّةٌ (F). Manet, Manement (E). Handling (E).
ما يجس باليد من جسم الحيوان لحرقه سمته أو هزاله .


2٥٧٠٤ - مِجْجَسَادٌ * (F). Stéréoscope (E). Stereoscope (E).
منظار جسم . جهاز بصري يمكن من مشاهدة الرسوم بقتسامها بفصل التنضيد الذي تكتبه النظارتان .

2٥٧٠٥ - مِجْجَسَادِيٌّ (F). Stéréoscopique (E). Stereoscopic (E).
مِجْجَسَادِيٌّ

2٥٧٠٦ - مِجَسَّةُ الأذن (F). Oreillecette, Oreillon (E). Auricle, Earlet (E).
مِجَسَّةُ الأذن



مِجَسَادٌ



مِجَلَّةٌ



مِجَلَّةٌ

Four à dessécher, Séchoir au feu (F). Bake house, Drying-house (E).
بناء خاص يجفف في داخله بواسطة الحرارة بعض المحاصيل الزراعية انصهاراً تبرغ السيكار وتبرغ فوريجانية .

2٥٧١٩ - مِجَسَّالَةٌ * (F). Stove (E). Stove
جهاز يحكم السد ، اختياري الحرارة ، يستخدم في شق الأعمال الانشائية والتلهيوية والتلقيمسية .

2٥٧٢٠ - مِجَسَّكَةٌ * (F). Arillé (E). Arillé
نعت تمريلي يطلق على كل بذرة مجرزة بأبريل أي جئكت .

2٥٧٢١ - مِجَسَكٌ (F). Arillé (E). Arillé
المجل : انشقاق من النصبية في أسفل عروق الفرس ، وهو من حيوب الخيل .

2٥٧٢٢ - مِجَسَّالَةٌ * (F). Ovoscope (E). Ovoscope
جهاز خاص يستعمل في استبعاد بويض الترسيم لانتقاء المزكوم الصالح وترك الجديب .

2٥٧٢٣ - مِجَسَّالَةُ الحَوِيرِ (F). Sérimètre (E). Sérimeter
جهاز يبين وزن خيط الحرر وصلابته ويورثه .

٢٥٧٧٧ - **مِجَنَّاكِي** °
Pterygoiden (F).
Pterygoiden (E).
تمت تعريفي يطلق على بعض عظام الفك الجناحية الشكل.

٢٥٧٣٨ - **مِجَنَّج** °
Alifre (F).
Aliferous, Aligerous (E).
تمت تعريفي يطلق على الحشرات التي تحمل البنية .

٢٥٧٣٩ - **مِجَنَّنَاتُ أُمْلَا** °
Podrygotes,
Pterygogénans, Ptilotes (F). Pterygotes (E).
مطالعة من الحشرات تشمل معظم شب ورتب الحشرات المعروفة وقديما ٤ شب و١٤ طلبة و٣٦ رتبة . أما فصائلها وأجناسها فبدا آلاف .

٢٥٧٤٠ - **مِجَنَّنَاتُ الْأَرْجُل** °
Pteropoda (S).
Pteropoda (F). Pteropoda (E).
رتبة من الرخويات اللدنية التي تتميز بأرجلها البنية .

٢٥٧٤١ - **مِجَنَّنَاتُ الْأَيْدِي** °
Cheloptera (S).
Cheloptères, chauves-souris (F). Cheloptera (E).
رتبة حيوانات ليلية راسمة تتميز بفناء جلدي يكتنف قوائمها فيمكنها عند انتشاره ، من الطيران || أجسامها كروية ، صغيرة القد ، رؤوسها بشرة . أذنانها متباعدة الاشكال والاحجام . تشبهها كامل الانظمة ، مغارات العدد الذي يختلف مع الاجناس . امتلاكها قصيرة . أرجلها خالية الاصابع ، دقيقة الحالب الشفوية الانحناف . ايديا فردية الاصابع || انثا اكبر قدماً من ذكورها ، وهي ثنائية التلدني وحويلة الحمل ، يحملها يوم من ٣٨ الى ٤٠ يوماً تضع في تمامه جرأ واحداً يكتسي ويتسع بعد الوضع ستة ايام ، ويصير بعد اليوم العاشر . ترشبه الام ويتصل بصدرها حتى القطام أي نحو سبعة اصابع || انواعها المعروفة نحو ٩٠٠ بجميعها عشرات الاجناس تنضم الى ست فصائل تنتمي الى مرتبتين ، مرتبة الوالوط ومرتبة الخفافيش كما هو موضح في الجدول التالي للاسفل .

٢٥٧٤٢ - **مِجَنَّنَة** °
Talus (F). Slope (E).
الجنت الارض المنحدرة على شكل جبلين .

٢٥٧٤٣ - **مِجَنَّر** ° ، **مِجَرُوسِكِب** °
Microscope
جهاز بصري يستخدم لتكبير وتوضيح المراتب الصغيرة الدقيقة . وهو على انواع البسيط ، والمركب ، والالكتروني والوحيد انظارا واثنائي المنظارات .

٢٥٧٤٤ - **مِجَنَّر** °
Microscope (F).
Microscopium (E).

المهر كوكبية نجوم جنوبية المقع مركزها تحت برج الجدي || نجوما قليلة العدد جميعها من المرتبة السادسة والسابعة .

٢٥٧٤٥ - **مِجَنَّرِيَّات** °
Microsoaires (F).
Microzoarian, Microzoön (E).

المهرات حوريات دنيا لا تشاهد الا بواسطة المهر .

٢٥٧٤٦ - **مِجَنَّر** °
Effort, Tension (F).
Stress, Strain (E).

هو ما تستطيع حله الوحدة الطمعية من الباطن دون ان تتأذى . يعبر عن الحمل بالكيلو جرام وعن الوحدة الطمعية

٢٥٧٤٦ - **مِجَلَّةُ الْحَلِيب** °
Lactoscope (F).
Lactometer (E).
جهاز يستخدم لمعرفة مقدار المواد الصنية الموجودة في الحليب .

٢٥٧٤٥ - **مِجَلَّةُ السَّحَاب** ، **مِصْحَاب** °
Néphoscope (F). Nephoscope (E).
آلة تستخدم لمعرفة اتجاه السحب وارتفاعها .

٢٥٧٤٦ - **مِجَلَّةُ الْوَلُؤ** °
Lucidoscope (F).
Lucidoscope (E).
جهاز يعمل في التصوير بين الاشياء الطبيعية والمزودة او الصنية .

٢٥٧٧٧ - **مِجَلَّاح** ° ، **دِيكُوتِيل** °
Dicotyles (S). Pécari (F). Pecary, Mexican hog (E).
جلس حيوان من فصيلة الخنزيريات موطنه امريكا الوسطى والجنوبية ، طوله نحو ١٠٠ سم ، صلبه ٤٠ وذنبه ٢ سم ، نظيفته مستطيلة ، اذنان صغيرتان منتصبتان . جسمه كثيف الحلب الفيلظ ، قوائمها نحيلة || يعيش جماعات كبيرة تقودها الفصول المانعة . يألف الاسراع والادغال الرطبة وصفات الانهر . قوته الجلود والثمار والحليب . مسرحه من الغروب الى الفجر ، لا يقرب الاماكن الآمنة || اناته تقصع جروين مرة واحدة في السنة || اعرف انواعه واشهرها :
Dicotyles labiatus (S).
مِجَلَّاح ابيض البراطم
Pécari à lèvres blanches (F).
Dicotyles angulatus (S).
مِجَلَّاح الكسكس
Pécari du Mexique (F).
مِجَلَّاح تهاكو ، مِجَلَّاح مطوك
Dicotyles tajacu (S).
Pécari Tajacou (F).

٢٥٧٢٨ - **مِجَلَّد** °
Pagoscope
هو الخدار ، مكشاف الجلد ، الملهب .

٢٥٧٢٩ - **مِجَلَّة** ، **نَقَاطَة** ، **بَيْتَة** °
Ampoule (F). Ampulla (E).
٢٥٧٣٠ - **مِجَلَّةُ كَوْ** °
Glacière
راجع طلبة .

٢٥٧٣١ - **مِجَلَّةُ كَوْ** °
Coudrale (F). Hazel-cops (E).
مفروس اشجار البندق .

٢٥٧٣٢ - **مِجَلَّسٌ وَصَائِي** °
Conseil de tutelle (F).
مجلس قانوني مؤلف من بعض اقرباء القاصر او المصور عليه ، مهمته حماية القاصر ومراقبة اعمال الوصي او القيم .

٢٥٧٣٣ - **مِجَنَّة** °
Académie (F). Academy (E).
تعتبر يطلق على مجئة من العلماء يجتمعون لاجل انظر في المسائل العلمية العائدة الى اختصاصهم .

٢٥٧٣٤ - **مِجَنَّرُوع** °
Total
٢٥٧٣٥ - **مِجَنَّرُوعَة** ، **رَكْمَة** °
Agréat (F).
Aggrégate (E).
مجموعة مواد مختلفة متباينة .

٢٥٧٣٦ - **مِجَنَّنَاغ** °
Pterygoide (F).
Pterygoid (E).
ما كان شكله كالجناب .



مِجَلَّاح



مِجَرُوسِكِب

Cheiroptères **مَجْنَحَات الأَيْدِي**

Genre	جنس	Sous-Famille	عائلة	Famille	الصفة	Sous-ordre	مرتبة
Roussettes	شفاعة			Pteropodidés	وطوايط	Mégachiroptères	وطوايط
Cynonycteris	رقاعة						
Epomophores	حيثر						
Cynoptères	سقطوم						
Harpie (Céphalote)	مساخة						
Macroglosse	لثانة						
Eonycteris des cavernes	مرحاب						
Nésonycteris	حيثوش						
Rhinolophes	عماش			Rhinolophidés	عماشيات	Microchiroptères	مخفاطوش
Triadenops	خناطل						
Phyllorhines	ذبابش						
Authops orné	دملوح						
Cotops	ذباب						
Mégadermes	مطاب			Nyctéridés	وسرناك		
Nyctères	وحرة						
Oreillardes	طمروق			Vespertilionidés	خفاشيات		
Synotes, Barbastelles	سحاة						
Vespérugos	خشاف						
Scotophiles	ذعاط						
Vespertillions	خفاش						
Minioptères	زباغ						
Furies	دوس	Emballonurines	رماكات	Emballonuridés	رماشيات		
Saccotéryx	غضوف						
Diclidures	دماص						
Noctilions	نكتيل						
Emballonures	رماص						
Taphiens	شقلمان						
Rhinopomes	عينوم						
Chiromèles	زغداب	Molossinés	هيرات				
Molosses	هيرة						
Nyctinomes	ضفوف						
Mystacops	خوبر						
Vampires	زراف			Phyllostomidés	ورقيات		
Phyllostomes	ورقية ، فيلستوم						
Glossophages	مصاص						
Desmodes	عولق						
Diphyllies	عولق						

بالاستمرار المربع . ويختلف الجهد باختلاف الفرض المطروح لذلك فهو قد يكون :

جهد أمن Effort de sécurité (F). Safe stress or strain (E).

جهد التواء Effort de torsion (F). Torsional stress (E).

جهد ضغط Effort de compression (F). Compressive stress (E).

جهد شد Effort de traction (F). Tensile stress (E).

جهد كسر Effort de rupture (F). Ultimate stress (E).

٢٥٧١٧ - **ميجنوا** ، **ميسحاح** ، **ميسكك** Oéromètre (F). Aerometer (E).

جهاز خاص يستعمل في تحديد كثافة الهواء .

٢٥٧١٨ - **مجبوقات** ، **لاحشريات** Coelenterés (F). Coelenterata (E).

شعبة من الحيوانات لا أضاء لها فيها مجموع واحد له فتحة واحدة إلى الخارج تقوم مقام الفم والاستمساك .

٢٥٧١٩ - **مجبوقات القرن** Cavicornes (F).

قسم من المجربات ذوات القرن الحويّة كالبقر والغنم والنبات .

٢٥٧٥٠ - **مجيل** Magilus (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل وفضيلة المجيليات . أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطائها البحر الأحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . تعيش في تجاويف مدافع الرخبان || أصدانها كلسية المادة ، بيضاء اللون ، بحلة النعز ، صفراء ، مكررة ، ثلاثية القلب أو رباعية في أول عهدها ثم تطول مع مرور الزمن تصبح كالقشر الأسطوانية الشكل .

٢٥٧٥١ - **مجيليات** Magilidae (S).

مجيلدس (F). Magilidae (F).

فضيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل . أجناسها وأنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة || أعرف أجناسها وأشهرها المجيل .

٢٥٧٥٢ - **مصح** ، **مصح** Vitellus

صفرة البيض ، وهو العرقل .

٢٥٧٥٣ - **مصحات** هي الخلمي القزمي ، اطلية .

٢٥٧٥٤ - **مصحكة** Phytosomie (F).

Phytotomy (E).

الحاجة أو الفيتوتوميه علم يبحث في تشريح النبات .

٢٥٧٥٥ - **مصحاح** Pauciflora (F). Pauciflorous (E).

نمت نمرين يدل على قلة الزهر في أي شكل كان من أشكال الأزهار . تفرد منابها ومناقيدها ومساكنها ولورها حاح .

٢٥٧٥٦ - **مصحاح** ، **إستردية** ، **أستردون** Ostrea (S). Huitre (F). Oyster (E).

جنس حيوانات من الرخويات وفضيلة المحاريات . أنواعها

كثيرة العدد تقسم إلى فئتين الأولى تشمل عمار المياه البحرية وهي منتشرة في معظم بحار العالم . والثانية تشمل عمار المياه العذبة التي تعيش في الأنهار والبحيرات || وهو من الرخويات الضخمة الإحساس ، القليلة الحركة ، يتغذى بالكائنات الدنيا الحيوانية والنباتية التي تدخل مع له الماء .

٢٥٧٥٧ - **مصحاح مألوف** ، **توكا** Ostrea edulis (S). Huitre ordinaire (F). Edible oyster (E).

نوع من عمار المايول للأكل . يكثر على الصخور المنسورة بالماء على طول الشاطئ اللبناني . وهو يربي في أحواض خاصة مهيئة فيكثر بسرعة .

٢٥٧٥٨ - **مصحاح** الهارتان هما رأس الورق المشتريان اللذان تكون لهما رؤوس الفضلن .

٢٥٧٥٩ - **مصحاح** ، **قوف** ، **صيون** Pavillon de Foraille (F). Pavillon, Auricle (E).

رأس قوف صيون .

٢٥٧٦٠ - **مصحاح** Ostréicole (F).

٢٥٧٦١ - **مصحاحيات** ، **إستركويات** Ostréides (F). Ostreidae (E).

فضيلة من الرخويات ذوات الصدفتين .

٢٥٧٦٢ - **مصحاح** Vinago (S).

Vinago (F). Vinago (E).

جنس طير من الجولم حمايت الشكل وفضيلة الترويات . أنواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض أصقاع أفريقية الاستوائية والحارة . ملجها الحياتي جامي . أوطانها حوضلة العدد . تجوب البلاد في طلب الرزق . قوتها الزور والحبوب وبعض الثمار البحرية والخشرات والديدان || أجناسها شبيهة بالحمام الأصيل . متاقدها مستقلة . أرساها كاسية . أوطانها تختلف من الأنواع جميعها حادقة الألوان السماء الباهة .

٢٥٧٦٣ - **مصحاح** Comptable (F).

Accountable, Responsable (E).

الوكيل المؤتمن على الحساب .

٢٥٧٦٤ - **مصحاح** ، **مصحاح** Comptabilité (F). Accounts, Book-keeping (E).

٢٥٧٦٥ - **مصحاح** ، **مصحاح** ، **مصحاح** الحاق أو الاقتان وجه من أوجه القمر يحدث عندما يتوسط القمر بين الأرض والشمس ويكون نصفه المضيء متوجها نحو الشمس فتستحيل رؤيته . والحق يتبقى حرف الحلال يور .

٢٥٧٦٦ - **مصحاح** Anelytropidae (S).

Anelytropidés (F). Anelytropidae (E).

فضيلة حيوانات زرافة من رتبة السقا قصيرات الألسنة . أجناسها المعروفة ثلاثة وأنواعها سبعة . موطنها أفريقية الاستوائية والجنوبية وبعض مناطق المكسيك . جميعها جامة تسرح في الليل وتبيت في النهار || أجناسها مدنية الشكل ، عادمة القوائم ، تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم .



مجل



محار مألوف



مصحاح

الاسم الفرنسي	التاج	الحبل باليوم	الحيوان	Transmission (F). Transmission, Transmittal (E).	٢٥٧٧٧ - مَحَاكِلَة		
Guenon	١	٢١٠	دحية	جهاز ميكانيكي .	٢٥٧٧٨ - مَحَاكِلَة		
Lièvre	٥-٣	٣٣	ذراة	Pouille de transmission (F). Pulley (E).	هي البكرة العديدة السفات التي تستعمل في رفع الاثقال .		
Fouline	٧-٢	٥٦	دلق	Egrappoir (F).	٢٥٧٦٩ - مَحْبِلَة		
Louve	٦-٣	٦٨	ذئبة	آلة تفصل حب اللب عن التفروق اي الملوخ .	٢٥٧٧٠ - مَحْبِلَة		
Lale	٨-٥	١٣٠	رث	Terra fertile (F). Fruitful soil (E).	المهار : الارض الفتحة السريعة النبات . و لنا جبال وصى محار و ج . محار .		
Renne	١	٢٤٦	رنة	Granulaire, Granuleux (F). Granular, Granulous (E).	٢٥٧٧١ - مَحْبِلَة		
Civetta	٤-٣	٧٢	زبادة	Granular, Granulous (E).	٢٥٧٧٢ - مَحْبِلَة		
Rat des moissons	٩-٣	٧٢	زبادة	Jus de grenade (F). Juice of pomegranate (E).	المحبرم : ماء حب الرمان .		
Girafe	١	٤٥٠	زرافة	Stalle, Box (F). Stall, Box (E).	٢٥٧٧٣ - مَحْبِلَة		
Muscardin	٧-٢	٧٨	زغبة	المحيس واليكس : مرقة الفرس الواحد في الاصطبل .	٢٥٧٧٤ - مَحْبِلَة		
Belette	٨-٣	٣٥	سرغوة	Déoperculeur (F).	٢٥٧٧٥ - مَحْبِلَة		
Marta	٦-٢	٥٦	سمشور	Gestation (F). Gestation, Pregnancy (E).	الحبل هو مدة الحمل ، اي زمن تكوين الجنين ، يستمر من الاخصاب الى الوضع تدهت تختلف مع نوع الحيوان ، اقصرها ١٣ يوما وأطولها نحو ٧٦٠ وقد ذكرنا في الجدول التابع اشهر انواع الحيوان ومدة حملها باليوم وعدد نتاجها :		
Ecreuil	٤-٣	٢٨	سجباب	Chenal	٩-٥	٦٣	ابن آوى
Chamois	٢-١	١٦٥	شمواء	Pucols	٦-٣	٦٣	ابن عرس
Chat sauvage	٤-٣	٥٦	فسيون	Furet	٤-٢	٤٠	ابن مقرض
Taupe	٥-٣	٢٨	طوفين	Opussum	٥-٣	١٣	ابوسوم
Biche	١	١٨٥	ظبية	Anese	١	٣٦٤	آكان
Campagnol	٧-٤	٢٢	عكبر الحقل	Moufflon	١	١٥٠	أروية
Chèvre	٣-١	١٥٤	عنز	Elan	٢-١	٢٢٠	ألكة
Eléphant	١	٧٦٠	عشوم	Baleine	٢-١	٣٦٥	بال
Blaireau	٥-٣	٦٥	غريراء	Vache	١	٢٨٦	بقرة
Gazelle	١	١٥٤	غزالاة	Renarde	٧-٤	٦٣	ثملة
Souris	٨-٥	٢١	فأرة	Lapine	٨-٢	٣١	جسمش
Jument	١	٣٤٥	فرس ، حجر	Rat	١٠-٥	٢٢	جرذ
Lérot	٦-٤	٢٨	فوقب	Castor	٢-١	١٢٠	حاريد
Tigresse	٥-٣	١٠٠	فزاراة	Zèbre	١	٣٧٥	حمار الزرد
Morse	١	٢٦٠	فظ	Chauve-souris	٢-١	٣٥	خفاش
Phoque	١	٢٧٦	فقمة	Traite	١٢-٤	١١٥	عنزيرة
Léoparde	٥-٣	٩٦	فهداة	Ours	٢-١	٢١٥	دبة
Hermine	٨-٥	٦٠	قائم ، هرين	Mulot	٨-٣	٢٦	دثمة
Hamster	٧-٣	١٦	قد آد هستر				
Loir	٦-٢	٢٨	قرقندون				
Loutre	٣-٢	٦٣	قضاة				
Hérissonne	٦-٤	٤٨	قنفلة				
Rhinocéros	١	٥٥٠	كركدان				
Chienne	١٠-٣	٦٣	كلية				
Cobaye	٥-٢	٦٨	كوباي				
Lama	١	١٦٨	لاما				
Lionne	٣-٢	١١٠	لبرة				
Mara	٢	٦٠	ماراة				
Marmotte	٦-٢	٣٥	مردودة				
Mandrill	١	٢٧٠	ميسون				
Chamelle	١	٣٢٠	نائلة				
Brebis	١	١٤٧	لصبة				
Panthère	٥-٣	٩٦	تمرة				
Chatte	٧-٥	٦٠	هرة				
Lynx	٤-٢	٦٣	وشق				
Bouquetin	١	١٦٧	وشل				
Chevreuil	٢-١	٢٧٠	يأمور				



محبس



محبر



محار



محراث الناح



محراث النقب



محراث يرايان



محراث ذو مقنن



محراث عادي



محراث كثير المقاطع

Calorifère (F). Heat-conveying (E). **محبر** - ٢٥٧٩٠

يحمل الحرارة وينقلها . جهاز ينقل الحرارة .

Boimètre (F). **محبر طيني** - ٢٥٧٩١

Boimeter (E).

ميزان حرارة يتغير بالمقاومة الكهربائية .

Charrue (F). Plough (E). **محبرات** - ٢٥٧٩٢

المحراث أداة الحراثة . ج محارث . والمحارث صيغة الاشكال تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

Charrue déboiseuse (F). Clearing plough (E). **محراث الجث** - ٢٥٧٩٣

هو المحراث المجهز لاختراق اوراق الشجر .

Charrue rigoleuse, Ch. fossayeuse (F). Ditching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٤

محراث التفتيح .

Charrue rigoleuse, Ch. fossayeuse (F). Ditching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٤

محراث تفتيح به جداول الاسقاء .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

من ٥٠ الى ٨٠ سم .

Charrue défoncée (F). Trenching plough (E). **محراث التفتيح** - ٢٥٧٩٥

محراث يستعمل في تفتيح التربة الزراعية على اعماق تراوح

٢٥٧ **محبرين**

بن تيجان من برج الجدي مركزها على الذئب واحد
الاثنين انور من الاخر ويدعى اخفى المحبر .

Grèsière, Grésier (F). **محبرة** - ٢٥٧٩٢

Sandstone quarry (E).

لج الحجر الرمل

٢٥٧٩٣ **محبر** - ٢٥٧٩٣

محبر المود : قشرة .

Lithopage (F). **محبر** - ٢٥٧٩٤

Lithopagous (E).

يش الحبيارة .

Lithoxyle (F). Lithesxyle (E). **محبر** - ٢٥٧٩٥

ل نبات تحوّل مايتها الخشبية الى مادة صخرية دون

ير في الشكل ينس محبراً .

Parc (F). Park (E). **محبر** - ٢٥٧٩٦

محبر هو الحديقة هذا ما قاله لبيد . وفي التليد : المحبر :

لوى للمخضف ، ج محابر .

Lasaret (F). **محبر صغي** - ٢٥٧٩٧

Lazaretto (E).

مزل مخصص لايواء الحيوانات القادمة من بلاد وبه .

Bec (F). Beak, Bill (E). **محبر** - ٢٥٧٩٨

محبر الطائر : منقاره ومنقاره ومنقاره .

Streptopus (S). **محبر** - ٢٥٧٩٩

Streptope (F).

جنس نباتات ترينية جلمورية معمرة من فصيلة الزنبقيات .

انواعه المعروفة قليلة . بعضها فروع موزقة . اوراقها متعاقبة

سنانية النصل الساعد الانشباب . ازهارها فردية التجميع ،

ابطية الانكاز ، جرسية الشكل ، مستطيلة الزنادة ، متدلية .

لونها يختلف باختلاف النوع ، منها الابيض الاخضر المولج

والاخر والارجواني . ازهارها يستمر من ابد الى محو .

٢٥٧٨٥ **محبر الاطراف**

Busqué, Convexilligne (F). Convexilinear (E).

نمت وصفي تحريفي يستعمل في تصنيف التوائن انحصها

الخليل .

Demi-sang (F). Half-bred (E). **محبر** - ٢٥٧٨٦

المحبر ج . محارث . هو كل حيوان ناتج من سلالة

متيقة صريحة حيث يسلالة لا رن لها .

٢٥٧٨٧ **محبر** - ٢٥٧٨٧

محبر ك * ، محبر الجلكد ، محبر

Pagocope

جهاز مؤلف من ميزاني حرارة ، ولثاف ووط . يستعمل

للحالة على حالة الرطاب الجوي وبالتالي على استكانية

محصول الصبر والملاح الاسود . وقد ينسب من الحدث قبل

وقوه بضع ساعات .

Amérir, Amerrir (F). **محبر** - ٢٥٧٨٨

To alight (E).

حط بطارته المائية على سطح الماء .

Amérissage, Amerrissage (F). **محبر** - ٢٥٧٨٩

Allighting (E).

انحر وصول الطائرة المائية الى سطح الماء .

٢٥٧٩٠ **محبر** - ٢٥٧٩٠

محبر ك * ، محبر الجلكد ، محبر

Pagocope

جهاز مؤلف من ميزاني حرارة ، ولثاف ووط . يستعمل

٢٥٨٢٣ - مَحَشَّشٌ هَشَّ الْجُلْدَ : قَشَرَهُ مِنَ اللَّحْمِ .

٢٥٨٢٤ - مَحَشَّشٌ Brouisure, Brûture (F).
Blight, Frost-nip (E).

المَحَشَّشُ الإِثْرَاقُ فِي الْبَشَرَةِ . الصَّعِيقُ يَمَحَشُّ الْبَشَرَ وَالنَّصْلُ أَيِ يَمْرِقُهَا .

٢٥٨٢٥ - مَحَشَّشٌ * ، مِخْطَافَةٌ Faucheur, Tondeuse de gazon (F). Lawn-mover, Mowing-machine (E).

آلَةُ مِيكَانِيكِيَّةٌ تَسْتَمَلُّ لِحْشَ كُلِّ الْمَرْجُوحِ .

٢٥٨٢٦ - مَحَشَّشٌ مَائِيٌّ Faucardeur (F).
آلَةُ مِيكَانِيكِيَّةٌ تَسْتَمَلُّ لِحْشَ النَّبَاتَاتِ الْمَائِيَّةِ فِي الْإِنْهَارِ .

٢٥٨٢٧ - مَحَشَّشٌ * Râtelier (F). Rack (E).
وِجَاءٌ خَاصٌّ بِمَكَزٍ فَوْقَ الْمَلْفِ الْعَامِدي يَوضَعُ فِيهِ الْكَلَّةُ وَالْثَنُّ لَتَلْعَلَهُ الْبَهَائِمُ شَيْئًا نَفِيسًا دُونَ أَنْ تَبْصُرَهُ .

٢٥٨٢٨ - مَحْشَفَةٌ Grève (F). Strand (E).

الْمَحْشَفَةُ شَطٌّ مَسْطَحٌ يَجْرِي أَوْ نَهْرِي تَقْرَعُهُ الْحَصَاةُ وَالزَّمَالُ الْخَشَبَةُ . ج. مَحَايِبُ .

٢٥٨٢٩ - مِخْصَدٌ ، مَحْصَدَةٌ ، حَصَادَةٌ . Moissonneur (F). Reaper (E).

رَاجِعُ حَصَادَةٍ وَنَبْأِ الْجَامِعةِ وَالرَّابِطَةُ الْخَبَرُ .

٢٥٨٣٠ - مَحْصُولٌ ، مَحْتَى ، حَتِي ، حَلَّةٌ ، تَزْكُ Récolte (F). Harvest, Crop, Vintage (E).

مَا يَحْتَمِي مِنْ زُرْعَةِ الْأَرْضِ .

٢٥٨٣١ - مَحْفَرٌ Procès-verbal (F).
Official report (E).

مَقْدُ يَدُونُ فِيهِ لِلْأُمُورِ الْمَوْجِبُ الرِّقَاقَ الْمَادِيَّةَ وَالْأَعْمَالِ أَيِ قَامَ بِهَا .

٢٥٨٣٢ - مِخْفَنٌ ، مِرْفَخٌ Incubateur, Couvoir (F). Incubator (E).

هُوَ الْمَرْكُ ، أَطْلَبُهُ .

٢٥٨٣٣ - مِخْفَبٌ * ، مِخْفَدٌ Serpe (F).
Bill-hook, Hedge-bill (E).

أَدَاةٌ سَادَةٌ مُنْفَلِقَةُ الطَّرَفِ تَسْتَمَلُّ فِي تَشْلِيقِ الْأَشْجَارِ وَقَطْعِ الْأَشْخَابِ .

٢٥٨٣٤ - مِخْفَبٌ Aslette (F).
أَشْجَارُ الْحَرَجِ الْمَعْدَةُ لِلْقَطْعِ .

٢٥٨٣٥ - مِخْفَتَةٌ جَوَاقِيَّةٌ Station météorologique (F). Meteorological station (E).

مَرْكَزُ جِهَازٍ بِمَا يَلْزَمُ لَتَتَوَيَّنُ الْأَحْوَالُ الْجَوَاقِيَّةُ وَدَرَسُهَا .

٢٥٨٣٦ - مِخْفَتَةٌ زُرْعَانِيَّةٌ Station agronomique (F). Agronomic station (E).

مَرْكَزُ عِلْمِي وَفَعْلِي يَبْحِثُ فِي مُخْتَلَفِ النَّبَاتَاتِ وَالْفَلَوْنِ الْأَزْرَاقِيَّةِ وَالْإِسْتِخَارِيَّةِ لِإِسْتِخْلَاصِ نَتَائِجِهَا .

٢٥٨٣٧ - مِخْفَطَارٌ * Sirex

جَنْسُ حَشَرَاتٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْمِخْفَطَارِيَّاتِ . أَنْوَاعُهُ الْمَرْفُوقَةُ ١٢ أَجْسَامًا اسْطَوَانِيَّةً لَشَكْلِ طَوِيلًا يَرَاوِحُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٤٠ سَمًا .

Triangulaire (F).
Triangular (E).

٢٥٨٠٧ - مُخَرَّعٌ * .

مَا كَانَ شَكْلُهُ مِثْلَ الزَّوْيَا .

Oxystomes (F).
Oxystoma (E).

لَمَّةٌ مِنَ الْقَشَرَاتِ عَشَارِيَّاتِ الْأَرْجُلِ تَسْتَمِلُ إِلَى رِجْلِيَّةٍ قَصَارِ الذَّيْلِ . أَجْناسُهَا وَأَنْوَاعُهَا الْمَرْفُوقَةُ مُتَوَسِّطَةُ الْعَمَدِ جَمِيعًا مِنْ مَطَرٍ يَحَارُ الْبِلَادَ الْحَارَةَ || أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ . تَتَمَيَّزُ بِدَوْرَمِهَا الْمُسْتَدِيرَةِ وَبَانْوَاهِهَا الْهَرَمَةِ الشَّكْلِ || الْأَشْهُرُ فَصَالُهَا الْكُرْلِيَّاتُ .

٢٥٨٠٩ - مُخَوَّكٌ Moteur (F). Motive, Motor (E).

كُلُّ كَأَنَّ شَيْءٍ أَوْ جِهَازٍ آتِيٍّ يَقُومُ بِعَمَلٍ مِيكَانِيكِيٍّ . لِذَلِكَ فَالْمُخَوَّكَاتُ تَقْصِمُ إِلَى حَيَةٍ وَجَاهِدَةٍ . الْخَرَكَاتُ الْحَيَّةُ كَالرَّجُلِ وَالْقَرَسُ وَالْقَوْرُ... وَالْمُخَوَّكَاتُ الْجَسَامَةُ هِيَ الْآلِيَّةُ الَّتِي تَسِيرُهَا أَحَدُ الْقُوَى الْمُتَصَرِّفَةِ كَالْغَايَةِ وَالرِّيحِ وَالْكَهْرَبَاءِ وَالْحَرَارَةِ ، الْخَبَرُ .

٢٥٨١٠ - مُخَوَّكٌ جَسَادِي Moteur inanimé (F).
Inanimate motor (E).

٢٥٨١١ - مُخَوَّكٌ حَرَوْرِيٌّ Moteur thermique (F).
Thermic motor (E).

٢٥٨١٢ - مُخَوَّكٌ حَيٌّ Moteur animé (F).
Animated motor (E).

٢٥٨١٣ - مُخَوَّكٌ كَهْرَبَائِي Moteur électrique (F).
Electric motor (E).

٢٥٨١٤ - مُخَوَّكٌ مَائِيٌّ Moteur hydraulique (F).
Hydraulic motor (E).

٢٥٨١٥ - مُخَوَّكٌ هَوَائِيٌّ Moteur aérien (F).
Aerial motor (E).

٢٥٨١٦ - مِخْرُوقَةٌ المِخْرُوقَةُ وَاحِدَةُ الْمِخْرُوقِ ، مِخْرُوقَةٌ يَفْضَأُ تَجَمُّلٌ فِي الْمَلْحِ لَا تَخَالُفُ شَيْئًا إِلَّا غَلَبَ رِيحُهَا عَلَيْهِ وَتَنَبَّتْ فِي الْبَادِيَةِ وَهِيَ ذَكِيَّةُ الرِّيحِ جَدًّا . (عَنْ ابْنِ شَيْلٍ ، الْفَسَانِ) .

٢٥٨١٧ - مِخْرَافٌ Inciseur, Coupe-sève,
Pince-sève (F). Ringing-knife (E).

أَدَاةٌ تَسْتَمَلُّ لِحْزَ الْأَشْجَارِ الْمَطْلُوبِ اسْتِخْلَاصَ مَصَارِفِهَا .

٢٥٨١٨ - مِخْرَافَةٌ Bottaloir, Botteleuse (F).
Binder, Sheaf-binding machine (E).

أَدَاةٌ تَسْتَمَلُّ فِي تَمِصِّ مَصَالِغِ الْحُلِيِّ وَتَحْزِيمِهَا .

٢٥٨١٩ - مِخْرَبَةٌ Estrille (F). Curry-comb (E).

٢٥٨٢٠ - مِخْرَبٌ ، مِخْرَبِيٌّ Ioue (F). Cheek (E).

هُوَ الْجُزْءُ الْجَانِبِيُّ مِنَ الرَّأْسِ فِي الْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ وَمِنَ الْبَيْضِخِ فِي الْخَشَرَاتِ ، وَهِيَ مِخْرَبَانُ .

٢٥٨٢١ - مِخْرَبِيٌّ ، مِخْرَبِيٌّ Jugal

٢٥٨٢٢ - مِخْرَبَةٌ Ebarbeur (F).
Paring machine (E).


آلَةُ يَنْزَعُ بِهَا شَعَارُ الشَّعِيرِ بِعَدِّ الْمَدْرَسِ .



مِخْرَابُ الْقَصْوِيِّ وَالذَّنْبِي



مِخْرَبٌ



مِخْرَبٌ



مِخْرَبٌ



مِخْرَبٌ



مِخْرَبٌ

٢٥٨٥٠ - مَحْكَمَة
Cour, Tribunal (F).
Court, Tribunal (E). هي المحكمة التي تلي القضاء .

٢٥٨٥١ - مَحْكَمَة الاسْتِنْفَاف
Cour d'appel (F). Appel court (E).
هي المحكمة التي تنظر في جميع القضايا التي حكم فيها ابتدائياً .

٢٥٨٥٢ - مَحْكَمَة الِيدَايَة
Cour de première instance (F). قضاء أول درجة .

٢٥٨٥٣ - مَحْكَمَة التَّحْكِيم الدَّوْلِيَّة
Cour internationale d'arbitrage (F).
انشتت هذه المحكمة بمقتضى اتفاق لاهاي عام ١٨٩٩ لكي تفصل بطريق التحكيم في جميع المنازعات الدولية التي لم تفلح الطرق السياسية في حلها . مركزها مدينة لاهاي .

٢٥٨٥٤ - مَحْكَمَة التَّعْيِيز ، مَحْكَمَة النِّقَض
Cour de cassation (F). Highest court (E).
هي اهل المحاكم درجة لانه يطلب منها النظر في الاحكام التي صدرت من محاكم الدرجة التالية فهي تنقض منها ما ترى فيه مغايرة للقانون او تفسيراً خاطئاً له .

٢٥٨٥٥ - مَحْكَمَة الْجَنَائِيات
Cour d'assises (F). Assize court (E).
هي المحكمة التي تنظر في المسائل الجنائية وهي تتلقت من ثلاثة اعضاء تعينهم محكمة الاستئناف من المستشارين يكون احدهم رئيساً .

٢٥٨٥٦ - مَحْكَمَة الْعَدْل الدَّوْلِيَّة
Cour internationale de justice (F). International justice court (E).
هي الادارة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة لايتها تشمل كل ما هو متصوص عليه في الميثاق والامدادات والاتفاقات المصولة بها .

٢٥٨٥٧ - مَحَل الإقامَة
Domicile de fait, Résidence (F). Dwelling, Ordinary residence (E).
هو المكان الذي يقم فيه المرء دون ان يكون زائماً موطنه القانوني .

٢٥٨٥٨ - مِحْلَاب
Galactophore (F).
Galactophorous (E).
لتم تمريرني يطلق على كل واه ينقل الحليب أو يقوده الى الخارج .

٢٥٨٥٩ - مِحْلَال
Bordereau (F).
Memorandum, Schedule, Account (E).
هو البيان التفصيلي الذي يوضح الاعمال والحسابات .

٢٥٨٦٠ - مَحَلَب *
Cerasus mahaleb, Prunus mahaleb (S). Mahaleb, Cerisier mahaleb, C. Ste Lucie (F). Perfumed cherry, Ste Lucie cherry (E). Lucianholz, Stein-Weichsel, Weichselkirsche (D). Cillegio mahaleb, C. odoroso, Pruno odoroso, C. canino, C. S. Lucia, Legno di S. Lucia (I).
نوع من الكرز البري، فحيرة كبيرة لثقة متضبة السابق تملو نحو ١٠ امتار . فرومها وانفاسها منعطرة . اوراقها صفيرة النصل . انماها نورية التجميع . ثمارها حصى

الوانها مختلفة ، قرونها الاستعمارية غليظة ، مرزاتها مستطيلة || رقاتها غاشية تركب الصنوبريات تقسردب ، الشكير والحشب .

٢٥٨٦٨ - مِخْطَار أُسُود *
Sirax juvencus (S). Sirax noir, Sirax commun, Bouvillon (F). Polished horntail (E). Kiefernholzwespe (D).
مِخْطَار كبير اللد ، طوله نحو ٣٠ سم . لونه الى السواد الاعم ، جرمزه الى الحمرة . مرزه مخزفي الشكل . يمتح مكنه داخل قشور الصنوبريات فوق الشكير ينفث من رقات تروذب الشكير والحشب بانفاق مستطيلةمنعرجة .

٢٥٨٦٩ - مِخْطَار جَبَّار *
Sirax gigas, Urocerus gigas (S). Sirax géant (F). Giant horntail (E). Riesenholzwespe (D).
نوع من المِخْطَار ، طوله نحو ٤٠ سم . رأسه وجوشره وصلقات بطنه الوسطى سود . سائر جسمه مع جرمزه الى الصفار اناري . مرزه ينتهي بشفة حادة || رقاته غاشية تركب جميع الصنوبريات تقسردب الاشخاب وتطسها .

٢٥٨٦٠ - مِخْطَارِيَّات *
Siricidae (S).
Siricidés (F). Siricidae, Horntails (E). Holz-wespen (D).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطائها البلاد المعتدلة الحرارة . جميعها اسطوانية الشكل ، كبيرة اللد ، طول اجسامها يراوح من ٢٠ الى ٤٠ سم . || رقاتها غاشية مؤذية تعيش على الصنوبر والتنوب .

٢٥٨٦١ - مِخْفَافَة ، لَلَاغَة
Arracheuse, Arrachoir (F). Grubbing plough (E).
آلة تستعمل لقع البطاطا والثوندر والجزر .

٢٥٨٦٢ - مِخْطَار
Sablère (F).
Sand-pit, Gravel-pit (E).
هو المرطلة ، منجم يستخرج منه الرمل .

٢٥٨٦٣ - مَحْفُوظَات ، كَنْسِرَوَات
Conserves (F). Preserves (E).

٢٥٨٦٤ - مَحَق
الحق : الشجر المقارب بينه في الفرس .

٢٥٨٦٥ - مَحْفَلَة
Ferme (F). Farming, Farm (E).
الحفلة في المزرعة . ج محفل . وفي الحديث « ما تضمنون محافلكم » .

٢٥٨٦٦ - مِخْلَن
Injecteur (F).

٢٥٨٦٧ - مِخْلَنَة *
Seringue (F).
Syringe, Squir (E).
اداة تحقن بها السوائل في جسم الحيوان وفي جوفه .

٢٥٨٦٨ - مِخْلَك ، مِشْعَب
Raclette, Raclor (F). Scraper (E).

٢٥٨٦٩ - مِخْلَكَة
Trihomètre (F).
Trihometer (E).
الحكاك جهاز يستعمل في قياس قوة الاحتكاك .



مِخْطَار أُسُود



مِخْطَار جَبَّار



مِخْلَنَة



مِخْلَب

Axile, Axillaire (F). **مَحْوَرِيّ** ٢٥٨٨٠
Axial, Axillary (E).

Herbe d'Inde (F). **مَحْوُوط** ٢٥٨٨١
نبات بري طبي يعرف باسم اخيراكتيس ، اطلبه .

Fascié (F). **مُحَوَّرٌ ، مُقَسَّمٌ** ٢٥٨٨٢
Fasciated (E).

نمت تعريفى يطلق حل كل ما هو مسوم بمصالب ،
وعلى النباتات المصاب بالشملة اي الاغراب .

Biennal, Bisannuel (F). **مُحَوَّل** ٢٥٨٨٣
Biennial (E).

Transformateur (F). **مُحَوَّرٌ** ٢٥٨٨٤
Transformer (E).

جهاز يغير درجة توتر التيار الكهربائي .

Teneur (F). **مَحْوِيّ** ٢٥٨٨٥
Tenor, Percentage (E).

هو ما تحواه كل مسادة معينة من الناصر المطلوب او
الناصر المطلوبة ، ج . محوي .

Cercle (F). Circle (E). **مُحِيط** ٢٥٨٨٦
هو الدائرة ، اطلبه .

Océan (F). Ocean, High sea (E). **مُحِيط** ٢٥٨٨٧
البحر هو قسم شاسع المساحة من سطح ماء الكرة الارضية.
الخصائص المحددة أربعة : (١) المحيط الهادي الذي تبلغ
مساحته نحو ٨٨ مليون كيلومتر مربع اي ما يقارب
مساحة اليابسة بكاملها . (٢) المحيط الاطلسي الذي تبلغ
مساحته نحو ٥٣ مليون كيلومتر مربع . (٣) المحيط
الجنوبي ومساحته نحو ٤٨ مليون كيلومتر مربع .
(٤) المحيط الهندي ومساحته نحو ٢٧ مليون كيلومتر مربع .

٢٥٨٨٨ - **مُحِيط الدائرة ، مُحِيط دَائِرَةِ**
Cercle de la circonférence, Périmètre, Périphérie,
Pourtour (F). Circle of circumference, Periphery,
Perimeter (E).

Pectes fourmis (F). **مُحِيل** ٢٥٨٨٩
Small anta (E).

الحيل : اصغر الدّر . قال الاخلال :

« ولو بات يسري الدّر فوق جلودها

لأثر في ابشاره» يحيلها »

Méliee à petites fleurs (F). **مُحِبِّلِيَّة** ٢٥٨٩٠
هي الخشخاش الصغير ، اطلبه .

Moselle (F). **مُصْع** ٢٥٨٩١
هو النخاع ومن المكاك ، اطلبه .

Tenants (F). Adjacent lands (E). **مُتَعَارِج** ٢٥٨٩٢
هي قطع الارض المجاورة للترك من جهة العرض .

Docks, **مُتَعَارِزٌ عُمُومِيَّة** ٢٥٨٩٣
Magasins généraux (F). Docks, Ware house (E).

٢٥٨٩٤ - **مَخَاسِ الزُّعْرُورِ ٥* ، مَخَاسِ ثُنَائِيّ**
الثَّقَلُ ٥

Cryptocéphalus
octopunctatus (S). Cryptocéphale octoponctué (F).
Cryptocéphalus octopunctatus (E).

حشرة غاشقة من النضاريات مصفات الاجنحة . تألف

القد ، سواء اللين ، حريقة العلم . انتشارها صلبة
معرفة طيبة الرائحة مرغوب فيها || والحب يستعمل خاصة
كطعم لبعض انواع الكرز لانه نبات سروتي يعيش في
مظلم الارثية || « نجارة مفرحة » مقربة الحواس
مطلقاً ، تمتع الخفايا والبهير وشيق النفس واللباس ، وتنتي
للمدة وابواب الكبد والكلى والطحال والخصى وصر البول
شرباً . ويطلق به فيلق الكلف والجرب . »

Escargolière (F). Snailry (E). **مَحْوَرَّة** ٢٥٨٩١
هي المكان المدة لتربية الحلزون .

Réducteur (F). Reducer (E). **مُحَلِّل** ٢٥٨٩٢

Solution **مَحْلُوط** ٢٥٨٩٣

Bouillie (F). Wash (E). **مَحْلُوط ، سَائِل** ٢٥٨٩٤

Vernaculaire (F). Vernacular (E). **مَحَلِّيّ** ٢٥٨٩٥
ما هو خاص بالبلد كقولك الاسماء المحلية او اللغة المحلية .

Pèse-acide (F). **مِخْصَاصِي ٥** ٢٥٨٩٦
Acetometer (E). مقياس او ميزان الحموضة .

Edulcoré (F). Sweetened (E). **مُحَوَّرٌ** ٢٥٨٩٧
نمت تعريفى يطلق على كل دواء تالف العلم او مرّ أخيف
اليه بعض السكر تحسناً للمذاق .

Acidifiant (F). Acidifying (E). **مُحَمِّض** ٢٥٨٩٨
نمت تعريفى يطلق على كل مادة تقوى الى التخميض .

Mammoth (F). **مَحْمُود** ٢٥٨٩٩
هو الصنابة ، اطلبه .

Scammonée d'Alep (F). **مَحْمُودَّة** ٢٥٩٠٠
هي السقمونيا ، اطلبه .

Convulvaceae **مَحْمُودِيَّات** ٢٥٩٠١
فصيلة نباتية مشهورة باسم اليليايات ، اطلبه .

Cumulo-nimbus **مَحْمُودِيّ** ٢٥٩٠٢
هو الركام ، لوح من البوم ، اطلبه .

Test **مَحْن ، قَحْص** ٢٥٩٠٣

٢٥٩٠٤ - **مَحْوَرَّة** كثيرة الحيات . يقال ارض محرواة .

Axe (F). Axis, Axon (E). **مَحْوَر** ٢٥٩٠٥
هو نقطة الارتكاز .

٢٥٩٠٦ - **مَحْوَرٌ أَكْبَشِيّ ، مَحْوَرٌ سِنِيّ**
Abcisse (F). Abcissa (E).

٢٥٩٠٧ - **مَحْوَرُ النَّهْرِ**
Thawleg اعرق خط في قامه . واذا كان النهر بين دولتين حد
محوره حدّاً بينهما .

Ordonnée (F). **مَحْوَرٌ صَادِيّ** ٢٥٩٠٨
Ordinate (E).

Peupleraie (F). **مَحْوَرَّة** ٢٥٩٠٩
Plantation of poplar trees (E).

مغرس المحور وكل مكان فيه حور .



مَخَاسِ الزُّعْرُورِ

٢٥٨٩٧ - مَخّاسُ لَسَانِي النُّقْطِ

Cryptocéphale octopunctue (F).

هو مخّاس الزعرور ، اطليه .

٢٥٨٩٨ - مَخّاسُ دِستِيج

Cryptocéphale distingué (F).

هو مخّاس العُشب ، اطليه .



مخّاس العُشب

Dentelure du limbe (F).

٢٥٨٩٩ - مَخّاشِر

Indenting of limb (E).

استان حافة نصل أقرّة .

Prise à partie (F).

٢٥٩٠٠ - مَخّاصِمَةُ القَاصِي

وسيلة طعن غير حادة مؤداها رفع دعوى على القاصي امام محكمة الاستئناف او التقاضي والارام يطالب فيها بتجويض عن ضرر وقع من عمل صدر منه يتصل بوظيفته ويطلب عليه القانون .

Gué (F). Ford (E).

٢٥٩٠١ - مَخّاصِمَة

كل مكان من النهر قليل العمق والماء يمكن اجتيازه على الاقدام .

Ecrémeuse (F).

٢٥٩٠٢ - مَخّاصِمَة * ، قَرَاة

Separator (E).

آلة تستعمل لفرد الكتانة من الحليب .

٢٥٩٠٣ - مَخّاشِرَة

بيع الثّار ويخرى لم يبد صلاحها .

Sébastien (F).

٢٥٩٠٤ - مَخّاطَة

هي شجرة السبستان وتسمى اطياء الكلية .

Mucilagineux (F).

٢٥٩٠٥ - مَخّاطِي * ، لُغَائِي

Mucilaginous (E).

الاجسام الغاطية اجسام لزجة مركبة من الكربون والاكسجين والليدروجين توجد في عدة نباتات .

Myxinième (S).

٢٥٩٠٦ - مَخّاطِيَة

Myxinième (F). Myxinième (E).

فضيلة السمك الغاطي من قسم الماصات .

Quitteuse (F). Racelpt (E).

٢٥٩٠٧ - مَخّالِصَة

هي الاراء .

Contravention

٢٥٩٠٨ - مَخّالِصَة

العمل الذي يقوم به المرء علاناً لاسكام القانون او النظام .

Braconnage (F).

٢٥٩٠٩ - مَخّالِصَة الصَيْد

Poaching (E).

علم التقيد بالنظمه الصيد المرعية الاجراء .

Tube à essai (F).

٢٥٩١٠ - مَخْبِر

Tube of trial, Pipe of essay (E).

Laboratoire (F).

٢٥٩١١ - مَخْبِر

هو المختبر ، اطليه .

Fournil (F). Bake house (E).

٢٥٩١٢ - مَخْبِيز

بناء الفرن وادوات الخبازة .

Boulangerie (F).

٢٥٩١٣ - مَخْبِيزَة ، مَخْبِيزَة

Baking (E).

صناعة الخبز وخبازها .



مخبر

البراري والاحراج للبعثرة الاشجار . غناتها ويرقاتها تعيش على اوراق الزعرور والبوق والنباتات الغدلية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الاوان ، كوسلها الى السرة السوداء طولها تزايدت حاجية . ظهراتها الى الحمرة البرتقالية يعلوها تنقيط اسود ثنائي العدد . بطنها وبرازها سود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في التبار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكان مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الارواق || والبرقة عند ادراكها الكمال الجسدي تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجسم ، سداسي الرؤوب ، حطلي اللون ، اصفر الحواج ، اصغر الرأس والرؤوب .

٢٥٨٩٥ - مَخّاسُ العُشب * ، مَخّاسُ لَحِيب

Cryptocéphale primarius (S). Cryptocéphale distingué (F). Cryptocéphale primarius (E).

حشرة خاضعة من التضراريات مفصلات الاجنحة . تألف البراري والاراضي للمحاة . غناتها ويرقاتها تعيش على النباتات الشبية || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها متراكب الاوان . رأسها وكوسلها وطبها وبرازها الى السوداء الاخضر الحواج . ظهراتها الى الحمرة الاروانية يعلوها عشر نقط سود . رأسها صغير الجسم . عينها صغرتان . زباناها حيطيان . ظهراتها مستدلة الاحدياب مقطوع الطرف اللاتح . غذاءها متناهية التحيز الخفيف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى ايلول . تسرح في التبار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكان على الصفحات السفلى من نصال المعف والاوراق || والبرقة عند بلوغها الادراك تمام تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الشكل سداسي الرؤوب ، اخبر اللون ، اصفر الحواج ، اسود الرأس ، يعلو من جانبيه خط من النقط السمر المتبزة يزوج من الحلب القصير || طور الاكمال ينقضي في التربة ضمن حبيرة جرابية الشكل .

٢٥٨٩٦ - مَخّاسُ البَيرِين *

Cryptocéphale Marise (S). Cryptocéphale de Marie, C. des églantiers (F). Cryptocéphale Marise (E).

حشرة واثمة خاضعة من التضراريات مفصلات الاجنحة . تألف البراري والاحراج . غناتها تعيش على ازهار السرين والعمر والابل والدراهم ... يرقاتها تعيش على الارواق فتقتطع الخشب بين الثروق ثم تلم النصل وتعيش في داخله || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها الى الشقة الصفراء البرتقالية الحواج . كوسلها ثلاثي الزاويق السود . ظهراتها يعلو بالاسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط آب . تسرح في التبار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكان على الصفحات السفلى من نصال الارواق || والبرقة عند ادراكها الكمال الجسدي تطول نحو ٧ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ثني اللون ، اصبر الرأس والرؤوب تملو ثلاثة خطوط لاذية حمراء اللون || طور الاكمال الذي يعيش نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة ضمن جراب من المواد النباتية المنجومة بالبراز والرياح .

Reyonneur (F). مِخْبَطْ * - مِخْبَذْ *
Drill (E).

جهاز ثنائي أو ثلاثي أو خماسي الإنسان يستعمل في تخديده التربة خطوطاً مستقيمة متساوية الأبعاد البينية .

Cansiculé (F). مِخْبَذْ
Channelled, Furrowed (E).

نمت وصفي يطلق على بعض أعضاء الحشرات كالكلوالس والأعقاد الميزابية التخديده .

Narcotique (F). مِخْبَذْ * - مِخْبَذْ *
Narcotic (E).

كل نبات يحوي اشياء قلبية مخدرة كالتيغ والحشاش وما اشبه .

Dominant (F). مِخْبَذْ * - مِخْبَذْ *
Dominating, Ruling (E).

هو السغار الذي ينتفع من الارتفاع .

Employeur (F). Employeur (E). مِخْبَذْ *
الخدم أو المستخدم هورب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستخدمهم .

Haichoir (F). Chopping-board, Chopping-knife, Chaff-cutter (E). مِخْبَذْ * - مِخْبَذْ *
آلة لا قياسية الشكل والحجم تستعمل في أغراض مختلفة اخصها تقطيع اللحم وفرم ورق التبغ وفرم الجذور الخ .

Stylé, Styleire (F). Stylar (E). مِخْبَذْ *
شكل من زيات الحشرات ونصال الأوراق يشبه الخرز .

Cueille-fruits (F). مِخْبَذْ *
Gathering-fruits (E). أداة تستعمل لقطف الثمار .

Cône (F). Cone (E). مِخْبَذْ *
Conique (F). Conical (E). مِخْبَذْ *
مِخْبَذْ * - مِخْبَذْ *

Conoïde, Cunéiforme (F). Conoid, Cuneiform (E).
نمت تعريفي توصف به الاشياء المخروطية الشكل .

Conifères (F). مِخْبَذْ *
Conifera (E). فصيلة نباتية مشهورة باسم صنوبريات .

Conirostres (F). مِخْبَذْ *
Conirostres (F). رتيبة من الطيور الجوارح تشمل عدة فصائل ، أشهرها الخشخشيات والقريبات والقرقيبات .

Conicisé (F). Conicalness (E). مِخْبَذْ *
Clapier (F). Hutch (E). مِخْبَذْ *

مكان تربية الأرانب إن بقفس أو رديحة .

Official مِخْبَذْ *
نمت تعريفي يطلق على كل نبات يستعمل في تركيب الادوية .

Malaxeur (F). مِخْبَطْ * - مِخْبَطْ *
Kneader (E).

Laboratoire (F). Laboratory (E). مِخْبَطْ *
مكان التحريات والفحوصات والتحليل المختلفة .

Mixtiligne (F). مِخْبَطْ *
Mixtilineal, Mixtilinear (E).

كل رسم يختلف الخطوط بين المستقيمة والمستديرة .

Hétéromères (F). مِخْبَطْ *
Heteromera (E).

رتيبة حشرات من مبدات الاجنحة .

Hétérocardes (F). مِخْبَطْ *
Heterocarda (E).

رتيبة حيوانات من الرخويات الحدية الأمايبات الخفيات .

Hétéropodes (F). Heteropoda (E). مِخْبَطْ *
رتيبة حيوانات بحرية من الرخويات مبدات الأرجل .

فصائلها واجناسها وأنواعها عديدة جميعها شقية ، صمجة ، مفترسة . ملجها الحياتي جماعي . تعيش في عرض البحر ولا تقرب الشطوط . اصطناعيا بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تسبح وتقوم على ظهورها ، بطونها موجهة نحو سطح الماء || اجسامها حلالية . رؤوسها تنتهي بأخطام متعاقبة الطول . ارجلها زعنافية الشكل تناسب الحياة البية || أشهر فصائلها الاطنطيات والريانات .

Hétérocères (F). مِخْبَطْ *
Heterocera (E).

رتيبة حشرات من حرشيات الاجنحة تشمل عدة فصائل . أشهرها القزبات والنازيات والنسقيات والحلويات والآزبات والقتليات والقاتلات الخ... تتميز بالوانها المتراكمة المادمة الزعاج ويقرونها الاستعمارية اللاقائية . خادراتها مجلبة بشرفة .

Hétéroptères (F). مِخْبَطْ *
Heteroptera (E).

رتيبة حشرات من حرشيات الاجنحة تشمل عدة فصائل . أشهرها القزبات والنازيات والنسقيات والحلويات والآزبات والقتليات والقاتلات الخ... تتميز بالوانها المتراكمة المادمة الزعاج ويقرونها الاستعمارية اللاقائية . خادراتها مجلبة بشرفة .

Hétérotriches (F). مِخْبَطْ *
Heterotrishes (E).

رتيبة حيوانات دنيا من المديدات أو التقيبات الخديبة .

Hétéroptères (F). مِخْبَطْ *
Heteroptera (E).


رتيبة حشرات من طبقة نصفيات الجناح . فصائلها واجناسها وأنواعها كثيرة العدد جميعها تدريجية التطور . منظمها متوسط القد أو صغير . منها الجنبة والمادمة الجناح . قرونها الاستعمارية قصيرة . اخطامها ثاقبة ماصة تمسكها من ثقب الانسجة النباتية واختصاص النعج . من ميزات بعض فصائلها ما تنقله ، عند الدفاع عن النفس ، من سوائل كركبة الرائحة مخزنها في خلد خاصة || أشهر فصائلها : القمصيات والبيقات والنازيات والفاسيات .

Hétérocarpe (F). مِخْبَطْ *
Heterocarpous (E).

نمت تعريفي يطلق على الاشجار اللاقائية الثمار .

Fosse à fumier (F). مِخْبَطْ *
Midden-pit (E).

سفرة تصطنع لجمع الزبل على اختلاف مصادر .



مِخْبَطْ



مِخْبَطْ



مِخْبَطْ

وفي حرم السباد الممد لتكاثر الفطور للأكلية كالنارايون المروي وغيره || مظهره الخارجي كتل نغمة الشكل يضاء اللون او صفراء تركيب طبقة البصرة السطحية حيث تتشب خيوطها المشابكة التي تحول دين لغزو النارايون وغيره || يكاتف باجتناب الاسمدة التي يبلوها البفن والاسمدة الضوية الكثيرة المواد المنحلة التي قمل فيها التخدير.



مخشب

Rayonneur (F. Drill) (E). آلة تستعمل لتخطيط صفوف الفرس ، راجع مخدأ .

Mègarmètre (F). مخشابط °
Megameter (E). جهاز آل يستعمل في تحديد خطوط الطول وهو شائع الاستعمال في الملاحة وفي الرصد .

Lobipes (S). Lobipède (F). ° مخشبال °
طائر وحيد الجنس والنوع من عائلة الطماليات واصله دجائيات الارض . طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه اسمر الظهر يعلوه تنسيق ورقيط . بطنه وصدره واثنيكه بيض . رأسه اسود القمة ابيض الحمار . عيناه مكشطان بالاسود . منقاره مقطوع الطرف . ارساه قصيرة وقوية . اصابه مفصصة الحطاب || يرتاد البحار والبحيرات يسبح ويومر كطيور كفتيات القدم . قوته الحشرات والشرافيف والقشريات والرخويات والاسماك الصغيرة || الاثني تدلن في البر ، قرب الماء ، بين الاشباب . تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوماً .



غصير لوتيا

Graphique (F). Graphic (E). مخشبال °
هو الخط البياني .

Zébré (F). مخشبال ، زردى °
Striped like the zebra (E). نعمت تمريرى توصف به الاثواب الحيوانية المجلدة بخطوط معترضة كما في سمار الزرد .

Mandibule (F). Mandible, jaw (E). مخشبال °
هو الفك أي فك منقار الطائر وما شاكله . ج خالط .

Rhynchocéphales (F). مخشبال °
رئية من الزحافات يعود ظهورها الى الاباح الثاني وقد انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالمخبريه الذي يعتبر اقدم الزحافات المعاصرة لانه مثلك السب الاول .

Psychromètre (F). مخشبال °
Psychrometer (E). اداة تقاس بها رطوبة الهواء وذلك لمرفة مقدار بخار الماء الموجود في الجو .

Levier (F). Lever (E). مخشبال °
هو الرافعة والعتلة ، اطلجها .

Musseta (F). Nose bag (E). مخشبال °
كيس صغير يوضع فيه الملف ويعلق برأس الدابة .

Acétomètre (F). مخشبال °
Acatometer (E). المخلل جهاز يستعمل في قياس حوضة الخلل . ويسمى ايضاً قياس التخليل .

Griffe, Serre (F). مخشبال °
Claw, Talon (E). ظفر سباع ظفير كالبرن من سباع الرض .

Xylomètre (F). مخشبال °
Xylometer (E). الخشاب جهاز يستعمل في تعيين حجم قطعة من خشب غير مستقيمة . وذلك بقياس كمية الماء التي ترسلها تلك القطعة .

Glacière (F). مخشبال °
راجع مقلجة .

Tamis (F). Sieve, Sifter (E). مخشبال °
اداة تستعمل لفرز الحبوب والثمار والاجرام المختلفة بالنسبة الى الحجم .

Ligneux (F). مخشبال ، ليئى °
Ligneux, Woody (E). يكون النبات خشبياً عندما تجمد اليافه فتكثر فيها المادة الخشبية الصلبة القاسية ، ومكسه النبات المشي . وما بين الخشبتين يسمى النبات الخشوب أي الليئى .

Élimin (F). Éliminate (E). مخشبال °
كل حين من الحيوان او النبات صار ابعاده لنقص في صفاته المطلوبة او المرغوب فيها .

Fertile (F). Fat, Rich (E). مخشبال °
هي التربة الجيدة الاتارة بالمادة الجلب .

Récondateur (F). مخشبال ، مزيك °
Fecunder (E). الغضب والمزكم من الحيوان من كان يحمل طانة الاخصاب .

Barattage (F). Churning (E). مخشبال °
فرز الكتاة يمد مزها لاجناب واندهام الكريات الزبدية وانفصالها عن الخيض .

Gazonnant (F). مخشبال ، مخشبال °
Grassy, Turfy (E). ارض كثيفة المشب الاخضر العمر . راجع غصير ويخضور .

Gazon (F). مخشبال °
Grass, Turf, Sward (E). ارض كثيفة المشب الاخضر العمر . راجع غصير ويخضور .

Psychromètre (F). مخشبال °
Psychrometer (E). اداة تقاس بها رطوبة الهواء وذلك لمرفة مقدار بخار الماء الموجود في الجو .

Eburné (F). Dentine (E). مخشبال °
المخسول للذهب البالج .

Mycelophthora (S). مخشبال °
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفولجيات . يتميز بكتانه القصيرة الشعب ، الصغيرة اللد ، البشبية الشكل ، اللاتكيسية التجميع اذ انها تحوي الفردية والقصية || انواعه قليلة ، ارمها غصير لوتيا .

Mycelophthora lutea (S). Vers-de-gris du champignon de couche (F). مخشبال °
نوع من الغصير وهو فطر مجهرى يعيش على المواد الضوية



مخشاب

أزهارها نورية التجميع . ثمارها تطفئ لونها إلى الحمرة البرتقالية .

٢٥٩٧٦ - **مُتَحَلِّية** *Linale commune (F).*
عقبة مشهورة باسم ليناريه عادية ، أطباها .

٢٥٩٧٧ - **مُتَحَلِّية** *Créature (F). Creature (E).*
كل كائن حي يدمى خلقياً . وبالخلق الحية تقسم إلى ملكتين مملكة الحيوان وملكة النبات || مملكة النبات تقسم إلى نحو ٢٥٠ مليون نوعاً تنتمي إلى مئات الفصائل والرتب والصنوف || أما الملكة التفرعية فختلف أنواع الحيوان المعروفة فهو نحو مليون ونمائية عشر ألفاً كما هو مبين في الجدول التالي .

العدد التقريبي لخصف أنواع الحيوان المعروفة
Nombre approximatif d'espèces animales connues

صنف	عدد الأنواع	Sub-Class	Class
لآليات	٩٠٠٠٠		Verabré
مفصليات	شجرات	٧٥٠٠٠	Insectae
	مفصليات	٣٠٠٠٠	Arachnides
	قنريات	٢٥٠٠٠	Crustacées
	دعادات	٨٠٠٠	Myriapodes
رغويات	١٠٠٠٠٠		Mollusques
حلقيات	٨٠٠٠		Annelides
حولات علية	٤٠٠٠		Bryozoaires
شوكيات	٥٧٠٠		Echinodermes
سلكات	١٠٠٠٠		Némertes (vers ronds)
مفصليات	١٤٥٠٠		Vers plats
مفصليات	١٠٠٠٠		Coelentérés
إسطنجات	٤٣٠٠		Spongiaires
أوركيات	٣٠٠٠٠		Protozoaires
دورات	١٥٠٠		Rocifères
مختلف	٢٠٠٠		Divers
	١٠٨٠٠٠		

٢٥٩٧٨ - **مِغْطَاف** *Zymosimètre, Zymoscope (F).*
Zymosimeter (E).

المجهر جهاز تقاس بواسطة درجة اختار السوائل .

٢٥٩٧٩ - **مُتَحَسِّن** ، **مُتَحَسِّن** *الأضلاع* *Pentagone (F). Pentagon (E).*
من الأشكال الخماسية وبغيرها ما هو مركب من خمس زوايا أو خمس أضلاع .

٢٥٩٨٠ - **مُتَحَسِّن** *Pentagonal*
ما كان شكله شكل الخمس .

٢٥٩٨١ - **مُتَحَلِّية** *Tagetas (S). Tagète (F).*
Marigold (E). Sambtume, Studentenblume (D).
Tagete, Puzzoloni (I).
جنس نباتات من الشرويات وفصيلة المركبات . أنواعها عديدة معظمها بري . أوراقها لا تقياسية الشكل والأزهار . أزهارها صفراء اللون أو برتقالية . بتلاتها حلقة اللبس يفرج منها عند اللبس رائحة مسهجة || أشهر أنواعها البرتقالية ما غلي .

٢٥٩٨٢ - **مُتَحَلِّية جَيْلَة** ، **قَرْتَنُفَل** *Tagetas patulus (S). Tagète couffue, Cillet d'Inde, Veloutine, Passo-velours (F).*
نوع من الحمضية البرتقالية المشهورة . غروها عذبة

٢٥٩٧٧ - **مُتَحَلِّية** *Griffe (Hort.) (F). Root (E).*
كلمة تطلق على جلور وخصوص وبجانبها بعض النباتات لقرب شجها بالغلب .

٢٥٩٧٨ - **مُتَحَلِّية التَّحْن** *Pterospora (S).*
Pterospora (F). Dragon-root (E). Drachenroot-baur (D). Pterospora (I).
حشية طفيلية ممرية في فصيلة الخنجيات . أصلها البلاد الباردة . تتميز بأزهارها المتعدية التجميع الطريقة الشكل .

٢٥٩٧٩ - **مُتَحَلِّية المُكَلَب** *Astragale (F).*
هو الأسطوخودوس ، من نباتات الفصيلة القرنية ، أطباها .

٢٥٩٧٠ - **مُتَحَلِّيات** *Crassulaceae (S).*
Crassulacées (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . أجناسها وأنواعها زهاء ٢٠٠ معظمها نبات عشبي وبعضها جني . أوراقها متعينة لحية صلبة . أزهارها ، في الغالب ، عشوية وهي بسيطة أو هامة الأرتكاز ، جيلة الشكل ، زاحية الألوان . نباتاتها وغية تعيش في جميع الأتربة وقد تغفل القليلة الحبس .

٢٥٩٧١ - **مُتَحَلِّية** ، **دَم العاشق** ، **زَرَّ حَبْنِي** *Gomphrena (S). Gomphréne, Amarantoide (F). Globe amarant (E). Gemeiner Kugelamarant (D). Amaranto, Amarantoide (I).*
جنس نباتات عشبية مزينة من فصيلة القطيفيات . أنواعها للمرة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها ترابي . أوراقها لاطئة متعينة . أزهارها نورية التجميع ، بسيطة الأرتكاز أو طرية || أشهر أنواعها البرتقالية ما غلي .

٢٥٩٧٢ - **مُتَحَلِّية بَرْتَقَالِيَة** *Gomphrena haageana, G. aurantiaca (S). Gomphréne orange, Amarantoide de Haage (F).*
عشبة حولية جادسة فرعاء تملو نحو ٤٠ سم . أوراقها بيضية النصل . أزهارها برتقالية اللون ، نوريها ثلاثية الأضلاع الكبيرة القد || أزهارها يستمر طول الصيف .

٢٥٩٧٣ - **مُتَحَلِّية كَرَوِيَة** *Gomphrena globosa (S). Gomphréne globe, Amarantoide globe, Immortelle violette (F).*
وقس (عاشق ويمشوق) عشبة حولية فرعاء مشونة تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم . أوراقها سنانية النصل . أزهارها بتفسيمة اللون ، نوريها ثلاثية الأضلاع || أزهارها يستمر طول الصيف .

٢٥٩٧٤ - **مُتَحَلِّية لَطِيَة** *Gomphrena pulchella (S). Gomphréne graciosa, Amarantoide gracieuse (F).*
عشبة حولية سبروتية فرعاء تملو نحو ٥٠ سم . أوراقها سنانية صيفية تقطو نحو ٥ سم . أزهارها ودية اللون ، نوريها ثلاثية أو خماسية الأضلاع ، قطرها يراوح من ٢ إلى ٣ سم . || أزهارها يستمر من الصيف إلى الخريف .

٢٥٩٧٥ - **مُتَحَلِّية** *Sorbus aria (S). Alouchier (F). Chequer tree, Maple service, Wild service tree (E). Wilder Elsebeerbaum (D). Bacarello, Mangiolo (I).*

نوع من الصلبة وهي شجرة برية فرعاء برصية الشكل تملو من ٣ إلى ١٥ م . أوراقها معتقة ، متعينة ، صابلة . نصلها يطول إلى ٦ إلى ١٤ م . ويعرض من ٤ إلى ٩ سم .



عذبة



عشاص



عشار



عشلية

٢٥٩٩٥ - **مُخَمِّلَةٌ** Culture de concombre (F).
زراعة الخيار وموضع هذه الزراعة .

٢٥٩٩٦ - **مُخَمِّلٌ** Babeurre, Lait écorché (F).
Whey, Buttermilk (E).
الحليب الباقى بعد فرز شدة ، ويؤخذ أيضاً بالمخفوف .

٢٥٩٩٧ - **مُخَمِّلُ الْمَاءِ *** Cayx
جنس طير من القريبات. أنواحه ثمانية موطنها البلاد الآسيوية.
تستعمل بمناظرها الكبيرة للقد الطويلة القاعدة الحمراء اللون.
اجتنبها طويلة . أذنابها وأرأسها قصيرة . قوائمها إلى
الصعبة البرتقالية . رؤوسها واجتنبها سود ملونها نمشة
بيضاء || تألف الشطوط البحرية ويجاري الماء . قوتها
الأسماك والقدريات والحشرات حل اختلاف فصائلها .
أنابها تلد في صدف الصغور تبقي من ٧ إلى ٩ بيضات
تحضنها نحو الأسبوعين .

٢٥٩٩٨ - **مُخَمِّلَةٌ** Sébaste (F). Sebesten (E).
ثمرة الخاطة أي اللدق . كانت ولا تزال تستعمل في الطب
لثلاثين الصدر . كما تستعمل في صناعة ديق الطير .

٢٥٩٩٩ - **مُخَمِّلَاتٌ** Cordiaceae (S).
Cordiscaeae (F).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وأنواعها كثيرة
المعد ، أصلها البلاد الحارة والاستوائية . أشهر اجناسها
الخاطة المعروفة بالبستان .

٢٦٠٠٠ - **مُخَمِّلَةٌ** Nimbus
هي السحابة ، نوع من الغيوم ، أظلمها .

٢٦٠٠١ - **مَدَّ**
المد ، مكيال لا يقيس الحجم يختلف من بلاد إلى بلاد
ومن منطقة إلى منطقة في ذات البلاد . ج أمداد ومدة
ومداد .

٢٦٠٠٢ - **مَدَّاعِيلٌ** Aboutissants (F).
Bordering upon (E).
هي قطع الأرض المجاورة للملك من جهة الطول .

٢٦٠٠٣ - **مَدَّادٌ** Piagiotrope (F).
نمت وصفي يطلق على كل نبات نوعه يجود أفضى
الانتساب .

٢٦٠٠٤ - **مَدَّادٌ *** Hemidactylus turcicus (S).
Hemidactylus verruculeux, Margouillat (F).
حيوان يربو من النطاء وفصيلة الزفقيات . جسمه صلب
القد يطول نحو ١٠ سم . رأسه بيض اللون . عيانه
مستحان . اجفانه شفافة ثابتة . أذناه رافعتا الدماء
الصواني المكفوف . لسانه متعلق الطرف . ظهره مشط .
بطنه كثير الحراشف الصقة . ذنبه سريع الانقسام .
قوائم صلبة . أصابعه نصفية الخطاب مجزأة بلواظف
عززة تمكنها من السير على السقف || قوته إلى الصعبة
الخطية المرفوعة بالانمن والأفبر ، لكنه يفتن الخيط
المويبد فيه || يألف الموائع الكثيرة الحليمة والمساكن
الأرضية . يسرح في النهار وفي الليل . قوته اللباب والميرض
والنساك والديدان || يعتبر من الزحافات النافعة .

٢٦٠٠٥ - **مَدَّادٌ** Trapan (F). Running (E).
نمت تمرني يطلق على الجلود الأظفة الانتساب وعلى
السوق التي تفتش التربة .

فوارقها لك النبات ولون الانزاع . جميعها حولية تملو من
٢٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقها لا قياسية الارتكاز ، خلية
التصل . انزعارها طبقية التجميع ، تاجية . لوها إلى الصفرة
المشاعة التوشيح والمواج || تنورها يستمر من تموز
إلى ايلول .

٢٥٩٨٣ - **مُخَمِّلِيَّةٌ لَامِيَّة** Tagetes lucidus (S).
Tagète luisante (F).
عشبة سرىوتية معمرة ، طرغونية الرائحة والطعم ، تملو من
٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها كاملة متعاقبة . فصلها ساني
الشكل ، مسن الحافة ، لامع الصفة الشديدة الخضار .
ازهارها احادق متعاقبة كالمعقود . ازهارها لينة نارية
اللون || تنورها يستمر من آب إلى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٤ - **مُخَمِّلِيَّةٌ مَرْقُطَةٌ** Tagetes signatus (S). Tagète mouchée (F).
عشبة سرىوتية معمرة تملو من ٦٠ إلى ٧٠ سم . أوراقها
متعاقبة طرفية ومسننة . ازهارها حلقي التجميع . ازهارها
ذهبية اللون مرقطة بالجلوي || تنورها يستمر من تموز
إلى تشرين .

٢٥٩٨٥ - **مُخَمِّلِيَّةٌ مُتَشَكِّبَةٌ ، وَرْدَةُ الهِنْد** Tagetes erectus (S). Tagète dressée, Rose d'Inde (F).
عشبة سرىوتية حولية تملو من ٨٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقها
لا قياسية الارتكاز ، كثيرة التشرع القدسي المسن . ازهارها
طبقية التجميع ، كبيرة القد ، لوها إلى الصفار الكبير
اللامع || تنورها يستمر من تموز إلى تشرين الثاني .

٢٥٩٨٦ - **مَخَنٌ** مخن العود : قشره .

٢٥٩٨٧ - **مِخْنَاتٌ ٥** Androgyne (F).
Androgynous (E).
نمت تمرني يوسف به كل نبات يجبل الانزعار الذكرية
والأنثوية معاً كالجزء مثلاً .

٢٥٩٨٨ - **مَخْفِقٌ** Etouffoir (F). Extinguisher (E).

٢٥٩٨٩ - **مَخْمِيَّاتٌ ٥** Hyalostilbacées (F).
Hyalostilbacaceae (E).
عمارة فلور مجهرية من فصيلة الكميبيات . تتميز بأصنافها
المزائية للشفافة . اجناسها وأنواعها عديدة أهمها المؤذي سبأ
قليل . أشهر اجناسها المؤذية الإزارية والكحية .

٢٥٩٩٠ - **مَخْمِيٌّ ، مَخْمِيَّيٌّ** Sensorial (F).
Sensorial (E).
نمت تمرني يطلق على كل ما هو منسوب إلى المخيم .

٢٥٩٩١ - **مِخْيَابٌ** Hétérogame (F).
Heterogamous (E).
نمت تمرني يطلق على النباتات المزواجية التي تحمل زهوراً
ذكوراً وأنثاً في تزوير واحد . راجع ميزن .

٢٥٩٩٢ - **مَخْيَابٌ** Epidiascope

٢٥٩٩٣ - **مَخْمِيخٌ** Sensorium (F). Sensorium (E).
المخيم مركز الحواس في الدماغ أي أله المركز الذي يتلقى
الإحساس وينظمه .

٢٥٩٩٤ - **مَخْمِيخٌ ، مَدَّيْقٌ ، مَهْرٌ** Lait mouillé (F). Milk and water (E).
هو الحليب الميرب بالماء .



مُخَمِّلُ الْمَاءِ



مَدَّاد

٢٦٠١٧ - مَدَاهِين صُفْصَالِي الْوَرْقِ *

Helianthemum salicifolium (S). *Hélianthème à feuilles de saule* (F). Willow leaved rock-rose (E). *Sonnenröschen, Citrörschen* (D). *Elantemo* (I).
 مجلة صبروتية تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعها منفرجة مسترسلة. اوراقها مستطيفة الشكل. ازهارها حثكولية التجميع، محورية الاذنكاز، لونها الى الصفار اللبني الالامع تملو رشفة ارجوانية || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

٢٦٠١٨ - مَدَاوَاة (F). *Treatment* (E).
 هي المالجة ، اطبها .

٢٦٠١٩ - مَدَّسَب ، مَوْتَسَب (F).
Acuminé (F).
Acuminata (E).

لست تعريفى توصف به اعفاء النبات والحشرات التي تنبت على شكل الحمة وبذاتها .

٢٦٠٢٠ - مَدْبَعَاة ، مَدْبَعَاة (F).
Tannerie (F).
Tannery (E).

٢٦٠٢١ - مِدَاة (F). *Delay, Time* (E).

٢٦٠٢٢ - مَدَدَرَات (F).
Entélégyes (F).
Entelegyna (E).

فئة من المناكب تتميز بيمينها المركبة من ثمان زلأم وبالنسويات الشَّوَارِبَة المفرقة عند الذكور والافانثا .

٢٦٠٢٣ - مَدَّج ، مَدَّج ، مَدَّج (F).
Notacanth (F).
 جنس اسماك بحرية من فصيلة المدجيات. انواعه المروفة قليلة منتشرة في جميع بحار العالم . اجسامها مستطيلة الشكل مدنية، تطلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها مقبوضة، اعظامها منقبضة صغيرة . عينها مستديرة بارزة . زعانفها الظهرية مؤلفة من ٦ اشواك حادة . اذواها الى السمة الرصاصية يملوها مزاج اسفنج . لحونها مأكولة متوسطة الصنف .

٢٦٠٢٤ - مَدَّج مَدَّوْل ، مَدَّج مَدَّوْل (F).
Notacanthus vulgaris (S). *Notacanthus commun* (F).
 Common *Notacanthus* (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة المدجيات ورتبة شالكاكات الزواحف . اعظامها منظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ونها البحر الابيض المتوسط . تتميز من اسماك النفاث المتوسطة الغور الى جسمها سطوي الشكل ، مستطيل الذنب ، متعدل التلطيط ، يطول نحو ٤٠ سم. ثورها الى الحسلطة الرصاصية السفاه المزاج . ظهرها شاذية السمة . بطنها باحث الخضاب . رأسها شارف الجبهة . منقبض اعظم ، صغير الفم ، قصير الشفق العريض . اسنانيا صغيرة ، ذرية . عينها صغيرتان ، بارزتان . حذقة عينها سبوا لامة . زعنفتها الظهرية كثانة من ستة مناعس متتامة منطقة ، شاذكة . الصدرية تساعية الشمع السرة . الخوضية بطنية الاذنكاز ، سباعية الشمع . الفرعية مستطيلة ، غيضة ، تمتد حتى طرف الذيل ويتقدمها تسعة مناعس حادة الاطراف . ذيلها عادم الزعفة ، دقيق الطرف || لحنها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٦٠٢٥ - مَدَّجَجَاة (F).
Poulailler (F).
Hen-house, Hen-roost (E).

هي ذرية الدجاج المشيدة وفقاً لقواعد الفن والمغتصيات الصحية .

٢٦٠٠٦ - مَدَاوَاة (F).
 حفرة يرقي فيها البود الذي يحمل طاماً السك .

٢٦٠٠٧ - مَدَاوَاة ، فُلْك (F). *Orbite* (F). *Orbit* (E).
 طريق الكوكب السيار .

٢٦٠٠٨ - مَدَاوَاة ، وَتَبَاة (F). *Orbitale* (F). *Orbital* (E).
 المدارة خط سير اجرام المتحرك .

٢٦٠٠٩ - مَدَاوَاة ، فُلْكِيَّة ، وَتَبِي (F).
Orbital (F).
 لست تعريفى يطلق على كل ما له صلة بخط سير الاجرام المتحركة .

٢٦٠١٠ - مَدَاوَاة (F).
 كل سمكة تعيش بين الصخور لا تبعد عنها ثدى مَدَاوَاة .

٢٦٠١١ - مَدَام (F).
Vin
 هو الخمر والنبذ واين الحامه واين اللذ .

٢٦٠١٢ - مَدَاوَاة (F). *Oenologie* (F). *Oenology* (E).
 هي علم الخمر ، علم يبحث في صنع الخمر وسفطها .

٢٦٠١٣ - مَدَان (F).
Eau salée, Eau de mer (F).
Sea-water (E).

٢٦٠١٤ - مَدَان (F).
Plectranthus (S).
Plectranthus, Germaine (F). *Plectranthus, Chinese basil* (E). *Mahnspeorn* (D). *Plectrantho* (I).
 جنس نباتات جنتية ممرية عطرية من فصيلة الشفويات. انواعه زهاء ٤٠ معظمها بري وبعضها زرعى . سوقها فروعها تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. فروعها غيضة الانفرج زباه اللحاء . اوراقها كاملة متعابلة مستطيفة . نصلها قلبي الشكل ، منن الحافة ، خلي للبرشة حسل صفحتيه . ازهارها صغيرة القد زرقاء اللون حثكولية التجميع فواحة العرف المستعب الذي ينفر منه العث .

٢٦٠١٥ - مَدَاهِين ، زَهْرَة الشَّمْس (F).
Helianthemum (S). *Hélianthème* (F).

جنس نباتات مجلية ممرية من فصيلة الالذنيات . انواعه عديدة، معظمها بري منبت الجبال والخصاب وبعضها زرعى . يزرع بين الصفور . سوق فروعها . فروعه مستطيلة . اوراقها لا قياسية الاذنكاز والشكل . ازهاره صغيرة القد متعددة الالوان . وهو يرغب في المواع الجملة وفي الامراض الجنوبية الكثيرة الصبح || احرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٦٠١٦ - مَدَاهِين شَالَع (F).
Helianthemum vulgare (S). *Hélianthème commun* (F).
Herbe d'or (F). *Sun-rose, Common rock-rose* (E). *Echtes Sonnenröschen* (D). *Panaces, Chironia, Erbo d'oro* (I).

نوع من المدايين ، شروبه الزراعية عديدة، تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. فروعها مستطيلة . اوراقها متعابلة اذنية . نصلها بيضي الشكل يطول من ١٠ الى ٤٠ م. ويرمز من ٥ الى ١٥ م . ازهارها بسيطة او مكسية تعرض من ٢ الى ٤ سم . الوانها عديدة تختلف باختلاف الشروب منها الاصفر والابيض والوردي والاحمر || ازهارها يستمر من ايار الى آب .



مَدَان



مدايين شالاع



مدايين صفصالي الورق



متج مَدَوْل

تنقيش وتكوير عند الطلب . بعض اجناسها اُرد ولبعض الآخر جزئي التستين || اشهر اجناسها التاتو والتاتوزيه والعبار .

Ferme d'élevage (F).

٢٦٠٢٦ - مَدَنِيَّة ٥

Rearing farm (E).

هي المزرعة المخصصة لتربية الدواجن من أي جنس كانت . وفيها تشمل الارض ربا عليها من ابنية ومعدات .

٢٦٠٤٢ - مَدَنِيَّة ٥

Crocethia alba (S).

Cocorli des sables (F). Sanderling (E).

طائر من طوال الساق القواطع وفصيلة الزرقائيات . مشاه بعض شطوط البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر . مصيفه شطوط البحار الشمالية . قوته البذبان والقشريات والرخويات التي تلتفها الامواج || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم . ثوبه الصيفي الى السواد تملو رقطة صناعية يتخللها الابيض في الرأس والرداء والجناب والذنب و صدره الى الشقعة ، بطنه ابيض . متفاده وساقه الى السمرة السوداء . ثوبه الشتوي الى الوردية في الرأس والرداء والجناب والذنب وآل البياض التاسع في الصدر والبطن . الاثني تسمل بنفس الثوب || يذئن الفصوصه في الربال . الاثني تحضن وحدها من ٢ الى ٤ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٧ يوما .



مدنية

٢٦٠٤٣ - مَدَنِيَّة ٥

دوية تسج كالسكيرت (الكلسان) .

Tropisme (F). Tropism (E).

شذو عرشي في نحو بعض اعضاء الاجسام الحيوانية والنباتية تؤثر فيه وتوجهه بعض العوامل الخارجية كالنور والحرارة والصقيع والاختفاء .

٢٦٠٤٥ - مَدَنِيَّة ٥

Déversoir (F).

Overfall, Waste-Weir (E).

المندس المكان الذي يفيض منه الماء المعبور .

٢٦٠٤٦ - مَدَنِيَّة ٥

Henicopus pilosus (S). Hentcope poilu (F).

Henicopus pilosus (E).

حشرة واشمة قانصة من فصيلة المنخيات ورنية نعمذات الاجنسة . تألف البراري والحقول المزيرة . غناصها تعيش على رقيق الازهار وبتلانها . يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاغصان النخرة ساعة وراه اساريع الحشرات الخائبة لاقتناصها || جسمها صغير القد ، كثيف الزغب والحلب ، يطول من ٧ الى ٨ سم . لونها صفراوات بارزات . زيانها غيبطيان مستطيلان . ظهورها مستدير الطرف الاثني ، تحيل التحزيز القضي . ارسافها خاوية المقل || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تتجسح في التار . تسالده بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمكن ميساديا تحت لحاء الاشجار وبشورها ويحث الانفاص وفي الجملانة والعبل || البرقة عند بلورها الادراك التام تطول من ١٢ الى ١٤ م . جسمها شبيه اسطواني الشكل ، مستطيل الرأس ، اسمر اللون الكادمي ، سداسي الجوارب النحيلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في آخر سرداب دخلته البرقة .



مدريون



منشأة زبا

٢٦٠٤٧ - مَدَنِيَّة ٥

Requérant, Demandeur (F). Plaintiff, Pétitioner (E).

٢٦٠٤٨ - مَدَنِيَّة ٥

جوزة التاربيل المرفقة من لها يغترف بها .

Notacanthidae (S).

Notacanthidae (F). Notacanthidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكانت الزعانف . اجناسها المعروفة اربعة اشهرها المدج .

Pondol d'autruche (F).

Nest of ostrich (E).

افصوص تحفزه الفلوس اي النمامة الاثني في الربل . قطره نحو ١٠٠ سم . وعقه نحو ٣٠ سم . تضع فيه من ١٢ الى ١٨ بيضة تحضنها بتناوبة الظلم .

٢٦٠٢٩ - مَدَنِيَّة ٥

عملية زراعية قوامها حفر جلع الشجرة او ساق الشثيلة الغنية بقليل من التراب لحماية .

Fumivore (F).

Smoke-consuming (E).

نمت تعريفي يطلق على كل جهاز يتنص الدعان فيحرقه .

٢٦٠٣١ - مَدَنِيَّة ٥

Polypter (F). Polyp (E).

مجموعة من المذيع تعيش على قاعدة كلسية واحدة .

٢٦٠٣٢ - مَدَنِيَّة ٥

Provision (F).

Provision, Store (E).

المخسر هو الذخيرة ، اطلها .

٢٦٠٣٣ - مَدَنِيَّة ٥

Apport (F).

٢٦٠٣٤ - مَدَنِيَّة ٥

Lactigène (F).

Lactigenous (E).

كل ما ينشط اللز ويؤدي من قنص .

٢٦٠٣٥ - مَدَنِيَّة ٥

Tubérigène (F).

نمت تعريفي يطلق على الجين المدرة الشكل .

٢٦٠٣٦ - مَدَنِيَّة ٥

Glâbe, Mocte de boue (F). Giebe, Sod, Clod (E).

الكنتة من التراب المماسك .

٢٦٠٣٧ - مَدَنِيَّة ٥

Galéga (F).

هي المكنتة ، اطلها .

٢٦٠٣٨ - مَدَنِيَّة ٥

Processus (F). Process (E).

انظور التدرجي التنبق المتتابع .

٢٦٠٣٩ - مَدَنِيَّة ٥

Batteuse (F).

Threshing-machine (E).

آلة ميكانيكية تستعمل لدس الحنطة والشعير .

٢٦٠٤٠ - مَدَنِيَّة ٥

Armadille (F).

هو التاتو ، سيوان صلب الجلد المدرع ، اطلها .

٢٦٠٤١ - مَدَنِيَّة ٥

Dasypodidae (S).

Dasypodidae (F). Dasypodidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها ملهقة بدروع عظمية وفقرولية خزائية التركيب

Dopé (F). Doping (E). ٢٦٠٦٤ - **مَدْمُوش** *
من اجترع اللعنة ان كان انساناً او جرّع اللعنة ان كان حيواناً .

Cuverie, Cuvier (F). ٢٦٠٦٥ - **مَدْكَة**
السرداب او البناد الذي تحفظ فيه دنان الخمر .

Pommelé (F). Dappled (E). ٢٦٠٦٦ - **مَدْكُر**
شبه من شيات الخليل وهو ان يكون في شعر الفرس لكت ثقافات سائر لونه .

Oléomètre (F). ٢٦٠٦٧ - **مِدْهَكَان** * ، **مِدْهَات** *
Oleometer (E).
جهاز تقاس به كثافة الادمان والزيوت .

٢٦٠٦٨ - **مَدْهَوْب** *
Nécrosique, Nécretique (F). Necrotic (E).
المدهوب من النباتات ما كان مصاباً بالذهب أي النخر .

Orbiculaire (F). Orbicular (E). ٢٦٠٦٩ - **مِدْوَكَر**

Spatule rose (F). ٢٦٠٧٠ - **مِدْوَاس**
هو الملاحقي لآودي، طائر من طول الساق ، اظله .

Trochanter (F). ٢٦٠٧١ - **مَدَوْر** ، **مِدَوْر**
عضو يجمع الحرقلة الى اللعنة .

٢٦٠٧٢ - **مِدَوْر** *
Cyclomètre (F). Cyclometer (E).
جهاز يستعمل لقياس الدوائر .

٢٦٠٧٣ - **مَدْوَس** * ، **مَدَوْر** ، **فَرْج البَحْر**
Medusa (S). Méduse (F). Medusa, Jelly-fish (E).
الواحدة ملوسة وملوسة . جنس حيوانات خلاصية بحرية . انواعها واشكاله عديدة تغلب فيها الاستدارة . الزواجا تراوح من الاصفر الباهت الى الازرق الساجوني . وهي نفسي في الليل وتبدو في بعض الظروف والحالات شغافة كالزنباج . واذا ذهرت من شيء قلقت برشاش نالط يلاخ كشرار النار . اشهر انواعها قنديل البحر ورلة البحر .

٢٦٠٧٤ - **مَدْوَسِيَّات** *
Méduses (F). Medusae (E).
حيوانات خلاصية بحرية صغيرة القند لتلبي الى عدة فصائل واحتملها ملوسة .

٢٦٠٧٥ - **مَدْوَكَة** *
Madoqua (F).
جنس ظباء افريقية متوسطة القند ، ريمة الجسم ، جميلة الشكل ، متخيلة القرب ، مستطيلة الاذن ، قصيرة الذنب . انثاها جهار . قرون ذكورها صغيرة القند ، مبطلة القرواح المتنامية الجسدية ، مائلة الاطراف المستديرة المنحنية . انثاها المعروفة ستة . اصحابها شامسة الاطراف متحد من تمام البحر الاخر الى السودان والحيفة والصيدا وركيبا .

٢٦٠٧٦ - **مَدْوَلَة** *
Médulla (F). Medulla, Pith (E).
اسم يطلق على كامل الملاك النباتي ، الداخلي والخارجي .

٢٦٠٧٧ - **مَدْوَلَم** ، **دَوَلَمِي** *
Dolomitique (F). Dolomitic (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان تركيبه الدولوم .

٢٦٠٤٩ - **مُدْعِي**
Plaignant (F). Plaintiff, Complainant (E).
هو من رفع تلامته او دعواه أمام المحكمة .

٢٦٠٥٠ - **مُدْعَى عَلَيْهِ**
Défendeur (F). Defendant (E).
هو الذي ترفع عليه الدعوى .

٢٦٠٥١ - **مُدْعَمَات**
Conjugues (F). Conjuga (E).
فصيلة نباتية من رتبة اخفيات الخضر . اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها من نباتات المياه العذبة ، تتميز بأشكالها الخيطية الماددة الفروع .

٢٦٠٥٢ - **مُدْعَشِي** *
Alléomorphe (F).
نمت تعريفي يطلق على الصفات المتباينة المتناقضة المخططة .

٢٦٠٥٣ - **مُدَقَّق** *
Amont (F). Up-stream, Up-river (E).
المُدَقَّق او حالية النهر هي الجهة التي تصدر عنها المياه الجارية . يقابلها المُنَسِّب .

٢٦٠٥٤ - **مِدْقَنَة**
Enfouisseur (F). Burier (E).
هي المطرقة ، أداة تضاعف الى المحراث فتدفعه للزبل في التلم ليظهر مقبب المحراث .

٢٦٠٥٥ - **مِدْقَال** *
Légende (F). Legend (E).
تفسير ما في رسم او خارطة من حروف وعلامات وتصاوير والوان الخ .

٢٦٠٥٦ - **مِدْقَة** *
Pistil
هي طرف المتاع اي عضو التأنث في الزهرة . وهي عند ادراكها تفرز مواد لزجة تمكن جنينات الطلع من الالتصاق للخصاب .

٢٦٠٥٧ - **مِدْقِي** *
Pistil6 (F). Pistillote (E).
صفة الاظهار السعيدة التي المجهزة بمقات اي اعضاء انتوية .

٢٦٠٥٨ - **مِدْقَال** ، **الْمَدْرِيس** *
Indice (F). Index (E).

٢٦٠٥٩ - **مَدْكَة**
Piscanie (F). Plantation of plane-trees (E).
غابة الدلب والارض الكثيرة الدلب .

٢٦٠٦٠ - **مِدْقَج**
Hérissan (F).
هو القنفذ ، الحلب

٢٦٠٦١ - **مِدْقَال**
Cordon du maçon, C. du charpentier (F). String, Strand (E).
المدماك هو خيط البناء والتجار . وقد شاع استعماله للدلالة على سائر الحجارة المبينة .

٢٦٠٦٢ - **مَدْكَة**
Râteau (F). Rake (E).
أداة تنهي بنحيفة ممتدة تتخلل اسنان من حديد قديم بها التربة أي تسوي .

٢٦٠٦٣ - **مَدْمَدِي** *
Fluvialite (F). Fluviale (E).
نمت تعريفي يطلق على كل حيوان يعيش في المياه العذبة . وعلى كل نبات يعيش فيها او ينبت على ضفافها ويربها .



مدقة



ملوس



مدركة

Dichogamie (F).

Dichogamy (E).

تفاوت زمن الإزهار التناسلي الذي يحصل بين الأعضاء الذكورية والانثوية في تنور بعض النباتات.

Coursier très rapide (F).

٢٦٠٨٩ - مدّاق

الفرس السريعة جدا .

٢٦٠٩٠ - مدّال * ، عتوق مبدّل * .

Centetes ecaudatus (S). Tanrec commun (F).

Tanrec, Tanrec (E).

حيوان لين حاشي وحيد الجنس والنوع من فصيلة اللقيايات . موطنه جزيرة مدغشكر . يألف المناطق الجبلية حيث تكثر السراخس . سره دجوي . قوته اللبدان والحشرات وبعض جلود الثبات إلى جسمه شوك صمغوي يطول نحو ٤٠ سم . رأسه شبه غروبي الشكل ، مستطيل الخطم . فكك الأعلى يتقدم الأسفل . عيناه صغيرتان . أذناه مستعرضتان . ذنبه ماسح لا ربيد له . جرائزه صمغية . أصابعه قوية . أظفاره مخيطة ، حادة الأطراف . عليه لبد قصير تتخلله مسال ذرية الأطراف متباينة الطول والشحانة تكثف الرأس والعتق ويخرج الظهر حتى الكتل إلى بيئات الشوي يستمر نحو خمسة أشهر . جسمه نقي مستطيل يحضره في الثرية إلى الآنثى ثور تضع في كل رمص من ١٥ إلى ٢٥ جروا .




مدّيد

Centetidae (S).

٢٦٠٩١ - مدّاليات *

Centetidae (F). Centetidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشية . اجناسها وأنواعها قليلة العدد أعطتها جزيرة مدغشكر إلى اجسامها صغيرة ، مكردة ، متقبضة ، أخطامها مستطيلة جرائزها قصيرة . أظفارها قوية ، ذرية . بعضها كثيف الوبر الناعم ، قصير الذنب أو مستطيل والبعض الآخر ماسح الذنب أو عاده ، حليبي الوبر وتطو سلال متباينة الشحانة والعلل . اعرف اجناسها اللذال والميسل والميرقولي والميكروغال والسينغال .



مدّية

Gobe-mouches (F).

٢٦٠٩٢ - مدّيكاب *

هو أكاك الذباب ، اطليه .

Muscipidae (S).

٢٦٠٩٣ - مدّيكابيات *

Muscipidae (F). Muscipidae (E).

فصيلة طير من الجوامئ السليات المتأثير . أنواعها نحو ٣٧٥ جميعها من العصائير الصغيرة لبد . أخطامها تشتمل مختلف مناطق السلال القديم . تألف النباتات والحداق والجائز . قوتها الحشرات اغصها الذباب .



مدّال

Autel, Vesta (F). Ara (E).

٢٦٠٩٤ - مدّيح مريخ *

المذبح المربع كوكبة نجوم جنوبية المذبح مركزها تحت ذنب العقرب إلى عدد نجمها ثمانية منها ثلاثة من المرتبة الثالثة .

Terre nue (F). Naked land (E).

٢٦٠٩٥ - مدّحالة *

الأرض البور لا شجر فيها .

Gécor (F).

٢٦٠٩٦ - مدّور *

To spoil, To damage (E).

مذرت البضة : فسدت فهي مذرة . والجوزة كذلك .

Polype (F). Polyp (E).

٢٦٠٧٨ - مدّيع *
جنس حيوانات بحرية من المحفلات . أنولسه عديدة . أشكالها الكائبات . أفرانها كلسي المادة سريع التحجير تموش عليه وفي داخله .

Barbotage (F). Mess, Mash (E).

٢٦٠٧٩ - مدّيد *
شراب مرطب للعداين يرتكز على اللينق وبعض النخالة .

Cynanchum (S).

Cynanche, Cynanque (F). Scamony plant (E). Roter Hundswürger (D). Scamones (I).

٢٦٠٨٠ - مدّيد *
جنس نباتات مداة من فصيلة الصقلابيات . أنولسه عديدة منتشرة في جميع أصقاع العالم . معظمها بري وبعضها تربي . سوقها مداة حلقة يستخرج منها عصارة لبنة طرية . أرواقها مدقة متعاقبة مزراية النصل . أزهارها خلسية الزكيب ، صبوالية التجميع ، محورية الإزكاز . اعرف أنواعها وأشهرها المدية العطر .

Cynanchum indicum (S).

٢٦٠٨١ - مدّيد عطر *

Cynanque odorant (F).

جنية صمغية متسلقة تطول نحو ٣٠٠ سم . ساقها وبروصها عطرية للواء الحولية . أرواقها مستطيلة الاثناق . نصلها خلي الصنفية يطول نحو ١٤ سم . ويبرص نحو ٨ . أزهارها جرسية الشكل ، صفراء اللون ، عطرية الرائحة الشبيهة بالياسمين إلى أزهارها يستمر من أواسط تموز إلى أواسط آب .

٢٦٠٨٢ - مدّيكه *

Turbo (S). Turbo, Sabot (F). Turbo, Turban-shell (E).

٢٦٠٨٢ - مدّيكه *
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الأرجل وفصيلة المدنيحات . أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطتها بحار البلاد الحارة إلى أصدافها كبيرة القد ، متساكة ، محززة الاعقاب ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، فنيمة اللوئات شبه المستديرة إلى لوحها مأكولة وأصدافها صناعية .

Turbinidae (S).

٢٦٠٨٣ - مدّيكيات *

Turbinidae (F). Turbinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الأرجل أمانيات الجهاش . اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والاستوائية إلى أصدافها حلزونية متساكة لؤلؤية الصفحات الداخلية بعضها يشبه المدية والبعض الآخر يشبه المداس إلى اعرف اجناسها وأشهرها المدية والدرعية والنبهية .

Débiteur (F). Debtor (E).

٢٦٠٨٤ - مدّين *
هو في التمول من يجب عليه تنفيذ الالتزام وفي التخصيص من كان عليه الدين .

Débit (F).

٢٦٠٨٥ - مدّين * ، مدّين * ، مدّين *

Debit (E).

هو ما على المرء من حساب ودين أو ما هو مطلوب منه .

٢٦٠٨٦ - مدّاخير *

Intestin (F). Bowel, Gut (E).

Intestine, Bowel, Gut (E).

في الامعاء . يقال ملأت المعدة مداخيرا .

٢٦٠٨٧ - مدّاع *

Porc-épic à queue blanche (F).

هو الشحم الأبيض الذب ، اطليه .

الى الصفرة يطولها تجذع مترص لا قياسي الشكل اسود اللون. وروشاها الخلفيان مذنبان ويبتجان بالاحر والاطلس. تظهر في اوائل الربيع ، تمتع مكها على اوراق اللوز والدرناق والحوخ والكرز فينفق من يرقات غاصلة تلثم بعض اجزاء الاوراق .

٢٦١٠٧ - مَذْنَاب مَكُون * ، مَكُون *

Papilio machaon (S). Machaon, Grand porte-queue (F).

فراشة كبيرة القد من عارة المذانيات . جسمها اسود اللون . بسطها لا تقل من ٧٥ م . ورواشها الى الصفرة يطولها تجذع وتنبج وتسقيج متراكبة الاوان يكمر فيها الاسود والاطلس والاحمر . وروشاها الخلفيان مذنبان . تظهر في اوائل الربيع . تمتع مكها على اوراق الجزر والشيار فينفق من يرقات تمش على الاوراق فتلتهمها .

٢٦١٠٨ - مَذْنَابِيَّات *

Papilionine عارة حشرات من فصيلة الفراشيات ورثية حشرليات الاجنحة صرغيات اللون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . منتشرة في جميع بلاد العالم . فراشاها متوسطة القد وكيرة . اوانها متباينة الالوان الغامقة . اشهر اجناسها المذنب والمذئاب والميضام .

٢٦١٠٩ - مَذْنَب *

Comète (F). Comet (E). كوكب طالع منتقل تلبه محابة مغشية . حركة دورانه حول الشمس مستقيمة المدار || عدد المذنبات المعروفة حتى الآن يتنازع ١٥٠٠ اشهرها « مذنب هالي » الذي يظهر كل ٧٦ سنة وقد ظهر عام ١٩١٠ ويظهر ايضا عام ١٩٨٦ .

٢٦١١٠ - مَذْنَب *

Urodèle (F). Urodele (E). نعت تعريفي يطلق ، في علم الحيوان ، على كل دوية او يرقة او اسروع مجعزة بذنب او بزايدة تشبه الذنب .

٢٦١١١ - مَذْنَبِيَّ *

Sperme (F). Sperm (E). هو مني الحيوان عامة ، راجع في .

٢٦١١٢ - مَذْنَابِيَّاب ، حَال *

Solvant (F). Solvent (E). مذيب

٢٦١١٤ - مَذْنَبِيَّ ، مَصْفِيَّ ، مَهْو *

Lait mouillé (F). Whey (E). اللبني والخير والمهز ، مزيج من اللبن والماء .

٢٦١١٥ - مَر * ، شَوَكَة *

Croc, Trident (F). Hook, Trident (E). اداة تستعمل في الزراعة لقبب التراب .

٢٦١١٦ - مَر *

Amer (F). Bitter (E). نعت يطلق على ما كان طعمه ضد الحلو .

٢٦١١٧ - مَر *

Myrrhe (F). Myrrh (E). صمغ راتنجي يستخرج من سوقه شجر المر . قال الدكتور بديوي مفتاح في احياء المذكرة عن الانطاني ما حريفه : وهو السمري في المقالات وهو معروف يسيل من شجرة بالغرب فيجعد قطعاً الى حرة صافية ، ومنه ما يرصد على ساق الشجرة وقد جد كالحاجج وهذا هو المر المعروف بالبطارخ لانه يحساكي بعض السمك في دسوته وصفقره

٢٦١١٧ - مِذْرَاق * ، مِذْرَي *

Fourche (F). Fork, Pitchfork (E). اداة من خشب او حديد تلوى بها الحنطة ويرفع بها الكلا والزبل وغيرها .

٢٦١١٨ - مِذْرَق *

Semoir (F). هي المبدرة .

٢٦١١٩ - مِذْرَج *

المذرج من الخيل والبقر وصائر الدواجن من كانت امة اشهر سلالة او حرقا واجيد اصلا من ابيه .

٢٦١٢٠ - مَذْنَق ، مَذْنَر ، لَس *

Mouillage (F). Soaking, Wetting (E). هو المزج بالماء كخط اللبن بالماء فهو مذيقي وغير .

٢٦١٢١ - مَذْنَقَرَة *

Polyphyllie (F). Franching (E). علة جسمية قليلة الاذن شاملة في جميع بلاد العالم تسمى الصمغ تشبه اوراقه وتفتش على صفه || مظهرها الخارجي اصفرار في الاوراق يبدأ من حافة النصل وينتشر تدريجاً نحو الداخل الى ان يتلحم الصمغ فينبو الورقة صفراء النسيج ، غضراء الصمغ والعروق ، رافعة الوثني الثنين || وفي حال اشتداد الحرارة فانها تسبب وباط الشتلة وتراكب الاوراق التي تسبب ملمعة ، مستطيلة النصل الضيقة ، متصبية الأطراف ، ملتوية الرؤوس || اسبابها الرئيسية عديدة ومتباينة اعصها قلبية التربة وقرب رطوبتها وضمت بحرلها الازوتي وقلة مواردها الضوئية وصعوبها الجرجسي || يقول العالم « ستينبرج » ان الملقرة علة ينجها خذيان خاص يفرزه نقطور تري يضي بافليس مبروس . وان هذا اللبنيان الذي يجب اختلال الايض الازوتي في النبات ينشط تكورن الحولمض الامينية اللبالية التي تحدث هذه الشوائب او تفرد اليها .

٢٦١٢٢ - مَذْنَق ، مَذْنَق *

Adulte (F). Adult (E). من دخل في الدور التالي من حياته وهو الدور القام بين الفترة والشينوخة .

٢٦١٢٣ - مَذْنَقَرَة *

Mémoire (F). Memorandum, Bill (E). حريضة تفصيلية تسرد وقائع القضية واسبابها وما آلت اليه .

٢٦١٢٤ - مَذْنَق *

Travail (F). Trava (E). آلة تربط بها الحيوانات الكبيرة لتدل فتسهل مداواتها .

٢٦١٢٥ - مِذْنَاب الحَبِيَّات *

Papilio alexanor (S).

فراشة متوسطة القد من عارة المذانيات . جسمها اصفر اللون يطولها خط مستعرض قاطب اسود . بسطها نحو ٦٥ م . ورواشها الى الصفرة يطولها تجذع اسود اللون مختلف الاشكال والاحجام . وروشاها الخلفيان مذنبان ويبتجان بالاحر || تظهر في اواخر الربيع ، تمتع مكها على معظم نباتات الفصيلة الصبوانية فينفق من يرقات غاصلة تمش على الاوراق فتلتهمها .

٢٦١٢٦ - مِذْنَاب اللُّوز *

Papilio podalirius, P. sinon (S). Flambé (F). فراشة متوسطة القد من عارة المذانيات ، جسمها حنفي اللون يطولها خط قاطب اسود ينقطع عند مؤخر الظهر ثم يعود فيطو البطن الى الترج . بسطها نحو ٦٥ م . ورواشها



مذرة



مذنب الحبيبات



مذنب اللوز



مذنب مقون



مَر

وسهوكه وليس بالريء. ومنه ما يحصر فيسيل ماء ثم يجمد مائلًا إلى السواد ويصير المية السائلة ويسعى المر الحظي وهو دين الثاني || وهو ركن عظيم في المرام والاكسال على اختلاف أنواعها. وهو ينفع سائر التآكلات والصداع...

يكتسل به فيحل المدة وغلظ الجفن، ويزيل الورم بلين التواء. والقرحة بماء الورد والحلبة. ويصل سائر القروح إذا نثر فيها وقتها فسلت قبله بماء لسان الحلي. ويشد اللثة ويزيل فرسوسها ووجعها الانسان بالتمر والزيت مضغمة. والصال وجع الظهر. وشربة القصبه استحلًا في اللث. ووجع الكبد والكل، والمثانة والبنيدان شربًا خصوصًا مع الترس والافستين. وامراض الارسام خصوصًا الصلبة والكتن حتى يحال له ولو بماء الاس. ويصلح الفتق اذا تموي عليه ويحل حرق التواء والمفاصل والتهرس مطلقًا. ويزيل ثن الايط بالثب وصف الشعر. وانتاره بالتمر والالادن ودهن الاس، والقوان بالصل، والتآكل والاثار كلها. دسائه ينبت شعر الاجفان وينرم نفسه شامًا ويحفظ المرق طلاء ومع دهن اللوز المر ينفع في امراض الاذن، ومع التسع امراض الانف، وهو يفسر المثانة ويسقط الاجنة ويصلحه السمل وشرته الى ثلاثة ويده فلفل او قسط او عجبناستر.

٢٦١١٨ - **مُر ***
Commiphora myrrha (S). Commiphora, Arbre à myrrhe (F). Myrrh tree, Myrrha (E). Myrrhenbaum (D). Albero del mirra (I). نوع من البسان من فصيلة البخوريات. شجيرة صغيرة القند شائكة، بغطر الصمغ من ساقها على شكل مدوع حراء اللون شاحبة مضيئة. اوراقها معتقة مركبة ثلاثية الوريقات. اغشائها ولحاءها عطرية الرائحة النفاذة. صمغها جيد الصنف شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١١٩ - **مُر افريقي**
Commiphora schimperi (S). Commiphore d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Echter Myrrhenbaum (D). Albero del mirra d'Africa (I). نوع أشجر من المر، اعطائه البلاد الافريقية يكثر في الجزائر ومراكش. شجيرة صغيرة القند شائكة. يشترج من سيقه صمغ رائحته المادة جيد الصنف صلب اللون، شائع الاستعمال الطبي.

٢٦١٢٠ - **مُر حبشي، مُر حبيكي**
Commiphora abyssinica (S). Commiphore d'Abyssinie (F). Coarsa myrrha (E). Afrikanischer Myrrhenbaum (D). Commifora (I).

نوع من المر، اعطائه الحبشة وسائر افريقية الشرقية وبجزيرة العرب. شجيرة صغيرة القند شائكة. ثمارها مجزعة الجوز كانت ولا تزال تستعمل في بعض المستحضرات الطبية. صمغ رائحته المادة جيد الصنف يأتي بعد المر الافريقي جودة.

٢٦١٢١ - **مُر اسع**
Métayer (F). Metayer (E). هو من استعمال الأرض بالزراعة، اغلب مزارع.

٢٦١٢٢ - **مُرَة مسلكة**
Andromède (F). Andromeda (E).

المرأة المسلسلة كوكبة نجوم بعضها قرب القطب الشمالي. عدد نجومها ٥٩ أشهرها ثور الرأس ولأسرة والقدم ورجل بالقرب من هذه الكوكبة سديم لوني اكتشف عام ١٦١٢ يبعد عن الارض نحو ٨٠٠٠٠٠ سنة ضوئية وقطره نحو ١٠٠٠٠٠ سنة ضوئية.

٢٦١٢٣ - **مُرَة**
Enflourage (F). طريقة صناعية لاستخراج العطر تتركز على مرث الازهار في الدهن او الشمع.

٢٦١٢٤ - **مُر ع**
Etable (F). Scabie (E). هو ماوى البقر والتمر والتمر وسائر الثوب، اي موضع واسنها في الليل.

٢٦١٢٥ - **مُر ك**
Centaurée étoilée (F). هو القنطريون النجسي، اطبه.

٢٦١٢٦ - **مُر ك**
Vésicule biliaire (F). Gall-bladder (E).

٢٦١٢٧ - **مُر ك**
Amertume (F). Acerbic (E). وصف ميكروبي يترى ا لمر فيفسلها بعد ان يسيب طمها اذ يجمله مر اللقاع.

٢٦١٢٨ - **مُر ك الحش *، قنطريون صغير، قصبة الحية، قنطريون**

Erythra centaurium (S). Erythrae centaurée, Petite centaurée, Herbe à la fièvre (F). Earch-gall, Centaury, Fever wort (E). Echtes Tausendgüldenkraut (D). Centaurea minore, Blondella, Caccie-febbre (I).

نوع من الار يتريا وهو نبات حشبي بري حولي طلي صغير القند. ساقه فراء مستدقة. اوراقه متعاقبة صغيرة. نصلها ضيق المسفة، حلي البشرة، اطلس اللون، شديد المرارة || يستعمل منه في الطب القمم الزهرية والاوراق. وهي مقوية للمعدة دافعة الحصىات. ويحضر منه متقوع هاضم يستعمل في حالات زيادة الحموضة وقرحة المعدة او المعوية ذلك لان هذا النبات يحوي بعض الاملاح القلوية بنسب كبيرة لها منافعها الطبية.

٢٦١٢٩ - **مُر ك الصحاري**
Chicotin (F). هي الخنظل، اطبه.

٢٦١٣٠ - **مُر اس**
Ophonus sebulicola (S). حشرة من فصيلة المربليات. طولها يراوح من ١٤ الى ١٧ مم. رأسها وكسولها الى التمرة السوداء. عندها الى القرية السطوح يملوها مراع اغصن || تكثر في الارثة الكلسية. تتركب ازهار نباتات الفصيلة الصبوانية وتلتهم البلور منذ تكوينها || يرقاتها خافتة قليلة الاذى.

٢٦١٣١ - **مُر اس**
Chiroseuthis (S). Chirotauthis (F). Chirotauthis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات واسيات الانجل وفصيلة المراسيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشية الشكل. زعانفها مستديرة طرفية الارتكاز. وروسها اسطوانية. عينها كبيرة صامخة. ثمانية من جراسمها طليقة معلقة متقاربة الطول واثنان شديدا الطول عادتا الحامض تنهبان برسي سنانية الشكل.

٢٦١٣٢ - **مُر اسيات**
Chiroseuthidae (S). Chirotauthidae (F). Chirotauthidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات واسيات الانجل، ثنائيات الخياشيم، عشاريات الجرامر. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي



مر



مرارة الحش



مراس



مراس

تنبية اللون صناعية. أوزانها طيبة وصلية || كانت قشور المران تستعمل استعمال الكينا قبل مرطبها وهي معرقة عاقضة للحرارة. أما الأوراق فتفيد الفوصة والقرص. احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٦١٤١ - **مرشش أبيض** * Fraxinus alba (S).
Frêne blanc, F. d'Amérique (F). American white ash (E). Amerikanische Weissesche (D).
شجرة سبروتية باسقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ م. مهدا امريكية الشايية. أوزانها تطوي نحو ٣٠ سم. وريقاتها تعد من ٧ الى ٩ ، تصلها سناني الصلصة بطول ١٥ سم. ويعرض ٥ سم. وهو اطلل اللون مدبب المقصبة مسنن الحافة. ازهارها حشوكي، طرفي وبحوري الايتكاز ، بطول نحو ١٠ سم. ازهارها بيضاء اللون.

٢٦١٤٢ - **مرشش أحمر** * Fraxinus pubescens (S).
Frêne rouge (F). American ash, Red ash (E). Amerikanische Rotesche (D). Frassino rosso americano (I).
شجرة سبروتية تملو من ١٢ الى ١٨ م. وريقاتها تعد من ٧ الى ٩ ، تصلها اخضر اللون بحرف في الخريف وهو سناني الشكل مدبب المقصبة ، مسنن الحافة بطول نحو ١٢ سم. صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها حشوكي، طرفي وبحوري الايتكاز، بطول نحو ١٥ سم. ازهارها فستقية اللون.

٢٦١٤٣ - **مرشش أسود** * Fraxinus nigra (S).
Frêne noir, F. à feuilles de sureau (F). American black ash (E). Amerikanische Schwarzesche (D). Frassino nero (I).
شجرة سبروتية جميلة الشكل، تملو من ١٠ الى ٢٠ م. غرايمها خضر نمشة بالاسود. وريقاتها تعد من ٩ الى ١١ ، تصلها بيضي الشكل، لاملي الانتشابه، حابق الخشاش. ازهارها حشوكي التجميع، كبير القد. ازهارها فستقية اللون.

٢٦١٤٤ - **مرشش ذروب الورق** * Fraxinus oxyphylla (S). Frêne oxyphylle (F).
شجرة متوسطة القد تملو من ١٠ الى ١٥ م. براعمها الى الشقة السفعاء المواج. وريقاتها تعد من ٧ الى ١٣ ، تصلها سناني الشكل ذروب الزام الاعير، صفحته السفلى خلية البشرة. ازهارها حشوكي التجميع طرفي الايتكاز. ازهارها بيض.

٢٦١٤٥ - **مرشش شامخ** * Fraxinus excelsior (S).
Frêne élevé (F).
اكبر انواع المران واشهرها واسرعها نموًا واعمرا، فحيرته سبروتية تملو من ٣٠ الى ٤٥ م. غرايمها اسطوانية، براعمها سيد. وريقاتها تعد من ٩ الى ١٥ ، تصلها سناني الشكل، مسنن الحافة. ازهارها حشوكي التجميع، طرفي الايتكاز وبحوري. ازهارها بيض يطويها مواج اخضر. يستخرج من سوطها بالخر لا بأس به سكري الحليم يحوى نحو ٧٠ ٪ من المنبت.

٢٦١٤٦ - **مرشش شائع** * **صتي** * Fraxinus ornus (S).
Frêne à fleurs, F. à manne, Orne commun (F). Manna-ash, Flowering-ash (E). Blumen Esche, Manna Esche (D).
شجرة سبروتية مبلولة تملو نحو ١٥ م. فروعها حر

والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه وشية الشكل او جرابية. زوائفها مستديرة طرفية. رؤوسها مستطيلة. عريضها كبيرة ماحكة. اجرامها لامتناهية الطول والشكل || احرف اجناسها واشهرها المرشش والمريش.

٢٦١٤٣ - **مرشش** * Spinax (S).
Spinax (F). Spinax (E).
جنس اسماك بحرية مفترسة من فصيلة المرششيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة ، شبه وشية الشكل. اعطائها ذلقة شاردة ، اسنانها مشطارية ، حادة تقطع كل شيء. جلودها مجعبة. زوائفها كبيرة. اللبالية لامتناهية الشطرين || اشهر انواعها واعرفها المرشش الاسود (S. niger) الذي يجوب البحر الابيض المتوسط.

٢٦١٤٤ - **مرششكة** * Mulch
مواد عضوية مختلفة انحصاها الورق والقصش تقلش على التربة لحفظ رطوبتها ولتبع تكاثر اعشائها الطوبية ولوقايتها من قسوة البرد.

٢٦١٤٥ - **مرششيات** * Spinacidae (S).
Spinacidae (F). Spinacidae (E).
فصيلة اسماك بحرية مفترسة من الاشلاق. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جميعها وشية الشكل ، متبانية القد والحجم. منها الصغير والوسط والكبير || اعطائها شرسة ماحكة ، لا تمر بسكة الا قسبتها الى شطرين.

٢٦١٤٦ - **مرششكة** * Plaidoirie, Plaidoyer (F).
Pleading, Speech for the defence (E).
المرافعة هي عرض وقائع الحقوى ومطالب المتقاضين شهيها امام المحكمة. وهي حق يغنوه القانون لكل متقاض.

٢٦١٤٧ - **مرشش** * المراق نجم ثير من كوكبة الدب الاكبر.

٢٦١٤٨ - **مرششكة** * Dosimétrie, Titrage (F).
Dosimetry, Titration (E).
فن قياس التركيز والاعلاط.

٢٦١٤٩ - **مرششكوي** * Kobus (S). Cobe, Kob (F).
جنس حيوانات لبونة من الفيلاء الكبيرة لقد. انولمه حسة اعطائها البلاد الافريقية. اجسامها منسجمة القوام طرفية الشكل تطول من ١٧٠ الى ٢١٠ سم. وتقلو من ١٤٠ الى ١٥٠ سم. اوزانها الى الخصى الاجهر المواج ومنها البلقا. للذكر منها قرنان كثيران لولبيان. أما الانثى فليها هي رباعية الاختلاف. اصغر قدما من الذكر || يالفت النسيب والناماي يصاري الماء. اجله يراوح من ١٥ الى ٢٥ نفرا.

٢٦١٥٠ - **مرشش** * **لسان المصفر** * Fraxinus (S). Frêne (F). Ash-tree (E). Esche (D). Frascio, Frassino (I).
جنس اشجار حرجية ويزينة من المرانيات وفصيلة الزيتونيات. انواعها عديدة منها الجنيات والشجيرات والاشجار الباسقة. اوزانها مركبة وريية متعاقبة عابطة. ازهارها حشوكي. ازهارها بيضاء اللون او فستقية. ثمارها جناحية. براعمها سود. لحاء سوطها واعضائها الى الربة السوداء. اخشابها



مرشش



مرامري



مران احمر



مران شامخ

٢٦١٥٥ - مرثياني (E). Epigé (F). Epigenous (E).
تنت تعريفني يطلق حل البزور التي ترتفع زيارتها عند
الانتاش فوق سطح التربة .

٢٦١٥٦ - مرثاة (E). Lais (F). Saddle (E).
المرثاة . ج مراب . هي الشجرة البالية عند قطع الغابة .



مران شائع

٢٦١٥٧ - مرثاج (E).
طائر من طير الماء قبيح الهيئة (الجاحش) .

٢٦١٥٨ - مرثاء (E).
المرثاء هو حبس المواشي . وفي الحديث أنه قيم مبريد
الشمس . وهو القضاء وراء البيوت يرتفع به . وهو الموضع
الصالح لتجفيف البتتر .

٢٦١٥٩ - مرثيس ، صيركة (E). Paddock (F).
Enclos pour caprine et ovine (F).
حظيرة الغنم والماعز .

٢٦١٦٠ - مرثع (E). Carré (F). Square (E).
شكل متعدي قائم الزوايا المتساوية الاضلاع .

٢٦١٦١ - مرثع الزوايا (F). Quadrangulaire (F).
Quadrangular (E).

٢٦١٦٢ - مرثع الزوايا والمثلث (F). Tétragone (F).
Tetragon (E).

٢٦١٦٣ - مرثع متعريف (F). Trapèze (F).
Trapezium (E).
مربع متوازي القاعدتين الكبرى والصغرى .

٢٦١٦٤ - مرثيكات (E). Confitures (F). Preserve (E).
المربيات هي الثمار المبطونة بالسكر .

٢٦١٦٥ - مرثة (E).
وبقلة تنفرض حل الأرض لها ورق مثل ورق الخنثباء
أو اعرض ولها نورة صغرى واربعة يضاء وتقطع مع اروعها
فتفصل ثم تترك بالخل والحلزون فيها حلقة سيرة (من ابي
حنيفة) ، ج مر وأمرار .

٢٦١٦٦ - مرثة (E). Heron goliath (F).
هو البشون الجبار ، الطليه .

٢٦١٦٧ - مرثاج (E). Lithophage (F).
هو الحمار ، الطليه .

٢٦١٦٨ - مرثوقي (E). Vivarium (F). Vivarium (E).
المرثوق قصص لانياس الطويل والعرض والارتفاع ، غالباً
مزيج أو مغلوب يشريط ضيق التناوب ، يشتمل تربية
النبويات والحشرات .

٢٦١٦٩ - مرثع (E). Fastigié (F). Fastigiata (E).
تنت تعريفني يطلق حل الفروع النهائية المرتفعة الاطراف
نحو الغلاء .

٢٦١٧٠ - مرثع جموي (E). Anticyclone (F).
Anticyclone (E).

٢٦١٧١ - مرثعة البيض (E). Superior ovary (F).
تنت تعريفني يطلق حل اثمار البليات المرتفعة البيض
من فئة الخصومات المتعالات .

اللحاء ، صغرى التمشيح . وريقاتها تد من ٥ الى ٩ ،
نصلها اعليلجي الشكل بطول نحو ٩ سم . ويغرس نحو ٥
تسنيته مستدير الاطراف . ازهارها حنكولي ، طري ،
لبد التجميع ، بطول نحو ١٥ سم . ازهارها يضاء اللون .
يستخرج من سوقها باخر من لا بأس به يحوى ٧٢ %
من الميت .

٢٦١٤٧ - مران صيني (S). Fraxinus chinensis (S).
Frêne de Chine, Orne de Chine (F).

شجرة سرورية تريينية مهددا الصين تملو من ١٢ الى
١٥ م . براعمها سود في الشتاء حمر في الربيع . وريقاتها
تد من ٥ الى ٧ ، نصلها اعليلجي الشكل بطول نحو ١٤
سم . ويغرس نحو ٦ سم . حروفه بارزة ، تسنيته متشاري .
ازهارها حنكولي طري بطول نحو ١٨ سم . ازهارها يضاء
اللون . حمارها جلوية .

٢٦١٤٨ - مران كثير الزهر (S). Fraxinus floribunda (S).
Frêne floribond, Orne florifère (F). Bitter-ash (E).

شجرة سرورية مهددا الهند تملو من ١٠ الى ١٢ م .
وريقاتها تد من ٧ الى ١٣ ، نصلها سناني الصنفه بطول
نحو ١٥ سم . ويغرس نحو ٥ وهو مائل البشرة ، دقيق
التسنيته الحاد . ازهارها حنكولي طري بطول نحو ٢٥ سم .
ازهارها يضاء اللون غبراء الملاج .

٢٦١٤٩ - مران معيني الورق (S). Fraxinus parvifolia (S).
Frêne rhomboidal, Orne de Bunge (F).

جنبة تريينية سرورية مهددا الصين تملو نحو ٢٠٠ سم .
وريقاتها تد من ٣ الى ٧ وهي معينية الشكل تطول نحو
٤ سم . وتغرس نحو ٢ ، نصلها سنن الحافة ، عتقا
مزفر اللحاء . مثالكها الزهرية طرفية الاوتكان تطول
من ٥ الى ٧ سم . ازهارها يضاء اللون .

٢٦١٥٠ - مران منشوريه (S). Fraxinus mandshurica (S).
Frêne de Mandchourie, F. du Japon, Tamo (F). Japanese ash, Tamo (E).
Japansche Esche, Tamo (D). Fraxino giapponese, Tamo (I).

شجرة شائعة تملو من ٢٥ الى ٣٠ م . مهددا منشوريا .
فروعها رباحية التطبيع . وريقاتها تد من ٧ الى ١١
نصلها شيق الصنفه ، مذهب المقصه ، مستطيل المتق،
يأخذ الحصار البحري . ازهارها حنكولي التجميع مستطيل
الشكل . ازهارها ييض ، خضر الملاج .

٢٦١٥١ - مرثاة (F). Frénale (F).
Ash-grove or plantation (E).
مفريس المران أو حربة المران .

٢٦١٥٢ - مرانجات (F). Fraxinées (F).
سبط من فصيلة الزيتونيات اشهر اجناسه المران .

٢٦١٥٣ - مرالين (F). Fraxéline, Fraxine (F).
فلوكوزيه يكثر بروجده في غاء المران . ويوجد ايضاً في
غاء القندل الهندي . يستخرج من اللحاء يده نفعها بالماء
ولطالها . يلبوره ايري الشكل ابيض اللون . طسه مر
حريف . يلبوب في الماء وفي الكحول .

٢٦١٥٤ - مرثب (F). المرثب : الارض الكثيرة النبات .



مران كبير الزهر

٢٦١٨٢ - **مرتقيشية *** Martynia (S). Martynie (F).
جنس نباتات عشبية من المرتقيات. أنواعها قليلة، جميعها
أمريكية المنبت منها البرية ومنها الزينة. أوراقها متدقة
لا قياسه الشكل والارتكاز. أزهارها جيلة القلب،
زاهية الألوان، لا نظامية التجميع والارتكاز. ثمارها جراه
مقرنة الأطراف. احرف أنواعها وأشهرها ما يلي.

٢٦١٨٣ - **مرتقيشية حويلية** Martynia annua,
M. diandra (S). Martynie annuelle (F).
عشبة حويلية زباه غدية لزجة تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم.
أوراقها متدقة متقابلة قلبية الشكل، نصلها خلي البشرة
خماسي التنسيت. أزهارها بيض القناة أرجوانية الأطراف.
ثمارها بيضية مالة قلتيه بزاوية متقادية الشكل قصيرة.
أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين.

٢٦١٨٤ - **مرتقيشية مخروطية** Martynia proboscidea (S). Martynie à trompe,
Bicorne trompe d'éléphant, Cornares, Ongles du
diable (F).
عشبة حويلية زباه لزجة تملو نحو ٩٠ سم. أوراقها متدقة
متقابلة قلبية الشكل، نصلها مستطيل الزناد خلي الصفحة
المتضعة المستعرضة التنسيت. أزهارها كبيرة القد، معوجة
القناة، غائرة الأطراف الحامسة التفريخ. قناتها إلى
البياض الاصفر المروج يطوئ تنسيت اغصن واجر، أطرافها
موجحة بالبنفسجي يملو مروج أرجواني، ثمارها غرطوية
الشكل تملو نحو ١٥ سم. || أزهارها يستمر من
حزيران إلى آب.

٢٦١٨٥ - **مرتقيشية صفراء الزهر** Martynia lutea (S). Martynie à fleurs jaunes, Bicorne
jaune (F).
عشبة حويلية زباه لزجة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها متقابلة،
متدقة، قلبية الشكل، مستديرة الطرف. نصلها خلي
البشرة مسن الحافة. أزهارها عتقودية التجميع مذهية اللون
يطوئها عند انقشاه مروج أحر || أزهارها يستمر طوال
شهر آب.

٢٦١٨٦ - **مرتقيشية عطرية** Martynia fragrans (S). Martynie odorante, Bicorne
odorante (F).
عشبة حويلية زباه لزجة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها
متدقة متقابلة ثلاثية القوس. نصلها خلي الصفحة
المقارنة التنسيت. أزهارها عطرية، بنفسجية اللون، أرجوانية
المشعة، منقالية التجميع. ثمارها تملو نحو ١٢ سم.
أزهارها يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٦١٨٧ - **مرتقيشية كلبية** Martynia craniolaria (S). Martynie craniolaire, Craniolaire
(F).
عشبة زراعية حويلية زباه غدية تملو من ٥٠ إلى ٦٠ سم.
أوراقها متدقة متقابلة كلية الشكل مسنلة الحافة. أزهارها
بيضاء اللون كبيرة القد تملو نحو ٨ سم. ثمارها كبيرة
كرويس المصافير، غرطوية الزاوية. جلودها حزائية
الشكل، مأكولة ورتب.

٢٦١٨٨ - **مرتوث، حوصي** Macératation (F).
Maceration (E).
نقع جسم صلب في الماء أو في سائل آخر ليئين أو لاذابة
بعض اجزائه الكيماوية.

٢٦١٧٢ - **مرتكتق، حخاديم** Dominé, Servant (F).
المرتق والمرتق به. هو الذي عليه حق ارتفاق لمعار آخر.

٢٦١٧٣ - **مرتكتقي** Dominane (F).
المعار المرتق أو المخدم هو الذي ينتفع من الارتفاق.

٢٦١٧٤ - **مرتلك، مرتلك، مرتد استنج** Litharge, Protoxyde de plomb cristallisé (F). Li-
tharge (E).
هو بروكسيد الرصاص المنصهر المتبلور البرتقالي اللون.

٢٦١٧٥ - **مرتكتب الجبعة، سجروم** Délinquant (F). Delinquent, Offender (E).
هو الذي يرتكب لملة يعتبرها القانون الجنائي جنحة
يعاقب عليها.

٢٦١٧٦ - **مرتقيشية *** Mertensia (S). Mertensie (F). Blue-bells (E). Lun-
genwurz (D). Mertensia (I).
جنس ليات من فصيلة الحمصيات معروف للتعريف باسم
الطيب مرتس (١٧٦٤-١٨٣١). أنواعه المعروفة ١٥،
جميعها عشبية معمرة. أصلها البلاد المعتدلة الحرارة.
أوراقها كاملة متقابلة. نصلها موجة بنده شفافة. أزهارها
عتقودية التجميع. توججات أزهارها انبوبية الشكل.
اشهر أنواعها الزينة ما يلي.

٢٦١٧٧ - **مرتقيشية قلبية** Mertensia ochioides (S). Mertensie vipérine (F).
عشبة من المرتقيات تملو نحو ٤٠ سم. ساقها وفروعها
مزقة اللحاء. أوراقها سنائية الشكل، نصلها خلي البشرة
حل مسطح. أزهارها كثيفة التجميع متوسطة القد لونها
إلى الزرقاء الباقية || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٦١٧٨ - **مرتقيشية سيبرية** Mertensia sibirica (S). Mertensie de Sibérie (F).
عشبة عشوية من المرتقيات تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها
وفروعها سرح. أوراقها قلبية الشكل متدقة، نصلها
ناعم السيج المتسج. أزهارها بنفسجية اللون متضعة.
أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

٢٦١٧٩ - **مرتقيشية حذكلية** Mertensia paniculata (S). Mertensie paniculée (F).
عشبة من المرتقيات تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. ساقها وفروعها
مهدة اللحاء. أوراقها سنائية التصل المستطيل الضيق.
توزعها حذكلي التجميع غلاف سائر. أنواع جلها ١٠
أزهارها إلى الزرقاء الكليكية. توججها خلي الصفحة، مسن
الحافة. أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٦١٨٠ - **مرتقيشية فيرجينية** Mertensia virginica (S). Mertensie de Virginie (F).
عشبة من المرتقيات تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها
وفروعها مريلة. أوراقها اهليلجية مقطوعة تملو من ١٠
إلى ١٥ سم. وتعرض من ٥ إلى ٨ سم. أزهارها كبيرة القد
متعالية، لونها إلى الزرقاء الجميلة. أزهارها يستمر من
أذار إلى حزيران.

٢٦١٨١ - **مرتقيشيات** Martyniaceae (S).
Martyniacées (F). Martyniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة القملات. أجناسها
وأنواعها قليلة العدد، أشهرها المرتقيشية.



مرتقيشية



مرتقيشية



مرآة



مرآة



مرآة



مرآة

Pageau, Pagel (F). **مرآة** ٢٦٢٠٠
هو القويدي، جلس معك من فصيلة الاسبوريات .

Zoanthaires (F). **مرآة زهرية** ٢٦٢٠١
Zoantharia (E).
رنية حيوانات بحرية عديدة الفصائل والاجناس . جميعها
جسيمة الافراز كالمرآة، ملاتها فسيحة الارباع تتكون
منها الشعاب والمستمرات والجزر .

Corallaires (F). **مرآة نباتات** ٢٦٢٠٢
شعبة حيوانات بحرية من صف المحرقات .

Barberidopsis corallina (S). **مرآة نباتية** ٢٦٢٠٣
Barbérídispe coral (F).
جنبة زرقانية مصرية من فصيلة النشويات . ملاتها سرمية
الفروع متسلقة تلمو من مترين الى ثلاثة أمتار . اورلها
ايضة، متعاقبة، معتقة، قلبية الشكل . نصلها جامد
الصفحة الالامية ملطب التستين الشالك . ازهارها حنقودي
التجميع ، طرفي الازتكاز . ازهارها تساعية البتلات والفصل،
سباعية الاسدية ، مرآة اللون ، كروية الشكل ،
متدلية || تنورها يستمر طول فصل الصيف .

Coralline (F). **مرآة نباتية** ٢٦٢٠٤
شعبة تدعى ثور الله ، اطلبه .

Chaudière, Cuiseur, **مرآة** ٢٦٢٠٥
Ebullanteur (F). Copper, Boiler (E).
قد كبير من النحاس او الحديد يمل في الماء .

Fronde (F). Sling (E). **مرآة** ٢٦٢٠٦
هي الصفحة السفلى من نصل ورقة البرخس حيث توجد
الحفاق . وقد تستعمل بصيغة الجمع قتل عمل مجسوة
الصفحات السفلى من أوراق البرخس الواحة .

Praticulture (F). **مرآة** ٢٦٢٠٧
المربوطة علم يبيث في زراعة المروج والمراعي .

Praticole (F). **مرآة** ٢٦٢٠٨
نعت تعريفية يطلق على كل حشرة او طائر او حيوان
ملأه المروج .

Emergula (S). **مرآة** ٢٦٢٠٩
Emergula (F). Emergula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات ملديات الازبل
امانيات الخياشيم الحلقية وقصيلة الصديديات . انوعها
المعروفة نحو ١٠٠ منها ٤٥ منتشرة في بحار البلاد المعتدلة
الحارة . تعيش على الصخور قرب الشطوط || اصداؤها
شبه مخروطية الشكل ، مضطعة السطح المحززة القفأ ،
شبه بيضيه اللون ، قطرها من ١ الى ٣ سم . || اجسامها
الرؤوس ، كبيرة العين الجاحضة القائمة على قواعد اللواس
الانغرافية . لواسها قصيرة ، مخروطية . ارجلها وحيدة
مستعرة ، ملطقة بزوائد انبوية الشكل .

Emergula (F). Emergula (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات ملديات الازبل
امانيات الخياشيم الحلقية وقصيلة الصديديات . انوعها
المعروفة نحو ١٠٠ منها ٤٥ منتشرة في بحار البلاد المعتدلة
الحارة . تعيش على الصخور قرب الشطوط || اصداؤها
شبه مخروطية الشكل ، مضطعة السطح المحززة القفأ ،
شبه بيضيه اللون ، قطرها من ١ الى ٣ سم . || اجسامها
الرؤوس ، كبيرة العين الجاحضة القائمة على قواعد اللواس
الانغرافية . لواسها قصيرة ، مخروطية . ارجلها وحيدة
مستعرة ، ملطقة بزوائد انبوية الشكل .

Eplir (F). To ear (E). **مرآة** ٢٦٢١٠
مرح ائزود : شرح منبله .

Etager (F). Whacnoe (E). **مرآة** ٢٦١٨٩
رف مستقل لا يستند الى سائط ، ج مرآة .

Couvoir (F). **مرآة** ٢٦١٩٠
Incubator (E).
مشن في سلة او في صندوق وما اشبه ترشم فيه الدجاجة
الرفقاء حضنتها . وهو ايضا بناء تجمع فيه الخواضن والحضنات .

Naz (F). Nosa (E). **مرآة** ٢٦١٩١
المتر والمترم الانف وقد كثر اسناده الى الحيوان .
ج مرآة .

Faire paltre (F). **مرآة** ٢٦١٩٢
To graze, to feed, to tend (E).
مرج الدابة : ارسلها رعى في المروج .

Prairie (F). **مرآة** ٢٦١٩٣
Meadow, Grass-land (E).
ارض نسحة معشوبة ينبت فيها العشب طويلا او يبار
وتعرج فيه الماشية او يعيش ويحفظ . نباتاته مختلفة
وعديدة اشبهها من القطنيات والنجيليات . والمروج قد
يكون :

Prairie artificielle (F). **مرآة صناعية**
Artificial meadow (E).
ترتكر اعشابه على القطنيات كالبرسيم والقصبة والباقية...

Prairie naturelle, Pré (F). Meadow (E). **مرآة طبيعية**
وهو المرج اللدوف بالمرعى او المتجع .

Prairie temporaire (F). **مرآة زمنية**
Temporary meadow (E).
هو الذي لا يبقى اكثر من بضع سنوات وتكون اعشابه
من النجيليات والقطنيات .

Pré-verger (F). **مرآة** ٢٦١٩٤
Orchard-meadow (E).
مرج طبيعي غرس فيه شجر مشر كالاجاص والتفاح
لاستفادة من اللعب ولثمار مأك .

Pré-verger (F). **مرآة** ٢٦١٩٤
Orchard-meadow (E).
مرج طبيعي غرس فيه شجر مشر كالاجاص والتفاح
لاستفادة من اللعب ولثمار مأك .

Pré-verger (F). **مرآة** ٢٦١٩٤
Orchard-meadow (E).
مرج طبيعي غرس فيه شجر مشر كالاجاص والتفاح
لاستفادة من اللعب ولثمار مأك .

Piezographe (F). **مرآة** ٢٦١٩٥
Piezograph (E).
المرباج جهاز يستعمل في قياس القوى الامتزازية وضغطها .

Faneuse (F). Hay-making (E). **مرآة** ٢٦١٩٦
اداة تستعمل في تقليب الاعشاب المحشوة اجتنابا لسطها
وتسبيلها في جلفها .

Sonde (F). **مرآة** ٢٦١٩٧
هو السبار ، اطلبه .

Séismographe, Stomographe, Tromomètre (F). **مرآة** ٢٦١٩٨
Séismograph, Tromometer (E).
آلة تسجيل الهزات الارضية بما في ذلك مدة الزلازل وصفه .

Corail (F). Coral (E). **مرآة** ٢٦١٩٩
سبون بحري من المنخ المحرقات وهو من الحيوانات الركنية
التي تعيش راحة على صخور واعشاب القاع . افرازها جسي
عديد الالوان يكثر فيه الاحمر القويدي (المرآة)
من بايق وباهت . والاسود والابيض . أما الابيض
فنادر الوجود .

٢٦٢٢٣ - مرذ قوش، مرذ كوش، برذ قوش،
مرزنجوش، ريحان د آوود، سفسف
Majorana (S), Marjolaine (F).

لبات عشبي حطري بري وزراعي من فصيلة الشفويات .
انواعه عديدة . جميعها عشبية زباه اللحاء . اوراقها لا
نظامية . ازهارها سنبلية التجميع . يستخرج من اوراقها
واذهارها حطر صناعي شائع الاستعمال || اعرف انواعه
واشهرها ما يلي .

٢٦٢٢٤ - مرذ قوش بستاني *

Majorana hortensis, Origanum majorana (S). Mar-
jolaine des jardins, M. à coquille (F). Knotted mar-
joram, Sweet marjoram (E), Echter Majoran (D),
Maggiolana (I).

بجلة معمرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساقها فراء جوية .
فروعها مفترسة . اوراقها محففة كاملة اهليلجية ، لصلها
خلى البشرة حل سفحيتي . ازهارها بيضاء اللون و ودية .
وهو نبات طبي ينفع من الصلداق ويحسب الزكام كيثما
استعمل . طيبته يحل ارباع الصدر والرؤو والسعال وسبق
النفس . ويقال انه يفتت الحصى ويدبر البول . دعه
يلعب الرشة والفالج .

٢٦٢٢٥ - مرذ قوش وزري

Majorana onites, Origanum onites (S). Marjolaine
onites (F).

بجلة مبلولة طيبة معمرة تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فراء .
فروعها منبسطة . اوراقها لاطئة اهليلجية . لصلها مسنن
الخافقة ، خلى البشرة حل سفحيتي . ازهارها سنبلية التجميع
وردية اللون . مناقها الطيبة لا تختلف عن منافع المردقوش
البستاني .

٢٦٢٢٦ - مرذ كوش احمر ، قوبسة هيبجكة

Horminum (S). Hormin, Horminelle (F). Common
sage, Annual clary (E). Buntschopsalvei (D). Orm-
ino, Salvia ormino (I).

بجلة رية طيبة مبلولة معمرة من فصيلة الشفويات . تملو
من ١٥ الى ٣٠ سم . ساقها عادمة الفروع . اوراقها
غمضية ، سفلية ، تملو من ٣ الى ٦ سم . وتعرض من ٢
الى ٥ . ازهارها لورية التجميع ، ابيلة الارتكاز ، زرقاء
اللون || اوراقه واذهاره تنفع الانماء وتبيح الحظم .

٢٦٢٢٧ - مرذل ٥

Radula, Radule (F).

المردل نصل قرني للمادة تملو اسنان صغيرة متساوية
الترتيب المترس . وهو من اعضاء الجهاز اللبني عند
الرخويات باستثناء صليحات الخياشيم . اما وظيفته فسحق
الطعام .

٢٦٢٢٨ - مرذكة مُعَصِّبة *

Mordella fasciata (S). Mordelle bandée, Mordelle
à fascies (F). Mordella fasciata (E).

حشرة واشمة خاضعة دامتة من فصيلة المردليات وربة
منفصلات الاجنحة . تالف البراري التي تكثر فيها
الصيوليات . غنائها تمش على بتلات الازهار واوراق
النبات . يرقاتها تمش على المواد النباتية المنطحة والصلابة
نحو الاضلاع || جسمها صغير القذ يملو من ٥ الى ٧ سم .
نوبا الى السواد الباقي يملو في عهده زيبان من البقع
البهيش . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخلف . ميناه

Guitare (F).

٢٦٢١١ - مرشح

سكة بحرية تدعى غياط ، اطلمها .

Séral (F). Seral (E).

٢٦٢١٢ - مرشحكي

نعت ترميني يطلق ، في علم التنوخ اي في علم اثر
البيتة ، حل طور من اطوار المتتابع التبعي في النبات .

٢٦٢١٣ - مرشح

شجر سريع الوري يفتتح به ؛ الواحدة مرشة (اللسان).

Détendeur (F).

٢٦٢١٤ - ميرعاه

Pressure reducer (E).

جهاز يستعمل لتخفيف ضغط الغاز . ج . مرخ .

Microchirus (S).

٢٦٢١٥ - ميرخيرة *

Microchire (F).

جنس اسماك بحرية من رتبة المسلاوات وفصيلة جاننيات
الوم . ازواها المرولة قليلة . جميعها من اسماك البحر
الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || اجسامها
مسطحة مغلطحة شبة بسلك موسى . زعانفها الظهرية
قائمة تمتد من الخلف الى قاعدة الذيل . زعانفها الصدرية
والخلفية شديدة الصغر . زعانفها الشربية تقابل الظهرية .
اما الذيلية فتستدير الشكل || اشهر انواعها واعرفها :

٢٦٢١٦ - ميرخيرة صفراء

Microchirus luteus (S). Microchire jaune (F).

مولها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط . جسمها بطول
نحو ١٢ سم . نوبا الى الشبة الصفراء يملوها موج ذهبي ||
لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٢٦٢١٧ - ميرخيرة مرزوقة

Microchirus variegatus (S). Microchire panaché (F).

مولها يمتد من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي .
جسمها بطول نحو ١٥ سم . نوبا الى الشبة الصفراء
تملونها زونقة سوداء تمتد الى الزعانف || لحمها فاخر
الصنف ، مرغوب فيه .

Effeuiller (F).

٢٦٢١٨ - مرذ

To strip of leaves (E).

جرد التقصيب او الشجرة من الورق .

Intrêc (F).

٢٦٢١٩ - مرذ ، مرذكة

راجع فائدة .

٢٦٢٢٠ - مرذاه

Arbre dépourvu de feuilles, Terre dépourvue de
plantes (F).

المرداء : كشجرة لا ورق عليها . والارض الخالية من
النبات .

٢٦٢٢١ - مرذاس ، مرذس

Cylindre compresseur (F). Compressor cylinder (E).

Litharge (F).

٢٦٢٢٢ - مرذك سنج

هو المترك اي بر وكسيد الرصاص .



مرخيرة



مردقوش بستاني



مردقوش احمر



مرذكة مُعَصِّبة

۲۶۱۳۲ - مِرْدَلِيَّات Mouche des nardisses (F).

حشرة من الذباب مشهورة باسم سرفيد النرجس .

۲۶۱۳۳ - مِرْدَلِيَّات Vanne (F). Sluice, Water-gate (E).

۲۶۱۳۴ - مِرْدَلِيَّات Oviscaptes (F). Oviscapt (E).

جهاز متح السرة أو المكنز في بعض الحشرات، ويحيط أشرة، أطليا .

۲۶۱۳۵ - مِرْدَلِيَّات Pal Injecteur (F).

Injecting tube (E).

أداة تحقن بها التربة لأغراض شتى اغصانها لتطهير والتسديد للملحي للملاح .

۲۶۱۳۶ - مِرْدَلِيَّات * مِرْدَلِيَّات ، مِرْدَلِيَّات Hygromètre (F).

Hygrometer (E).

أداة تستعمل في معرفة الرطوبة الجوية أي كمية بخار الماء الموجودة في الجو بالنسبة إلى درجة الحرارة .

۲۶۱۳۷ - مِرْدَلِيَّات شمعي * مِرْدَلِيَّات شمعي Hygromètre à chevaux (F).

مِرْدَلِيَّات يرتكز على تمدد وانكماش الشعر النباتي يثار بالرطوبة

۲۶۱۳۸ - مِرْدَلِيَّات * Balance de précision (F).

هو ما يعينه ميزان الدقة لانه دقيق التركيب يتأثر بكسور اللبغرام .

۲۶۱۳۹ - مِرْدَلِيَّات Circus (S).

Busard (F). Buzzard (E).

جنس طير من حمارة المزيات وصيلة الصقريات. أنواعه عديدة منتشرة في معظم انحاء العالم . جميعها من الكواس التي تقتنص القوافض والجربان والصائير والظلاء والحشرات. اجسامها متوسطة الحجم، طولها يراوح من ٤٠ إلى ٦٠ سم. اجنتها وارجلها واذناتها طويلة . أوتها إلى البقعة المرقطة . تكمن في الاثجار الحرجية الباسقة أو على الحفيض وفي أوتاب الصخور . انثا تحضن من ٣ إلى ٤ فرائد مدة ٤ أسابيع || أشهر انولها الاربعة التالية .

۲۶۱۴٠ - مِرْدَلِيَّات البَطْلَاح * Circus strigiceps (S).

Busard blefard, B. des steppes (F). Pallid harrier (E).

طائر من المردة صغير الجثة، الجملد الثوب المرط بالاسر، اسد المنسر، احر البين والرجلين . وهو من القوافض يالث السحب والبطلان، قوته الزخات من مظاء وميات وديوات وبعض الحشرات .

۲۶۱٤١ - مِرْدَلِيَّات الدجاج * ، صكر الفيران Circus cyaneus (S). Busard Saint-Martin (F). Hen harrier (E).

طائر من المردة، متوسط القد طويل الجناحين والرجلين والذنب . ثوبه إلى البقعة المرقطة بالاسر، وهو اسد المنسر، اصفر البين والرجلين . يصيد القوافض والصائير والفسادع والظلاء والحشرات وراخ الدجاج . يدن وكه على الحفيض بين القصب والزار .

۲۶۱٤٢ - مِرْدَلِيَّات الصائغ * ، دُرَّاج Circus ceruginosus (S). Busard des marais, B. harpaye, B. des roseaux (F). Marsh harrier (E).

طائر من المردة، كبير الجثة طوله يراوح من ٥٥ إلى ٦٠ سم. ثوبه إلى الصبغة المرقطة . وهو من القوافض يالث

كيرتزان . زباناها عظيمان . ظهرانها لا يلفح كالطير . بطنها مستطيل السمكة الشرجية المذبية الطرف || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر نيسان ويمض حتى اواخر آب . تسرح في النهار . ثلثه في تموز || البرقة عند بلوغها الكمال الجسموي طول نحو ١٢ م . جسمها مبطل الشكل ، مستطيل المقدم ، سداسي الرؤاوب ، ضخم الرأس ، ضلع القفاير الذكبة، اطحل اللون ، يسد في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي تحت السماء مطلقا من كل غلاف .

۲۶۱٢٩ - مِرْدَلِيَّات * Mordellidae (S).

Mordellidae (F). Mordellidae (E).

فصيلة حشرات واسعة من رتبة غدييات الاجنحة || اجنتها وانولها المعروفة قليلة المدد مضطها من حشرات المناطق الحارة . خناتها تألت نباتات الفصيلة الحبية . يرقاتها دامتة تعيش على المواد النباتية السائلة نحو الانحال || جميع حشرات صغيرة القد قلما يتجاوز طولها ١٠ م . اجسامها لاقفاية الشكل . احماها لا تلتفح بطنها بالبقعة المستطيلة المذبة الاطراف الشرجية . لونهاا خيطية ، مستطيلة ، مركبة من ١١ فصلة . ارساخ جرانها الخلفية رباعية المقل اما ارساخ الجرام الوسطى والامامية فخاصة || اشهر اجنتها المردة والزملطوية والريشة .

۲۶۱۴٠ - مِرْدَلِيَّات ، مِرْدَلِيَّات Quenouille (F).

Distaff (E).

شكل من اشكال الهيكله المتينة في تشذيب بعض الاثجار الشجرة والثرينية || وللشكل المردني يكون اضيق قاعدة وجسما من الرشي واكثر ارتفاعا .

۲۶۱۴١ - مِرْدَلِيَّات البَرْلُوق * Odonestis pruni, Gastropacha pruni (S).

Odonestis du prunellier, Bombyx du prunellier (F).

Odonestis pruni (E).

حشرة من فصيلة الحفييات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى إلى اربوية . فراشتها صيفة تعيش على غزونها الاماني . سرحتها تعيش على اوراق البرقوق والزهرور والاجاص ... جسمها مستطيل مكرم طويل نحو ٢١ م . بطنها نحو ٤٤ م . رأسها حنطي اللون . مينها كيرتزان . زباناها مشطيان . مرشهاا جعدة . جوشها وبطنها إلى الحنطي الاكلت || ورشهاا الاماميان إلى الحنطي الاكلت مائة مائة حمراء وضعت ممرس اسمر ولقطة وسطى يضاء . ورشهاا الخلفيان إلى الحنطي الاثثع . اهدايا إلى الشقعة || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الغفراة في تموز . تسرح من الثروب إلى العجر في اليالي الممطرة . تماثل بعد ظهورها بنمو اربعة ايام وتضع المكن لطحا على ملأه الجلدول والاضان || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٤ م . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها إلى الحنطي الاسمر الماوي يطولها من الرأس إلى الشرج خط عريض من الملبب القصير تتخلله منه كل مفصل صيدي ضمة من الملبب المستطيل . منهاا وشرجها ودواجها كاسية . شرجها ينتهي بزاكمة صيرة لمثلية الشكل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي تحت القشور وبين السماء ضمن صلجة يثقلها غشاء كالنخامة اغبر اللون .



مردولة البرقوق



مرزاق



مرزان



مردة البطالاح



مردة الدجاج

٢٦٢٥٤ - **مرسوم** (F). Décret (F). Decree, Order (E).
هو كل قرار يصدره رئيس الجمهورية. وتختلف أسماء
المراسم باختلاف مؤسساتها فتكون جمهورية وسكوية
وعامة وتنظيمية وخاصة.

٢٦٢٥٥ - **مرسوم قانون** (F). Décret-loi (F).
Order in Council (E).
هو كل نص تشريعي يصدره رئيس الدولة في أثناء غياب
المجلس النيابي ويكون نافذاً كالقانون بشرط موافقة المجلس،
عند انعقاده، عليه.

٢٦٢٥٦ - **مرسونية** (S). Marssonina, Marsonia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغيفيات. يتميز بكتلاته
الشعاعية الثنائية الخالية البيضاء الشكل أو المستطيلة المنعقدة.
يركب الأوراق فيلطحها. قصبته أدمية الارتكاز تصعد
البشرة || أنواعه عديدة لكنها قليلة الأذى. أضرها ما يلي.

٢٦٢٥٧ - **مرسونية البرسيم** (S). Marssonina medtagnis (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب البرسيم والقصة والنفل
في سوريا وأورانيا. مظهره الخارجي بطور صغيرة لا قياسية
الشكل، حنطية اللون، سمراء الأطار، تركيب السوق
والأوراق فتتوزع || يكافح بالخش عند ظهور الوسم
ومنهم من سرح الماشية في المقاضب لترحائها.

٢٦٢٥٨ - **مرسونية التفاح** (S). Marssonina betulae (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب التفاح في أورده.
مظهره الخارجي بطور صغيرة مستديرة شعراء اللون حنطية
الأطار لا قياسية الترتيب تركيب تفصل الأوراق حصل
صفحاتها العليا || أضراره زهيدة لا تستوجب المكافئة.

٢٦٢٥٩ - **مرسونية الحور** (S). Marssonina populi (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب أوراق الحور وبصيلها.
مظهره الخارجي بطور متتابعة طحلاء اللون جزئية الأطار
تركيب تفصل الأوراق وقد تشاهد يرمة تقصب الذبول
والاحتيال.

٢٦٢٦٠ - **مرسونية الخس** (S). Marssonina panattoniana, M. perforans (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب الخس فيؤذيه. مظهره
الخارجي يقع مستديرة لونها إلى السمره ظاهراً من ٢ إلى
٣ مم. تنمو مبررة على صفحات تفصل الأوراق الخارجية
ثم تمتد وتتلاقى وتركيب الأوراق الفواصة تلو الأخرى
حتى الساق || يكافح بتقلع النباتات الموصية وينفض
النهات الباقية بمحلول كربونات النحاس أو سائل يورده
المحود المركز ٠.٨ ٪ || من الواجب تطهير البذار قبل
استعماله بواسطة الأخضر المكناني (Vert malachite)
المركز ١ ٪.

٢٦٢٦١ - **مرسونية الصفصاف** (S). Marssonina salicicola (S).
فطر مجهرية من المرسونية يصيب أوراق بعض أنواع
الصفصاف. مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل وألحم،
مسنة الأطار، حنطية اللون، تركيب تفصل الأوراق
فتبدو كالبيثور الرافعة || أضراره زهيدة لا تستوجب
المكافئة.

المنافع والبحيرات ويجاري الماء. قوته القواض والطيور
المائية والصفصاف.

٢٦٢٦٣ - **مرزة ومزده** (S). Circus cinereus (S). Busard cendré, B. de montagne (F). Montagn's harrier (E).
طائر من المرزة، متوسط القد، أبيض اللون المتبادر للرقعة،
أسود المنصر، أصفر العينين والرجلين. وهو من القواطع،
يألف الجبال والمنافع والبيحيرات وشطوط الأنهار. قوته
الماء والصفصاف والحشرات.

٢٦٢٦٤ - **مرزة** (F). Rizière (F). Rice-plantation (E).
هي عقلة الأرض أو الأرض المغروسة رزاً.

٢٦٢٦٥ - **مرزح** (F). Charasson, Echelas, Etançon de vigne, Paiseau (F).
Vine-prop, Vine-stick, Stay, Shore (E).
مسند يستعمل لحم الكربة أو لرفعها من التربة.

٢٦٢٦٦ - **مرزوم** (F). Flamant (F).
هو النحام من طير الماء، طويل الرجلين والرقع، أبيض
المقار، في أطراف جناحيه سواد، أطلب نحام.

٢٦٢٦٧ - **مرزوم** (F).
الميرزومان نجان مع الشريرين.

٢٦٢٦٨ - **مرزوم الذراع** (F).
مرزوم الذراع نجم يتعرف أيضاً بالذراع المسبلة، أطلقه.

٢٦٢٦٩ - **مرزويات** (F). Busards, Circiens, Circinés (F).
عارة طير من فصيلة البقريات. أنواعها عديدة تتميز
بقدمها الرشيق الأبيض. تناسرها صغيرة عجيبة. سوطها
مستطيلة. أذناها بيضة. أرباعها مستعدة معتلة الطول.
غالبها عامرة || أخطائها العالم. تألف الأماكن الرطبة.
قوتها القواض والحشرات.

٢٦٢٧٠ - **مرسب** (F). Précipité (F).
المرسب والراسب واحد.

٢٦٢٧١ - **مرسوتومات** (F). Mérostomes (F).
Merostoma (E).

صف من المفصليات التحجيرات ترقبه الصنفي يأتي
بين الثشريات والمكنوتيات || من هذا الصف يوجد
رتبة واحدة ماصرة تقطع مريدات الذناب.

٢٦٢٧٢ - **مرسج** (F). Amphicomis (S).
Amphicome (F).
جنس غنطس من فصيلة العمليات ورتبة مندبات الاجنحة.
أنواعه عديدة، أعطانها الشرق الأوسط. أجسامها متوسطة
القد زيا. رؤوسها قصيرة. قرونها الاستشعارية صغيرة
التركيب. أرباعها خاسية الفصل. أناتها أكبر قدماً من
ذكورها || تعيش على ثلاث الأنواع والأوراق الفتية.
رقبتها مقببة الشكل، سداسية الأرباع تعيش في التربة
على المواد العضوية والنباتية السائرة إلى الانحلال.

٢٦٢٧٣ - **مرسن** (F). Nez des solipèdes (F).
Nose of soliped (E).
المرسن هو أنف ذوات الحافر.



مرزة المنافع



مرج



مرسونية البرسيم

٢٦٢٧٤ - مَرُوسَنَةُ ٥ Robot (F), Robot (E).

جهاز آلي يقوم مقام الانسان في انجاز بعض الاعمال .

٢٦٢٧٥ - مَرُوسُون ٥ Parasité

٢٦٢٧٦ - مَرُوسَدُ الْجَوَاتِ

Observatoire météorologique (F), Meteorological observatory (E).

مكان مجهز بالمادة اللازمة لرصد العوامل الجوية .

٢٦٢٧٧ - مَرُصِق ٥ Adhérent (F).

يقال جُوز مَرُصِقٌ ومَرُصِقٌ اذا تعلق خروج له .

٢٦٢٧٨ - مَرُوسَ ، وَحَم Maladie (F).

Illness, Diseases (E).

انحراف صحي سببه تقاوس الصفو من القيام بطيفته على الوجه الاكل || الاوصام التي تصيب الحيوان والنبات حادثة منها داخلية وخارجية وظيفية وبكروية . الخ .

٢٦٢٧٩ - مَرُوسُ البُتُونِ السَّازِي ، دَرُمِيت

Dermite (F), Pöit-evil (E).

وصم سار يصيب الخيل والبقرة .

٢٦٢٨٠ - مَرُوسُ الحَرَاثِف Lépidorthose (F).

Lépidorthosis (E).

وصم جرثومي يصيب الاسماك بحراشفها .

٢٦٢٨١ - مَرُوسُ الْخُرُوبَات

Coccidiose, Maladie du gros ventre (F).

وصم جرثومي يصيب الارانب خاصة والطيور الفداجة

مُتَلَة .

٢٦٢٨٢ - مَرُوسُ الصَّخَنِ Bleime (F).

Sand-crack (E).

وصم يصيب باطن حافر الخيل .

٢٦٢٨٣ - مَرُوسُ الظِّلْفِ ، تَعَقَنُ الظِّلْفِ

Necrosis bacillaris (S), Piézin (F), Foot-rot (E).

مرض معد يصيب اطراف الضأن .

٢٦٢٨٤ - مَرُوسُ الْفُطْرِ الشَّعَاعِي

Actinomycose (F), Actinomycosis (E).

هو الحاروش وصم يصيب الفرواني وينتقل الى الانسان .

سببه الفطر الشعاعي . مظهره قباب في الفك واللسان . حوافره هزال وضعف وحى وانخفاض في الوزن . وقد

يمتد الى اشحاء الحيوان وظلمة جلده .

٢٦٢٨٥ - مَرُوسُ الْقَسَمَلِ Phtiriasis (F).

Pthitiriasis (E).

كل مرض جلدي سببه الحشرات من قمل وقواد...

٢٦٢٨٦ - مَرُوسُ الْمُتَمَمِّجَاتِ Spirillose (F).

Spirillose (E).

وصم يُلْشَأُ من ويبدو المتصبغات في الدم .

٢٦٢٨٧ - مَرُوسُ بَكْتِيرِي Maladie bactérienne (F).

Bacterial illness (E).

كل مرض سببه البكتيريا .

٢٦٢٨٨ - مَرُوسُ جِلْدِي ، دَرَمَتُوز

Dermatose (F), Skin disease (E).

تغير شامل يطلق على جميع الاوصام الجلدية مما كان

سببها .

٢٦٢٩٢ - مَرُوسُنِيَّةُ الثَّقِيبِ ٥

Marssonina acerina (S).

فطر مجهري من المرسونية يصيب اوراق الثقيب وقد

يمتد الى الاذنات والافناد . مظهره الخارجي يقع صغيرة

مفرقة الزوايا تبلو سمراء اللون ثم تنحرف نحو الصهبة

البيضاء . تركيب نصل الوراق ولحاء الاذنات والافناد .

اضرارو زائدة لا تستوجب المكافاة .

٢٦٢٩٣ - مَرُوسِيَرِيَّات

Merciéres (F).

سبط من فصيلة الجرسيات يشمل الكثير من الاجناس

والانواع معظمها بري وبعضها زراعي زينة .

٢٦٢٩٤ - مَرُوسِيَس

Peuplier de l'Euphrate (F).

هو الخور القراقي الجليل للشكل ، اطلبه .

٢٦٢٩٥ - مَرُوسِيَلَة ٥

Marsilea (S).

Marsilea, Marsilie (F), Marsilea, Nardoo (E).

Marsilie, Kleeforn (D), Marsilea (I).

جنس نباتات حشوية مائية معمرة من فصيلة المرسليات ،

انواعها قليلة العدد . سوقها جذمورية مفادة تنسج في الماء .

جلودها نحيلة تقور في السيل تقابلها اوراق مسطيلة

الزناد رباعية الوريقات المتقابلة الغافية على سطح الماء .

اشهر انواعها :

مرسيلة السنغال ٥ Marsilea senegal (S).

Marsilea pygmaea (F).

Marsilea aegyptiaca (S).

Marsilea d'Egypte (F).

٢٦٢٩٦ - مَرُوسِيَلِيَّات ٥

Marsileaceae (S).

Marsiliaceae, Marsiliaceae (F), Marsileaceae (E).

فصيلة نباتية من المتفيمات . اجناسها وانواعها حشوية ،

جميعها اشواب جذمورية مفادة تعيش في اسماح المياه

القليلة النور .

٢٦٢٩٧ - مَرُوسِيَس ، مَرُوسِيَس Myrte commun (F).

هو الآس الجري ، اطلبه .

٢٦٢٩٨ - مَرُوس Terre imperméable (F).

Impervious earth (E).

هي الارض المسبكة التي اذا اطرت سالت مريما .

جج مروض وامراض .

٢٦٢٩٩ - مَرُوسَاء ٥

Stérile (femelle) (F).

Sterile (femelle) (E).

المقور من كل حيوان .

٢٦٣٠٠ - مَرُوسَاد ٥

Robotologie (F).

Robotologist (E).

من تعامل المُرَشَة .

٢٦٣٧١ - مَرُوشَة * Arrosoir (F), Watering-pot (E).

وهاء لاسقاء بالرش .

٢٦٣٧٢ - مَرُوشَدَة ٥

Robotologie (F).

Robotology (E).

المُرَشَة علم يبحث في تطوير الاجهزة الآلية وتمكينها من

انجاز ما يقوم به الانسان من اعمال .

٢٦٣٧٣ - مَرُوشَت ، مَرُوشَت

Susoïr, Trompe d'insecte (F), Sucker (E).

جهاز انبوي ثقب يمكن الحشرات من ارتشاف السوائل .



مرسيلة



مرشة

٢١٣٠٣ - مرعابولا شرعية

Echinops tournefortii (S). Boulette de Tournefort, Echinope de Tournefort (F).

حشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. سوقها خالية اللحماء، حلجها غليظ مستطيل أكثره أبيض اللون وبضه آخر. أوراقها جامدة النصل الحامسي التفريش، الشالك الحلق. أزهارها وردية وبض، ورؤسها متوسطة القد.

٢١٣٠٤ - مرعابولا لترجعة

Echinops viscosus (S). Boulette visqueuse, Echinope visqueux (F).

حشبة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها كثيرة الفروع اللزجة. أوراقها كبيرة القد، خدية التفريش، زغبية لتصل القد للزج، شالكة الحلق. أزهارها غبراء اللون، ورؤسها صغيرة الحجم.

٢١٣٠٥ - مرعابولا وضيعة

Echinops humilis (S). Boulette humble, Echinope humble (F).

حشبة معمرة قليلة الفروع تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها قطعية البشرة على صفحاتها. أزهارها زائفة الزرقة، قطر الرؤسية نحو ٤ سم.

٢١٣٠٦ - مرعة

Porzana (S). Porzane (F). Porzana (E).

المرعة. ج. مرع. جنس طير من دجاجيات الماء وفصيلة التفصليات، أنواعه المروفة ١٦ جميعها من طيور العالم القديم. أجسامها متوسطة القد وصغيرة. أثوابها إلى الصبهة الخفيفة يعلوها رقيق أبيض وتبقي أسود || أعطائها تمتد من الحنك إلى الأروية ومن الصواري إلى مراكز. معظمها من القواطع يحوي منقح البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي. أحرف أنواعها وأشهرها المرعة الشائعة.

٢١٣٠٧ - مرعة شائعة * مرعة مرطوة

Porzana maruette (S). Porzane marouette, Marouette (F).

طائر من المرع، قدوه قدر السباقي، ثوبه إلى الصبهة الخفيفة السمراء اللواح. رأسه متمش بالابيض. زوره ويطنه إلى البياض الناصع. صدره إلى الطحلة الخفيفة المراج. ظهره أسود التقيق أبيض الحمار. جناحه مجذع بالآخر. منقاره جالس الانكناز، اسر القاعدة، آخر الطرف سقاء إلى الخصار الاسفر || وألف الناتق وضفاف البحيرات والأنهار. قوته الحشرات والبراق ويزور النباتات المائية. مرتبه من الغروب إلى الظلمة ومن الفسي إلى الفجر. ينش منه وسط جم الساعدي. أثناء تمضن نحو ١٢ بيضة.

Chèvre d'Angora (F).

٢١٣٠٨ - ميرهز

هو مازن انقره، اطلبه.

Pratral (F). Meadow (E).

٢١٣٠٩ - مرعوي

Embouche, Gagnage, Herbage (F).

٢١٣١٠ - مرعي

Pasture-land, Rich meadow, Grass-land (E).

مرج طبيعي تسوم الماشية أعشابه.

Clio (F).

٢١٣١١ - مرعي الحبوب

جنس حيوانات بحرية من الرخويات تدهى مرزوة، اطلها.

Hygrophyte (F).

٢١٣١٢ - ميرهكاد

نمت تمريني يطلق على كل نبات ينمو في المواقع الرطبة.

٢١٣١٩ - مرعي دود الأمعاء

Helminthiasis (F). Helminthiasis (E).

هو الملمتياز، وصف تسببه الديدان في الأمعاء.

٢١٣٢٠ - مرعي ساري، مرعي وييل، وياء

Maladie infectieuse (F). Infectious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدوى من حيوان إلى آخر.

٢١٣٢١ - مرعي فطري

Maladie cryptogamique (F). Cryptogamic disease (E).

كل مرض تسببه الفطور، مجهرية كانت أو غير مجهرية.

٢١٣٢٢ - مرعي شعدي

Maladie contagieuse (F). Contagious disease (E).

كل مرض جرثومي أو ميكروبي ينتقل بالمعدوى من فرد إلى فرد.

٢١٣٢٣ - ميرهكابي

Siagogue (F). Siagogic (E).

نمت تمريني يطلق على كل مادة تسبب افراز الرضاب.

٢١٣٢٤ - ميرهناخ، ميرهكة

Concasseur (F).

هو الجاروش، اطلبه.

٢١٣٢٥ - مرطاب، مرطب

Hygromètre (F).

هو المرزاق، اطلبه.

٢١٣٢٦ - مرطاب شعري

Hygromètre à cheveux (F).

هو المرزاق الشعري، اطلبه.

٢١٣٢٧ - مرطيش، مرطوشة

Améchyta (F).

هو الكركمان، اطلبه.

٢١٣٢٨ - مرع

مرع ومرع المكان: انخصب بكثرة الكلا.

٢١٣٢٩ - مرعان

Clématisse toujours verte (F).

هو اللامي البني، اطلبه.

٢١٣٣٠ - مرعابولا *، شوكه الجمال

Echinops (S). Echinope, Boulette (F).

جنس نباتات برية عشبية من فصيلة المركبات الانبورية ازره. أنواعه عديدة منها الحلوية والحمولة والمصرة. سوقها فرماء. أوراقها كبيرة القد شالكة النصل. أزهارها رؤسية كروية الشكل || أحرف أنواعها وأشهرها ما يلي:

٢١٣٣١ - مرعابولا زرقاء

Echinops ritro (S).

Boulette azurée, Echinope azuré (F).

حشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها كبيرة القد فلقية التفريش. نصلها اخضر الصفحة العليا المائلة، أبيض السفلى الخلفية، شالك الحلق. أزهارها زرق. قطر الرؤسية يراوح من ٣ إلى ٤ سم.

٢١٣٣٢ - مرعابولا شائعة، شوكه الجمال

الشائع، وهي الإبل، سكافي

Echinope commun (F).

نوع من المرعابولا، مشهور باسم دوي الإبل، اطلبه.



مرعابولا



مرعة شائعة

٢٦٣١٢ - مَرْغَعة

المرقة واللرخ : الروضة الكثيرة النبات .

٢٦٣١٤ - مَرْغَرُودُ اليَاسَمِين

Margarde du jasmin, Pyrale du jasmin (F).

فراشة من المرغشقيات وفصيلة الناريات مشهورة باسم نارية الياسمين ، يرتبطها مذبذبة .

٢٦٣١٥ - مَرْغَرِيَت

Reine Marguerite (F).
Queen Margaret (E).

نبات زينة حولي يعرف بالخنكار ، اطلبه .

٢٦٣١٦ - مَرْغَرِين

Margarina
زبدية صناعية مركبة من ادهان نباتية مع شحم البقر .

٢٦٣١٧ - مَرْغَرِف

Marcgravia (F).

جنس نباتات برية وتربينية عارضة من فصيلة المرغشقيات . منبتها التلويحي بعض مناطق امريكا الاستوائية || انواعها المعروفة قليلة العدد منها السريعة ومنها المتسلقة المارشة . اوراقها مزديسة الشكل ، ابيدة ، متعاقبة . ازهارها عتقودي التجميع . ثمارها كروية ، جامدة ، حمراء اللون .

٢٦٣١٨ - مَرْغَرِيفِيَّات

Marcgraviaceae (S).
Marcgraviaceae (F). Marcgraviaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها متوسطة العدد . اصطلحوا بعض اصفاغ امريكا الاستوائية || نباتاتها متباينة الاشكال ، منها الاجبار والشجيرات والمتسلقات . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، جامدة المتصال المستنة الاطراف . ازهارها لاقحيات التجميع منه الصيواني والمدقوي والسلي ، جميعها مستطيلة المالحيق . ازهارها لاقحية الحجم . كذاوصها لانظامية التركيب منها الثنائية للفصل والثلاثية والحادية . عدد بتلات توجعها بمائل عدد الفصل . جميعها ملونة . ثمارها كروية ، ديوام ، جامدة القشور || اشهر اجناسها المرغف .

٢٦٣١٩ - مَرْغَرِعة

Mérogonia (F). Marogony (E).
المرقة احصاف بويضة متصاحلة بمحوي منوي .

٢٦٣٢٠ - مَرْغَرِي

Mérogenique (F).
Merogonic (E).

نعت تدرفي يطلق على كل ما له صلة بالمرقة ككوك احصاف مرقي .

٢٦٣٢١ - مَرْغَرُوسَة

Prolifiqua (F). Prolific (E).
نعت تدرفي توصف به الاثنى الكثيرة النتاج .

٢٦٣٢٢ - مَرْغُول

Margulus (S).
Margule (F). Margulus (E).

جنس طيور بحيرة من فصيلة البطريقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اصطلحوا مناطق الدائرة القطبية . لا تركه الم الى اليابسة الا في زمن الترخيم والحياة . الرحالة القطبية تلقبها بطير الجليد || ملجئها الحياتي جاحي . اسرابها وافرة العدد . قوتها الحوام والخشرات والدعاصيص والقشريات والاسماك الصغيرة || اشهر انواعها وارعها واعما انتشاراً المِرْعُولُ القَرَمُ أو المِرْعُولَة .

٢٦٣٢٣ - مَرْغُولُ قَرَم ، مَرْغُولَة

Margulus alie (S).
Mergule nain (F). Little auk, Dovekie (E).

جسها صغير لثقة ، يطول من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها مستدلاً جرم ، قصير المتقاد الاسود . حذقة منها كسائية الابن . ذنبها مخروطي الشكل . قصير . ريشها الى السمرة والصفرة اللواح . ثوبها الصفيبي اسود الرأس وازداد والذنب والسفحة العليا من الجناح ، ابيض الصدر والبطن والصفحة السفلى من الجناح . اباها ريش الاطراف . ثوبها الشتوي يتقلص فيه الاسود ليشمل حله الاكعب || الاثنى ايزر قدماً من الذكر ويحتل بنفس الثوب ، مكنها لفرقة بين حضور المهادح . الاثنى تحضن منابوة الذكر بيضة واحدة شبه اجاصية الشكل ، اصفر من بيضة الدجاجة . الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع والصغير يحوم على سطح الميم بعد التلق باسبوع .

٢٦٣٢٤ - مَرْغِي

Casarca (F).
هو الشهران ، طائر من الدمل مشهور باسم ابرو فرقة .

٢٦٣٢٥ - مَرْغِي

Felle tigrina (S). سينور بتري
Margay, Chat tigre (F). Margay (E).

حيوان لاحم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه بعض اصفاغ امريكا الوسطى والبرازيل . يألف الاسراج ولا يبتعد عن الماء حيث يكثر قصه . ملجئه الحياتي غري اي ان الذكر يكوم عدة اناث || جسمة احيف التوام ريشها يطول نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٨ سم . رأسه مستدل الجرم . اذناء صغيرتان ، مستديرتان كاسيتان . عيناه صغيرتان مكملتان . ثوبه الى الصفرة الصفاء ويلوحها يتيجج وتندبر اسود . صدره الى الصفرة الثريا المشيرة بالاسود . بطنه الى الصفرة الخطية المرقشة بالاسمر . ذنبه متتابع الاطراف السود || سرعه دجوي . يتسلق الاشجار بفعلة ويمدو على الارض بسرعة . قوته الطير والبرذان والقدار والذخايات والفضاوح .

٢٦٣٢٥ - مَرْغِيَط

Erodium à feuilles de bryone
هو الجزاب الفاشري الورق ، اطلبه .

٢٦٣٢٦ - مَرْقَاع

Grue (F). Crane (E).
آلة رافعة ، كبض الانتقال وتنقلها .

٢٦٣٢٧ - مَرْقِع

Élévateur (F). Elevator, Lift (E).
جهاز ثابت او لتدال يستعمل في رفع وتنسيف الجرايل والستاديق والبالات الخ .

٢٦٣٢٨ - مَرْقِي ، مَرْقِي

Coudé (F). Elbow (E).
موصل للذراع من الصلب . ج مرقاق .

٢٦٣٢٩ - مَرْقِي

المرقق نجم ثير من كوكبة سيلاس .

٢٦٣٣٠ - مَرْقِيُ الطَرِيَا

مرقق الطريا نجم من كوكبة الجبار .

٢٦٣٣١ - مَرْقِيِي

Coudé (F). Elbowed (E).
شكل من الازباقي ، قائم لزاوية ، يشبه المرقق .

٢٦٣٣٢ - مَرْقِيْن ، مَرْقِيْن

Morphine (F).
Morphia (E).
مادة شبه قلوية غدرة ويسكنة تستخرج من الافيون .



مرغول



مرقي

Composante (F). ٢٦٣٤٩ - مُرَكَّبَة
Component (E). وهي قد تكون اقية أو رأسية .

Centre, Point central (F). ٢٦٣٥٠ - مُرَكَّز
Centre, Middle (E). هي نقطة الدائرة .

Centre de gravité (F). ٢٦٣٥١ - مُرَكَّزَ الجِثَالِ
Centre of gravity (E).

٢٦٣٥٢ - مُرَكَّز الدَّائِرَة ، نُقْطَة الدَّائِرَة
Centre d'un cercle (F). Centre of circle (E).

Centre astatique (F). ٢٦٣٥٣ - مُرَكَّز مُطْلَق
Astatic centre (E).

Accumulateur (F). ٢٦٣٥٤ - مُرَكِّم
Accumulator (storage cell or battery) (E).

Pot (F). ٢٦٣٥٥ - مُرَكِّن ، قَارُورَة
وهو من فخار تُزَع فيه النباتات أو تستنبط ريشاً تنقل
الى مستقرها . ج مراكن وقوارير .

Investi (F). Invest (E). ٢٦٣٥٦ - مُرَكَّوْن
نمت تعريفى يطلق عل الاموال ، اخصها غير التقديرة ،
المبسطة لعل ما او المشروع معين .

Merlus, Merluccius (S). ٢٦٣٥٧ - مُرَقُوش
Merluce (F). Hake (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الفاسيات . اصلها
بحار البلاد الحارة والمتصلة بالحارة || اجسامها اهليجية .
رقوبها كبيرة . اشتاقها سلحة باسنان قوية هربية
الشكل . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة الشكل ،
خالية من الناحس الشائكة || انواعها المعروفة اثنان المرلوش
البلبل الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط
والمرلوش الامريكى المعروف أيضاً بمرلوش الشيلي .

٢٦٣٥٨ - مُرَقُوش صَدَلُون *
Merluccius merluccius (S).

Merluce commune, Merlu (F). Common Hake (E).
نوع من المرلوش . سمكة بحرية بيوض مقشرة نمة يكثر
وجودها في البحر الابيض المتوسط || سرها واقر العدد .
سرسها عرض البحر خارج المياه الاقليمية ، لا تقترب
من الاحاد الا في زين التشرة || جسمها شبه اهليجي
الشكل ، بطول من ١٠٠ الى ١٣٠ سم . رأسها كبير
الجرم . ثوبها الى الطحلة الثبراء السفهاء الموج . غطها
الاجناني اسود . بطنها الى البرة البيضاء || زعانفها الظهرية
اثنان . زعنفتها الشرجية واحدة || لحمها جيد الصنف .
كبدها وافر المادّة الزيتية الجيدة .

٢٦٣٥٩ - مُرَقَّاحُون
Amaraque (F). هو المرء ، اطلبه .

٢٦٣٦٠ - مُرَقَّاحُون
Germandrée ambrée (F). هو الطوقيون الكوربي ، ليات عطري مدي مقو
للأصصاب ويغيد لها . وهو منه وقابض ويضاد للتشنج .

٢٦٣٦١ - مُرَقَّة ، مُرَقَّة
Babine, Babouine (F). Lip (pendulous) (E).
المرة والحمة : شفة البقرة وكل ذات ظلف لانها ترتم بها .

٢٦٣٣٣ - مُرَقَّ
Barbe du blé (F). Beard (E). هي سمكة السبلة وتسمى سفا وشاح . ج أمراق .

٢٦٣٣٤ - مُرَقَّ
Puccinia وهو نظري يمتري النبات ويؤذي ، اطلب سحام .

٢٦٣٣٥ - مُرَقَّاة *
Progression (F). هي التوالية وقد وضعها لانها تؤدي سنى التوالي والمزيد
وهو المطلوب .

٢٦٣٣٦ - مُرَقَّاع
Uranomètre (F). Uranometer (E).

جهاز يستعمل في تقدير المساحات الفضائية ان بين
الكواكب او بينها وبين الارض .

٢٦٣٣٧ - مُرَقَّاق * ، مُرَقَّاقَة
Aplatisseur (F). Grain-crushing mill (E).

آلة لتريق الحبوب السليقة ، مركبة من اسطوانتين تتوران
في اتجاهين مماكسين تسحق الحبوب التي يمر بينها دون
ان تكسرها .

٢٦٣٣٨ - مُرَقَّال *
Apode (F). Apod (E). هي الحشرة العديمة الارجل . ج مرقاقيل .

٢٦٣٣٩ - مُرَقَّاب ، راصِدَة
Télescope (F). Telescope (E).

آلة مجهزة لرصد كواكب الفلك وسياراته ونجومه .

٢٦٣٤٠ - مُرَقَّد
Stalle (F). Stall (E). شقة الفرس الواحد في الاصطبل .

٢٦٣٤١ - مُرَقَّشِيَتَا
Pyrite (F). Pyrites (E). هو كبريتور الحديد ويكون اصفر اللون او ابيض .
واحد بيريت .

٢٦٣٤٢ - مُرَقِّي عُنْثَرِي ، مُقْيَس عُنْثَرِي
Echelle décimale (F). Decimal scale (E).

٢٦٣٤٣ - مُرَقَّكَا ، مُنْشَاع *
Doseur (F). Dosimeter (E). جهاز المراكزة او قياس التركيز .

٢٦٣٤٤ - مُرَقَّاش
Sarcloir (F). Spud (E). أداة لركش التربة ، يستعمل باليد .

٢٦٣٤٥ - مُرَقَّاب الفَرَس
مركب الفرس نيم ثير من كوكبة السفينة .

٢٦٣٤٦ - مُرَقَّاب
Composé (F). Composed (E).

٢٦٣٤٧ - مُرَقَّاب
Multiple (F).

٢٦٣٤٨ - مُرَقَّابَات
Compositae (S). Composées (F). Composées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلغلتين وسيدة القمامة سفلية
الاسدية . تتميز من اكبر الفصائل النباتية ، انواعها حدة
آلاف تجمعها ثلاثة اسباط : الشاعية وانبوية الزهر
ولسنية الزهر . منها الاجبار والشجيرات والجنات والاشعاب .
حصارتها مائة او لينة . اولها متعاقبة او متعاقبة .



مرقاق



مرقب



مرلوش مبدول

٢٦٣٧٣ - مَرمَوتُ النُطْب ، مَرمَوتُ كَنَدَا

Arctomys monax, A. empetra (S). Marmotte monax, M. du Québec, Monax (F). Canadian marmot, Monax (E).

نوع من المرموط، موطنه يمتد من كندا إلى كليفورنيا. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ١٧ سم. وبره كثيف التجميع، متوسط الطول. ثوبه أل الحلة السوداء، بطنه أصفر المالح.

٢٦٣٧٤ - مَرمَوتُ بُولُونِيَا

Arctomys bobac (S). Marmotte bobac, M. de Pologne, Bobac (F). Polish marmot, Bobac (E).

نوع من المرموط موطنه يشمل بلاد بولونية وإفريقية وروسية الجنوبية. جسمه يطول نحو ٣٧ سم. وذنبه ٩ سم. ثوبه أل الصبغة. حنار عينيه أل أسيرة. طرف ذنبه أل السواد. وبره ليد التجميع متوسط الطول.

٢٦٣٧٥ - مَرمَوتُ حَمَلَايَا

Arctomys himalayensis (S). Marmotta de l'Himalaya (F). Himalayan marmot (E).

نوع من المرموط، صغير القد، كثيف الور الثام المتوسط الطول. موطنه يشمل حلالا حتى ارتفاع ٤٠٠٠ م. من سطح البحر.

٢٦٣٧٦ - مَرمَوتُ شَالِك

Arctomys marmotta (S). Marmotte commune (F). Common marmot (E).

نوع من المرموط يعيش من ٩ إلى ١٠ سنوات. موطنه جبال أروية. جسمه يطول من ٢٨ إلى ٤٥ سم. وذنبه ١٦ سم. وزنه أل الخريف قبل بيانه الشتوي يراوح من ٧ إلى ٨ كيلو. ثوبه أل الصبغة الخفيفة يطولها مراح صناعي يتحول أل الأحمر الغني مع استقالة العمر. رأسه وأطراف قوائم وذنبه أل أسيرة. انتفا تضع جروين في أواسط شهر حزيران.

٢٦٣٧٧ - مَرمَوتُ مَدَهَب

Arctomys aureus (S). Marmotte dorée (F). Golden marmot (E).

نوع من المرموط صغير القد كثيف الور الثام، ثوبه أل الصبغة الصفانية اللامعة. موطنه بعض جبال الهند والباير.

٢٦٣٧٨ - مَرمَوتُ كَرِيَا

Meromyza (S). Meromyza (F). Meromyza (E).

جنس حشرات من فصيلة الخربايات وذبة ذات الجنحين. أنوعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المحتلة الحارة || أجسامها صغيرة، هلاء، تقطن من ٣ إلى ٦ سم. رؤوسها مكورة، عيناها كبيرة، فارة عند الشقير. قرونها الاستشادية قصيرة، تنتهي بنسيلة دقيقة. ملاصقا صغيرة. تقطنها متتلة الجرم. كواسها مستطيلة، مرققة. بطونها انتابية الشكل. رواشها كبيرة، قسطانية التخفيف. أفضاخها الخلفية فضفة تمكها من التغفر || الحشرة الجملانة واثمة مرتعها البراري والمروج. البرقة تميش أل سرق التنبليات وقد تركب القمح والأرز فتسبب أضرار زهر السائل.

٢٦٣٧٩ - مَرمَوتُ رَينوس

Rhinoceros (F). هو الكركدن، أطلبه.

٢٦٣٨٠ - مَرمَوتُ تِبِت

Surmulot (F). هو جزء الخناص، أطلبه.

Marbre (F).

٢٦٣٨٢ - مَرمَوت

هو الرضام، أطلبه.

٢٦٣٨٣ - مَرمَوتُ مَرَبَرِي

Marbré (F). Marbled (E). نعت ترميني يطلق على ما كان يشبه الممر.

٢٦٣٨٤ - مَرمَوتُ سِيَانَا

Myrmicidae (S). Myrmicidae (F). Myrmicidae (E).

فصيلة حشرات من فئائيات الإجمنة المصنوعة وثلة الحشرات. أجسامها وأنوعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض اصقاع البلاد الباردة والقطبية || أجسامها شبيهة بأجسام النمل. أنوعها أل الجلوة للتفافة المناجات. جميعها مجنحة. حاما دقيقة. ذرية، معتلة الطول || أشهر أجناسها المرمس (Myrmique).

٢٦٣٨٥ - مَرمَوتُ سَندِي

Arénacé (F). Sandy (E). نعت ترميني يطلق على كل ثرة خضراء كثرت فيها نسبة الصنوبر الريلي.

٢٦٣٨٦ - مَرمَوتُ مَحْفَلَر

Sablère, Carrière de sable (F). Sand-pit, Gravel-pit (E). منجم يستخرج منه الرمل.

٢٦٣٨٧ - مَرمَوتُ جَدَانِيَا

Jardin de grenadiers (F). هي بستان الرمان.

٢٦٣٨٨ - مَرمَوتُ مَرَبَرِي

Pagel marbré (F). المرموة سمكة بحرية تدعى فريدي منج، أطلبه.

٢٦٣٨٩ - مَرمَوتُ مَرَسَا

Marmoset (F). هو الهبال من القرود اللبية.

٢٦٣٩٠ - مَرمَوتُ مَرَسَا * مَرمَوتُ مَرَسَا * مَرمَوتُ مَرَسَا

Calceolaria (S). Calceolaria (F). Slipperwort (E). Pantoefblume, Schubblume (D). Calceolaria (I).

جنس نباتات عشبية ليفية وعشبية من فصيلة الخنازريات. أنوعها عديدة، منها الحلوية والهولة والمصرة، معظمها يري ويعفها زينة كثير الضروب والأصرام. سوقها زينة. أوراقها متفالية كاملة. أنوعها غريبة الشكل تشبه الخف. ألوانها متباينة عديدة تراوح من الأبيض إلى الأحمر الغامق.

٢٦٣٩١ - مَرمَوتُ مَرَسَا

Arctomys (S). Marmotte (F). Marmot (E). Marmelotier (D).

جنس حيوانات لبرية قاضية من فصيلة السنجابيات. ألوانها المعروفة ١٥، جميعها متوسطة القد بطيئة الحركة. رؤوسها مستديرة. أذانها صغيرة مستديرة. أذنانها قصيرة جللة. صولها متوسط النعومة || أطلانها الجبال العالية. بيئاتها الشتوي يدم نحو أربعة أشهر. تميش جهامات في أجسام تحفرها في الحرم على أعماق تراوح من ٩٠ إلى ١٢٠ سم. جهامها نفق قطره نحو ١٥٠ سم. وطوله من ٨ إلى ١٠ أمتار ينتهي برعدة حرفها ٢٠٠ سم. أحرف أنوعها وأشهرها ما يتبع.

٢٦٣٩٢ - مَرمَوتُ تِبِت

Arctomys robustus (S). Tibetan marmot (E).

أكبر أنواع المرموط، موطنه جبال التبت. ثوبه أل أسيرة الخلفية. وبره كثيف، لين، مستطيل.



مرموت



مرموط شالغ

Hypsomètre (F).

Hypsometer (E).

جهاز آل يمكن المراه من تحديد ارتفاع المكان أو الشيء .

* مِرْهَاه ٢٦٣٩٠

٢٦٣٩١ - مِرْهَاه

نعت وصي يطلق على الاسكة القليلة الشجر كقولك حديقته مرهاه أو غابة مرهاه أو أرض مرهاه .

Impondéré (F).

Unweighed (E).

المربل ما كان عديم الوزن أو القياس .

٢٦٣٩٢ - مِرْهَبِل ٥

Etang artificiel (F).

Artificial mere, A. pond (E).

هوز صناعي تخزن فيه مياه الشتاء .

٢٦٣٩٣ - مِرْهَكَة

٢٦٣٩٤ - مِرْهَم

Liniment, Onguent, Pommade (F). Liniment, Unguent, Ointment, Pomade (E).

مركب دهنى يخلط بمختلف العناصر والالوان، استعماله خارجي.

Quartz

قرب من الصوان يختلف الاشكال البلورية والاحجام الشبائنية .

٢٦٣٩٥ - مِرْو

٢٦٣٩٦ - مِرْو* ، حَبَق الشَّيْخُ ، خَرَبَتَشْ ، مِرْمَاحُوز ، بَرْدَ كُوشِ مُعَقَّد ، زَعْبَر

Origianum maru, O. amaracus, Majorana maru (S). Amaracque, Marjolaine vrale (F). Amaracus (E). Amaraskuschtblume (D). Amaraco (I).

بجلة معمرة صطوة برية وزراعية من فصيلة الفصليات . تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . ساقها وفروعها جزئية اللون . فروعها متفرعة مسترسلة . اوراقها لائقة كاملة اهليلجية ، نصلها خلى البشرة على صفحتيه . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها قليلة العدد وودية اللون || ينبت من التوابل وهو مقو للعدة ، منه ، طارد الرياح . يستخرج منه بالتقطير زيت طيار كافوري الرائحة له استعماله الطبي .

Maerus (S).

Maerus (F). Maerus (E).

جنس نباتات بحلية وجبلية معمرة من فصيلة الكريبات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ منبتها بعض المناطق الافريقية اغصها المشرقة على البحر الابيض المتوسط || ساقها فروع . اوراقها بخصية النصال الجاهدة ، صغيرة الربيبات . ازهارها صفودي التجميع . ازهارها مستدلة الاحجام ملونة من الابيض الى الاصفر والاخضر والاريجاني . ثمارها منوية وقرية البلور او شعية || تنويرها دهنى .

٢٦٣٩٧ - مِرْوَكَة

٢٦٣٩٨ - مِرْوَاژ* ، بَارُومِتر

Baromètre (F).

Barometer (E).

جهاز خاص وضع لقياس الضغط الجوي وهو يتكون عادة من وعاء الزئبق وانبوبة شمية ترفس في الوعاء وسام دقيقة ينفذ منها الهواء وسواقي مدرج يدل على ارتفاع الضغط أو انخفاضه .

٢٦٣٩٩ - مِرْوَاژ مُسْجَل ٥

Baromètre enregistreur (F). Registrer barometer, Self-registering barometer (E).

مرواژ جهاز بالعدة اللازمة لتكوين انفعالات الضغط الجوي.

Clapier (F). Hutch (E).

انقاص الارانب وكل مكان خصص لتربية الارانب وتكاثرها .

٢٦٣٨١ - مِرْوَبِئَة

٢٦٣٨٢ - مِرْوَكَة *

Coregonus marana (S).

Corégone, Marène (F).

سمكة نهرية من مفتحات المائنة وفصيلة السلمونيات . اصطلحها معظم بحيرات الشرق الاوسط وادوية الوسطى || جسمها متوسط القد ، مستدل التبطيط ، بطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى الزبداء الفضية المواج يبقى في الرأس والظهر وذيتر في البطن . زعنبتها الخلفية غالبة ، شبه هلالية الشكل || لحمها ان مدخن او ملح رائع السوق في ادوية الوسطى .

٢٦٣٨٣ - مِرْوَكِجِيَة (F). Meringie (S).

عشبة معمرة من فصيلة القرغفليات . مهدها حشاب وريام بنفس التام البحر الابيض المتوسط . ساقها نحيلة فريام اوراقها سنائية بطول من ٢ الى ٣ سم . نصلها مقعرة السطوح ، بحرية الخضار . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد . ترفس في المواقع الوعرة والاثربة الكلسية || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

Laurière (F).

كل موقع تكثر فيه اشجار اللند اي القار يدعى مرندة .

٢٦٣٨٤ - مِرْوَدَكَة

Maranta (S).

Marante (F). Arrow-root plant (E). Arrowroot-pflanzen (D). Cannacoro, Erba da freccle (I).

جنس نباتات جذمورية برية وزراعية من المرنتيات وفصيلة الزنجبليات . انواعها المعروفة خمسة ، منبتها المناطق الحارة . اوراقها كبيرة القد مستطيلة الزيد الحامسة . نصلها سنائي الشكل بارز المروى . ازهارها سفلية او عقدونية التجميع بيضاء اللون || اعرف انواعها ولشهرها الثلاثة التالية .

Maranta juncea (S).

Marante élanée (F).

نوع من المرندة الزراعية ترفس في الاربة الرطبة . اوراقها سنائية كبيرة منتقصة . شاربستها الزهرية تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ازهارها سنبلية التجميع || جذاميرها دقيقة مستطيلة قليلة المادة النشوية .

٢٦٣٨٧ - مِرْوَكَة قَصِيْرَة * ، اَرُوْتَة

Maranta arundinacea (S). Marante arundinacée (F).

نوع من المرندة الصناعتية الشائعة الاستعمال ، تروم من اجل جذاميرها النشوية الغالب التي يستخرج منها الارروت وهو نوع من النشا النذالي ، دقيقه يحرق :

١٠٢٥ ٪ من المواد الاثرية

٠٢٢٠ ٪ من المواد الدهنية

٨٥,٢٥ ٪ من المواد النشوية والسكرية

٢٦٣٨٨ - مِرْوَكَة هِنْدِيَة *

Maranta indica (S).

Marante de l'Inde (F).

نوع من المرندة الزراعية ترفس في الاربة الهذالية الحسبة . يستخرج من جذاميرها الارروت الهندي الجيد الصنف والانتاج الذي يحتل المركز الثاني بعد الارروت الصيني .

٢٦٣٨٩ - مِرْوَكِطِيَات

Marantacées (F).

Marantaceae (E).

سبط من فصيلة الزنجبليات ، اشهر اجناسه المرندة .



مرندة



مرندة قصية



مرندة هندية




مرهه



مرو



مرواژ



مرواژ مسجل

Palimpestris or, * مروء الحور * ٢٦٤٠٨
Cymatophora or (S). Cymatophora or, l'Or (F).
Palimpestris or (E).

حشرة من فصيلة الشروقيات ورتبة شروقيات الاجنحة .
موجها بحث من الشرق الاسود الى اودية . فراشها واسعة
قوتها رقيق الاضرار . سرتها تعيش على اوراق الخور
والصنصاف || جسمها وبني الشكل يطول نحو ١١ م .
يسقطها نحو ٣٤ م . رأسها حلي اللون . عيناها كبيرتان .
زباناها خطيتان . سرتها مثل الطيل . جوفها وبها
الى الحنطي المذهب المراج || ورشها الاسمان الى اعطلي
الاثير تملو رقة الى الصخرة وتطوط معتزة الى السرة .
ورشها الخلفيان الى الحنطي الكلف الملعب المراج
تملو حدة وسطى هلالية سمراء || لها جيلان في الحول .
تظهر فرائة الجيل الاول في نيسان وتظهر فرائة الجيل
الثاني في تموز . كسر من العصر الى فصحة الليل . تماطل
به ظهورها بنمو اربعة اسابيع وتفتح المكن لطفا على
الصنصاف السفلى من نصال الازراق || السرة عند بلوغها
الكامل تطول نحو ٢٦ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ،
مائل للقتار . ثوبا الى الخضار البحري الجرد بالابيض
والاصفر . رأسها جزوي اللون . مدنها ورواجها الى
السرة || طور الاكمال الذي يستمر ١٥ يوما
يتقضي ضمن صلبة تحميها السرة تحت القشور او بين
شقوف الحاء .



مروء النبع



مروء الحور

Laité (F). Soft-wood (E). * مروء * ٢٦٤٠٩
كل سمكة ذكر لا يزال جرابها الشفني مليء بالروء
تمت بالروء . كقولك طرمتوج مروء .

Irrigée (F). * مروءي ، مَسْقَوِي * ٢٦٤١٠
Irrigated (E). هو النبات أو الزرع الذي يسقى .

Oesophage (F). * مروء * ٢٦٤١١
Oesophagus, Gullet (E). جزء من انبوب الحضم مركز بين البلعوم والمعدة .

Anémomètre (F). * مروء * ٢٦٤١٢
Anémomètre (F). جهاز يحدد مهب الريح وسرعته وشماله .

Rentable (F). * مروء ، مِفْعَال * ٢٦٤١٣
Profit-earning (E). كل استثمار يعود على صاحبه بإيراد سنوي يغطي الاكلاف
ويؤتي بعض الدائل الصافي .

Prolifère (F). * مروء ، مَحْلِف * ٢٦٤١٤
Proliferous (E). صفة الشيء الذي يتكاثر . وتنتعري توصف به الازهار
والثآليل التي تنبت باطن موزة .

Mars (F). * مروء ، مَهْرَم ، مَهْرَمَج * ٢٦٤١٥
Mars (F). Mars (E). كوكب سيار من الفلكس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي .
يمد من الشمس يأتي بمد الارض . لونه الى الصفار الاحمر .
جرمه يقل عن جرم الارض نحو ٧ مرات وكذلك نحو
عشر مرات . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو
٨٧٩٦٦ كيلومتر بالساعة . دورته الفلكية حول الشمس
تستغرق نحو ٦٨٧ يوما . دورته المحورية الذاتية تستمر



مروء

Balloea (S). * مروء * ٢٦٤٠٠

Baliota, Marrube (F).
جلس نباتات عشبية بوية ميمرة من فصيلة الشفويات .
انواعه المعروفة متوسطة المدد . اعطائها تشمل بعض مناطق
الشرق الاسود والاحد واروية وافريقية الشالية || سويها
عذائية فرعاء تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقها متعابلة ،
اهليلجية النصال الخشنة المسننة الختار . ازهارها محوري
الارتكاز . ازهارها بيضاء اللون وبها الابيض الاصفر
المراج . ازهارها واوراقها فوطة البرف للاستصحب ||
تؤثرها سيلي .

Eventail (F). Fan-shaped (E). * مروء * ٢٦٤٠١
شكل من اشكال تقليم الشجر ، يشبه المروسة .

Palmier éventail (F). * مروء * ٢٦٤٠٢
هي اللؤل نوع من النخل التريبي .

Flabellé, Flabelliforme (F). * مروء * ٢٦٤٠٣
Flabelliform (E). تمت وصفي يطلق على ما كان شكله كالمروسة .

Stylot (F). * مروء * ٢٦٤٠٤
كل انبوب من مججمة الانابيب التي تشكل قلم اللقطة
في الزهرة . وهو محور البكرة والحديد التي تدور في الجلام
وكل نصل دقيق مثلوث . ج. مرلود .

Xiphosures (F). * مروءيات الاذناب * ٢٦٤٠٥
رتبة من المفصليات الشيفنات المريتويات . نصالها
واجناسها وانواعها كثيرة المدد . منظمها الساحة من
متحجرات الاحقاب الاول || المعاصر منها الآن فصيلة
واحدة تدعى لميطيات .

Epithrix parvula (S). * مروء النبع * ٢٦٤٠٦
Flea beetle (E).

حشرة من مفصليات الاجنحة وفصيلة الخساريات . جسمها
صغير القد يطول نحو ٣ م . ثوبا الى السرة المابقة .
وفي من الحشرات التي تطير وتقفز حسب تقفي الحاجة .
اجسامها الحولية تراوح من ٢ الى ٣ . انثاها تمتع المكن
على الاحصاب البرية نيفت من رقات دقيقة تحمله غبار
اللون يبلغ طرفها عند كمال تطورها نحو ٤ م . || ازهارها
تمد الى الحفرة والبرقة . الحفرة تقضم نصال النبع على
صفحاتها العليا في المشتل وعلى صفحاتها السفلى فيالحقل
تقتو الازراق ويحط من قبتها . اما البرقة التي تعيش
على المواد العضوية في التربة فانها لا تتأخر عن قرض
جلود الشتلات الناشئة || مكافحتها نظرا لسرعة حركتها
واختباها في التربة وبين الاحصاب تبدأ بتنظيف المشتل
او الحقل من جميع الاحصاب البرية واذا كان لا بد من
دواء فيجب ان يكون شديد الفعالية . كاخضر باريس
وزرنايات الرصاص والروتينون .

Rejet, Rejston (F). * مروء * ٢٦٤٠٧
Shoot, Sprout (E). هو الرود والفصيلة والبتلة والقرع وقد يحسن تخصيصه
بركة النبات المخشوب .

مريضة في المسانف ، عارضة في الغابات حيث يبلغ طولها نحو ٥٠ متراً . ثمارها رشيعة الجراب الذي يطول من ٣٠ إلى ٤٠ سم . ويعرض نحو ٤ سم . بزورها كثيرة العدد ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، لونها إلى السرة الصفانية يملؤها زيتنج ذهبي . رائحتها صريحة ، مقسة . طعمها يبدو كطعم البنقد ثم يتحول فوراً إلى مرارة العلقم || يستخرج منها نحو ٢٢٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

٢٦٤٢١ - مريضة الغابون ، مريضة لطيفة

Sterophantus gratus (S). *Sterophante agréable* (F).
نوع من المريضة . مهدا الغابون وبعض مناطق نيجيريا الجنوبية والكونغو . جنبها داسية أو سريفة في المسانف ، عارضة في الغابات . ثمارها متوسطة الحجم . بزورها اهليلجية الشكل ، تطول من ١٢ إلى ١٥ سم . وتعرض من ٣ إلى ٥ سم . لونها إلى السرة الكستنية الزيتية المزاج . رائحتها صريحة ، مقسة ، لا تقبل الانقباس . طعمها شديد المرارة مثل الاول || يستخرج من بزورها نحو ٣٤٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

٢٦٤٢٢ - مريضة تشاد ، مريضة كعب

Sterophantus Kombe (S). *Sterophante de Kombe* (F).
نوع من المريضة ، مهدا مناطق تشاد ومجريات افريقية الوسطى . جنبها داسية في المسانف ، عارضة في الغابات . ثمارها اصفر قدماً من ثمار مريضة السودان اما بزورها فانجم وقد يبلغ طولها نحو ٣٠ سم . لونها إلى السرة الخضراء المزاج . رائحتها قليلة الصراة اللبوية . طعمها شديد المرارة || يستخرج من بزورها نحو ٣٠٪ من الدهن الجمالي الطبي الاخضر اللون .

٢٦٤٢٣ - مريضة

Histioteuthis (S). *Histioteuthis* (F).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات وأسد الاربيل وفصيلة الراسيات . انواعها المعروفة قليلة اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || اجسامها جرابية الشكل مستطلة الاقطاب . هيونها كبيرة ماصة . زعانفها طرفية نصف دائرية الشكل . رؤوسها اسطوانية كبيرة مندرجة مع الاجسام . جرابها متباعدة الاشكال منها ستة محطة وصغيرة متساوية الطول واثنان طويلتان محسمتان واثنان مستطيلتان تلتها برس ستانية الشكل عادمة الحاجم .

٢٦٤٢٤ - مريضة

Myrris (F).
هو السرفال الطري ، اطبه .

٢٦٤٢٥ - مريضة

Fertile (F).
صفة الحصب في التاج والانتاج والثمار والواتا .

٢٦٤٢٦ - مريضة

Laemargus (S). *Laemargus* (F).
جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة السمنديات . انواعها المعروفة اربعة ، منها لويان بحويان بحار الشمال ونوع محبوس المحيط الهندي والاربع يحبوس البحر الابيض المتوسط وهو اصفرها قدماً لانه لا يعطى اكثر من متر بينا الانواع الاخرى تطول من ٤ إلى ٦ امتار || وتتميز مريضة

نحو ٢٤ ساعة و٣٠ دقيقة || والمربيع كالارض له بحار وجو ويوم في تلكه قران « مريضة » و« مريضة » ، دورة الاول تستمر نحو ٧ ساعات و٣٠ دقيقة ، ودورة الثاني نحو ٣٠ ساعة و٢١٠ دقيقة || والمتمجمون يسمونه النحس الاصفر لانه دون زمل في النحوية . واضافوا اليه البش والقتل والتهرب .

٢٦٤١٦ - مريضة

المادة الصلبة البيضاء الكاثية في جوف القرن .

٢٦٤١٧ - مريضة

Pteris (S). *Pteris* (F).
Yellow succory (E). *Bitarich* (D). *Pteris* (I).
جنس نباتات عشبية طيبة من فصيلة المركبات اللبينة الزهر . انواعها عديدة جميعها برية . سوقها فروع غزيرة العصارة اللبينة المرة الطعم . اوراقها متعاقبة ، لاطقة ، متباعدة الشكل صغيرة القد . نصليها مششاي الحافة خلي البشرة على سطحها ، بحري اللون . انذارها رؤوسية جويصة العصار || والمرير يزيل الجرب والحكة ويهدد البيل وينفع من ضمت الكبد والقصة واذا اخذ مع التذوية فتحت الحصى والعلق البيل وهو يصدح وتصلحه الكثيراء .

٢٦٤١٨ - مريضة

هي الخنثويل ، نبات طبي ، اطبه .

٢٦٤١٩ - مريضة

Sterophantus (S). *جيفالكة* (F).
Sterophante (F).
جنس نباتات برية ، طيبة ، ممررة ، من فصيلة الفديقات . انواعها المعروفة ٤٥ مهدا المناطق الاستوائية والاقليم المتاخمة من البلاد الافريقية والمحتمية . تحديد انواعها ونباتاتها الطوية هو التالي :

افريقية الشرقية والوسطى	تثبت ١٥ نوعاً
افريقية الثالية	تثبت ١١ نوعاً
افريقية الجنوبية	تثبت ٤ انواع
مدغسكر	تثبت ٣ انواع
اخذت وبالريضة	تثبت ١٢ نوعاً

سوفها رها كلها متباعدة الاشكال ، منها الشجيرات والجنبات والمواد والسرمية الفروع والداسية . يبدو ان شكالتها الرئيسية تعود الى بعض العوامل التوضعية ، اخصها الضع . اوراقها اهليلجية ، معتقة ، لاقياسية الانظام ، منها المتعاقبة والمتعاقبة والقصية ومنها المائلة النصال والمريضة . ازهارها طبقية التجميع ، طرفية الارتكاز ، مخلفة الالوان . كوروسها قلبية ، حامية الانفاق . بتلاتها قديمة مستطيلة . ثمارها سميكة ، ملبية الاطراف . ثمارها مركبة من جرابين متقابلين . بزورها مستطيلة ، متكية الطرف ، لتتصير بقزعة من الحلب المستطيل الدقيق النسام || يستخرج من بزورها ، باستثناء القزعة ، مادة جميلة طيبة . شديدة المرارة تدعى سرفنتين (*Sterophantia*) كانت ولا تزال تستعمل من قبل بعض قبائل مجاهل افريقية في علاج التبال السامة . وتستعمل طبياً في علاجات القلب وانقباضه وفي تحسين الدورة الدموية واستقرار النيفس والقضاء على شيق التنفس || اشهر انواعها الطبية الثلاثة التالية .

٢٦٤٢٠ - مريضة السودان ، مريضة مريضة

Sterophantus hispidus (S). *Sterophante hérissé* (F).
نوع من المريضة . مهدا السودان ومجيبه وليجيري . جنبها



مريضة



مريضة



مريضة



مريضة



مرتبة



مرتبة



مرتبة



مرتبة

سنة، سيقها منتصب، أوراقها متقابلة، نصلها شيق الصفة المسنة الشائكة. أزهارها مستقيمة العرف، لا قياسية الانكناز، خطية الشكل، خمسة الانقسام، ثنائية القصوص الكأسية والاسدية الخمسة || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٦٤٣٥ - مرتبة صكره الزهر

Morina couleriana (F). *Morine de Coulter* (F).
بجلة تربيتية تلوم من ٦٠ الى ٩٠ سم . ساقها فراءه فناء . أوراقها خطية، نصلها بطول نحو ٢٠ سم . ويمرض نحو ٢ سم . أزهارها صفراء اللون، ثنائية التجميع، ابطة وقاجية الانكناز || أزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

Morina bulleyana (S). *مرتبة صينية*
Morine de Chine (F).
بجلة سرورية تربيتية تلوم نحو ٦٠ سم . ساقها فراءه تلومها خطوط مستطيلة من الزغب الاطلس . أوراقها سنانية تلوم من ١٢ الى ١٥ سم . أزهارها بيضاء اللون، ثورية التجميع، طرفية الانكناز || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

Morina perica (S). *مرتبة عجمية*
Morine de Perse (F).
جنية سرورية تربيتية تلوم من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فراءه . أوراقها متقابلة خفيفة، نصلها بطول نحو ١٥ سم . ويمرض نحو ٣ سم . صفحت خلية البشرة متبادعة السنين التي الحف . أزهارها ابطة وطرفية الانكناز ، وردية اللون ، خلية الصفة || أزهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٤٣٨ - مرتبة مستطيلة الورق

Morina longifolia (S). *Morine à longues feuilles* (F).
جنية تربيتية تلوم من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ساقها فراءه . أوراقها خفيفة، نصلها بطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويمرض من ٢ الى ٤ سم . حجارة متدوج الخلقة ، دقيق الحف . أزهارها متوسطة القد، ابطة وطرفية الانكناز ، ثيرة بيضاء اللون ثم تتحرف الى الوردي وتستقر على الحمرة القاننة . أزهارها يستمر من تموز الى آب .

٢٦٤٣٩ - مرتبة نوس

Mérinos (F). *مرتبة نوس*
Morino sheep (E).
فان بني مرين ، سلالة من الضأن المشهور بقرارة صوفه ونعمته وجودة صنفه .

٢٦٤٤٠ - مرتبة شيق

Murenidae (F).
هي فصيلة الشقيقات ، اطلسا .

٢٦٤٤١ - مرتبة

Mérione (F).
هو الزيد ، اطلسا .

٢٦٤٤٢ - مرتبة

Alibite (F). *Nueritive* (E).
للادة او المواد الغذائية القابلة للتشيل المباشر في الجسم .

٢٦٤٤٣ - مرتبة

Vin de bon goût (F).
الخمر اللذيذة الطعم .

٢٦٤٤٤ - مراد الائتمار

Adjudication au revidage, à la revision (F).
هو المزاد الذي يخضع لاتفاق قوم تأسروا على ان لا يتناضوا في المزايدة العلنية وذلك ليسر المطروح بمن

المتوسط باستطالة خطها ويحبها الاطلس الارزق الموج الذي يبع مع انزابه من الظهر ويبيض عند البطن || سوكها فاعرة الصنف مرغوب فيها . غوبها مأكولة متوسطة الصنف ، ويستخرج من اكبادها الصفة مادة زيتية شائعة الاستعمال .

٢٦٤٤٧ - مرتبة

Margaritana (S). *مرتبة*
Margaritana (F). *Margaritana* (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات فصليات الخياشيم ولصيلة النبادات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في منط انهر وبحيرات افريقية واروپية وآسية وأمريكة || اصداها فيه يفضية الشكل ، محدبة ، مستطيلة ، لا متساوية المسارح والاطلس . بعض انواعها ينتج اللؤلؤ الفاعرة || تعيش بين الصخور او في الرمال والاسمال . لحوبها مأكولة متوسطة الصنف .

Carthame (F). *مرتبة* *مرتبة*
هو القرم ، نبات من فصيلة المركبات ، اطلسا .

٢٦٤٤٩ - مرتبة

Murex
جنس حيوانات بحرية من الرخويات المصليات ذات الاصداق . انواعها عديدة اشهرها المريق القيثني (ابو دينار) والمريق اليوناني || اصداها مدنية شائكة . كانوا يستخرجون منه في الزمان الكافور خضابا ارجوانيا ثابثا يستعمل في صبغ انفس الثياب .

٢٦٤٥٠ - مرتبة

Muricidae (S). *مرتبة*
Muricidae (F). *Muricidae* (E).
فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مصليات الارجل وصيدات الاجهزة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمتحدة الحارة . كان لها شهرة في الزمان القابر ايام الفينيقيين اذ كانوا يستخرجون من بعض انواعها الصباغ الازرق المشهور || اعرف اجناسها واشهرها الحريق والقرنفرة والكسوس .

٢٦٤٥١ - مرتبة

Marica (S). *مرتبة*
Marique (F). *Marica* (E).
جنس نباتات عشبية جلمورية سرورية من فصيلة السوسنيات . منبتها البرازيل ، شجارتها منتصب ، رفيعة . أوراقها خفيفة النصل ، بجلة الخضار الزاهي . أزهارها زرقاء اللون او بيضاء || تزود القرنين في الحدائق . انواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الزرقاء .

٢٦٤٥٢ - مرتبة زرقاء

Marica corulea (S). *مرتبة زرقاء*
Marique bleue (F).
نوع من المريكة . منبتها البرازيل . شجارتها مستغلظ الجرم يرتفع من ٦٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها صغيرة الحجم ، خفيفة النصل ، بجلة الخضار الزاهي . أزهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الزرقاء اليلكية الملوخ || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

Sauge officinale (F). *مرتبة*
نبات طبي ، يعرف بالقوسية الحزنية ، اطلسا .

٢٦٤٥٤ - مرتبة

Morina (S). *مرتبة* *مرتبة*
Morine (F). *Whorl flower* (E). *Quirlkard* (D). *Morina* (I).
جنس نباتات تربيتية معمرة من فصيلة البهباسيات . انواعها

- Enchère (F). Auction (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٥٧
هي عرض مبلغ أجل من الأثن الاساسي أو من المبالغ التي سبق عرضها في أثناء المزاد .
- Bourrerie (F). Butter factory (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٥٨
هي معمل الزبدة، بناء مخصص لصنع الزبدة ويبيعها .
- ٢٦٤٥٩ **مَزَايِدَة** هي الخشنة ، اطلبها .
- Mazus (S). Maze (F). Mazus (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٠
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة أختنازيديات . أنواعها المعروفة قليلة العدد بعضها من نباتات لبوت الهند والبيض الآخر من استرالية وتساوية || سوقها قصيرة أو جعدة أو مدادة . أوراقها أهليلجية ملطية . أزهارها متدفقة التجميع ، شمراخي الإزهار || أعرف أنواعها وأشهرها النيران التالية .
- Mazus rugosus (S). **مَزَايِدَة خَشْنِيَّة** ٢٦٤٦١
Maze rude (F).
نوع من المَزَايِدَة . ساقها فراء قصيرة تملأ من ١٠ إلى ٢٠ سم . أوراقها مشرمة غشنة . عناقيدها الزهرية تعلل من ٨ إلى ١٥ سم . أزهارها إلى الزرقاء الباهتة الجميلة || تنويرها يستمر من أيار إلى أيلول .
- Mazus pumillo (S). **مَزَايِدَة قُصْرَمَة** ٢٦٤٦٢
Maze pygmée (F).
نوع من المَزَايِدَة . ساقها جعدة . أوراقها غشمية مستتة النصال . شمراخيتها الزهرية قصيرة . أزهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى حزيران .
- Amandier amer (F). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٣
هي شجرة اللوز المر . ج . مزج ، اطلبها .
- ٢٦٤٦٤ **مَزَايِدَة**
الزيتون : الموضوع الذي يرسل منه الحمام الزاجل الهادي .
- Concurrentiel (F). **مَزَايِدَة حَامِيَّة** ٢٦٤٦٥
Competitive (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو قابل للمزايدة .
- Sep (F). Frame of plough (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٦
قطعة من الخرافات ترسب في قعر التلم عند الحراثة .
- Terroir (F). Soli (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٧
هو الميصر ، اطلبه .
- Binaire (F). Binary (E). **مَزَايِدَة** ٢٦٤٦٨
هو كل مركب من عنصرين .
- Bilatéral (F). **مَزَايِدَة الْأَطْرَاف** ٢٦٤٦٩
Bilateral (E).
هو كل اتفاق أو عقد ملزم للجانبين المتعاقدين .
- Diotocardes (F). **مَزَايِدَاتُ الْأَذْنِ** ٢٦٤٧٠
قسم من الرنويات المدية .
- Amphipodes (F). **مَزَايِدَاتُ الْأَرْجُلِ** ٢٦٤٧١
Amphipoda (E).
رتبة من القشريات .
- جنس حل أحمر فيمينه ويقسمون الفرق بين الثمين وهو من الاعمال غير المشروعة التي يماقها القانون .
- ٢٦٤٤٥ **مَزَايِدَةُ النَّهْرِ** ، **مَزَايِدَةُ الْأَسْتِرْسَالِ**
Adjudication sur folle enchère (F).
هو ما يعرف بإعادة المزاد على ذمة الملتزم .
- ٢٦٤٤٦ **مَزَايِدَةُ النَّاقِصَةِ** ، **مَزَايِدَةُ**
Adjudication au rabais (F).
هو أن يرسو الالتزام أو البيع على من يعرض أدنى ثمن يلتزم به القيام بالمثل على الوجه المفصل والشروح في دفتر الشروط وفي البيان التفصيلي للمعروض لتتنافس المتنافسين .
- ٢٦٤٤٧ **مَزَايِدَةُ جَبْرِ**
Adjudication sur saisie immobilière (F).
هو المزاد الذي يتم حجب الحيز العقاري بعد الإجراءات القانونية المعروفة من تسجيل ونشر .
- ٢٦٤٤٨ **مَزَايِدَةُ قَضَائِي**
Adjudication judiciaire (F).
هو الذي يجري في المحكمة وفقاً لنص قانوني أو امر رسمي بعد استكمال الإجراءات القانونية .
- ٢٦٤٤٩ **مَزَايِدَةُ تَعَذُّرِ الْقِسْمَةِ**
Adjudication sur licitation, Licitation (F).
هو مزاد يقع على مقدار شائع بين ملاك كانوا أشترية أو ورثوه ولا يمكن قسمته حيناً .
- ٢٦٤٥٠ **مَزَايِدَة**
Bletissement, Bletcissure (F).
Becoming over-ripe or sleepy (E).
المزارة كالقوب والتفول هو زيادة نضج الثمر أو ابتلاء ذبوله بعد تمام نضجه .
- ٢٦٤٥١ **مَزَايِدَة** ، **مَزَايِدَة** ، **مَزَايِدَة** ، **مَزَايِدَة**
Métayer (F). Metayer (E).
هو من استعمل الأرض بالمزارة .
- ٢٦٤٥٢ **مَزَايِدَة** ، **مَزَايِدَة**
Métayage, Colonage (F). Metayage (E).
هي أجرة مزرة إلى أجل ما يدفع المستأجر بمقتضاها إلى المئزر قسماً من حاصلاتها بنسبة يتفقان عليها . ويقال للمستأجر مزارع . وهذه المزارعة قد تكون :
- ٢٦٤٥٣ **مَزَايِدَة بِالْقَوَكِيلِ**
Colonage partiaire (F).
مزارعة المحاسبة
- ٢٦٤٥٤ **مَزَايِدَة**
Colonage perpétuel (F).
مزارعة مستديمة
- ٢٦٤٥٥ **مَزَايِدَة بِالْقَوَكِيلِ**
Absentéisme (F).
Absenteeism (E).
استغلال الأرض بالمزارة على أن يشغل صاحب الأرض بوكيل .
- ٢٦٤٥٤ **مَزَايِدَة**
Hérison (F).
هو القنطذ ، اطلبه .
- ٢٦٤٥٥ **مَزَايِدَة الْعَمَلِ**
Vacation
هو الوقت الذي يقضيه بعض الأشخاص للزور بهم عمل معين في القيام بأعمال هذا العمل أو المهمة .
- ٢٦٤٥٦ **مَزَايِدَة حَقِيقِيَّة**
Command (F).
هو الذي يستمر يوم المزابدة حتى يرسو المزاد على سواء ظاهراً في حين أنه صاحب الصفقة .

٢٦٤٧٢ - مُزْدَوِجَات الأصابع

Artiodactyles (F). Artiodactyla (E).
رَبِية من البليات منها الخنازير والحمير.

٢٦٤٧٣ - مُزْدَوِجَات التَّنَفُّس

Dipnès, Dipneustes (F). Dipnoi (E).
طائفة من الاسماك تعتبر حلقة الانتقال بين الاسماك والقرود.

٢٦٤٧٤ - مُزْدَوِجَات الخَيْطُوم
Dibranches (F).
رَبِية حيوانات من الرخويات الرأسيات الايليل.

٢٦٤٧٥ - مُزْدَوِجَةُ التَّقْطِيع
Décussée (F).
Decussate (E).
هي الاوروال المتقاطعة اثنتين اثنتين تقاطعاً عمودياً.

٢٦٤٧٦ - مُزْدَوِجَةُ الفَلَقَة
Dicotylédones (F).
Dicotyledon (E).
أحد قسمي مستورات البزور من النباتات. راجع ثنائية الفلقة.

٢٦٤٧٧ - مُزْدَوِجَةُ السَّكَم
Distyle (F).
Distyle (E).

نمت تمريني يطلق عل كل نبات ازهاره مزدوجة أقلام اليبات.

٢٦٤٧٨ - مُزْدَوِجَةُ المَيْسَم
Distigmate (F).
Distigmat (E).
نمت تمريني يطلق عل كل نبات ازهاره مزدوجة المياس.

٢٦٤٧٩ - مَزْرُ
Bière (F). Beer (E).
هو البيرة تحميصاً وهو القنديل المحتلص من سائر الحبوب للشوية كالشعير والحنطة والذرة ...

٢٦٤٨٠ - مَزْرُوب اخْتِلاَئِي
Forcherie (F).
راجع زريبة المختارير.

٢٦٤٨١ - مَزْرُودَة * ، مَزْرُوع جَبَّار
Priodontes giganteus (S).
Priodonte, Tatou géant (F).

حيوان لبون اهدر وحيد الجنس والنوع من فصيلة المُرَّعَات. موطنه معظم غابات امريكا الجنوبية. يألف المواقف القريبة من الماء. مسرعه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر. ملجئه الحيائي فردي الا في زمن التساقط والحضانة التي تستمر نحو ستة اشهر. وجاره نفق تسجل مستطيل يحفره بين جدران الاضمار. قوته الغذاء والحيات والوزغ والقنارن وبعض المواد النباتية || جسمه شبه اطيالجي الشكل، قليل الفلحة، بطول نحو ١٦٠ سم. بما فيه الذب الذي يبلغ ٥٠ سم. رأسه مخروطي الشكل. اذناه يوقتان قصيرتان. جرابه قصيرة خاسية الاصابع الامتدادية الطويل المسننة باظفار حادة اعصها اظفار الاصابع الثلاثة والاربعة من الجرايم الامامية. رأسه وجسمه وفليه مغطاة بدمر من ازرد العظمي المادة. لونه اسود الغلي باستثناء الرأس والبطن والذنب فإنها الى البياض الاثير.

٢٦٤٨٢ - مَزْرُوعَة ، مَشَارَا ، جَرِيَّة ، كَرْدَة ، عَزْبَة
Ferme, Métairie (F).
Lasse, Farming, Land, Small farm (E).

٢٦٤٨٣ - مَزْرُوكَة

المزركة. ج. مزارف. هي اليسات في التربة وقد سالت بها الدرة عيس فيها الماء حتى تمتلئ ثم يساق الماء الى فيرها.

٢٦٤٨٤ - مَزْرُوكَة
Closque (F). Closca (E).
فجوة المسالك البولية والمعدة والتناسلية عند بعض القاريات واعصها الطير.

٢٦٤٨٥ - مَزْرَعَايَات *
Boinés (F).
عارة من فصيلة البواليات. اجناسها وانواعها عديدة. منظمها من حط المناطق الاستوائية الامريكية ويبرز المحيط الهادي، اعصها مدخكر. وبعضها اسيري وافريقي || اجسامها متباينة الاطوال التي تراوح من متر الى عشرة امتار || اشهر انواعها :

Anascunda (F).
Boa constrictor (F).
Boa arc-en-ciel (F).
Boa de Cook (F).
Boa javelet (F).

٢٦٤٨٦ - مَزْرُوكَة *
Epinette (F).
Spinet, Box for fattening poultry (E).

قفس يرب فيه للدجاج المد للتسمين.

٢٦٤٨٧ - مَزْرُوكَة * ، مَشْهَر
Luscinia succia (S).
Gorge-bleue à miroir roux (F).
طائر من الفزار وفصيلة اللعليات. صغير اليفة طوك نحو ١٥ سم. ثوبه متركب الالوان الجميلة التقيق والزعفر. صفه مقلد بالازرق || هو من القرايط محبوب البلاد في طلب الرزق. قوته الحشرات والديدان وبعض الحار المتينة التي تدلك في الحريف. يألف الملتع والجاري الماء وصفات البحيرات. يفتن انصومه بين الابدال وفي المقاصب. انثاه تحضن من ٤ الى ٦ بيضات نحو ١٥ يوماً.

٢٦٤٨٨ - مَزْرُوكَة
Gaveuse (F).
Cranning apparatus (E).

٢٦٤٨٩ - مَزْرُوكُوب *
Hybride (F).
Hybrid, Mongrel (E).
المزكوب كالمسلاج، نمت تمريني يطلق عل كل حيوان او نبات جبين.

٢٦٤٩٠ - مَزْرُوكُوم *
Fécondé, Imprégné (F).
Imprégate (E).
نمت تمريني يوصف به البئيس المكوش الصالح لترسيم.

٢٦٤٩١ - مَزْرُوكَا
Glissière (F). Slide (E).
٢٦٤٩٢ - مَزْرُوكَا
Glottes (F). Glottis (E).
هو فم الخنجره او فم قصبه الرئة.

٢٦٤٩٣ - مَزْمَار الراعي * ، مَسْكَس
Alisma (S). Alisme, Pléauze (F). Water plantain (E).
Froschküpfel, Wasserflesch (D). Alismo (I).
جنس نباتات جيلسورية مائية معمرة من فصيلة الزماريات. انواعها عديدة معظمها يعيش في الاموار والنانع المشمورة



مَزْدَة



مَزْ



مَزْ



مَزْمَار الراعي

Parallaxe (F). Parallax (E). ٢٦٥٠٢ - مَزَوَاة
المزواة زاوية عند كل نجم أو كوكب يقابلها قطر الفلك الأرضي أو نصفه .

Pantomètre (F). ٢٦٥٠٣ - مَزَوَاة
Pantomètre (E).
جهاز يستعمل في قياس جميع الزوايا والأبعاد .

Clinomètre (F). ٢٦٥٠٤ - مَزَوَاة
Clinometer, Inclinator (E).
المزواة جهاز يستعمل في قياس الميل الحاصل بين خط مستقيم وخط أفقي .

Goniomètre (F). ٢٦٥٠٥ - مَزَوَاة
Goniometer (E).
هو المنقلة، جهاز يستعمل في قياس زوايا الأرض عند مساحتها .

Anguleux (F). Angulus (E). ٢٦٥٠٦ - مَزَوَاة
نمت تعريفي وصفي يطلق على ما كان شكله كائزارية .
Crèche (F). Manger (E). ٢٦٥٠٧ - مَزَوَاة
هو وعاء الزاد .

٢٦٥٠٨ - مَزَوَاة
المزود والملطف والثرة ثلاثة أسماء لنجم واحد من كوكبة برج السرطان .

Masoreus (S). ٢٦٥٠٩ - مَزَوَاة
Masorée (F). Masoreus (E).

جنس حشرات من فصيلة المزوريات ورتبة غدييات الاجنحة . أنواعها المعروفة عشرة اصطلحنا بعض مناطق افريقية والمهند وروبية . بعض أنواعها أصبح عكاشي لاتنتفع مع الفسق السوداني الى جميع مرائف العالم الى اجسامها صغيرة ، متدلة أتبسط ، تقو من ٤ الى ٦ مم . رؤوسها متدلة الجرم . عينها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية ثلاثية الشكل . تأشيرها وفكوكها وملاسها قياسية . كواسلها ضيقة القواعد . بطونها مفلطحة . الحامدها لاسفة ، سباحية الاغاديي النحلة القاطية ، يملؤها بعض الحلب . غنايبها قوائمها مجهزة بمخاض متشارية التستين الى الحشرة الجملانة مفترسة ودائمة البرقة ايضاً .

Masoreidae (S). ٢٦٥١٠ - مَزَوْرِيَّات
Masoreidae (F). Masoreidae (E).

فصيلة حشرات من لمديات الاجنحة . اجناسها وأنواعها المعروفة متصلة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة الى اجسامها صغيرة تقو من ٤ الى ١٠ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرة القطن . عينها ناشرة . تأشيرها وفكوكها قياسية . قرونها الاستشعارية ضخمة ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرة ، ضيقة القواعد المنصورة . الحامدها سباحية الاغاديي النحلة القاطية ، يملؤها في حشارها بعض الحلب . قوائمها نشطة . غنايبها كثيرة الحلب الشائكة ومجهزة بمخاض كبيرة ، متشارية التستين . تألف الحلق المزدودة وريال السواحل . جميعها دائمة ومفترسة . اشهر اجناسها المزور الذي يكثر وجوده في زراعات الفسق السوداني .

ويضاها يكثر على ضفاف البحيرات والأنهر . اوراثها اربية الانتشاب ، لا قياسية الشكل والحجم . انذارها ضمية التجميع صغيرة القد سريعة الشطب . قال الانطاكي : « نباتات طيبة الرائحة يزورها تحلل الارياح والسموم مطلقاً وارجاع الارياح وتدر البول وتقت الحصى وتخلل الانتفاخ والملح مع يدر الحزور والسيل . واذا شغل به الشمر طوله ويطيب رائحة القراس . »

٢٦٤٩٤ - مَزَارُ الراعي المائي* ، اذان العنتر
Allium plantago (S). Flotteau plantain, Plantain d'eau (F). Mad-dog weed (E). Echter Froschbiss (D). Plantagine acustica, Barba silvana (I).
نوع من مزار الراعي تكثر زراعته في احواس الماء للترين . عشبه تقو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه كبيرة القد بيضيه الشكل ، نصلها قلبي القاعدة ذلق الزام الاخير . انذاره كثيرة العدد صغيرة الحجم لوها الى البياض المخض بالوردي . وهو نبات طبي صيره مرطب خافض لحرارة ويدر البول .

٢٦٤٩٥ - مَزَوْرِيَّات
Alismaceae (S). Alismaceae (F). Alismaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقة . اجناسها وأنواعها كثيرة العدد، جميعها نباتات جلمورية متغمة او عالة . اوراقها اربية الانتشاب منقطة . انذارها متعدية التجميع مستطيلة الزناد المنقصب .

٢٦٤٩٦ - مَزُوْهَج
Luxuriant (F). Luxuriant (E).
نمت وصفي يطلق على النباتات الريان النضر الرخم .

٢٦٤٩٧ - مَزُوْهَل
Myzomela (S). Myzomèle, Misomèle (F).
جنس طير من الجوارح رقيقيات المناقير وفصيلة المغتريات . انواعها المعروفة نحو ١٥ موطنها يمتد من استراليا الى ماليزية . ملجئها احيائي جامي . جامتها قليلة العدد . تألف البراري والادغال . قوتها الحشرات الممنعة والديدان ورسق الانهار الى اجسامها صغيرة القد تقو من ١٢ الى ١٥ سم . مناقيرها مدبة الاطراف المدبة . اجنتها متدلة الجرم . اذنانها منقطعة . افراسها متباينة الالوان جميعها زاهية الخصب الى انثا ايمت عصباناً من ذكورها . قدان احشاشها في الادغال . انثا تحض متباية الذكور ، على مرتين في الحول ، من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

٢٦٤٩٨ - مَزُوْهَم
Intrusif (F). Intrusive (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان له صفة التزم .

٢٦٤٩٩ - مَزُوْهَارَة
Multiflora (F). Multiflorous (E).
نمت تعريفي يوصف به كل نبات كثير الازهار .

٢٦٥٠٠ - مَزُوْهَارِيَّات
Anthozoaires (F). Anthozoa (E).

فئة حيوانات بحرية من المبرقات تتميز بمدائنها المشابة بالازهار البحرية .

٢٦٥٠١ - مَزُوْهَر
Florifère (F). Floriferous (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نبات مزهر او كثير الزهر .



مزار الراعي المائي



مزول



مزان



مزور

٢٦٥١١ - مَرْزُوقَة * ، كَبْدَمَة مَرْزُوقَة

Labrus turdus (S). Labre tourd, Tourd (F).
Labrus turdus, Wrasse (E).

نوع من الكبد. سمكة بحرية بيضاء. أصلها من قاع البحر الأبيض المتوسط. تتميز من أسماك الجراح والحشاش جسمها احليجي الشكل، ي طول من ٢٧ الى ٣٠ سم. ثوبها قليل اتيان بين الشقين. اللون السالم الاخضر يمح وتشتد لحيته عند الظهر ويغير عند البطن. خضاب الذكر ابيض ولحم من خضاب الانثى || رأسها مخروطي الشوذن. شكلها متعادلان. شفتها متوسط الانفرج. اسنانها كبيرة، حادة. عيناها كبيرتان جاحضتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة، ارجوانية اللون يملها بليج ازرق واخضر. زعانفها الصدرية والشرجية تتحلل بخضاب الظهريه. الحوضية جزئية اللون اما الذيلية فسنانية الشكل، جزئية اللون يملها كالظهريه تبيج ازرق واخضر || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

بسطها من ٤٠ الى ٤٥ سم. ورؤسها مستديرة، خنابها البويية الشكل فارقة || تنوش جهات قليلة البعد. تأثت الانجبار الحربية الخفيفة. مسرهما من الفس الى الصبر. قوتها الجار على اختلاف انزلها.

٢٦٥٢١ - مَسَاد
Pot (F).
نحي السنن أو السمل.

٢٦٥٢٢ - مَسَادَح مُسَاعِيَة

Paramètres climatiques (F).
Climatic parametars (E).

المساح المناخية مجموعة العوامل الواجب معرفتها في تحديد اقليم معين أو كورة || بقمة || اهمها ملجن الاطار وكبتها وتوزيعها. البخر. الاشعاع الشمسي. الحارات القصوى والدنيا والرياح. الرطوبة الجوية النسبية. الروية. الرياح. الضغط الجوي.

٢٦٥٢٣ - مَسَار
Electroda
هو للابح، اطلية.

٢٦٥٢٤ - مَسَارِيح ، مَسَارِيكَة
Mésentère (F).
Mesentery (E).
هي طيات الصفاق.

٢٦٥٢٥ - مَسَارِيحُ الْخَصِيَة
Mesorchium

٢٦٥٢٦ - مَسَارِيحُ الْمَبِيض
Mesovarium

٢٦٥٢٧ - مَسَاس
Allame (F).
نبات طبي جلموري مائي يعرف بملار الرامي، اطلية.

٢٦٥٢٨ - مَسَاسَة
Anredra (S). Anridère (F).
جنس نباتات معمرة عارضة من فصيلة المرمقيات. انزاه قليلة نفا البرية والزراعية الفريينية. اصلها البلاد الحارة. انزلها حيلة الشكل ملونة.

٢٦٥٢٩ - مَسَاعِدَة
Assistance (F).
هي الاسعاف، راجية.

٢٦٥٣٠ - مَسَاعِدَة ، مَسَارِيكَة
Beil à complant
هي ان يغير المالك مزرعاً مغروساً او غير مغروس فيلزم المسأجر أما يتعهد اغراسه او يفرسه مقابل مقدار معين من الثار. ويشترط فيه وجوب قيام المسأجر بالترامه حل اكل وجهه والا تلغش الاجارة حتماً بدون مقاضاة.

٢٦٥٣١ - مَسَالِف
Passéiste (F).
المسالف الخشاع المنجب بالمعني.

٢٦٥٣٢ - مَسَالِكُ تَنَاسُلِيَة
Conduites génitiaux (F). Genital ducts (E).
هي الموادر التناسلية.

٢٦٥٣٣ - مَسَكَمِي
Poreux (F). Porous (E).
ذو مسام.

٢٦٥٣٤ - مَسَامِيَة
Porosité (F). Porosity (E).
كون الشيء ذا مسام.

٢٦٥٣٥ - مَسَاهِم
Actionnaire (F).
Shareholder (E).
هو كل من يملك سهماً في شركة سلمية.



مَرْزُوقَة



مَرْزُوكَة



مَسَاعِيَة

٢٦٥١٢ - مِزْوَكَ *
Gnomon, Cadransolaire (F).
Sun-dial, Gnomon (E).

هي الساعة الشمسية، قولها قضيب عمودي ميل ظله يحدد الوقت.

٢٦٥١٣ - مِزْوَكَ ٥
Goniométrie (F).
Goniometry (E).
هي علم قياس الزوايا.

٢٦٥١٤ - مِزْكَير
Dasyphyllie (F).
من الاوراق ما كانت نصلها كثيفة الزوبر.

٢٦٥١٥ - مِزْزِيَات ٥
هو المدعان او مقياس الاحداث.

٢٦٥١٦ - مِزْزِيَوْت ٥
Oléagineux (F).
Oleaginous, Oily (E).
هي الاغضاء النباتية، اغصنها البزور والثار، الفنية بالمواد الزيتية.

٢٦٥١٧ - مَسَاح ، مَسَاح
Arpenteur, Géomètre (F). Surveyor, Geometer (E).
الذي يمسح الارض فيقيس طولها وعرضاها لحرفة مساحتها. راجع ارني.

٢٦٥١٨ - مِسَاحَة
Superficie (F).
Superficies, Area (E).
قياس سطح الشيء.

٢٦٥١٩ - مِسَاحَة
Cadastra (F).
Cadastral survey, Survey (E).

المساحة هي مجموعة الفئات والرسوم والخرائط التي تكد على مساحة الاراضي الزراعية وغير الزراعية وبيان الابنية والمقارنات وتخطيطها وتحديد ما حل وجهه التفصيل في البلاد. ويراد بها ايضاً الاحمال نفسها التي يقوم بها الاختصاصيون الذين تنوبهم الادارة هذه المهمة. الفرض الرئيسي من هذه الاحمال هو تحديد الملكية العقارية بالفتة الواجبة ثم تقدير الضرائب التي يتقوى الملاك على دفعها منظراً لنها الى ثمن الاملاك ودخلها.

٢٦٥٢٠ - مَسَاحَة ٥
Harpyis (S).
Harpie céphalote
جنس حيوان من فصيلة الطوايطات. انزاه المعروفة ثلاثة، موطنها الشرق يبرز المحيط الهادي حتى استرالية. اجسامها صغيرة للقد، طولها يراوح من ١١ الى ١٢ سم.

Intimé (F). **مُستأنف عليه**
Respondent, Defendant (E).
هو المتداعي الذي استأنف الحكم الصادر بحقه .

Néophyte (F). **مُستجيد**
Neophyte (E).
التحق حديثاً .

Mire à œufs (F). **مُستجلي**
أداة خاصة بفحص البيض حل الضوء الصناعي تميزاً
لمركزهم من غير المركز .

Creux (F). **مُستجرف**
نمت تعريفي يطلق حل التبورج البادئة الطعم المائل أو
التي يتميز عليها ببب فافع بمبه اللرق .

Lapidifique (F), Lapidific (E). **مُستحجر**
صالح للحجر .

Bénéficiaire (F), Beneficiary (E). **مُستفيد**
مُستفيد

Emulsion **مُستحلب**
سائل مائع يحصل زائداً من المواد النعنية أو الراتنجية
المعلقة .

Sensitive (F). **مُستحسنة**
حسنة زينة مركبة تلمى حسنة ، أطلها .

مُستخدم ، **مُخدوم**
Employeur (F), Employer (E).

رب العمل الذي يستعين على عمله بالذين يستعملهم .

Employé (F). **مُستخدم**
Employed, Servant (E). كل من أدى الخدمة المنوطة به .

مُستخرج ، **مُخلص** ، **عُلاصة**
Extrate (F), Extract (E).
هو جزء من عقد رسمي أو حكم يُلخس بحرفه ويسلم إلى
طالبه ويكون له قوة الأليات التي لست الأصل .

Polygalées (F). **مُستدرات**
هي البوليفانيات ، أطلها .

Latier (F). **مُستدر**
هي البوليفان ، أطلها .

Echauffent (F), Heating (E). **مُستفيط**
نمت تعريفي يطلق حل الاصلاح والحبوب التي تلتظ حرارة
الجسم وتسبب الادفاء .

Commodataire (F). **مُستجير**
هو الذي يأخذ المين المارة من المير في عقد المارية .

Firme (F), Firm (E). **مُستقل**

Firme agricole, **مُستقل زراعي**
Exploitation agricole (F), Farming (E).

Futurisme (F). **مُستقبلية**
Futurism (E).

المستقبلية نظرية حديثة في فلسفة الفن قولها مزيج من

٢٦٥٣٦ - **مُساهمة** ، **مُساهمة المُرمكة**
Contribution
هو أن يسام كل واحد من الزموا دفع دين مشترك في
دفع حصة من هذا الدين من الجميع .

٢٦٥٣٧ - **مُسكو** ، **مُكافئ**
Equivalent

٢٦٥٣٨ - **مُسَاوَاة** (E), Equality, Parity (F).
Egalité (F).

٢٦٥٣٩ - **مِسْبَاح**
Limnomètre (F),
Limnimeter (E).

هو المقياس جهاز يستعمل في تقدير أوضاع مستوى
البحيرات .

٢٦٥٤٠ - **مِسْبَار** ، **مِرْجَاس**
Sonde (F),
Sounding-line, Lead (E).

أداة السبر ، تقع حل اشكال مختلفة . تستعمل في الطب
والزراعة والأرض .

٢٦٥٤١ - **مِسْبَال** ، **أَبُو سِبَال** ، **فُرُفُف**
المُغاصب
Panurus (S),
Panure, Mésange des roseaux (F).

جنس طير من فصيلة القرقيفيات . أنواعه المروعة قليلة
العدد ، أصلها الشرق الاوسط وأوروبية الجنوبية والشرقية .
اجسامها وأذناها مسطبة . اجنتها محتلة القد ،
منقروها الأطراف . منقروها قصيرة مستقيمة القواعد ،
مسقة أطراف الخافض العليا البيضة الصمغين || أعرف
أنواعه وأشهرها المسال القضي .

٢٦٥٤٢ - **مِسْبَال لَفِي**
Panurus biarmicus (S), Panura à moustaches (F).
Bearded titmouse (E).

طائر من المسال . طوله نحو ١٧ سم . سبال لطفه سيوا
خلفية تمتد من الزنبد وقاعدة الجفن إلى طرف العنق . رأسه
إلى الزنقة الرمادية المواج . عنقه ووجهه إلى الأبيض
القضي . ظهره إلى الصبهة الصنابية . جناحه إلى السمرة
الحظية الجعدة بالأبيض . بطنه إلى الصبهة الفاتحة . ذنبه
وتاجي الريش المتراكب ، أصغر اللون ، حنطلي المواج .
منقاره وصقعة حية إلى الصفار المايق . ريشه وأصابعه إلى
الردة الرصاصية || أصلها الشرق الاوسط وأوروبية الجنوبية
والشرقية بألف المناطق والمغاصب والمجاري الماء || قوته
الحفريات وبلور النباتات المنقمة والمالية || يذئن في
الادخال والاصل . عنه كالمجرب تقع فيه الاثن من ٩
إلى ٨ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوماً .

٢٦٥٤٣ - **مِسْبَلَك** ، **مِسْبَر**
Fonderie (F),
Foundry (E).

لعمل المعيز لتلويب المعادن وصبا .

٢٦٥٤٤ - **مِسْبَل** ، **عُتْل**
Organe mâle des insectes (F), Manly organ of in-
sects (E).

٢٦٥٤٥ - **مُسْتَجِير**
Locataire (F),
Tenant, Lodger (E).

هو الذي تستعد الاجارة من مالك المين باسمه .

٢٦٥٤٦ - **مُسْتَأْنَف** (E), Appealing (F).
Appellant (F), Appealing (E).
هو المتداعي الذي يستأنف الحكم الصادر .



مِسْبَار (١)



مِسْبَار (٢)



مِسْبَال لَفِي



مِسْبَل

٢٦٥٧٧ - مُسْتَكْتَفُ الْحَلِيبِ *

Lacto-densimètre (F). Lacto-densimeter (E).
ميزان خاص يقيس كثافة الحليب .

٢٦٥٧٨ - مُسْتَكْتَفُ الزُبْدِ كَ*

Lacto-butyromètre (F). Lacto-butyrometer (E).
ميزان خاص يقيس زبدة اللبن أي مقدار المواد السنية في الحليب أي اللبن .

٢٦٥٧٩ - مُسْتَكْتَفُ دَعْمَانِ*

Décombant (F). Decumbent (E).
نمت تعريفى وصنى يطلق حل غثت الجروع والقروع النباتية المسترخية التي لا تستطع الانتصاب .

٢٦٥٨٠ - مُسْتَكْتَفِ*

Absorptiomètre (F).
Absorptiometer (E).
جهاز يستعمل في قياس مدى الحسور القوارة للفساز الكربونيكى .

٢٦٥٨١ - مُسْتَكْتَفِ*

Pépière (F). Nursery (E).
هو المشتل ، اطلبه .

٢٦٥٨٢ - مُسْتَكْتَفِ*

Document, Titre (F).
Document, Title (E).
هو السند ، اطلبه .

٢٦٥٨٣ - مُسْتَكْتَفِ*

Hélodes (F).
نمت تعريفى يطلق حل كل ما له صلة بالمستعجمات كالنباتات المستقيمة والحشرات المستقيمة .

٢٦٥٨٤ - مُسْتَكْتَفِ*

Mycetobia (S).
Mycétobia (F). Mycetobia (E).
جنس حشرات من فصيلة المستويات رزقية ذوات

الجناحين . أنواعها المروقة سبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || أجسامها صلبة ، نحيلة ، تطول من ٢ الى ٤ م . رؤوسها مكورة . حوزنها متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الإناث . قرونها الاستشعارية عجيطة . ملاسها مستطيلة . أعطاشها صلبة وقصيرة . كواسلها وبطنها شبه اسطوانية . رواشها ملونة . قوائمها مستطيلة ، مهدبة الظنايب || أسرارها عاردة ، تمش على العنقور .

٢٦٥٨٥ - مُسْتَكْتَفِ*

Mycetobillides (S).
Mycétobillides (F). Mycetobillides (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين ، أجسامها وأزواجها

المروقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || أجسامها صلبة ، تطول ٢ الى ٦ م . رؤوسها شبه مكورة . حوزنها متباعدة عند الإناث ، متقاربة عند الذكور . زلثاتها ثلاثية عند الفدين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، مركبة من ١٧ فصلة . ملاسها ملونة . قوائمها مستطيلة || يرقاتها ملكية تمش على المصرة النباتية التي ترشع من الجروح || أشهر أجناسها المستوية .

٢٦٥٨٦ - مُسْتَوْدَعٌ ، مَعْدُونٌ ، حَاصِلٌ

Dépôt (F). Depot, Warehouse (E).

٢٦٥٨٧ - مُسْتَوْدَعٌ عَمَلَقِيرِ*

Office (F).
Dispensary (E).

الإلكار الخالية للتضاربة . ركيزتها مادة ملونة مستمرة التجديد . وصل الكلمة أن تستحث الشعور وإلا فلا لزوم لها .

٢٦٥٩٥ - مُسْتَكْرَاتُ أَنْبِيَاثِيمِ *

Pérennibranches (F).
فئة من السرفويات تتميز باستمرار وجود جهازها الفلوسفي في مختلف أطوارها الخالية ، من الطور البلمبى الال طور البالي .

٢٦٥٩٦ - مُسْتَكْتَفِ*

Polarimètre (F).
Polarimeter (E).
مقياس الاستقطاب .

٢٦٥٩٧ - مُسْتَكْتَفِ*

Polarisant (F).
Polarizant (E).

٢٦٥٩٨ - مُسْتَكْتَفِ الْعِمَالَاتِ*

Dialypécales (F).
Dialypetalous (E).
نمت تعريفى يطلق حل النباتات ذات الأزهار المستقلة البتلات .

٢٦٥٩٩ - مُسْتَكْتَفِ الْأَطْرَافِ*

Rectiligne (F).
Rectilinear (E).
الحيوان الذي تشكل أطرافه خطوطاً مستقيمة لا احيدباد نها ولا تقعر .

٢٦٥٩٠ - مُسْتَكْتَفِ الزُبَانِ*

Recticorne (F).
نمت تعريفى يطلق حل كل حشرة مستقيمة الزبان .

٢٦٥٩١ - مُسْتَكْتَفِ الْمُنْقَادِ*

Rectirostre (F).
نمت تعريفى يطلق حل كل طائر متقاده مستقيم الشكل .

٢٦٥٩٢ - مُسْتَكْتَفِمْكَاتِ الْجَنَاحِ*

Orthoptéroïdes (F). Orthopteroids (E).
طبقة حشرات تنتمي الى شعبة اليرقانيات وطائفة الحشرات أصلاً . تشمل حالياً خمس رتب وهي اللزليات والاشيانيات والقصصيات ومستقيمة الاجنحة والجملفيات . جميعها كبيرة النفع مستطيلة الساق . أرسافها مفصليّة تتكون من ثلاث عقل أو أربع . انانها تتميز بأجهزتها التناسلية المسلسلة بمرزات قوية .

٢٦٥٩٣ - مُسْتَكْتَفِمْكَاتِ مَعْلَقَاتِي*

Lignes droites concourantes (F).

٢٦٥٩٤ - مُسْتَكْتَفِمْكَاتِ الْأَجْنَحَةِ*

Orthoptera (S). Orthoptères (F). Orthoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة مستفحات الاجنح . فصائلها وأجناسها وأزواجها كثيرة العدد تشمل أكبر مجموعة من الحشرات الكبيرة اللد . أجسامها واشكالها وألوانها عديدة || من أشهر فصائلها الجندبنيات والجراديات والقبوطيات .

٢٦٥٩٥ - مُسْتَكْتَفِمْكَاتِ الْعُرْوِ*

Rectinerve, Rectinerviée (F).

نمت تعريفى يطلق حل كل رفة متوازنة العروق المتجهة من القاعدة الى القمة .

٢٦٥٩٦ - مُسْتَكْتَفِ*

Aréomètre, Densimètre (F). Aræometer, Densimeter (E).
مقياس الكثافة .



مستكف



مستكف الحليب

Triangulation ٢٦٦٠٣ - **مِسْتَحْكَة**
علية تأريخ وديم بواسطة المثلثات تمهيدا لكليل المساحة.

Oserale (F), Oser-bed (E). ٢٦٦٠٤ - **مِسْتَحْرَكَة**
منبت السوحر أي المصفاة .

Broyeur (F). ٢٦٦٠٥ - **مِسْتَحْق**
Braking machine (E).
آلة تستعمل لسحق المسائل وللكسب وما أشبه .

Broyeur-effibreux (F). ٢٦٦٠٦ - **مِسْتَحْق مِسْحَق**
آلة لسحق وأشقر أكل من المسحق العادي .

Broie (F), Brake (E). ٢٦٦٠٧ - **مِسْحَكَة**
آلة تسحق بها سوق القنب والكتان قبل مشقتها .

Gourmette (F). ٢٦٦٠٨ - **مِسْحَل**
Curb, Curb-chain (E).
سلسلة منبوعة متصلة بطرفي الشكبة تكون تحت جملة الفرس السفلى .

Catalyse (F), Catalysis (E). ٢٦٦٠٩ - **مِسْحَكَة**
هي التحليل بالاملاسة أو الإختلال بمجرد ملاسة مادة أخرى لا تتغير .

Catalytique (F). ٢٦٦١٠ - **مِسْحَكِي**
Catalytic (E).
هو ما يتميز بالإختلال اللسي .

Poudre de sang (F). ٢٦٦١١ - **مِسْحَق الدَّم**
مركب عضوي تجد فيه السج النباتية والحبرانية مغلف المواد الغذائية اللازمة لحياتها . وهو يستعمل من الدم بعد تجفيفه ومعالجته للقضاء على رائحته الكريهة . مظهره الخارجي حبيبات دقيقة صمراء اللون سواء المواجه للامع . يستعمل في أطراف البوابين على اختلاف أنواعها ويستعمل في الزراعة كمهاد أزوتي عضوي لأنه يحوي من ١٠ إلى ١٤ ٪ من الأزوت . وهو من أنشط الاسمدة الطبيعية لكنه يبطئ الاندخال والتأدية .

Poudre d'os (F). ٢٦٦١٢ - **مِسْحَق العظم**
صماد فسفوري عضوي يستعمل من العظم الذي يحوي الكثير من فسفات الكلس وكربونات الكلس || أشكاله التجارية المستعملة ثلاثة : الخام واللاشمعي واللاشمعي .

Poudre d'os brut (F). ٢٦٦١٣ - **مِسْحَق العظم الخام**
هو الخشائي من صنف العظام كما هي دون معالجتها وهو يحوي من ١٥ إلى ٢٥ ٪ من الحامض الفسفوري ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت .
غير أن ما يحوي من شحم ، يؤثر فاعلية الحسب ويثقل بعض الأوصاف البكتيرية المؤذية ، يجعله محدود الاستعمال .

٢٦٦١٤ - **مِسْحَق العظم اللاشمعي**
Poudre d'os dégraisée (F).
هو الخشائي من صنف العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم . وهو يحوي :
من ١٥ إلى ٢٥ ٪ من الحامض الفسفوري
ومن ٣ إلى ٥ ٪ من الأزوت
وهو قليل الاستعمال كمسحوق العظم الخام .

٢٦٥٨٨ - **مِسْتَوْرَات البزور**، **هَكَائِيَات البزور**
Angiospermes (F), Angiosperms (E).
أحد قسمي باديات الزهر وهو يشغل النباتات التي تكون بيضها في مبيض وبزرها في ثمرة || تقسم مستورات البزور إلى قسمين : وحيدات القلفة وبذوات القلقتين .

٢٦٥٨٩ - **مِسْتَوْرَات الزهر**، **هَكَائِيَات الوكيع**
Cryptogames (F), Cryptogams (E).
قسم من المملكة النباتية ، نباتاته مستورة أعضاء التناسل تنضج إلى ثلاثة صفوف : مستورات الزهر الوعائية ، الطليقيات والمشريات .

٢٦٥٩٠ - **مِسْتَوْرَات الزهر الوعائية**
Cryptogames vasculaires, Pteridophytes (F), Vascular cryptogams, Pteridophyta (E).
صنف من النباتات الخفيات الأعضاء التناسلية . أشهر نباتاتها السراخس والكتنبات التي تحمل ثلاثة أعضاء فقط وهي الجذور والسوق والأوراق .

٢٦٥٩١ - **مِسْتِيَك**، **مِسْتَحْمُون التلطيح**
Mastic à greffer (F), Mastic for graft (E).
مادة مركبة عازلة يستعملها البستاني في ستر جروح التلطيح أو التلطيح لوقايتها من الهواء والحرارة .

٢٦٥٩٢ - **مِسْجَلَة**
Marnière (F), Mart-pit (E).
المسجلة هي مقلع الحسيل .

٢٦٥٩٣ - **مِسْجَلَة**
Marnière (F).
هي المسجلة

٢٦٥٩٤ - **مِسْج**
Arpentage (F).
قياس مساحة الأرض .

٢٦٥٩٥ - **مِسْحَاء**
Terre plate (F), Flat land (E).
أرض مستوية ذات حصى صفار . ج. مساح وسلي .

٢٦٥٩٦ - **مِسْحَاب**
Néphoscope (F).
Nephoscope (E).
جهاز يستعمل لدرس تحركات السحب .

٢٦٥٩٧ - **مِسْحَاة**
Nivaleur (F), Leveller (E).
أداة يستعملها البستاني لتسطيح الأكوداد وصنع أحصادها .

٢٦٥٩٨ - **مِسْحَاة آليَة**
Ravale (F).
آلة زراعية مجرورة تستعمل لبسط التراب وتوسيته .


٢٦٥٩٩ - **مِسْحَاة**
Anémographe (F).
Anemograph (E).
جهاز يسجل سرعة الريح واتجاهها ويقيسها بالغ .

٢٦٦٠٠ - **مِسْحَاة** هو الهواء ، أطلقه .

٢٦٦٠١ - **مِسْحَاة**
Aérifère (F).
Aeriferous (E).

نمت تعريفي يطلق على ما هو غصن ينقل الهواء اللازم لتنفس هذه النباتات والحويون . نسيج مسامي ، فيمرات مسامية ...

٢٦٦٠٢ - **مِسْحَال** ، **وَسِيط**
Catalyseur
جسم يحدث التحليل بالاملاسة .



مساح



مسفة



مساس



مسطح



مصار

- Fraysère (F). مَسْرَا ٢٦٦٢٨
Spawning place or season (E). المكان حيث يبيض السمك .
- Oviducta (F). Oviduct (E). مَسْرَكَة ٢٦٦٢٩
المراء قناة المبيض .
- Poli glanduleux (F). مَسْرَكَة ٢٦٦٣٠
Glandulous down (E). عضو ليفاني خلي ادب يتفأ على مختلف اجناس لثيات . ج مسارب .
- Esophage (F). مَسْرَطَة ، مَسْرَط ٢٦٦٣١
Esophagus (E). هو مجرى الطعام في الحلق ويدعى البلم والاري .
- Beltane haut-chaussée (F). مَسْرُوك ٢٦٦٣٢
القرس مسرك اذا بلغ التجنيب الركبتين او المرفقين .
- Régime (F) Rule (E). مَسْرَى ٢٦٦٣٣
هو مججمة القرواء المفروضة او المجبة .
- Pianmètre (F). مَسْطَاح * ٢٦٦٣٤
Pianimeter (E). جهاز يستعمل في قياس الطرح .
- Molte (F). Must (E). مَسْطَارَة ، مَسْطَار ٢٦٦٣٥
عصير القنب الجديد قبل أن يستحيل الى خر .
- Banquette (F). مَسْطَبَة ٢٦٦٣٦
Bench terrace (E). سطح من الارض كفافه من التراب أو الحجارة يصنع في التواضع للمندرة منأ لانحداف القرية .
- Pallier (F). مَسْطَح ، مَسْرُوكَة ٢٦٦٣٧
Landing, Stair-head (E).
- Parallélogramme (F). Parallélogram (E). مَسْطَح مُتَوَكِّزِي الْأَضْلَاح ٢٦٦٣٨
- Parallélogramme rectangle (F). Rectangular parallelogram (E). مَسْطَح مُسْتَقِيل ٢٦٦٣٩
- Parallélogramme oblique (F). Oblique parallelogram (E). مَسْطَح مَعِين ٢٦٦٤٠
- Echantillon (F). مَسْطَرَّة ، أَنْمُودَج ٢٦٦٤١
Sample, Pattern (E). هي العينة والنمينة .
- Mire (F). Stigt (E). مَسْطَرَّة الْإِرْتِفَاع ٢٦٦٤٢
هي المير ، جهاز يمكن من تحديد الارتفاع النسبي .
- Calorimètre (F). مَسْطَر ٢٦٦٤٣
Calorimeter (E). جهاز يستعمل في قياس كيات الحرارة الناتجة والصادرة والواردة .
- Calorifique (F). مَسْمَرِي ، مَسْمَرِي ٢٦٦٤٤
Calorific (E). نعت ترميني توصف به الاشياء التي تولد الحرارة .
- Calorimétrie (F). مَسْمَرِيَّات ٢٦٦٤٥
Calorimetry (E). درس طبيعي يبحث في قياسات الحرارة .

- Poudre d'os déglutins (F). مَسْحُوقُ الْعَظْمِ الْأَهْلَامِيِّ ٢٦٦١٥
هو الماتني من سحق العظام بعد استخلاص ما فيها من شحم وعلام . منظرة الخارجى مسحوق نام اريد اللون يحوي : من ٢٩ الى ٣٤ ٪ من الحامض الفسفوري ومن ١٥ الى ١٢ ٪ من الازوت وهو جزيل الفائدة شائع الاستعمال .
- Poudre de corne (F). مَسْحُوقُ الْقَرْن ٢٦٦١٦
Horn meal (E). سماد عضوي يتجم من سحق القرن والظلوف بعد تجميعها او معالجتها بالخيار . وهو يحوي : من ١٠ الى ١٥ ٪ من الازوت من ٤ الى ٦ ٪ من الحامض الفسفوري من ٧ الى ١ ٪ من الكلس يعتبر من الاسمدة الجزيلة التفع المولدة الاجل لانه يغني عن التربة اكثر من سولين .
- Monstruosité (F). مَسْخ ٢٦٦١٧
Monstrosity (E). ج. مسخ . شاذ عارفة او وراثية تشوه الشكل المألوف .
- Cultivateur (F). مَسْخَكَة * ٢٦٦١٨
Cultivator (E). آلة تستعمل المرح السطحي تنفق التربة دون ان تقلبها ويتبثر ذراتها .
- Sympode (F). Sympode (E). مَسْخُود * ٢٦٦١٩
نعت ترميني يوصف به كل حيوان او نبات شذت بعض اعضاءه عن قاعدة الانفراد الذاتي كما في خروف البحر الذي تصمت ريشاه . وكما هي حال القمامة في الثنيات .
- Fibre ٢٦٦٢٠ مَسَك
ج ساد وأساد .
- Sextant ٢٦٦٢١ مَسَدَاس *
جهاز يمكن من قياس الابعاد المزاوية وتحديد ارتفاع الكواكب عن الأفق .
- Sextant, Sextant d'Uranie (F). Sextans (E). مَسَدَاس ٢٦٦٢٢
المساسد كوكبية نجوم جنوبية الموقع شكلها يشبه المساسد || نجوما قليلة العدد جميعها من المرتبة الخامسة وما دونها .
- Nébuleuse (F). Cloudy (E). مَسَدَاس * ٢٦٦٢٣
اداة آلة تستعمل في ذر المساحيق فتشدها كالمباب .
- Hexagone (F). Hexagon (E). مَسَدَاس ٢٦٦٢٤
شكل هندسي سدس الزوايا والاضلاع .
- Hexaèdre (F). مَسَدَسُ السُّطُوح ٢٦٦٢٥
Hexahedron (E).
- Obnubilé (F). مَسَدُوم ٢٦٦٢٦
نعت ترميني يطلق على الاشياء التي يشاهد القباب او الغمام او الدخان ...
- Fibreux (F). Fibrous (E). مَسَدِي ٢٦٦٢٧

Arrhas (F). **مُسْكَنَة** - ٢٦٦٦٣
Earnest, Deposit (E).
هو البرين الذي يلقه احد طرفي العقد الى الآخر
ساحة التعاقد .

٢٦٦٦٤ - **مُسْكَبَة ، كَوْدَة**
Planche à semis, Planché surélevée, Plate-bande (F).
Border, Bed, Seed-bed (E).
مستطيل من التراب اربع من سطح التربة مستقيم الاضواء
غطاء بمس صيد .

Bouillon blanc (F). **مُسْكِر الحَوْت** - ٢٦٦٦٥
هو البوسير ، اطلبه .

Local d'habitation (F). **مُسْكَن** - ٢٦٦٦٦
Dwelling-local (E).
المسكن او محل السكن هو المكان الذي يخصصه المرء
لسكنه .

Habitation rurale (F). **مُسْكَن زُرَاعِي** - ٢٦٦٦٧
Rural residence (E).
كل بناء او بيت ريفي يسكنه من اقام في الريف او
تدور حل الريف مها كانت طبقة الاجتماعية . راجع
بيت زراعي .

Massicot **مُسْكُوت** - ٢٦٦٦٨
هو بروكسيد الزرصاص الاصفر اللون .

Moschifère (F). **مُسْكِي** - ٢٦٦٦٩
Moschiferous (E).
نمت تعريفي يطلق حل الاجهزة الخاصة التي تتركز مادة
المسك ويجمعها عند الحيوان .

Muscat (F). **مُسْكَاة ، مُسْك** - ٢٦٦٧٠
صفة العنب المسكي العرف وفي الكرومة غروب عديدة
مشهورة بهذا العرف المذاقي .

Moschins (F). **مُسْكِيَات** - ٢٦٦٧١
نفة من فصيلة الآليات تشمل جنساً واحداً يدعى ايل
المسك .

٢٦٦٧٢ - **مُسْلَاح**
النخلة التي يكثر بصرها وهو اخضر . وفي حديث مسا
يشتره المشتري حل البائع انه ليس له مسلح ولا محضار .

Erode (F). **مُسْلَة** - ٢٦٦٧٣
نوع من الجزأب ، مشهور باسم ابو مسلة ، اطلبه .

٢٦٦٧٤ - **مُسْلَح ، مَهْيَش**
المكان الذي يكثر فيه سلح الطير .

Abattoir (F). **مُسْلَح** - ٢٦٦٧٥
Slaughter-house (E).
المكان المد لتحر وسلح وقضابة الحيوانات ويدهى الجوزر .

٢٦٦٧٦ - **مُسْلَكَة * ، مُسْلَن**
Scarificateur (F). Scarificator, Hoeing-machine (E).
اداة تيسر ذرات التراب وتسوي سطح التربة وتقلع
الاعشاب .

Malcolmia (S). Malcolmie (F). **مُسْنَح** - ٢٦٦٧٧
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات .

Pai injecteur (F). **مُسْقَطَة *** - ٢٦٦٤٦
Soil injector, Root injector (E).
أداة زراعية تستعمل في حقن التربة لكافة بعض الحشرات
والاصنام النباتية .

Homéotherme (F). **مُسْقُور** - ٢٦٦٤٧
Homiothermal (E).
نمت تعريفي يطلق حل كل حيوان ثابت الحرارة المستقرة .

Courbine (F). **مُسْقَار** - ٢٦٦٤٨
مسكة بحرية تدعى مسقار ، اطلها .

Masca (F). **مُسْقَة** - ٢٦٦٤٩
مسكة بحرية تدعى ايضاً خليد ، اطلها .

Projection **مُسْقَط** - ٢٦٦٥٠

Projection horizontale (F). Horizontal projection (E). **مُسْقَط اَافِي** - ٢٦٦٥١

Projection verticale, Élévation (F). Vertical projection, Elevation (E). **مُسْقَط رَافِي** - ٢٦٦٥٢

Projection orthogonale (F). Orthogonal projection (E). **مُسْقَط عَمْدِي** - ٢٦٦٥٣

Cypress (S). **مُسْقَلَة * ، وَدَعَة** - ٢٦٦٥٤
Porcelaine (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات المدليات . اولوها
مدينة . اصداؤها صغيرة القد ، شبه بيضية ، مبطلة .
تكثر في مجار البلاد الحارة . تستعمل لتزيين القواب .

Irrigée (F). Irrigate (E). **مُسْقُوتِي** - ٢٦٦٥٥
المسقوي او المروي هو كل زرع يسقى .

Pau de poisson (F). **مُسْك** - ٢٦٦٥٦
Fish skin (E).
المسك هو جلده المسك . ج مُسْك .

Musc (F). Musk (E). **مُسْك** - ٢٦٦٥٧
مادة دعنية عطرية سمره اللون يفرزها ايل المسك .

٢٦٦٥٨ - **مُسْك الجَن**
اسم يطلق قسلاً عدة نباتات اعصها حشيشة الريح
والنيسوم .

٢٦٦٥٩ - **مُسْك اللَقَائِر** هي الحاسبة .

Tubéreuse (F). **مُسْك زُونِي** - ٢٦٦٦٠
هو الزبيب نبات زينة من الترنجيبات .

Saccharimètre (F). **مُسْكَار *** - ٢٦٦٦١
Saccharimeter (E).
جهاز يستعمل في قياس مقادير السكر الموجودة في
السوائل . ويدهى ايضاً لقياس السكر ومقار .


٢٦٦٦٢ - **مُسْكَلَة *** هو الهبلو ، اطلبه .



مسقلة



مسكار



مسقلة

Brousse (F). Bush (E). ٢٦٦٨٨ - مَسْتَكَف ٥

المسكف كل غلالة أو فيفاء أو سهب تعلوها بعض الاشجار المبرقة التجميع . ج سائف .

Odontoglosses (F). مَسْكَنَات الَاثْنَة ٢٦٦٨٩

لغة من الرياضات تحمل في اطراف انتابها بعض الانسان الصغيرة الذرية .

Courant d'air (F). ٢٦٦٩٠ - مَسْجَح ٥

Wind current (E).
مر الريح وبجراها في اي مكان او مفتح كان .

Gorge-bleue (F). ٢٦٦٩١ - مَسْجَر ٥

هو المرقعة ، طائر من السحليات ، اطلها .

Aristolochie siphon (F). ٢٦٦٩٢ - مَسْجُورَة ٥

هو زراوته سيطو ، اطلها .

Courant d'air (F). ٢٦٦٩٣ - مَسْجَك ٥

Air current (E).
هو المسح اي مر الريح او مجرى الهواء .

Purgatif (F). ٢٦٦٩٤ - مَسْجِل ٥

Purgative, Purging (E).
دواء يطلع البطن . اشهر مسهلات الحيوان : سلفات السودا وسلفات المغنيزا وزيت الخروع .

Cheval demi-sang (F). ٢٦٦٩٥ - مَسْجَم ، مَسْجَب ٥

Half-bred horse (E).
الفرس المجين .

Spatula (F). ٢٦٦٩٦ - مَسْجَاط ٥

Spatula, Paleace-knife (E).
اداة من خشب تستعمل لطحن الزبدة وسائر المصنوعات .

Cedran (F). Dial-plata, Dial (E). ٢٦٦٩٧ - مَسْجَوَاتِي ٥

Oldenlandia (S). ٢٦٦٩٨ - مَسْجَوَاك ٥

Oldenlandia (F). Indian madder (E). Oldenlandia (D). Oldenlandia (I).
جلس نباتات عشبية وجينية من فصيلة القرويات ، انواعها ٢٠٠ ، اطلها البلاد الحارة . مسطها بري وبضها زراعي صناعي يستخرج من جلونها مادة صينية حمراء اللون .

Paseorage (F). ٢٦٦٩٩ - مَسْجَوَاك الرَاقِي ٥

هو النصاب ، نبات من فصيلة السليبيات ، اطلها .

٢٦٧٠٠ - مَسْجَوَاك ، مَسْجَبَكَة ، مَسْجَبَاك ٥

Préure (F). Rannet (E).
خيرة قابلة للذوبان تستخرج من منطقة الجدي الرقيق . تستعمل في تجميد الحليب .

Dominé (F). ٢٦٧٠١ - مَسْجَوَاك ، مَسْجَوَاك ٥

Dominated (E).
نمت تمرني يطلق على كل خيرة لا يزيد ارتفاع سنها عقب قمة الشجرة السائدة .

Eau saumâtre (F). Briny (E). ٢٦٧٠٢ - مَسْجُوس ٥

المسوس الماء بين المالح والمليح . قال الرازي :
و لو كنت ملاك كنت لا طب المالح ولا مسوا ٥

انواعها عديدة منها حوض البحر المتوسط . سفيها فرعاء تعلق من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها متعاقبة اخليلية مقطوعة . نصلها على البثرة مسن الحافة . ازهارها طرفي الازتكاز ، عشقوي التجميع . ازهارها صغيرة القد يكثر فيها الابيض والاحمر والقرنزي || اشهر انواعها الزينية ما يتبع .

Malcolmia maritima (S). مساح مجري

Malcolmia bicolor (S). مساح ثنائي اللون

Malcolmia litorea (S). مساح جهادي

Palisseau (F). Vine-stick (E). ٢٦٦٩٨ - مَسْكَك ٥

هو المرزح ، مسند يستعمل لدم الكرمة او لرصها من التربة .

Acanthe-ursine (F). ٢٦٦٩٩ - مَسْكَس ٥

نبات يدمي اقتنا رهلة ، اطلها .

٢٦٦٨٠ - مَسْكَكَاك ، مَسْكَكِرَان ٥

Aristolochie cotonneuse (F).
هو الزراوته الازرق ، اطلها .

Piscine, Vivier (F). ٢٦٦٨١ - مَسْكَكَة ٥

Fish-pond, Fish-wall, Stew (E).
حوض كبير ترب في الاسماك .

Digue (F). Dike, Embankment (E). ٢٦٦٨٢ - مَسْكَكَة ٥

حاجز يقام في وجه المياه لتحويل جزء منها او لتخفيف سرعة انسيابها .

Bigarré, Rayé (F). ٢٦٦٨٣ - مَسْجَج ٥

Motley, Streaked, Striped (E).
صفة الشيء المجلج .

Anerglé (F). ٢٦٦٨٤ - مَسْجَجِل ٥

نمت تعريفه يطلق على من اخسعت فيه عوارض الانهاف .

Tuteur (F). Prop (E). ٢٦٦٨٥ - مَسْجَد ٥

هو كل حود يوضع بجانب القرية او الشجيرة لتسند اليه . لذلك يحسن ان يكون مستقيماً وان لا يقل متوسط طوله من ٤ سم . افضلها اصله كالستديان والمليح... تقطع المساند في اواخر الربيع فتتلف وتتقرن اطرافها العليا بالمخارق ويقت اطرافها السفلى التي تستعمل التربة بالمنجل او بالقدوم ثم تقطع بمحلول سلفات النحاس وتبني كذلك حتى ينشأ المحلول من قمة المسند . والمحلول يتركب من كيلو سلفات النحاس في مشرين لتر ماء . وهو يحفظ المساند من النخر نحو سيمة احوام . ويصعبها من الخمران الذي ان اصابها تفشى الى جميع الاغراس والاشجار .

Espalier (F). ٢٦٦٨٦ - مَسْجَد ٥

الخط من الاشجار المشرفة القائمة على جدار . ج مسندات .

Mussandé (S). Mussende (F). ٢٦٦٨٧ - مَسْجَدَاك ٥

جلس نباتات جنينية من فصيلة القرويات . انواعها الممرية زهاء ٥٥ . بعضها من نباتات العالم القديم . اطلها البلاد الاستوائية والحارة . سفيها فرعاء . اوراقها متعاقبة اخليلية . ازهارها طرفي التجميع ، تاجي الازتكاز . ازهارها خمسة التركيب ، مسطلة الانابيب . لحاء سفيها وفادها حافة . اوراقها تدمل القروح . ازهارها تنفع الصغر وتلقب بالسمال وتلازم الجروح .



مسند



مسوك

٢٦٧١٧ - مِسْقَة * ، شَجَرَة الجِرْح ، نَبْخ
Nicotiana glauca (S).

نوع من نَبْخ رَسِيكَا وهو بَشِيَّة بَرِيَّة مَعْمَرَة فِي الْمَنَاطِق الْحَارَّة ، حَوْلِيَّة فِي الْمَتَلَّة . يَحْيِي عَلَى السَّوَاوِل اللَّيْلَانِيَّة . سَالَهُ عَشْرِيَّة مُتَنَصِّبَةً فَرَادَ تَلَوِي مِنْ ١٠٠ إِلَى ٣٠٠ سَم . أَوْرَاقُهُ مُتَعَالِيَّة ، مُتَبَادِلَةٌ الْإِرْتِكَال ، مَعْقَّة ، مُسْتَطِيلَةُ الزَّيَاد . نَاصِلُهُ رَءِيحِي الشَّكْلِ ، جَامِدُ الصَّلْبَةِ ، يَجْرِي اللَّيْلِ . أَزْهَارُهُ خَلَامِيَّة التَّرَكِيب ، طَرَفِيَّة الْإِرْتِكَال ، صَفْرَاءُ اللَّوْنِ . قَمَارُهُ جَرَاءُ رَءِياعِي اللَّفْلَق تَدْفَعُ بَعْضُ الْبُزُورِ اللَّثِيقَةِ ، الْكُرُوبِيَّة ، الْكَسْتَانِيَّة اللَّوْنِ || يُقَالُ أَنَّ أَوْرَاقَهُ طَلِيَّة تَقْبِدُ الْجِرْحَ وَتَلْأَمُهَا .

٢٦٧١٨ - مِسْقَة
Terre Imperméable (F).
Impermeable soil (E).

المِسْقَة مِنَ الْأَرِثِيَّةِ الَّتِي تَمْسُكُ الْمَاءَ وَتَمْنَعُ أَنْصَرَفَهُ .
Armoise dorée (F).

٢٦٧١٩ - مِسْقَة
Erodium mosquë (F).

٢٦٧٢٠ - مِسْقَة
Hydromètre (F).

٢٦٧٢١ - مِسْقَة
Hydrometar (E).

٢٦٧٢٢ - مِسْقَة
Baradine (F).

٢٦٧٢٣ - مِسْقَة
Péripatéicien (F).

٢٦٧٢٤ - مِسْقَة
Pépiériste (F).

٢٦٧٢٥ - مِسْقَة
Nurseryman (E).

٢٦٧٢٦ - مِسْقَة
Apomixie (F).

٢٦٧٢٧ - مِسْقَة
Ferme, Métairie (F).

٢٦٧٢٨ - مِسْقَة
Farm, Small farm (E).

٢٦٧٢٩ - مِسْقَة
Sculpation (F).

٢٦٧٣٠ - مِسْقَة
Stipulation (F).

٢٦٧٣١ - مِسْقَة
Clause compromissoire (F).

٢٦٧٣٢ - مِسْقَة
Sociétaire (F).

٢٦٧٣٣ - مِسْقَة *
Solarium (S).

٢٦٧٣٤ - مِسْقَات *
Solarium, Cadran (F). Solarium (E).

٢٦٧٣٥ - مِسْقَات *
Solaritides (F). Solaritides (E).

٢٦٧٣٦ - مِسْقَات *
Responsabilité (F).

٢٦٧٣٧ - مِسْقَات *
Responsabilité (E).

٢٦٧٣٨ - مِسْقَات *
Responsabilité délicieuse (F).

٢٦٧٣٩ - مِسْقَات *
Responsabilité du fait d'autrui (F).

٢٦٧٤٠ - مِسْقَات *
Responsabilité du fait des animaux (F).

٢٦٧٤١ - مِسْقَات *
Responsabilité du fait des choses inanimées (F).

٢٦٧٤٢ - مِسْقَات *
Responsabilité du fait des bâtiments (F).

٢٦٧٤٣ - مِسْقَات *
Responsabilité contractuelle (F).

٢٦٧٤٤ - مِسْقَات *
Responsabilité légale (F).

٢٦٧٤٥ - مِسْقَات *
Responsabilité atténuée (F).

٢٦٧٤٦ - مِسْقَات *
Responsabilité civile (F).

٢٦٧٤٧ - مِسْقَات *
Responsabilité partagée (F).

٢٦٧٤٨ - مِسْقَات *
Capacimètre (F).

٢٦٧٤٩ - مِسْقَات *
Capacimeter (E).

٢٦٧٥٠ - مِسْقَات *
Fluximètre (F).



مِسْقَة



مِسْقَة

Haras (F).

٢١٧٣٨ - مُشَبَّكَة

٢١٧٣٧ - مُشَاش هو النظم الطويل ، اطليه .

Breeding-stud, Stud (E).

موسسة تخني يكرام الخيل المدة للزود .

٢١٧٣٨ - مُشَاشَة Cartilage de l'extrémité des os

Caniveau, Emissaire (F).

٢١٧٣٩ - مُشَبَّرَكَة

٢١٧٣٩ - مُشَاش * Notopterus (S).

Channel stons, Gutter, Overflow channel (E).

Notoptera (F). Notopterus (E).

قناة لصرف المياه ، وهي قناة الصرف الاساسية التي تنتهي اليها مياه الاسراب وما شبه .

جنس اسماك بحرية من فصيلة المشاطيات . انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في بعض الانهر الاسيريه اخضها انهر واخوار العراق واثنت . جميعها كبيرة القند تطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . زعانفها الظهرية صغيرة ضيقة . زعانفها البطنية والشرجية متباعدة كالمخبط . لحوبها مأكولة متوسطه الصفث || اشهر انواعها مشَاش شيلاتا (Notop-terus chilata) الذي لا يقل طوله عن ١٠٠ سم . والذي يكثر وجوده في اخوار الهند ومليزيا .

Amentifère (F).

٢١٧٤٠ - مُشَبَّرَقِي *

من النبات ما كان ازهاره قد في الشكل كالشجرة .

Rassasiat (F).

٢١٧٤١ - مُشَبَّع

نمت تمريني يطلق على كل تبع ملجم الصفات الملائمة التي تتمركز دون القمامة وفوق الموزونة .

٢١٧٣٠ - مُشَاشِيَّات * Notopteridae (S).

٢١٧٤٢ - مُشَبَّع ، مُشَرَّب ، مُشَمَّم

Notopteridae (F). Notopteridae (E).

Imprégné (F). Imprégnated (E).

Prévenu (F).

٢١٧٤٣ - مُشَبَّو ، فَتِين

فصيلة اسماك بحرية من فصيلة المشاة . اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد جميعها من اسماك مناطق البلاد الحارة || اشهر اجناسها المشَاش .

Accused (E).

هو الذي تلقى عليه شبه اقتراف الجريمة .

٢١٧٣١ - مُشَاش Indivis (F). Undivided (E).

الملكية الشاملة غير المنقسمة .

Dispersif (F). Dispersive (E).

٢١٧٤٤ - مُشَاشَة

٢١٧٣٢ - مُشَاق * Pecten (S).

٢١٧٤٥ - مُشَاشَة * Extracteur (F). Extractor (E).

Pecten (F). Pecten (E).

جهاز آلي يستعمل لاستخراج الحسل من الخوايرب وذلك بتأثير القوة الانابتة .

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المشطيات . انواعها المرفوعة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم واخصها البلاد المتحدة الحرارة || اصنفها كبيرة القند ، شبه مرسية الشكل ، شعاعية التضخيد ، لامتلاوية المصاريم ، الايمن منها شديد التضخيد قليل التضخيد || تعيش طليقة على الرمال وتتغذى بسرعة . لحوبها مأكولة جيدة الصفث .

٢١٧٤٦ - مُشَاش عكى الشُّعُوع

٢١٧٣٣ - مُشَاشَة ، مُشَقَّة ، مُهَبَّر

Indivisaire (F). Co-parcaner (E).

Filasse (F). Filasse, Hari, Tow (E).

هو ما يملك مع غيره مالا على الشيوع .

ما غلص بالثمن من لحاء النباتات الليفية كالكناك والقنب قبل نزله .

Collectif (F). Collective (E).

٢١٧٤٧ - مُشَرَكَة

٢١٧٣٤ - مُشَاشَة Tille, Taille (F). Hemp-harb (E).

هي قشور القنب والريزوف .

Hamamelidaceae (S).

٢١٧٤٨ - مُشَرَكَات

Hamamelidacées (F). Hamamelidaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . نباتاتها اشجار وشجيرات . اوراقها منتنة اذنينة . ازهارها عشوية . ثمارها جواء صغيرة . معظم انواعها بري وبعضها طبي وزينة .

٢١٧٣٥ - مُشَاشِيَّات * Pectinidae (S).

٢١٧٤٩ - مُشَرَكَة * Hamamélis

Pectinidae (F). Pectinidae (E).

Hamamelis (S). Hamaméle, Hamamélis, Noisetier

sordaire (F). Witch hazel (E). Zanburnus (D).

Amanelide, Trilopo (I).

جنس شجيرات ونباتات برية وزينة من فصيلة المشركات . انواعها قليلة العدد . اوراقها متعاقبة منتنة مائلة ، نعلها يبيح الصفحة مسن الحلقة . ازهارها محورية الارزكان ، بحيلة الشكل ، وباحية او خلية البتلات || اوراقها وثمارها صلبة تستعمل في بعض العلاجات الصغرية . . اشهر انواعها الازينية ما يلي .

٢١٧٣٦ - مُشَاش Northéche (F).

هو الكريشان ، اطليه .

٢١٧٥٠ - مُشَرَكَة عَمَلِيَّة

٢١٧٣٧ - مُشَاشِيَّات * Pérépécisme (F).

Hamamelis mollis (S). Hamamelis velouté (F).

Pérépécism (E).

شجرة متوسطة القند غارسة تعلم نحو ٩٠ اثنار . موها الصين . اوراقها خلية البتلة على صفحاتها السفل . ازهارها كبيرة القند ، عذيفة المرف ، لها الى الصفرة الزخمية ، كروها خرية عابقة || ازهارها يستمر من اواخر كانون الى اواخر اذار .


المشاشية اسم يطلق على فلسفة ارسطو لانه كان لا يلتقي دوروه الا ماشيا بصحبة طلابه .



مشَاش



مشَاق



مشَاش



مشَرَكَة

2١٦٥٩ - **مِشْجَارٌ** °
Dendromètre (F).
Dendrometer (E).
أداة تستعمل في قياس الانحجار لتقدير الملو والمجم .

2١٦٦٠ - **مَشْجَرٌ**
Bois (F). Wood, Forest (E).
موضع الشجر ونبتته الطبيعي .

2١٦٦١ - **مِشْحَارَةٌ** °
Nigrospora (S).
جنس فطور مجهرية من الدبقيات وفصيلة الطحيمات . تتميز
ببغاياها الثنائي التكوين والشكل . الخصب منها بسيط
التركيب ، فردي التجميع ، متصبب الإزتكاز ، عايق
اللون . أما الآخر ففسي التجميع مداد . كئاشدا
كروية ، متناهية ، كثيرة العدد || أحرف الأنواع مشحارة
الذرة ومشحارة الموز .

2١٦٦٢ - **مِشْحَارَةُ الدُّرَّةِ** (S).
Nigrospora oryzae (S).
فطر مجهرى مركب غرائس الدرة قرب ادراكها حينها فيفسد
الاليف بعد أن يسبب الخللها وأسودادها مما يؤدي إلى
تساقط الحب قبل الإنبات والظفان || يذركا باحتجاب
المواقع الرطبة ويكافح باستعمال مسحوق شيرلان تمليفاً
حل النبات .

2١٦٦٣ - **مِشْحَارَةُ المَوْزِ** °
Nigrospora musae (S).
فطر مجهرى مركب ثمار الموز المخفظة فيفسد اللباب
ويقوده إلى الخلل دون أن يبدو على القشرة ما يتم من
الاصابة || يكافح عند ظهور أول أصابة بفضخ الكباشات
المخفظة بسائل شيرلان المركز من ١ إلى ٢٪ .

2١٦٦٤ - **مِشْحَبٌ**
Racloir (F). Scraper (E).

2١٦٦٥ - **مِشْحَةٌ**
Teinte (F).
Tint, Shade, Hue (E).

2١٦٦٦ - **مِشْحَرَةٌ ، مِشْحَمَةٌ**
Fauille (F).

2١٦٦٧ - **مِشْحَطٌ**
Charasson, Pisseau
هو المرحض أي الممسوك ، عويد يوضع تحت قضيب الكرمر
يرفقه عن التربة .

2١٦٦٨ - **مِشْحَطَابٌ** °
Lactomètre, Pèse-lait (F).
Lactometer (E).
هو ميزان الحليب ، جهاز يستعمل لتقدير نسبة المواد
السكرية الموجودة في الحليب .

2١٦٦٩ - **مِشْحَلٌ ، مِشْحَلٌ**
Baliveau (F).
Saddle (E).
كل فرع أو شجرة من الخشب تركت بدون قطع لتكبير
وتصغير حجرة . ج . اعجاز .

2١٦٧٠ - **مِشْحَذَبٌ** °
Serpette (F).
Pruning-knife, Serpette (F).
سكين خاص يستعمل في قطع الفروع والقضبان الغرسية
وفي التطعيم .

2١٦٧١ - **مَشْرٌ ، مَشَرٌ**
مشر ويشتر الشجر : مخرج ورقه واكتس خضرة .

2١٦٧١ - **مُشْتَرَكَةٌ رَيْبِيَّةٌ**
Hamamelis vernalis (S). Hamamelis plantanet (F).
جينة سبروتية تملو نحو ٢٠٠ سم . مهدا البلاد الأمريكية .
ساقها فراء . فرجها متصببة . أوراقها تطول نحو ٦ سم .
نصلها مائل المسفة . أزهارها صلبية الرائحة ، حر
الكرويس ، صفر البتلات || أزهارها يستمر من
كانون الثاني إلى أواخر آذار .

2١٦٧٢ - **مُشْتَرَكَةٌ فِيرْجِينِيَّةٌ**
Hamamelis virginiana (S). Hamamelis de Virginie (F).
جينة سبروتية تملو من ٣ إلى ٤ أمتار . مهدا أمريكا
الشالية . أوراقها مائلة المسفة تطول من ٥ إلى ٨ سم .
أزهارها صفراء اللون . أزهارها ينتفخ عند إقبال الورق
ويستمر من أواسط أيلول إلى أواسط كانون .

2١٦٧٣ - **مُشْتَرَكَةٌ يَابَانِيَّةٌ**
Hamamelis japonica (S). Hamamelis japonica (E).
شجرة سبروتية صغيرة القد فائضة تملو من ٤ إلى ٧ أمتار .
مهدا اليابان . ضروبها الأزينية أربعة . ألوان أزهارها
تختلف باختلاف ضروبها منها الأصفر الذهبي والكبريتي
والبيروني والبرتقالي . جميعها صلبة مستقيمة الطرف .
أزهارها يستمر من شباط إلى نيسان .

2١٦٧٤ - **مُشْتَرِي ، مِشْرِي**
Jupiter (F).
Jupiter (E).

المشتري أو المريخ أكبر كوكب في مجموعة النظام
الشمسي . يعتبر ألم كوكب بعد الزهرة . يقسم بين المريخ
وزحل . جرم كتلته يفوق جرم الأرض نحو ١٢٩٥ مرة
وتطهر يفوق قطر الأرض نحو ١١ مرة . سرعة دورته
الانقلابية في الفضاء نحو ٤٦٩٨٠ كيلومتر بالساعة .
دورته المحورية حول الشمس تستمر نحو ١٢ سنة . مدة
اليوم المريخي نحو عشر ساعات . ويدور في فلكه أربعة
أقار كبيرة وبمانية صغيرة . أسماء الكبيرة : إيو ، أدوبه ،
غانيميد ، كليميوس . أما الصغيرة فأسمائها من ٥ إلى ١٢
لأنها لا تحمل أسماء || والمشتريون يستعمل المشتري السد
الأكبر لأنه فوق الزهرة في السعادة وأغناسوا إليه الخيبرات
الكبيرة والساعات العظيمة .

2١٦٧٥ - **مُشْتَقٌ**
Dérivé (F).
Derivative, Drifted (E).

2١٦٧٦ - **مِشْكَلٌ ، مِشْكَلَتٌ ، دَلْدَلَةٌ**
Pépinière (F). Nursery (E).
مكان تستند فيه الفراس والنباتات المخلطة فتنشأ فيه
وتكثف فترة من الزمن إلى أن تنقل وتزرع في مستقرا .

2١٦٧٧ - **مِشْكَلُونٌ ، شَالِيلٌ**
Plantoir (F).
Dibble (E).
أداة من حديد أو خشب تنصل في التشتيل أي غرس
الشتل .

2١٦٧٨ - **مِشْكَنٌ** °
Filtre (F). Spinneret (E).
المشكن القوعة التي يخرج منها الخيط عند نفس المشرات
كمكيط الحرير عند دودة القز وكالتواس عند الرقباد ||
وهو أيضاً جهاز من الفولاذ يستعمل في جذب المادان
ومدها وتحويلها إلى أسلاك .



مشتلون



مشحارة الموز



مشخاب



مشذب



مشط



مشط الزامي



مشط الزامي البري



مشط الزهراء

خشب فيها أشنان تسوى بها التصاب ويغسل بها الحب .
وللمشط أشكال ، أهمها استعمال :

- Herse en bois (F). مشط خشبي
- Herse rotative (F). مشط دوّار
- Herse trainante (F). مشط زاحف
- Herse canadienne (F). مشط كندي
- Herse émotteuse (F). مشط مدري
- Herse souple (F). مشط مرن
- Herse articulée (F). مشط مفصل
- Herse norvégienne (F). مشط تروجي

٢٦٧٨٩ - مُشَطَط ، تَمَشِيط

Harrowing (E). حراثة سطحية بالمشط؛ اللصق منها تنعم التربة وتزيلها من الأشجار .

Chromis (F). ٢٦٧٩٠ - مُشَطَط

هو البلطي، جنس أسماك بحرية ونهرية من فصيلة المخطيات.

٢٦٧٩١ - مُشَطَط الذئب

وئث صغير طيب الرائحة يقارب الكزبرة .

٢٦٧٩٢ - مُشَطَط الزامي * ، شوك الدوّاج

Dipsacus fullonum (S). Chardon à foulon (F). Bonnetier, Cardère à foulon (F). Draper's teasel, Fuller's teasel, Teazle (E). Weberkarda, Kardendistel (D). Cardo del lanajo, Dissaco, Lattugoni (I). نبات عشبي زراعي صناعي من فصيلة الدياسيات . رؤوساته الزهرية حراشف ثلاثية متراكبة متراصة منبسطة الأطراف تولّد أكوازاً اسطوانية تصعد في تهبّ الصوف.

٢٦٧٩٣ - مُشَطَط الزامي البري *

Dipsacus sylvestris (S). Cardère sauvage, Cabaret des oiseaux, Baignoire de Vénus (F). Wild teasel, Shepherd's rod, Barber's brushes (E). Schuttkarde (D). Dissaco salvatico, Erba messella, Varga da pastore (I).

نبات عشبي بري شائك من فصيلة الدياسيات . يزود مأكّل للصافير أنصفاً الحسني وشاهيه . يستخرج من أنباتها الصارة لانه يغلي على سائر أنباتات التي تمشط بقره .

٢٦٧٩٤ - مُشَطَط الرجل

Métatarses (F). Metatarsus (E).

٢٦٧٩٥ - مُشَطَط الزَّهْرَاء * ، مُشَفِيطَة

Scandix جنس نباتات عشبية من فصيلة البنيانيات . أنواعها المعروفة ١٠ ، جميعها برية . أولها متعلقة مركبة طويلة الزناد . أنهارها غنية بالتصبيغ يضاء اللون . تتكثر بين الزروع وتوجد في جميع البلاد . أشهرها وأهمها مشط الزهراء الطويل.

٢٦٧٩٦ - مُشَطَط الزَّهْرَاء الطَّوِيل

Scandix pecten-veneris (S). Scandix peigne de Vénus, Aiguille de berge (F). Shepherd's needle, Venus' comb (E). Echter Nadelkerbel, Venus-kamm (D). Scandice, Forasacco, Pettine di venera (I).

نوع من مشط الزهراء يكثر في الأرض البور وبين الزروع فيجمعها ويؤخذها .

٢٦٧٧٢ - مُشْرَاب * Liquomètre (F).

Liquometer (E). المشرب هو ميزان المشروبات ، جهاز يستعمل لقياس درجة الكمّول في المشروبات الروحية .

٢٦٧٧٣ - مُشْرَبَة Thalle (F). Thallus (E).

هي جهاز شجاع غشيات الزهر كالظهور والألوان .

٢٦٧٧٤ - مُشْرَبَة

طائر صغير مدهج كان ثوب وفي (اللسان) .

٢٦٧٧٥ - مُشْرَبَة Couleuvre à échelons (F).

هي الخلت الأشقر ، الحلب .

٢٦٧٧٦ - مُشْرَب على الوصي

Subrogatuteur (F). Deputy-guardian (E). هو الذي يقوم مقام الوصي على القاصر إذا تضاربت مصالحها ، أما مهمته الأصلية فهي مراقبة أعمال الوصي .

٢٦٧٧٧ - مُشْرَبَة Ecumeuse (F).

هي المصفاة ، آلة تحضّر الزرع عالياً غشية من الشجبان .

٢٦٧٧٨ - مُشْرُوب

Boisson (F). Drink, Beverage (E).

٢٦٧٧٩ - مُشْرُوج ، لاشيقيّ Agane (F).

Agamous (E).

٢٦٧٨٠ - مُشْرُوع ، تصميم

Projet (F). Project (E).

٢٦٧٨١ - مُشْرُوع استيعابي

Projet préalable (F). Previous project (E).

٢٦٧٨٢ - مُشْرُوع إعدادي

Avant-projet (F). Advance project (E).

٢٦٧٨٣ - مُشْرُوع العقد

Avant-contrat (F). Advance contract (E).

٢٦٧٨٤ - مُشْرُوع قانوني

Projet de loi (F). Draft bill (E).

هو المشروع الذي تضمه الحكومة ويقسمه إلى المجلس النيابي باسم رئيس الجمهورية ليقدر ويصبح قانوناً .

٢٦٧٨٥ - مُشْرُوبات المتكاثرة ، سنيّات المتكاثرة

Dentirostras (F). Sicklebill (E).

رتيبة من الطيور الجارح تشمل بعض الفصائل ، أشهرها الدغليات والحريرات والمشروريات والصرديات .

٢٦٧٨٦ - مُشْرِيَّات ، نباتات خشبية

Thallophytes (F). Thallophyta (E).

صف من المملكة النباتية . نباتاته تتكون من جرم يمس فطرًا أو ثلا . وهي عاصمة الجلود والسوق والأوراق والأعوار . أمثالها وأنواعها تعد بنسبة آلاف جميعها ثلاث شعب : البكتريات والخفيات والفطريات .

٢٦٧٨٧ - مُشْتَش Suros (F). Splint, Tumeur (E).

حلة تسمى الخيل وهي تريدات في الرظيف .

٢٦٧٨٨ - مُشَطَّ

Herse (F). Harrow (E).

أداة تستعمل لتمشيط التربة . زيجي = شعبة من حديد أو

- Actinaires** ٢٦٨١١ - **مُشَعَّات**
رَبِيَّة من المرجانيات تشغل العديد من الفصائل والجناس
والأنواع .
- Indicteur (F).** ٢٦٨١٢ - **مِشْعَاو**
Indicator, Indicatory (E).
- Radiomètre (F).** ٢٦٨١٣ - **مِشْعَاع**
Radiometer (E).
المشاع جهاز يستعمل في قياس شدة النور .
- Compte-gouttes (F).** ٢٦٨١٤ - **مِشْعَاف**
Dropper, Drop-tube (E).
- Terebellum (S).** ٢٦٨١٥ - **مِشْعَبَة**
Térébelle, Tarelère (F). Terebellum (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الأربل
وتفصيله الدلاحيات . أنواعها المعروفة عديدة ، بعضها من
متحجرات الاحقاب الثالثة والبعض الآخر معاصر
متشتر في بعض بحار البلاد الحارة أعصها المحيط الهندي ||
اصداؤها صاروخية الشكل ، مستطيلة الذبذبة القليلة
الانفراج . اجسامها صغيرة القد ، غرطية الإضم
المستطيلة .
- Fané (F).** ٢٦٨١٦ - **مِشْعُون**
Faded (E).
نمت تدريجي توصف به الاضاء النباتية القابلة .
- Atelier, Local de travail (F).** ٢٦٨١٧ - **مِشْعَل**
Work shop (E).
هو المكان المد للشدل .
- Enanthe (F).** ٢٦٨١٨ - **مِشْعِيل**
هو الرأزيانة ، نبات من الصيرانيات ، اطلها .
- Phellandre (F).** ٢٦٨١٩ - **مِشْعِيل مَائِي**
اطلب وزاينة مائية .
- Pneumatique (F).** ٢٦٨٢٠ - **مِشْعَاط**
Pneumatic (E).
- Diaphanomètre (F).** ٢٦٨٢١ - **مِشْعَاف**
Diaphanometer (E).
جهاز يمكن من درس وتحديد شفاف الاجسام والوسائل .
- Babine du chameau (F).** ٢٦٨٢٢ - **مِشْقَر**
المشقر من الحجر كالجبلغة من الفرس . ج مشافر .
- ٢٦٨٢٣ - مِشْقِي** سمكة بحرية مشهورة باسم مدجج .
- ٢٦٨٢٤ - مِشْقِي مَبْدُول**
- Notacanthus commun (F).** ٢٦٨٢٥ - **مِشْقِي**
سمكة بحرية تسمى مدجج مبدول ، اطلها .
- Teillage (F).** ٢٦٨٢٥ - **مِشْقِي** ، **تَقْشِير**
Teillage (F). Stripping (E).
نصل المشاقة اي القشرة من سوق القنب والكتان وما
اشبه .
- Ebroutage** ٢٦٨٢٦ - **مِشْقِي** ، **مِشْقَاق** ، **هَتَّ**
فصل ورق التوت من آسالج قبل تقديمه الى دود القز .
- Dérayure (F).** ٢٦٨٢٧ - **مِشْقِي**
Water-furrow (E).
منخفض يترك بين السكينين في الحراثة تسوية لصرف
المياه .
- Métacarpe (F).** ٢٦٨٢٨ - **مِشْطُ الِيَد**
Metacarpus (E).
- Fissifolié (F).** ٢٦٨٢٩ - **مِشْطُور التصل**
Fissifoliat (E).
نمت تدريجي يطلق على كل نبات يحمل أوراقا ناصفا
مشطورة الأطراف .
- Diatomaceae (S).** ٢٦٨٣٠ - **مِشْطُورَات**
Diatomacées (F). Diatomaceae (E).
فصيلة من الحث السمر . اجناسها وأنواعها كثيرة العدد
جميعها نباتات مجهرية من وحيدات الخلية . تعيش في
المياه المالحة والمليحة .
- Kigélie (F).** ٢٦٨٣٠ - **مِشْطُورَة**
هي الكيجلية ، اطلها .
- Pinnal, Pinné (F).** ٢٦٨٣١ - **مِشْطِي**
Pinnate (E).
شكل من اشكال أوراق النبات يشبه المشط .
- Pectiné (F).** ٢٦٨٣٢ - **مِشْطِي**
Pectinate (E).
شكل من الزباني يشبه المشط .
- Ctenodonte (F).** ٢٦٨٣٣ - **مِشْطِي الأَسنان**
Ctenodonte (E).
من الحيوان والاسماك من كانت اسنانه كالشط .
- Bipectiné (F).** ٢٦٨٣٤ - **مِشْطِي مُزدَوِج**
Bipectinate (E).
شكل من الزباني يشبه المشط المزدوج من جهتي الطول .
- Chromidae (S).** ٢٦٨٣٥ - **مِشْطِيَّات**
Chromidés (F). Chromidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة شالكات الزعنات .
- Ctenophores (F).** ٢٦٨٣٦ - **مِشْطِيَّات**
Ctenophora (E).
رَبِيَّة حيوانات دنيا من شعبة مجربات البطون .
- ٢٦٨٣٧ - مِشْطِيَّات الخياشيم**
- Ctenobranches (F).** ٢٦٨٣٨ - **مِشْطِيَّات الخياشيم**
Ctenobranches (E).
رَبِيَّة من الرغويات مميزات الأربل اماميات الخياشيم .
نصائلها واجناسها وأنواعها عديدة . جميعها وحيدة المشط
الخيشوي والاذنين والحقوق . وجميعها أيضاً مميَّزة الأعضاء
لأن الأعضاء الهوائية المقابلة ضامرة لا عمل لها .
- Rétribution (F).** ٢٦٨٣٨ - **مِشْع**
Remuneration, Reward (E).
المشع حيلة تدفع اجراً او مكافأة لمن يقوم بعمل .
فالملفح والرائب والجزاء والشكر والاعصاب والصلة والجمالة
والتمريض جميعها تعتبر من الامشاع .
- Radiomètre (F).** ٢٦٨٣٩ - **مِشْع** ، **مِشْعَاع**
Radiometer (E).
مقياس شدة أشعة النور .
- Flustra (S).** ٢٦٨٤٠ - **مِشْعَاب**
Flustrelle (F). Flustra (E).
جنس حيوانات طحلبية بحرية ثولية التجميع متشعبة تعيش
على الفوس .



مشعة

البشرة ، من الحافة . ازهارها خشوية كبيرة اللد ، بيضاء اللون ، ودية الموالج . ثمارها لحمية السويك ، لا قياسية الشكل ، خلية البشرة ، قصيرة الاذن ، للبدلة العلم ، مستحبة البرف والنكهة . صمغها بيضية خشبية مطيقة وبنفسطة تحضن بررة جامدة للساب الايض . وثمره المشمش لكل طازية ورطب ويحبف ويوصح من صمغها رطب ناشف لدن يملك اجزاء صفيحي الشكل يضي قر اللين يكثر استهلاكه في البلاد العربية .

٢٦٨٢٨ - **مُشَقَّاسِي** ° Commensurable
نعت تعريفي يطلق على ما يمكن قياسه هو وغيره بمقياس واحد مشترك .

٢٦٨٢٩ - **مُشَقَّاسِيَّة** ° Commensurabilité (F).
Commensurability (E).
امكان قياس كيتين او أكثر بمقياس واحد .

٢٦٨٣٠ - **مُشَقَّة** Filasse (F), Tow (E).
هي الطاقة التي ما يخص بالمشق من لحاء النباتات اللينة كالقنب والكتان .

٢٦٨٣١ - **مُشَقَّن** Scarificateur (F).
المسلفة تسوي بها التربة المبلورة .

٢٦٨٣٢ - **مُشَقَّقُ الْجَنْجَاح** Fisiipenne (F).
Fisiipinna (E).
نعت تعريفي يطلق على كل طائر مشقوق الجناح .

٢٦٨٣٣ - **مُشَقَّقَاتُ الْأَرْجُل** Schizopodes, Fisiipeds (E).
رتبة حيوانات من الثعريات .

٢٦٨٣٤ - **مُشَقَّقَاتُ الْأَنْسَكَة** Fisiilingues
رتبة من الطنائات تشمل بعض الفصائل . تتميز بالسبنا المستطيلة المشققة الفارقة الاعادة .

٢٦٨٣٥ - **مُشَقَّقَاتُ الْمَتَالِي** Fisiostres (F).
Fisiostrous (E).
رتبة من الطيور الموالج .

٢٦٨٣٦ - **مُشَكَاة** Guirlande (F).
Garland, Wreath (E).

٢٦٨٣٧ - **مُشَكَّال** Allotropique (F).
Allocropic (E).

صفة بعض الاجسام كالكاربون والفسفور وغيرها التي تتصل بأشكال حكيمة مختلفة دون ان يتبدل شيئاً من تركيبها الجزي .

٢٦٨٣٨ - **مُشَكِّطَارَا** Menthe aquatique (F).
هو القونج المائي ، اطبه .

٢٦٨٣٩ - **مُشَكَّكَة** Fraîtière (F).
Strawberry-bed (E).
قطعة ارض مفرسة شبيهاً ج مشاك .

٢٦٨٤٠ - **مُشَكَّلُوز**
هو المشمش اللوزي المحلو اللخ . الواحدة مشكولة .

٢٦٨٤١ - **مُشَقَّاس** Mélioscope (F). Helioscope (E).
منظار الشمس .

٢٦٨٤٢ - **مُشَقَّاسِي** Mélioscopique (F).
Helioscopic (E).

٢٦٨٤٣ - **مُشَقَّاش** °
Prunus armenica, Armenica vulgaris (S). Abricotier (F). Apricot tree (E). Aprikosen, Echta Aprikose (D). Albicocca, Armellini, Melico (I).
شجرة عسرة من فصيلة الورديات . تطرم من ٧ الى ١٥ م . ساقها قصيرة . اثمارها وفروها منسقة . قشورها تكون في اهل جهدها ملساء ثم تتشقق مع مرور الزمن . اوراقها حابلة ، متعاقبة ، منقطة ، قليبة الشكل . لصلها مائل

مهده :
قبل انه من نبوت الجسم او ارضها وقد انقضا شيئاً على انه من نبوت الصين لانهم هربوا واستمروا منذ زهاء ٢٠٠ سنة قبل الميلاد ، وقد أدخل من الصين بالتتالي الى الهند فالسجم فالمرق فاروبيا فتركيا فالبرتان فالنطاليا .

الليم :
لو لم يكن المشمش من النباتات البكورة الاقرار ولو لم يكن ازهاره يستحق الاوراق ويتأثر من صقيع الربيع لكانت سائر النباتات الممتدة طولها . لذلك فهو رطب في الاسكان اللطيفة والمعارض الجنوبية والمواقع التي لا تكثر فيها الريح الموسما .

ترابسه :
ينمو ويوجد في جميع الارضية ولا يأفف من كثرة الحمى اما يحض شدة الالتصاق والطرورية المستحكة || وهو من الاجنار المسقوية التي تتطلب الري المنتظم وقد تنضج من الجفاف .

تكميره :
يتكاثر بالبذر وبالعلم . والتعلم يتم عادة بالرقعة ، معلوم وفي . أما الاجنار التي يحسن تغذيتها كاهيات فهي اللوز في الاربة الكلية والخوخ في الاربة المنجبة والذرات في الاربة العميقة القليلة الرطوبة والمشمس الكلاني في سائر الاربة .

فروبه :
فروبه عديدة تقسم الى لنتين : فة المشمش الكلاني وهو ما كانت يلموه مرة العلم غنية بالحامض السيانيدري وفي المشمش اللوزي (المشكولة) وهو ما كانت يلموه مأكولة عادمة الحامض السيانيدري || اثمره فروبه الوطنية ما يتبع :

- **المسوي** : فطره متوسطة اللد قارشة . ساقها جوية اللون قليل التشقق . اوراقها مابقة الخضار صغيرة اللد . ثمارها كبيرة الحجم غاذية الى الحمرة وفي للبدلة العلم خافتة البرف والنكهة . يزودها حلو مأكولة .

- **البلدي** : اصراره عديدة ، اثمرها الماردي وانجاشا . فطره متوسطة اللد كروية الشكل . ساقها جوية اللون عريقة التشقق . فروها منسقة متراصة . اوراقها كبيرة اللد زاهية الاخضر . ثمارها كبيرة الحجم برتقالية اللون للبدلة العلم يكثر استهلاكها في النفرج . يزودها حلو مأكولة .

- **الحوي** : له صرمان « الكيز » و « القوس » فطره كبيرة اللد ساقها مرارة كثيرة التشقق . اثمارها منسقة متراصة . اوراقها زاهية الاخضر . ثمارها متوسطة الحجم للبدلة العلم ذكية البرف والنكهة لونها الى الصفرة الغامقة . يزودها حلو العلم مأكولة .

- **السنشاني** : فطره كبيرة اللد شائعة . ساقها كهباء اللون مرارة الموالج . اوراقها صغيرة الصفحة مستطيلة البت



مشمش

٢٦٨٥٣ - مَشِيسْكَسي
Hypogée (F).
Hypogean, Hypogean (E).
لعت تعريف يطلق على البزور التي تستقر زبارتها ، عند الانتاش ، تحت سطح التربة وهي تماكس بذلك البزور المربانية التي ترتفع زبارتها فوق سطح التربة .

٢٦٨٥٤ - مَشِيسْط *
Achrostichum (S). Acrostic, Acrostique (F). Full-fern, Horn-fern (E). Füllfarn (D). Acrostico (I).
جنس نباتات برية وتربينية من الرضويات البساجيات . انواعها المعروفة قليلة ، ترفب في المناطق والمواقع الرطبة الغظيلة . اوراقها قرصية الانتشاب تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم . تصجبتها لا يعنى حدود الزايم الثالث . تشرمها مشاربي الشكل ، مستدير السن .

٢٦٨٥٥ - مَشِيسْط
Etrape, Etrapeire (F).
Small sickle (E).
منجل خاص يستعمل في تشويل الجملاد .

٢٦٨٥٦ - مَشِيسْط *
Hétéroclis (F). Heterosis (E).
المشيط هو هجلاج السب الاول اي السلالة الاول عندما يكون عظم القدر . ويحيث ان صفات المشيط صفات انتقائية لا مستقرة ولا وراثية فهجلاج السب الثاني لا يكون مشيطاً لانه يرد الى صفات دحه ويغله . ج . مشايط .

٢٦٨٥٧ - مَشِيسْطِي
Hétéroclitique (F).
Heterotic (E).
نعت تعريف يطلق على بعض العوامل او الصفات الخسيرة التي تقيد الهجن الى الشلطة او التفوق الشياطي .

٢٦٨٥٨ - مَشِيسْط *
Diagometer (F).
Diagometer (E).
جهاز يستعمل في قياس الاصلية اي قابلية النقل الحراري في الاجسام .

٢٦٨٥٩ - مَشِيسْط
Allure (F). Carriage (E).
طريقة سير أنجل وسائر الدواب كالخيل والحملجة والخبيل والعدو .

٢٦٨٦٠ - مَشِيسْط
Muschle (S). Muschle (F).
جنس نباتات تربينية عشبية غشوشية معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، وهذا حوض البحر المتوسط . سيقانها منتصبه فراء . اوراقها كبيرة ، فارشة ، مسننة الاطراف . فصلها ريلة مسترغية تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها حثكولي التجميع ، هري الشكل . ازهارها صفراء اللون او حمراء تطول من ٤ الى ٥ سم . تتوزعها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٦٨٦١ - مَشِيسْطَة الفُطُر
Mycellum (F).
Mycellum (E).
خيوط دقيقة متشابكة كثيفة التجميع ناعية تحمل البوغ في الفطور . ج . امشاج .

٢٦٨٦٢ - مَشِيسْطَة
Plantain triomphe (F).
هي لقمة النخبة ، اطليه .

٢٦٨٦٣ - مَشِيسْطَة
Scandix (F).
هي مشط الزهراء ، اطليه .

باعت الحضار . ثمارها الى السفرة اللامعة وهي قرية الشبه من الحسوي لكنها دونه لذة وذكاة . يزورها حلوة مأكولة .

العصبي : شجرته كبيرة اللد شائعة . ساقها جذوية سرء قليلة التشقق . اغصانها فارشة منبسطة . اوراقها بيضية الصفحة ، قلبية القاعدة ، حيلة الحضار القاتم . ثمارها كبيرة اللد حيلة الشكل صفراء اللون غصراء المواج

لباها جامد المكسر سكري الطعم غالت العرف والتكة . - الكلاسي : اغصانها عديدة . اشجاره شائعة ، سوقها جذوية اللون متوسطة الخشونة والتشقق . اغصانه منفردة . اوراقه قلبية مدببة المعص . فصلها قليل الاخضرار والزهرة . ثماره كروية الشكل صغيرة اللد غزيرة الصدارة تستعمل في صناعة قر العين . يزور مرة الطعم .

- للوزي ، المشطوز ، القهسي : شجرته متوسطة اللد فارشة ، اوراقها شديدة الخضار . ثمارها كروية الشكل متوسطة اللد حيلة اللون الابيض تشوبه حرة ودية . لهاها غزير الصدارة لديد الطعم ذكي العرف والتكة . يزورها حلوة مأكولة .

٢٦٨٤٤ - مَشِيش اليابَان
Kaki (F).
هو الكاكي ، اطليه .

٢٦٨٤٥ - مَشِيش امريكة
Mammée d'Amérique
شجرة عمرة مشهورة باسم جيباس امريكة ، اطليه .

٢٦٨٤٦ - مَشِيشْطَة
Abricot (F). Apricot (E).
هي ثمرة المشش . راجع جدول الفيتامينات .

٢٦٨٤٧ - مَشِيشْطَة
Mespilus (S). Néflier (F).
جنس شجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات . انواعها قليلة العدد ، البرية منها شائكة والزراعية سرسة . اوراقها حاملة منتقة اعطالية ، فصلها يارز العروق عشن المنس . ثمارها خلى البشرة . ازهارها كبيرة اللد بيضاء اللون . ثمارها كيار الاكيدنيا لكنها اصفر حجباً واقل سيقاً ، لونها الى السرة الكستنية || اشهر انواعها المشطلة المحولة .

٢٦٨٤٨ - مَشِيشْطَة مَبْدُولَة *
Mespilus germanica (S). Néflier commun, N. germanique, Marlier, Nêle (F). Medlar tree, Dutch medlar (E). Deutsche Mispel (D). Nespolo (I).
نوع من المشطلة وهي شجيرة زراعية تطول من ٢٥٠ الى ٤٠٠ سم . ساقها سرسة . اوراقها اعطالية متسيلة و فصلها يارز العروق ، خلى البشرة ، تحمل اللون . ازهارها كبيرة اللد تطول نحو ٤ سم . ثمارها كستنية اللون شديدة الحسوبة الحامضة تكلل بعد تمام كبرها .

٢٦٨٤٩ - مَشِيشْطَة يابانية
Néflier du Japon (F).
هي الاكيدنيا ، اطليه .

٢٦٨٥٠ - مَشِيشْطَة
المن هي الجندوش او المشوش او المشويق التي يسبحا البرد في الثمار والاوراق || الثمار المشوشة هي الثمار التي عليها البرة .

٢٦٨٥١ - مَشِيشْطَة
مشن البقرة والناقة : حطب ما في صرعها .

٢٦٨٥٢ - مَشِيشْطَة *
Local de pente (F).
هو المشطوع المد لتفتيح مشاكك التبع او عموطه ردياً يمين وقت التصفيط والزم .



مشطلة مدولة



مشط



مشط

Brunia (S). Brunnie (F). ۲۶۸۶۴ - مَشَلِك ۵

الواحدة مشيكة ، جنس نباتات جنية يرية وتزينة
من فصيلة المشيكيات. انواع المعروفة نحو مشرة . اما
ضروبه الازينية عديدة . سيقانها منتصبه معتدلة التفيد .
اوراقها متعاقبة ، صغيرة النصال . ازهارها خماسية التركيب ،
عديدة الالوان ، يكثر فيها الازرق والاصفر والوردي .

Bruniaceae (S). ۰ مَشِکِیَات - ۲۶۸۶۰

Bruniacées (F). Bruniaceae (E).

فصلية نباتية من ذوات الفلقتين عذلية القملات . أجسامها
أولواعا المعرفة متوصلة البدن ، منبتها بعض اصقاع
أفريقية الجنوبية || جميعها جنبات معمرة . سفها فراء ،
أوراقها متعاقبة شكية . نساها خلية البشرة . أزهارها
خماسية التركيب . بزورها صغيرة تكثر فيها الاستدارة ||
اشهر اجناسها المشبك .

Placentales (F). ۷۶۸۶۶ - مَلِیْمَات

Placentalis (E).

شعبة من صنف الضرعيات . فصائلها وأجناسها كثيرة

العدد يتجمع الى ١٢ رتبة : الدم والحويات ومفردات الاصابع ومزدوجات الاصابع والخطوط ومفردات القوائم والحشرات والزئفيات الاقدام واللوامس ومجنحات الايدي والليموريات والرتبسات .

1990

Placenta, Arrière-faix (F). مشيمة - ٢٦٨٦٧

الجيب الفشائي الذي يتكون فيه الجنين داخل الرحم ويخرج معه عند الوضع .

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Choroïde (F). Choroid (E). **مَشِيمَة - ٢٦٨٦٨**

غشاء العين القائم بين الصلبة والشبكية .

Ergonomic Evaluation (E) 44-57474

Suckling up or out (E).

... 1981 ...

۱۸۷۰ - قیام

نبت له قشور كالصل بعضها فوق بعض كلما فشرت
امصرخة ظهرت اخرى (اللسان) .

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Confiscation ٢٩٨٧١ - مصادرة

حقوقية موضوعها استصفاء مال المحكوم واستيلاء الحكومة

عليه.

۲۶۸۷۲ - مَعَارِفِ کُنُودِ

Frais frustratoires (F). Frustratory expenses (E).

هي التي تشفق دون وجه في الدعوى فحيتي على عاتق منلقها.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Glossophagi (S). ٢٩٨٧٢ - مصاص

Glossophaga, Mange-langue (F).

جلس كفايتي من لصفحة التوزيعات ، التوجه الجديد

مؤلفها أجداد الحارة ، ألوانها إلى السمر الباهية ، الجذابة

٣٣٨٤ - الطائر ذو العنق - مناجاة - خطبة - صلاة إلى

لأنه الطوبى لمنفعة مسامحة جفيا عطفه بجملة من
البناء إلى البناء فذكرها فذكرها أناسا ومن

الوزراء || تعيش متفرقة . ذكورها تطرب ألاف
الكنوز . ألفت تجميد في الأشرار والحقير . مسجلا

الحوم . ثلث بجاويف الأجبار وأوتاب السجور . مسرحة
 بدم بارد إلى أن تستألف أوتاب السجور .

يُحرم تناول الليل ، لونها الخضراء والحدادين .

Absorptivité (F). 0.000000 - 26174

Absorptiveness, Absorptivity (E)

هي قوة الامتصاص.



٢٦٨٩٣ - مصفت
المصت هو ادخال اليد في رحم الانثى لمصته واستخراج ما فيه .

٢٦٨٩٤ - مصبح ، مصوح ، Virescence (F).
هو التبدل الطارى في لون الزهر .

٢٦٨٩٥ - مصحفات القشك Placophores (F).
رقة من الرغويات اصدانها مصقفة القشك . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة معظمها من المتحجرات والمعاصر منها منتشر في جميع بحار العالم .

٢٦٨٩٦ - مصحكار Saxatile
تمت تعريفه يطلق على كل نبات يعيش وينمو على الصخور وفي الهاجر .

٢٦٨٩٧ - مصد
المصد والمصدر الحفصة العالية ، وقيل اهل الجبال .

٢٦٨٩٨ - مصدز ، مفتح ، منشأ Origine, Source (F). Origin, Spring (E).

٢٦٨٩٩ - مصركب Lacto-fermentateur (F).
جهاز يستعمل في قياس حوضة اللبن الرائب .

٢٦٩٠٠ - مصركاد Frileux (F).
لا يصبر على البرد .

٢٦٩٠١ - مصراع Valve (F). Vaive, Clack (E).
احد اجزاء الخلاف الثري في الآبار المفتحة .

٢٦٩٠٢ - مصركامي Valvulaire (F). Valvular (E).
٢٦٩٠٣ - مصرد

Clate à gravier, C. à sable, Tamis (F). Wastle, Screen, Sieve, Sifter, Strainer (E).
غربال يفصل الرمل عن الحصى والحجارة .

٢٦٩٠٤ - مصروف Drain, Bardeau (F).
Drain, Drain-pipe, Shingle (E).
سيل ماء تنصرف فيه المياه التي ترشح من الارض الزراعية عقب ريها ، وقد شاع استعمال انابيب الحجر لهذه الغاية . والمصارف تنتهي بالبرب . والمصارب تنتهي بالشرية .

٢٦٩٠٥ - مصرك ، بئك Banque (F). Bank (E).
هو كل عمل ائلى المتاجرة بالترشد او الارواق ذات البذل المالي .

٢٦٩٠٦ - مصرك الإصدار Banque d'émission (F). Issuing house (E).
هو المصرف الممنوح له امتياز اصدار اوراق النقد من الحكومة .

٢٦٩٠٧ - مصرك زراعي ، بئك زراعي Banque agricole (F). Agricultural bank (E).
مصرف يختص بامداد ارباب المزارع الزراعيه بالمال على سبيل القروض الطويلة الاجل .

٢٦٩٠٨ - مصرك عقاري ، بئك عقاري Crédit foncier (F). Loan society (E).
مصرف يقرض المال لاجال طويلة لقاء رهن الضار .

جفاف التسج || يكافح بتطهير البدار بمادة الفورمولا المركز ٢٥ .. / او قفيرا باحدى المركبات الزئبقية .

٢٦٨٨٣ - مصاع الشوند Pleospora betae, Phoma betae, Ph. tabifica, Ph. sphaerosperma, Phyllosticta tabifica (S).
فطر مجهرى يصيب اوراق الشوند فينذها ويسبب ذبولها . مظهره الخارجى يقع صغيرة مستديرة حطية اللون ، تركب الارواق فتسبب جفاف التسج ويقيه الذبول ثم العطب . يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفوطاير المعتدلة المنصر الفعالم .

٢٦٨٨٤ - مصاع المسكن Pleospora putrefaciens, Clasterosporium putrefaciens, Sporodesmium putrefaciens (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الشوند في اواخر مهدها اي قبيل الاقلاص منه وبيته || مظهره الخارجى يقع مهدية لقياسية يملوها حل اسمر تركب القسم الاكبر من النصل لا يفوض منه الا البت والارام الاول || اغراضه زبيدة الا اذا استحكم في كامل الزراعة وهذا لا يكون الا في مواقع خاصة || يكافح باستعمال احد الفوطاير المادية المتوسطة المادة الفعالم .

٢٦٨٨٥ - مصاع الهنديك Pleospora albicans, Phoma albicans (S).
فطر مجهرى يركب جهازز الهنديك فينذها ويسبب اغلاص انجازها ويقتدها || مظهره الخارجى يقع مهدية لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى الحمية ، اطرافها المهدب ينصرف من الخنطى الى الاسود وعنه وصولها الى هذا الطور يملوها في وسطها شحمة حلقة بيضاء . تركب نصل الاوراق وسويقات الازهار || يكافح عند ظهوره على الاوراق باستعمال احد الفوطاير المادية المجتدة المنصر الفعالم .

٢٦٨٨٦ - مصاعة Boeryomycosa (F). Boeryomycosis (E).
المصاعة مرض جلدى يمتري الخيول . مظهره الخارجى دمال صغيرة منفكة شبيهة بالمصع تسبها بعض الميكروبات اعصبا الكروية .

٢٦٨٨٧ - مصالكة Sérologie (F). Serology (E).
هي دوس الامصال ونوعاها المختلفة وانفمالاتها وتائجها .

٢٦٨٨٨ - مصالكة ، مصلل Patic lait (F). Whay (E).
الماء الذي يخرج من الحليب المخبين عند اصططاع الجبن .

٢٦٨٨٩ - مصالكة ، تسويكة Transaction
هو الاتفاق الذي يقدّمه المختارون ليلفوا به نزاعاً قائماً او متعلّقاً بنزول كل منهم من شيء من مطالبه .

٢٦٨٩٠ - مصليكي Sérologique (F). Serologic (E).
منوط بالمصل او مختص به .

٢٦٨٩١ - مصان Canne à sucre (F).
هو قصب السكر ، اطليه .

٢٦٨٩٢ - مصب ، محور Embouchure (F).
ملتقى مياه الأنهر بالبحر .



مصاع الشوند

Laminole (F). ٢٦٩٢٦ - **مِصْلَاح**Flattening-mill, Rolling-mill (E).
الآلة الخاصة بتصفيح المعادن .Dolichocephale (F). ٢٦٩٢٧ - **مُصَنَّعُ الرَّأْس**Dolichocephalic (E).
نمت تصنعي يميز يوصف به الرأس المستطيل عند بعض الحيوانات الألفية كالإبقار والأغنام .Conchacé (F). ٢٦٩٢٨ - **مُصَنَّد**

نمت ثمريني يطلق على الإصداف أثنائية المصراع .

Courbine (F). ٢٦٩٢٩ - **مِصْكَار ، مِصْكَار**

مكة بحرية تدمي لوت القوس ، أطبا .

Sérum (F). Serum (E). ٢٦٩٣٠ - **مَصَل**Petit lait (F). ٢٦٩٣١ - **مَصَل**

هو المصالة ، أطبا .

Tuberculin (F). Tuberculin (E). ٢٦٩٣٢ - **مَصَلُ السِّل ، لَنْفَاكُوس**

مصل كاثف تخمن به الإبقار الثيق من أنها مصابة أو غير مصابة بالسِّل البقري .

Bac-croisé (F). ٢٦٩٣٣ - **مُصَلَّب**

هو الصيق ، طائر من الشرشوريات ، أطبا .

Amendements agricoles (F). Improvement, Manuring of ground (E). ٢٦٩٣٤ - **مُصْلِحَات زُرَاعِيَّة**

هي التي تصلح التربة فزيده غصبا . والمصلحات عديدة منها التسميد المضمري والمضمري والمندقي والإسماء والصفرت والتربيل والتدبيل الخ .

Intérêt (F). Interest (E). ٢٦٩٣٥ - **مَصْلَحَة**

هو كل ما يصلح به المرء من شأنه بمنفعة تأتبه إذا هو زائل سقاً أو أقام دعوى .

Service des haras, S. de remonte (E). ٢٦٩٣٦ - **مَصْلَحَة الخيالي ، مَصْلَحَة خَيْل**

دائرة حكومية تابعة للبلدية البيطرية في وزارة الزراعة تمنى بشؤون خيل النزر .

Plein (F). Full (E). ٢٦٩٣٧ - **مُصَنَّب ، مُلْتَك**

نمت وصي يطلق على ما لا جوف له كالقرون مثلاً .

Cervicornes (F). ٢٦٩٣٨ - **مُصَنَّبَات الْقُرُون**

قنة من الحشرات ، قرونها مصنبة غير مجوفة كالأيل .

Gummifère (F). ٢٦٩٣٩ - **مُصَنَّع**Gummiferous (E).
ينتج الصمغ أو يحوي الصمغ ويصطنعه .Réservoir (F). Reservoir (E). ٢٦٩٤٠ - **مَصْنَع**

حوض تجمع فيه المياه للاستعمال الصناعي ويعرف أيضاً باسم حاووز .

Cynomoir (F). ٢٦٩٤١ - **مُصَرَّر**

هو الطروث ، أطبا .

Cynomorises (F). ٢٦٩٤١ - **مُصَرَّرَات**

سبط من الطروثيات يشمل بعض الاجناس والأنواع .

Dépense (F). Expenditure (E). ٢٦٩٤١ - **مُصَرَّف**

هو المال المخرق .

Faux frais, Menus frals (F). Incidental expenses, Petty expenses (E). ٢٦٩٤٢ - **مُصَرَّفَات ثَرَوِيَّة**Faux frais, Menus frals (F). Incidental expenses, Petty expenses (E).
مصارف من زجاج ، يلد أو يستر هذه الحاجة ، تستثبت فيه ثباتات الأبداء التي لا تحصل البرد .Serre (F). ٢٦٩٤٣ - **مِصْرِي ، وَاَم**Greenhouse (E).
بناء من زجاج ، يلد أو يستر هذه الحاجة ، تستثبت فيه ثباتات الأبداء التي لا تحصل البرد .Serre froide (F). ٢٦٩٤٤ - **مِصْرِي بَارِدَة**Conservatory (E).
هي التي يكمن فيها بجمرة الشمس داخل الزجاج .Serre chaude (F). ٢٦٩٤٥ - **مِصْرِي حَارَة**Hot-house (E).
هي التي تستمد حرارتها بطريقة ثابتة حيث يراوح مطلقا من ٢٤ إلى ٢٨ سغ في زمن البرد والشتاء .Trieur (F). ٢٦٩٤٦ - **مُطْلَقِيَّة ، فَرَاكَة**Sorting-machine (E).
آلة تفرق الفلك من الحب والحب عن بقشه بعض بالنسبة إلى حبه .Lentisque (F). ٢٦٩٤٧ - **مُطْلَقَاة**

هو البطم الشرقي ، أطبا .

Mûre de ronce (F). ٢٦٩٤٨ - **مُصَنَّة ، مُصَنَّة**Blackberry (E).
ثمرة المليق والتابعه من مرجع وغيره وهي حمراء اللون تركل . ج معص ومع .Anode ٢٦٩٤٩ - **مُصَنَّد ، أَنْوْدَة**

هو لاجب التيار الكهربائي في المفلط .

Ascenseur (F). Lift, Elevator (E). ٢٦٩٥٠ - **مُصَنَّد**

جهاز يستعمل في رفع الأشخاص والأثقال .

Sublimé (F). Sublimate (E). ٢٦٩٥١ - **مُصَنَّد**Paratonnerre (F). ٢٦٩٥٢ - **مِصْنَكَة**Lightning-conductor (E).
رأس دافع الصاعقة .Liquidateur (F). Liquidator (E). ٢٦٩٥٣ - **مُصَفِّ**

من تباط به أعمال التصفية .

Raffinerie (F). Refinery (E). ٢٦٩٥٤ - **مِصْنَكَة**

معمل مجهز بالآلة للتزفة للتصفية .

Filtre (F). Filtré (E). ٢٦٩٥٥ - **مِصْنَكَة ، وَاشِح**

أداة تصفى بها السوائل ، وقد تكون من خزف أو رمل أو فحم الخ ...



مصري

٢٦٩٥٢ - مُضَافُ أُفْرِيكِي

Evonymus americana (S). Fusain d'Amérique (F).
نوع من المضاف ، جنسه صغيرة اللد تملو من ١٠٠
الى ٢٠٠ سم. فروصها منتصبية مالة. اوراقها عابلة
تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ٢ الى ٣ ، نصلها
خلى الصفحة السفلى حاد التنتين . ازهارها وردية اللون
رباعية البتلات ، حقايقها مستديرة جوزية اللون رباعية
الفلق || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٦٩٥٣ - مُضَافُ حَرِيشِ الْوَرْقِ

Evonymus latifolia (S). Fusain à larges feuilles (F).
نوع من المضاف المبلول ، جنسه تملو من ٢ الى ٥
متر. فروصها مالة . اوراقها عابلة تطول من ٨ الى
١٤ سم. وتعرض من ٤ الى ٦. نصلها جامد الصفحة ،
سمن الحافة . ازهارها خماسية البتلات احمر . حقايقها
قمرية خماسية الفلق || ازهارها يستمر من ايار الى
حزيران .

٢٦٩٥٤ - مُضَافُ قَرْقَم

Evonymus nana (S).
Fusain nain (F).
نوع من المضاف ، جنسه صغيرة اللد تملو من
٥٠ الى ٨٠ سم. فروصها مجذارية مستقيمة . اوراقها
عابلة متعاطة سنائية ، نصلها لامع الصفحة يطول نحو ٥ سم.
ويعرض نحو ١ . ازهارها رباعية البتلات والاسدية ، ثلاثية
التجميع لونيا الى الخضرة احمراد المواج . حقايقها وردية
اللون رباعية الفلق || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٦٩٥٥ - مُضَافُ مَبْدُولِي * ، مُضَافُ أُورُبِّي

Evonymus vulgaris, E. europaeus (S). Fusain commun, F. d'Europe, Bonnet de prêtre, Bois à lardoir (F).
نوع من المضاف المبلول ، يجبرته تملو من ٣ الى ٦ متر.
فروصها رباعية التضلع مالة . اوراقها عابلة سنائية
تطول من ٢ الى ١٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٤ ، نصلها
مالس الصفحة الجابضة ، سمن الحافة . ازهارها الى الخضار
الاصفر . حقايقها رباعية الفلق احمر . زورها وردية .
ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٢٦٩٥٦ - مُضَافُ مَجْدَارِ

Evonymus radicans (S). Fusain radicate (F).
نوع من المضاف ، جنسه مثولة صغيرة اللد. ساقها مجذارية.
فروصها دقيقة بحرية اللون . اوراقها ابيدة تطول نحو ٥ سم.
وتعرض نحو ٢ ، نصلها جامد الصفحة المسنجة بالاياض
الوردية . ازهارها رباعية البتلات والاسدية ، زينة اللون ،
حقايقها وردية رباعية الفلق || ازهارها يستمر من
حزيران الى آب .

٢٦٩٥٧ - مُضَافُ يَابَانِي *

Evonymus japonica (S). Fusain du Japon (F).
نوع من المضاف ، يجبرته منتصب تملو من ٣ الى ٨ متر.
فروصها مسطحة خنبر اللحاء . اوراقها ابيدة تطول من ٧
الى ١٠ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ ، نصلها جامد الصفحة
المسنجة والمزركشة بالاياض والاصفر . ازهارها رباعية
البتلات والاسدية لونيا الى الخضار الفسفي . حقايقها حر
رباعية الفلق || ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٢٦٩٥٨ - مُضَامَةُ * Intégration (F). Intégration (E).

المضامة الحلق شيء يأخر لإتمامه او لإتمام كماله .

٢٦٩٤١ - مَصْنُوعَةٌ * Sépiophores (F).

المصنوعة والمصنوعات فئة من الرغويات ثنائيات الخياشيم ،
صهاريات الارجل ، مجهزة بصنخ كاطسار وامثاله .

٢٦٩٤٢ - مِصْهَر Haut-fourneau (F). Blast-furnace (E).

موقد خاص عمودي الارتكاز يستعمل لتلويب الحديد
تحت تأثير الحرارة المرتفعة .

٢٦٩٤٣ - مَصُونَات Sonomètre (F). Sonometer (E).

جهاز يستعمل في قياس الاصوات ومقابلتها وتصنيفها .

٢٦٩٤٤ - مَصْرُوح Virucence (F).

هو للمص ، التبدل الطارئ الذي يغير لون الزهر الطبيعي .

٢٦٩٤٥ - مُضَادُّ الْحَيَوِيَّةِ ، مُرْدُ ، أَكْثِيْبِيَوِي Antibiotique (F). Antibiotic (E).

مادة ينتجها كائن معين تملو من الكائنات ||
المضادات الحيوية المعروفة حتى الآن تقسم الى فئتين :
- فئة الفنجيات كالمبيسلين والستربتوميسين والتتراسكلين .
- وفئة البكتيريات كالتيوتريسين والبايسترامين .

٢٦٩٤٦ - مُضَادُّ السَّحَالِ Béchique (F). Bechic (E).

٢٦٩٤٧ - مُضَارَّةُ * Polygamie (F). Polygamy (E).

المضارة تعدد الزوجات عند الرجل .

٢٦٩٤٨ - مُضَافُ Eau saumâtre (F).

Brackish water (E).

المضاف : الماء لا يطلق ملحوة وشده التطلع وهو الصافي
الزلال .

٢٦٩٤٩ - مُضَافُ Evonymus (S).

Fusain (F). Spindle tree (E). Spindelbaum, Pfaffen-
hütchen (D). Fusano, Evonimo (I).

جنس اشجار وجنات برية وزيينية من فصيلة القاتيات.
انواعه عديدة ، اصنافها فسيمة الاجساد تشمل الشرق
والغرب وامريكا . اوراقها متعاطلة متعقة كاملة مرطاب .
ازهارها متكونية التجميع ابيدة الارتكاز . ثمارها جرداء
مستديرة مقعصة . زورها مرة الطعم مقية وسهلة
اشغالها صفراء اللون شديدة الصلابة شائعة الاستعمال
الصناعي . نصحها يستعمل في التصوير وفي صناعة
البابرد || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٦٩٥٠ - مُضَافُ أُسُود *

Evonymus atropurpurea (S). Fusain noir (F).

نوع من المضاف ، يجبرته تملو من ٣ الى ٧ متر . فروصها
مالة . اوراقها عابلة تطول نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ٦ .
نصلها سمن الحافة خلى الصفحة السفلى . ازهارها رباعية
البتلات الازرقوانية . حقايقها الى الجوزة السوداء المواج .
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٦٩٥١ - مُضَافُ أَكْثَنُ Evonymus verrucosa (S). Fusain varruqueux (F).

نوع من المضاف ، جنسه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم.
فروصها مثولة اللحاء . اوراقها عابلة يفضية ذرية ، نصلها
سمن الحافة يطول نحو ٦ سم. ويعرض نحو ٣ . ازهارها
جوزية اللون رباعية البتلات . ثمارها برتقالية اللون ،
رباعية الفلق || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .



مضاف أسود



مضاف مبذول



مضاف ياباني

Embryon humain (F). **مُضَيِّعَة** ٢٦٩٧٣
Human embryo (E). هي الملقحة البشرية.

Embryonnaire (F). **مُضَيِّعِيّ، جَيْفِيّ** ٢٦٩٧٤
Embryonic (E).
نعت تعريفى يطلق هل ما هو مختص بالمضغة أو الجنين.

Polygone (F). Polygon (E). **مُضَلَّع** ٢٦٩٧٥

٢٦٩٧٦ - **مُضَلَّع دائريّ، مُضَلَّع مستدير**
Polygona circulaire (F). Circular polygon (E).

Quadrilatère (F). **مُضَلَّع رباعيّ** ٢٦٩٧٧
Quadrilateral (E). فيه مربع رباعي اضلاع.

Polygone régulier (F). **مُضَلَّع مُنْتَظِم** ٢٦٩٧٨
Regular polygon (E).

Manège (F). **مُضَمَكَل** ٢٦٩٧٩
Horsemanship (E). للبهان للمد لتضيق الخيل.

٢٦٩٨٠ - **مُضَمَكَلَة** صوت الحية من لسانها.

Ascence, Plûre (F). **مُضَوَّر** ٢٦٩٨١
Ascence (E).

٢٦٩٨٢ - **مُضَيِّعَة**
Photomètre (F).
Photometer (E). جهاز يستعمل في قياس حدة الضوء أو قوته.

Entomophyte (F). **مُضَيِّف** ٢٦٩٨٣
Entomophyt (E). نعت تعريفى يطلق على كل نبات من غقيات الريح
تتطفل عليه الحشرات.

Hampe (F). Stem, Flower-stalk (E). **مُطَا** ٢٦٩٨٤
الطاء هو الشمرخ. مثناه مطوان. ج. أمطاه.

٢٦٩٨٥ - **مُطَاوَرَة** الأرض الكثيرة الطير.

Caoutchouc (F). **مُطَاط** ٢٦٩٨٦

Phanérogytes parasites (F). **مُطَايِل** ٢٦٩٨٧
هي النباتات الطفيلية من باديات الزهر كالجنفيل والكتشوث.

Fine (F). **مُطَايِل** ٢٦٩٨٨
راجع اغراض.

٢٦٩٨٩ - **مُطَايَلَة**
Réclamation (F).
Complaint, Request, Claim (E). الاتماس أو الادعاء بقرار حق أو حالة.

٢٦٩٩٠ - **مُطَايَلَة**
Revendication (F).

Claiming (E).
رفع دعوى يطلب رافعها الاعتراف له بحق الملكية على
مال معين.

٢٦٩٩١ - **مُطَاوِع، مُطَيَّاع** ٢٦٩٩١
Plastique (F).
Plastic (E). هو ما كان قابلاً للشكل والتشكل.

٢٦٩٩٢ - **مِصْبَحَة**
Pompe (F). Pump (E). آلة تستعمل في رفع أو دفع المياه والسوائل وقد تكون يدوية
أو محركية. أما اشكالها فثلاثة وهي:

٢٦٩٩٣ - **مِصْبَحَة دافعة**
Pompe foulante (F). Force-pump (E).

٢٦٩٩٤ - **مِصْبَحَة رافعة**
Pompe aspirante (F). Suction-pump (E).

٢٦٩٩٥ - **مِصْبَحَة رافعة ودافعة**
Pompe aspirante foulante (F).
Suction-force pump (E).

٢٦٩٩٦ - **مُضَر**
Ascence (F).
Ascence, Acidifying (E). ابتداء الحامضية في كل مادة.

٢٦٩٩٧ - **مُضَر، مُضَرِّع، مُضَرِّعَة**
Piqué (F). Sour (E). ما كانت فسدته الحامضية من بحر وجبة وما اشبه.

٢٦٩٩٨ - **مُضَرِّح**
Harpagus (S).

Diodon, Harpagus (F).
جنس طير من حمارة البراة ونفسيعة لصقريات. أنولاه
قليلة جميعها رقيقة الفراء صغيرة القد. أثوابها موشية تنلب
فيها الجذوة الخطيعة للذئب. بطونها غير نمرة. أزوارها
بيض. ارسافها سم. || موطنها الدابات الكثيفة. تعيش
منفردة، قوتها القوامم والصائير والحشرات. تدفن في
الاجنار الرقيقة، ألتها تحضن من ٢ الى ٥ زفئات مدة
٤ اسابيع.

٢٦٩٩٩ - **مُضَرِّم**
Pyromètre (F). Pyrometer (E). جهاز يستعمل في قياس الحرارة العالية.

٢٦٩٩٤ - **مُضَرَّب يه**
Multiplicande (F).
Multiplicand (E).

٢٦٩٩٥ - **مُضَرَّب يه**
Multiplicateur (F).
Multiplier (E).

٢٦٩٩٦ - **مُضَرَّب كذا**
Factorielle (F).
Factorial (E).

٢٦٩٩٧ - **مُضَرَّوَة**
Himanthalia (S).
Himanthalia (F).

جنس نباتات بحرية من الخفيات السم. انواعها المعروفة
قليلة العدد اصلاتها جميع بحار البلاد الحارة والمتدلة
الحرارة || كلالها شديدة القصر. قوامها قسيمة الشكل
ينشعب في قمرها غضة من السيور الفرقة يروح طوطا من
متر الى ثلاثة امتار.

٢٦٩٩٨ - **مِضْغَة**
Diplostémons (F).
نعت تعريفى يطلق على كل مضغ أو جش يكون عدد
اسديته ضعف عدد التملات أو الفصل.

٢٦٩٩٩ - **مِضْغَة**
Narcisse tazette (F).
هو اليرجس الشرقي، اسطبه.

٢٦٩٩٠ - **مِضْغ**
Mastication

٢٦٩٩١ - **مِضْغ التين**
Chiquer (F).
To chew tobacco (E).

٢٦٩٩٢ - **مِضْغَاط**
Compresseur (F).
Compressor (E).

اسم يطلق على مختلف الاجهزة الضاغطة اعصها الملامسات
ومضغاط الغاز.



مضغ



مضرم

Tourbière (F). ٢٧٠٠٣ - **مِطْرَبَة**
 Peat-bog, Peat-moss (E).
 هي التُّراب و منجم التُّراب العفوي .

Gaufrier (F). ٢٧٠٠٤ - **مِطْرَمَة**
 Waffle-iron (E).
 جهاز معدني رقائق يصطنع رقائق الشمع الملمدة لتجهيز
 التفتير أي خلية النحل .

Pluvial (F). ٢٧٠٠٥ - **مِطْرِي** ، **شَتَوِي**
 Pluvial, Rainy (E).

Porte-grefle, Sujet (F). Stock (E). ٢٧٠٠٦ - **مِطْعَم**
 الإصل الذي يركب فيه العلم أو الإصل الذي يفرس
 في الأرض .

Pantogrefle (F). ٢٧٠٠٧ - **مِطْمَعَة**
 أداة للتلميع تلمع بضعة قضبان في آن واحد .

Billot à pozzée (F). Clog (E). ٢٧٠٠٨ - **مِطْمَعِيَة**

Grefion (F). Graft (E). ٢٧٠٠٩ - **مِطْمُوم**
 هو العلم ، أطلبه .

Parasite (F). ٢٧٠١٠ - **مِطْمَال**
 Parasite, Hanger-on (E).
 نمت تمرني يطلق على كل نبات يعيش طفلياً على غيره
 من النبات .

Argillière (F). Clay-pit (E). ٢٧٠١١ - **مِطْمَلَة**
 الميخ الذي يستخرج منه الطين أي الصلصال .

Diplodia (S). ٢٧٠١٢ - **مِطْق**
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يكتسبته
 فردية كروية تنشأ محفونة ثم ترقى وتثرف . جرمها
 سميك الثلاث ، حنطي اللون يميلو مق صغير . بويضاته
 حنطية لميلولية ، طولها نحو ١٥ ميكرون . غلبيتها ثنائية ،
 غنيفة الكثيرة الفاصلة || أنزلها قليلة ، جميعها مؤذية ،
 أضرها .

Diplodia griffoni (S). ٢٧٠١٣ - **مِطْق الأجاص**
 فطر مجهري يركب اخضار وانفساد الاجاص والتفاح
 ينطها ويحيطها || مظهره الخارجي يشور كثيفة التصبغ
 تركيب الحباء فتصدع البشرة بعد أن تفرح الادمة وتشوهها
 يكالته باقتطاع الاخضار الموصوبة ويظهر الجروح مع
 العلم أن هذا الفطر يتسدى على الانجبار الضعيفة دون سواها .

Diplodia zeae (S). ٢٧٠١٤ - **مِطْق الدَّرَّة الصَّفْرَاء**
 Diplodia zeae (S). Dry-rot du maïs, Pourriture sèche
 des épis (F).

فطر مجهري يصيب الدرة الصفراء في سبوتها ويظهرها
 ويصفها . مظهره الخارجي يقع لا قياسه الحجم والشكل
 جراه اللون سريمة الاتساع تركيب المصنف ففؤديه . وهو
 في السبال والامطار مشيج أغير اللون ثم يتحول الى البسرة
 فيسود كاللبن الاسود الجاف || يكالته يظهر البذار
 بواسطة املاح الزئبق . ومن المسجن اجتناب الزراعة في
 المواقع الرطبة والتخلي عن زراعة الدرة في الاربة المويومة
 نحو ثلاث سنوات .

Dama (F). Dam (E). ٢٦٩٩٢ - **مِطْبَة**
 اداة من خشب أو حديد تضرب بها الأرض لترص .

Plecoptera (S). ٢٦٩٩٣ - **مِطْبَخَة الأجنحة**
 Plécoptères (F). Plecoptera (E).
 هي اللؤلؤيات ، رتبة من الحشرات ، أطلها .

٢٦٩٩٤ - **مِطْبَخَة**
 المبخة هي مؤخر ظلف الشاة وقيل هنة كالظفكة في رجليها
 تسبح بها الأرض .

Minotarie (F). ٢٦٩٩٥ - **مِطْبَخَة**
 Flour-mill, Flour-store (E).
 البناء الملمد لصنع الطحين وهو يحوي جميع أجهزة الطحن
 ويستودعات التفتير .

Pluie (F). Rain (E). ٢٦٩٩٦ - **مِطْر**
 المطر هو الماء المنهمر من السحاب ، ج امطار . والمطر
 هي الدفعة من المطر .

Rafle (F). ٢٦٩٩٧ - **مِطْر**
 Head of maize stripped of all its fruit (E).
 سنبل الذرة والدخن وإشابهها . ج امطار .

٢٦٩٩٨ - **مِطْرَاق**
 الاثني المطراق هي القرنية البهد يتركب القنن اياها .
 تستعمل في التمية والبنزة والبقرة .

٢٦٩٩٩ - **مِطْرَاق البَحْر** ، **نَضَار**
 Sphyrna (S). Requin-marteau, Squal-marteau, Mar-
 teau (F). Hammer-head (E).

من امثالها : ابو مطرقة ومكة الاسكندر . جلس املاك
 بحرية ييوس ولؤ من فصيلة القرشيات ورتبة الاشراق .
 انواعها المعروفة ستة جميعها من الاملاك المفترسة الشرسية
 الهيفة . قوتها الاسماك والقشريات وكل ما تستطيع اليه
 سبيلا في البحر || اصطلها مياه مجاذج واخوار البلاد
 الحارة || اجسامها وشعيا الشكل تقطع من ٣ الى ٥ امتار .
 انوارها الى الكهبة تنقب او زهره وتغير مع اختلاف الانواع .
 رؤوسها كطرفة النحات ، امطوانية الشكل ، مفرغة الارتكاز
 يفرق طولها ربع طول الجسم . حشيتها كبيرة ، مستديرة ،
 بارزة ، تحتل اطراف المطراق المقنطية . اصطلها لاطة
 لكنها كبيرة الشدق وبسلة بثلاثة صفوف من الاسنان
 الدرية الحادة القرنية للشركة . زعانفها سبع تمكثها من
 سرعة الانقلاب والحركة . زعنفتها الشرجية فائرة عذلية
 الشكل || اهرق انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٦٩٩٩ - **مِطْرَاق البَحْر الهندي**
 Sphyrna zygaena (S).

نوع من مطراق البحر ، تكثر في المحيط الاطلسي ، اصطلها
 مجاذج البلاد الحارة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ امتار .

٢٦٩٩٩ - **مِطْرَاق البَحْر المَوْسَط**

Sphyrna tudes (S). Maillat (F).
 نوع من مطراق البحر . اصطلها مجاذج البحر الابيض
 المتوسط . طولها يراوح من مترين الى اربعة امتار .

٢٦٩٩٩ - **مِطْرَاق البَحْر الهندي**
 Sphyrna blochi (S).
 نوع من مطراق البحر . اصطلها تحت من مجاذج الهند
 الى الخليج الفارسي فالبحر الاحمر فصيق زنجبار . طولها
 يراوح من ٣ الى ٤ امتار .



مِطْرَاق البحر



مِطْرَاق



مِطْق الاجاص

٢٧٠٢٦ - مَقْلَقَات

Antiseptiques, Désinfectants (F). Antiseptic, Disinfecting (E).

مواد فعالة بسيطة أو مركبة تقضي على الجراثيم المرضية مثلًا حامض الفينيك والليزول، الخ.

٢٧٠٢٧ - مَقْلَقَات

Polyphasé (F).

Polyphase, Multiphase (E).

كثير الأطوار .

٢٧٠٢٨ - مَقْلَقَات

Montacuta (S).

Montacuta (F). Montacuta (E).

جنس حويالات بحرية من الرضويات فصليتها الخنافس وصليتها اليرسويات . أنواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من صلب بحار المناطق الشالية . أجسامها صغيرة القدد . أصدافها بيضيه اللون ، قليلة الإحدياد ، ناشرة السن للمضغمية . الألبا سوية تزأوح من الأبيض اللبني إلى المسند .

Calandre (F).

٢٧٠٢٩ - مَقْلَقَات

طائر من فصيلة القُرْبَات يدعى عليل ، أظلم .

Couleuvre à collier (F).

٢٧٠٣٠ - مَقْلَقَات

هي الحفّات المطوّقة ، أظلم .

Aspius (S).

٢٧٠٣١ - مَقْلَقَات ، أم حَسْرَد

Aspe (F).

جنس اسماك بحرية ونهرية من الشبويات . أنواعها المعروفة قليلة يتكثر وجودها في البحر الاسود وفي بحيرات وآهر الشرق الاوسط وأروية الجنوبية . أجسامها مستطيلة الشكل طويلا يراوح من ٢٥ الى ٥٥ سم . زعانفها الظهرية صغيرة القدد عادية الحشف . أسناتها الأمامية السفلية محبة كخالب الطير . لحويها مأكولة متوسطة الصف .

Longe (F). Lunge, Tacher (E).

٢٧٠٣٢ - مَقْلَقَات

المقود أو الخيل الذي يربط من مرسل الدابة لجرها .

٢٧٠٣٣ - مَقْلَق ، طعام الأرَب

Phagnalon rupestre (S). Phagnale (F).

نبات عشبي برّي طيب من فصيلة المركبات . مهدد البلاد الممتدة الحرارة . يوجد في المواقع الرطبة من الوسط البساتنة . أوردها متعالية ، لسة ، صغيرة القدد . أزهاره غصية التجميع ، حامية الانتكاز ، مستطيلة المالحق الدقيقة . تنويره ربيعي . منافسه الطبية مبيحة .

Tropophyte (F).

٢٧٠٣٤ - مَقْلَقَات

Tropophyte (E).

نعت ترميى يطلق على كل نبات يتكيف مع عوائل البيئة حيث يعيش فلا يتأقلم بحدائق ولا تفرقه بطرية .

Plastique (F). Plastic (E).

٢٧٠٣٥ - مَقْلَقَات

هو المطاوع ، ما كان قابلاً للشكل والتشكل .

٢٧٠٣٦ - مَقْلَقَات

Spectromètre, Spectroscope (F). Spectrometer, Spectroscope (E).

منظار طيفي ، مجلّة الاشباح .

Oisellerie (F).

٢٧٠٣٧ - مَقْلَقَات

Bird-catching, Bird-shop (E).

هي صيد الطيور وتربيتها وفي أيضاً محل تربية الطيور .

٢٧٠١٥ - مَقْلَقُ الصَّنَوِيرِ .

طير مجهري يركب أهداب الصنوبر فيميلها ويقود البنايات التي قعدت أهدابها إلى الذبول واليباس .

٢٧٠١٦ - مَقْلَقُ نَاقَالِ .

Diptodia natalensis (S).
طير مجهري يصيب النخل في كربه وأصوله سفه . منظره الخارجي بضع فسيحة مستطيلة غيراه اللون ثم سواه تركب بشرة النخل فتؤذيها وتمتري البسر تنصبه || يكافح عند ظهوره باستئبال سائل يورده الحليق نحو ١ ٪ يضاف إليه حليل الكسبة أي ما يساود نحو ١ ٪ من الزيتون الشوية .

٢٧٠١٧ - مَقْلَقُ .

Problème (F). Problem (E).

٢٧٠١٨ - مَقْلَقُ .

Débit (F). Sale, Retail (E).

ما حل المرء من حساب أو ما هو مطلوب منه .

٢٧٠١٩ - مَقْلَقُ ، زَيْقُ

Pil du maçon (F).

Mason-line (E).

خط البناء .

٢٧٠٢٠ - مَقْلَقَات

هي اللغة ، أظلم .

٢٧٠٢١ - مَقْلَقَات

Silo (F). Silo, Store-pit (E).

هي البيرة بناء خاص تحفظ فيه الحبوب والأعلاف .

٢٧٠٢٢ - مَقْلَقَات

Momot (F). Momot (E).

جنس طير من فصيلة المطويّات . أنواعها المعروفة ٢٠ أصنافها البلاد الأمريكية الحارة . تألف الإحراج والقافات . تتميز باستطالة أذنانها التركيبية التركيب الثنائية الرقال الخريطة قدر ثلاثة أصابع قبل الأطوار . مناقيرها خفيفة مستطيلة شارفة الحوافر العليا المستكة الطفا || قوتها الحشرات والقويّات وأوزغ والفقران . تلتصق أوكارها في أوقاب الصخور . تضع اللاش من بيضتين إلى ثلاث بيضات فضتها بمنوبة الذكر نحو ثلاثة أسابيع || أشهر أنواعها المطوط الملبول .

٢٧٠٢٣ - مَقْلَقَات مَقْلَقَات

Prionites motmota (S). Momot vulgaire (F).

نوع من المطوط . أصله تشمل معظم مناطق البرازيل والقويان . طول نحو ٥٠ سم . نوبه متباين الألوان . غوره وأعلى جناحيه إلى الخضر الزيتي . مناكبه إلى الزرقاء المسنجرة . عنقه وزوره وبيوضته وريشته إلى الصبغة النحاسية المولج . صغراه وقلّة رأس سود . جبهة صغراه اللون يقابلها من الوراء حثار أخضر يطقو القفن . حياته إلى الجلفة . منقاره أسود . رساء إلى الريدة السراء || يألف الإحراج البعيدة من كل حمران . قوته الحشرات وأوزغ والفقران .

٢٧٠٢٤ - مَقْلَقَات

Momotidae (S). Momotidae, Prionitidae (F). Momotidae (E).

لفصيلة طير من الجوامع سنابات المنافير . أنواعها المعروفة عديدة يتسمها جنس واحد يدعى مطوط || مهددا معظم أصراج أمريكية الوسطى والجنوبية . قوتها الحشرات وأوزغ والفقران .

٢٧٠٢٥ - مَقْلَقَات

Autoclave (F).

Autoclave, Vacuum-pan (E).

مرجل محكم الد ترفع فيه الحرارة والبخار للمطهو ، يستعمل لتعطير .



مطوط ملبول



مطاهر

٢٧٠٤٩ - مُعَادَاة بَسَالِيَّة ، مُعَادَاة تَقْصِيْلِيَّة
Equation graphique (F), Graphic equation (E).

٢٧٠٥٠ - مُعَادَاة سِنِيَّة
Formule dentale (F), Dental formula (E).

٢٧٠٥١ - مُعَار ٥
Aptère (F), Apterus, Wingless (E).

هي كل حشرة عادية الروشن أو الغد .

٢٧٠٥٢ - مُعَارَض شرعي
Contradictoire légitime (F), Legitimate adversary (E).
« هو ما كان يغل في قضية من قضايا النسب جميع خصوم المتنازع في نسبة الموجدين والاحتاليين » .

٢٧٠٥٣ - مُعَارَضَة من الغير
Tierce-opposition
« هي إحدى طرق الطعن غير العادية في حكم لا يكون المراض طرفاً أو مثلاً فيه ولكنه يكون قد اجسفت بمقتضى » .

٢٧٠٥٤ - مُعَاص ٥
Milieu (F), Medium (E).
هو البيئة ، اطلبها .

٢٧٠٥٥ - مُعَاك ٥
Ligne de conduite (F), Line of conduct (E).
الملك منح السلوك المتبع .

٢٧٠٥٦ - مُعَال كَسْتِي *

Hyfacles castaneus (S), Mégalyonx châtain (F).
طائر من الجوارم سنيات المتأخر وبضيلة لاقفات التمل .
موطن بلاد الشيل . ملجته الحيثاني زويجي . يألف البراري
الشفقة ، يغتسل قصر غيره من الطير . قوته الحشرات
والتمل || جسمه ربة يعادل نحو ٢٢ سم . يتميز بصغر
المنقاد والجناح والذنب . سقاؤه وأصابعه شديدة النشاط
تمكثته من العدو السريع . ثوبه كستني الرأس والرداء
والجناح وأطراف الذنب ، اشهب الزور والصدر والبطن .
بطنه مجذع بالكستني . متقاد وسقاؤه الى الطحلة السوداء ||
الانثى تحمل بغير الذاكر .

٢٧٠٥٧ - مُعَالَجَة ، مُعَادَاة ، مُعَالَجَة
Traitement (F), Treatment (E).

حلة وسائل المنابة بالحويان أو النبات لاقفاء الامراض
أو لمداواتها . لذلك فالمعالجة قد تكون واقية أو شافية .

٢٧٠٥٨ - مُعَالَجَة بِاتَّصُل
Sérothérapie (F), Serothrapy (E).

٢٧٠٥٩ - مُعَالِم الْأَرْض
Abouissants et canots (F), Adjacent lands (E).
هي قطع الارض المجاورة للملك من جهتي الطريق والدررس .

٢٧٠٦٠ - مُعَالَنَة
Informatique (F).
هي الاستقصائية ، اطلبها .

٢٧٠٦١ - مُعَالَنَة ، مُسَالَنَة ٥
Alternative (F), Alternative, Alternata (E).
نعت تعريفي يطلق حل كل شجرة تحمل عاماً وتختلف آخر .

٢٧٠٦٢ - مُعَالِيَات ، مُطَوَّر مُعَدِيَّة
Gastéromycètes (F), Gasteromycetes (E).
فضيلة ظهور من ادعائيات .

٢٧٠٦٣ - مُطَيَّرَة (E), Volière (F), Large bird-cage (E).
البناء المدة تربية الطير .

٢٧٠٦٩ - مُطَيِّع ٥
Chambre à humidification (F), Damping room (E).

حجرة رطبة يوضع فيها التبع الجاف ليلين .

٢٧٠٦٠ - مُطَيِّل
Ductile (F).
ما كان يتصف بخاصة اللط .

٢٧٠٦١ - مُطَي ٥
Grenadier sauvage (F), Wild pomegranate-tree (E).
هو الزمان البري ، جلناره مقري يحرسه التمل فيكثر صله .

٢٧٠٦٢ - مُطَاغَة *

Umbrella (S), Ombrell (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات معنات الارجل
سقطيات الخياشيم وبضيلة المظاعيات . انواعها المعروفة
قليلة العدد اشهرها مظاعة الحنت ومظاعة المتوسط || اصداها
مظلية الشكل ، قليلة الارتفاع ، تلفت الغليل من الجسم .
اجسامها بيضية الشوزن ، متسامكة . حيوها كبيرة
قائمة . ارجلها فضفاضة ، محيستها سقية ، ورقية
الشكل . ارجلها وسيدة ، كبيرة ، مبطقة ، ماسة
الصناعة السفل .

٢٧٠٦٣ - مُطَاغِيَّات ٥
Umbrellidae (S), Umbrellidae (E).

نصيلة حيوانات بحرية من الرغويات معنات الارجل
سقطيات الخياشيم . اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد
منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداها صغيرة
مظلية الشكل . ارجلها غارضة بيضية الشوزن أو مستديرة ||
أعرف اجسامها المظلمة والتلوين .

٢٧٠٦٤ - مُطْشَاي ، مُطْشِي
Culture sèche (F), Dry farming (E).
الذي تسقيه السماء من الزرع .

٢٧٠٦٥ - مُعَات ٥
Expédient (F), Expédient (E).
المعات الطريقة المناسبة .

٢٧٠٦٦ - مُعَادِل ، مُطَيِّر
Pair (F), Equal, Even (E).

٢٧٠٦٧ - مُعَادَاة
Bipollence
الصادق في القوة أو القيمة .

٢٧٠٦٨ - مُعَادَاة
Equation .
المعادلة في علم الرياضيات هي مائلة الشيء أن في النسبة
أو في الصيغة . والمعادلات عديدة منها :

المعادلة التفاضلية (F),
المعادلة الثانية (F),
المعادلة الزمنية (F),
المعادلة السنوية (F),
المعادلة المتكسبة (F),
المعادلة المحيية (F),
المعادلة المتألفة (F).



مظاعة



معال كستني

- 27080 Rhéostat (F). **مُعَدِّلَة ، رِيصَا**
Rheostat (E).
جهاز يزيد أو ينقص المقاومة في التيار الكهربائي المقصود تقويته أو تخفيفه .
- 27081 Mineral, Métal (F). **مُعَدَّن** (E).
المعادن اجسام طبيعية تتميز بصفاتها الكيميائية الفيزيائية وبخواصها الفارقة عنها الصلابة وقابلية الصهر والسحب والفرق باستثناء الزئبق المائع في الحرارة العادية .
- 27082 Epierrer (F). **مُعَدَّن ، صَافِرُور**
Cleanser (E).
آلة تنقل الحجارة من الارض وتجمعها .
- 27083 Minéralisation (F). **مُعَدِّلَة**
Mineralization (E).
المعدنة والتدينين واحد .
- 27084 Minéral (F). **مُعَدَّنِي** (E).
Mineral (E).
نمت .
- 27085 Minéralogie (F). **مُعَدِّلِيَة**
Mineralogy (E).
علم المعادن وهو يبحث في تكوينها وتركيبها الكيميائي والكيفي وطرق استغلالها واستعمالها وفوائدها .
- 27086 **مُعَدِّيَّات ، مُعَدِّيَّات الأَوْجُل**
Gastéropodes (F).
Gastropoda (E).
صف حيوانات من الرخويات .
- 27087 **مُعَدِّيَّات رُلُوِيَّة**
Gastéropodes pulmonés (F).
Pulmonata gastro-
poda (E).
صنف من الرخويات المعذبة .
- 27088 Erminette, Herminette (F). **مُعَدَّقِي ***
Adza, Howel (E).
أداة تسهل لمرق البرية واقتلاع الاشجار الفسدة .
- 27089 **مُعَر** (F).
Pou profond (F).
Little deep (E).
رَبَة عمرة : قليلة العمق وقليلة النبات .
- 27090 **مُعَر** (F).
Peisda (F).
Fox-evil (E).
المعر : سقوط الشعر والريش .
- 27091 **مُعَرَّاج**
قال القزويني : دابة عظيمة صلبة مثل الاراب صفراء اللون حل راسها قرن واحد اسود لم يرها شيء من السباع والقباب الا حرب (الجباض) .
- 27092 **مُعَرَّاجِيَة**
Hibernie (F).
هي معركة الشجر ، اطلبها .
- 27093 **مُعَرَّجَة ، عُرَّة**
Tic
كل هادة مستقيمة يمتدحها القرس كصك الانسان وبلغ الهواء ونفس الجدران والاربعاج يمنة ويسرة الخ...
- 27094 **مُعَرَّشَة** هي المَعْرَشة ، اطلبها .
Exposition (F).
Exhibition (E).
- 27095 **مُعَايِرَة**
Etalonnage (F).
Gauging, Standardization (E).
27096 **مُعَايَشَة**
Symbiose (F).
Symbiosis (E).
هي الاشتراك التين في المصلحة بين فردين مختلفين وهو لا يسري على الذكر والانثى والاب والابن والقطيع ومااله .
- 27097 **مُعَايَنَة**
Visita (F).
Visit, Search (E).
هي الجيتكو ، اطلبها .
- 27098 **مُعْتَرِشَة ، مُعَرَّشَة**
Liane (F).
Liana (E).
كل جنبه متسلقة مستطيلة الساق كثيرة الفروع .
- 27099 **مُعْتَصِب**
Herbivore (F).
Herbivore, Herbivorous (E).
ما كان قوته الشب .
- 27100 **مُعْتَرِي**
Elud (F).
كل مادة تنفصل عن غيرها بواسطة عائق تدعى معتقة .
- 27101 **مُعْتَن**
Fumigant (F).
27102 **مُعْتَجَل**
Hâtif, Précoce (F).
Early, Precocious, Forward (E).
صفة النبات الذي ينمو ويترك سريعاً .
- 27103 **مُعْتَجِن ، مُعْجَنَة**
Pétrin (F).
Kneading-trough (E).
27104 **مُعْتَجُون التَطْطِيم**
Mastic à greffer (F).
Graft mastic (E).
ويسمى صمغ التلميم ولاء التلميم ، اطلب و ستيك .
- 27105 **مُعَد** هو البقل الرخص والشر القصر .
27106 **مُعَدَّات زُرَاعِيَّة**
Matériel agricole (F).
Agricultural material (E).
هي الادوات والاجهزة الزراعية الآلية .
- 27107 **مُعَدَّال**
Statoscope (F).
Statoscope (E).
المعدل مرزاز تتفاضل يتأثر باضعف تقلبات الضغط الجوي . يستعمل في الملاحة الجوية خاصة عند الارتفاع او الهبوط .
- 27108 **مُعَدَّكَة ، مُعِدَّة**
Estomac (F).
Stomach (E).
جزء من جهاز الهضم في الحيوان . والمعدة انواع فهي بسيطة عند الطيليات ومرتبة عند المفترسات حيث تمكن اصحابها من اعادة الطعام الى الفم لمضغه الا اما الالفم المعدة المرتبة فاربعة وهي : أم التلافيف والأنفحة والفلسنة والكروش .
- 27109 **مُعَدَّن**
Taux (F).
راجع حق .
- 27110 **مُعَدَّل**
Statocyste (F).
Statocyste (E).
المعدل جهازان التوازن عند الرخويات . مركزه الرأس أو بالقرب منه .

مرة حاملة لها استعمالها الطبي || أشهر أنواعه المزروع
الميلوك .

٢٧١٠١ - مَعْرُوف مَبْدُول *

Cneorum tricoceum (S). *Camelée commune* (F).
نوع من المزعرون وهو جنية سرولية مبدولة تملو من
٩٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها فراء . أوراقها أبيض زيتونية
الشكل . نصلها وسيد البرق ، ملتصق الحمار ؛ لاص
الصفة البحرية اللون . أزهارها صغيرة القند ثلاثية التجميع
صفراء اللون . ثمارها الى الحفرة الشديدة الاسمرار .
يستخرج من أوراقها وبزورها عصارة مرة حاملة مسهلة .

٢٧١٠٢ - مَعْرُوفَات ٥

Cneoraceae (S). *Cneoraceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات القساعات
مقتدات المبيض . اجناسها وأنواعها عديدة ، اصناف
الاقليم المختلفة . أشهر اجناسها المزعرون .

٢٧١٠٣ - مَعْرُوف مَعْرُوف

Bineuse (F). *Hoer* (E).
جهاز زراعي يستعمل في حرق التربة تجره العوالب او
الحركات .

٢٧١٠٤ - مَعْرُوف

Caprinés (F). *Caprinés* (E).
ابعد قسي فصيلة الغنيمات .

٢٧١٠٥ - مَعْرُوف

Laite (F). *Milk* (E).
المس هو اللبن ، يقال ما في النجسة مس .

٢٧١٠٦ - مَعْرُوف

Tubériss (F).
كل مادة عاشوية تقضي على بعض الاشباب الضارة
تدعى مشاب .

٢٧١٠٧ - مَعْرُوف

Désèrant (F).
كل مادة عاشوية تقضي على بعض الاشباب الضارة
تدعى مشاب .

٢٧١٠٨ - مَعْرُوف مَعْرُوف

Herbier du littoral (F). *Herbal of littoral* (E).
المعاشب المداحية هي المواقع القريبة من البحار
والتي تكثر فيها الثبوت والاشباب البحرية .

٢٧١٠٩ - مَعْرُوف

Décagone (F). *Decagon* (E).
كل آلة تستعمل للمصر من عصر البئر الى الحبوب لذلك
فالمصارع حديد الاشكال والاحجام .

٢٧١١٠ - مَعْرُوف مَعْرُوف

Pressoir (F). *Press* (E).
كل آلة تستعمل للمصر من عصر البئر الى الحبوب لذلك
فالمصارع حديد الاشكال والاحجام .

٢٧١١١ - مَعْرُوف

Brontomètre (F). *Brontometer* (E).
جهاز آلي يسجل الموجات والظواهر الجوية (الترابولوجية)
أثناء الزلازل والمواسم والاضايع . من البرق والصاعقة
وارعد الى هبوب الرياح وسرعتها الخطية والارضية الى الاضطار
وفزاراتها الى البرد وحجمه الى الضغط الجوي .

٢٧١١٢ - مَعْرُوف

Echenilloir (F). *Branch-opper* (E).
أداة تستعمل في الاصلح تمكن العامل من الوصول والقضاء
على الاساريع والديدان الخفية في احوالي الاجبار .

٢٧١١٣ - مَعْرُوف

Nimbus
هي الدجعة نوع من الغيوم ، اطلها .

٢٧٠٩٦ - مَعْرُوف زراعي

Exposition agricole (F). *Agricultural exhibition* (E).
مكان يمرض فيه كل ما له علاقة بالزراعة من النباتات
والآثار والحيوان والادوات والمعدات .

٢٧٠٩٧ - مَعْرُوف مَعْرُوف

Déchaussé (F).
مُعْرُوف الشجر *
Hibernis defoliari, Erannis defoliari (S). *Hibernie
défoliante, Phalène effeuillante* (F). *Mottled-
umber moth* (E). *Grosser Frostspanner* (D).
حشرة من فصيلة الذبذبات ، ذكرها صغير القند اصفر
الجسم والارواش المسجبة والمزركشة بالاحمر والاسمر .
انماها مارة بمراء اللون مستطيلة الجرازم والارواش والاشرة .
تمتص كمنها في اوائل الخريف عند انتشاب الاثمار فيقتط
في اوائل الربيع من رقات نمة تلثم البرام والاوراق
الغنية || تركب منم الاثمار الحرجية وبعض المشرقة
كالستيدان والندارد والكرزان والزيلا والزيغوني والخلص
والزعرور والبنق والفتاح والاجاص || تكافح في الشتاء
باستعمال احد المواكين الفدالة .

٢٧٠٩٨ - مَعْرُوف مَعْرُوف

Hibernis leucophaearia, Erannis leucophaearia (S).
Hibernis gristère, Phalène du chêne (F).
Hibernis leucophaearia (E).
حشرة من الاقيات حرشفيات الاجنحة . ذكرها مجنحة
اناثها مارة . موطنها البلاد الممتدة الحارة من الشرق
الاصول الى اوروبا . فراشتها صفعة تميش على غزونها
الاماعي . سرتها تميش على اوراق الستيدان والقص ||
جسم الذكر منير قصيف يطول نحو ٩ سم . بسطة نحو
٣٤ سم . رأسه الى الربعة . عيناه صغيرتان . زياناه
مشطيان . جوشه ويطة الى الربعة للسراء المواج . رواشته
ردادية اللون يعلوها قبيج بيضوي وتسلج اسمر . اعداها
الى الربعة القفصية || الاثى مارة . جسمها اعليحي
الشكل يطول نحو ١٠ سم . ويتنهي بمزج حاد . ثوبها
الى الربعة السراء تملوها رقة مراء . جرانها مستطيلة
نظيفة تكتنها من الانتفال بسرعة وين تلتق الاثبار ||
لها جيل واحد في الحول . تظهر في نيسان . تسرح في
الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثلاث ساعات وتمتص
المكن مباحدا على اباط الاوراق || السرعة عند بلوغها
الاكمل تطول نحو ١٨ سم . جسمها اسطواني الشكل ،
مبشر اطلب الدقيق القصير . ثوبها الى الكهبة تملوها ثلاثة
خطوط سود قاطبة منها خط نجبي مضاعف العرض . رأسها
الى الجفوة . شرجها معمدوب الشكل ينتهي بزايدة ذلقة .
وراجها البنية الوسطى شديدة القصر مما يجعلها تقصر
عند الانتفال || طوط الاكمل يستمر نحو ٣٨ اسبوعا
ويتقضي في التربة ضمن غلاف من الطين والبراز المصمون
بالريال .

٢٧٠٩٩ - مَعْرُوف مَعْرُوف

Cneorum (S).
مَعْرُوف الشجر *
Cneorum (S).
مَعْرُوف الشجر *
Cneorum (S).
مَعْرُوف الشجر *



مَعْرُوف الشجر



مَعْرُوف رداء



مزعرون مبدول



مصارع



مصارع

٢٧١٢٨ - مَصْمِيح للبرحة البقلية في ساق النبات الحولي .

Huilerie (F).

٢٧١٢٩ - مَصَصْرَة

عمل استخراج الزيت . Oil-works, Oil-shop (E).

Articulées (F).

٢٧١٢٩ - مَصْمِيحَات

Articulata (E).

Ciderrie (F).

٢٧١٣٠ - مَصَصْرَة التَفَاح

Cider making, Cider-factory (E).

المكان المد لمصر مصنع خمر التفاح مع ما يشمل من مختلف التجهيزات .

Ecimeuse (F). Pollarder (E).

٢٧١٣١ - مَصَصْرَة

آلة تُشْرِفَت أَرْوَاحَ حَالِيًا قَبْلَ الْإِسْهَابِ خَشِيَةِ الصَّيْغَانِ .

Emondoir, Serpe (F).

٢٧١٣٢ - مَصَصْرَة

أداة المقصد ويدهي المقصب . Pruning-hook (E).

Brachionidés (F).

٢٧١٣٣ - مَصَصْرَة يَتَات

Brachionidés (E).

فئة درويبات مائية من دَوَارَاتِ الْمِيَاءِ الْعَلِيَّةِ . تَمَيِّزُ بِاسْتَطَاعَةِ الْإِرْجُلِ الشَّدِيدَةِ الْمُرَوَّلَةِ .

Scissipare (F). Schizogenous (E).

٢٧١٣٤ - مَصَصْرَة

متناسل بالانقسام إلى شطرين .

Amblycephalidae (S).

٢٧١٣٥ - مَصَصْرَات

Amblycephalidés (F). Amblycephalidae (E).

فصيلة حيّات بيوضة من عادات السموم . اجناسها المعروفة خمسة ، جنسان يمشان في مناطق جنوب آسية وثلاثة اجناس تعيش في البلاد الاسيوية إلى اجسامها متوسطة الطول ، شبه اسطوانية الشكل ، طولها من ١٠ إلى ٧٥ سم . رؤوسها مستقيمة الاغظام ، راحة الاشدق فكركها مستنمة . صيبتها صغيرة . اعتنقها لا ملحوظة . اذنها قصيرة . اثنائها مبلقة أو مرقوشة إلى انواعها المعروفة ٤٢ . تألف الغابات والجبال العالية . تسرح في الليل . قوتها الفئران والجرذ والبطاء والثعابين الصغيرة .

Routoir (F).

٢٧١٣٦ - مَصَصْرَة

Retting-pond, Retting-pit (E).

مصنع أو حوض أو بركة أو غدير يملأ فيه القنب والكتان .

Putrescible (F).

٢٧١٣٧ - مَصَصْرَة ، مَصَصْرَة

صفة التي ، القابل للتلفن . Liable to putrefaction (E).

Franc (F). Exempt (E).

٢٧١٣٨ - مَصَصْرَة

خالص الاجرة أو طليق من الكس .

Stérilisateur (F). Sterilizer (E).

٢٧١٣٩ - مَصَصْرَة ، مَصَصْرَة

جهاز لتطهير رنكز على الحرارة المرتفعة .

Drageonnante (F).

٢٧١٤٠ - مَصَصْرَة

هي النباتات الكثيرة القسا والمملوخ كالتين والخرور والورد والرومان .

Pancreas (F).

٢٧١٤١ - مَصَصْرَة

هو الحولة ، اظلمها . Pancreas (E).

Articulation, jointure (F).

٢٧١٤٢ - مَصَصْرَة

Articulation, joint, joining (E).

المحاق من التحل في المفاصل . فالربيع عند الحافر معقم والركبة معقم والمعزوب معقم إلى يقال فرس شديد المعاقم .



مَقَام



مِطْلَاطُ الرُّوحِ



مِطْلَاطُ

Pédoncle (F). Peduncle (E).

٢٧١٣٧ - مِطْلَاق

جسم دقيق مستطيل يحمل زهرة أو بعض اجزاء .

Podocorpe (F).

٢٧١٣٨ - مِطْلَاقِيَة

هي القشع ، اظلمه .

Expérimenté (F).

٢٧١٣٩ - مِطْلَاقِيَة

Experienced (E).

Mangeoire (F).

٢٧١٤٠ - مِطْلَاقِيَة

Manger, Crib (E).

وهاء من عشب أو باطن من حيوان توضع فيه الاغلاف للحيول والبقر وغيرها .

٢٧١٤١ - مِطْلَاقِيَة

الملف بمجموعة كواكب .

Informatique (F).

٢٧١٤٢ - مِطْلَاقِيَة

هي الاستقصائية ، اظلمها .

Hydroscope (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٤
Water-diviner (E).
هو الذي يستكشف البنايع ويمن موائها .

Terror (F). Soil, Ground (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٥
صفة الارض بالنسبة الى الزراعة كقولك مِقْبَاش جيد
الآباء ، ويمع كرم ، وطعم الميس .

Losange, Rhombe (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٦
Lozange, Rhomb, Rhombus (E).
جسم رباعي الاضلاع المتساوية .

Hydroscope (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٧
Water-divining (E).
علم استكشاف البنايع وتبين موائها .

Rhomboidal (F). Rhomboidal (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٨
Oculaire (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٥٩
المعين من كان يعمل حياً . راجع جامح .

Misuler (F). To maw (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٠
مفا ومباغ وباء السور : صَوْرَت .

Glossostemon (S). **مِقْبَاش** ٢٧١٦١
Glossostémon (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخبائيات .
انواعها قليلة العدد ، اصلها الشرق الاوسط . اوراقها
متعقبة متناقبة كفية . ازهارها صغيرة القد فردية || اشهر
انواعها اللغات المجي .

Glossostemon bruguleri (S). Glossostémon de Perse (F). **مِقْبَاش عَجَمِي** ٢٧١٦٢
نوع من اللغات وهو عشبة برية طيبة تملو من ٥٠ الى
١٠٠ سم . جذورها حزائي الشكل احمر المادة اسود القلفة .
ساقها وفروعها زهاء اللحاء . اوراقها مستطيلة الاضلاع
خلية النصل . ازهارها صغيرة القد بيضاء اللون || جلوره
تستعمل مسبوقة وتدخل في عدة مركبات تفيد المرأة النساء .

Avarias (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٣
Damages, Averages (E).
هي القوار ، راجع .

Magas (S). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٤
Magas (F). Magas (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات عضديات الارجل
وفصيلة التثدييات || انواعها المعروفة عديدة جميعها من
متحجرات الاناج الاول .

Magas (S). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٥
المغائر والمغائير : صنع ينسجه العرط وهو حلو يلزك
الا انه مقت الرأفة .

Hétérotrope (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٦
Heterotropous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبت (ملقونة نباتية) رأس
طرفه لا يقابل انقور البزرة .

Néphélomètre (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٧
Nephelometer (E).
جهاز يمكن من درس الغبش وتحديده .

Vivace (F). Perenniel (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٨
نعت تعريفي يوصف به النبات الذي يعيش أكثر من
سنتين .

Novala (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٦٩
Newly broken-up (E).
كل ارض حيرة مستعدة .

Fabrique, Manufacture (F). Fabric, Manufactory (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٠
Brasserie (F). Brewery, Brewhouse (E).
معمل تصنع فيه البيرة اي البيرة .

Glucoserie (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧١
Glucose-house (E).
معمل يحول فيه النشا الى غلوكوز .

Grapperie (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٢
Graperie, Vinery (E).
هي دفيئة العنب ، بناء زجاجي السقف وبعض الجوانب
مجهز بعدة الفتحة يستعمل لفرس الكروية ونتاج العنب
علاوة لزبان الانتاج الطيب .

Insectarium **مِقْبَاش** ٢٧١٧٣
موسسة علمية مجهزة بالوسائل الخاصة التي تمكن من تربية
الحشرات لدرس اطوارها وبيوتها .

Fiduciaire (F). Fiduciary (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٤
هو الذي اوصى له مال وفرض عليه دفعه للمستحق
المهدي .

Mécanisme (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٥
نعت تعريفي يطلق على الاعضاء المماثلة المتماثلة في كامل
الجسم او في جزء منه .

Pioche (F). Pickaxe (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٦
اداة زراعية تستعمل في ركاش التربة . اشكاله واحجامه
عديدة تختلف باختلاف الاعمال المطلوبة .

Collique (F). Collic, Coliac (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٧
Intestin (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٨
Intestine, Bowel, Gut (E).
عضو من جهاز الهضم يمتد من المعدة الى المست وهو
يقسم الى عدة اقسام انحصارها للمي التثيق والمي التفليط .

Intestin grêle (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٧٩
Small intestine (E).
القسم الوسطي من الامعاء .

Jéjunum (F). Jejunum (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٨٠
الممي الصائم جزء من الممي التثيق مركزه بين التلج ودين
الممي التفليط .

Colon (F). **مِقْبَاش** ٢٧١٨١
Colon (E).
القسم الاخير من الامعاء ينتهي في المست .

Iléon, Iléum (F). Ileum (E). **مِقْبَاش** ٢٧١٨٢
الممي القفيف هو القسم الثالث والاطول من الممي التثيق ،
مركزه بين الممي الصائم والاخور .



مقش



مقش



مكث اخضر



مكث اريد



مكث غروي



مكثرة



مكثليس الكرز

٢٧١٧٦ - مكث غروي *

Alnus glutinosa (S). Aune glutineux, Aune, Verne, Vergne (F). Common alder (E). Alder, Erlenbaum, Erle, Schwarzerle (D). Alno, A. ontano, Ancetano, Aunera, Verna russa (I).

نوع من المكث اللؤلؤ. شروبه عديدة تملو من ٥ الى ٣ م. منبها الشائع بجاري الماء. سيقانها جالسة تشورها الى السرة السوداء. فروصها زياه. اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص. نصلها عديد المروق الدقة، لابع البشرة المائلة على صفحتيه.

٢٧١٧٧ - مكث قلبي الورق *

Alnus cordata (S). Aune à feuilles en cœur (F). نوع من المكث، شجرته صغيرة تملو من ٨ الى ١٠ امتار. فروصها مائلة. اوراقها ثلثية الشكل تملو من ٥ الى ١٢ سم. وتعرض من ٤ الى ١٠ سم. نصلها مسنن، الحافة خلي الصفحة السفلى. غاريطها فردية التجميع جوزية اللد.

٢٧١٧٨ - ميكر، مغثور، مغثور *

Miellet (F). مغثور، مغثور (E). نوع من المكث وهو شجرة جبلية مبلولة تملو من ٢ الى ٦ امتار. اوراقها بيضيه ذلقة. نصلها يطول من ٣ الى ٨ سم. ويعرض من ٢ الى ٥ سم. وهو ثنائي التستين. اخضر الصفحة العليا خلي السفلى.

٢٧١٧٩ - ميكرينات *

Nectarinidées (S). *Nectarinidées* (E). فصيلة طير من الجوارم وريقات المكث. اجناسها والوانها زهاء ١٢٠، جميعها صغيرة اللد، بجلة الشكل، زاهية الالوان المرائية، مستطيلة المنابير النقيقة. مهاجا البلاد الحارة. يجرس رقيق الاطوار والبال الكرية.

٢٧١٨٠ - ميكرية *

Melica (S). *Mélancolie* (F). *Mellic*, *Meick* (E). *Nickendes* (D). *Melica* (I). جنس نباتات عشبية سولية او معمرة من فصيلة الجبليات. انومها عديدة جميعها علفية ترعها للثاني. وهي تنبت في مسط الامتداد المتدلة الحارة. سيقانها نخيلة متضخمة. اوراقها عصفية، متبادعة، قليلة. ازهارها صغيرة اللد، حذوية التجميع، حطرية العروق، خزرية الرقيق يجرسها النمل.

٢٧١٨١ - مكث، مكث *

Málonghe (F). ليات زراعي مشهور باسم بالونج، اماليه.

٢٧١٨٢ - ميكداني *

Pluvioscopa (F). *Pluvioscopa* (E). الملقاق جهاز يسجل زمن وقوع المطر بعدة استمراره ويقدره.

٢٧١٨٣ - ميكد *

Rams (F). *Or* (E). الملقاق جهاز مجازي الشكل يكون منه بعض المفصليات والرضويات والقتريات والحشرات.

٢٧١٨٤ - مكثليس الكرز *

Magdalis cerasi (S). *Magdalis des cerisiers* (F). *Magdalis cerasi* (E).

حشرة خاضعة خالصة مؤذية من فصيلة السويات وربة مفصلات الاجنسة. تألف جناتن الاجار الشرة من قنقاج واجامس وكرز وغوغ... غناظها تميش على نصال الازواك. يرقاها تنجج الاناد والافصان حتى

٢٧١٨٥ - مكثلية، مكث *

Vache taurillière (F). في البقرة القملة المستعدة ابدانك او الاستحمام.

٢٧١٨٦ - مكثوم *

Echadé (F). *Scalded* (E). الملقوم من النبات: الذي لقمه الحمر.

٢٧١٩٠ - مكث، مكث، جكر الماء

Alnus (S). *Aune* (F). جنس نباتات شجرية وجينية من فصيلة البتليات. انواعها ١٦، اصنافها البلاد الممتدة. تميش حل ضفاف البحيرات وجاري الماء. اوراقها مائلة. ازهارها قديمة، الاكثية منها تظهر في الخريف والانتوية تأخر الى الربيع. اعشاشها خالصة الاستعمال المناضي لا يطعها الماء. فحمها يستعمل في صناعة الباريد. تشورها وافر الطنان تصلح للباغة. اشهر انواعها ما يتبع.

٢٧١٩١ - مكث اخضر *

Alnus viridis (S). *Aune vert*, *Aunâtre* (F). *Green alder*, *Mountain alder* (E). *Grünerle*, *Drosle* (D). *Drosza*, *Drosale*, *Trosga* (I).

نوع من المكث وهو شجرة جبلية مبلولة تملو من ٢ الى ٦ امتار. اوراقها بيضيه ذلقة. نصلها يطول من ٣ الى ٨ سم. ويعرض من ٢ الى ٥ سم. وهو ثنائي التستين. اخضر الصفحة العليا خلي السفلى.

٢٧١٩٢ - مكث اريد *

Alnus incana (S). *Aune grisâtre*, *A. de montagne*, *Aune blanchâtre* (F). *Black alder*, *Hoary alder*, *Speckled alder* (E). *Weisserle*, *Grauerle* (D). *Auzano*, *Marassola*, *Ontanella* (I).

نوع من المكث اللؤلؤ. شروبه عديدة، اجناسها صغيرة اللد تملو من ٥ الى ١٥ م. اوراقها مزرقية تطول من ٤ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ سم. نصلها باهت الاخضر، اريد اللون. كثير العروق، مزدوج التستين.

٢٧١٩٣ - مكث اليابان *

Alnus japonica (S). *Aune du japon* (F). نوع من المكث، مهدد اليابان. شجرته متوسطة اللد تملو من ١٠ الى ١٨ م. فروصها مضلمة زياه. اوراقها سنائية تطول من ٦ الى ١٤ سم. وتعرض من ٢ الى ٦ سم. نصلها قابل الزيب والخل، متبادعة التستين، ينتهي بهبة مستدقة مستطيلة.

٢٧١٩٤ - مكث بحر *

Alnus maritima (S). *Aune maritime* (F). نوع من المكث، شجرته صغيرة اللد تملو من ٨ الى ١٠ امتار. فروصها مائلة. اوراقها تطول من ٥ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٦ سم. نصلها مائل الصفحة العليا خلي السفلى لا قياس التستين ينتهي بهبة قصيرة. وهو يربح في المناطق الرطبة الساحلية ويجيد قرب الماء.

٢٧١٩٥ - مكث صباغي *

Alnus tinctoria (S). *Aune tinctorial* (F). نوع من المكث، مهدد اليابان ومغشوريا. شجرته متوسطة اللد تملو من ١٢ الى ٢٠ م. ساقها كثبة سمراء اللحاء. فروصها الفتية مغشورة. اغناها ثلثية الحمل. اوراقها اهلالية متبادعة مقبولة للقاعدة تطول من ٦ الى ١٢ سم. وتعرض من ٥ الى ١١ م. نصلها مجري اللون خلي الصفحة السفلى. تشورها صبغية خالصة الاستعمال.

2٧١٩٨ - **مِفْرَلَة** (F). Scoop, Ladle (E).
رشف مقعر يستعمل في اغتراف الماء والمواد المائعة .

2٧١٩٩ - **مِقْرُود** (F).
هو الكرم الأحمر ، اطبله .

2٧٢٠٠ - **مُقْرِي** (F).
نوع من الفجل الزراعي المأكول يعرف بفجل الهند أو فجل جاوا .

2٧٢٠١ - **مِقْرَل** (F). Distaff (E).
هو المردن ، شكل من اشكال تشذيب الشجر .

2٧٢٠٢ - **مِفْشِيلُ الْوَرْدِ** *
(F). *Megachile centuncularis* (F). *Mégachile* (F).

حشرة من المِفْشِيلِيَّات طولها نحو ١٢ سم . تركيب الوردة والفلل ختصم نصل الارواق وتنقل اللغات الى غشائها الذي تقيمه في بعض التجاويف الخفية حيث ترسب اللغات سنفا متتامة يغطيها المكان ، يشاهد ويحيط به شيء من الصل || يعتبر من الحشرات الضارة لانه يلذي اوراق الوردة والفلل .

2٧٢٠٣ - **مِفْشِيلِيَّات** *
(F). *Megachilidae* (F). *Mégachilidés* (F). *Megachilidae* (E).
فصيلة حشرات خاضعة جارية من رتبة غشائيات الاجنحة . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، قريبة الشيء من النحل . جميعها صغيرة القدر ، طولها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . تقيم غشائياتها في تجاويف الاشجار اليابسة .

2٧٢٠٤ - **مَغْض** (F).
Colique (F).
Colic, Stomach-ache (E).
عارض يعترى بعض الحيوانات كالخيل والبقر . اسبابه مختلفة وانواعه ايضا اغصها الكولي والمومي .

2٧٢٠٥ - **مِغْصَن ، مِفْنَد ، مِقْصَب**
(F). *Ebranchoir* (F). *Pruning-tool* (E).
اداة تستعمل في قطع الاغصان والاشاد .

2٧٢٠٦ - **مَغْض** (F). *Momordica* (S). *Momordique* (F).
جنس نباتات عشبية مفادة وعارضة من فصيلة الغشائيات ، انواعها ١٢ منها الحولية والمصرة . اوراقها متعاقبة ، مستطلة ، كنية ، زغبية ، خشنة . ازهارها فردية التجميع ، كبيرة القدر ، وسيدة المسكن . ثمارها بيضية الشكل ، لثولية القشور . يزورها مبطلة ، سحلية اللون ، بارزة التسنجع والازراكنش || احرف انواعه واشهرها ما يلي .

2٧٢٠٧ - **مَغْضُ الْكُوْشْنَشِين**
(F). *Momordica cochinchinensis* (S). *Momordique de Cochinchine* (F).
نوع من المغض المسر ، منته الكوشنشين والهند . جذوره عشوية ، ساقه تطول نحو ٨ أمتار . حوافه بسيطة . اوراقه ثلاثية او خاسية التفصيص . ازهاره كبيرة القدر تطورها نحو ١٠ سم . لونها الى الصفرة الباهتة ، بتلاتها سنانية الشكل ، مضطبة بالاسود . ثماره بيضية حمراء اللون تطول من ١٠ الى ١٨ سم .

2٧٢٠٨ - **مَغْضُ بِلْسِي** *
(F). *Momordica balsamina* (S). *Momordique baumier*, *M. balsamina*, *Pomme de merveille*, *Pomme de Jérusalem* (F). *Apple of Jerusalem*, *Balsam apple* (E). *Balsampfel*, *Wunderapfel* (D). *Momordica*, *Pomo balsamo*, *P. di meraviglia* (I).
اشهر انواع المغض . اصطناعه فسيحة الارباب معتد من الشرق

الاقارب قطعها وتكثها || جسمها صغير القدر يطول من ٢ الى ٤ م . ثوبها الى السواد الكامد . رأسها كبير الجرم ينتهي بتمك قاصم ثاقب . عينها كبيرتان . زباناها صوطانيان . ظهرها مستدير الخوضر اللامع القارق الطرفت . ارساغها رباعية المقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع . تسرح في الليل . تساقد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تزرز المكان في طاء الافئاد والافصان في تقرب تغلجها بتمكها || البرقة مرقاة تطول عند تمام الادراك من ٦ الى ٧ سم . جسمها اهليجي الشكل ، سحلي اللون ، اصفر الخواج ، اسمر الرأس والفرج || طود الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في طرف النلق الذي احفرته البرقة .

2٧١٨٥ - **مُعْدٌ**
(F). *Nutritif* (F).

(E). *Nutritive*, *Nourishing* (E).
نعت تعريفي توصف به المواد الغذائية او التي لها علاقة بالتغذية .

2٧١٨٦ - **مِغْرَاس** *
(F). *Transplantoir* (F). *Garden trowel* (E).

اداة مختلفة الشكل والحجم تستعمل في تحجيم التربة لتسكينها من اقتبال الشتل المطلوب غرسها .

2٧١٨٧ - **مِغْرَاسُ الْكِي** *
(F). *Transplantoir mécanique* (F). *Transplanting-machine* (E).

جهاز آلي يؤمن غرس الشتل في التربة على ابعاد متساوية .

2٧١٨٨ - **مُغْرَب**
(F). *Albinos* (F).
هو الاصعب ، اطبله .

2٧١٨٩ - **مُغْرَة**
(F). *Ocre* (F). *Ochre* (E).
تراب صلبالي يستعمل في التخصيب .

2٧١٩٠ - **مُغْرَة حَمْرَاء**
(F). *Ocre rouge* (F). *Red ochre* (E).
تراب صلبالي اخر اخضاب .

2٧١٩١ - **مُغْرَة صَفْرَاء**
(F). *Ocre jaune* (F). *Yellow ochre* (E).
تراب صلبالي اصفر اخضاب .

2٧١٩٢ - **مُغْرَدٌ**
(F). *Scare bird* (F).
راجع ابو مقار ديك البحر .

2٧١٩٣ - **مُغْرُز**
(F). *المغرز* او مغرز الذهب نجم ثمر من كوكبة الدب الاكبر .

2٧١٩٤ - **مُغْرُزٌ**
(F). *Empettement* (F). *Footing* (E).

2٧١٩٥ - **مُغْرُزُ السَّيْب**
(F). *Ecamousseure* (F).
مغرز نصاب الحشرات .

2٧١٩٦ - **مُغْرُزُ الطَّعْم**
(F). *Enture* (F). *Cut*, *Incision* (E).
الموضع الذي يوضع فيه الطعم من المظلم .

2٧١٩٧ - **مِغْرَسٌ**
(F). *Birona*, *Haque* (F). *Truck* (E).
اداة من حديد مخروطية الطرف تفرز في التربة لتفتح حفرة توضع فيها التربة .



مغراس



مفشيل الوردة



مغض بلسي

- الأولى إلى الهند . ساقه تطول نحو ١٥٠ سم . حوالقه دقيقة .
اوراقه ثلاثية أو خماسية التفصيص تطول وتعرض نحو ٨ سم .
نصلها مائل الصفحة الالامعة ، مسن الحافة . أزهاره
صفراء اللون ، اهليلجية البتلات . ثنائياتها ثلثية الشكل ،
مسنة ، طرية الارزكان . ثماره برتقالية الشكل واللون تطول
نحو ٨ سم . وهي تزكك خضراء في أول حدها وتصبح طرية
عند نضجها وقد تدخل في عدة مستحضرات دالة ومفيدة .

٢٧٢٠٩ - مغض خَلْيِي الْوَرَقِ *

٢٧٢١٩ - مُغْلَقِي Indéhiscant (F). Indehiscent (E).
لمت تعريفي يوصف به ما لا يتفتح أو لا يتشقق من
البزور وغيرها .

٢٧٢٢٠ - مُغْلِمٍ راجع مغلفة .

٢٧٢٢١ - مُغْضَا صَهْرَكِي Magma (F). Magma (E).
المغيا ، فيزياليا وكباريا ، كل مادة رغو شبة مائلة
كازجاج المصهور أو كالطابع الذي يثقل به البركان
عند ثورانه .

٢٧٢٢٢ - مُغْمَدَكَة الْاَجْنَحَة Coléoptères (F). Coléoptera (E).
رقة من الحشرات تعرف بقدمية الاجنحة ، الطلها .

٢٧٢٢٣ - مُغْمَنٍ Ensacheur (F). Sacking (E).
اداة تجمل الكيس قائما مفتوحا فيسهل ملوك حبا .

٢٧٢٢٤ - مُغْنِطَا Magnétomètre (F). Magnetometer (E).
جهاز يمسك في قياس الاقطاب المغنطة .

٢٧٢٢٥ - مُغْنِطِيسِيّ ، مُغْنِطِيسِيّ Magnétique (F). Magnétique (E).
مغناطيسي .

٢٧٢٢٦ - مُغْنَتَة * ، مُغْنَتُو مَاهُونِي Swietenia mahogoni (S). Mahogon, Mahogoni, Acajou à meuble (F). Mahogony tree (E). Mahogoni baum, Acajou baum (D). Mogano, Acajou (I).
شجرة متوسطة القد من فصيلة الازورسيتيات . مهدا المناطق
الحارة الافريقية . خشبها اصفر اللون ، اسمر المواجه ،
ناعم الرقعة ، فائس الصنف ، يحتر من اجود أنواع
الأكاجي . وهو شائع الاستعمال في البلاد الاستوائية لانه
عازل طبيعي للحرارة القوية المشددة .

٢٧٢٢٧ - مُغْنِطَ Alimentar (F). To magnetize (E).
مغنت .

٢٧٢٢٨ - مُغْنِطَة Magnétisation (F). Magnetization (E).
مغنت .

٢٧٢٢٩ - مُغْنِطَة حَيَوَانِيَة Zoomagnétisme (F). Zoomagnetism (E).
علم يبحث في تأثير المغنطية على الاحياء .

٢٧٢٣٠ - مُغْنِطِيس ، مُغْنِطِيسِ Aimant (F). Magnét (E).
مغناطيس .

٢٧٢٣١ - مُغْنِطِيس كَهْرَبَالِي Electro-aimant (F). Electro-magnet (E).
مغناطيس كهربي .

٢٧٢٣٢ - مُغْنِطِيسِيّ كَهْرَبِي Magnéto-électrique (F). Electro-magnetic (E).
مغناطيسي كهربي .



مغض خلي الورق



منة

Momordica charantia (S). Momordique à feuilles de vigne, Margose, Paparah (F).
نوع من المغض ، منته البلاد الحارة . جلوهه ليلية التركيب .
ساقه حارفة تطول نحو ٣٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه
خماسية أو سباعية التفصيص . نصلها مسن الحافة ، خل
البشرة قتالة العروق البارزة . ازهاره صفراء اللون ، خفيفة
البتلات . ثنائياتها تتوسط المالحق . ثماره برتقالية اللون ،
مستطيلة الشكل ، ذرية الرأس والمقب ، ثملورية القشرة
الخشنة ، تطول إلى ١٥ سم . لها احمر اللون
ماكول .

٢٧٢١٠ - مغض قَلَالِيّ

Momordica involucrea (S). Momordique à involucre (F).
نوع من المغض ، منته افريقية الجنوبية . ساقه حارفة
تطول نحو ٣٠٠ سم . حوالقه بسيطة . اوراقه صغيرة القد
خماسية التفصيص ، نصلها مسن الحافة يطول ويعرض
من ٤ إلى ٦ سم . ازهاره بيضاء اللون مستديرة البتلات
ثنائياتها ثلاثية طرية . ثماره ارضوانية ، بيضية الشكل
تطول نحو ٥ سم . لها احمر .

٢٧٢١١ - مُغْمِر Cochénille
المغمر والمغمرية حشرة واحدة مشهورة باسم قرمزية .

٢٧٢١٢ - مغمرِيَات ، قَرْمِزِيَات

Coccidae (S). Coccidées (F). Coccidées (E).
فصيلة حشرات من تصفية الاجنحة . اجناسها وانواعها
كثيرة البند تتميز بصغر كدها وبازدواجها الشكل والشي
وبافرازاتها الشمية أو الككية || ذكروها تحيلة الجسم
مجسة . انثاهما معار يفضية الشكل أو مكورة تميز
حل النسج النباتية تنفثها وتمتص عصارتها .

٢٧٢١٣ - مغمرِيَة التَّلَاحِ الدُّكْبَة

في قرمزية التَّلَاحِ ، اطلها .

٢٧٢١٤ - مغمرِيَة الحُمْضِيَّاتِ

Pseudococcus citri (S). Cochenille farineuse des agrumes (F).
حشرة من القرمزيات ، بيضية الشكل ، صغيرة القد
مبططة الجسم ، مخدة الظهر ، صفراء اللون ، تحيلة التلّاف
الشمي القوي التركيب || تركيب الحفصيات والمغش
وبعض نباتات الزينة . اضرارها مدمجة . تكاثرها كثيرا
من القرمزيات .

٢٧٢١٥ - مغمرِيَة اليَاسْمِينِ

Orthazia insignis (S). Cochenille du jasmin (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات ، ثوبها إلى الخضار البني
يشفاها ندف شبي بمغلقها من كل صوب . طولها مع
كيس مكها يبلغ نحو ٧ مم . تركيب الياسمين والكرزات
وغيرها من نباتات الزينة || تكاثر كثر القرمزيات .

٢٧٧٤٠ - مَغْنُولِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الزَّهَرُ

Magnolia grandiflora (S). *Magnolia à grandes fleurs* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية. جفهرتها كبيرة القد هريمية الشكل تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م. أوراقها أبيضة تطول من ١٢ إلى ٢٥ سم. وتعرض من ٦ إلى ١٢ سم. نصلها لامع البشرة عائق الخضار على صفحته العليا، أسفم اللون الزنجاري على صفحته السفلى. أزهارها مكسية بتينة اللون، عطرية العرف، قطرها يراوح من ١٨ إلى ٣٠ سم. يتلاتها تده من ٩ إلى ١٢، أقلام اسديتها رجبوانية || أزهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٧٧٤١ - مَغْنُولِيَّةٌ كَبِيرَةٌ الْوَرَقُ

Magnolia macrophylla (S). *Magnolia à grandes feuilles* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية. جفهرتها متوسطة الحجم تملو من ٨ إلى ١٨ م. ألتانها وزيماتها خالية البشرة. أوراقها عابطة كبيرة مستطيلة، طولها يراوح من ٢٠ إلى ١٠٠ سم. وعرضها من ١٠ إلى ٣٠ سم. نصلها أحليجي الشكل مسطووم القاطعة. أزهارها عظيمة القدر، قطرها يراوح من ٢٠ إلى ٣٢ م. وهي فواصة العرف، بيضاء اللون، سداسية البتلات المستديرة || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٧٧٤٢ - مَغْنُولِيَّةٌ مَتَدُونَةٌ

Magnolia coco, *M. pumila*, *Talauma pumila* (S). *Magnolia coco* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية. جفهرتها متدونة تملو من ٢ إلى ٤ أمتار. أوراقها أبيضة سنانية ذرية تطول من ٨ إلى ١٥ سم. نصلها أخضر الصفحة العليا، بحري السفلى. أزهارها صغيرة القدة قطرها نحو ٣ سم. وهي ثلاثية الفصل الخضر، سداسية البتلات، فواصة العرف المطري، عابطة اللون. أزهارها يستمر طوال السنة.

٢٧٧٤٣ - مَغْنُولِيَّةٌ مَحْزِلَةٌ

Magnolia officinalis (S). *Magnolia officinal* (F).

نوع من المغنولية الطبية والزراعية، مهدا الصين. جفهرتها هريمية الشكل تملو من ٦ إلى ١٦ م. أوراقها عابطة كبيرة تطول من ٣٥ إلى ٤٥ سم. وتعرض من ١٢ إلى ٢٠ سم. نصلها أخضر الصفحة العليا، خلي السفلى البسرية اللون. أزهارها مكسية كبيرة القدة قطرها يراوح من ١٥ إلى ٣٠ سم. يتلاتها بيض اللون، أقلام اسديتها قمرية. || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع.

٢٧٧٤٤ - مَغْنُولِيَّةٌ مَطْلِيَّةٌ

Magnolia tripetala, *M. umbrellia* (S). *Magnolia parasol* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية. جفهرتها مظلية الشكل تملو من ٥ إلى ١٠ أمتار. أوراقها عابطة أحليجية مستطيلة، طولها يراوح من ١٢ إلى ٦٠ سم. نصلها مالم البشرة جبل الخضار الزاهي. أزهارها بيضاء اللون. مستبجة العرف، تسامية البتلات المستطيلة، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م. || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٧٧٤٥ - مَغْنُولِيَّةٌ مُوَلَّغَةٌ

Magnolia acuminata (S). *Magnolia acuminé* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية. جنبها سربوية تملو من ٨٠ إلى ١٥٠ سم. وهي في أقلها وبديتها شجرة شاذة تملو نحو ٣٠ م. أوراقها عابطة بيضية ذرية، نصلها يطول من ١٢ إلى ٢٢ م. ويعرض من ٦ إلى ١٢ م.

Magnétisme (F).

Magnetism, Mesmerism (E).

٢٧٧٣٣ - مَغْنَطِيَّةٌ

Magnolia (S).

Magnolier, *Magnolia* (F). *Magnolia* (E). *Magnolie*, *Lilienbaum* (D). *Magnolia* (I).

جنس اشجار وشجيرات ونباتات برية طيبة وآزيبينية من فصيلة المغنوليات. أنوعها عديدة. أوراقها متعاقبة، كاملة، جلدية النصل اللامع. أزهارها كبيرة القدة، ثلاثية الفصل، عديدة البتلات المتركة، كثيرة الاسدية، فواصة العرف المطري، ثمارها مغاريط صغيرة القدة ناشقة || اشهر أنوعها ما يلي:

٢٧٧٣٥ - مَغْنُولِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ الْوَرَقُ

Magnolia glauca, *M. virginiana* (S). *Magnolia glauque*, *M. de Virginie* (F).

نوع من المغنولية، جفهرتها تملو من ٥ إلى ٢٠ م. أوراقها أبيضة بحرية اللون خالية الصفحة السفلى. نصلها يطول نحو ١٨ سم. ويعرض نحو ٦. أزهارها عطرية، مكسية، عديدة البتلات البيض || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

٢٧٧٣٦ - مَغْنُولِيَّةٌ بَقِيَّةٌ

Magnolia denudata, *M. conspicua*, *M. procia* (S). *Magnolia magnifique*, *M. yulan* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية. جفهرتها تملو من ١٠ إلى ١٥ م. أوراقها عابطة، لامة الصفحة، تطول من ٧ إلى ٢٠ سم. وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم. أزهارها عطرية، تسامية البتلات المنصبة، قطرها يراوح من ١٠ إلى ١٥ سم. لونها إلى البياض الثلجي ونها خضروب وزيد اللون أو حراء. أزهارها يستمر طوال شهر نيسان.

٢٧٧٣٧ - مَغْنُولِيَّةٌ زَكَبِيَّةٌ الزَّهَرُ

Magnolia liliflora (S). *Magnolia à fleurs de lis* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية. ضروبها وأصنافه عديدة، جميعها جنبات فواصة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها عابطة بيضية، نصلها مقطوع القاطعة ذرب الطرف يطول من ١٠ إلى ١٥ سم. ويعرض من ٦ إلى ١٠ سم. أزهارها زنبقية الشكل، سداسية البتلات الملونة، فواصة العرف المطري. أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار.

٢٧٧٣٨ - مَغْنُولِيَّةٌ صَغِيرَةٌ الزَّهَرُ

Magnolia parviflora (S). *Magnolia à petites fleurs* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية. جفهرتها تملو من ٣ إلى ٦ أمتار. أوراقها عابطة تطول من ٦ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٤ إلى ٨ سم. نصلها مالم البشرة كثير المروق الواضحة. أزهارها بيضاء اللون، عطرية العرف، سداسية البتلات، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. || أزهارها يستمر طوال شهر حزيران.

٢٧٧٣٩ - مَغْنُولِيَّةٌ صَفْصَفِيَّةٌ الْوَرَقُ

Magnolia salicifolia (S). *Magnolia à feuilles de saule* (F).

نوع من المغنولية الآزيبينية. جفهرتها هريمية الشكل تملو من ٣ إلى ٦ أمتار. أوراقها عابطة، صفصافية الشكل، بحرية اللون تطول من ٦ إلى ١٦ سم. وتعرض من ٣ إلى ٩ أزهارها عطرية العرف، بيضاء اللون، ثلاثية الفصل، سداسية البتلات، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م. || أزهارها يستمر طوال شهر نيسان.



مغنولية

٢٧٢٥٦ - مِفْصَلَةٌ ، مُمَايَزَةٌ

Dédifférenciation (F). Dedifferentiation (E).

المفاصلة أو المايزة الارتدادية ، بيولوجياً ، رجوع الحبيبات أو الخلايا إلى الحالة المضيئة عند زرع الانسجة.

٢٧٢٥٧ - مُفْتَحِ الثَّامِنِ

Apéritur (F). هو الزمن الذي يفتح عنه الثامن بتطيقه وإتزامه بمبلغ معين . وهو الذي يلبس ولبس على المومنين الآخرين الذين يؤمنون بالعدا الأطلاق القبول .

٢٧٢٥٨ - مُفْتَرَشَةٌ ، قَارَشَةٌ

Etalée (F). Spread (E). تمت تعريفي بوصف به النباتات التي تلحف التربة بأوراقها والأشياء المتصلة بالصلصات الكبيرة .

٢٧٢٥٩ - مَكْتَوَمَاتُ المَلَكَاتِ

Phyzotomes (F). رقية من الاسماك تعرف أيضاً بلبينات الزمانيات .

٢٧٢٦٠ - مُقَمَّرٌ

Carbonifère (F). Carboniferous (E).

٢٧٢٦١ - مُقَرَّدُ التَّحْدُبِ

Plan convexe (F). Convex plane (E).

٢٧٢٦٢ - مُقَرَّدُ التَّكَعَّرِ

Plan concave (F). Concave plane (E).

٢٧٢٦٣ - مُقَرَّدُ الدَّوَرِ

Monophasé (F). Monophasic (E).

٢٧٢٦٤ - مُقَرَّدَاتُ

Simples (F). هي النباتات البلية التي يعالجون بها بعض الأمراض .

٢٧٢٦٥ - مُقَرَّدَاتُ الأصابع

Périssodactyles (F). Périssodactyla (E).

رقية حيوانات تشمل ثلاث فصائل : الخيليات والكركنديات والتابيريات .

٢٧٢٦٦ - مُقَرَّصَةٌ

Acinaire (F). Acinous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات تطلو لحاء ساقه أو أغصانه حوصلات صغيرة تشبه القرميد ، وهي تزيينات طبيعية لا علاقة لها بالي وصم كان .

٢٧٢٦٧ - مُقَرَّقٌ

Potentiomètre (F). Potentiometer (E).

مقياس فروق الجهد الكهربائي .

٢٧٢٦٨ - مُقَرَّقَةٌ

Hachoir (F). هي الخفحة ، راجعها .

٢٧٢٦٩ - مِفْصَاصٌ ، مِفْلَاقٌ

Multilobé (F). Multilobate (E).

ما كان كثير الفصوص أو الفللق .

٢٧٢٧٠ - مِفْصَلَةٌ

Ecnassa (F). Sheller (E).

آلة تستعمل لآلتزاع زرد القرقيبات من سفلها .

٢٧٢٧١ - مِفْصَصٌ ، مَكْلُوبٌ

Lobé, Lobulé (F). Lobate, Lobed (E).

٢٧٢٧٢ - مِفْصَعَةٌ ، قَصَاصَةٌ

Seringue (F). Syringe (E).

صفحة البليا بحيرة اللون لامة ، صفحة السفل خلية طلاء . انزعارها غادة العرف ، فسقية اللون ، تطرحها نحو ١٠ سم . ثمارها كالتانير الصغير تبلو بحرية الخضر ثم تحمر شيئاً فشيئاً حتى الإدراك || انزعارها يستمر من أيار إلى تموز .

٢٧٢٦٩ - مَقُولِيَّةٌ نَجْمِيَّةٌ

Magnolia stellata (S). Magnolia étoilé (F). نوع من المقولية النجمية . ثمرتها هريبة الشكل تملو من ٣ إلى ٥ امتار . أوراقها حابطة مائلة زاحية الخضر تطلو من ١٢ إلى ١٤ سم . وتعرض من ٢ إلى ٤ سم . انزعارها مكعبة نجمة الشكل تمتد من ١٢ إلى ١٨ بطة ، قطرها نحو ٨ سم . بتلاتها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، قدية الصلصة ، مدببة الطرف ، منسطة الارتكاز || انزعارها يستمر من آذار إلى نيسان .

٢٧٢٦٧ - مَقُولِيَّاتٌ

Magnoliaceae (S). Magnoliaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفعالات . اجناسها ٢٢ ، تشمل زهاء ١٥٠ نوعاً جميعها اثمار وثمار . أوراقها متعاقبة بسيطة جلدية النصل . انزعارها خشوية أو وسيدة المسكن ، فردية أو متعددية التجميع . منبها البلاد الحارة ، فيها الطبية والصناعية والزراعية .

٢٧٢٦٨ - مَقَشٌّ

Villa (F). هي الدارة ، أطبا .

٢٧٢٦٩ - مَقَشِّرِيَا

Magnésie (F). Magnesie (E). هي اكسيد المغنيزيوم ، يترى في تصنيف العناصر الغذائية النباتية من العناصر الأولية .

٢٧٢٥٠ - مَقَشِّرِيُومٌ

Magnesium (F). Magnesium (E).

مدن صلب ، لونه إلى البياض الفضي ، رمزه (Mg-م) وزنه الذري ٢٤٫٣٢ ، نقيه الذري ١٧٫٥ يتصهر في ٦٥٠°س . وهو يمتزق في الهواء الطلق ، اختصاه بأمر اللهبة الحارة . يستعمل في عدة مركبات صناعية . أما ملحه فسهل شديداً القاطلية .

٢٧٢٥١ - مَقِصَافٌ

Hygrophile هي نمت تعريفي يوصف به كل نبات لا يعيش إلا في المواقف الرطبة .

٢٧٢٥٢ - مَقِصَالٌ

Touffu (arbre) (F). Thick (tree) (E).

الشجرة الملتفة الأغصان الكثيرة الورق .

٢٧٢٥٣ - مَقَشِّرَةٌ ، حَشِيشَةُ البَسَاطِ

Mollugo (S). Mollugina (F). Mollugo, Carpet-weed (E). Weichkraut (D). Mollugo (I).

جنس اعشاب برية حرلية من المقيريات . أنوعه نحو ٤٣٠ أصلاتها البلاد المعتدلة الحارة . جميعها مرصوة تستحبها الماشية .

٢٧٢٥٤ - مَقَشِّرِيَّاتٌ

Molluginae (S). Molluginées (E).

فصيلة نباتية قريبة الشبه من الرجلية . اجناسها وأنوعها قليلة العدد ، جميعها برية مرصوة .

٢٧٢٥٥ - مَقِيشٌ

Mare (F). Pool, Pond (E).



مليرة

Epouilleuse (F).

Cleansing apparatus (E).

صندوق صغير يضع فيه الطائر باستناده رأسه لمعالجته
لسد الحشرات الطفيلية والقضاء عليها .

Funiculé (F), Funiculat (E). ٢٧٧٩٠ - مِفْصَلِي ٥

نمت تعريفية يطلق في علم النبات على كل عضو مجهز
بفتل .

Argument a fortiori - مَفْهُومُ الْاَوْتُولُوبَةِ ٢٧٧٩١

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها
لان هناك اسباباً تجعل تطبيقه على هذه الحالة اولى من
تطبيقه على المخصوص عليها .

٢٧٧٩٢ - مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ

Argument a contrario (F).

حجة ثنائية للتدليل على المخالفة بين الامر الواقع والنص
القانوني .

Argument « pari » (F). ٢٧٧٩٣ - مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ

حجة يراد بها تطبيق نص قانوني على حالة لم ينص عليها
لان اسبابها تدل على اسباب الحالة المخصوص عليها .

٢٧٧٩٤ - مَقْرُوسٌ بِالتَوْكِيعِ

Fondé de pouvoir (F). Legal representative (E).

المفوض له بالتوكيع هو الذي يوكله غيره بالقيام بمقامه
في بعض ما له من سلطة .

Eléphantiasis (F). ٢٧٧٩٥ - مَفْصُولَةٌ ، ذَكَاءُ الْفَيْسَلِ

Elephantiasis (E).

التهاب مزمن يصدر جلد قوائم الخيل والبقر .

Ostiole (F). Ostiol (E). ٢٧٧٩٦ - مَقْ ٥

هو الشق النقيق المستطيل الذي ينطلق عن البوغ عند
الادراك .

٢٧٧٩٧ - مَقَارُ الْقُطْبِ ، مَقَارُ رَاهِبٍ ٥

Fratercula arctica (S).

Macareux arctique, M. moine, M. commun (F).

Sea-parrot, Coulter-neb, Puffin (E).

نوع من المقار ، طائر مائي من فصيلة البطريقيات .
أصله المناطق القطبية الاسيوية والاروبية والامريكية .
ينزع في زمن الشتاء العاصف الى البلاد الشمالية التي لا
يفترها الجليد || ملجئه الخياطين جامي . اسرابه وافرة

العدد . قوته الاسماك والقشريات وبعض النباتات ||
جسمه ريمية ، كثر ، يطول نحو ٣٥ سم . يتميز بمقاده
البريمي الشكل ، المتساوي الطول والارتفاع . ثوبه العلوي
الى السواد الاسم " اللامع . ثوبه السفلي وعصره الى اليباض
الناعم . عنقه مطوق بقلادة عريضة الوجة من لون الرأس
والرداء . مقاده اكهب اللون ، ازرق القاعدة ، اجر
الطرف . صدقة عينه عاجية . انبجانه وكحلة عينه الى
الجلوة . رساء الى الحمرة البرتقالية المولج || الاثنى امير

قدماً من الذكر وتحتل بنفس الثوب . وكنته مفضي
بحفرها وترتيبها في اهل مرتفعات الجبال المدة الحصن .
الحصنة تتألف من بيضتين فقط . الترخيم الذي يستمر
من ٥ الى ٦ اسابيع وتقوم به الاثنى بمناوبة الذكر ،
ينجز في اليل فقط .

Articulé (F), Articulata (E). ٢٧٧٩٣ - مِفْصَلِي

نمت تعريفية يطلق على كل عضو مركب من فصل ،
كزبان الحشرة فهو مفصلي التركيب .

Arthropodes (F).

Arthropoda (E).

صنف من الحيوانات يشمل شبة الحشرات وكثيرات الارجل
والمنكربيات والقشريات .

Desmodie (F).

نبات تزييني من القرنيات مشهور باسم ارقيس .

Desmodie du Bengale ٢٧٧٩٦ - مِفْصَلِيَّةُ الْبَنْغَالِ

نبات تزييني مشهور باسم ارقيس هندي ، اطلية .

Champignonnière (F).

Mushroom bed (E).

المكان المد لزراعة الفطور .

Muselière (F).

هي الكأمة ، اطلية .

Octographe (F).

المضمار جهاز يستعمل في تسجيل حركات كل كائن
حي لمراقبة مدى نشاطه .

Aphromètre (F).

Aphrometre (E).

جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في ثاني الخمر
القلوية .

Rentable (F). Profit-earning (E). ٢٧٧٨١ - مِفْصَالٌ

رأبج مربح .

Van (F). Fan, Van (E).

اداة خاصة تستعمل في ذر البياض لفصل البر عن اللق .
ج مفائل .

Voltmètre (F). Voltmeter (E). ٢٧٧٨٣ - مِفْصَلٌ

مقياس التحليل الكهربائي .

Failli (F).

Bank-rupt, Insolvent (E).

هو كل صاحب مستقل او متجر حكمت المحكمة بشهر
افلاسه .

Pleuronecziidae (S).

Pleuronecziidae (F). Pleuronecziidae (E).

هي جانبيات الدم ، اطلية .

Décussé (F). Decussate (E). ٢٧٧٨٦ - مَفْصُولِي

صفة النسب النباتي المتساوي الانغلاق الطولي .

Fissiflore (F).

Fissiflora (E).

نمت تعريفية يطلق على كل نبات متفلق التبريجات الزهرية .

Mouflon d'Europe (F).

نوع من الاروية يسمى اروية كورسيكة ، اطلية .



مَقَارُ الْقُطْبِ

27308 - **مُكَارِب** (F). Sous-entrepreneur (F).
Sub-contractor (E).
هو الذي يعمل على المقاول في جزء من العمل .

27309 - **مُقَارَمَة** (F). Résistivité (F). Resistivity (E).
27310 - **مُقَابِصَة** ، **مُقَابِصَة** (F). Devis (F).
Estimate (E).
بيان مفصل بالاعمال المقصودة مقروناً بثمن كل ألفها .

27311 - **مُقَابِصَة** ، **مُقَابِصَة** (F). Echange, Troc (F).
Exchange, Barter, Truck (E).
مقد يلمع احد طرفيه الى الآخر شيئاً او يتنازل له عن حق مقابل من احدى او حتى آخر . وفي كانت المقايضة بيع اعيان او حقوق باعيان او حقوق فهي المقايض .

27312 - **مُقَابِلَة** (F). Rétrocession (F).
Retrocession (E).
التنازل الى الغير عن صفقة بما لها وما عليها .

27313 - **مُقَابِصَة** (F). Mesures (F). Mesures (E).
27314 - **مُقَبَض** ، **مُقَبَض** (F). Mancheron (F).
Selle (E).
من اجزاء المحراث ، الخشب التي يقبض عليها الفلاح لضبط التلم .

27315 - **مُقَبِط** (F). Mélangeur (F). Mboer (E).
آلة تستعمل لتخلط الاشياء كالاسمدة وغيرها .

27316 - **مُقَبِضَات** (F). Recettes (F).
Receipts, Returns (E).
27317 - **مُقَبِضَة** (F).
المقبوضة نجم لير من كوكبة برج التوأمن مركزه على الركة اليسرى من التوأمن المؤخر .

27318 - **مُقَبِط** (F).
هو القضاء عليه .

27319 - **مُقَبِط** (F). Mactra (S).
Mactra (F). Mactra (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وقصبة المقطريبات . انبعاث المعاصرة المعروفة نحو ١٥٠ متنترة في معظم بحار العالم ٥ اصدافها شبه حرة الشفرن مائلة السطوح . مثابها متصلة الطول مزدوجة ٥ تعيش في الرمال المغمورة بالماء قرب المصببات والاعوار ٥ لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

27320 - **مُقَبِطَات** (F). Mactridae (S).
Mactridae (F). Mactridae (E).
نصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة المدد جميعها متصلة اللحم ، متشابهة الاشكال ، ثنائية المصاريع ، مستغلطة الرباطات القذاعية ٥ اصليها معظم بحار العالم اغصها بحار المناطق المعتدلة الحارة ٥ أشهر اجناسها المقتر والصراع والصلحة والكومنتجة .

27321 - **مُقَبِطَة** (F). Culture de concombre fleuveux (F).
زراعة الشتاء وموضع هذه الزراعة كالبيطخة البطيخ .

27298 - **مُقَارِب** ، **مُقَارِب** (F). Commanditaire (F). Sleeping partner (E).
هو الشريك في احدى شركات القراض او المضاربة فلا يفرض من ديون الشركة الا قدر ما يوزي حصته فاذا كانت شركة القراض بالسهم اطلق على المقارن اسم المساهم .

27299 - **مُقَارَمَة الْمُتَارِجِ فِيهِ** (F). Pacte de quota litis (F).
شرط يتمتد بين المتقاضين والمهاضي على ان اتأب القضية تكون جزءاً من كسبها وهو محظور في اللوائح المهنية .

27300 - **مُقَارَمَة** (F). Compensation (F).
Compensation (E).
وهي احدى وسائل البقاء ، تعريفها الشامل ان يتوافق الالتزامان متبادلان بين شخصين ويكون محل الالتزامين مبلغاً من النقد او اشياء مثلة من نوع واحد . ويكونان مستحقين اللقم خالين من النزاع واجبي البقاء في مكان واحد .
واذا ارد احد الالتزامين على الآخر كانت المقاصة في المبلغ الاذن فقط ٥ والمقاصة قد تكون :

مقاصة تامة
Compensation totale (F).
Total compensation (E).

مقاصة تعاقدية - بالتراضي
Compensation conventionnelle (F). Conventional compensation (E).

مقاصة جزئية
Compensation partielle (F).
Partial compensation (E).

مقاصة قانونية
Compensation légale (F).
Legal compensation (E).

مقاصة قضائية
Compensation judiciaire (F).
Judicial compensation (E).

27301 - **مُقَارَمَة** (F). Poursuite (F).
Sulte, Proceedings (E).
وهي القيام بالمساعي والتدابير القانونية للحصول على قرار قضائي او حكم . وهي في القانون الجنائي الإجماعات والتحقيقات التي تجري للكشف عن الجاني او المجرم .

27302 - **مُقَارَمَة الضامنين** (F). Appel en garantie (F).
إدخال الضامن في الدعوى وهو إجراء خاص يراد به ادخال من يمكن عليه ضمان في دعوى لم يكن داخلها فيها حتى يعمل من الضمون له ما يمكن ان يحكم به عليه .

27303 - **مُقَارِط** (F). Colporteur (F).
Hawker, Pedlar (E).
هو البائع الجوال .

27304 - **مُقَارِط** (F). Tâcheron (F).
One working by the job (E).
هو العامل المتقيل .

27305 - **مُقَارِط** (F). Dénominateur (F).
Denominator (E).

27306 - **مُقَارِط** (F). Jockey (F).
هو الجوكي الذي يركب جواد الرهان .

27307 - **مُقَارِط** ، **مُقَارِط** (F). Entrepreneur (F). Contractor (E).
هو الذي يرتبط بمقتضى المقلولة ويأخذ على عاتقه القيام بعمل معين يساعده فيه عمال مأجورون .



مقتر

٢٧٣٣٧ - مَقْرَأَس * مَقْرَأَس * مَقْرَأَس السُّنْثَالِي، مِقْصُ
التَّكْلِيم، مِقْصُ الشَّجَر (F).
Sécateur (F).
Pruning-scissors (E).
مقص تقلم به أغصان الشجر .

٢٧٣٣٨ - مَقْرَدُون *
Macrodon (S).
Macrodon (F). Macrodon (E).

جنس اسماك نهري من مفتوحات الفم وفصيلة القرشانيات
انواعها المرفوعة أربعة أعطانها أنهر ومجريات المناطق
الاستوائية الامريكية || أجسامها مستطيلة الشكل ،
متعددة الطول الذي يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم ، رؤوسها
متوسطة الحجم . أشداقها ريشة . أسنانها كبيرة ، ذرية ،
قوية الصف في الفكين . زعانفها الظهرية محدلة الحجم
يطلب فيها الشكل المربع . زعانفها الخلفية غليظة
الارتكاز ، صغيرة القد ، تقابل الظهرية . زعانفها
الذيلية مستقيمة الأطراف عند جميع الأنواع . أطوارها تزاوج
من الربدة إلى النكهية . رؤوسها وتظهرها أصبق عسائبا
من بطنها || لحونها متوسطة الصف ، مأكولة || أعرف
أنواعها وأشهرها مقردون ترانيرا (Macrodon trahira)
الذي يكثر وجوده في أنهر البرازيل والفوايا .

٢٧٣٣٩ - مَقْرَط
Pinceuse-rogneuse (F).
أداة تستعمل لقطع سروع الكروية .

٢٧٣٤٠ - مَقْرَعَة
Courgerie (F).
منبت القرع ويوضع زراعته .

٢٧٣٤١ - مَقْرَعَات
Asoceratidae (S).
Asoceratidae (F). Asoceratidae (E).
مجموعة من الرخويات تنتمي إلى رتبة رباعيات الخياشيم
ضائلها وأجسامها وأنواعها كثيرة العدد جميعها من
متصمرات الأرضية الغارية .

٢٧٣٤٢ - مَقْرَنَس *
Macrorrhinus (S).
Macrorrhine (F). Macrorrhinus (E).
جنس حيوانات لينة ، مائية ، من فصيلة الفقاعيات .
أنواعها المرفوعة قليلة العدد ، أعطانها بعض مناطق المحيط
المحادي || أجسامها كبيرة القد . ذكورها أكبر من إناثها
وأضخم . رأس الذكر عديم القد ، غليظ الشكل ،
يلتصق بمنتهى أسنانه فك العلوي يشرف على السفلي . عتفه
وتوابعه صغيرة || قوتها الأسماك والرخويات والقشريات . عتفه
الأنثى تضع جروا واحدا في العام || تصاد من أجل جلدها
وزيوتها وعظامها || أعرف أنواعها الضرماني والضيق
الخطم .

٢٧٣٤٣ - مَقْرَنَسُ صِبْرَهَامِي *
Macrorrhinus leoninus (S).
Macrorrhine leonin (F).

نوع من المقرنيس . أعطانها مناطق جنوب المحيط المحادي .
طوله نحو ٩ أمتار . قوته كسوتي اللون يبق من الظهر
ويصفر عند البطن .

٢٧٣٤٤ - مَقْرَنَسُ صَبْقِ الخُطْم *
Macrorrhinus angustirostris (S).
Macrorrhine à rostre droit (F).

نوع من المقرنيس . أعطانها مجامح المكسيك وكاليفورنية .
طوله نحو سبعة أمتار . قوته إلى الجوفاء السقاء المواجه
تتبع عند الظهر وتضيق وتبرز عند البطن .

٢٧٣٣٧ - مِقْطَحَة * مِقْطَحَة
Ratissole (F).
Scraper (E).
نصل حريض قاطع مركب حل حضا لتحت به الإكثار
والأصايب .



مِقْطَح

٢٧٣٣٨ - مِقْدَفُ خَارُجِي *
Exopodite (F).
المقدف الخارجي ، جزء مفصل من الفك
مركز في الجالب الخارجي من المرفوعة حيث يشرف على
الركبية || والمقدف الخارجي ، زورولوبيا ، جزء من
زوائد المفصليات يملأ ، مع المقدف الداخلي ، القسم
القاعدي .

٢٧٣٣٩ - مِقْدَفُ دَاخِلِي *
Endopodite (F).
المقدف الداخلي ، زورولوبيا ، جزء من زوائد المفصليات
يملأ القسم القاعدي .



مِقْدَف

٢٧٣٤٥ - مَقْدَمُ الإِرْتِ
Avancement d'hoirie (F).
هو التبرع لاحد الورقة الإرتاليين بجزء من نصيبه في
تركة التبرع .

٢٧٣٤٦ - مَقْدَمُ الجِسْم ، مَقْدَمُ الجِسْم
Avant-main (F). Fore hand (E).
في الخليل والاعلام وما أشبه .

٢٧٣٤٧ - مَقْدَمُ الجَوْشَن
Prothorax
هو في الحشرات القسم الأول من الجوشن أو الحلقة
الصدرية الأولى .



مَقْرَأَس

٢٧٣٤٨ - مَقْدَمُ المِحْرَات ، مَقْدَمُ المِحْرَات
Avant-train (F). Wheels (E).
أجزاء الامامي من المحركات حيث يوجد التناظم والصلابة .

٢٧٣٤٩ - مَقْدَمَات
Primates
هي الرئيسات ورتبة من الثدييات تشمل مراتب البشرات
والقرديات والليموريات .

٢٧٣٥٠ - مَقْدَمُورُ القِسْمَةِ ، قَابِلُ القِسْمَةِ ،
مُقْتَسِم
Divisible
هو ما كانت قسمته جائزة .



مَقْرُون

٢٧٣٥١ - مَقْدَمُورُ
Parsil (F).
نبات بقلي مشهور باسم بقدونس ، أعلايه .

٢٧٣٥٢ - مَقِير
Amer (F). Bicar, Marsh (E).
مقر الشبي : صغار مرأ فهو مقر .

٢٧٣٥٣ - مَقِير ، مَقْعَدَان
Aloes (F).
هو الألوة ، نبات صناعي وزخفي .

٢٧٣٥٤ - مَقِير
Acule (F). Aculous, Stemless (E).
النبات العديم الساق ويدهى أيضا نجمة .

٢٧٣٥٥ - مَقِيرَأَس ، مَقِيرَأَس
Réfrigérateur (F).
Refrigerator (E).

٢٧٣٥٦ - مَقِيرَأَس *
Greffoir (F).
Grafting-knife (E).
سكين خاصة منقطة الأطراف تستعمل في التقليم .



مَقْرِنَسُ صِبْرَهَامِي



مقصب



مقاع



مقبي



مقل

Cotonnerie (F). **مَقَطَنَة** - ٢٧٣٦٣Cotton-planting (E).
الأرض التي تزرع فيها القطن . ج مقطن .Chapon (F). Capon (E). **مَقَطُوش** - ٢٧٣٦٤

هو الطير الذي فرخ الدجاج الخفي . ج مقاطيش .

Tronqué (F). Truncate (E). **مَقْطُوم** - ٢٧٣٦٥Epiclytus (S). Epiclyrta (F). **مَقْطِي** * - ٢٧٣٦٦جنس اسماك نهريّة من مفتوحات الفم وفصيلة السلمونيات .
انواعه المعروفة قليلة البعد . اطلقها بعض انهر البلاد
الحارة الاسيوية والامريكية || اجسامها اطيالية بسيطة
تطول من ٣٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها مستطيلة ، قصيرة .
هياكلها كبيرة جاحضة . اشدانها رسيّة . ظهرها زينة ،
مقلّبة يشرف على الرأس . تتميز بزيانها الفرجية
المستطيلة وبالظهيروية الثنائية البعد المتقاربة الحجم . اوائها
الى الريكة يملؤها موج نفسي || غوبها مأكولة .Alois (F). **مَقْعَدَان** - ٢٧٣٦٧

هو الآلة والمقر .

Gibbeux (F). Gibbous (E). **مَقْعَر** - ٢٧٣٦٨نمت تعريفي توصف به الاشياء المقعرة السطح ومنها
الاوراق والازهار .Concaviligne (F). **مَقْعَر الاطراف** - ٢٧٣٦٩Concaviline (E).
نمت تعريفي وهي يستعمل في تصنيف النواحيان اشياء
الخلل والاقطار . ويكون مقعر الاطراف ذا جبهة مقعرة
وحجاج بارز وكفل منحن الخ...* **مَقْل** - ٢٧٣٧٠**Balsamodendron africanum**, **Moudeolotia africanum**
(S). **Balsamé d'Afrique**, **Arbre à baume** (F). **Bal-**
samodendron krs, **Bdellium tree** (E). **Afrikanischer**
Balsambaum (D). **Albero balsamo d'Africa**,
Bdelio (I).نوع من البلسان وفصيلة البفوريات ، منته البلاد الافريقية .
يكثر في تمام حوض البحر الاحمر . ثمرته متوسطة القد
فرواه . اوراقه مركبة ثلاثية الورقيات البنيية الشكل
المغطية الاطراف . ازهاره فردية محورية رباعية التركيب .
ثمارة جواه رباعية القلق . يستخرج من ساقه عصارة
وراثنية بخورية فائرة الصنبر ويستعمل من زهره حطر
حزري .Marrube blanc (F). **مَقْل ابيض** - ٢٧٣٧١

هو الفراسيون الابيض ، اطله .

Bdellium indicum (S). **مَقْل الْبَهْد** - ٢٧٣٧٢**Balsamé de l'Inde** (F). **Indian bdellium tree**, **False**
myrrh, **gagal** (E). **Indisches Bdelliumbaum** (D).
Bdelio (I).نوع من البلسان وفصيلة البفوريات . يكثر في بعض
الاصقاع الهندية . ثمرته صغيرة القد . اوراقه مركبة
ثلاثية او خاسية الورقيات . ازهاره رباعية التركيب
قواعة العرف || يستخرج من ساقه عصارة راثنية بخورية
تستعمل في المايه ويستعمل من اذهاره دهن عطري
مغروب فيه .Malaxage (F). **مَقْس** - ٢٧٣٦٥Kneading, Working (E).
مقس الزبدة بعد فصلها من الخيض وضلها لتجانس
اجزائها بعد طرد الهواء منها .Sébastien (F). **مَقْسَاس** - ٢٧٣٦٦

هو الدبوق ، ثقبه حرجية صناعية .

Crémomètre (F). **مَقْسَاد** - ٢٧٣٦٧Crémometer (E).
مقياس اللبنة .Ebogeuse (F). **مَقْشَر** - ٢٧٣٦٨

آلة تنزع القشور للشالكة التي تغلف ثمار الكستنا .

Décortiqueur (F). **مَقْشَرَة** - ٢٧٣٦٩Disbarcad (E).
أداة من حديد تستعمل في تنظيف سوق بعض الاشجار
من القشور اليابسة .Sécateur (F). **مَقْص الْبُسْطَانِي** - ٢٧٣٧٠Pruning-shears (E).
مقص البستاني . ويقص التقليم ومقص الشجر والمقراض
واحد .Cannale, Roselière (F). **مَقْصَب** - ٢٧٣٧١Cane-plantation, Reed-bed (E).
كل مكان زرع فيه القصب بكثرة او نبت طيباً .Faux (F). Scythe (E). **مَقْصَب *** - ٢٧٣٧٢Cane-plantation, Reed-bed (E).
أداة كالنجل كبيرة الشفرة المستطيلة تستعمل في الحصد
والخش .Luxurière (F). **مَقْصِبَة** - ٢٧٣٧٣Lucerne-field (E).
المكان المخصص لزراعة القصب أي النصة .* **مَقْط** - ٢٧٣٧٤

المكان المخصص لزراعة القصب أي النصة .

Colportage (F). Hawking (E). **مَقْط** - ٢٧٣٧٥هو بيع التجوال .
يخيط يصاد به الطير .Multipolaire (F). **مَقْطَاب** - ٢٧٣٧٦Multipolar (E).
كثير الاقطاب .* **مَقْطَاع** - ٢٧٣٧٧Microtome * ، ميكرونوم *
Distillerie (F). **مَقْطَرَة** - ٢٧٣٧٨Distillery, Still-house (E).
صناعة التقطير وبصل انتاجه .Section **مَقْطَع** - ٢٧٣٧٩Soc (F). Ploughshare (E). **مَقْطَع** - ٢٧٣٨٠جزء رئيسي من المحراث مكانه وراء السكين وظيفته قطع
كتلة التراب انقياً .Griffe (F). Root (E). **مَقْطَم** - ٢٧٣٨١القطم ج مقاطم : هي الفروع الناشئة من اودية الحليين
واشباهاه من النبات .

27385 - مَقْتَمَة ، مِقْتَمَة Lippe (F).

Thick lower lip (E).
هي الحمة أي شفة الحيوانات المَهْرَة كالإبقار والأغنام وللأعز .

27386 - مِقْتَب Pastre (F), Paw (E).

كف الأسد ، مخلب الأسد في مقبته . ج قنوب .

27387 - مِقْتَبَة Chênevière (F), Hemp-field (E).

مزدورع القنب منها اتسع .

27388 - مِقْتَبَة Mimule (F).

هي الفندل ، أظليه .

27389 - مِقْتَبَة Calyptraea (S).

Calyptrée (F), Calyptraea (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الأرجل وسيدات الأجهزة وفضيلة القروصيات . أنواعها المعروفة عديدة بعضها من متحشرات الطبقة الطيارية والثاقبة والنبض الآخر معاصر منتشر في جميع بحار العالم . جميع أنواعها تحضن الشلق على الصغور ملحوظاً بأرجلها || أصدانها يرمية الشكل . رؤوسها قصيرة مفلوكة المقدم . أقوامها مستديرة . لأوسها مسطيلة . عيونها صغيرة قاعدية . خياشيمها حلبيّة الشكل ، قاسية .

27390 - مِقْوَانِيَة Miconia (S), Miconie (F).

Indian bush (E), Mikonie (D), Miconia (I).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القزانيات . أنواعها زهاء ٥٥٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية . أوزانها لا قياسه الشكل والترتيب . أزهارها أبطية وطرفية الايتكاز . مجارها حلبيّة مستديرة قاسية القشور . منها أنواع حمية . أوزانها عطرة تستعمل استعمال الشاي ومنها بطيئة يستعملون مجارها في معالجة على المرارة . ومنها صناعية صبغية خضابها أصفر اللون جيد الصنف .

27391 - مِقْوَد Licol, Licou (F), Halter (E).

أداة من جلد أو حبل تستعمل لقيادة الدواب .

27392 - مِقْوَس Starter

حبل تصف عليه الخيل عند السباق . ج مقارص .

27393 - مِقْوَس الحَوْشِب Bouleté, Juché (F).

Upright on fetlock-joint (E).
تقويس في حوشب الفرس يعتبر من حوشب الخيل القاصصة .

27394 - مِقْوَس الرُكْبَة Arqué, Brassicourt (F).

Bandy-legged, Knee-sprung, Arched (E).
نعت يوصف به الفرس المقويس الركبة طبيعياً لا من مرض ولا عن هرم .

27395 - مِقْوَس طائر معروف منطبق سواده في البياض كالحمام . (الجاظ).

27396 - مِقْوَن Machoon (F).

فراشة من المذانيات ، يرتقا تعيش على أوراق الجزر والشيار . راجع مذنانب مقون .

27397 - مِقْلَاب ، ذَاكِرَة الانقلاب Tropique (F), Tropic (E).

المقلاب أو دائرة الانقلاب الحزام القائم بين دائرتي الانقلاب الصيفي والشتوي أي دائرة السرطان ودائرة الجدي .

27398 - مِقْلَابِي Tropical (F), Tropical (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمقلاب كقوك المناخ المقلابي والأمطار المقلابية والمنطقة المقلابية وهي أحر مناطق الكون .

27399 - مِقْلَاص Atmomètre (F).

Atmometer (E).
جهاز خاص تقاس بوسلته مقادير سوائل تبخرت في مدة معينة .

27400 - مِقْلَب Versoir (F), Mould-board (E).

جزء المحراث الذي يقلب كتلة التراب بعد أن يقطعها المقطع .

27401 - مِقْلَبَة ، تَمَقْلَب Tropicalisation (F).

المقلبة جعل المواد والأوزام الصناعية وغيرها لا تتأثر بالمناخ المقلابي .

27402 - مِقْلَبَة القاصي ، * يَطْبَح شَرَكِي Melocactus (S), Mélocacte, Mélocactus, Melon-car-

dard (F), Melon-thistle, Turk's-cap cactus (E), Melon-enkaktus (D), Papone spinoso (I).
جنس نباتات لحمية شائكة من فصيلة الصباريات . أنواعه نحو ٣٠ بعضها ترابي . أصلها البلاد الحارة . سوقها بطيئة الشكل ، محززة ، شائكة ، عائدة الورق . أزهارها أبيضوية الأزتكاز ، كبيرة القد ، جميلة القالب والألوان أزدها . ثمارها ، حنينة حمره اللون ، لمساء البشرة .

27403 - مِقْلَد Fauchard (F), Slash-hook (E).

المنجل يقطع به ألقت والشطب .

27404 - مِقْلَع Carrière (F), Quarry (E).

ويُدعى المنجر والمقلع ، هو المكان الذي تستخرج منه الحجارة .

27405 - مِقْلَع Déplantoir (F).

Garden-trowel (E).
أداة تستعمل لقلع النباتات الصغيرة مع ثني من التراب يحفظ شروشها ردياً تنرس في مكان آخر .

27406 - مِقْلَعَة الخَضِير Dégazonneuse (F).

Unturfier (E).
محراث مفلطح المقطع الريفي القصير ، له سكتيان ، يستعمل في القلاع الخضير .


27407 - مِقْلَعَات Conserves (F).

Conserves, Preserves (E).
هي الاطعمة المحفوظة المقطوع منها الهواء . ويهتم من سائما معلبات . ويدعى ساءاً في مصر ، الكنسروة والكنسروات .

27408 - مِقْلَم قصب الثود والتيس والجلد . والمقلعة : وهاء القصب .



مِثْلَة القاصي



مِقْلَعَة

٢٧٤١٠ - مِقْيَافُ الْغُلُوكُوزِ ، مِيزَانُ الْغُلُوكُوزِ

Pèse-mûre, Glucomètre, Glucomètre (F). Glucometer (E).

أداة تقاس بها المواد السكرية في عصير العنب أو في الخمر .

٢٧٤١١ - مِقْيَافُ الْعَبْيَانِ

Ebulliomètre, Ebullioscope (F). Ebullimeter (E).

جهاز يمكن من معرفة درجة الحرارة اللازمة لغيان كل جسم أو مائع .

٢٧٤١٢ - مِقْيَافُ الْقَشْدَاةِ ، مِيزَانُ الْقَشْدَاةِ

Butyrosopé, Crémomètre (F). Creamometer (E).

هو المكتأة ، أداة تقاس بها نسبة القشدة في الحليب .

٢٧٤١٣ - مِقْيَافُ الْقُوَّةِ

Dynamomètre (F). Dynamometer (E).

هو المنشاط ، أطلبه .

٢٧٤١٤ - مِقْيَافُ الْكُحُولِ

Pèse-aspirite (F).

هو المكحال ، أطلبه .

٢٧٤١٥ - مِقْيَافُ الْكِلْسِ

Calcimètre (F). Calcimeter (E).

هو المكلاس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس في التراب .

٢٧٤١٦ - مِقْيَافُ الْلِسَانِ

Glossomètre, Glottomètre (F). Glossometer (E).

هو اللسان ، جهاز يقاس به خطوط التمثل لسمرة الاتواع الأصغر من غيرها في ارتشاش رقيق الزهر .

٢٧٤١٧ - مِقْيَافُ الْقَلْوَنِ

Colorimètre (F). Colorimeter (E).

هو الملوان ، جهاز يقاس به مقدار تلوّن السوائل والمائات لا سياً أخضر ، أطلبه ملوان .

٢٧٤١٨ - مِقْيَافُ مَقْوِيٍّ

Centésimal (F). Centesimal (E).

٢٧٤١٩ - مَقْيَرٌ ، مَقْيَرٌ

Makaira (S). Makaira (F).

جنس اسمك بحمرية كبيرة القد من شاكلات الزعنائف فضيلة الاستقرية . أنواعه المعروفة ثلاثة جميعها قريبة الشبه من سياف البحر ، أشهرها المقيّر الاسود الذي لا يقل طوله عن أربعة أمتار وهو يتميز بظهر زعنفته الظهرية التي تشبه الشراخ ويمجازه المظلي الذي يند من فكه الإحل على شكل السيف .

٢٧٤٢٠ - مِقْيَافُ

Ehretia (S). Ehretia.

Cabrillet (F). Ehretia (E). Ehretia (D). Ehretia (I).

جنس الشجيرات من فصيلة الحمحميات . أنواعه نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية . أوراثها متفككة ، متقابلة أو متناوبة . أزهارها عسكولية التجميع ، أبطية الارتكاز وطولية . ثمارها مأكولة لكنها تفتحة وهي نوية ، طعنة ، قدرها قدر الحمصة الكبيرة || أشهر أنواعه ما يلي .

٢٧٤٢١ - مِقْيَافُ كَبِيرِ الْوَرَقِ

Ehretia macrophylla (S). Ehretia à grandes feuilles, Cabrillet à grandes feuilles (F).

نوع من المقيّف ، شجيرة سريعة التطور من ٥ إلى ٨ أمتار .

Mucuna (S).

Mucuna, Pois à gratter, Pois poulleux (F). Cowitch, Cowage (E). Jackfasel, Stechende Echte Fasel (D). Fagiolo di Rio Negro (I).

جنس نباتات حارثة من فصيلة البقوليات القراشية . أنواعها نحو ٢٥ ، أهمها البلاء الاستوائية والحارة . سوقها لولبية التبريش ، سوائفها ثنائية . أوراثها مركبة ، طويلة الزناد ثلاثية الوريقات . أزهارها كبيرة القند حراء اللون ، سفاتها مطلقة عسنة مستطيلة الهدبة الطرفية الشاككة . بزورها مستديرة ، مبطلة ، هلبة البشرة ، تفعل عند لمسها ما يفعله القراص .

Echelle, Mesure (F).

Ladder, Scale (E).

٢٧٣٩٩ - مِقْيَافُ اخْتِمَارِ اللَّبَنِ ، مِصْرَبٌ

Lacto-fermentateur (F).

أداة تعرف بواسطتها جودة اللبن . أساسها أن الحليب الرديّ يربوب قبل الحليب الجيد في حرارة معلومة .

٢٧٤٠٠ - مِقْيَافُ الْأَدْهَانِ

Oléomètre (F). Oleometer (E).

أداة تقاس بها كثافة الادهان وتسمى مدحان .

٢٧٤٠١ - مِقْيَافُ الْأَسْتَوَاءِ

Niveau (F). Level (E).

هو القادان ، أطلبه .

٢٧٤٠٢ - مِقْيَافُ الْأَشْعَةِ

Actinomètre (F).

Actinometer (E).

آلة تقاس بها قوة الاشعة لا سياً الاشعة الشمسية .

٢٧٤٠٣ - مِقْيَافُ الْأَمْلَاحِ

Pèse-sels (F). Araeometer for salt liquids (E).

مستكشف يبين بصرية درجة كثافة الأملاح .

٢٧٤٠٤ - مِقْيَافُ الْجِصِّ

Gypsomètre (F).

Gypsumeter (E).

هو المقياس ، أداة تستعمل لقياس كبريتات البوتاس في الخمر .

٢٧٤٠٥ - مِقْيَافُ الْخَبَبِ

Aphromètre (F).

Aphrometer (E).

هو المقفّاع ، جهاز يقاس به ضغط الغاز الكربوني في قناني الخمر القذرة .

٢٧٤٠٦ - مِقْيَافُ الرُّطُوبَةِ

Hygromètre (F).

Hygrometer (E).

هو المرطاب ، أطلبه .

٢٧٤٠٧ - مِقْيَافُ السُّطُوحِ

Planimètre (F).

Planimeter (E).

هو المسطح ، أطلبه .

٢٧٤٠٨ - مِقْيَافُ السُّكَّرِ

Saccharimètre (F).

Saccharimeter (E).

هو المسكار وللمسار ، أداة تبن مقدار السكر الخلاب في السائل المقصود .

٢٧٤٠٩ - مِقْيَافُ الشَّجَرِ

Dendromètre (F).

Dendrometer (E).

هو الشجار ، أداة تستعمل لتقدير طول الشجرة وسميها .



مقوّنة



مقيّر

Imperméable (F).

Imperméable, Impervious (E).

٢٧٤٣١ - مِكْتَمَام

صفة التربة التي تملك الماء .

Acquis (F).

Acquired, Secured (E).

٢٧٤٣٢ - مِكْتَسَب

نمت تعريفي تمت به الصفة المكتسبة من الحيوان او
النبات حصة كانت ام سيفة . وكلمة مكتسب هي تعريفي
عقلي اي فريقي .

Acquies (F).

An acquisition (E).

٢٧٤٣٣ - مِكْتَسَبَات

هي الاموال التي يكتسبها الزوجان في انهاء الزواج .

٢٧٤٣٤ - مِكْتَكَل ، سَل

Vendangeoir, Vandangeret (F). Grape-basket (E).
وعاء ينقل فيه العنب من الكرم الى المعصرة .

Bréviligne (F). Breviline (E).

٢٧٤٣٥ - مِكْتَكَل

نمت تصنيفي يطلق على الحيوانات القصيرة الجال المحيكل
بالنسبة الى متوسط جال نوصها او سلالها .

Enclave (F).

Enclave, Gore (E).

٢٧٤٣٦ - مِكْتَكَنَة ، حَيْبَكَة

كل ارض لا طريق لها ، واقتانون يعطي صاحبها حق
المرور .

Mycterus (S).

٢٧٤٣٧ - مِكْتِير * *

Myctère (F). Mycterus (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة غمديات
الاجنحة . انواعها المعروفة سبعة منتشرة في بعض مناطق
البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اجسامها صغيرة ،
صغيرة ، مستطيلة الاعظام . حبيتها بارزة . ثآليلها
وكوكها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية ثلاثية .
كواسلها معدنية . اعانها لاصفة . قوائمها نشطة .
انثواها وحيدة اللون ، تكثر فيها السمرة الفصحى والجلوة .
كواسلها واعانها مغلفة بحمل دقيق اشهب اللون او اخضر .
تألف الحرج والبراري والحدائق ، جميعها واسعة ، اما
البقرة فنادسة .

٢٧٤٣٨ - مِكْتِير ، شَمِيرُو Mycteria (S). Jabiru

جنس طير من اللقالق ، انواعها المعروفة ثلاثة : المِكْتِير
الافريقي والامريكي والاسرائلي . جميعها كبيرة القد ، تتميز
بمتانيتها الغليظة المستطيلة المرسومة القاعدة ، اجنحتها
رافلة . اذناها قصيرة مربعة . ارساغها زرقية . اصابعها
كبيرة القد صغيرة الخطاب والخاب || اعرف انواعها
واشهرها المِكْتِير الافريقي .

٢٧٤٣٩ - مِكْتِيرِ افْرِيقِي * ، مِكْتِيرِ السِّنْفَعَال ،

لَقَلَقِ مَسْرُوجِ الْيَنْقَار ، اَبُو مَيَّة ،

اَبُو مَكِيَّة Mycteria senegalensis (S).

Jabiru du Sénégal (F). Saddle-billed stork (E).
طائر من المكتير، موطنه افريقية الغربية . يكثر في السنغال .
طوله نحو ١٥٠ سم . رأسه وصفته وجناحاه وذيله الى السواد
اللامع الاسفنج المواجه . اما سائر توبه فالى البياض اللطيف .
حلقه عينه صلبة . منقاده احمر الجهم تتوصله لطفة

اسطوانات فسيحة الارباع تمتد من الهند الى اليابان . ساقها
اسطوانية . فروجها مضطربة زياد اللحاء . اوراقها متعاقبة ،
بيضية ، مقطوعة الطرف ، طول نحو ٢٠ سم . ازهارها بياض
اللون . ثمارها مأكولة .

٢٧٤٣٢ - مِفْيَت مُدْبِبُ الْوَرَق

Ehretia acuminata (S). Ehretia à feuilles acuminées,
Cab. Illet à feuilles acuminées (F).

نوع من المقيف وهو شجيرة جادعة تملون ه الى ٦ امتار .
مهددا الهند . ساقها وفروعها اسطوانية ملسة . اوراقها
متعاقبة ، سنانية الشكل ، ذرية وبديعية . نصلها يطول من ه
الى ١٠ سم . ويبرس من ٢ الى ٤ سم . وهو مستطيل
المنق ، مسنن الحافة ، لاص الصفحة || ازهارها بياض
اللون . ثمارها مأكولة .

٢٧٤٣٣ - مَفْيِيء ، Emétique (F). Emetic (E).

Terrier (F).

Burrow, Hole (E).

٢٧٤٣٤ - مَكَا ، مَكُو

هو جسر القراع اي الارنب البري ونحوه . ج امكاه .

٢٧٤٣٥ - مَكَا * Lapidium meyenii (S). Maca (F).

نبات حولي يقل من فصيلة الصليبيات . مهدد بعض
مرتفعات جبال الالاند الاسريكية . ساقه لذنية الشكل
والقد ، مأكولة . اوراقه قوسية الانشعاب ، مركبة ،
وريشية . شمرانه الزهري يملون نحو ٤ سم . ازهاره حشوكي .
ازهاره صغيرة القد ، ودية اللون . غريثاته تحملة مستطيلة .
يزوره كروية دقيقة || يتكاثر بالبر . منته الاستان
الجزيرية . يرغب في الارربة الخلوة الوافرة العناصر الغذائية .

٢٧٤٣٦ - مَكَا * Certhilauda (S). Sirli (F).

Bifasciated lark (E).

جنس طير من فصيلة القيريات . انواعها ستة ، بعضها
صحراوي وبعضها من طيور الشرق الادف واروبة ولسا
جميعها تصيد في الجو وهيوط وهي في ذلك تمكو وتصفر .
اجسامها صغيرة القد تطول من ٢٢ الى ٢٤ سم . انثواها
متعددة الانثوان يكثر فيها الاخراج والاضحل . صدورها
موشية . اعناقها بيضاء . منقارها قوية مستطيلة منقرو
الطرف . عقالها نشطة . سادة الاظافر ، تمكثها من
استقرار التربة || تألف الغشاب والاراضي للمسا .
قوتها الحشرات والبروز البرية || تكثر شها في انحوص
بين الاذغال والحشيم . حشبتها حولية تتألف من ٤ او ه
بعضها تحشبتها بمتاربة الاكر .

٢٧٤٣٧ - مَكَا فَاة ، انْعَاب Emolumenta (F).

Remuneration (E).

هي ما يمنح من تعويض من القيام بأمة للتأدية .

٢٧٤٣٨ - مَكَا كَة ، مَكَا كَة Moelle (F). Pith (E).

القسم الداخلي المركزي من ساق النبات .

٢٧٤٣٩ - مَكَا كِي Médullaire (F).

Medullary, Medulla (E).

Pressa (F).

Pressure, Throng (E).

٢٧٤٣٠ - مِكْتَس

آلة ضاغطة مختلفة الاشكال والاجسام تستعمل في عدة
صناعات لغايات معينة .



مَكَا



مَكَا



مَكِير



مِكْتِيرِ افْرِيقِي



مِكْنَاة



مِكْنَال



مِكْنَال الحمر



مَك



مَكْرَة مَبْدُولَة



مَكْرُور نَمِي



مَكْرُور مَبْدُول

القائمة ذرب الزام الاخير ، يبدو احمر اللون ويستقر حل
الخضار البحري تملوه خلة كثيفة . بتلات ازهارها صغيرة
ضخمة تطول نحو ٢ سم . ثمارها حامضة لا تؤكل .

٢٧٤٥٤ - مَكْرُورَة مَبْدُولَة * ، مِكْنَاة

Amelanchia rotundifolia, *A. vulgaris* (S). *Amélan-*
chier commun (F). *Savoy medlar*, *Service-berry* (E).
Felsenbeer, *Felsenbirne*, *Gemeine Felsenbeer*,
Traubenbirne (D). *Aronia* (I).

نوع من المكر وهي جنبة مبدولة تطول من ١٠٠ الى
٢٠٠ سم . اوراقها بيضيه مستديرة الطرف تطول نحو
٤ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها يبدو قطي الصلصة
السليل ثم يستقر حل الحامضة . بتلات ازهارها خلية البشرة .
ثمارها سكرية الطعم مأكولة قطرها نحو ١ سم .

٢٧٤٥٥ - مَكْرُورَة يَابَانِيَّة

Amelanchia asiatica (S). *Amélan-*
chier du Japon (F).
نوع من المكر وهي شجرة دائمة متوسطة القد تطول من ٥
الى ١٢ م . اوراقها سنانية ، نصلها خلي الصلصة مسنن
الحامضة تطول نحو ٧ سم . ويمر نحو ٤ ، بتلات ازهارها
قذبة الشكل خلية الصلصة الحارضية . ثمارها سكرية الطعم
مأكولة قطرها نحو ٢ سم .

Carisale (S). **مَكْرُورَة ***
Cherry-orchard (E).
هي مزروع الكرّز .

٢٧٤٥٧ - مَكْرُورُومُ التَحْلُ

هو زعفران التحل ، اطليه .

٢٧٤٥٨ - مَكْرُور *

Macrurus (S).
Macroure, *Lépidolèpre*, *Grenadier* (F).
Macrurus, *Rat-tail* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المَكْرُورِيَّات . انواعه
المبروفة ثمانية منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة . جميعها
مستطيلة الاخطام الذلقة ، قصيرة الاشداق السفلي ،
كبيرة العين الجاحضة ، مستطيلة القدم ، مستقيمة المؤخر
المامم الزنفة . سفنها مغطى الزوايا ، مستقيم الطرف
الشائك || اشهر انواعه المَكْرُور المبدول والقصي .

٢٧٤٥٩ - مَكْرُورُوفِي * *

Macrurus trachyrhynchus (S).
Macroure argenté, *Lépidolèpre argenté* (F).
نوع من المَكْرُور يكثر وجوده قرب الساحل الاطريقي
من البحر المتوسط والخليج الاطلسي . طوله نحو ٤٠ سم .
ثوبه الى البطلة الغضبية المواج يقيم مع اقترابه من الظهر
ويبيض عند البطن . لحمه متوسط الصلابة مأكلي .

٢٧٤٦٠ - مَكْرُورُ مَبْدُول * *

Macrurus colorrhynchus (S). *Macroure commun*,
Lépidolèpre commun (F). *Common Rat-tail* (E).
نوع من المَكْرُور يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .
طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه الى الرعدة البنفسجية المواج يقيم
مع الظهور ويحيل الى الفضي عند البطن . لحمه متوسط
الصلابة مأكلي .

٢٧٤٦١ - مَكْرُورِيَّات *

Macrouridae (S).
Macrouridae, *Macruridae* (F). *Macrouridae* (E).
فصيلة اسماك بحرية من المملوآت شالكات الزعانف .
اجناسها وانواعها متوسطة البدن . اطرافها بحار المناطق

سواء . ساقها الى الكعبة المابقة بطورها مواج حمر || يعيش
ذكراً وانثى لا يفترقان . يأنث مجاري للماء وضفاد الاخر
وشواطي البحر . قوته اخشرات والنظام والحيات والاسماك .
يثن في الانجار . انتفا تخمن اربع بيضات .

٢٧٤٦٠ - مِكْنَاة *

Crémomètre (F).
Creamometer (E).
اداة تقاس بواسطتها نسبة القشدة في الحليب .

٢٧٤٦١ - مِكْنَال

Densimètre (F).
Densimeter (E).
اداة تستعمل لدرجة الثقل النوعي في كل جسم .

٢٧٤٦٢ - مِكْنَف

Condenseur (F). *Condanser* (E).

٢٧٤٦٣ - مِكْنَفَة

Condensateur (F). *Condenser* (E).

٢٧٤٦٤ - مِكْنَحَال *

Alcoolomètre (F).
Alcoholometer (E).
هو ميزان الكحول ، جهاز ينطس في السائل الكحولي
فيبين نسبة ما يجره من كحول .

٢٧٤٦٥ - مِكْنَحَالُ النَمَر *

Vinomètre, *Vinoscope* (F). *Vinometer* (E).
جهاز يستعمل لقياس درجة الكحول في الخمر .

٢٧٤٦٦ - مِكْنَحَلَة

Jacinthe muguet (F).
نبات زينة ينحس جاسمت شرقي ، اطليه .

٢٧٤٦٧ - مَكْنَة *

Râteau (F). *Rake* (E).
اداة تستعمل لتشطيب التربة .

٢٧٤٦٨ - مَكْنَس

Grange (F).
هو السقيفة ، اطلبها .

٢٧٤٦٩ - مَكْنَسَة

Botteleuse (F).
Binder, *Sheaf-binding machine* (E).
جهاز يلوي آلي أو يستعمل لكس اللش وانثى وما اشبه .

٢٧٤٦٠ - مَكْر

Irriguer (F). *To irrigate* (E).
مكر الارض : سقاها . امكروا الارض فاتها صلبة ثم
اسرونها ، والمكرو هي السقية . ج مكر ينكرو .

٢٧٤٦١ - مَكْرُورَة * ، مَكْرُورَة *

Rectificateur (F). *Rectifying* (E).
جهاز خاص يستعمل لتكرير الكحول وذلك بإعادة
التقطير .

٢٧٤٦٢ - مَكْرُورَة

Amelanchia (S). *Amélan-*
chier (F).
جنس شجيرات وجنات برية ويزينية من فصيلة الورديات .
انواعها عديدة ، اطرافها بالأم . سقها فراه . اوراقها بسيطة
مابقة ، نصلها كثيفة البروق . ازهارها عتقوي التجميع
محوري الارتكاز . ازهارها قليلة العدد مستطيلة البتلات
البيضاء . ثمارها نورية ، صغيرة الذة ، بنفسجية اللون || اصرف
الاورها سنا لي .

٢٧٤٦٣ - مَكْرُورَة كَنْدِيَّة

Amelanchia canadensis (S). *Amélan-*
chier du Canada (F).
نوع من المكر وهي شجرة متوسطة القد تطول من ٥ الى ١٠
امتار . اوراقها مستطيلة ، نصلها بيضي الشكل قلبي

٢٧٤٦٨ - مَكْرُوبُورِيوم المُرَّ *
Macrophoma musae, Phoma musae (S).

وصم يمتري الموز سببه فطر مجهرى يركب الاوراق والتآثر || مظهره الخارجى يقع مستديرة متناوبة حنطية او سمراء اللون تقطع النصل من الفلج الى الاخافة . وهو ان الثآثر يقع سود صغيرة متناوبة تشبه القشور دين على ثؤذي اللب || يكافح باستعمال سائل بودود وبتغطى معلق الكيماة عند اكتمال امشاطها بالورق الابيض او المستعمل من اي صنف كان .

٢٧٤٦٩ - مَكْرُون *
Mucron
من صغيرة بارزة مختلفة الاشكال ترتكز عليها بعض الاعضاء الفطرية او النباتية كارتكازها على محور او حل وثيرة . ج . مكان .

٢٧٤٧٠ - مَكْرُونِيكس
Macronyx (F).
هو الزحل ، اطليه .

٢٧٤٧١ - مَكْس ، جَمْرُوك
Douane (E).
Customs, Custom-house (E).

٢٧٤٧٢ - مَكْس المُرَّو
Péage (F). Toll (E).
رسم جمود تقرضه السلطة على كل شخص او سيارة تمر في مكان معين .

٢٧٤٧٣ - مَكْسَان *
Trigonocephalus piscivorus (S). Trigonocéphale piscivore, Moccasin d'eau (F). Motton-mouth (E).
حية سرلودة سامة من الانواع انبويات الاغاييد . موطنها يشمل امريكا الوسطى والمكسيك . تألف صغاف مجاري الماء والناقص والمرزات || جسمها يطول نحو ١٥٠ سم . رأسها حرسائي الشكل . عتقها دقيق وذنبها كذلك . قروية الشبه بالصنعية لكنها عادمة الجهاز الخرساني الصنعي الصوت || تعتبر من الانواع الشرسة الجوفية الشديدة الاذى .

٢٧٤٧٤ - مَكْسَحَة
Ratissoire (F). Scraper (E).
اداة يوقية تستعمل في تسوية التربة وتطهيرها من الاعشاب .

٢٧٤٧٥ - مَكْسِيَة الارنب
Myxomatose (F).
Myxoma (E).
تزيد حجروي يصيب الارنب فيعطى النسيج التي يتشكر فيها .

٢٧٤٧٦ - مَكْسِف
Thermoscope
محرار هوائي يستعمل في درس الفوارق الحرارية بين وسطين او بينتين .

٢٧٤٧٧ - مَكْسِف الجلكد ، مَكْسِلَاد
Pagoscope
جهاز يذك على الصمغ وهو من ادوات انبويات يستدل به على امكان حصول الصمغ ليك . راجع مجلد .

٢٧٤٧٨ - مَكْشَط
Avant-voe, Rasette (F).
Tuning-wire (E).
قلعة من المهرات تقدم السكة وتطبخها كة التربة .

٢٧٤٧٩ - مَكْشَف *
Emousseir (F).
Moss-scraper (E).
صفحة معدنية مسنة او قفاز من قريط يستعمل في كشط الطلعب من الشجر .

الحارة . جميعها سامة تألف اللجاج وقلما تقترب من المياح والشلط || اجسامها شبه رحيمة الشكل ، مستطبة الاذيال الماعدة الزعائف . مخروطية الرؤوس اللذقة ، كبيرة البون المستديرة الماحطة ، قصيرة الاشداق السفلى المنطفة . حراشها مثلثة الزوايا ، مستطبة الاطراف الشائكة . زعانفها الظهرية والشرجية تمتد كالنواصير المتناوبة القصيرة حتى اطراف الاذيال || اعرف اجناسها واشهرها المكرور .

٢٧٤٧٢ - مَكْرُوبُورِيوم *
Macrosporium (S).
جنس فطور مجهرية من عارة الزحاميات وفصيلة الطلعيات . كانت انعامه فيها مضى عديدة وبخلفة الاشكال فاق الملم الحديث ضرورة احاطها بالاجناس والمهارات التي تشبه فلم يبق منها سوى النوع المعروف بمكروبوريوم الشام .

٢٧٤٧٣ - مَكْرُوبُورِيوم الشام *
Macrosporium cucumerinum (S).
فطر مجهرى يتطفل على اوراق وممار الشام والبطيخ . مظهره الخارجى يقع صغيرة متراكبة سمراء اللون تملس الاوراق والتآثر وتغطها بجلات متناوبة مابقة اللون تسب يباس التسج للشحارة ثم ذبول نصال الاوراق وتقريح قشور الثآثر || يكافح بتطهير البذار قبل زروقه وقد يحسن نضج المبطعة عند ظهور الوسم . بأحد املاح النحاس المركز او المحلول من ٥٠ الى ٧٠ ٪ .

٢٧٤٧٤ - مَكْرُوسِتِيل
Macrostylis (S).
Macrostyle (F).
جنس شجيرات ونباتات برية وريضية من فصيلة السليانيات . مشهورة بازهارها المستطيلة الالام الرقيقة السبات .

٢٧٤٧٥ - مَكْرُوبُورِيوم *
Macrophoma (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات . يتميز بكتائده المستطيلة القائمة ضمن بكتيدات سميكة الجلود ، صغيرة المقي الصغير || انعامه التي تهم الاقتصاد الزراعي قليلة ، اعرفها :
٢٧٤٦٦ - مَكْرُوبُورِيوم الشاي *
Macrophoma theicola (S).

فطر مجهرى يصيب الشاي في افناده واوراقه . مظهره الخارجى بفور قرصية مستطيلة تركب لاه الانعام خففي حل نموا ، ويقع حنطية تصيب نصل الاوراق في زامها الاخير فتلوها || يكافح بتقليم الانعام الموصية وبنضج الجنبات بسائل بودود او بنثره من القواطير المخرجة .

٢٧٤٦٧ - مَكْرُوبُورِيوم الفاصوليا *
Macrophoma phaseoli, M. corchori, M. cajani, M. sesami (S).

فطر مجهرى ناعم ، واسع الانتشار ، يوجد في جميع البلاد الحارة . يركب جلود وسوق وممار عدة نباتات مختلفة اعصها الفاصوليا والقطن والبطاطا الخلسة والحمضيات والبن والكافور والبطاطا والسند || يصيب الفاصوليا بجلودها وجنبها وساقها فيعفن الجلود والجنبات ويمتدق الساق بنشاد ليد اسمر اللون || وهو حل القطن عفن اسمر يركب الجلود ويقع قرصية ايضا الى الجلود تملو الساق فوق التربة || وقتنا يصيب البطاطا الحارة بحول لياها الى مادة استنجية سوداء اللون || وهو في الحمضيات عفن اسود يركب الجلود ووصم على بلحاء السوق فيعيب جنباتها وانعدامها وروث صبارة صمغية تفقد الشجرة بعض حيويتها وتقيد نمو الثمرة || يكافح باستعمال احسد الفوطير الفعالة غير المركزة على النحاس .



مكروبوريوم الشام



مكروفيوم الموز



مكان



مكشطة



مكانة غزالية



مكرد



مكودة

٢٧٤٩٣ - مَكَبَة الاسْتِرْدَاد ، حَبَار الاسْتِرْدَاد
Faculté de rachat
هو حق ارتجاع اللبيع بموجب شرط الفداء .

٢٧٤٩٤ - مَكَنَس ، كِنَاس
Ratrait (F).
Ratring (E).
مولج الرشح من اللبلاء ويكثر تستكن فيه من الحر .

٢٧٤٩٥ - مَكِنَس
Sorgho à balais (F).
نبات زراعي مشهور باسم ذرة المكاس .

٢٧٤٩٦ - مَكَنَسَة الْأَنْدَر
Molène blanche (F).
هي البوصير الأبيض ، اطلبه .

٢٧٤٩٧ - مَكَنَسَة الْجَنَّة
Kochia (F).
هي الهيمس ، نبات زينة جميل القالب والخضار .

٢٧٤٩٨ - مَكَنَسَة السَّاحِرَة
Balais de sorcière (F). Broom of the sorceress (E).
تعريف وصفي يطلق على اثنان مشابهة مريضة تكون
في بعض الانجبار الثمرة والخريصة سببا فطور مجهرية
مختلفة .

٢٧٤٩٩ - مَكَنَسَة
Mécanisation (F).
Méchanization (E).

٢٧٥٠٠ - مَكُون
Potentiel (F). Potential (E).
صفة القوة الكامنة .

٢٧٥٠١ - مَكُو
Terrier du lièvre (F).
Hole of the hare (E).
جحر القرواع اي الارنب الوشي .

٢٧٥٠٢ - مَكُونَة *
Manucodia (S).
Manucodia (F). Manucodia (E).
جنس طير من الجواثم وفصيلة التروذرويات . انواعه
المعروفة نحو ١٥ جميعها من طيور استوائية والجزر
المجاورة . ملجتها الحياتي بجاعي . جلعاتها متوسطة البدن .
تألف القنابات . قوتها الحشرات والثمار والبلور || اجسامها
ربعة تطول من ٢٥ الى ٢٦ سم . اذنها تراوح بين
الازرق والاخضر والاسود جميعها سفاه المراج . رؤوسها
مكحلة برش ناعم صغير لونـه يختلف عن لون الرأس
والجاء . اجنتها معتدلة الحجم . اذناها مستديرة الاطراف .
انثاها تحمل بنفس الاقواب || تدفن اعشاشها في الانجبار
قريبة . الاناث تحضن بمناوبة الذكور من ٤ الى ٦
بضاضات . الفرجح يستمر نحو ١٥ يوما .

٢٧٥٠٣ - مَكُونَة *
Limacoda (S).
Limacode (F). Limacode (E).

حشرة من فصيلة المكوديات وربة عرشفيات الاجنحة .
اصطلاحا بعض مناطق البلاد الحارة والمتدلة الحرارة . تألف
المراج التي تكثر فيها الانجبار الابدية الدواك || جسمها
صغير اللد ، كثيف الحمل الناعم . يسقط نحو ٢١ سم .
رأسها شبه موزاني الشكل . صماتها صغيرات . عظمها
ثديده القصر . ملصحاتها قديتان ، مستطيلتان . زباناها
عيطيان . كوسلها متكاثف الحمل . يلبسها متراكب
السفوف والحمل || سرقها قريبة الشبه بالحلزونية وتنقل
ببطء مثله . وهي غاشلة تعيش على اوراق السنديان وغيره
من الانجبار الابدية .

٢٧٤٨٠ - مَكَب
Cube (F). Cube, Cubic (E).

٢٧٤٨١ - مَكَبِيَّة
Cuboïde (F). Cuboid (E).

٢٧٤٨٢ - مَكْفِهَر
Cumulo-nimbus
هو الزكام ، نوع من الغيوم ، اطلبه .

٢٧٤٨٣ - مَكَلَاوِس
Calcmètre (F). Calcmeter (E).
هو مقياس الكلس ، جهاز يبين مقدار كربونات الكلس
في التراب .

٢٧٤٨٤ - مَكَلَف ، مَعْدَد له
Grevé (F).
Burdened, Encumbered (E).

٢٧٤٨٥ - مَكَلَوْرَة
Maclure (F).
هي القانة ، ثمرة فراء من القراصات .

٢٧٤٨٦ - مَكْنَاة
Truffière (F).
Truffa-ground (E).
ارض تبت الكرم وستنبث الكرم .

٢٧٤٨٧ - مَكْنَة ، مَخَنَالَة
Butteaus, Buttoir (F).
Riding-plough (E).
محراث خاص يستعمل لكي افي تخسيس المزروعات التي
تتطلب هذه الحالة .

٢٧٤٨٨ - مَكْن *
Œufs d'insectes (F).
Eggs of the insects (E).
المكن هو بيض الحشرات . الواسدة مكنة .

٢٧٤٨٩ - مَكْنَان *
Oryssac
جراب المكن في بعض الحشرات وقد يكون في البطن
أو شربي الانكاز .

٢٧٤٩٠ - مَكْنَالَة ، مَدْرَة
Galega (S).
Galega, Lavanèse (F). Goat's rue (E). Geiss-raute (D). Galega, Lavanese (I).
جنس نباتات عشبية برة حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات
الفراشية . انواعها عديدة جميعها صليبية تنشط الدر . اوراقها
متساقطة ، مركبة ، ريشية ، وربة . ازهارها عتقودية التجميع ،
ابلية الارتكاز ، زرقاء اللون أو بنفسجية || اشهر
انواعها ما يلي .

٢٧٤٩١ - مَكْنَالَة شَرْيِيَّة
Galega orientalis (S).
Galega oriental (F).
نوع من المكناة وهي عشبة معمرة مبلولة تطول من ٦٠
الى ١٢٠ سم . ارضها ممدادة . ساقها فراء خلية . اوراقها
تعد من ١١ الى ١٧ وريقة . وريقاتها بيضيه مديبة تطول
من ٣ الى ٥ سم . صلها خلي البشرة في صفحته . ازهارها
بنفسجية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .
يقال انها تحمل غواص المكناة الحزنية ولكنها دونها منفة .

٢٧٤٩٢ - مَكْنَالَة مَحْزَنِيَّة * ، مَدَاب المَاهِز
Galega officinalis (S). Galega officinal, Rue des chèvres (F).

نوع من المكناة وهي عشبة مبلولة معمرة تطول من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . ساقها فراء . اوراقها تعد من ٩ الى ١٣
وريقة ، وريقاتها سانية تطول من ٢ الى ٤ سم . نسلها
مالس الصفعة مهذب الصفعة . ازهارها زرقاء اللون .
ازهارها يستمر من حزيران الى آب . وهي صباغية وتعتبر
من النباتات الطبية المنيعة تدخل في عدة علاجات اخصها
علاج السلس .

٢٧٥١٢ - مَلَاخ

بقلة طيبة رخصة تلقي كشحة (السان). الواحدة ملاحة.

٢٧٥١٣ - مَلَاخ

Resumurie (S).

Résumure, Résumurie (F).

جنس نباتات مجلية وجنية من فصيلة الالديات. انواعها المدونة سبعة منها في بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والشرق الاوسط || سوقها منتشرة رقيقة فراء لعلو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها متعاقبة، متقاربة الاوتكاز، غطية النصال الصغيرة القد البحرية اللون. ازهارها فردية التجميع، ابضية وطرية الاوتكاز، خاصة التركيب، يكثر فيها اللون الابيض. ثمارها حلابة الفلق. تنموها صيني || اعرف انواعها واشهرها الملاح الودي المدون بمحشية الحصف.

٢٧٥١٤ - مَلَاخ دُرِّي

Résumurie vermiculées (F).

نبات بري طبي مشهور باسم حشيشة الحصف، اطلها.

٢٧٥١٥ - مَلَاخَة

Saline (F).

Salt-marsh, S.-mine, S.-pit (E).

المكان المد لا صطناع الملح ونسجم الملح.

٢٧٥١٦ - مَلَاة

مزروع اللوز وكل ارض تكثر فيها اشجار اللوز.

٢٧٥١٧ - مَلَاي

Malieus (S).

Marteau (F). Malieus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم، عادات المشاب وفضيلة الاطريات. ازهارها المدونة عديدة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اغصها المحيط الهندي || اصداقها لانظامية، متباينة الاشكال، لاقائية المصارع، بعضها قريب الشبه بالمطاس. مفصلاتها عادية التسنين || تعيش لاصقة بصخور المجاح على اعماق تراوح من ١٥ م.

٢٧٥١٨ - مَلَاة *

Crenatula (S).

Crenatula (F). Crenatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم عادات المشاب وفضيلة الاطريات. ازهارها المدونة ثمانية جميعها من عظم البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصداقها شبه مروحية الشكل، رقيقة القدم، رقيقة المصارع للامتساوية، تحلة التضخيد للؤلؤة الداخل || تعيش لاصقة بالاسفنج.

٢٧٥١٩ - مَلَاة * هَمَلَسَة ، مَلَق ، هَمَلَكَة

Rouleau (F). Röll, Roller (E).

معدة اسطوانية تستعمل في تلمس أو حذل التربة الزراعية. اشكالها واحجامها عديدة تختلف باختلاف الغاية من استعمالها. اهمها:

Rouleau plombé (F).

ملاسة واطة

Rouleau ondulé (F).

ملاسة متواجة

Rouleau à bécettes (F).

ملاسة خياطية

Rouleau marqueur (F).

ملاسة غططية

Rouleau brise-mottes (F).

ملاسة مفتحة المد

٢٧٥١٤ - مَكُونِيَّات *

Limacodidae,

Cochlididae (S). Limacodidae, Cochlididae (F).

Limacodidae, Cochlididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المدونة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم اغصها المناطق الحساسة والاستوائية || اجسامها صغرة. بسطها تراوح من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها معتدلة الجرم. عيونها صغرة. اغصانها شديدة القصر. ملاسها مستطيلة، تحلة. قرونها الاستشارية غطية. بطونها متراكبة النصف النقيق والحمل الناعم. اجنحتها مستعرضة، عادمة التبدب || تسرح في الليل. اسارها شبه بيضبة الشوزن، قصيرة الجرامز الصدرية، ثلثة الجرامز البطنية. جميعها غاصلة || اشهر اجناسها المكودة.

٢٧٥١٥ - مَكِيلَة ، قَدَاة

Module, Mesure de capacité (F). Modul, Dry measure (E).

اسم شامل يطلق على كل وحدة كيلية من اي حجم كانت او سمة.

٢٧٥١٦ - مَكِير هو المقيز، اطله.

٢٧٥١٧ - مَلَاب مَلَاب : كل عطر مائع.

٢٧٥١٨ - مَلَاب * ، مَكْبِيغِيَا

Malpighia (S). Malpighie, Malpighier (F). Barbados cherry (E). Barbadoskirschen (D). Malpighia (I).

جنس نباتات شجرية من فصيلة المالايات، مهدا البلاد الاستوائية. اولها نحو ٢٠، اوراقها متعاقبة معتقة اهليلجية. نصلها خلى البشرة ستن الحافة الشائكة. ازهارها عقودية او نورية التجميع منها الاحمر والوردي والابيض. اعرف انواعها واشهرها:

ملاط حريف. Malpighie brillante, Bois capitaine (F).
شجرة امريكية المنبت، قشورها حامزة كاوية طيبة وصناعية.

ملاط كروي.
Cerister des Antilles, Mourellier, Xocot (F).

شجرة تكثر في المكسيك، ثمارها كروية مأكولة لا تحلو من الحوصلة وقد تزوج للزبون.

٢٧٥١٩ - مَلَابِين

Epinard de Malabar (F).

بقلة زراعية تلقي باذية بيضاء، اوراقها تستعمل استعمال الاسبانج.

٢٧٥٢٠ - مَلَابِيَّات *

Malpighiaceae (S).

Malpighiacées (F). Malpighiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات. اجناسها ٥٠ وانواعها ٦٠٠ مغلها من نباتات المناطق الاستوائية الاسريقية. جميعها اشجار وشجيرات وجنيات. اوراقها متعاقبة معتقة بسيلة او مركبة. ازهارها خماسية التماثلات والبتلات، عقودية التجميع، صفراء اللون او بيضاء او حمراء. ثمارها جراء مكبرة عديدة البزور.

٢٧٥٢١ - مَلَاخ ، مَكِير ، مَكِيرِي

Gélee, Givre (F).

Frost, Jelly, Rime (E).

هو جند نقط الماء على سطح التربة والنبات من جيلوت درجة الحرارة الى ما دون الصفر.



مَلَاب



مَلَاة

Féculerie (F).

٢٧٥٣٢ - ملحبة °

Manufacture of fecula (E).

الملبية أو مصنع اللبوب أو منشأة البطاطا هي المصنع المخصص باستخراج اللبوب.

Laiterie (F).

٢٧٥٣٣ - ملحبة °

Dairy-farm (E).

المسل الذي يمالج فيه الحليب رتباً يباع .

٢٧٥٣٤ - ملحبيًا °

في الملب ، الملب ، الملب .

Malt

٢٧٥٣٥ - ملح

في الحبوب الناشئة صناعات لا سيما حبوب الشعير التي تستعمل في صناعة البيرة .

Maltage (F).

٢٧٥٣٦ - ملحج

الملاحج أي صنع الملح ، هو عمل استمالة الشعير وطيره من الحبوب إلى ملح أي حبوب ناشئة .

Maltese

٢٧٥٣٧ - ملحز

خبرة قابلة للولان تحول الملحوز إلى ملحوز قابل الاختيار .

Manducable (F).

٢٧٥٣٨ - ملحالة

٢٧٥٣٩ - ملحج °

النبت الأرض اجتمع فيها وكثر . والأرض المنتجة : الكثيرية الخضرة .

Conjonctives (F).

٢٧٥٤٠ - ملححة

Conjunctiva (E).

ملححة العين ، غشاء يلفح صفحة القلقة الخارجية وصفحة الاقناب الداخلية .

٢٧٥٤١ - ملحقم °

هو المقول ، الملب .

٢٧٥٤٢ - ملحقات الأصابع ، ملحقات

٢٧٥٤٣ - ملحج °

أحد قسمي الطيور الجوارح ، يشمل فصلي الخفاشيات والقرليات .

Volubile (F).

٢٧٥٤٣ - ملحج

صفة النباتات المارئي الذي يمتلئ بأي جسم كان فينتله ويلتص حوله حلزونيًا .

Circinal

٢٧٥٤٤ - ملحج °

لمت تعريفه يطلق ، في علم النبات ، على كل عضو ، إن ورقة أو غيرها دائرية الالتفاف .

Convergent

٢٧٥٤٥ - ملحج

٢٧٥٤٦ - ملحج °

الملحك والمصمت : ما لا جوف له .

Maltose

٢٧٥٤٧ - ملحوز

نوع من السكر القابل للاختيار ، يحصل من تكسير النشا بالملح .

Contiguité (F). Contiguity (E). ملحقة ٢٧٥٤٠

Cément (F). Cement (E).

٢٧٥٤١ - ملأط

٢٧٥٤٢ - ملأصب فله

اسم يطلق على طائر ين صلتين هما الرفراف والقرقرى الشائع ، اطلبها .

Platalea (S).

٢٧٥٤٣ - ملأصقي °

Spatule (F). Spoon-bill (E).

جلوس طيور مائية من طوال الساق القواطع . أنواعه المعروفة ٨ ، تتميز بمناقيرها الكبيرة الملعقة الشكل ، بسواطعها الفضفاضة الدرية ، بأرأسها المستطيلة وبشعرها المفرغة . تعيش قرب الماء . قربها السك والهددان والخشرات والرخويات . تنش أوكها في الأبحار وبين القصب . اناتها تقع من بيضتين إلى أربع بيضات مستطيلة تحضنها ثلاثة أسابيع ٥ أشهر أنواعه ما يلي .

٢٧٥٤٤ - ملأصقي أبيض ، أبيض ملحقة ، دواس

Platalea leucorodia (S). Spatule blanche (F).

نوع من الملاحقي وهو طائر كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم . ثوبه إلى الأبيض الناصع باستثناء مناقير وريشه السد ، ونحوه وزفده وطرف مناقير الصفرة . أرياش رأسه مستطيلة مهدلة . يعيش مجامعات كبيرة تنش في مكان واحد . يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي . يكثر على شواطئ الخليج الفارسي والبحر الأسود وعلى ضفاف الباناب وفي هولندا .

٢٧٥٤٥ - ملأصقي زرد ، أبو مسوط ، عداواس

Platalea ajaja (S). Spatule rose (F).

نوع من الملاحقي طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه وردي اللون . أحواله شطوط وشفاف الشرق وغربية الشرقية . مجامعات متوسطة الحجم ، عدد أفرادها يراوح من ٦ إلى ٢٤ ، وهي تنش في مكان واحد .

٢٧٥٤٦ - ملأصقي °

نبات محلي من الجليليات يدعى قتلقة ، اطلبها .

Terrien (F).

٢٧٥٤٧ - ملأك

Landed, Proprietor (E).

هو صاحب الاملاك أي الاراضي الزراعية والحرجية .

٢٧٥٤٨ - ملأك البحر

سمكة بحرية ولون مفرطة مشهورة باسم سقطين ، اطلبها .

٢٧٥٤٩ - ملحاصي

Palpes (F). Palps, Feelers (E).

زوائد مفصلي فكية تلمس الحشرات بواسطة ما أكلها وربما يمدادها .

٢٧٥٥٠ - ملحاب °

Féculomètre (F).

Faeculometer (E).

جهاز يستعمل في تحديده محتوى اللبوب الناشئ المرجح في مادة معينة .

٢٧٥٥١ - ملحان °

Galactomètre (F).

Galactometer (E).

جهاز تقاس بواسطة المواد السكرية والسمنية والجنية والجلالة الموجودة في الحليب .



ملأصقي

٢٧٥٥٨ - مُتَجَنِّ ٥
Régime (F).
هو مجموعة المواليد والانفعالات الطبيعية التي تسيطر عليها.
المشي . كقولك ملحن الاطوار وملحن الرياح الخ .
ج ملحن .

٢٧٥٥٩ - مُتَج ٥
الملح : ورم في قلوب الفرس دون الجرد فإذا اشتد
فهو الجرد .

٢٧٥٦٠ - مُتَج ٥
Sol (F). Salt (E).
الاسلاح ، كياويا ، مواد ناتجة من احلال مدن محل
الهيدروجين في حامض . فإذا أضيف مثلاً الحامض الكبريتي
المخفف الى الزنك يتصاعد غاز الهيدروجين ويختفي المذن
ويتكون ملح كبريتات الزنك .

٢٧٥٦١ - مُتَج البَارُود ، تَطْرُون ، بَوَرَق اُرْمَنِي ٥
Nitro, Salpêtre (F). Nitro, Salpêtre (E).
هو كياويا نيترات البوتاس، يحصل ويتجمع طبيعياً على
الصخور الكلسية وعلى جدران الاقباء الرطبة ويستعمل
في صنع البارود .

٢٧٥٦٢ - مُتَج الطَعَام ٥
Sel de cuisine, Chlorure de sodium (F). Kitchen
salt (E).
تسميته الكياوي كلوريد الصوديوم . يستخرج بأكثرية
من مياه البحر بعد ترقيدها وتبينها في الملاحات ثم معالجة
بلوراتها ضمن مجاف خاصة .

٢٧٥٦٣ - مُتَحَان ٥
Janvier (F). January (E).
هو شهر كانون الثاني .

٢٧٥٦٤ - مُتَحَان ٥
Halimodendron (S).
Halimodendro (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة التريبات . انواعه
المعروفة قليلة العدد ، جميعها اسوية المهد ، تبت في رمال
الشواطئ البحرية . معظمها جنبي وبضها مشجر . اوراقها
مركبة عابلة . ثمارها قرنية ، بزورها مفلطحة ، اشهر
انواعه التريينية الملحان القضي .

٢٧٥٦٥ - مُتَحَان فِيْهِ ٥
Halimodendron argenteum (S). Halimodendro
argente (F).
نوع من الملحان يعيش في الاربة الرملية الناحية . جنينه
شائكة فارشة تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها عابلة ، مركبة ،
شعيرية . وريقاتها رباعية العدد ، اهليلجية الشكل ،
مغطوة النصل البحري اللون القضي المواج ، ازهارها كبيرة
القد ، منها الثنائية التجميع ومنها الثلاثية ، معاليها مسطحة
متدلية . لبها الى الحرة البفسجية المواج || تنوره يستمر
من ايار الى حزيران .

٢٧٥٦٦ - مُتَحَاوَات ، تَقْسِيْمَةٌ ٥
Feuillus (F).
Leavy (E).
هي الاشجار الحرجية والتريينية التي يسقط ورقها في الشتاء .
تقضيها العروات والايادة اي الدائمة الخضرة التي لا يسقط
ورقها . واحدتها لماء .

٢٧٥٦٧ - مُتَحَق ٥
Annexe (F).
Annexed, Appended (E).
هو كل تابع خلق بأصل .

٢٧٥٤٨ - مُتَوَرِّيات الأَجْنِيحة ٥ ، مُتَعَفِّيات ٥
الأَجْنِيحة ٥
Stropsipères, Stropsipteres, Rhapiptères (F).
رتبة حشرات من طيقة غشائيات الاجنح . اجناسها وانواعها
المروفة قليلة العدد تجسمها فصيلة الحَشَفِيَّات .

٢٧٥٤٩ - مُتَوَرِّية ٥
Latanier (F).
هي الحشف ، اطلبه .

٢٧٥٥٠ - مُتَتِين ٥ ، مُتَاتِين ٥ ، مُتَسِين ٥
Maltine, Malsine (F).
المُتَتِين اي كسب اللذة الصفراء هو الطفل الناتج عن
صناعة تقطير اللذة ، ويستخدم من اعلاف الماشية .

٢٧٥٥١ - مُتَشَوِّد ، تَشِيد ٥
Synanthérique (F).
Synanthéric (E).
المُتَشَوِّد والشيء من الازهار ما كانت اسديتها ملتحمة المآثر .

٢٧٥٥٢ - مُتَج ٥
هو نوى المقل . ج املاج .

٢٧٥٥٣ - مُتَجَا ٥
Abri (F). Refuge, Shelter (E).

٢٧٥٥٤ - مُتَجَدَّة ٥
Mulgedium (S). Mulgédie (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها
المعروفة عديدة . اطعمانها بعض مناطق الشرق الاوسط
واروبية || سوقها فراء تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم .
اوراقها كبيرة مفروشة لامتناهية التفرع . ازهارها عشكوي
التجميع . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الازرق ||
اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٢٧٥٥٥ - مُتَجَدَّة تَقَرِّية ٥
Mulgedium tataricum (S).
Mulgédie de Tartarie (F).
نوع من المُلجدة التريينية . مهدا بلاد التتر . ساقها قليلة
الفروع تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها حاضنة
بحرية اللون . ازهارها عذقي التجميع . ازهارها الى الزرق
الساجينية || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٧٥٥٦ - مُتَجَدَّة جَبَلِيَّة ٥
Mulgedium alpinum (S). Mulgédie alpine (F).
نوع من المُلجدة التريينية البريوية تعيش في جميع الاودية
ومختلف المواقع . مهدا جبال الشرق الأدنى وبعض جبال
اروبية . ساقها فراء تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها حاضنة
كبيرة النصال المرطاه . ازهارها عشكوي التجميع ، ممثل
الكثافة . ازهارها الى الزرق الباهتة || تنويرها يستمر
من تموز الى ايلول .

٢٧٥٥٧ - مُتَجَدَّة كَبِيرَة الزَّرَق ٥
Mulgedium macrophyllum (S).
Mulgédie à grandes feuilles (F).
نوع من المُلجدة التريينية . مهدا بعض المناطق التركية
والقوقاز . ساقها فراء ، خلية المهاد ، تملو من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . اوراقها كبيرة القد ، قليلة النصال ،
مالسة المسطحات العليا ، مزينة السفلى . ازهارها عشكوي
التجميع ، كبير القد . ازهارها الى الزرق الزاهية ||
تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٢٧٥٦٨ - ملحق التامين

Avenant (F).

Modification (E).

عقد كتابي يضاف الى وثيقة التأمين الدلالة هل تعديل وقع في بعض شرائطها .

٢٧٥٦٩ - ملحق الرصية

Codicille (F).

Codicil (E).

هو الملحق الذي يجرده الموصي بعد تحريره وصيته إما لتمامها او لتعديلها أو لالغائها .

٢٧٥٧٠ - ملحوظة ، ملحوظة

Prévisible (F).

Foreseeable (E).

٢٧٥٧١ - ملحوبات الفلك

Plectognathes (F).

رتبة من الاسماك الغضائيات .

٢٧٥٧٢ - ملحق

Dragon (F).

Sucker (E).

الملق والعالق : قضيبي ينمو من برصة مرضية نشأت على جذور نبات مقوق .

٢٧٥٧٣ - ملحوبات

Malachitidae (S).

Malachitidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائمة من رتبة غمديات الجنجاء || اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات البلاد الحارة وبعضها يألف مناطق البلاد المعتدلة الحرارة مرتبها النباتات المثبثة والادغال ترتكض رقيق الازهار وتقترب الحشرات الدنيا التي تقترب منها . وبعض اجناسها يتميز بجهاز خاص يمكنه من دفع حويصلات جانبية حراء اللون تطلق منها رائحة اثيرة تجذب الاصاصاب ، قليلة الاثى || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس . مستقلة التزيان المسطيلة المركبة من ١١ فصلة . ارساغها خماسية المقل || يرقاتها تعيش تحت الماء والاعشاب المتفورة ساعية رواد اساريع الحشرات الخالصة لاقراسها || اشهر اجناسها الملحية والمداشفة والوسقة .

٢٧٥٧٤ - ملحية نكالية البثور

Malachius bipustulatus (S).

Malachius bipustulatus (E).

حشرة وائمة جاذبة قانصة من فصيلة الملخيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الحقل المزروعة والمزاري . غنائلها ترتكض رقيق الازهار وتقترب الحشرات الدنيا . تتميز بجهاز حرمي قاسح تطفه الحشرة الى الخارج ، عند الحاجة ، فيلور احر اللون يفرز مادة اثيرة نافذة تجذب الاصاصاب تكفي للقتل مقاومة الفرم . يرقاتها تعيش على جذور النجيليات وعلى ما تقترب من اساريع الحشرات التاربة ولدائمة || جسمها صغير القد يطول نحو ٦ م . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخطم ، اخضر اللون . صينها كيرتان . زبائنها غطيان . فكها صليبان . كوسلها شبه مربع الشكل ، اخضر اللون . ظهرها الى الخضار الالمنس أو الاطراف الخلفية فال الحشرة . غداها خفيفتا التحيزيز للمجم المخلوط . ارساغها خماسية المقل || لها جبيل واحد في الحقل . تظهر الحشرة الجملانة في ايام وتبين حتى اشد . انماها تهريق للكن قرب سوق نبات وتحت الارراق التي تلامس التربة || البرقة عند الادراك التام تطول نحو ٩ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب القصيرة ، حنكي اللون ، اسمر الملاج ،

اسفني الرأس الاسود ، مستند للزعر والسكة الشرجية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً يتغذى في التربة ضمن جلاب من الطين والبراز ينطلق عند انطلاق الحشرة .

٢٧٥٧٥ - ملحية حمراء

Malachius rufus (S).

Malachie rouge (F).

حشرة وائمة قانصة من فصيلة الملخيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف البراري والمزاري والاحراج الغلظة . غنائلها ترتكض رقيق الازهار وتقترب الحشرات الدنيا . تتميز بجهاز الحويصلي القاسح الاثري الرائحة التي تجذب الاصاصاب . يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاعمشاب النضرة قربها اساريع الحشرات الخالصة || جسمها صغير القد يطول من ٦ إلى ٧ م . رأسها مستطيل الجرم اسمر اللون . زبائنها مستطيلان مستقان . صينها كيرتان . فكها صليبان . كوسلها صناعي اللون يتصله بقية غضار . ظهرها مستطير الطرف اللصق ، احر اللون . ارساغها خماسية المقل || لها جبيل واحد في الحقل . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر حزيران . تسرح في النهار . تسلف بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تنجح المكن تحت لحاء الاشجار وتحت الانقاض || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٠ إلى ١٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل الرأس ، مستند الطرف ، سداسي الرواجب القصيرة ، اسمر اللون ، اخضر الملاج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً يتغذى في آخر سرداب دخلته البرقة .

٢٧٥٧٦ - ملدكان

Flectométre (F).

Flectometer (E).

جهاز يستعمل في قياس لدانة الماد تحت ضغط معين .

٢٧٥٧٧ - ملدكان

Pellicule (F).

Pellicle (E).

صفحة او عصاية سليولوزية رقيقة منسوبة السطح تستعمل في غش الصناعات اخصها صناعة الافلام السينمائية حيث تطل على اسطح جهتها بمادة جيلاتينية حساسة يؤثر فيها النور .

٢٧٥٧٨ - ملدكان

Pelliculé (F).

منقى بالملدن .

٢٧٥٧٩ - ملن

Mélèze (F).

شجرة حرجية تسمى لاويس ، اطاليا .

٢٧٥٨٠ - ملن كاذب

Faux-mélèze (F).

شجرة حرجية وتزيينية تسمى لاويس كاذب ، اطاليا .

٢٧٥٨١ - ملن

Gonocytus (S).

Gonocytus (F).

جنس نباتات تجمية ، متصصة الارتفاع ، برية ، مبررة ، من فصيلة القرنيات القرائية . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منتبها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اخصها تهايم لبنان والمنطقة العلوية السورية || سوقها متصصة ، فرعاء ، حاملة الشوك . اوراقها مركبة ، وثرة المدد ، وريقاتها شبه بيضية النصال المسطيلة . ازهارها اجلية الانتشاب ، مسطيلة الزناد ، صفراء اللون ، مستعينة العرف ، يحرمها النحل .



ملحية ثنائية البثور



ملحية حمراء

Lin commun (F).

٢٧٥٩٢ - مَكْسَج

هو الكتان الشائع ، اطليه .

Melasmia (S).

٢٧٥٩٣ - مَكْسَسِيَّة

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهذكيات . انواعه قليلة
عامة القيمة الاقتصادية . بكنهاده ديمية التركيب ،
فضية اللون ، ترتكز حل ونية فارشة فرجية الانغلاق .
بوفاته غمرولية متنفقة ، شفافة ، وسيدة الخلية .

Mylésinus (S). Mylésine (F). * ٢٧٥٩٤ - مِلْسِين

الواحدة ملسينة ، جنس اسماك نهريه من مفصوات المائنة
وفصيلة القرصانيات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها انهر
البرازيل والغويان || اجسامها بيضيه الشوزن ، مسطلة
الجرم ، صغيرة القد ، تقطون من ١٦ الى ٢٠ سم . زعانفها
الظهرية وللرجبة كبيرة مقابلة . اما الذيلية فهلاية
الشكل . انوارها الى الخصار المتلغات المجاهات || حيوها
ماكولة ، متوسطة الصنف .

٢٧٥٩٥ - مِلْسِيَت السَكْم

هي زخعة السكج ، اطليا .

٢٧٥٩٦ - مِلْسِيَت المَكْفُوف

هي زخعة المكفوف ، اطليا .

Fluoroscope (F).

٢٧٥٩٧ - مِلْصَاف

جهاز يستعمل في تشعيع الاشعاع اي الفلورور الموحيده
في المواد المنلنية .

Dugong (F).

٢٧٥٩٨ - مَكْصَة

هي الاطوم ، حيوان بحري غليظ الجلد ، اطليه .

Compresseur à pistolet (F). ٢٧٥٩٩ - مِلْطَاس

جهاز آلي يستعمل في تقطيع المواد الصلبة كالصخور
ونحوها .

Malthusianisme (F). ٢٧٦٠٠ - مَلْطُوسِيَّة

Malthusianism (E) .
الملطوسية مذهب اقتصادي اجتماعي نادى به الاقتصادي
الانكليزي «ملطوس» لمخضه ضرورة كبح الانجاب
لان التكاثر البشري يزداد والمواد الغذائية الصرورية
تنضب .

Tissu sous-cutané (F).

٢٧٦٠١ - مِلْطَى

Subcutaneous tissue
قشرة رقيقة بين العظم والدم .

Cochléaire, Cochléiforme (F). ٢٧٦٠٢ - مِلْطَقِي

Cochleiform (E) .
ما كان شكله شكل الملعقة .

Cochléaria officinal (F). ٢٧٦٠٣ - مِلْطَقِيَّة

هي حشيشة الملاحق ، من النباتات الطبية ، اطليا .

Clematidae (S). ٢٧٦٠٤ - مَلْعَوَّرَات

Clematidae (E) .
مجموعة نباتية من فصيلة الشقيقيات . اعطائها البلاد الحارة
والمتدلة . انواعها كثيرة المدد معظمها مداد مارش . سورها
ليفية . اوراقها متقابلة طويلة الارجيول ، مصارها سامة
محرقه . ازهارها عادية التلات كبيرة الفصل الملونة .

Malesherbia (S).

٢٧٥٨٢ - مَلْزُورِيَّة

Malesherbie (F).

جنس نباتات عاوية ، معمرة ، برية وتربيتية من فصيلة
اللزوريات . انواعها المعروفة خمسة . منبتها الطوي بعض
مناطق الشيل والبيرو || تزدهج للزوين في المراكب وفي
المواقع التي لا تخشى الصقع في الشتاء .

Malesherbiaceae (S).

٢٧٥٨٣ - مَلْزُورِيَّات

Malesherbiaceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القمالات . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة المدد . منبتها الطوي بعض اصناع
امريكية الجنوبية || نباتاتها معمرة ، عاوية ، قريبة الشبه
بالامليات . اوراقها متعاقبة . ازهارها غشوية و كبيرة
القد ، جميلة الالوان ، سننية الارتكاز . تتميز باستطالة
النوب الكرم وباسديتها المتدربة في قاعدة الزويز ||
اشهر اجناسها الملزورية .

Synallagmatic (F).

٢٧٥٨٤ - مَلْزُوم لِطَرَكَيْن

Synallagmatic, Reciprocal (E).

هو المقد الذي يلتزم فيه كل فريق من المتماثلين نحو
الشريك الآخر .

Coobligé (F).

٢٧٥٨٥ - مَلْزُوم مع غَيْرِه

Coobligant (E).

٢٧٥٨٦ - مَلْزُورِي

Amygdalaire (F).

Amygdaloid (E).

نعت تعريفي يطلق على كل عنصر يحوي بعض الحجات
للتحجرة او بعض الحصيات .

Châtrer (F).

٢٧٥٨٧ - مَكْس

To castrate, To geld (E).

مكس القصية : استلها بمروقها . وليس الكيش : سل
خصيية بمروقها فهو مكس وليس الكيش ملوس .

Glossomètre (F).

٢٧٥٨٨ - مِلْسَان

Glossometer (E).

هو مقياس اللسان ، جهاز تقاس به غراميم التحصيل
لمعرفة الانواع الاصغر من غيرها في جرس رحيق الازهار .

Anacanthinins (F).

٢٧٥٨٩ - مَكْسَاوَات

رئية من الاسماك الطغيات .

٢٧٥٩٠ - مَكْسُورِيَّة * ، سَلْجَ هِنْدِي

Melastoma (S). Mélastome (F). American gooseberry (E). Schwarzmund (D). Melastoma (I).

جنس مجهرات وجينات برية وزراعية من فصيلة الملسويات .
مدها المناطق الاستوائية . انواعها عديدة . اوراقها متنفقة ،
متقابلة سنانية التصل . ازهارها محورية الارتكاز او هامية .
ثمراها لوروية مسنجة العرف والطعم ، صبرها اسود اللون
يدبح اللسان والقم .

Melastomaceae (S).

٢٧٥٩١ - مَكْسُورِيَّات

Mélastomacées (F). Melastomaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، مستقلة القمالات ،
منخفضات المبيض . اجناسها وانواعها زهاء ١٨٠٠ ، جميعها
من نباتات المناطق الاستوائية . اوراقها كاملة متقابلة .
ازهارها خاسية التركيب .



ملسومة



ملسين



ملئى ارجوانية



ملئى جبالية



ملئى زرقاء



ملئى سامة



ملئى صفراء

٢٧٦١٢ - ملئى شرقية *Clematis orientalis (S)*.
Clématite d'Orient (F).
جنية عارضة عديدة الفصوص طول من ٣ الى ٦ امتار.
اصطفاها الشرق من شط بحر قزوين الى منشوريا ، اوراقها
مركبة ، ثلاثية الفصوص القلبية الشكل ، المسنة الحافة .
تصلها بحري اللون . ازهارها رباعية الفصل ، قطرها نحو
٣ سم . || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٧٦١٣ - ملئى صفراء *

٢٧٦١٣ - ملئى صفراء *Clematis ochroleuca (S)*.
Clématite jaune (F).
جنية فراء منتشية تملو نحو ٦٠ سم. مهدا البلاد الامريكية.
اوراقها بسيطة لاطئة متعابلة ، تصلها بيضى الشكل مالى
الصفحة . ازهارها حامية الارزكاز ، فردية ، صفراء اللون ،
زيتية اللون ، اجابية الشكل ، متعابلة || ازهارها يستمر
من ايار الى حزيران .

٢٧٦١٤ - ملئى قلبية الوزق ، طيبان

٢٧٦١٤ - ملئى قلبية الوزق ، طيبان *Clematis angustifolia (S)*.
Clématite à feuilles étroites (F).
جنية دخلة مثبوتة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها منتشية .
اوراقها مركبة . وريقاتها خضراء بسيطة او ثلاثية التفريص ،
صضارها سامة . ازهارها كثيفة التجميع ، خافتة الورد ،
بيضاء اللون . تكثر في بعض الاسراج الربطية . تجملها
للمازن ولا تنضرو منها .

٢٧٦١٥ - ملئى عنكبوتية

٢٧٦١٥ - ملئى عنكبوتية *Clematis paniculata (S)*.
Clématite à panicules (F).
جنية سرىوتية عارضة طول نحو ٤ امتار . مهدا اليابان
وكوريا . اوراقها مركبة . وريقاتها خضراء او صباوية
الازواج ، ريشية التركيب . تصلها بطول من ٥ الى ٨ سم .
ويمرض من ٢ الى ٤ . ازهارها حثولكية التجميع ، رباعية
الفصل القليلة ، قطرها نحو ٣ سم . || ازهارها يستمر
طوال شهر ايلول .

٢٧٦١٦ - ملئى عتمى ، مزهان ، حبيل مسكى *Clematis cirrosa (S)*.
Clématite à vrilles, C. tou-jours verte (F).
جنية عارضة برية وريبيتية تملو من ٣ الى ٥ امتار .
حراقها مركبة ثلاثية . اوراقها ابيدة بسيطة لا خضراء
الشكل . ازهارها قمية رباعية الفصل الخلية الجنية
لونها الى الياضى الاخير تملو مائة وريدي || مصارة
اوراقها قليلة المادة القلوية السامة لكنها حريفة تحرق
الجله || ازهارها يستمر من اذار الى كانون .

٢٧٦١٧ - ملئى قلبية الوزق

٢٧٦١٧ - ملئى قلبية الوزق *Clematis cordata (S)*.
Clématite à feuilles en coeur (F).
جنية عارضة طول نحو ٦ امتار . اوراقها مركبة مثلية .
وريقاتها تده من ٥ الى ٧ ازواج ، تصلها قلبي الشكل
مسن الحافة . ازهارها خلية الفصل البياض || ازهارها
يستمر من حزيران الى تشرين الاول .

٢٧٦١٨ - ملئى كركسية الوزق

٢٧٦١٨ - ملئى كركسية الوزق *Clematis apifolia (S)*.
Clématite à feuilles d'ache (F).
جنية سرىوتية عارضة طول نحو ٣ امتار . اصطفاها الصين
واليابان . اوراقها مركبة كركسية الشكل . تصلها اخضر
اللون مسن الحافة . ازهارها عقنودية التجميع ، صنية
القد ، رباعية الفصل ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ١٠ سم .
ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٢٧٦١٥ - ملئى *Clematis (S)*.
Clématide, Clématide (F). *Clematis (E)*. *Waldrebe (D)*. *Clématide (I)*.
جنى نباتات معمرة عارضة من المعلومات . انواعها عديدة .
اوراقها لا نظامية تكثر فيها الاشكال المركبة الريشية .
ازهارها عادمة البتلات تستعفى ضبا بالفصل الملون المنخلة
الاجسام والاشكال || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٧٦١٦ - ملئى ارجوانية *

٢٧٦١٦ - ملئى ارجوانية * *Clematis coccinea (S)*.
Clématite écarlate (F).
جنية فراء منتشية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فروها
جوية اللون . اوراقها متعابلة ، لاطئة ، بسيطة . تصلها
سانلي الشكل ، بارز العروق ، خلى البشرة . ازهارها
ارجوانية اللون ، اجابية الشكل تطسود نحو ٤ سم .
ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٧٦١٧ - ملئى بحريرة

٢٧٦١٧ - ملئى بحريرة *Clematis maritima (S)*.
Clématite maritime (F).
جنية فراء منتشية تملو نحو ١٢٠ سم. منبتها للشطوط
البحرية . اوراقها مركبة ، وريقاتها قديمة التفريص
بحرية اللون . ازهارها صنية للقد تبينة البياض || ازهارها
يستمر من ايار الى تموز .

٢٧٦١٨ - ملئى جبجية *

٢٧٦١٨ - ملئى جبجية * *Clematis montana (S)*.
Clématite montagnarde (F).
جنية سرىوتية عارضة طول من ٤ الى ٦ امتار . ساقها
وفروها جوية اللون . اوراقها مركبة مثلية . وريقاتها
الاجلية الشكل ، عاقبة الخضار . ازهارها بيضاء اللون ،
اجلية الارزكاز ، مستطيلة المالحاق ، كبيرة القد ، قطرها
برامج من ٥ الى ٩ سم . || ازهارها يستمر من ايار
الى حزيران .

٢٧٦١٩ - ملئى جرسية

٢٧٦١٩ - ملئى جرسية *Clematis campaniflora (S)*.
Clématite en cloche (F).
جنية سرىوتية عارضة طول من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها
مركبة ثلاثية . تصلها اخضر اللون عادم التنتين . ازهارها
جرسية الشكل ، رباعية الفصل الزرق ، مستطيلة للمالحاق ،
متعدية || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٢٧٦٢٠ - ملئى زرقاء *

٢٧٦٢٠ - ملئى زرقاء * *Clematis viticella (S)*.
Clématite bleue (F).
جنية سرىوتية عارضة طول من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها
مركبة ثلاثية التثلث ، وريقاتها صنية عادمة التنتين .
ازهارها كبيرة القد ، زرقاء اللون ، قمية الشكل ، رباعية
الفصل ، قطرها برامج من ٥ الى ١٢ سم . || ازهارها
يستمر من حزيران الى ايلول .

٢٧٦٢١ - ملئى سامة ، فراج

٢٧٦٢١ - ملئى سامة ، فراج *Clematis vitalba (S)*.
Clématide des haies, C. brulante, Herbe aux yeux, Berceau de la Vierge, Vigne blanche (F).
جنية مبلولة عارضة طول من ١٠ الى ٢٠ م . اوراقها
مركبة مثلية . وريقاتها تده من ٥ الى ٩ ازواج ، تصلها
حبيل الخضار الزاوي . ازهارها رباعية الفصل الخلية
البياض اللون ، قطرها نحو ٣ سم . اسديتها وريقاتها بيض .
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز . وهي تكثر في المالحاق
الربطية احصها السباحات . صضارها غزيرة المادة السامة
النشيط .

٢٧١٦٨ - مَلْقُطُون * Sicana odorifera (S).

Melocoton (F).

نبات زراعي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات. مهدد بعض مناطق أمريكا الجنوبية. يستعمل كجيش أنواع القرع في الطبخ ويستعمل أيضاً في تطهير المنازل وإزالة البعوض لانه فواح العرف المستحب || ساقه عارية طول نحو عشرة أمتار. حوافها مزينة بحماض تمكثها من الالتصاق بأي سطح كان. أزواكه معتقة كلبية، خاسية البتلات. ثماره قرعية الشكل تطلع من ٢٥ الى ٣٥ سم. لبها، عند الإدراك، الى الحمرة البرتقالية || تتركب الثمار مطبوخة قبل دعوها في طور الإدراك لان لبها يتصلب عند الإدراك ويفوح منه اريج عطر ثابت يستقر بعض الوقت.

٢٧١٦٩ - مَلْقُوعَة Embryon (F). Embryo (E).

المادة الخلية المكونة الناشئة التي يستمر بها الحيوان والنبات. وهي في الانسان مضغة وفي الحيوان نمره وفي النبات نيتس.

٢٧١٧٠ - مَلِكُ الْعُقْبَان Aigle impérial (F).

هو العقاب القيصري، اطلبها.

٢٧١٧١ - مَلِكَةُ النَحْل Reine des abeilles (F).

Queen-bee (E). هي النحلة الانثى البيض واسيرة نحل النحل والخلية والتغير.

٢٧١٧٢ - مَلِكُورِيَّة Malacologie (F).

Malacology (E). فرع من الزولوجية يبحث في شعبة اللافقريات.

٢٧١٧٣ - مَلِكُوك * Melicoccus (S).

Mélicouque (F). Melicoccus (E). جنس اشجار وشجيرات برية عروق من فصيلة السابنديات. انواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض المناطق الاستوائية من البلاد الامريكية، اغصانها جنيكة || سيقانها منتصبه كثيرة الفروع تطلع من ٣ الى ١٠ أمتار أوراقها ابيدة، مركبة، متعاقبة. وريقاتها شديدة العدد، ثنائية او ثلاثية الأزواج. نصلها جامدة الول، يضيء الشكل. ازهارها حثكولي التجميع، طرفي الازهار. ازهارها صغيرة يبيض اللون او وردية، عطرية العرف. ثمارها نوية مأكولة اللباب والمصحات.

٢٧١٧٤ - مَلِكِيَّة Propriété (F).

Property, Ownership (E). هي حق الاستعمال والاستمتاع والتصرف في الشيء اطلاقاً في نطاق القانون.

٢٧١٧٥ - مَلِكِيَّة مُشْتَرَكَة Copropriété (F).

Joint property (E). هي حق ملكية مال منقول او ثابت موزع على افراد متعددين. وقد تكون الملكية المشتركة شاملة او غير شاملة.

٢٧١٧٦ - مَلِكِسُ رُومِي Dracodéphale moldavique (F).

هو رأس التين اللطاني، اطلبها.

٢٧١٧٧ - مَلْبُوس * Melampus (S).

Mélampe (F). Melampus (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدميات الأرجل وفصيلة الحفصيات. انواعه المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠

٢٧١٧٨ - مَلْمَى لَهَب، مَلْمَى عَطِرَة، قَمِيص

بِنْتُ الْمَلِك، عَنَصَرَة

Clématis flammula (S). Clématite odorante, C. flammula (F).

جنية مبلولة عارية طول نحو ٤ أمتار. اصطنائها حوض البحر المتوسط. اوراقها مركبة شطية. وريقاتها ضيقة كثيرة العدد. نصلها لا قباسي الشكل. صصارته سامة حريفة كارية تحرق الجلد. ازهارها صغيرة القد غبراء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٧١٧٩ - مَلْمَى مُنْقَصِيَّة * Clématis recta (S).

Clématite dressée, Téverin (F).

جنية خصاصه دلفة مبلولة تطلع من ٦٥ الى ١٢٠ سم. ساقها منتصبة جبهة. اوراقها مركبة ثنائية او ثلاثية الأزواج. وريقاتها يضيء النصل، بحرية اللون. صصارته لا تكوي. ازهارها مكسبة، عطرية، يبيض اللون. ازهارها يستمر من ايار الى تموز

٢٧١٨٠ - مَلْمَم Périsme (F). Peristome (E).

ما يكتنف القم في الحيوانات الدنيا وما يحوق ثغرة الفطور ج ملائم.

٢٧١٨١ - مَلْمَلَف، مَلْمَلَة Trouli (F).

Windless, Hand-winch (E).

آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الاثقال.

٢٧١٨٢ - مَلْمُوك *، كُرْمَب، لَحْنَة Brassica oleracea capitata (S).

Chou, Chou cabus, Chou potager (F). Cabbage, Drum head cabbage (E). Kraut, Kopfkohl (D). Cavolo, Cavolo cappucco (I). جنس زراعي من فصيلة الصليبيات. ضرورها واسرارها كثيرة العدد. جميعها ملطحة الاوراق المأكولة اثنى بعض الفيتامينات الصحية. تحليلها الرسمي يطلي:

٣٧.٠ ٪ من المواد الازوتية
٥.٠ ٪ من المواد العننية
٢٥.٢ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٧١٨٣ - مَلْمُوكُ بروكسل * Brassica oleracea gemmifera (S).

Chou de Bruxelles (F). Brussels sprout (E). Brüsselar kohl, Rosenkohl (D). Cavolo di Brussella (I).

نوع من الملموك الزراعي للمأكول. تشابهه ضحية الشكل، صغيرة القد، تعد من ٦ الى ٢٠ أدرائها تدريجي يتنشق من الاسفل.

٢٧١٨٤ - مَلْمَلَح * Gravid (F).

Gravid, Pregnant (E). الملقاح الحامل من الاناث او من كانت طالتها تمكثها من ذلك.

٢٧١٨٥ - مَلْمَلَح Malschra (S).

Malschra (F). Wild ochra (E). Malschra, Weichmalve (D). Gombo salvatico (I).

جنس نباتات شبيهة برية من فصيلة الملبازيات. انواعه المعروفة خمسة، جميعها مرورية، اصطنائها البلاد الامريكية. اوراقها متعاقبة لا قياسية الشكل والتفصيص. ازهارها رؤسية منها الالبيض والليالي والوردية والاحمر.

٢٧١٨٦ - مَلْمَلَط Pointe du bec (F).

Point (of the beak) (E). هو طرف منقار كل طائر إلا الكاسر.



ملمى منتصبه



ملفوف



ملفوف بروكسل



ملقظون



ملوك

Salinité, Salure (F).
Salinity, Saltiness (E).

٢٧٦٥٠ - ملوكة

Corchorus olitorius (S).
Corète potagère, Corette potagère, Guimaive potagère, Mauve des Juis, Mélochie (F). Jew's-mallow, Nalta jute (E). Judenmalve, Meluchie (D). Corcoro ortense, Malva del giardino (I).
ونهم من قال « ملوكة ». ثبات حشبي بقلي حولي من فصيلة التريفيديات . يزرع لأوراقه الطويلة الناعمة التي تغلب المذاق والأصناف . متطلبات زراعته تربة مروية غيرة خصبة يكثر فيها عنصر الأزوت العضوي أو المعدني .

منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة || اصنافها شبه غرومية الشكل، طرفية القولية المنسوبة الخطوط . فوجاتها مستطيلة مسنة الحفلات .

٢٧٦٣٨ - ملتصع
Profil (F).
Profile, Side face (E).
مظهر الشئ، الجانبي .

٢٧٦٣٩ - ملتس

٢٧٦٤٠ - ملتس شفوي

٢٧٦٤١ - ملتس فكي

٢٧٦٤٢ - ملتسي

ثمت تمرغبي يطلق على كل عضو حشري أو نباتي يحمل ملساً أو يقوم بوظيفة الملس أو يشبه الملس .

٢٧٦٤٣ - ملتصع
ملح الطائر جناحه . ويقال لجناحي الطائر ملتصعاً .

٢٧٦٤٤ - ملتكة
Trompe de l'éléphant (F).
Trunk (E).

هي غرطوم الفيل يتلصق به الطعام وإلما ويستعمله في الدفاع عن النفس وفي نقل الأثقال .

٢٧٦٤٥ - ملتسيوم
Melanthium (S).
Mélanthe (F). Melanthium, Bunch flower (E). Braunblümchen (D). Melanthio (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من الوردجيات . أزهاره للمروقة ثلاثة تربع في المواق الأرضية اللطيفة . سيقانها نحيلة تطلو من ٢٠ إلى ٦٠ سم . تنتهي بالثقافات الزهرية التي يراوح ارتفاعها من ٥ إلى ١٠ سم . أزهارها قديمة ، غصية ، كثيرة العدد تطلو من ٢٠ إلى ٣٠ سم . وتعرض من ٦ إلى ١٨ م . أزهارها إلى البياض الاخضر المالح || أنزاعها يستمر من أيار إلى تموز . وصغير صقلها مع مطلق المواد السكرية . يقتل الذباب .

٢٧٦٤٦ - ملتكترييس
Melanconis (S).
جنس فطور مجهرية من الرغيات ، راجع رفة .

٢٧٦٤٧ - ملتباب ، ألتهوب
Lance-flammes (F). Flame thrower (E).

آلة تصدر اللهب وتلقفه وهي تستعمل خاصة في مكافحة الجراد .

٢٧٦٤٨ - ملتباب
Pyrocaphalus (S).
Pyrocéphale (F).

جنس ملير من الجوارث سنيات المتناثر وفصيلة القصبويات . أزهاره المروقة نحو ٦٠ أصنافاً تمتد من الحكيك إلى البرازيل إلى اجسامها صغيرة . رؤوسها متوجسة بطوار تشرف على التفتن . ألوانها متراكبة الألوان الزاهية الجسيلة يكثر فيها الأحمر الصانق الشبيه بلهب النار || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والحوام .

٢٧٦٤٩ - ملوانك
Colorimètre (F).
Colorimeter (E).

هو مقياس اللون ، جهاز تقاس به ألوان السوائل لا سيما الحمر اذ يمتزجها نور النهار .

٢٧٦٥٢ - ملود
Meloë (S). Mélodé (F).
Oil beetles (E). Marwürmer, Ölkäfer (D).

جنس حشرات من الملويدات . أزهاره المروقة ١٢ أصنافاً المناطق المعتدلة الحارة من العالم القديم . اجسامها تطلو من ١٠ إلى ٤٠ سم . ذكورها أصفر قداماً من انثائها . أثوابها تراوح من الزرقة إلى السواد اللحي . يكثر وجودها في المراعي على الاعشاب البرية من نيسان إلى حزيران .

٢٧٦٥٣ - ملود ملون
Meloë variegatus (S).
Mélodé variable (F).

نوع من الملود ، ثوبه إلى الزرقة الخضراء المالح ، حمار رأسه وكعوله وسر يمتد إلى الحفرة السفلى الذكر طويل نحو ١٢ م . والأنثى نحو ٣ م . || يكثر وجوده في نيسان وأيار . مسرعه الاعشاب والمراعي والأزهار البرية .

٢٧٦٥٤ - ملوديات
Meloidae (S). Méloïdés (F).
Meloidae, Blister beetles (E). Blasenkäfer, Pflanzterkäfer (D).

فصيلة حشرات من مخفيات الاجنحة . اجسامها وألوانها عديدة ، جميعها ملونة صغيرة اللثة أو متوسطة ، بعضها طبي . مرتعها الأشجار والأزهار والاعشاب . تفرز ، عند لمسها ، مادة صفراء اللون كريهة الرائحة . شواربها وبهجتها اللدوي يحويان مادة نافذة تنج الجمل وتثير الاله || غروبها الاستعمارية صوبانية ، مركبة من ٩ إلى ١١ فاصلة . ارسلها خمسة التركيب باستثناء الحلقية فانها رباعية المفصل .

٢٧٦٥٥ - ملود ، مريون
Malthus (S).
Malthus, Mérion (F). Malthus (E).

جنس ملير من الجوارث سنيات المتناثر . أزهاره المروقة نحو ١٥ أصنافاً بلاد استرالية . ملجتها الحياتي جامعي . جامعاتها قليلة العدد . جميعها من الأرباب تألف الأبراج الميمرة الأشجار والبراري النطفة . قوتها الحشرات اصمها الحمنية والذئب والذئبان وبعض الثآليل البرية || اجسامها صغيرة تطلو من ١٢ إلى ١٦ سم . تتميز باستطالة أذنانها وبكثافة سبالها . ألوانها متباينة الألوان فيها الاسود والاعضر والامس والاعضر الزهري والجلوي والكتشي والاشهب والاطمل والاشمع . أثواب الاناث لا تختلف من الثواب الذكور لكنها أقل زهاء ولعة || تدفن اعشاشها في الأدغال . انثائها تحفن نحو ٦ بيضات على مرتين في الحول . الذكور تتارب الاناث في الحفن .

٢٧٦٥٦ - ملوك
Chêne égllops (F).
هو السيفيان الرومي ، اطلبه .



ملوس



ملب



ملوكة



ملود ملون



ملوك

اصلها بحيرات وانهار الهند الصينية وقد انتشرت تربيتها في الاكوادوريم نظراً لجعلها وصفر قدما لانها لا تطول اكثر من ١٠ سم. ثوبها زبرجدي اللون مجلج بالاصفر والاخر. الذكر يجمع سره الانثى تحت قبة عاتمة يصلتها من النسالة واللعاب ويحافظ عليه دون انقطاع حتى التفق والانسلخ.

٢٧٦٦٩ - ميكيل Régulus (F). Regulus (E). الملك نجر ثير من كوكبة الاسد الاصفر. يبعد عن الارض نحو ٦٥ سنة ضوئية.

٢٧٦٧٠ - ميكيككة ، جمل Abellie mère, Ab. femelle, Reine (F). Queen bee (E). الملكة او الجمل الانثى الكاملة الشوار الشقي من النسل. تتميز بجسمها الاخير المستطيل. وظيفتها منح المازن للمحافظة عل استمرار النسل والتكاثر النومي || تساهل مرة واحدة في حياتها وتموت نحو خمس سنوات تمتع بتخلها ملايين المازن.

٢٧٦٧١ - ميليتر Millimètre (F). Millimetre (E). جزء من ألف من المتر.

٢٧٦٧٢ - ميليكرين Millimicron هو جزء من اصل مليون جزء قسم اليها المليمتر الواحد.

٢٧٦٧٣ - مكلين Malléine (F). سائل يستخرج من تكثير قصيات الرغام ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيل.

٢٧٦٧٤ - مكلين Laxatif (F). Laxative, Opening (E). مسهل خفيف.

٢٧٦٧٥ - مكلينكة Málnet (F). هي البرتة، عشبة مثمرة طيبة، اطلها.

٢٧٦٧٦ - مكلولا Meliola (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الوثنيات. انواعه عديدة معظمها من فطور المناطق الاستوائية. مشيها غليظ الشكل اسمر اللون دقيق الاهداب المشلولة الاطراف يذب حل بشرة الافئاد والافئان والاورق ويشترك بمراشف ينلها في النسيج. اصنامه الخارجية مكررة الشكل تلحف ازقاتاً عديدة تحضن البويضات. يوفاته، عند الادراك، صمراء اللون اهلجية الشكل لا قياسية الانقسام الجوي المحترق.

٢٧٦٧٧ - مكلين Million المليون : ألف الف.

٢٧٦٧٨ - مكلين ميتر Mégamètre (F). Mégaméter (E).

٢٧٦٧٩ - مكلينكة ، شوككة Mimésisme (F). Mimesis, Mimicry (E). راجع شوكلة.

٢٧٦٨٠ - مكليل Identique (F). Identical (E).

٢٧٦٨١ - مُماد الماء : المروي من النبات.

٢٧٦٥٧ - ميلاكاف Filandreux (F). Fibrous, Stringy, Thready (E).

لمت تعري يعلق على ما كان كثير الالياف من الثار والنسوم وغيرها.

٢٧٦٥٨ - ميليب Maëlben (S). Málbe (F). Maëlben (E).

جنس دوبيات بحرية من الرغويات مديات الادرل وفصيلة التبيديات. انواعه الماصرة المعروفة قليلة العدد اعطائها معطر بحار البلاد الحارة || اجسامها هرياطة مستطيلة مبططة، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. رؤوسها كبيرة محزمة الشكل يملوها في ثقبها من منتصف الرأس الى طرف الجسم بعض الحليقات للنفقة || لونها الى الشبهة السمره. حليقاتها شديدة السمره. اربطها صغيرة، قليلة المرض، مستديرة الاطراف.

٢٧٦٥٩ - ميليت سف نجر المرخ.

٢٧٦٦٠ - ميليت Meleeta (S). Meleeta (F). Melet (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفصيلة الصابوقيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها صفيرة، شبه وشية الشكل، تطول من ١٠ الى ١٨ سم. رؤوسها معتلة الجرم، صغيرة الاضطام والاشداق. زعانفها الظهرية فردية تتوسط الظهر. الخرسية شديدة الصغر تقابل الظهرية. اما الذيلية فضاقة. انواعها تراوح من الريدة الفضية المواج الى الشبهة الرصاصية اشهر انواعها الثلاثة التالية :

٢٧٦٦١ - ميليت الشوسط Meleeta phalerica (S). Meleeta de la méditerranée (F).

نوع من المليت. يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط. لحمها جيد الصنف || تستعمل استهلاك البردين.

٢٧٦٦٢ - ميليت مبدولة Meleeta sprattus (S). Meleeta commune (F).

نوع من المليت. يكثر وجودها في المحيط الاطلسي. تستعمل استهلاك البردين واللبم.

٢٧٦٦٣ - ميليت سامة Meleeta venenosa (S). Meleeta vénéneuse (F).

نوع من المليت. يكثر وجودها في المحيط الهندي. لحمها ذاصف السم ميت.

٢٧٦٦٤ - مليمج الجدي الرضيع. ج. ملى.

٢٧٦٦٥ - مليكة Blongios nain (F). هي الرواق الصغير، اطلها.

٢٧٦٦٦ - ميليغرام Milligramme (F). Milligram (E). جزء من ألف من الغرام.

٢٧٦٦٧ - ميكياف Poisson-cheville (F). الميكا سمكة بحرية تدعى سفرله، اطلها.

٢٧٦٦٨ - ميكيكة Macropodus (S). Macropode, Poisson de paradis (F). Paradis fish (E).

سمكة نهريه وصيدة الجنس واثنوع من كثيرات الزمانف.



مليت



مليكة



مليولا

27714 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Manne (F). Manna (E).
مادة سكرية أو بالاحرى مزيج من السكر والمنسخت
والسكرين تفرزه بعض النباتات اما طويلاً او بواسطة
حز اللحاء او بتأثير وخر بعض الحشرات كقرمزية المن
وزيز المران وغيرها || والمن يقع على اشكال عديدة
تختلف باختلاف مصادر وطرق جمعها . اما النباتات
التي تفرز للمن فكثيرة العدد اشهرها الاثل النيلي والحوير
والشعير والبقول والمران التي .

27715 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Puceron (F).
هو الأرق ، اطلبه .

27716 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Aphis lanigera, Eriosoma lanigerum, Myzoxylus
mali, Schlonzeura lanigera, S. americana, S. crataegi
(S). Pucaron lanigère (F). Woolly aphid (E). Blute-
laus (D).
حشرة صغيرة القدة من الرقيات ، تركب التفاح من براعم
الى جلوره . تمسح ضمن نطاق من النوازل الشمعي المتراكب
الذي يشبه ندف القطن || اغماره ونسبة الماتية . يكافح
عند ظهوره باستعمال احد الحواشير الفعالة نفساً على
الاشجار ويجعلها لتسكين وصول السائل الغدا الى منش
الجلور .

27717 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Spalacidés (F). Spalacidae (E).
هي فصيلة الخلدات من رتبة القوائم .

27718 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Climat (F). Climate (E).
هو مجموعة العوامل الجوية المؤثرة المميزة . راجع اقليم .

27719 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Climatérique (F). Climatic (E).
كل ما له صلة بالمناخ .

27720 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Borne (F).
Landmark, Milestone (E).
ما يوضع لاشهار حدود المقار او الملك . وما يوضع على
الطرقات العامة للارشاد واستدلال المسافة .

27721 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Pupidae (S).
Pupides (F). Pupidae (E).
فصيلة من الرغويات مغذيات الاربيل ريفية . اجناسها
وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد المعتدلة
الحارة من السواحل الى الجبال والجرود ، ترطب في المواقع
الرطبة ولا تخشى الصقيع || اصنافها شبه اسطوانية الشوزن
متفاوتة الاحجام تبدو كالأبراج او المنارات || احراف
اجناسها واشهرها الحانة والشمسوط .

27722 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Rorqual commun (F).
هي الحركول المعروف ، اطلبه .

27723 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Pupa (S).
Pupe, Mollot (F). Pupa (E).
جنس حيوانات برية من الرغويات مغذيات الاربيل وفصيلة
المنارات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم
اصقاف البلاد المعتدلة الحارة ، ترطب في المواقع الرطبة
ولا تخرج من مكانها الا بعد اول هباية مطر || اصنافها
شبه اسطوانية الشوزن تقضي مع الاقتراب من المقب .
جميعها مجازنة وبعضها او مسج او ماس . اجناسها
خسة احصاء الخلا : د

27714 - مملكة، مَنَازَة (F).
Règne (F).
Kingdom (E).
اول قسم في تصنيف الاحياء والجماد . يقال مملكة او عالم
الحيوان ومملكة او عالم النبات ومملكة الجماد .

27715 - مملكة الجماد (F).
Règne minéral (F).
Mineral kingdom (E).
هي مملكة الكائنات الطبيعية الخارجة عن نطاق الحيوان
والنبات ، التي لا تتناسل ولا تتحرك .

27716 - مملكة الحيوان (F).
Règne animal (F).
Animal kingdom (E).
المملكة الحيوانية قسم من الكائنات الحية تتغذى بالنبات
والحيوان وتتكاثر وخص وتتحرك وتتغذى . انسابها عديدة
تتبعن بوسيدات الحية وتنتهي بالحيوان الناطق .

27717 - مملكة النبات (F).
Règne végétal (F).
Vegetable kingdom (E).
المملكة النباتية قسم من الكائنات الحية . تغلبها العامة :
تتناسل من بعضها لكنها لا تحس ولا تستطيع الانتقال
من مكان الى آخر . هي تعد ملايين الانواع جميعها اربعة
اقسام رئيسية || اولها كثرية ، اي اسفلها دجبة ،
المشريات وهي عادمة البذور والسوق والاوراق كالحفريات
والفطريات || ثانياً الطحليات وهي تشمل الطحالب
والكبديات || ثالثاً مستويات ترزهر الزوائية وهي تشمل
السرغاس والاسرخيات والخلدريات || رابعاً البوريات وهي
تشمل مريانات البور وبعثيات البور . من مريانات
البور الهروطيات والسكاسيات . ومن وعثيات البور
ريجات الفلقة وثالثيات الفلقة || الرسم النباتي تتابع
« ثمرة الانساب النباتية » يميز الاقسام وقروها ودين
درجات سلم الانزقاء النباتي من البدييات ذوات الحلية
الواحدة الى البواقيات ذوات ملايين الخلايا .

27718 - مملكة، مَنَازَة (F).
Eclat (F).
Fragment (E).
كل قبيلة نباتية يرز لها جلور تمكها من الحياة
المستقلة نيا او فصلت وزرعت رسماً .

27719 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Terre noire fertile (F).
المسنة : الارض السوداء الخصب .

27720 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Nectrioidaceae (S).
Nectrioidacées (F). Nectrioidaceae (E).
فصيلة تطور مجهرية من رتبة الزوويات . اجناسها وانواعها
عديدة لا مؤذية . تتميز ببنيتها الجملية التركيب المحصورة
في الانسجة النضلية التي تمسحها عند انتشارها . نيسا
يصرح من الاسفر الى الاحمر القرميدي . بكتيناتها
صغيرة . بوباتها شفافة ومستطيلة .

27721 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Mammée (F).
هي الجباس ، اطلبه .

27722 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Mammée d'Amérique (F).
هي جباس امريكة ، اطلبه .

27723 - مَنَازَة، مَنَازَة (F).
Glacière (F).
هو الماشيا ، اطلبه .



من قطن



منارة

27746 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Nucléole (F). Nucléolus (E).

النواة اللرية الرئيسية. وضو التنازل في الخليات.

27747 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Monine, Guenon (F).

She-monkey (E).

لفظة أنثى القرد. ومن اسمائها القردة والدحية والالفة.

27748 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Munna (S). Munna (F). Munna (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات العليا متساويات الارجل وبصيلية النوبريات. انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في البحار الشتالية || اجسامها صغيرة مبططة، مستعرضة الرؤوس، كبيرة العين الجاسطة. قوائمها متساوية الشكل والظرف باستثناء الزوج الامامي الاول التحول الى ملاحظ فكية.

27749 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Pâturage (F).

هو للمتنع، أي المرعى اللبني.

27750 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Pore de la peau (F).

Pore of skin (E).

ج منائع. والمناخ هي المناظف المظهرية الطبيعية الموجودة في بشرة الجلد عند الانسان والحويوان.

27751 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Germe (F). Hot-bed (E).

اذا وضعت توضع فيها البزور المطلوب انتاشها.

27752 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Usufruitier (F).

Usufructuary (E).

هو الذي يملك حق الانتفاع.

27753 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Falances (F).

Dues (E).

ما يزداد من المنافع على حصة صاحب الارض.

27754 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Chenopodium vulvaria (S).

Vulvaire, Anserine fétide, Arroche punctata (F). Stinking goose-foot, Dog's orache (E). Stinkender Gäusefuss (D). Chenopodium fectio, Atriplice puzzolana (I).

نبات كره الرائحة من فصيلة السرمقيات. اوراقه متعاقبة متعككة كاملة طحله اللون. ازهاره عقودية التجميع تحوي مع اوراقه بعض المواد الصمغية والناصرات القلعة ككربونات الاونييك ونترات البوتاس التي تلغص فيها الرائحة الكريهة.

27755 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Prégermée (F).

صفة البزور التي دخلت في طور التصلع او البروز قبل وضعها في التربة.

27756 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Coulard (F).

هو المرطاب، راجع.

27757 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Chelanthus (S).

Giroflée (F). Gilliflower (E).

الاسم العلمي من العربي. والحويدي جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الصليبيات. انواعها ١٢ منها الحولية والحرولة والمعمرة. سوقها عشية خشبية. اوراقها متعاقبة بسيطة سنائية. ازهارها عقودية التجميع صفراء اللون او حمراء || والمنثور اسم شامل يطلق ايضاً على اللتيلو الشبيه به.

27745 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Etapes de la lune (F).

Stage of the moon (E).

منازل القمر ثمانية وعشرون. ينزل القمر كل ليلة بواحد منها من مستطلة الى ثمانية وعشرين ليلة من الشهر. ثم يكون الحاق. فان كان الشهر تسعاً وعشرين يوماً استمر ليلة ثمان وعشرين وان كان ثلاثين استمر ليلة تسع وعشرين. والرب تقسم هذه المنازل الى قسمين وتسمى اربعة عشر منها شامية واربعة عشر بجانية. فالشامية، بترتيب قولها، تبعد بالشرطين ثم البطين والثرى والدبران والمهقة والهمنة والدراع والثيرة والظرف والجبهة والذرة والصرقة والمواد والباك || اما الجانية فلها الدفر ثم الزبانا والاكليل والقلب والثيرة والنام والبلدة وسد الاابع وسد بلع وسد السعد وسد الاشعية والفرع الاول والفرع الثاني وتنتهي ببطن الحوت المعروف ايضاً بالرشاء.

27746 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Organes reproducteurs (F).

Reproductive organs, Sire organs (E).

هي الاعضاء التناسلية في الحيوان عامة.

27747 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Immunité (F). Immunity (E).

سلامة الجسم من الامراض وقوته الفاعية. والمناعة قد تكون طبيعية او اكتسابية. راجع حصانة.

27748 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Résistance (F).

Resistance (E).

27749 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Adjudication au rabais (F).

راجع مزاد المنقصة.

27749 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Restriction (F).

Adjudication restreinte (F). Restricted allocation (E). نوع من المناقصات لا يكون باب التنافس فيها مفتوحاً لكل راضٍ بل يقتصر فيها على بعض المتنافسين عن تشجيع الادارة بعد استبعاد الآخرين.

27750 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Hélophyte (F). Helophyte (E).

نمت لمرعي يطلق على كل نبات يعيش وينمو في اوسال المستنقعات غير الماطة.

27751 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Rémiges secondaires, Favillons (F).

Wing secondaries (E). من ريش جناح الطائر ما يتبع صف القوام ويتقدم الخواطي. الواحد منكب.

27752 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Praticabilité (F).

Praticability (E).

هي التيسير في النج والعمل تهيئاً للامانة.

27753 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Manœuvres dolosives (F).

Swindling (E). اعمال خارجية مادية يخدع بها فاعلها شخصاً آخر. وهي من طرق النش والخداع التي ينص عليها القانون.

27754 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Habitat (F).

مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Habitat (F). الكورة او المكان الذي يلائم هذا النبات فيعيش فيه طويلاً او طويلاً.

27755 - مَنَازِلُ الْقَمَرِ (F). Source (F).

Spring (E). المكان الذي ينبع منه الشيء كالماء والنفط الخ...



منته

27768 - مِجْجَل
Faucille (F).
Sickle, Reaping-hook (E).
أداة يدوية تستعمل للحش .

27769 - مِجْجَل مَالِي
Faucard (F).
Long-handed scythe (E).
منجل خاص مستطيل المقبض يستعمل في حش النباتات المائية .

27770 - مِجْجَلِي
Falciforme (F).
Falcate, Falciform (E).
نمت وصفي يطلق على ما كان شكله شكل المنجل .

27771 - مِجْجَم
Gisement, Mine (F).
Lie, Layer, Mine (E).
موقع المدن في جوف الارض .

27772 - مِجْجَلَكَة
Rucher (F).
Stand or shed for bees (E).
المنحلة والمصرة والنحيتة هي مجموعة القفران أو الحلايا التي يتجمعها النحال .

27773 - مِجْجَمَة ، أَوْرُور
Courbe (F).
Graph, Graphic curve (E).
مِجْجَمَة

27774 - مِجْجَمِي الْأَصْلَاع
Curviligne (F).
Curvilinear (E).
مِجْجَمِي الْأَصْلَاع

27775 - مِجْجَمِيَات الْإِرْتِفَاع
Courbes de niveau (F). Contour lines (E).
هي خطوط الرءاء ، وأرجها .

27776 - مِجْجَبَاب
Calibreur (F). Jiggerer (E).
آلة تكتب التآر أي تفرقها وتوزعها بحسب أبعادها .

27777 - مِجْجَر
Naseau (F). Nostril (E).
مِجْجَر

27778 - مِجْجَرِيَات
Foraminifères (F).
Foraminifera (E).
رئية حيوانات دنيا من الجدریات .

27779 - مِجْجَس
Aiguillon (F). Goad, Sting (E).
حصا طويلة منسارية الطرف ينخس بها بقر الحراثة .

27780 - مِجْجَسِيَات
Porte-aiguillons (F).
هي الحويوات ، وأرجها .

27781 - مِجْجَسِيَة الْمِيفِض
Inférovariés (F).
Inferovariés (E).
لعت تعريفي توصف به ازهار النبات المنخفضة الميفض من فئة المصنعات التعاللات .

27782 - مِجْجَل ، مِجْجَل
Blutoir (F).
Bolter (E).
مِجْجَل ، مِجْجَل

27783 - مِجْجَلَاة
Vaporisateur (F).
Vaporizer, Sprayer (E).
جهاز يستعمل لنفخ السوائل وذرها كالندى .

27784 - مِجْجَلَاة
Blutoir (F).
Bolter (E).
مِجْجَلَاة

27785 - مِجْجَلَاة
Vaporisateur (F).
Vaporizer, Sprayer (E).
جهاز يستعمل لنفخ السوائل وذرها كالندى .

27786 - مِجْجَلَاة
Conocéphalus mandibularis (S). Conocéphale (F).
حشرة من الجنادب وفصيلة القبطيات . ثوبها ثنائي اللون ، اعصر الكوسل والبطن والقران ، اسمر الرأس والفرج والسيقان . جسمها صغير اللد يطول من ١٩ الى ٢٢ م . جناسها ملحقان الجسم والسررك والمرز . ساقها تطلون من ١٦ الى ٢٠ م . مرزها وسرركها مستطيلان جالسان

27768 - مَشُور أَصْفَر * ، عِجْرِي أَصْفَر
Cheiranthus cheiri (S). Giroflée commune, G. jaune, G. de muraille, Carafée, Violier jaune, Ravenelle (F). Bleedingheart, Wall-flower, Yellow gillflower (E). Goldlack, Leucoje (D). Violacciocco giallo, Bastone d'oro, Ramo d'oro (I).
نوع من المشور الأترشي . يملكه سر روية ، ومرة ، فرهاد ، تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها كاملة منقطة ، نصلها بجري اللون ، ساني الشكل ، خلي البشرة حل صفحته . ازهاره عبقريه التجميع ، تاجي الايتكاز . ازهاره عطرية العرف ، صفراء اللون || ازهاره يستمر طوال الربيع والصيف .

27769 - مَشُور يَرِّي * ، شِمَشْم ، عِجْمِغِي
Matthiola livida (S). Matthiola livida, Giroflée livide (F). Gillflower (E). Levkoje (D). Violacciocco (I).
نوع من المتيولا البرية الملبلة يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . ازهاره عبقريه ، طرفية ، منفرقة ، ولونها الى الصفرة الزيتية اللامعة يملوها تزييح ضيق اسمر || ازهاره يستمر طوال الربيع .

27770 - مَشُور شَقْوِي *
Cheiranthus incanus, Matthiola incana (S). Giroflée quarantaine, G. d'hiver, Cocardeau, Violier (F). Gillflower, Queen's stock, Stock (E). Gemeine Gartenlevkoje, Winterlevkoje (D). Viola, Flor barco, Flor bono (I).
نوع من المشور الحولي والغول وهو بالحقيقة نوع من المتيولا . سرويه وأصرامه كثيرة العدد . نباتاته تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . سوقها غشيشة فرهاد . أوراقها منقطة احليجية الشكل . نصلها بجري اللون ، الحبل المزلج ، خلي البشرة حل صفحته . ازهاره عبقريه التجميع يكثر فيها المكبس وفي صارية العرف مختلفة الالوان منها الاحمر والبشجي والوديدي والايض والاصفر والمزق والموشح . ازهاره يستمر من اذار الى تموز .

27771 - مَشُور تِشْجِي
Giroflée des jardins (F).
هو المتيولا المكسبة ، اطلها .
27772 - مِجْج : المنج : الماش الاخضر .
27773 - مِجْجَا ، مِجْجَر ، مِجْجَو ، مِجْجَا
Manglier (F). Mango tree (E).
هي شجرة الايتج ، اطلها .
27774 - مِجْجَلَاة * ، مِجْجَلَاة
Mangue (F). Mango (E).
هي ثمرة الايتج ، تقصر من ازيد ثمار البلاد الحارة ويقال لها تشط الدم وتفيد الامعاء .
27775 - مِجْجَبِي
Mangabey (F).
هو الحيدول ، من القرود البالية ، اطلها .
27776 - مِجْجَعَرَات
Orycteropidae (S).
Orycteropidae (F).
هي فصيلة الحافرات من رتبة الورد .
27777 - مِجْجَع
Piscage (F).
Pasture, Grazing (E).
هو المنتجع ، مرج طبيعي اقل حشبا من المرعى .



مشور اصفر



مشور يري



مشور شوي



منجاة



مثال



مندوسه البازلاء



مندوسه البازلاء



مندوسه العدس



مندوسه الفول



مندوسه اللوبيا

* ٢٧٧٩٧ - مَنَدُوسَة البَيْكِيَّة *

Bruchus brachialis (S). Bruche de la visco (F).
Vetch weevil (E). Zottelwickenkäfer (D).

حشرة وأشة خاضعة حابية من فصيلة المنوسيات ورتبة
معلقات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقاليم حوض
البحر الابيض المتوسط ويمتد الى داخل الشرق الاقصى
وأوروبية. تألف زبانات البَيْكِيَّة ابيًا كانت والبراري التي
تنبت فيها الانواع البرية. غلافها قميش على طلع
الازهار وبلاطها. يرقاتها تعيش على الحبوب فتنتفخها
جسمها صغير القد بطول من ٢ الى ٤ م. ثوبها الى
الرودة السمره يملؤها في كوسها بقبحة يفسدها تمام الجفنة
وبقبة اخرى صغيرة في المقدم. رأسها صغير الجرم.
عينها كبيرتان. زباناها صرطانيان. منكبها مستطيل
الشكل، مزق الطرف. ظهرها لا يلحف كامل البطن.
غدها تساميت الصرير القاطب. ظنايبها مجهزة بمناخس
حاددة لا حيل واحد في الحول. تخرج الحشرة الجملنة
من بيئات الشتوي في اواخر ايار. تساقد بعد ظهورها
بنحو اربعة اسابيع. ويضف لكن بعد متعة ينحو
نحو ايام الى البرقة عند تمام ادراكها، اي بعد التقف
ينحو ثلاثة اسابيع، تطول نحو ٧ م. ثوبها الى الخشن
الاخضر. رأسها اخضر. سكتها الشريفة بمجزة يسركين
مفقتين في طور الاكمال ينحو نحو ستة ايام ويتقفي
في الحبة حيث كانت البرقة. ثم تخرج الحشرة الجملنة من
الحبة وتتوجه الى حيث تختبئ لتفاد بيئات الشتوي.

* ٢٧٧٩٨ - مَنَدُوسَة العدس *

Bruchus lentis, *B. pallidicornis* (S). Bruche des lentilles (F). Lentil weevil (E). Linsenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات. طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السمره
تملوها زغبه بنية ويقع غبار اللين قليلة الاقسام في جيلها
الحولي واحد. تركيب الطمس فتتخر الحبة وتقيم فيها.

* ٢٧٧٩٩ - مَنَدُوسَة الفول *

Bruchus rufimanus (S). Bruche de la fève (F). Bean beetle (E). Speisebohnenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات طولها يراوح من ٤ الى ٥ م. ثوبها
اسود اللين يملوه زغب غلي اطحل اللواج في جيلها الحولي
واحد. تركيب القول فتتخر الحبة وتقيم فيها مع يرقاتها.

* ٢٧٨٠٠ - مَنَدُوسَة اللوبيا *

Acanthoscelides obsolatus (S). Bruche du haricot (F).
Common bean weevil (E). Speisebohnenkäfer (D).

حشرة من المنوسيات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م. ثوبها
الى الخشن، زغبها اطحل اللين. زباناها مشاربة الشكل.
جيلها الحولي واحد. تركيب اللوياء فتتخرها وتقيم فيها
مع يرقاتها.

* ٢٧٨٠١ - مَنَدُوسَة التفل *

Bruchidius trifolii (S). Bruche des trèfles (F).

حشرة من المنوسيات طولها ٢ م. ثوبها اسود اللين،
ظهرها غشط بالابخر. قوائمها وزباناها سود في جيلها
الحولي واحد. تركيب مع يرقاتها يلدو التفل على انواعه.

* ٢٧٨٠٢ - مَنَدُوسَة صِينِيَّة *

Callosobruchus sinensis (S). Bruche chinoise (F).
Cowpea weevil (E). Chinesischer Bohnenkäfer, Kundekäfer (D).

حشرة من المنوسيات طولها يراوح من ٢ الى ٣ م. ثوبها

المرق فسن الحافة الداخلية في وهو من الجنادب التي
تألف المراعي والاماكن المشبة. قوته المواد النباتية اخصها
الصف والاوراق.

* ٢٧٧٩٥ - مَنَدَح *

Appontement (F).

Flying-bridge (E).

مقالة بحرية تقوم على الركائز تستعمل لشد السفن،
بقلوبها، اليها منه الشحن او التفريغ. ج. منادح.

* ٢٧٧٩٦ - مَنَدُوسَة خَشِيَّة *

Menodora scabra (S).

Ménodore scabra (F).

جنبة ممره وحيدة الجلس والنرح من فصيلة الزيتونيات.
مهدا المكسك والمناطق المجاورة من الولايات المتحدة
الامريكية تزور قترين في ساقها قصيرة تملو من ٢٥
الى ٤٠ سم. فروعها مزواية اوراقها صغيرة خيشية النصل
طولها نحو ٢٠ م. وعرصها ٣ م. لونها الى الخضار الاصفر
انماها ببقية صفراء اللين طعنها نحو ٢ سم. في تنويرها
يتمتع طولها فصل الصيف.

* ٢٧٧٩٧ - مَنَدُوسَة *

Mandarinier (F).
Mandarin orange tree, *Tangerine orange tree* (E).

هي شجرة الليمون الاندي اي اليوني، اطليها.

* ٢٧٧٩٨ - مَنَدُوسَة *

Mandarin, *Tangerine* (E).

ثمرة المندرين اي اليوني او الليمون الاندي.

* ٢٧٧٩٩ - مَنَدَح *

Zygomorphe (F).

Zygomorphous (E).

لعت تعريفي يوصف به كل نبات زوائده الزهرية متشابهة
متعددة.

* ٢٧٧٩١ - مَنَدَح *

Protractile (F). *Protractor* (E).

Amaranta tricolora (F).

هو الطليقة الثلاثية الالوان، اطليها.

* ٢٧٧٩٢ - مَنَدَح *

Mendélien (F). *Mendellen* (E).

لعت تعريفي يطلق على كل قاعدة او عملية بنيفقة من
ملعب مندل الوراثي.

* ٢٧٧٩٤ - مَنَدَح *

Mendélien (F). *Mendellien* (E).

هي ملعب مندلي في الوراثة، مخلصه ان النبات يتوارث
صفات معينة دون غيرها وذلك ينسب بمحدودة منضبط لا
شذوذ فيها.

* ٢٧٧٩٥ - مَنَدُوسَة *

Monodora (F).

ثمرة تسمى حيدلان، اطليها.

* ٢٧٧٩٦ - مَنَدُوسَة البازلاء *

Bruchus pisorum (S). Bruche du pois (F). *Pas beetle* (E). *Erbsenkäfer* (D).

حشرة من المنوسيات. طولها يراوح من ٤ الى ٥ م.
ثوبها الى السمره، ظهرها مبيط بالابخر، زغبها حشوي.
جيلها الحولي واحد. تركيب البازلاء دون سواها فتتخر
الحبة وتقيم فيها ولا يوبد في الحبة الواحدة سوى حشرة
او رقة.

بحرية اللون. ازهارها خضبي الشكل ، خاسي التجميع .
ازهارها صغيرة المالحق بيضاء اللون ، صناعية الموضع ،
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم. تنويرها يستمر طوال
شهر ايار .

٢٧٨١٣ - مَنَظْرِيَّة *
Mentzelia (S).
Mentzelia (F). Mentzelia (E).

جنس نباتات عشبية برية يزهرين من فصيلة المورزيات .
منها بعض مناطق امريكا ، الشمالية . بعضها فراء تملو
من ٣٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها لاطفة ، متعاقبة ، خاسية
التفرع ، مديبة الفلق . ازهارها خشوية ، خاسية
الفصل ، خاسية او عشارية البتلات ، عديدة الاسدية ،
عطرية العرف ، عاجية اللون او صفراء ، تبتلع في الليل
ابتداء من الغروب الى انوارها المرفوعة قليلة المدد اشهرها
التالية :

٢٧٨١٤ - مَنَظْرِيَّة عَشَارِيَّة الْبَتَلَات *
Mentzelia decapetala (S). Mentzelia à 10 pétales (F).

نوع من المَظْرِيَّة . عشية محولة تملو من ٦٠ الى ١٠٠
سم. ساقها وفروعها كثيفة الاهداب القصيرة . اوراقها
تطول نحو ١٥ سم. ازهارها عاجية اللون ، كبيرة القد ،
قطرها من ١٠ الى ١٢ سم. وهي عشارية البتلات تضم
نحو ٣٠٠ سداة الى تنويرها يستمر من نموز الى ايلول .

٢٧٨١٥ - مَنَظْرِيَّة لِيْنْدَلِي *
Mentzelia Lindleyi (S). Mentzelia de Lindley (F).

نوع من المَظْرِيَّة . عشية حولية تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم.
ساقها فروعها ماسية الجاه . اوراقها تطول نحو ٧ سم.
نصالحا خالية على الصفحتين . ازهارها عوجية الصفار
الزاهي ، قطرها نحو ٨ سم. وهي خاسية البتلات ، عديدة
الاسدية نحو ١٥٠ الى تنويرها يستمر من نموز الى آب .

٢٧٨١٦ - مَنَس *
Mérisme (F). Merisme (E).

هو النسيج الانشائي في النبات .

٢٧٨١٧ - مَنَسَاب *
Compas de proportion (F).
Proportional compasses (E).

٢٧٨١٨ - مَنَسَاب * ، بُولَنُور
Bulldozer

جراة آلية ينسج بها التراب والصخور فتفتح بها جرفاً
من مكان الى مكان .

٢٧٨١٩ - مَنَسَاخ *
Pantographe (F).
Pantograph (E).

جهاز يستعمل في نقل الرسوم وتكبيرها وتضخيمها .

٢٧٨٢٠ - مَنَسَر *
Bec d'oiseau de proie (F).
Bill of the prey (E).

هو منقار كواكس الطير ، يتميز بقوته وانفتاح بصره للبرية
احادة الطرف .

٢٧٨٢١ - مَنَسَكَة *
Lame (F). Scale (E).

٢٧٨٢٢ - مَنَسَف ، مَنَسَكَة *
Winnowing-basket, W.-machine (E).

جهاز يفرغ او آلي يستعمل في نفس الحبوب . لتخليتها
من الاجرام .

اسود اللون يملو بقع بيض جلية الانزام الى جيلها
الحولي واحد . تركب مع رقاتها القدس والحصى ولقاصوليا
فتنشر الحب وتعلبه .

٢٧٨٠٣ - مَنَدُوسِيَّات *
Bruchides (S).
Bruchides (F). Bruchides (E).

فصيلة حشرات من رتبة خمليات الاجنحة . اجناسها
وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، زياة الجسم ، خطمية
اللقط . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة لكنها
غخلفة الاشكال يكثر لها اعطلي وللشراشي والمشي
والصولياني . انماها لا تلتصق كآكل الجسم . ارسافها
خاسية تتكون ، رباعية المظهر الخارجي . مكها ذري
القدر ، يضي للشكل ، اصفر اللون ، تحته الانثى على
الازهار والبار والجرب فيقتف عن رقات دقيقة غبراء
اللون تمسح على البار والجرب فتشغرها وتنسلخ فيها وتحتول
الى حوريات فحشرات كاملة .

٢٧٨٠٤ - مَنَدُول *
Maena (S). Mendole (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المنطويات . انواعها المرفوعة
اعطيا المنطوط . جميعها صغيرة القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم
تتميز زعانفها الظهرية الفردية المستطيلة وزعانفها الشربية
القاترة الى اشهر انواعها المنطولة المبدولة ، اطليها .

٢٧٨٠٥ - مَنَدُولَة مَنَدُولَة *
Maena vulgaris (S). Mendole commune, Amendoula,
Matasoudac (F).

نوع من المنطول وهي سمكة مبدولة في المنطوط . جسمها
اعطلي الشكل بطول نحو ٢٠ سم . قرونها فضي اللون ،
ظورها عايق التفتيض تملو غطوط سم .

٢٧٨٠٦ - مَنَدُولِيَّات *
Maenidae (S).
Ménides (F). Maenidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . اجناسها
وانواعها عديدة . اشهرها المنطول والقلام .

٢٧٨٠٧ - مَنَدِي *
Sennopithèque (F).

نوع من القرد المكنمة يمشي حيار ، اطليها .

٢٧٨٠٨ - مَنَدِيلِيَّة * هي قيمان المروج ، اطليها .

٢٧٨٠٩ - مَنَدُوكَة ، مَنَدُوك *
Drain (F).
Drain-pipe (E).

منذرة . ج منازح ، قناة تستعمل لتفويض التربة اي
لصرف مياهها الزائدة .

٢٧٨١٠ - مَنَدُوكَة ، مَنَدُوك *
Tendance (F).
Tendency (E).

٢٧٨١١ - مَنَدُوكَة المَلِكِيَّة *
Exproprié (F).
Expropriate (E).

هو القادر التي زمت ملكيته من يد صاحبه .

٢٧٨١٢ - مَنَدُوكَة *
Menziésia (S).
Menziésia (F). Menziésia (E).

نبات معقود التعريف على اسم العلامة الانكليزي (ارشيبلد
منزي) . جنس جنينات صغيرة معمرة من فصيلة الحنطيات
مهددا امريكة الشمالية . انواعها المرفوعة قليلة البد
سوقها فروعها تملو من ٥٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عابطة
متعاقبة . نصالحا اعطليجية مستطيلة . صفحاتها السفلى



منطولة مبدولة



منطولة



منساج

٢٧٨٢٢ - منسل ، غُدَّة منسليَّة

Gonade (F). Gonad (E).

هي الغدة التي تنتج البويضات وتفرز الهرمونات. لذلك فانخصية هي المنسل الذكري والمبيض هو المنسل الانثوي ج منسل.

٢٧٨٢١ - منسل

Narins de poisson (F).

Nostril of the fish (E).

المنسل ج مناس. هو منخر الاسماك خاصة.

٢٧٨٢٥ - منسل

Aspidium lonchitis (S).

Aspidia (F). Holly fern, Shield fern (E). Schilfarn (D). Capulvenara doppio (I).

نوع من السراخس البساجيات المصورة. ضروره مدينة منها البرية والثرينينة. يرغب في الارربة الرملية وفي المواقع الرطبة. ابروته مدادة. اوراقه منقصة، مراجه منقطة الزوايا ، زركامه حامدة للفشاء، لونه الى الخضار الاصفر. يزرع في المراكن فيجيده.

٢٧٨٢٦ - منسليَّة

Mancenillier (F).

هي الصابة ، اطبا.

٢٧٨٢٧ - منسوب

Homogène (F).

Homogenous (E).

٢٧٨٢٨ - منسوبيَّة

Relativisme (F).

Relativism (E).

المنسوبية مذهب فلسفي يقول بنسبية المعرفة حتى في الزمان والمكان.

٢٧٨٢٩ - منسوح

Lazardé (F). Cracked (F).

ما كان النسيج صلب.

٢٧٨٣٠ - منسوي

Méristématique (F).

Meristematic (E).

منطقة الكائنات الخليوي حيث التنج الانشائية.

٢٧٨٣١ - منسكة

Trucherau (F).

هي الميفاريديون المعروف ، اطليه.

٢٧٨٣٢ - منسأ

Origine, Source (F).

Origin, Spring (E).

هو مصدر الشيء او منبئه.

٢٧٨٣٣ - منسأ

Amidonnerie (F).

Starch-works (E).

هي العمل الذي يصنع فيه النشا.

٢٧٨٣٤ - منشاح

Plastotype

لعت تعريتي يطلق على كل جزء التي يتأثر بالهضم فيتنطور.

٢٧٨٣٥ - منشار

Scie (F).

سمكة بحرية من الاثلاق ، مشهورة باسم ابو منشار.

٢٧٨٣٦ - منشار

Scie (F). Saw (E).

اداة يدوية أو آلية تعمل في نشر الاعشاب والمواد والحجارة الخ.

٢٧٨٣٧ - منساري

Serriforme, Serrulé (F).

Serriform (E).

نعت تعريتي ومنى يطلق على كل ما كان تفريص حالته يشبه اسنان المنشار.

٢٧٨٣٨ - منشاريات

Pristidae (S).

Pristidae (F). Pristidae (E).

فصيلة اسماء من رتبة الاثلاق.

٢٧٨٣٩ - منشاريات

Tenthréinidae (S).

Tenthréinidae (F). Tenthréinidae, Sawflies (E).

Blattwespen, Sägewespen (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، جميعها صغيرة لثقل طولها يراوح من ٣ الى ١٥ سم. ألوانها مختلفة الألوان. قربها الاستشارية خيطية || ريقاتها دودية عديدة الابريل تحمل عادة دون الثانية أو أكثر من ١٦ وهي بأكثريةا خائفة ومنها الرائحة والكافرة.

٢٧٨٤٠ - منشاريَّة ، دُباب منشاري

Tentredo (S). Tenthrède, Mouche à scie (F).

جنس حشرات من فصيلة المنشاريات ، انواعه نحو ٢٠٠ أكثرها من الحشرات الضارة ، شذام مرزا منس كالمنشار عتق أصلب اللحاء. ريقها ناعمة لا تنف من شيء. أشهر انواعه المؤذية ما يتبع :

٢٧٨٤١ - منشاريَّة السوسن

Rhadinoceraea micans (S). Tenthrède des iris (F).

نوع من المنشارية ، لها جيلان في الحبل ، طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. ثوبها الى السواد اللامع. زباناها قصيرتان. تظهر في اوائل حزيران || ريقها اسطوانية الجسم المائل الاشهب الزيتي ، ولها مستير الشكل جوزي اللون. تركب اوراق السوسن فتلفها اشد الاذى.

٢٧٨٤٢ - منشاريَّة الكشمش

Pteronidea ribesii (S). Tenthrède du groseillier (F).

Imported currantworm (E). Gelbe Stachelbeerblattwespe (D).

نوع من المنشارية ، اجيالها الحولية ثلاثة. طولها يراوح من ٦ الى ٨ سم. ذكورها سود اللولاب انثاها صفر. ريقاتها غضر الأتواب المنسفة بنكت سود. تركب الكشمش فتلهم كامل نصل الورقة وقد لا تنف من العروق.

٢٧٨٤٣ - منشاريَّة اللث

Athalis colibri (S). Tenthrède de la rava (F).

Turnip sawfly (E). Kohlrübenblattwespe, Rübenblattwespe (D).

نوع من المنشارية ، اجيالها الحولية ثلاثة. طولها يراوح من ٧ الى ٨ سم. ثوبها الى الصفرة. رأسها والقمم الخلفي من جوشها الى السودة. ريقها سمرا. اللون غيرة المروج تحمل ١٦ زوبيا من الابريل. تركب غثف اوراق الصليبيات اخضا اللث.

٢٧٨٤٤ - منشاريَّة الورد

Arge rosae, Hylotoma rosae (S). Tenthrède du rosier (F).

Arge rosae (E). Rosenbüschthornwespe (D).

نوع من المنشارية ، لها جيلان في الحبل. طولها يراوح من ٧ الى ١٠ سم. رأسها وزباناها سود. جوشها اسود وأصفر ، بلها وأرجلها صفر. اجنتها شفافة ودوية المروج. ريقها الى الحفرة الزاوية. تركب اوراق الورد فتفقي عليها.



منسل



منشارية السوسن



منشارية الكشمش



منشارية اللث



منشارية الورد

Clivé (F). Cleavat (E).

٧٧٨٥٥ - مِنطَقَة

Phénomène (F).

٧٧٨٥٦ - مِنطَقَة

Phenomenon (E).

هو الظاهرة . ج مناشح .

Phénoménisme (F).

٧٧٨٥٧ - مِنطَقَة

المنشعية ملعب فلسفي يدعى أيضاً الظاهرة والحوالرة .
اطلب ظاهرة .

Narine d'oiseau (F).

٧٧٨٥٨ - مِنطَقَة

Nostril of the bird (E).

هو المنخر عامة ومنخر الطير خاصة وهما منشقان .

Bisectrice (F). Bisecting (E).

٧٧٨٥٩ - مِنطَقَة

Germandrée sauvage (F).

٧٧٨٦٠ - مِنطَقَة

هو الاسقوديون البري ، اطلبه .

٧٧٨٦١ - مِنطَقَة ، مِنطَقَة

Pulvérisateur (F). Pulverisator, Vaporizer (E).

آلة تستعمل لتضخ الادوية السائلة حل النبات . وللمناضج
مختلفة الاشكال والاحجام والتصاصم وقد تكون آلية أو
يدوية .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E).

٧٧٨٦٢ - مِنطَقَة

هو حجر الشبست . راجع شبست .

Coercible

٧٧٨٦٣ - مِنطَقَة

ما كان قابلاً لفصل كالخيار وغيره .

Megaderma (S).

٧٧٨٦٤ - مِنطَقَة

Mégaderme (F).
جنس حيوان من فصيلة البويريات . انواعه اربعة تتميز
بقراطيسها الطويلة اللدقة ، بزوائدها المنخرية الشارفة ،
بساتعائدها ورحابة بساطها الانشائي ويغطيها من الذنب الظاهر .
كما انها عادمة النشاي العلوية ، أما لتواجدها فففس .
اجسامها صغيرة لثة طولها يراوح من ٨ الى ١١ سم .
وبسطها من ٣٥ الى ٤٥ سم . اثنائها رادية اللون يعلوها
موجع اصفر يمتد مع اقترابه من ثوج الظهر ١١ موضعها
الرفيعة الشرقية وسرديب والهند . تألف الكهوف والمجاور
والبيوت الحرية . تعيش جهامات قليلة العدد . قوتها الحشرات
والديدانيات والصفادوخ والاسماك الصغيرة .

Polyplioide (F). Polypliot (E).

٧٧٨٦٥ - مِنطَقَة

كل خلية تتألف بمجموعة تشبه المتشابهة من عدة مناطق .

Aérostatische (F).

٧٧٨٦٦ - مِنطَقَة

Aerostatics (E).

هي علم توازن الهواء .

Gamma

٧٧٨٦٧ - مِنطَقَة

هو سلم سياق الانلام المتتابعة المتناسقة ان صادحة او
هابطة . وهو مدرج تتابع الالوان والمذاقات الخ ..

Génome, Haplome (F).

٧٧٨٦٨ - مِنطَقَة

مجموعة نطاش او نسب العامة الواحدة .

Zone

٧٧٨٦٩ - مِنطَقَة

مساحات من الارضين تخضع لنظام طبيعي واحد وموحد
جوية واحدة .

٧٧٨٦٥ - مِنشارية بَرَاقة

Caliroa limacina (S). Tenthrède limace (F).

Pear slug, Cherry slug (E). Schwarze Kirschsblatt-
wespe (D).

نوع من المنشارية ، طولها نحو ٥ سم . ثوبها الى السرة
السوداء ، اجنحتها شفافة . مرزها مستطيل الشدلم . اثنائها
اكثر حدداً من ذكورها تمتد مكها في بشرة النصل فينتفخ
من ريقاتها تشبه الزنابق ، لوها الى الخفيرة السوداء . تركيب
اوراق معظم الاجنحار للشرة قمرى النصل ويثمن عن
المرق .

٧٧٨٦٦ - مِنشارية دَمِيحَة

Tenthrède difformis (S). Tenthrède difforme (F).

نوع من المنشارية ، متوسطة القد ، غليظة الشكل . طولها
يرواح من ٦ الى ٧ سم . ثوبها الى السرة . اجيالها الحولية
ثلاثة . ريقاتها مؤذية تقضم اوراق الورديات والصيليات .

٧٧٨٦٧ - مِنشارية سَوْدَاء

Tenthrède aethiops (S). Tenthrède noire (F).

نوع من المنشارية ، صغيرة القد ، طولها يراوح من ٥ الى
٦ سم . ثوبها الى السرة السوداء . اجيالها الحولية ثلاثة .
ريقتها مؤذية تقضم غصيب النصل حل صفحتها العليا .
والبرقة تبهر صفراء اللون خضراء الملوحي ثم تتصرف رويداً
رويداً الى السرة اخضبة فالداكنة .

٧٧٨٦٨ - مِنشارية مُزَرَّة

Emphytus cinctus (S). Tenthrède à ceinture (F).

نوع من المنشارية ، متوسطة القد ، طولها نحو ٨ سم . ثوبها
الى السرة المزرة بالاسود . اجيالها الحولية تراوح من
٢ الى ٣ . ريقاتها ممره اللون تمس في الانابيب المكسية
تنتسها من مواضع القش حل اثر الانشاي والتقليم .

٧٧٨٦٩ - مِنشارية مِنطَقَة

Tenthrède zonata (S). Tenthrède zonée (F).

نوع من المنشارية ، صغيرة القد ، طولها نحو ٥ سم . ثوبها
الى السرة الفاتحة المخططة بالاسود . ريقاتها مؤذية تقضم
اوراق نباتات التفصيلة الوردية اغصنها الورد .

٧٧٨٧٠ - مِنطَاط ، مِقْيَاس الْوُكَة

Dynamomètre (F). Dynamometer (E).

جهاز تقاس به قوة الانسان والحيوان والآلات الميكانيكية .

٧٧٨٧١ - مِنطَاط كَهْرَبَائِي

Electrodynamomètre (F). Electrodynamometer (E).

جهاز يقيس حل ما يمارسه المغنطة من تأثير في التيار
الثابت والمتحرك .

Dosser (F). Dosimeter (E).

٧٧٨٧٢ - مِنطَاط

جهاز يستعمل في التفتيح او التبركيل .

Séchoir (F). Drying-sun (E).

٧٧٨٧٣ - مِنطَاط

المكان لشد لثمر ويجهت اوراق التبع في الشمس وهو
يعني ايضاً الاجهزة المختلفة التي تنشر عليها مشايك التبغ
الاخضر ريثما تجف الاوراق اغصنها المنشر الطليقة
والمجوية والتمالة .

Sclerie (F). Saw-mill (E).

٧٧٨٧٤ - مِنطَاطَة

هي معمل نشر الخشب وصناعتها .



منشارية بَرَاقة



منشارية سوداء



منشارية مَزْرَة



منشارية مِنطَقَة



منشفة يدوية



منشفة آلية



منطاب

Manguier (F).

٢٧٨٨٤ - منقاع

هي شجرة الانج ، اطلبها .

Manganese

٢٧٨٨٥ - منقاعات ، منقعات

للمنقات في اصلاح الحامض المننيكي .

٢٧٨٨٦ - منقاعيل ، منقاعيس ، منقاعيز

Manganèse (F). Manganese (E).

معدن اشهب اللون شديد الصلابة واللمعة قابل الصقل.
وزنه (Mn) وزنه الانج ٥٤,٩٣ ٪ قلته النج ٧,٢ ٪
يحلل الماء في ١٠٠ سم. يصهر في ١٢٢٥ سم. ويحلل
في ١٩٠٠ سم. وهو يوسد في الطبيعة على هيئة مركبات
كبريتية اخصها الاوكسيدات والكربونات ، ويوسد أيضاً
في معادن السجسج النباتية ولكن بمقادير ضئيلة كما يوسد في
جميع الارربة. يذلت السبب الضئيلة ٪ يستعمل ويستعمل
صناعياً في حدة تراكيب اخصها الصلب .



منقاع

٢٧٨٨٧ - منقعو هو الانج ، اطلبه .

Mangiferae (S).

٢٧٨٨٨ - منقعات

Mangiferae (F). Mangiferae (E).

سبط من البطليات ويهم من جعلها فضيلة مستقلة .

Soufflet (F). Bellows (E).

٢٧٨٨٩ - منقاع

اداة يدوية تستعمل في ذر المساحيق الزراعية .

Soufreuse (F).

٢٧٨٩٠ - منقاع كبريت

Sulphurator (E).

اداة تستعمل في ذر مساحيق الكبريت .

Callotte (F).

٢٧٨٩١ - منقعة ، فون

Rennet (E).

جزء من معدة الفترات .

Préure (F). Rennet (E).

٢٧٨٩٢ - منقعة

هي المسوة ، خيرة قابلة للذوبان ، تستخرج من منطقة الجدي
الرضيع ، تستعمل في تجبن الحليب .

Exécuteur (F). Executor (E).

٢٧٨٩٣ - منقعد

هو من قام بالتنفيذ .

٢٧٨٩٤ - منقعد الوصية

Exécuteur testamentaire (F). Executor (E).

هو الذي يمينه الوصي في الوصية ليعمل ما جاء فيها .

Dédactyles (F).

٢٧٨٩٥ - منقعات الاصابع

احد قسم الطيور الجوارح ، يشل حدة ريشات والمعدي
من القصاصات والجناس والافواخ .

٢٧٨٩٦ - منقش

نمت تعريف توصف به اللجاجة التي كلفت عن البيض .

Egrenouse, Egre noir (F).

٢٧٨٩٧ - منقش

آلة تفصل حب الذرة وبزور مختلف نباتات الكلا من
مطرها وراثيتها وسابها وسفها .

Déhiscant (F). Dehiscant (E).

٢٧٨٩٨ - منقش

نمت تعريف توصف به الاضواء النباتية التي يتغلل درزها
عند الادراك .

Bec (F). Beak, Bill (E).

٢٧٨٩٩ - منقار ، منقار

الجزء القرني الامامي البارز من رؤس الطير .

Ressort (F).

٢٧٨٩٠ - منطقة الإخصاص

Province (E).

هي المنطقة التي يشغلها اخصاص اسحق الحاكم وهي
ايضاً تبين درجة الاختصاص .

٢٧٨٩١ - منطقة الجوزاء

Baudrier d'Orion (F).

Orion's belt (E).

ثلاثة نجوم مستقيمة الصف مركزها في وسط كوكبة الجبار
أي الجوزاء . وتسمى ايضاً النطاق ويطلق الجوزاء وفقر
الجوزاء ويد الجوزاء .

Zone franche (F).

٢٧٨٩٢ - منطقة حرة

Franked zone (E).

منطقة اقليمية معينة لا تخضع لرسوم الجمركية .

٢٧٨٩٣ - منطقة عقارية

Circonscription foncière (F). Ground circumscription (E).

٢٧٨٩٤ - منقليات

Cetodes (F). Cetoda (E).

صف من الديد الرمضات .

Mniotiltidae (S).

٢٧٨٩٥ - منقليات

Mniotiltidae (F). Mniotiltidae (E).

فصيلة طير من الجوارح سيات المناظر . اجناسها وانواعها
عديدة اعطتها نعت من الهند الى امريكا الجنوبية والشيالة ٪
اجسامها صفراء قلبية الشبه بالقرنف . ارجلها ملونة
تكثر فيها الطلحة والياض ٪ ملجها الحيواني زوجي في
زمن التناقص والحضن ثم جامي ٪ قريبا الحشرات ويكثها
ويرقها وتأثير البانعة والبلور ٪ تدفن في تجاويف الانجار
من مريث الى ثلاث مرات في الحول . حفنتها اربع
بيضات .

٢٧٨٩٦ - منظام

Isotherme (F). Isotherm (E).

منظام او ايزوترم . ج منظم : خطوط الحرارة الاقليمية

او العالمية المتساوية التوزيع .

٢٧٨٩٧ - منظف

Détargent, Déservif (F).

Detergent, Deterensive (E).

٢٧٨٩٨ - منظمة

Organisation (F).

Organization (E).

٢٧٨٩٩ - منظور عظمي

Perspective linéaire (F). Linear perspective (E).

٢٧٨٩٠ - منق

Crabe (F). Crab (E).

حيوان مائي من القشريات يعرف بالسرطان .

٢٧٨٩١ - منق مصوف

Crabe à laine (F).

هو الخيول دويبة بحرية من القشريات ، اطلبه .

٢٧٨٩٢ - منقعات النهر

منقعات النهر ثلاثة انجم ثيرة متتالية من كوكبة النهر

المعروفة ايضاً بكوكبة اريداونوس . موقعها في المنقعات

الذي ظهر .

٢٧٨٩٣ - منقعات الاجنحة

راجع ملتويات الاجنحة .



منقاع كبريت

مترابكة الألوان الساطعة. قوتها الثَّأر والبذور وبعض الحشرات || أعرف أنواعها وأشهرها المنكان الطويل الذنب والمنكان الزاهب .

٢٧٩١٤ - مَنَكَّانُ رَاهِبٌ * Pipra monacus (S).
Manakin moine (F).

طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الطيَّات . فرجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربة ، يطول نحو ١٥ سم . ثوبه الملوي إلى السواد الأصمغ المالح . ثوبه السفلي إلى البياض الأصفر . يتميز بقلبه عنه التي تتنفس وتنتفش عند الطلب فتبدو كاللَّقْن وهو ما دعي إلى كنهته بالراهب . متقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف المسن . حقله صوته عالية اللين . جناحه قصير وذنبه كذلك . رصاه دقيقان ، رفيحان ، احمران || أخلاقه رضية لكنه كثير الوجيل وشديده الجلد . قوته الثَّأر البانمة وبعض الحشرات || يذنب منه في الانجهاز القليلة الانزراع . الاثنى تضع من ٣ إلى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٢٧٩١٥ - مَنَكَّانُ طَوِيلُ الذَّنْبِ * Pipra candata (S). Manakin à longue queue (F).

طائر من المنكان . موطنه بعض مناطق البرازيل . يألف الطيَّات الرطبة . فرجه لا يتجاوز ٢٠ زوجاً || جسمه صغير القد ، ربة ، يطول نحو ١٧ سم . ثوبه إلى الزرقعة البياوية . جبهته وقمة رأسه إلى الحمرة الزاهرة . حمراء وضعفه وجناحاه وذنبه إلى السواد الأصمغ اللامع . ذنبه مستطيل الشكل ، مستدير الطرف . حقله صوته إلى الحمرة القترزية . متقاده صغير الحجم ، ذلق الطرف المسن . رصاه دقيقان رفيحان ، حقلها اللين . ثوب الاثنى إلى الخضار الزرقع السوي . ثوب الصغار حق التحسير الأول لا يختلف عن ثوب الاثنى || أخلاقه هنية لكنه كثير الوجيل والجلو . قوته الثَّأر البرية والزراعية والحشرات . طيرانه قصير الشوط يكثر فيه السفيف والتصعيد والتبسيط || يذنب منه في الانجهاز القليلة الانزراع عند اطراف الاغصان . الاثنى تضع من ٣ إلى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٢٧٩١٦ - مَنَكِبُ الْجَوَّازِ Bételgeuse (F).
Beteiguse (E).

منكب الجواز نجم ثَّأر يتقارب اللين من المرتبة الأولى . مركزه حل منكب الجبار اليسى أي الشرقية . يبعد عن الأرض نحو ٣٠٠ سنة ضوئية .

٢٧٩١٧ - مَنَكِبُ الْفَرَسِ Brunfelsia hopeana, Francisca uniflora (S).

منكب الفرس نجم ثَّأر من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

٢٧٩١٨ - مَنَكِبُ ذِي الْعَيْنَانِ Manaca (F). Manaca tree (E). Manakakraut (D).

الاسم العربي كانفرنسي والانكليزي والامالي ترميز الاسم البرازيلي . شجيرة طيبة برية وتربينية من فصيلة الباذنجانيات . مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية اغصانها البرازيل || ساقها فروعاء تملو نحو اربعة امتار . اوراقها متعاقبة ،

٢٧٩١٩ - مَنَكَّة

Brunfelsia hopeana, Francisca uniflora (S).
Manaca (F). Manaca tree (E). Manakakraut (D).

الاسم العربي كانفرنسي والانكليزي والامالي ترميز الاسم البرازيلي . شجيرة طيبة برية وتربينية من فصيلة الباذنجانيات . مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية اغصانها البرازيل || ساقها فروعاء تملو نحو اربعة امتار . اوراقها متعاقبة ،

٢٧٩٠٠ - مَنَقَارُ الدَّجَاجَةِ

منقار الدجاجة نجم ثَّأر من كوكبة الدجاجة .

٢٧٩٠١ - مَنَقَارُ الْفُرَّابِ

منقار الفرب نجم من كوكبة الفرب المعروفة ايضاً بالخاباء البالي .



منقاية

٢٧٩٠٢ - مَنَقَاعِيَّاتُ Limnanthes (S).

Limnanthes (F). Limnanthaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد ، جميعها احشاش متقمية ، معظمها حولي . اوراقها مركبة مستطيلة الزناد . ازهارها فردية ، خاسية البتلات ، عشارية الاسدية . ثمارها حنينة صغيرة القد .

٢٧٩٠٣ - مَنَقَاعِيَّةُ Limnanthes (S).

Limnanthe, Cresson fleuri (F). Meadow-foam (E).
Rosenrote Sumpfbiume (D). Limnante (I).
جنس نباتات عشبية متقمية من فصيلة المنقاعيات . انواعها قليلة العدد ، جميعها برية ، سوقها طويل ٢٠ الى ٧٠ سم . معظمها ينبت على الارض . اوراقها مركبة ريشية خمرية . ازهارها كثيرة العدد منها الاصفر والابيض والوردي .



منقل

٢٧٩٠٤ - مَنَقَبُ

المنقب نجم ثَّأر من كوكبة قيطس مركزه في الرأس .

٢٧٩٠٥ - مَنَقَبَةُ Palmeria (F).

Palm-plantation (E).
هي الحائش أي بستان النخل العامر .

٢٧٩٠٦ - مَنَقَسِمٌ ، مَنَقَدُّورُ الْقِسْمَةِ Divisible

Départiteur (F).

٢٧٩٠٧ - مَنَقِيسُ تمت تعريفه يطلق على كل مادة او عنصر يسبب نقصاً في طاقة الجهد أي الطاقة الكامنة في الجسم .

٢٧٩٠٨ - مَنَقِطَعُ Discontinuu (F).

هو المنقطع أي غير المستمر او المتواصل .

٢٧٩٠٩ - مَنَقَعُ Marais, Marécage (F).

Marsh, Bog, Fen, Swamp, Morass (E).
ارض منخفضة يستنقع فيها الماء .

٢٧٩١٠ - مَنَقِيعِيٌّ Palustre (F). Paludal (E).

منقي وطراني وقذيري : تمت تعريفه يطلق على النباتات التي تعيش في المنابع .

٢٧٩١١ - مَنَقِطَلُ * ، مَنَقُوكَانُ Gonlômètre (F).

آلة لقيس ، تقاس بها زوايا الارض . Gonlometer (E).

٢٧٩١٢ - مَنَكَّاشُ Binette (F). Hoe (E).

اداة الغرز الخفيفة تستعمل باليد .



منكان راهب



منورينة

Manorins (S). * **مَنُورِينَة** ٢٧٩٣٣
Manorins (F). Manorina (E).
جنس طير من فصيلة المغرريات . أنواعه المعروفة خمسة
موطنها أستراليا وأجزاء القارية منها . ملجئها الحياتي
جاني قوتها رقيق الاثمار والثمار الياض والطيور || اجسامها
صغيرة . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . مناقبها
غروية . السنتها عظيمة منقطة . تجرس الزهر كالنمل .
اثوابها متراكبة الاألوان الزاهية || تدفن في الاذغال القليلة
الارتفاع . اناتها تقص من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بتناوبة
الذكور نحو ١٢ يوما .

Mannoes * **مَنُور** ٢٧٩٣٤
سكر غلوكوزي ، بلوري التركيب ، سريع الحلويان في
الماء ، ينتج خميرة البيرة ، ويوجد في بعض النباتات اخضها
تحت الحبوب وقشور البرتقال .

Monsul (F). * **مَنُول** ٢٧٩٣٥
هو الحفظ الجلي ، اطلبه .

Narcotique (F). * **مَنُوم** ، **مُحَدَّر** ٢٧٩٣٦
Narcotic (E).
نمت تعريف يطلق على المواد شبه قلبية الحذرة الموصوفة
في بعض النباتات ، وقد يطلق تسمية على كل نبات
يسوي هذه المادة او المواد .

Sperme (F). Sperm (E). * **مَنُوي** ٢٧٩٣٧
مادة مركبة مائنة لزجة تتوزع سيان الحويون المنوي تفرزها
خصيتا الذكر وتخزنها الحويصلات المنوية عند وجودها
ويذنها التفتيب عند الاندفاع .

Aphididae (S). * **مَنُويات** ٢٧٩٣٨
Aphididae (F). Aphididae (E).
هي فصيلة الاقيات ، اطلبها .

Sarcelle marbrée (F). * **مَنُويّة** ٢٧٩٣٩
هي الحلف الجليل ، اطلبه .

Spermatisme (F). * **مَنُويّة** ٢٧٩٤٠
Spermatism (E).
المنية ملطب الذين يمترون ان مني الذكر يحوي جميع
اجزاء الملقحة ، وان ما تقدمه الاثنى منوط بالنشوي والنوية
فقط .

Mania maura (S). * **مَنُويّة مَوْرَا** ٢٧٩٤١
Mania maura, la Maura (F). Mania maura (E).
حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة .
موطنها يمتد من الشرق الاذلى الى اوروبا وافريقية الشمالية .
فراشها جارية قوتها رقيق الاثمار . سرتها تيش على
اوراق النباتات المرورية والخرسية والهورلة || جسمها
كبير القد يطوي نحو ٢٣ مم . يسطها نحو ٦٢ مم . واسها
صغير الجسم حشلي اللون . عيناها كبيرتان . رياناها
عظيمان . جوشنها ويطها الى الحشلي الكسني المروج ||
رواشنها عند الشقن الى الحشلي الاسمر المروج تملو في
الزوج الامامي زوجة كسنية وتشيخ وتبيض ويرادح
من الجؤرة الى السمرة الكسنية . وتطوي في الزوج الخلفي
مشتحان مبرغشتان لونها الى السمرة الكسنية . حنارها



منية مورا

منقطة ، مستطيلة الزناد ، خلية العمل الانقباضي التضييع
خلية البشرة على صفحتها || ازغارها فردية ، عوربة
الارتكاز ، مستطيلة المالحاق ، صغيرة الحجم ، ليلكية
الون || ثمارها عنية ، جعالية المادة ، تيدو خضراء
وتنهي ، عند النضج ، بالبنسجي المالحق .

Hache fourrage (F). * **مَنَكَّة** ٢٧٩٤٠
Fodder-cutter (E).
آلة تستعمل في فرم ورق التوت والكلكا وما الشبه .

Décalifé (F). * **مَنَكِيس** ٢٧٩٤١
Dacalifed (E).
فقد كله .

Serfouette (F). Small hoe (E). * **مَنَكِيفَة** ٢٧٩٤٢
أداة تستعمل في حرق تربة حدائق الزهور والمباثل .

Masticable (F). * **مَنَكِيع** ٢٧٩٤٣
Fourmillière (F).
Ant-hill, Ant's nest (E).
هي قرية النمل .

Butyromètre (F). * **مَنَكِيَة** ٢٧٩٤٤
Butyrometer (E).
هو ميزان الحليب ، جهاز يستعمل لعمرة مقدار السن
في الحليب .

Méthode (F). * **مَنَيج** ، **مَنَيج** ٢٧٩٤٥
Method (E).
هو الاسلوب المتبع ، راجع طريقة .

Allergique (F). Allergic (E). * **مَنَهْدَف** ٢٧٩٤٦
المنهدف من كان جهازه العضوي عرضة لانهداف .

Ebauche (F). Rough Shape (E). * **مَنَهَر** ٢٧٩٤٧
الرسم الابحازي للشي وبداية تكوين الشيء . ج مناهر .

Shénique (F). Schenic (E). * **مَنَهْش** ٢٧٩٤٨
نمت تعريف يطلق على كل مادة من عقاقير وغيرها تقشط
فاعلية الاعضاء .

Menhir (F). Menhir (E). * **مَنَهْش** ٢٧٩٤٩
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). * **مَنَهْش** ٢٧٩٥٠
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). * **مَنَهْش** ٢٧٩٥١
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). * **مَنَهْش** ٢٧٩٥٢
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). * **مَنَهْش** ٢٧٩٥٣
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). * **مَنَهْش** ٢٧٩٥٤
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). * **مَنَهْش** ٢٧٩٥٥
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

Menhir (F). Menhir (E). * **مَنَهْش** ٢٧٩٥٦
المنهر حجر فخم مستطيل منتصب يمد الى عصور
ما قبل التاريخ . يقال انه كان يرمز الى الفلوس المعبد
كسائر الاصنام . ويقال انه كان بمثابة تمثال || المناهر
كثيرة العدد ، متفارة الحجم والطول ، اطولها يبلغ
نحو ٢١ متراً ويزن نحو ٣٤٧٥٠٠ كيلوغرام .

بعد التقع والغلي في الماء ، لاثبات غنية بالعناصر المرة السامة ، ليروب نشوي غذائي شائع الاستعمال يدهى تيبوكاو أو قساوا . ولبوبها هذا يحوي ما قدره نحو :

٣,٦٨ ٪ من المواد الازوتية

١,٩٨ ٪ من المواد الدهنية

٩١,٤٤ ٪ من المواد النشوية

وهو كالمشيت المحلو يرغب في الارربة الخفيفة البديلة الغنية المروية ، يتكاثر بالقلع .

Tannerie (F).

٢٧٩٤٩ - مَنِيَّتْ

هي المدهنة ، اطلبها .

٢٧٩٥٠ - مَهَّاب * ، مَهَّاب

Addax nasomaculata (S). Addax, Antelope de Nubie, A. de Mendès (F). Addax (E).

الجمع مهورات . والمهابة بقرة وحشية قوية جامدة رقيقة الحاروك وصيدة الجنس والنوع . نوبها الى البياس الاغبر . رأسها حاقق اللون مستطيل الشكل يحمل قرنين كبيرين لولبيين ، رايوح طويلا من ٥٠ الى ٧٠ سم . صياها كبرتان مكحلتان . عنقها اخضر من فوق الظلياء . طول جثتها نحو ٢١٠ سم . وارتفاعها ٩٠ سم . انثاها رباعية الاعلاوت || تدش اودات متوسطة العمد ، موطنها الصحاري والغنيابي فيوجد في الجزيرة وصورة والنوبة وليبيا وتونس وجزائر ومراكش .

Antelope saiga (F). مَهَّاب سِيكَا

نوع من الظباء يدعى سِيكَا ، اطلبها .

Atomiseur (F). مَهْبَّاب * ، مِهْبَّاب

Atomizer, Spray (E). آلة خاصة بالمساحيق والسوائل تذرهما كالنفاث .

Cathode (F). مَهْبَّاب

Remise (F). مَهْبَّاب الطير

Lighting-place (E). المكان الذي يأوى اليه الطير عند الجفوم أو الاستراحة .

Vagin (F). Vagina (E). مَهْبِل

من اعضاء التناسل في الحيوان وهو القناة التي تصل الشفر بمقت الرسم .

Vaginal مَهْبِلِي

Potomètre (F) Potometer (E). مَهْبَّان

المهتان جهاز يستعمل في قياس ما يمتصه النبات من ماء .

Turbellariés (F). مَهْبَّرَات

Turbellaria (E). صف من البود المريف .

Tératologie (F). مَهْبَّجَة

Teratology (E). علم غرائب الخلقة والتعاجيب .

Tératologique (F). مَهْبَّجِي

Teratologic (E).

Habitat (F). مَهْد

هي البلاد التي يعيش فيها الحيوان الممن منذ الاعتماد اليه .

الخارجي بلذباب الاطراف || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنمو خمسة اسابيع وتحت الممكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٤٥ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل المقدم والمؤخر . نوبها الى الخضار اللانس تعلو خطوط جانبية متعرجة يهضام اللون ونط تجبي اسيد طاب . مدنها ورواجها الى السرة || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنفخ السرعة متلفسة بجلباب من العين .

Mannite (F). مَنِيَّتْ

مادة سكرية قابلة للتبلور لتستخرج من بعض النباتات والفطور .

Magnésio (F). مَنِيَّار

هي المنيَّار اي اكسيد المغنيزيوم .

Résistant (F). Unyielding (E). مَنِيَّع

Spermine (F). Spermin (E). مَنِين

شبه قلوي غير سام يكثر في الحني ويوجد في البصل .

Manihot (S). مَنِيَّهَوْت

Manihot, Manioc, Magnoc (F). Mandioc plant, Cassava plant (E). Bitter Manioka, Kassava-wurzel (D). Manioc, Mandiocca, Jatropha officinale (J). من نباتات معمرة من فصيلة التريينيات . انواعها نحو ٤٠ جميعها جنبية منها البيرة والزرعية الغذائية . اصلاتها البلاد الاستوائية . سوقها تملو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، اذنية ، كفية التنصل ، خاسية او سباعية المنصوص . ازهارها فستقية اللون ، صغيرة القند ، عشوية التجميع ، محورية وطرفية الارتكاز . ثمارها جراد ثلاثية الاضعية تنقل من ٦ صرايح || تُزْرَع من اجل جلورها المستقرية الغليظة المسطلة التي يستخرج منها لبوب نشوي غذائي يدعى تيبوكاو || اشهر انواعه الزراعية صالح .

٢٧٩٤٧ - مَنِيَّهَوْت حَلْو

Manihot dulcis, M. alpi, M. palmata (S). Manioc doux, Camagnot, Cassave (F).

نوع من المنهوت الزراعي ، ضروب كثيرة العمد . جلوره قليلة المواد المرة السامة . سوقه منتصبة عادمة التضلع ، اوراقه مستطيلة الاذنيات والامناق الخضراء ، معترضة المنصوص . جرادوا عادمة الجناح . جلوره نشوية غذائية تحوي ما قدره نحو :

٣,٢٥ ٪ من المواد الازوتية

١,٥٦ ٪ من المواد الدهنية

٨٨,١٢ ٪ من المواد النشوية

يرغب في الارربة الخفيفة المروية ويتكاثر بالتعقل .

٢٧٩٤٨ - مَنِيَّهَوْت مَر

Manihot utilisima (S). Manioc amer, Cassave amère (F).

نوع من المنهوت الزراعي ، ضروب كثيرة العمد . جنباته كبيرة القند تملو من ٣ الى ٤ امتار . سوقها مضلمة . اوراقها مضغصة قصيرة الاعناق الجلوية اللون ، اذنياتها جعدة . قصور نصلها مستطيلة ضيقة . جرادوا مجنحة || حقاقلها غليظة كبيرة تستعمل في صناعة الكحول ويستخرج منها



منهوت حلو



منهوت مر



مهابة

ازهارها تقوية مغلفة الكأس تيلو كالثالب المدبسة الاطراف .

٢٧٩٧٦ - مَهْمَزِيَّة *

Dicentra, Dielytra, Bicuella (S). Diélytra, Diélytra, Dicentra, Bicuclée (F). Seal flower, Bleeding heart, Locket flower (E). Flammendes, Fliegendes Harz, Tränendoppelsporn (D). Dielytra (I).

جس نباتات معمرة من فصيلة الحشائشيات . ازهارها المعروفة ١٢ معلما بري وبضها طلي ينسل في حلاجات السلس وبضها تريسي . اوراقها متعاقبة ، مستطلة ، مفروضة . ازهارها جميلة الشكل مَهْمَزِيَّة ٥ أشهر انواعها واعرفها سالي .

Dicentra eximilis (S). مَهْمَزِيَّة اُنَيْكَة ٢٧٩٧٧ Diélytra d'élite, D. distingué (F).

بجلة تريبيتية مثبوتة معمرة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها بحرية اللون . عناقيدها الزهرية هوية الشكل منتصبه . ازهارها حراء اللون قصيرة المهايزن ٥ ازهارها يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف .

٢٧٩٧٨ - مَهْمَزِيَّة جَمِيلَة

Dicentra formosa (S). Diélytra gracloux, D. à belles fleurs (F).

بجلة معمرة طيبة مثبوتة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها جميلة الخضار الزاهي . نصليها قدري للتشريح . عناقيدها الزهرية مخروطية الشكل . ازهارها وردية اللون ، قصيرة المهايزن ٥ جلودها غنية بمادة الكورديالين الشائعة الاستعمال الطبي ٥ ازهارها يستمر من ايار الى اواسط الخريف .

٢٧٩٧٩ - مَهْمَزِيَّة ذَهَبِيَّة

Dicentra chrysantha (S). Diélytra jaune d'or (F).

بجلة تريبيتية معمرة تملو من ٦٥ الى ١٠٠ سم . ساقها فراء موقرة . اوراقها كثيفة التجميع شبيطية التشريح . عناقيدها الزهرية منتصبه . ازهارها صغيرة القند والمهايزن ، ذهبية اللون ٥ ازهارها يستمر طولا فصل الخريف .

٢٧٩٨٠ - مَهْمَزِيَّة رَاحِيَة

Dicentra spectabilis (S). Diélytra remarquable, Cœur de Maria, Cœur de Jeannette (F).

بجلة تريبيتية معمرة تملو من ٦٥ الى ٩٠ سم . ساقها فراء موقرة . عناقيدها الزهرية كبيرة القند متدلية . ازهارها قلبية الشكل ، مستطيلة المهايزن ، قرمزية اللون ٥ ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٧٩٨١ - مَهْمَزِيَّة عَاشِرَة

Dicentra torulosa (S). Diélytra grimant (F).

جنية تريبيتية عاشرة تملو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها وفروها نحيلة . حوائقها بسيطة . اوراقها تدية التشريح . عناقيدها الزهرية كبيرة القند متدلية . ازهارها قرنية الشكل ، صفراء اللون ، حلقة ٥ ازهارها يستمر طولا فصل الخريف .

Aristoloch (F). مَهْمَتُون ٢٧٩٨٢ هو الزراوند ، من النباتات الطبية ، اعطيه .

Subdésertique (F). مَهْمِي * ٢٧٩٨٣ Subdesertic (E). هو البلقعي ، نمت تمرني وسمي للاقليم شبه صحراوي .

Aplanir (F). مَهْد ٢٧٩٦٢ To level, To smooth (E).

اصحح ويسط اللشز من الارض او ما انخفض منها في سهولة واستواء . ويقال مهد الارض وقدن القرية .

Vent précurseur de pluie (F). مَهْدَاج ٢٧٩٦٣ الريح الخفيف تستبق المطر .

Cénoïde (F). Ctenoid (E). مَهْدَب ٢٧٩٦٤ نعت تمرني يطلق على الحراشف الابرية او المسنة الحمار الطليق . راجع مبراش .

Poulain (F). مَهْر، فُلُو، فِلُو ٢٧٩٦٥ Fosl, Yearling (E). ولد الفرس قبل بروز ثنيته الثابتين . ج مهاز وامهاز ومهارة وفلاء واللاء .

Iris orateur (F). مَهْر اَجْنَة ٢٧٩٦٦ حشرة من السرعويات تدمي قسطية ، اعطياها .

Poulche (F). مَهْرَة ، فُلُوَة ، فِلُوَة ٢٧٩٦٧ Filly (E). هي انثى اللبل والمهر .

Foutoir (F). مَهْرَس العُتَب * ٢٧٩٦٨ Beater (E). مهريس العنب او الماصرة ، آلة يسحق فيها العنب لاستخراج عصارتها .

Hachoir (F). مَهْرَمَة ٢٧٩٦٩ هي الخفخة ، اعطياها .

Méhari (F). Méiri (E). مَهْرِي ٢٧٩٧٠ سلالة من الابل الركائب السريعة منسوبة الى مهران صيدان . يقال ابل مهيرية .

Trayeuse mécanique (F). مَهْمَشَرَة ٢٧٩٧١ Milking machine (E). هي الماهرة ، جهاز آلي يستخرج الحليب من الفصح .

Arracheuse (F). مَهْمَلَس ٢٧٩٧٢ Drawer, Spud (E).

Todiramphus (S). Todirampha * مَهْمَلَس ٢٧٩٧٣ جنس طير من المازوريات . انواحه قليلة المده . موطنه البلاد الاسيوية ، يألف مجاري الماء والشلوط والنباتات اجسام هذه الطيور متوسطة القند تملو نحو ٢٧ سم . انواها مزركبة الالوان لها الابيض والاحمر والازرق والجلوي والاسمر والاسود ٥ قوتها الاسماك الصغيرة والحشرات . انها تبقي من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين . (راجع مازوريات) .

Dauphinelle des jardins (F). مَهْمَل ٢٧٩٧٤ نبات تريبي يعرف بمائق الحدائق ، اعطيه .

Dicranaceae (S). مَهْمَلَزِيَّات ٢٧٩٧٥ Dicranacées (F). Dicranaceae (E). سهل من فصيلة الحليبيات ، اجناسه وانواعه نحو ١٠٠ منها النباتات الظليلة . جلودها نحيلة قليلة العدد والانتداد . ساقها مستطلة . اوراقها شبيطية كثيفة تكسو كامل الساق .



مهرس العنب



مهلبل



مهزاية

٢٧٩٩٩ - مَوَادٌ زَيْتِيَّةٌ (F).
Matières huileuses (F).
Oily material (E).
توجد في المادّن كالنظف مثلاً .

٢٨٠٠٠ - مَوَادٌ شَحْنِيَّةٌ (F).
Greasy material (E).
توجد في الحيوان .

٢٨٠٠١ - مَوَادٌ عَازِلَةٌ (F).
Wrapping material (E).

٢٨٠٠٢ - مَوَادٌ عَصْرِيَّةٌ (F).
Organic material (E).
هي المواد البسيطة الممتزجة التي ترتكب منها نسيج الحيوان والنبات .

٢٨٠٠٣ - مَوَادٌ غِذَايَّةٌ (F).
Alimentary material (E).
هي جميع المواد الصالحة لغذاء الحيوان . وقد وضعنا في ذلك جدولاً أعطاناه من «كلتر» نذكر فيه تركيب الإغلاف الوسطى وعلاؤها من المواد الخام والمنهضعة مع بعضها الغذائية بالنسبة إلى النشا . اطبل علف .

٢٨٠٠٤ - مَوَادٌ مَصْصَةٌ (F).
Substances hygroscopiques (F).
Hygroscopic substances (E).
هي المواد التي تمتص الرطوبة كالنترات الذي يمتص رطوبة الهواء ولديها الذي يمتص رطوبة التربة .

٢٨٠٠٥ - مَوَادٌ مُدْخَرَةٌ ، مَوَادٌ اِحْتِيَاطِيَّةٌ (F).
Matières de réserve (F).
Reservation material (E).
مواد غذائية يَحْتَرِها النبات كالادعاه في النباتات الزيتية ، والسكر في التوتير واللسان ، والنشا في البطاطا .

٢٨٠٠٦ - مَوَادٌ مَعْدِنِيَّةٌ (F).
Mineral material (E).
هي الاجسام غير المتفتضة كالآزوت والاكسجين والفوسفور والكلس والحديد والبرنات والصوديوم الخ .

٢٨٠٠٧ - مَوَادٌ مُغْدِيَّةٌ (F).
Nutritive material (E).
هي جميع المواد الصالحة لتغذية النبات .

٢٨٠٠٨ - مَوَادٌ لَشْوِيَّةٌ (F).
Amylaceous material (E).
اصول مركبة ، اسامها النشا ، توجد في اعضاء بعض النباتات .

٢٨٠٠٩ - مَوَادٌ هَيْدُرُوكَرْبُونِيَّةٌ ، هَيْدِرَاتٌ (F).
Matières hydrocarbonées .
الكربون
Substances hydrocarbonées , Hydrates de carbone (F).
Hydrocarbons material (E).
مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين منها الخلاصات اللازوتية كالنشا والسكر والصمغ ... ومنها المواد المعدنية ومنها الخليلوص اي السليلوز .

٢٨٠١٠ - مَوَازٍ (F).
Tropometre (E).
المواز ميقت شديد الاقنات واللغة يستعمل في تحديد دائرة الطول في البحر .

٢٨٠١١ - مَوَازٍ ، مُتَوَازٍ (F).
Parallèle (F).
Parallel (E).

٢٧٩٨٤ - مَهْرٌ ، تَارَهَنْدِي ، تَارَهَنْدَكْ (S).
Mésuz, Bois de fer (F).
Iron wood, Indian rose chestnut (E).
Eisenbaum, Kastanien Rose (D).
Albero della ferro (I).

الواحدة مهرة . جلس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الكلوذيات ، مهدا الهند . اوراقها كاملة متقابلة متفتة مستطيلة النصل . ازهارها نورية التجميع او فردية . ابطية الارتكاز او تاجية وفي ذكوة العرف المستحب . ثمارها جراء تطفل زرة ، كبيرة القدة تشبه الكستناء طيبة الرائحة ، مأكولة اللباب ، لغشها شديدة الصلابة مرغوب فيها .

٢٧٩٨٥ - مَهْوَيٌّ (F).
Périgée (F).
Parigee (E).
اقلب على لسيارة من الارض .

٢٧٩٨٦ - مَهْيَاتٌ (F).
Multiforme (F).
Multiform (E).
كثير الهيئات والاشكال .

٢٧٩٨٧ - مَهْيَكَةٌ ، كَنْدُرِيُومٌ (F).
Chondrioma (F).

٢٧٩٨٨ - مَهْيَدَةٌ ، مَهْيَدَةٌ (F).
Plonnière (F).
Pioneer (E).

هو النبات الطري الذي يكتسح التربة الحديثة الاستصلاح وهو أيضاً كل نبات يزر او غرس لهية الظروف المناسبة لنبات لاسق .

٢٧٩٨٩ - مَهْيَقٌ ، مَهْيَقٌ (F).
هو مسلح الطير . ج مهايص .

٢٧٩٩٠ - مَهْيَكٌ (F).
هو الفحل الذي اذا ضرب لم يلقح .

٢٧٩٩١ - مَهْيِمٌ (F).
Asoifé (F).
Thirsting (E).
نمت ترميز يوصف به من كان شديد العطش .

٢٧٩٩٢ - مَوْ (F).
Aneth sauvage (F).
هو الثيث البري ، اطلبه .

٢٧٩٩٣ - مَوَاءٌ (F).
Mialement (F).
Mewing (E).
صوت الهر .

٢٧٩٩٤ - مَوَادٌ اَحْيَاءٌ ، مَوَادٌ اَلْبُيُوتِيَّةٌ (F).
Albuminoides, Substances protéiques (F).
Albuminoid, Proteinic substances (E).
مواد تركيبها يتوابعها كتركيب بروتينوا من بياض البضة .

٢٧٩٩٥ - مَوَادٌ اِسْتِخْرَاجِيَّةٌ ، مَوَادٌ اِسْتِخْلَاصِيَّةٌ (F).
Matières extractives (F).
Extractive material (E).

هي ما يمكن ان يبقى من مواد بعد تبخير سائلها .

٢٧٩٩٦ - مَوَادٌ ثَلَاثِيَّةٌ (F).
Substances ternaires (F).
Ternary substances (E).
مواد غذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الاكسجين والهيدروجين والكربون .

٢٧٩٩٧ - مَوَادٌ دُهْنِيَّةٌ (F).
Matières sébécées (F).
Sebaceous material (E).

٢٧٩٩٨ - مَوَادٌ رُبَاعِيَّةٌ (F).
Matières quaternaires (F).
Quaternary material (E).
مواد عضوية مركبة من اربعة عناصر وهي الكربون والهيدروجين والاكسجين والازوت كالأحج مثلاً .

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28021 - مَوَالِيقَة (F). Approbation, Entérinement (F).

28021 - مَوَالِيقَة (F). Musophaga (E).

28022 - مَوَاقٍ * Grallaria (S).

28022 - مَوَاقٍ * Grallaria (S).

جنس طير من الجواثم سيات النائير فصيلة الجالليات. أنواع المروعة نحو ٣٠ جميعها من طيور أمريكا الجنوبية. تألف الرياش والغابات الرطبة. ملجئها الحيائي جماعي. جماعاتها قليلة العدد. قوتها الحشرات وأصغرها النمل السيار الذي تكثر قوافله الجمرارة في معظم تلك الأصقاع. أجسامها صغيرة تغلظ من ١٢ إلى ١٨ سم. أظفارها مختلفة الألوان تكثر فيها الشقعة والشيبة. تحورها وصغورها وبلوطها صفراء اللون أو براء تملحها رقة سراد أو بيضاء وتنتج حنلي. رؤوسها ونائيرها وأجنحتها معتدلة الأحجام. أذناها قصيرة مخروطية الشكل. قوائمها رفيعة تمكّنها من العدو بسرعة. تدثّن أعشاشها في الأدغال. حل ارتفاع قليل لا يتجاوز ثلاثة أمتار. الإناث تحضن بمناورة الذكور من ٤ إلى ٦ بيضات على مرتين في الحبل.

جنس طير من فصيلة الموزيات. أعضائه البلاد الأفريقية انحصاراً أفريقية الثنائية. أنوعه المروعة قليلة العدد تتميز باستطالة الجسم وبكبر الذنب الأليلجي الشكل. منائيدها مخروطية، قوية، مسننة الطفاف، صفراء اللون. جهاها ملحوفة بصميفة قرنية المادة، صفراء، تبدو كأنها امتداد المخداف نحو الرأس. طيراتها خفيف الحركة سريع. تدثّن في تجاويف الأشجار القديمة العهد. أعرف أنواعه وأشهرها الموز البينجسي.

28013 - مَوَازٍ بَشَقَسَجِيَّة * Musophaga violacea (S).

28013 - مَوَازٍ بَشَقَسَجِيَّة * Musophaga violacea (S).

28023 - مَوَازِيَر Métayer (F).

28023 - مَوَازِيَر Métayer (F).

28024 - مَوَازِيَرَة Métayer, Colonage (F).

28024 - مَوَازِيَرَة Métayer, Colonage (F).

28025 - مَوَالِيسَة Connivence (F).

28025 - مَوَالِيسَة Connivence (F).

28026 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28026 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28027 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28027 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28028 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28028 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28029 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28029 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28030 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28030 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28031 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28031 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28032 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28032 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28033 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28033 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28034 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28034 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28035 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28035 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28036 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28036 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28037 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28037 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28038 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28038 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28039 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28039 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28040 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28040 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28041 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28041 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28042 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28042 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28043 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28043 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28044 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28044 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28045 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28045 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28046 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28046 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28047 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28047 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28048 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28048 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28049 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28049 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28050 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28050 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28051 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28051 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28052 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28052 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28053 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28053 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28054 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28054 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28055 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28055 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28056 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28056 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28057 - مَوَالِيسَة Connivence (E).

28057 - مَوَالِيسَة Connivence (E).



مَوَازٍ



مَوَالِيسَة



مَوَازٍ



مَوَيْل

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

28012 - مَوَازٍ * Musophaga (S).

مزقية. اوراقها مفصصة، نصلها رمل النسيج، خمل البشرة، مسن الحافة. ازهارها حمراء اللون متدلية مستطيلة. ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢٨٠٤٧ - موريتية متوركة

Maurandia semperflorens (S). *Maurandie toujours fleurie* (F).

جنية تريبتية عارشة تطول نحو ثلاثة امتار. فروجها واصفرها عديدة. اوراقها قليلة مزوانية، نصلها ملس البشرة متعرج الصفحة. ازهارها كبيرة القذ تطورها براوح من ٣ الى ٥ سم. لونها مختلف باختلاف فروجها، اشبعها الابيض والقرط والبفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى تشرين.

٢٨٠٤٨ - موريتية مكسكية

Maurandia grandiflora (S). *Maurandie كبيرة الزهر* (F). *Maurandie du Mexique* (F).

جنية تريبتية عارشة تطول من ٣ الى ٤ امتار. جلورها وساقها ليفية. اوراقها شبه قليلة. نصلها ملس الصفحة. ازهارها كبيرة القذ تطورها نحو ٥ سم. لونها الى الازرقواني يعطو مزاج بنفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

٢٨٠٤٩ - موريسية

Mauritia (S). *Mauricia, Mauricie, Palmier bâche* (F). *Mauritia, Moriche palm, Carana palm* (E). *Mauritia-Palme, Moritz-Palme* (D). *Palma mirici, Palma ita* (I).

جنس اشجار نخلية، اعطائها المناطق الاستوائية الامريكية. انواعها ثمانية، جلونها متعرجة مستقيمة تملو من سبة الى ثمانية امتار. يستخرج من بعض انواعها لبوب نشوية غذائية ومن البعض الآخر عصارة مكوية قابلة للتخثير تستعمل في صناعة الخمر والكحول.

٢٨٠٥٠ - موريكالدييه

Moricandie (F). نبات يدهى الخمر، اطبخه.

٢٨٠٥١ - مورين

Morine (F). اطلب مرينه، نبات تريبت في الابداسيات.

٢٨٠٥٢ - موريتيه، عقاب البحر

Myliobatis (S). *Myliobate, Mourine, Aigle de mer* (F).

جنس اسماك مذنية بحرية من فصيلة الشفنيات. انواعها المعروفة ٧ جميعها كبيرة القذ مبطلة مستعرجة تشبه العقاب الباسلة جناحها. اذناها مستطيلة كالسياط تحمها عند قواحتها مناس مستعرجة سادة. قوتها الاسماك. تألف المياه الاقليمية الضيقة للدور || اشهر انواعها وارفعها ما يلي.

٢٨٠٥٣ - موريتيه جودرية، عقاب البحر

Myliobatis bovina (S). *المغير* (F). *Myliobate vachette, Mourine vachette* (F).

نوع من الموريتيه متوسطة القذ والتبطيط، ثوبها اخضر اللون اشهل المواجه. اعطائها البحر المتوسط والاسود والاحمر. وهي اقل مسلوقة من الجفاعة.

طورها البرقي. ذكروها بمنحة. اناثها عادمة الجناح مجهزة بحصى ذرية شياية الاطوال || اشهر اجناسها الموتيل.

٢٨٠٣٢ - موتة

Prostate جسم فدي التركيب يلف عند الذكور فيج الثلاثة ويژه من الحالب.

٢٨٠٣٣ - موتلوج

Tissu lâche (F). *Loose tissu* (E).

٢٨٠٣٤ - مؤجر

Bailleur (F). *Lessor* (E).

٢٨٠٣٥ - مؤجل

Différé (F). *Deferred* (E).

٢٨٠٣٦ - مؤجن

Urnière (F). نمت ترمي يطلق، في علم النبات، حل الطحالب المزهرة باجنيات اي اجرية لحفظ البويضات.

٢٨٠٣٧ - مؤجور

Cuniculé (F). *Cuniculiste* (E).

الموجور ما حوى حفرة مستطيلة بعيدة الفور.

٢٨٠٣٨ - مؤخر الجوف

Post-abdomen (F). *Postabdomen* (E).

مؤخر الجوف عند الحشرات هو الخس حلقات الأخيرة من بطن الحشرة اي جوفها || وهو زوولوجياً ذنب القشريات ومؤخر جسم التريلوبيت.

٢٨٠٣٩ - مؤدكة

طورية صغيرة قصيرة المتى نحو القيرة (السان).

٢٨٠٤٠ - مؤرة

Mora (F). مكة بحرية تدعى جسة المتوسط، اطبخها.

٢٨٠٤١ - مؤرت

De cujus هو الذي مات من مال يورث من يمه.

٢٨٠٤٢ - مؤردكة

Roseraie (F). *Rosery, Rose garden* (E).

حديقة الورد وزراعتها الاستارية.

٢٨٠٤٣ - مؤرق

Frondifère (F). *Frondiferous* (E).

المروق ماكان يحمل ورقاً.

٢٨٠٤٤ - مؤرنية

Lapinière (F). *Hutch* (E).

هي الهرة، اطبخها.

٢٨٠٤٥ - موريتية

Maurandia (S). *Maurandie* (F).

جنس نباتات عارشة مصرية من فصيلة الخنازريات. انواعها المعروفة ١٢. سيقانها متسلقة. اوراقها قليلة النصل. ازهارها كبيرة القذ بحورية الارنكاز. ترميها انبوي الشكل، خاسي الفصوص الاششوية || اشهر انواعها ما يلي.

٢٨٠٤٦ - موريتية حمراء

Maurandia erubescans (S). *Maurandie rougeâtre* (F).

جنية تريبتية عارشة تطول نحو ٤ امتار. ساقها وفروجها



موريتية



موريسية

كباسة عجنمة متدلية. ثمارها صغيرة ناشفة لا تكلل ، يزودها كروية كاملة صالحة لتفككتار || وهو يزرع من أجل لباب ساقه الذي يستعمل استعمال البتق . زراعتة تقوم ٤ سنوات تنتهي بكبح الساق لاستفراخ لبابها وقد يجري ذلك قبل تبشير الانزراع بتسو ٥ أسابيع .

٢٨٠٥٩ - موز السعد *Musa religiosa* (S).

Bananier fétiche (F). نوع من الموز البري الافريقي، مهدده المناطق الاستوائية. ارويته مقلد . ساقه تملو ١٠ امتار . اوراقها كبيرة القند متدلية الاطراف ، نصلها جامد الصفحة المائلة ، يجري الخضار . كباسة كبيرة القند ، نارية القنابات ، ارجوانية الطرطب . ثماره دقيقة ، مستطيلة ، ناشفة لا تكلل .

٢٨٠٦٠ - موز الصين *Musa sinensis* (S).

Bananier de Chine (F). ويصلى موز الهند ، ثماره مأكولة . زراعتة المشهورة خمسة . ارويته مقلد . ساقه تملو من ٤ الى ٨ امتار . اوراقه اعليجية الشكل ، متوسطة القند ، منفردة الانتساب . نصلها فارش الصفحة المنبسطة المائدة الالتواء ، لونه الالفخار الباهت . كباسة متدلية عديدة الاشطاط . ثماره ضخمة قصيرة مأكولة متوسطة الصنف .

٢٨٠٦١ - موز اليابان *Musa japonica*, *M. Basjoo* (S). **Bananier japonais** (F).

نوع من الموز الزراعي المأكول البار . مهدده اليابان وقد انتشرت زراعتة في معظم المناطق الحارة نظرا لقلة متطلباته المناخية وضالة ما يلزمه من سرعات حرارية يستهلكها نمو ويتفصيص ادراك ثماره ٤ الى ٤٠٠ سم . اوراقه تطلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . وترعرع من ٦٠ الى ٨٠ ، نصلها جامد الصفحة الناعمة ، حابب الخضار . كباسة منقطة متدلية عديدة الاشطاط . قناباته ارجوانية . طرطبه غروطي الشكل بنفسي اللون . ثماره مأكولة مستحبة الطعم متدلة الغلاظة والعلول .

٢٨٠٦٢ - موز لينتي *Bananier textile*, *B. d'Amboine*

هو الأبيض ، الطلب .

٢٨٠٦٣ - موز مبدولة * *Bananier du Paradis*, *Figulier d'Adam*, *Bananier légume* (F).

نوع من الموز الزراعي ، فزوهو المشهورة نحو ٥٠ ، اخطابها البلاد الاستوائية . ارويها مقلد . ساقها اسطوانية الشكل خضراء اللون تملو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها كبيرة القند جامدة الصفحة . كباساتها متدلية عديدة الاشطاط . ثمارها مستطيلة ، خفيفة ، عجنمة الاطراف . لبابها غزير المادة اللشوية اللذائية يصنع منه يمد التحليل والسق دقيق شائع الاستعمال يمدى دقيق الموز .

٢٨٠٦٤ - موزة *Banane*, *Figue-banane* (F).

Banans (E). ثمرة الموز المأكولة وهي تحوي العناصر التالية :
نحو ٧٢,٤٠ ٪ من الماء
١,٤٤ ٪ من المواد الاوتوية
٠,٠٩ ٪ من المواد المعدنية
٢٣,٩٣ ٪ من المواد الهيدروكربونية

٢٨٠٥٤ - مورينه مبدولة * *عقاب البحر*

الجفاسكة *Mytilobactis aquila* (S).

Mytilobate commune, *Mourine commune*, *Mourine glorieuse* (F).

نوع من المورينه كبيرة الجفة توها الى البني الاسود المروج . اخطابها جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة . وهي شرمة بظافة شديدة الطرط .

٢٨٠٥٥ - مورينيات *Mytilobactides* (S).

Mytilobactides (F), *Mytilobactidae* (E).

فصيلة اسمك بحرية من السنفقيات ورتبة الاشلاك . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اخطابها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . قوتها الاسماك والمارح || اجناسها مغلطة ، مغلطة ، ملتحمه الزعانف الصدرية الكبيرة المستعرضة تشبه العقاب الباسطة جناحها . رؤوسها مخروطية شارة . اشدافها متوسطة الانفراج اسنابها مسطحة ، سباعية الصفيوف . مورينا جانبيصة الارتكاز . اذنانها مستطيلة كالسياط عجيها ، عند ثمارها عناقس كبيرة مسنة حادة || اشهر اجناسها واعرفها المورينه .

٢٨٠٥٦ - موز *Musa* (S), *Bananier* (F).

Banana-tree (E), *Echte Banane* (D), *Banano* (I).

جنس نباتات عشبية ليفة من فصيلة الموزيات . انواعها عديدة ، اخطابها البلاد الحارة والاستوائية . جميعها مائدة البروق الخفيفة . ارويها مقلد . ساقها ليفة افقية الانبساط . ساقها عجنمة من الاتحاد الليفية للفتة المتراكبة القرمزية الانتساب . تنتهي بنصال فارقة اعليجية الشكل جامدة الصفحة المائلة الجيلة الخضار . انزراعها سنبل التجميع ، هامى الارتكاز ، كبير القند . ثمارها لبية ، مستطيلة ، كثيرة العدد ، تتولف كباسة مركبة من عدة اشطاط متتالية || والموزة اي ساق الموزة تضر مر واحدة وتموت ، أما الأروبة التي تحفظ التسل فهي ممررة وتكتاثر بالفسائل حل مر الاحوام || والموز يجود في جميع الاراضي المعتدلة الانبساط الغنية بالمواد اللذائية والناصر اللذائية وهو من النباتات المروية التي تستلزم الاسقاء المنتظم || أما الأروبة المشهورة فهي ما يتبع .

٢٨٠٥٧ - موز الجنة * *Musa paradisica* (S).

Bananier du Paradis, *Figulier d'Adam*, *Bananier légume* (F).

نوع من الموز الزراعي ، فزوهو المشهورة نحو ٥٠ ، اخطابها البلاد الاستوائية . ارويها مقلد . ساقها اسطوانية الشكل خضراء اللون تملو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها كبيرة القند جامدة الصفحة . كباساتها متدلية عديدة الاشطاط . ثمارها مستطيلة ، خفيفة ، عجنمة الاطراف . لبابها غزير المادة اللشوية اللذائية يصنع منه يمد التحليل والسق دقيق شائع الاستعمال يمدى دقيق الموز .

٢٨٠٥٨ - موز الحبشة *Musa ensata* (S).

Bananier d'Abyssinie (F).

نوع من الموز ، يتكاثر بالبذر ، مهدده الحبشة . ارويته لا تنق ، ساقه تملو من ٣ الى ٧ امتار وهي ضخمة الجذع حل حدود زانها الاول . اوراقها اعليجية الشكل تطلو من ٤ الى ٦ امتار وترعرع من ٨٠ الى ١٢٠ سم . نصلها ناعمة جامدة جيلة الخضار ، ضلوحها غليظة جلوية اللون . انزراعها سنبل التجميع . انزاعه بنفسجية كبيرة القند ،



مورينه مبدولة



موز الجنة



موز مبدولة

Canthus ٢٨٠٨٠ - **مُوق**

هو ملتقى الجفتين وما اثنان: الموق الاكبر والموق الاصغر. فالأكبر ما كان من جهة الانثى والاصغر من جهة الذكر.

Réchaud (F), Chafing-dish (E). ٢٨٠٨١ - **مُوقِد**

Apogée (F), Apogee (E). ٢٨٠٨٢ - **مُوقِل**

البعد الأقصى لنجم عن الارض.

Mandant (F), Employer (E). ٢٨٠٨٣ - **مُوسِكِل**

هو الذي يصدر منه التوكيل الى شخص يدهي وكيله.

Eleveuse (F), Raiser (E). ٢٨٠٨٤ - **مُوسِكِن**

دنية اصطفاة تستعمل لحسن القوب.

Mull ٢٨٠٨٥ - **مُوَل**

ساف من الطبقة الدنياية يرتكز على التربة المدنية، يشتر بحبيباته الرملية ويكثر ذيدانه وحشراته وبخاصيته النسيية وبوفرة مواده الغذائية.

Financier (F), To finance (E). ٢٨٠٨٦ - **مُوَل**

Araignée (F), Spider (E). ٢٨٠٨٧ - **مُوَلَة**

المول اسم للمكبوت. الواحدة مولة.

Zeus (S). ٢٨٠٨٨ - **مُوَلَك**

Zée, Dorée, Poisson de St Pierre (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من شالكاات الزعانف وفصيلة المولكات. اصطناعها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه بيضي الشوزن يعطى من ٤٠ الى ٥٠ سم. رأسها مستطيل الجرم، كبير الذقن الرب. عيناها ماحتان. زعنفتها الظهرية كبيرة مستطيلة، منحنية القسم الامامي، سرعة الخلفي. ويدلها في القسم الامامي نحو ١٢ حكة مستطيلة دقيقة غسروية التركيب. زعنفتها الخرجية ثلاثية المناسخ الحادة. الذيلية شبه مربعة مقطوعة. ثوبها الى الصغار المذهب. يدلها في اعلى خيشها: نقطة سوداء مستديرة || لها مأكول متوسط الصنف.

Zeldas (S). ٢٨٠٨٩ - **مُؤَنِّيَات**

Zeldés (F), Zeldes (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكاات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد، عمراء البرن. يسطة اجنتها تراوح من ١٨ الى ٢٨ م. اجنتها مستطيلة الشكل، ضيقة. الامامية منها كثيفة الخمل، الخلفية شفاقة || تألف البسيرات والمناسق والفردان. اساريها تعيش في المياه الراكدة ضمن جلايب ريلية من الاصناف المبتلة.

Molennidas (S). ٢٨٠٩٠ - **مُؤَنِّيَات**

Molennidas (F), Molannides (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونات الاجنسة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد، عمراء البرن. يسطة اجنتها تراوح من ١٨ الى ٢٨ م. اجنتها مستطيلة الشكل، ضيقة. الامامية منها كثيفة الخمل، الخلفية شفاقة || تألف البسيرات والمناسق والفردان. اساريها تعيش في المياه الراكدة ضمن جلايب ريلية

١٠٢٢ ٪ من السليلوز

٠٩٢ ٪ رماد

Mouzaubi (F). ٢٨٠٩٥ - **مُؤَزَمْبِي**

هو التليكة من النباتات البتلية، اطليا.

Equilibré (F), Balanced (E). ٢٨٠٩٦ - **مُؤَزُون**

نمت تعريفي يطلق على كل تبغ متدل الطعم لا يتحور نفس.

Musaceae (S). ٢٨٠٩٧ - **مُؤَزِيَات**

Muscées (F), Musaceae (E).

فصيلة نباتية من ربيدات الفلقية. انواعها عديدة تجسمها ثلاثة اجناس: اللوز والجل والوشيج. اصطناعها السيلاد الاستوائية والحرارة. نباتاتها عشبية حادة الجذوع الخشبية. سوقها انحاء ليفية، مراكية، فرصة الانتشاب، ترتكز على اروية.

Muscardine (F). ٢٨٠٩٨ - **مُؤَسَكْرَدِين**

مرض يصيب دود القز يدهي الشلل الوردي، اطليا.

Thérrophyte (F). ٢٨٠٩٩ - **مُؤَسَمِي**

Therophyte (E).

كل نبات يزري للنشأ دورته الحياتية تطول موسمًا واحدًا لا يتعدى الخريف.

Prisme (F), Prism (E). ٢٨٠٩٠ - **مُؤَسُور**

جسم متوازي الحروف الجانبية المتساوية السوية على كل من قاعدتيه || والمؤشور قد يكون قائمًا ومزودبًا وثلاثيًا ورباعيًا وخماسيًا الخ... || يستخدم المؤشور الزجاجي الثلاثي السطوح في علم الضوء وهو يتكون من وسط شفاف محصور بين سطعين مائلين تحدهما زاوية تدعى زاوية الانكسار.

Prismatique (F). ٢٨٠٩١ - **مُؤَسُورِي**

Prismatic (E).

نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله كاللؤلؤ.

Paille (F), Straw (E). ٢٨٠٩٢ - **مُؤَس، قَش**

Commisure ٢٨٠٩٣ - **مُؤَسِل**

موضع اتصال بعض اجزاء الجسم.

Efférent (F), Efferent (E). ٢٨٠٩٤ - **مُؤَسِل**

Inducteur (F). ٢٨٠٩٥ - **مُؤَسِل كَهْرَبَائِي**

Inductor, Field-magnet (E).

Légataire (F), Legatee (E). ٢٨٠٩٦ - **مُؤَسِي لَهُ**

هو الذي يستحق له الموصى به.

Hétérozygote (F). ٢٨٠٩٧ - **مُؤَسُوت**

Heterozygote (E).

هو الاثيب، راجمه.

Mahogon (F). ٢٨٠٩٨ - **مُؤَسُوت**

هو الخلف، راجها.

Fourmis allées (F). ٢٨٠٩٩ - **مُؤِي**

Winged ants (E).

هو النمل الجناح.



مُؤَن

شبه غروبية الشكل يطوقها حَجَر رقيق قلبي الشكل ، من التركيب ذاته يمينها على الانتقال . أشهر أجناسها :

المولنة

٢٨٠٩١ - مُولَات ٥ Laemobochronidae (S).

Laemobochronidae (F). Laemobochronidae (E). فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلديات وطبقة القمليات . أنواعها عديدة يجمعها جنس واحد . جميعها صغيرة القد مفلطحة الجسم المستطيل ، ملوفا بأرجح من ٥ إلى ١٠ م . ألوانها إلى الكهبة البهراء يملؤها تخطيط أسمر . وهي تعيش على الطيور الكراسر فضفسيها . وأحدثها مولة والجمع مول .

٢٨٠٩٢ - مُولَات قَرْلَاة Molyta (F).

هي خنافس أجزر ، راجعها .

٢٨٠٩٣ - مُولِيرَة Mulleria (S).

Mulleria (F). Mulleria (E).

جنس حورانات مائية من الرخويات مصفحات الشياشيم وفصيلة النبادات . أنواعها المعاصرة المروفة قليلة العدد أعطتها ابنر ومناع وفغان أمريكة الاسواتية ٥ أصدانها لانظامية الاشكال والاحجام ، لامتواسية المصاريع ، ملحوفة بادمة سبيكة باحة الحفار ٥ تعيش متنمعة في الاحمال . لحومها كاتعة الصنف .

٢٨٠٩٤ - مُولِيرِيَّة Molinie (F).

هي الخوطالية الزرقاء ، اطلبها .

٢٨٠٩٥ - مُموم Heum (F).

هو الشيث البري ، اطلبه .

٢٨٠٩٦ - مُمَزَّة Bananeraie (F).

Banana-plantation (E).

هي بستان الموز .

٢٨٠٩٧ - مُمَزَّة ٥ أُسْتَبِين Monarda (S).

Monarde (F). Bee-balm (E). Etagenblume (D).

Monarda, Menta americana (I). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . أنواعها سبعة . سيقانها فروع قصيرة . أوراقها كاملة مسننة متعاقبة . أزهارها غنية التجميع ، أنبيلة الارتكاز أو طرفية . أوراقها وأزهارها غنية بمادة التيبول ٥ أشهر أنواعها شاي بلسلغانيه وتعتبر الخليل والانسورية والمرقطة .

٢٨٠٩٨ - مُمَزَّة ٥ مَرْطَقَة Monarda punctata (S).

Monarda punctata (F). Monarde punctata (E).

نوع من الموزدة وهي بجلة تريينية معمرة تملو من ٤٠ إلى ٦٠ سم . ساقها فروع . أوراقها سنائية . نصلها خلى البشرة مسنن الحلقه . أزهارها إلى الصفرة المرقطة بالحمرة . أزهارها يستمر من حزيران إلى تشرين الأول .

٢٨٠٩٩ - مُمَزَّة ٥ نَاصُورِيَّة ٥ بَرَقَمَت بَرِّي ٥ نَعْتَم القَرَس ٥ نَعْتَم الخَطَل Monarda fistulosa (S).

Monarde fistulose (F). Wild Bergamot, Horse Mint (E). Pterideminza (D). Monarda

pelosa, Menta rossa (I).

نوع من الموزدة وهي بجلة تريينية معمرة تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم . ساقها سقة فروع . أوراقها بيضيه ذرية . نصلها خلى المصقة مسنن الحلقه . لون أزهارها يختلف

باختلاف الفرووب . منها الابيض والبنى والاصفر والوردي والاحمر ٥ أزهارها يستمر من حزيران إلى آب . أوراقها عطرية فواحة المرق تستعمل في صناعة الملوو ويستخرج منها زين الازهار ، بالتقطير ، زيت طيار له رائحة الكافور وهو سنيه ، ملارد لرائح ، مضاد للثقبه ، مفو للاعصاب خافض الحرارة . أوراقها الحاقفة تستعمل استهلاك الشاي .

٢٨١٠٠ - مُمَزَّة ٥ مُرْتَف Acuminé (F). Acuminata (E).

نمت وصني يطلق على الورقة أو الشرة المدببة الطرف .

٢٨١٠١ - مُمِيلِيَّة ٥ Monilla (S).

جنس فطور مجهرية من الثوصيات وفصيلة الفوطيات . جربها الكنديية واضحة الهيئة . كتائلها لبنيوية الشكل ، سبيحة التجميع ٥ أنواعها عديدة معظمها طفيلي يشكل الطور الكندي في اللبن ٥ أعرف أنواعها وأشهرها الكتلة التالية .

٢٨١٠٢ - مُمِيلِيَّة ٥ مُيَضَّاه Monilla candida (S).

نظر من المونيلية ركب القش والأعشاب النحلة والساورة إلى الاعلال والبار السكرية المخموفة والمصير والخلاد... . كتائلها سبيحة التجميع . قياس الكتيبة ١×٥ م .

٢٨١٠٣ - مُمِيلِيَّة ٥ ذَهَبِيَّة Monilla surea (S).

نظر من المونيلية ركب ملد الجذوع والأعصاب اليابسة . يبدو كالصادة . كتائلها لبنيوية الشكل صفراء اللون مقلعة المواج قياسها ١×٢٠ م .

٢٨١٠٤ - مُمِيلِيَّة ٥ مُيَضَّاه Monilla fimicola (S).

نوع من المونيلية فطرها ركب عرم المفاطر فينتطها ويضعها بمشبهه الامبق اللون ، اللبد التجميع ، الذي يقضي على الفطور المرته الناشئة ٥ يكافئ بنضج الفمرة الحاصبة بالمخاض الخلي عيار ٣٣ ٪ للركو ١ على ٧ أي جزء واحد من المخاض في سبعة اجزاء ماء .

٢٨١٠٥ - مُمِيلُوبسيس ٥ Monillopsis (S).

جنس فطور مجهرية من الونيات . مشبهه قدي الشكل ، لبد التجميع ، يسرح على الاعضاء النباتية عند سطح التربة . هيئة اسطواني الشكل ، دقيق الجول ، كبير الفروع ، متركب القواصل ٥ أنواعه قليلة المدد والأذى أضرها ساي لي .

٢٨١٠٦ - مُمِيلُوبسيس ٥ أَدْرُهُولدي Monillopsis adarholdi (S).

نظر من المونيلوبسيس ركب سوق وأوراق الارلسية والمعلية والكرزيت ومخرو مرج والسراخس... . أضرها في الأوراق عادية لا تستوجب المكافئة . أما إذا تمكن من السوق فانه يقضي على الصلاء عند سطح التربة . لذلك تحسن المكافئة .

٢٨١٠٧ - مُمِيلُوبسيس ٥ قَاضِي Monillopsis fagi (S).

نوع من المونيلوبسيس فطره ركب أوراق الزان فيقضيها لانه يسبب يباس النسيج .

٢٨١٠٨ - مُمِيلُوبسيس ٥ فُولِكِلَا Monillopsis follicola (S).

نوع من المونيلوبسيس فطره ركب أوراق الاكينييا . والبثق والاجاس فيشجها يفسق الشيء دون أن يؤذيها .



موزدة ناسورية



موزية



مُونِيْمَة



مُونِيْمَة غُرُوطِيَة



مُوهُ



مُونِيْمَة مُنْتَبِيْة



مُونِيْمَة مُنْتَبِيْة



مُونِيْمَة مُنْتَبِيْة

٢٨١١٩ - **مُونِيْمَة *** Monimée (F).
جس نباتات جنينة من فصيلة المونيميئات . انواعها عديدة
اعطانها البلاد الحارة اغصانها الخشنة والجذور . اوراقها متعقبة
متقابلة بيضية . فصلها جامد الصفحة اللامعة ، بارز
الورق . ازهارها ثنائية المسكن . ثمارها كالتين شكل
وقد يهي مأكولة سكرية اللحم لا تحل من الحامض .
لحاء سقيها حامزة طيبة كانت ولا تزال تستعمل حشمة
الحطاب .

٢٨١١٠ - **مُونِيْمَة غُرُوطِيَة *** Monimia gothica (S).
Monima gothique (F). Monimia gothica (E).
حشرة من الكسفيات حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض
اقاليم موزيل الجرس الابيض المتوسط والمناطق الداخلية
المتاخمة . فراشها واسعة قوتها رقيق الازهار . سرتها تعيش
على اوراق السنديان ويغير من الازهار العروة والمالة ||
جسمها متوسط القد يطول نحو ١٢ م . يسطها نحو ٣٦ م .
رأسها حنطي اللون . عيناها ناشزتان . زباناها عظيمان .
رشفها معتدل الجرم ويغطيها بالحنطي .
الاصفر المواج || رشفها الاسمان الى الحنطي يملو
تبيض وتفتيح وتبيض وزرقة خضابها اصفر . ويملو
ايضا بقعة مربعة واخرى مستطيلة لونها الى الكسني القاتم .
ورشفها الخلفيان الى الحنطي الاصفر يطوقه حنطار تبني
يتنهي بالاعذاب || لها جيل واحد في الحول . تظهر القراشة
في آذار وتبقى حتى ايار . تسرح في الليل . تماثل بعد
ظهورها بنحو ستة اسابيع وتحت المكن لطفاً مستطيلة
على الصفحات السفلى من فصائل الازراق || السرة عند
بلوغها الكمال تطول نحو ٣٥ م . جسمها اسطواني الشكل ،
واضع الحيد . قوتها الى انفسار الاطامل المواج يملو
خط لثبيبي اسود وثلاثة خطوط جانبية حراء مراء . رأسها
اسود . منها الى الفتحة الرصاصية . رواجبها الى السرة
القائمة || طول الاكمال الذي يستمر من ١٥ الى ١٧
يوماً ينتفي في التربة حيث تنتمن السرة ملتصقة بجلباب
من الطين .

٢٨١١١ - **مُونِيْمَة مُنْتَبِيْة *** Monimia stabilis (S).
Monima ambigua (F). Monimia stabilis (E).
حشرة من الكسفيات حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من
الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية . فراشها واسعة
قوتها رقيق الازهار . سرتها تعيش على اوراق السنديان
ويغير من الازهار العروة || جسمها متوسط القد يطول
نحو ١٢ م . يسطها نحو ٣٣ م . رأسها حنطي اللون .
عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، عظيمان
عند الانثى . جوشها ويغطيها الى الحنطي الاشعث المواج ||
ورشفها الاسمان الى الحنطي الاشعث تطول دائرتان
متساوتان وسط معترض وتفتيح حنطاري . جيمها الى الحنطي
لثبيبي السرة . ورشفها الخلفيان الى الريقة الثبراء تطولها
موجة فظية وسط اسمر يستيق الحنطار الخارجي || لها جيل
واحد في الحول . تظهر القراشة في آذار وتبقى حتى ايار .
تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع
وتحت المكن لطفاً مستطيلة على الصفحات السفلى من
فصائل الازراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو
٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل . قوتها الى السرة
الزرقية المواج يملو خط لثبيبي جزوي وثلاثة خطوط
جانبية منها خطان اسودان والخط الوسطي اصفر . رأسها
احمر . منها الى الفتحة الثبراء . رواجبها الى السرة ||

طول الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع
ينتفي في التربة حيث تنتمن السرة ملتصقة بجلباب
من الطين .

٢٨١١٢ - **مُونِيْمِيَّات *** Monimiaceae (S).
Monimiaceae (F). Monimiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها واوراقها عديدة .
جميعها اشجار ونباتات . اوراقها متقابلة بسيطة . ازهارها
وحيدة الشق . اشهر اجناسها المونيمية .

٢٨١١٣ - **مُوهُ *** Moho (S). Moho (F). Moho (E).
جس طير من الجوارم ريشات المتناقص وفصيلة المغريات .
انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الهندونيش . ملحيتها
الحياقي جماعي . جماعتها قليلة العدد . قوتها رقيق الازهار
والطوارم ... || اجسامها صغيرة مستطيلة المتناقص القليلة
التفوق . اذنانها رتاجية مستطيلة . اذنها ثلاثية الاوران
فيها الاسود والاصفر والابيض . رشفها دائماً صفراء
اللون او يبيض ويميلوا في اياطها بطبقة دقيق ناعم ||
تدئن في الادغال . انثاها تضع ٤ الى ٥ بيضات
تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوماً .

٢٨١١٤ - **مَوْهِيْب لِه *** Donaire (F).
Donee, Receiver (E).
هو الذي يقبض الهبة .

٢٨١١٥ - **مَوْهِيْب *** Provision (F).
٢٨١١٦ - **مِيْبَار *** Metier, مقبّر ، مَتَك

٢٨١١٧ - **مِيْبَل *** Anthère (F). Anthère (E).
المصو الذكري في النبات وهو الجزء العلوي من السداة
يرتكز على الحويطة ، اليه تنتهي جدران الطلع وفيه
تضخم رسته تتفر .

٢٨١١٨ - **مِيْبَل *** Manomètre (F).
Manometer (E).
جهاز خاص يستعمل في قياس ضغط الغازات والبخارة .

٢٨١١٩ - **مِيْبَل *** Affluent (F).
Falling into, Running into (E).
الجلد الذي يسحب في البحر . ج مأكب .

٢٨١٢٠ - **مِيْبَل *** Tardif (F). Tardy (E).
مِيْبَل ، لَقِيْس
هو ما طال زمن نموه ان في الحيران او في النبات .

٢٨١٢١ - **مِيْبَل *** Acidimètre (F). Acidimeter (E).
مقياس الحموضة . يستعمل لمعرفة مقدار ميا في بعض
السوائل كالحجر والحليب وما اشبه من حوامض .

٢٨١٢٢ - **مِيْبَل *** Périscope (F). Periscope (E).
مِيْبَل

٢٨١٢٣ - **مِيْبَل *** Afférent (F). Afferent (E).
ناقل السائل الى المصو او الى المركز .

٢٨١٢٤ - **مِيْبَل *** Marée descendante (F).
Falling-tide (E).
هو ما يدعوه الجزر اي تباعد مياه البحر من الشط
وربوعها الى ما كانت عليه قبل الهياط .

٢٨١٢٥ - **مِيْبَل *** Vasculose (F).
مادة التسج الوعائية .



مير للك



ميشة الرنسن



ميشة مقنسة



ميشة نقية



ميشة وردية



مِثَّع

٢٨١٣٣ - مِثَّعَان ، مِثَّعَان Methane (F).
غاز ملتهب عديم اللون .
Marsh gas (E).

٢٨١٣٤ - مِثَّوْكُولَرِي Mitochondrie
رأج كوليرويزوم .

٢٨١٣٥ - مِثَّعَنَة Mycena (S).
Mycène (F). Mycena (E).

جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد أعطاها غابات مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز بتنكاهها الصغيرة وبأطراسها الحادة الأطراف الملوثة . بعض أنواعها جيدة الصنف مأكول والبعض الآخر كاعن الصنف غير مرغوب فيه || اعرف أنواعها وأشهرها الأربعة التالية .

٢٨١٣٦ - مِثَّعَنَة السَّرْمَسَن Mycena epityrula (S). Mycène des fougères (F).

توجد في المواقف الرطبة بين السرخس . ساقها حقيقية ، رقيقة ، لزجة . نكتها قمية الشكل . صغرة اللد ، قطرها نحو ١ سم . لونها أل الصفار الميوني || لحيتها كاعن الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٧ - مِثَّعَنَة مَقْنَسَة Mycena galericulata (S). Mycène à bonnet (F).

توجد في الغابات على الجذوع النخرة القريبة من التربة . ساقها حقيقية ، متدلة الارتفاع ، تينة اللون . نكتها قلسوية الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها إلى الكعبة الصفراء . أطراسها وردية اللون || لحيتها مأكولة ، لذينة الطعم ، مرغوب فيها .

٢٨١٣٨ - مِثَّعَنَة نَقِيَّة Mycena pura (S).
Mycène pur (F).

توجد في المواقف الرطبة . تعيش على اللبالب . رانحتها القليل . ساقها متدلة الارتفاع والمتلافة . نكتها صاجية الشكل ، صفراء اللون يعلوها موج ليكني عابن . أطراسها وردية اللون || لحيتها كاعن الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٣٩ - مِثَّعَنَة وَرْدِيَّة Mycena rosella (S).
Mycène rosé (F).

توجد في المواقف الرطبة بين الصغبر . ساقها رقيقة ، دقيقة ، وردية اللون . أوصرتها صاجية الشكل ، صغرة اللد ، قطرها نحو ١ سم . لونها إلى الوردية العابق || لحيتها كاعن الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٨١٤٠ - مِثَّع Dactylopterus volitans (S).

Dactyloptère, Grondin rouge (F). Flying-fish (E).
جنس اسماك بحرية طيارة زاجية الألوان من فصيلة الميجيات . وديتها شاكات الزائفات الاصعبية . أنواعه قليلة العدد ، أشهرها مِثَّع المتوسط الذي يبلغ طول نحو ٥٠ سم . له زعنفتان مجنحتان طول الواحدة نحو ٣٠ سم . يمكنه من الارتفاع والسير فوق الماء فيطير نحو نصف دقيقة على ارتفاع متر .

٢٨١٤١ - مِثَّع مِثَّوْل ، مِثَّع المتوسط Dactylopterus volitans communis (S).

Dactyloptère pirapède, D. commun, D. de la Méditerranée (F). Swallow-fish, Kite-fish, Common Flying-fish (E).

نوع من المِثَّع . سمكة بحرية ييوش من فصيلة الميجيات

٢٨١٤٥ - مِثَّع Fluidista (F). Fluidista (E).
النوع من شايح النظرية القائلة بان الغناطيس الحيواني يمود إلى جاذبية خاصة .

٢٨١٤٦ - مِثَّكَة ، كَلَّاسِيَّة Collectia (S).
Collectie, Mayaca (F). Mayaka (E).

مِثَّكَة هو الاسم الشلي . جنس نباتات برية معمرة ، عيطه من فصيلة النقيات . أنواعها المعروفة نحو ٢٠ منها بعض مناطق أمريكا الجنوبية اعصها الشلي والبيرو . جميع أنواعها شجيرات ورنجيات فرعاء . مظهرها شالك الاقنات والاقنات . أوراقها متعاقبة ، متعقة ، اهليجية الاتصال الصغيرة . أزهارها فردية ، اهليجة الارتكاز ، عطرية العرف ، يكثر لها اللون الالبيش . ثمارها متاية الشكل واللذ ، مأكولة لكنها تسهل المدة .

٢٨١٤٧ - مِثَّع رَاكِدَة ، مِثَّع أسنَة Eau stagnante (F). Stagnant water (E).

٢٨١٤٨ - مِثَّكَة Hydrométrie (F).
Hydrometry (E).
علم كل ما هو عنص بالماء كالكثافة والضغط والسرعة الخ .

٢٨١٤٩ - مِثَّع Jus de coing (F).
Juice of the quince (E).
صغير السفرجل .

٢٨١٥٠ - مِثَّع المِثَّك * Bledius littoralis (S).
Blédie armé, Blédie du littoral (F).
Bledius littoralis (E).

حشرة جاسة رائجة من فصيلة الدنليات وديتها غدييات الاجنحة . موطنها حوض البحر الالبيش المتوسط . تألف المواقف الرطبة واعصها البساتين . خنفساها ويرقاتها تعيش على المواد العضوية وكل ما تستطيع افتراسه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير اللد ، نحيل ، يطول من ٦ إلى ٧ سم . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، جويي الفمدين والجرايز . رأسه صغير الحجم قصير الخطم ينتهي بفكين ضليعين . ورأس الذكر مسلح بقرين ذريين . زبانه مرفقتان ميثاء صغيرتان . ظهرانه عادم الترسيز يلسف نحو خني البطن || يدعي مير المِثَّك نسبة إلى ما تفرزه سكته البطنية الثامنة من مادة عطرية قريبة الشبه بعرف المِثَّك || الذكر اميز قدام من الانثى وأبع ثوبا منها واطول زبانا وادق بطنًا || لها جيل واحد في الحول . تغذير الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار || البرقة بطيئة النمو لا تتدلك الكال الجسودي قبل اواسط شياط . جسمها يطول من ١٢ إلى ١٥ سم . وهو مستطيل المقدم والرأس ، مستدق الطرف امير اللون ، امير الرأس والشعر ، منقط الجانين الامين والامير بملون سود متوسط السمك || طور الاكمال يستمر من اواسط شياط إلى اواخر آذار .

٢٨١٤١ - مِثَّع Guenon (F). She-monkey (E).
المية القردة الفنية وتدعي قِشَّة . اما التي بلغت الصبغة فندعي زَنَامَة .

٢٨١٤٢ - مِثَّع الفيزيك ، مَآ وَرَالِيَّة Métaphysique (F). Metaphysic (E).

علم ما وراء المادة أو الطبيعية من المفغولات .



مَيْجَة



مَيْجَل



مَيْجَة البَطَا



مَيْجَة النَّارِيْقُون



مَيْجَة خَيْبِيَّة



مَيْدَاس



مَيْدَع

شائكات الزعانف الاصبعية || اسطائها بحار البلاد الحارة وبها المتوسط . يكثر وجودها في المياه التوتسية والبيئية ويقف في المياه الباردة || جسمها شبه وشي الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . رأسها مستد الجنب ، غروبي الشكل . فكها الاعلى يتقدم الاسفل قليلا . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، فائزتان ، رفيتا الارنكاز . ثوبها يراوح بين الاحمر والوردي الزاهي يملو موج اصفر وبمسيجي || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام . الظهرية مستطيلة الصدرية كبيرة جناحية الشكل يطولها عند قاعدتها شعاع مقوس الطرف || زعنفتها الصدرية الصدرية جعنجان تمكناها من الارتفاع فوق سطح الماء والطيران نحو نصف دقيقة واكثر || لحمها متوسط الصنف ، مأكل .

٢٨١٢٢ - مَيْجَة * (E). *Majsa, Mafo*. Spider crab. جنس منع من القشريات المعروفة بعتاك البحر . انواها عديدة ، اسطائها بحار البلاد الحارة . يكثر وجودها بين الخش ومن الصغور || اشهر انواها المأكولة الميحية المجلولة التي يراوح طولها من ١٨ الى ٢٢ سم .

٢٨١٤٣ - مَيْجَل * (E). *Ameiva*. جنس حيوانات زعاف من اللطاء وفصيلة التديتات . انواها المعروفة نحو ٢٠ موطنها امريكة الوسطى والاكوادور . تألف البراري والقياني الرملية . قوتها الحشرات واساريها والديدان || اجسامها تطول من ٢٥ الى ٣٧ سم . اثولها تختلف مع الانواع تكثر فيها الركة السراء .

٢٨١٤٤ - مَيْجِيَّات (S). *Dactylopteridae*. (F). *Dactylopteridae*. فصيلة اسماك بحرية بيروية من رتبة السطيات شائكات الزعانف الاصبعية || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . معظمها من اسماك المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر || اجسامها وشية الشكل تطول من ١٥ الى ٧٠ سم . رؤسها كبيرة ، غناظها قصيرة . زعانفها الصدرية مستطيلة ، جناحية الشكل ، تمكنها من الطيران فوق سطح الماء || اشهر انواعها واعرفها الميج المجلول .

٢٨١٤٥ - مَيْجَع الميج : مشي البط . ماحت تيج . ٢٨١٤٦ - مَيْجَعَة (E). *Isola*. الشجرة او الاكلة المنفردة البائنة عن اسرارها . ج . مواسيد .

٢٨١٤٧ - مَيْجَة * (S). *Hypomyces*. جنس فطور مجهرية من السناخيات فصيلة السطيات . انواعها عديدة معظمها من الفطور التي تنقل على خبثا من الزئبق والذخاير وبعضها يعيش على النباتات العليا . اصنافها وتكاثرها دقيقة ، نكاهها اروسية الشكل متراكبة . بطها متابع الخلاء وودي اللون || انواعها اللؤذية ثلاثة وهي :

٢٨١٤٨ - مَيْجَة البَطَا * (E). *Hypomyces haematococcus, Nectria citri, Fusarium solani esmarli*. فطر مجهر يصاب عدة نباتات انحصا البطاطا والخضراوات والبن والكاكاو الخ يركب بطور البطاطا ودوناتها . مظهره الخارجى يقع سمع لا قياسية تنفى البشرة والللب فتسبب فيها دون ان تؤذي الحيوان || ويركب سق

الاشجار من الخضراوات وغيرها فيسبب قروحا لونها الى السمرة تبهو كالحلوش المسجبة ثم تنتشر لتصلب الماء والشكر والخشب وتقود الجلع الى الصرم || يكافح بالزئبق ويكشط وتنظيف الاعضاء الموصوبة ويظهرها بالكريزول المحلول ١٠ ٪ الى ٢٠ ٪ من امداد التطهير مرة ثانية بعد الاول بادامة او خسة ايام .

٢٨١٤٩ - مَيْجَة النَّارِيْقُون * (S). *Hypomyces rosellus, Dactylum dendroides*. فطر مجهرى يتطفل على الناريقون لؤذيه . مظهره الخارجى يقع خلية ، لونها الى البياض الاخضر ، قشرها يراوح من ١٠ الى ٣٠ سم . تملو الفطرة منسا ومنسا ثم يركب الناريقون وقد تصيب نكمتة قشرها وتضرها بعد ان تمسها بمسح خاص ، نواها كنف القطن لونه الى الخضرة الزرقاء || يكافح باستعمال الليزول المحلول ٢ ٪ او الفورمول التجاري المحلول ايضا ٢ ٪ .

٢٨١٥٠ - مَيْجَة خَيْبِيَّة * (S). *Hypomyces perniciosus, Mycogone perniciosus, Verticillium, Cephalosporium* (S). *Môle du champignon de couche* (F). فطر مجهرى يتطفل على بعض انواع الفطور المأكولة واخصه الناريقون المرئ || مظهره الخارجى يقع خلية لونها الى الرماد تملو سطح الفطرة ثم تمتد الى الفطور قشرها وتضرها || يكافح باستعمال الليزول المحلول من ٢ الى ٢٥ ٪ .

٢٨١٥١ - مَيْجَعِيَّة * (F). *Unioitn*. تمت تعريفي يطلق على كل حشرة تبيض موسما وحادا متتابعا لاستطفا في دورتها الحياتية الحولية .

٢٨١٥٢ - مَيْجَعَاء * (F). *Style*. يقال بنوا يبيض على مياه واحد اي على طريقة واحدة .

٢٨١٥٣ - مَيْدَاس * (S). *Midas*. جنس قرد امريكية من فصيلة القرد الدبية . انواها ٢١ . موطنها كستاركا وباناما وكوليبيا والبيرو والبرازيل والفوايا || اجسامها صغيرة القد ، حيلة الشكل ، مستطيلة للشر الناعم اللوثر . رؤسها مستديرة ، اذانها عادمة الور . اذانها مستطيلة حيلة . اثولها سوية الالوان البتائية الموجج || تعيش بين الاغدا وفي المروج القريبة من الغابات . قوتها الحشرات واللطاء والسفادع والعصافير وبعض الجار والحويو .

٢٨١٥٤ - مَيْدَاس ، مَيْدَاس * (F). *Hippodrome, Champ de courses* (F). *Hippodrome, Race-course, Race-ground* (E). مكان سباق الخيل .

٢٨١٥٥ - مَيْدَاس * (E). *Fluviographe, Fluviomètre* (F). جهاز يستعمل في قياس مياه الانهار ونسبة انحدارها .

٢٨١٥٦ - مَيْدَع * (F). *Pentapus* (S). *Pentapode* (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة القشريات . انواعها المعروفة قليلة ، جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة والمستديلة . اجسامها اليلبية الشكل متوسطة القد . زعانفها الظهرية مستطيلة شائكة ، زعانفها التخرجية فارة . اثولها فضية اللون يملو تحطيط مذهب قاطب .



ميدوس



ميديه



ميرة



ميرسين



ميرف



ميروس

٢٨١٦٣ - مِيرُ ، مِسْقَرَةُ الْإِرْتِفَاعِ

Mire (F) Sighting (F)

مسقرة مرقعة تستعمل لمعرفة الارتفاعات في مسح الأرض .

Mira (F) Mira (E)

ميرا نجم ثير من كوكبة قيطس مشهور باسم أصبوجة ، أطلها .

٢٨١٦٥ - مِيرَاتُ

Héritage, Hoirie, Succession (F). Heritage, Inheritance, Succession (E).

هو التركة ، أطلها .

Mira (S). Mira (F).

جنس حشرات ناعمة من فصيلة الحشرانيات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصورة . أنواعها عديدة موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . جميعها تتطفل على الحشرات الصلبة من الحشرشيات وذوات الجناحين || أجسامها صفيرة القند تطول نحو ١ سم . رؤوسها نصف دائرية الشكل . قرونها الاستقامارية مرفوعة ، صمغية ، كبيرة . جوارثها مستطيلة . بطونها قصيرة يرمية الشكل . مرزاتها قصيرة . اجنتها بملع عند الشقين . أنثاها تزاوج من الوردي إلى الصنابي الاصفر المالح .

٢٨١٦٧ - مِيرْسِين * ، قَتَم

Mysrine (F). Mysrine (E) Trugmyrte (D). Mysrine (I).

جنس نباتات جنينية مسرة من فصيلة البرمديات . أنواعه عديدة ، أطلها البلاد الحارة المشبعة نحو الاستوائية . جميعها تشبه الآس ، بعضها زراعي ثماره نوية صغيرة القند مأكولة .

٢٨١٦٨ - مِيرْسِينِيَّاتٌ ، قَتَمِيَّاتٌ ، جَنَاحِيَّاتٌ

Mysrinaceae (S). Mysrinacées (F). Mysrinaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها واولها نحو ٥٥٠ معظمها من نباتات المناطق الاستوائية ، فيها الاشجار والشجيرات والجنابات . اوراقها متعاقبة . ازهارها صغيرة القند ، منها الخشوية ومنها وصيدة السكن . ثمارها نوية مأكولة في بعض الانواع .

٢٨١٦٩ - مِيرُوقُ *

Myagre perlolié (F).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة البيليبديات . منته البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط واروپة . ساقه فروع . اوراقه متعاقبة ، رقيقة النصل ، بحرية اللون . ازهارها ناجي الارتكاز عشقودي التجميع . ازهارها صفيرة القند صفراء اللون دقيقة المالحق . ينبت بين الزروع ، كثرته مؤذية .

٢٨١٧٠ - مِيرُوسُ *

Myrus (S).

Myra (F). Myrus (E).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات الحائنة وفصيلة الشبقيات . منته انواعه المرفوعة اثنتان ، واحد منها الميريس الملبول يعيش في البحر الابيض المتوسط والثاني من اسماك بحار الصين واليابان || جسمه مستطيل الشكل كاللاكليس ، طوله يراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم . جلده امرب عادم المرافش . رأسه مخروطي ، ذائق الخطم ، واسع الصدر . عيناه صغيرتان صامختان . زعنفته الظهرية قاطبة ، غنيقة تقابلها الشرجية التي تحت من اواسط البطن الى طرف الذيل . ثوبه الى

٢٨١٧٠ - مِيدَاحُ مُشْبَرٌ

Pentapus vittatus (S).

Pentapode rayé (F) Sea rough (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرغيات ورتبة شاككات الزعانف . اطلها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط . ثمنه من اسماك الثغاف المتوسطة الغور || جسمها اهليجي الشكل ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الزرقعة الفضية المالحق يبق عند الرأس والظهر ويدير ويبيض عند البطن ويملوها في جانبها ستة خطوط ذهبية قاطبة . زعانفها زرقاء اللون ، الصدرية والخصية والشرجية والذيلية حر القواعد . رأسها مخروطي الشكل ، ذائق الخطم . شغلها معتدل الانفراج . اسنانها صغيرة ذرية . عينها كبيرتان ، ناشزتان ، صليتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة . زعنفتها الذيلية قارعة || لحمها جيد الصنف ، مرفوف فيه .

٢٨١٥٨ - مِيدَاحُ *

Parefeu (F). Firebreak (E).

حاجز طبيعي او صناعي جردت منه جميع المواد القابلة للاشتعال منعا لامتداد الحريق في الغابات والاحراج .

٢٨١٥٩ - مِيدُوسُ *

Mydaus (S).

Mydaus (F). Mydaus (E).

حيوان لبون مفترس من فصيلة السوريات . موطنه الهند الصينية وبنيزيا || جسمه قريب الشبه بحم الغرير . رأسه مخروطي الشكل ، ذائق الخطم . قوائمه قصيرة . اظافيره مستطيلة ، شديدة الصلابة . عليه عش - ثوبه الى السمرة الكستنية يعلوه خط ابيض يمتد من القطن الى مغرز الذنب . ذنبه جذعة كستنية اللون يضاء الطرف || من ميزاته انه يرمي عدوه بسائل كاسر كرهه الرائحة تفرزه اللغد الشرجية ويسدده بفضففيه على ايمد من متر .

٢٨١٦١ - مِيدِيَّاتٌ

Mytilidae (S).

Mytilids (F). Mytilidae (E).

فصيلة من الرغويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . اشهرها الميدي .

٢٨١٦١ - مِيدِيَّةُ * ، بَلَحُ الْبَحْرِ

Mytilus (S). Moule (F). Mussel (E).

جنس بحار من فصيلة الميديات . انواعه المرفوعة نحو ٧٠ معظمها مأكول مستحب اللحم . يعيش على الصخور التي يغمرها المادوقه ير في احواس بحرية خاصة صار تجهيزها في هذا السيل .

٢٨١٦٢ - مِيدَلُ *

Hémicentetes (S).

Hémicentète, Hémitanrec (F).

جنس حيوانات لبنة حارثة من فصيلة المالحيات . انواعه المرفوعة قليلة القند موطنها الساحل الشرقي من جزيرة مدغشكر . تألف السباب والاماكن التي يكثر فيها الاعشاب البرية . مسرعا دجوي . قوئها الحشرات والديدان || اجسامها صغيرة مكرومة تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . اعطائها مستطيلة . هليها معتدل الشفاعة تتخلله سال متباينة الطول تكثر في ثوب الظهر . الوالها الى المسر السوداء يعلوها تسنج قابل اصفر . وثبا نوح اسود الرأس || انثاها ثورقة تضع في كل رمص من ١٥ الى ١٢ جروا || يابها الشوي يستمر نحو اربعة اشهر .

٢٨٣٠٠ - نارجيس * ، نارجيس

Tragelaphus spekel (S). Tragélaphe de Speke (F). Nakong (E).

نوع من الجبل، قدره قدر القنمار، له قرنان جالسان ثوبه الى السرة يملوه بجلع ابيض. اطلانه اواسط افريقية. يأنف الحصاب والفياي ويرتاد المناق وضفاف مجاري الماء. قوته الاعشاب. اجله يد من ه الى ٢٠ نفراً.

Méua (F).

٢٨٣٠١ - نارجيس

هو المهر، اطله.

Naranio (S).

٢٨٣٠٢ - نارجيس

Naranio (F). Naranio (E).

نارايو هو الاسم الهندي، جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وصفيحة التقيبات. انواعها المعروفة قليلة العدد بعضها هندي والآخر استرالي || اجسامها صفيحة. مناهبا بارزة و طليقة. اصداها صيوانية الشكل || تميش في انفاق تفتها في الصخور المغسورة بالماء قرب مصبات الانهر || ليفها غزير المادة، جيد الصنف.

Cocos (S).

٢٨٣٠٣ - نارجيس

Cocotier (F). Cocos-nut palm (E).

جنس اشجار ليفية الجذع من فصيلة النخلات. انوله المعروفة ٣٠، اطلانها المناطق الاستوائية والحارة. معظها بري ويزرع وبعضها زراعي صناعي. اشهر انوله النارجيل المعروف (اطله). أما الانواع التريزية التي تميش في بعض المواقع الحارة من الاقاليم المختلفة فهي:

Cocos erythraspatha

Cocos eriospatha

Cocos australis

Cocos lapidea

Cocos leiospatha

Cocos datil

Cocos coronata

Cocos campestris

Cocos elegantissima

Cocos romanzoffiana

Cocos plumosa

Cocos flexuosa

Cocos capitata

Cocos weddeliana

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Cocos ysay

Jubée (F).

٢٨٣٠٥ - نارجيس شيلي

هو الجوه، اطلها.

٢٨٣٠٦ - نارجيس معرّف * ، جوز الهند

رأب، شعفور، حشرج

Cocos nucifera (S). Cocotier commun (F). Cocos-nut palm (E). Kokospalme, Indischer Nussbaum (D). Cocco, Albero del cocco, Noce d'India (I).

نوع من النارجيل الزراعي. ساقه اسطوانية متصببة تملو نحو ٢٥ م. اطلانه بعض المناطق الاستوائية. يعيش قرب الماء ويجود على الشواطئ البحرية. ثماره بيضية الشكل تطول من ١٦ الى ٢٢ سم. قشورها غشيرة تغلفها الااليان. لبها جامد الحمر، حامي اللين، مستحب الطعم، شائع الاستهلاك الغذائي والصناعي.

٢٨٣٠٧ - نارجيس * ، جوز الهند، جوزة

النارجيل

Coco, Noix de coco (F).

Coco-nut (E).

ثمرة النارجيل، لبها يتبع من البلم والسواد وضف الكبد والكل والمثانة وقروح الباطن. ويزيل اوجاع الظهر واليدان والراسير ويهيج لقوة الجنسية ويمنع تقطير البول. صصاره مع السكر تلتط الدم وتقوي الزهرة. وماد قشوره يطرد الانسان ويزيل الكلف والتمش والحكة ويشد الشعر اذا استعمل مع الحناء.

٢٨٣٠٨ - نارددين، سنبل

Valeriana (S). Valériane (F). Valerian (E). Baldrian (D). Valeriana (I).

جنس نباتات طيبة برية وزراعية من فصيلة الناردديات. انواعه زهاء ١٥٠ جميعها اشباح حولية او معمرة. اوراقها متعاقبة مركبة ريشية. ازهارها نوري او متحركة التجميع، ابطي وتلبي الاركانز. انهارها غشيرة جيلة الشكل يكثر فيها الابيض والوردي || اشهر انواعه الطيبة والزراعية والبرية ما يتبع.

٢٨٣٠٩ - نارددين أزرق * ، سنبل أزرق

Valeriana wallichii (S). Valériane indienne, Nard indien (F). Indian valerian (E). Indische Narde (D). Spiganardi (I).

نوع من النارددين البري والزراعي. جذاميره ملفطة. ساقه غشيرة. اوراقه عاقبة الخضر. ازهاره كثيفة التجميع، زرقاء اللون، مستحبة العرف. جذاميره طيبة و اذا استعمل مسحوقها مع الاستنقيد والسنبل ينشر صاحبه بضع من شدة تقويته المدة. وينظر اللون برزيل البرقان والكلبد والخصي. واذا طلى بالخل قطع العرق وطيب رائحة البدن وان طيخ بالخمير حتى يتقزم وظل به الشعر سوده وطوله ٥.

٢٨٣١٠ - نارددين إيطالي * ، سنبل رؤمي، عطار

Valeriana celtica (S). Valériane celtique, Nard celtique, Spic celtique (F). Celtic valerian, Celtic spikenard (E). Alpenbaldrian, Nardenbaldrian (D). Nardo celtico, Salicina, Spiga celtica (I).

نوع من النارددين البري الطيب الحمر. ينبت في الآربة الرملية الجبلية. جذاميره مستقيمة مستطيلة لينة العرف. ساقه نحيلة تملو من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقها لينة كاملة اطيالية. اوراقه الوسطى والعلوية مركبة. اوراقه عقدية التجميع بيضاء اللون. ثماره بيضية الشكل، صغيرة القد



نارجيل ميشل



نارجيل معروف



نارجيلة



ناردن أزرق



ناردن إيطالي

Valeriana saluina (S). **ناردين عطر** ٢٨٣١٧
Valériane odorante (F).

نوع من الناردين البري والزراعي المعمّر . ساقه مشعّرة تملو من ٥ الى ١٥ سم . تحمل وريقتين صفيرتين ثلاثية التركيب . ازهاره نوري التجميع . ازهاره صغيرة القذ ، وردية اللون . جلوره فواحة العرف يستخرج منها دهن عطري فاخر الصفت || تنوره يستمر من عوز الى آب .

٢٨٣١٨ - **ناردين مغزلي** * ، **حشيشة القط** ،
Valeriana officinalis (S). **بقلّة الهر**

Valériane officinale, Herbe aux chats (F). Common valerian, All-heal, Cat's valerian (E). Echter Baldrian (D). Valeriana minore, Amanitilla (I).

نوع من الناردين الطبي البري للمعمّر المبلول . ساقه عذبة منتصبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه مركبة ، وريقاتها سنانية النصل ، سفلة الحافة ، ورتبة التجميع تد من ٥ الى ٢٢ . ازهاره نوري . ازهاره صغيرة القذ ، وردية اللون . جنوره طيبة وعطرية يستخرج منها عطر الناردين ويحلىة مقوية للاصحاب ، مفيدة لقلب والكلى والطحال ، منبهة للقرّة الجنبية ، مضادة للشنج ، تنظم الحضم وتزيل الانتفاخ . جروعة المسحوق منه تراوح من غرام الى حصة .

٢٨٣١٩ - **ناردين بنيتات**
Valerianaceae (S). Valérianacées (F). Valerianaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة العلات . انواعها كثيرة تجتمع الى عدة اجناس ، نباتاتها شبيهة وجنبية . اوراقها مركبة متقابلة . ازهارها لا قياسي التجميع والارتكاز . ازهارها لا نظامية || اشهر اجناسها الناردين والوشة والتركوك والكروزل .

٢٨٣٢٠ - **ناردين**
Pavot blanc (F). هو رمان السمك أي الخشخاش الابيض .

٢٨٣٢١ - **ناردينك** ، **ناردينك**
|| الناردينك والناردينك : رمانة صغيرة مفتحة كأنها وردة لونها الى البياض والحمرة والصفرة في وسطها نوار ، لونه كذلك وسطه حفص ورائحته طيبة (أ.م.) || هو الزمان البري يجيب النرف والاسهال . شربه دواء .

٢٨٣٢٢ - **نارنج** * ، **لقاش** ، **أبر صغير**
Citrus amara, C. vulgaris (S). Bigaradier, Oranger amer (F). Sour orange, Bitter orange (E). Bitter-orangenbaum (D). Arancio agro, Arancio amaro (I).

نوع من الحمضيات والفصيلة النارجية . منبهة المقدر بلاد الصين او الهند الصينية ثم ادخل الى الهند لبلاد الصين والبربر كانوا اول من ادخلوه الى افريقية الشالية واروبة (المسودي) || ثمره شاككة فناء وارة تملو من ٢ الى ٧ امتار . اوراقه ممتقة متعاقبة . نصلها متنج العتق ، اعليجي الصلصة الجلمدة الجلملة الخشار . ازهاره خاسية البتلات البيض ، حمراء مستديرة الشكل برتقالية اللون واللون ، المنسحب . ثماره مستديرة الشكل برتقالية اللون واللون ، خضراء نقوش المرة الحامزة . حصاره نصوصها شديدة غليظة القشور المرارة المستنكرة . قشور ثماره ترب بالسكر بعد معالجها بالحم والكلس ويحلىة مقوية ، نافعة ، غنية ببيض الفيتامينات ، خافضة الحرارة ، مضادة للشنج . يستعطر من زهره المعروف بالقدح دهن يعطى السطر الليرولي ويستعطر ايضاً من زهره واوراقه ماء الزهر المشهور

حشيشة البفرة . || جلوره صناعية يستخرج منها عطر الناردين ويستعمل في الطب استعمال الناردين الهزني الا انها اقل فعالية منه .

٢٨٣١١ - **ناردين الجبل**
Valériane de montagne (F).

نوع من الناردين البري المعمّر المبلول . ساقه تملو من ١٠ الى ٥٥ سم . اوراقه الجلمة اعليجية النصل المسن الحافة . اوراقه العليا مركبة ريشية . ازهاره عثكولي التجميع ، مستطيل الشكل . ازهاره صغيرة القذ خضر اللقباوات وردية البتلات || تنوره يستمر من نيسان الى تموز .

٢٨٣١٢ - **ناردين الحدائق** * ، **منبل** ،
الحدائق ، **فو**

Valeriana phu, V. discords (S). Valeriana phu, V. des jardins (F). Cretan spikenard, Garden valerian (E). Grosser Baldrian (D). Valeriana maggiore, Fu pontico, Nardo agresta (I).

نوع من الناردين الزراعي المعمّر . جلوره مدادة ، اسطوانية ، مشمية . ساقه حالية منتصبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه السفلى اعليجية كاملة . اوراقه الوسطى والعليا مركبة مشية . ازهاره عثكولية التجميع ، كبيرة القذ ، يعضاه اللون او وردية ، فواحة العرف العطري المستحب . جنوره طيبة لكنها قليلة المواد الفعالة || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٣١٣ - **ناردين الصخور**
Valeriana saxatilis (S). Valériane des rochers (F).

نوع من الناردين البري المعمّر . يعيش بين الصخور ويرقب في الاودية الكلسية . ساقه نحيلة تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه الجنبية سنانية النصل . اوراقه العليا مركبة ريشية . ازهاره عثكولية التجميع . ازهاره يعضاه اللون || تنوره يستمر من حزيران الى تموز

٢٨٣١٤ - **ناردين الطيب** * ، **ناردين هندي**
Valeriana spica (S). Valériane des Indes, Nard des Indes, Spikanard (F). Indian valerian, Nardus, Spikanard (E). Indische Nardo, Echte Nardenshire (D). Spignardi (I).

نوع من الناردين البري الطبي المعمّر . اعطائه بلاد الهند . جلوره غليظة غليظة مغلقة زافرة المادة العطرية . ساقه منتصبة عذبة تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مركبة . وريقاتها شبيهة النصل المسن الحافة . ازهاره عثكولية التجميع ، صغيرة القذ ، فواحة العرف . يستخرج من جلوره دهن عطري يستمر من اجود انواع الطيب .

٢٨٣١٥ - **ناردين المروج** *
Nardus stricta (S). Nard des prés, Nard bétard (F). Nard, Mat-grass, Wire bent-grass (E). Straffes Bortengrass (D). Nardo, Cervino, Fiano dei monti, Spigo fitto (I).

نوع من الناردين المعمّر من فصيلة النرجليات . ساقه نحيلة منتصبة فمراء . اوراقه شقيقة مستطيلة . ازهاره صليبية التجميع ، صغيرة القذ ، وردية اللون || وهو من النباتات المروية التي يجود عليها البر ويطيب .

٢٨٣١٦ - **ناردين بري**
Nard sauvage (F). هو الاساورن ، املية .



ناردين الحدائق



ناردين الطيب



ناردين المروج



ناردين هندي



نارج

٢٨٣٢٩ - نَارِيَّة الصَّمَار المُجَعَّفَة
هي نَمَاسَةُ التَّبَخ ، أَلْطَبَا .



نَارَة

٢٨٣٣٠ - نَارِيَّة الحَنْطَلَة * ، هُفَّ الشَّعِير

Plodia interpunctella (S). Teigne orientale des dattes (F). Indian meal moth, Meal worm moth (E). *Dörobrossette* (D).

حشرة من التاربات، صغيرة القد . رواشتها طرسة نارية الالبيض والحطلي والاسمر الاسفع المواج . رتبها دقيقة نحيلة تركيب الجيوب الحزونة على اختلاف انواعها كالحنطة والشعير والذرة والشوفان والسلت ...



نَارِيَّة الْبَرْتَقَال

٢٨٣٣١ - نَارِيَّة الْخَرْبُوب *

Myelos ceratonie (S). *Pyrale des caroubes*, *Teigne des caroubes et des figues* (F). *Myelos ceratonie* (E).

حشرة صغيرة من فصيلة التاربات وربة حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها وسبق الازمار . سرقها ثائرة قوتها لباب قرون الخروب وثمار اللين || جسمها نحيل اهيف بطول نحو ٨ م . يسقطها نحو ٢١ م . رأسها معتدل الجرم . عيناها صيرتآن . زباناها خيطيان . شرفها معتدل الطول . جوشنها ويطنها الى الشبهة || رواشتها الاساميان الى الشبهة الحديدية يملونها بتقيج ابيض وصف من النقط البيض يستبق الحمار الخاريجي . وروشتها الخلفيان الى الشبهة السمر . احداها الى الشبهة خضراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في الصيف || تسرح في النهار . تعاطل يمد ظهورها ينسو ثلاثة اسابيع وترز للكن مبيحاً في قرون الخروب || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٩ م . جسمها اسطواني الشكل . رأسها شديد السرة . ثوبها الى الالباض اللين تملو ماجة وردية . رواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي ضمن صلجة تحببها السرة تحت القشور او بين شقوق السماء .



نَارِيَّة الحَنْطَلَة



نَارِيَّة الْخَرْبُوب

٢٨٣٣٢ - نَارِيَّة الدَّكْبَقِي *
Asopia farinella (S). *Asopie*, *Teigne des farines* (F). *Meal snout moth* (E). *Mehlzünsler* (D).

فراشة صغيرة القند من فصيلة التاربات ، فوجها الى الصبوة الصنابية . رواشتها مزركشة . زباناها غليظة مستطيلة . تطير من ايار الى تشرين ، تألف البيوت والمطابخ والافران . ابيها الحولية ثلاثة . رتبها تسمى دودة الدقيق تعيش على الدقيق والكنس والذرة والذرة الجافة الخ...



نَارِيَّة الدَّقِيق

٢٨٣٣٣ - نَارِيَّة الدَّكْبَقِي الْغَرَاء

هي نَمَاسَةُ الدَّقِيق ، أَلْطَبَا .

٢٨٣٣٤ - نَارِيَّة الدَّرَّة *
Pyrusta nubilalis (S). *Pyrale du maïs* (F). *Corn moth* (E). *Maiszünsler*, *Hirsezünsler* (D).

حشرة من التاربات ، رتبها غليظة الشكل تطول نحو ٢٥ م . ظهورها اسمر اللون يملو خطوط قزوين . مدنها الى السرة الحنطية || تحبل من جانيتها نقط سمر داكنة يملوها حلب مستطيل || تركيب سوق الدرة تنفخها رسا وتسبب قصفاها .



نَارِيَّة الدَّرَّة

وهو يقيد الحنط والمض || تصوب التارنج تستعمل كعلم تختل أنواع الحشويات وذلك لانها قوية المناحة الجنية ولا تخشى الاثرية المتدنية التي تنفر منها انواع الليون المزدرة .

٢٨٣٣٣ - تَارَنج مَرَسِيَنِي

Oranger à feuilles de myrte (F).

هو الليون المرسي ، أَلْطَبَا .

٢٨٣٣٤ - نَارِيَّة *

Acanthoscyos horrida (S).

Nara (F).

اسما الاثري نارا وهي جنين من فصيلة القرصيات منبها صاري افريقية الشالية . ساقها ليلية فرعا تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فرونها اقية الانتشاب ، منبسطة ، متدلية ، تطول نحو ٤ اتر وهي حادة الورق كثيرة الشوك . جلونها تدور في الرمال من ٢٠ الى ٤٠ م . انزعها كبيرة القند . ثمارها برتقالية الحجم واللون ، قشورها خشكرة ، هريفة التعل . لها مسحب العلم مأكول وهو ادم وأسل وألد من البليغ . بزورها مأكولة طازجة ومطبوخة . لها مومان في العام الواحد . وهي من النباتات الزريرة الكثيرة النفع .

٢٨٣٣٥ - نَارِيَّات
Pyralidae, *Pyralididae* (S). *Pyralidae*, *Pyralin moths*, *Snout moths* (E). *Zünsler* (D).

فصيلة حشرات من ربة حشرقيات الاجنحة . ابيها ١١١ اجناسها وانواعها زمام ١٠٠٠٠ . جميعها فراشات ليلية صغيرة القند ، دقيقة الاجسام ، اثرية الاصطام ، واضحة التأثير . رواشتها صفيقة ، مهدبة الاطراف ، متداخلة الالوان . ابيها الحولية لاقياسة . رقاتها ملونة . غادراتها تلحف بأغشية حريرية النواس .

٢٨٣٣٦ - نَارِيَّة الْبَاذَنجَان

هي يَنْقَرَةُ الْبَاذَنجَان ، أَلْطَبَا .

٢٨٣٣٧ - نَارِيَّة الْبَرْتَقَال *

Prays ceteri (S).

Teigne des fleurs d'oranger (F).

حشرة من التاربات ، صغيرة القند ، نحيلة الجسم ، قريبة اليه من قومة الزيتين . يسقطها تراوح من ٩ الى ١٠ م . رواشتها الاساميان الى الكمية النفسية المواج تملوها رشفة رمداء لا مسماوية الشتر . رواشتها الخلفيان الى القردة الزامية السوية يحرفها اطار من الهب الكثيف المستعرض . ابيها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ . تمتع الاقن مكها على الازمار والذرة الفضية ينقش من رقات دقيقة تراوح طولا عند اكتمال نموها ، من ٥ الى ٦ م . فوجها الى الكمية الزامية يملوها ثلاثة خطوط قاطبة واحد يكتشف الظفر من الرأس الى الفرج واثنان جانبيان . رأسها الى السرة الباقية . مدنها الى السرة الحنطية رنكتر على خمسة ازواج من الجرايز السمر || اسطانها اللين البرتقال الذي عند من الهندن الى كمال حوض البحر المتوسط || اغمرها قد تكون ملوية نارا كثر عددها ذلك لانها تقضم بيلات الازمار واسديتها واقلام مدققاته وقه تعطب في ظروف خاصة تقشر الثار التي تقضم وتسردب لابلها || تكافح بالروتين الذي يقضي عليها .

٢٨٣٣٨ - نَارِيَّة الشَّعِير ، نَارِيَّة الْبَلَح

هي نَمَاسَةُ الْبَسَر ، أَلْطَبَا .

Stalactite ٢٨٣٤٦ - نازلة ٥
نازلة ج نازل : واسب كلسية متجمعة في سقف
الغاور الرطبة .

٢٨٣٤٧ - نازون قصير الزبان ٥
Nasonia brevicornis (S). Nasonie brévicorne (F).

حشرة نازغة من فصيلة الطليطيات ورتبة غشائيات الالجنة
المضروبة . موطنها بعض مناطق البلاد الحارة المنحرفة نحو
المتلة . تتطفل عل ذوات الجناحين اخصها الذباب ||
جسمها صغير القد بطول نحو ١ سم . واربية غلوط .
رأسها مستعرض الشكل . زباناها صولجانيان صغيران .
جوشها ضيق المخرز بطعنا شبه يوفي الشكل . مرتتها
قصيرة مستقيمة . اجنتها وردية اللون . ثوبا الى الخضار
الالمن .

٢٨٣٤٨ - ناسور
Fistula (F). Fistula (E).

٢٨٣٤٩ - ناسير
هو الفصل المصري ، اطلبه .

٢٨٣٥٠ - ناسيرة
Diffuseur (F). Diffuser,
Mixing cone (E).
اداة الانتشار ، تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة
السكر ، راجع انتشار .

٢٨٣٥١ - ناسيرة الخشب ٥
Lymexylon (S).
Lyméxylon, Lime-bois (F).
جنس حشرات غاشية من فئدة الالجنة . انواعها
ثلاثة ، جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، ريشة الجسم .
يرقاتها تنكث باخشاب الاشجار القائمة والمقطوعة تقتردها
وتتغلبها .

٢٨٣٥٢ - ناسير
Exsert
نمت تعريفي يوصف به الشيء المرتفع عن سطح محيطه .

٢٨٣٥٣ - ناسط
Assez fort (F).
نمت تعريفي يطلق عل التبرع التي تتحلل بسورة ناشطة
مركزها التنسيغي دون المانعة وفوق المعتدلة .

٢٨٣٥٤ - ناسط
Oryx de Nubie (F).
هو الارخ السوداني ، اطلبه .

٢٨٣٥٥ - ناسفة
هي جمرى السيل آل الوادي . ج نواشع .

٢٨٣٥٦ - ناصيات ، وقنبرليات ٥ ، ناليات
البقير
Buprestidae (S). Buprestidae,
Richards (F). Buprestidae, Flatheaded beetles (E).
Prachtkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة رتديات الالجنة . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد . معظمها من حشرات المناطق المعتدلة والحارة .
اشكالها مانوسة ، الوانها عابقة زاهية ، ولوسها قصيرة ،
قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاعلة ، ارساغها
خامسة ، احمادها مستطيلة . جميعها تسرح في التار وهي
سريعة الحركة والطاران . || يرقاتها خاضعة تعيش عل
جلود وصوق واوراق مختلف النباتات . كثرها عل بعض
اعشاب المراعي تسبب الحياط اي الثقفة في الايقار التي
تبتلعها مع السب .

٢٨٣٥٥ - نارية السمين ٥
Antigatra catalaunalis (S). Antigastre du
Sésame (F).

حشرة من الناريات . يرقها صغيرة القد تطول نحو ١٢ سم .
لونها الى الخضرة اليرداء المواجه لتلوها ريشة سوداء || تركيب
السمن من ساقه الى ازهاره وثماره .

٢٨٣٦٦ - نارية الشمع الصغيرة
Alveicole, Teigne de la cire (F).
هي محل النحل الصغير ، اطلبه .

٢٨٣٣٧ - نارية الشمع الكبيرة
Gallérie de la cire (F). اطلبه .

٢٨٣٣٨ - نارية الصليبيات
Pionia forticalis (S).
Pyrale des crucifères (F).

حشرة من الناريات ، يرقها صغيرة ، دقيقة ، حمراء اللون ،
سريعة الحركة . تركيب اوراق الصليبيات عل صفحاتها
السفل .

٢٨٣٣٩ - نارية الصبان ٥
Mecyna gilvata (S).
Pyrale des cannes à sucre (F).

حشرة من الناريات متوسطة القد غبراء اللون مزركشة
الرواشن . يرقها تطول نحو ٢٢ سم . لونها الى الحمرة تحمل
عل ظهرها وجانبيها خسة غلوط ارجوانية || تركيب
الصبان فتتخر الساق وتذهب فيه صمدا حتى القسة .
وتركب اللده تقتل فيها ذات الشيء وتركب الارز تقتلف
السوق والسنابل .

٢٨٣٤٠ - نارية اللوبياء ٥
Etiella zinckenella (S). Etielle du haricot, Pyrale
des haricots (F). Lima bean pod borer (E).

حشرة من الناريات ، يرقها تطول نحو ٢٥ سم . وهي
ارجوانية الظهر غبراء المذب || تركيب ازهار وثمار
اللوبياء تنضجها .

٢٨٣٤١ - نارية الورد ٥
Myelois cribrella (S).
Myelois des fleurs (F).
حشرة من الناريات ، يرقها دقيقة نحيلة حنطية اللون
تميش داخل وزم وسوق نباتات التفصيلة المركبة .

٢٨٣٤٢ - نارية الباسمين ٥
Glyphodes unionalis (S). Pyrale du jasmin (F).
حشرة من الناريات ، حنطية اللون سوداء الزواكش . يرقها
صغيرة القد مستطيلة الجسم ، غبراء اللون ، حمراء الملوچ .
تركيب برام وازهار الباسمين وسنابل الازريقن .

٢٨٣٤٣ - نارية البخنصور ٥
Pachyzancla (icarsicalls (S). Pyrale des gazons (F).
حشرة من قناريات ، يرقها مستطلة تطول نحو ٢٥ سم .
لونها الى السرة يطلوها تنظف اسود منتظم التركيب وحيد
الهبة المستطيلة || تركيب مختلف اوراق الاعشاب الفتية
اخصها النجيلية فتلتها .

٢٨٣٤٤ - نارية دمية
Pyrausta surata (S).
Pyrale dorée (F).
حشرة من الناريات ، رواشها ذهبية اللون . يرقها صغيرة
القد غبراء اللون . تركيب برام وازهار النباتات السطرية
اخصها الننع .

٢٨٣٤٥ - نارية شهباء
Pyrale grise (F).
فراشة موزية تسمى طينية الشنان ، اطلها .



نارية السمن



نارية الصن



نارية اللوبياء



نارية الباسمين



نارية البخنصور



نازون قصير الزبان



نارية الخشب

Maille (F) Stitch (E) - **نَاطِبَة** ، **نَاطِبَة** ٢٨٣٦٨
ج . ناطب . والناطب هي غرور المصفاة .

٢٨٣٦٩ - نَاطِب

الناطب نجم نير من كوكبة برج الثور ويسمى قرن الثور الشبلي .



نصبة الملوخ

Eprouvette graduée (F). - **نَاطِل** ٢٨٣٧٠
عبار مدرج تكلل به السوائل .
Test-tube (E).

٢٨٣٧١ - نَاطُور المَاء

Aiguardier (F).
Freshwater guardian (E).
هو الشاري الذي يحافظ على مياه الري ويؤمّن على مستعقبها بالقلع .



نصبة الدراق المرداء

Tarbophis - **نَاطِر** * ، **رَاقِب** ٢٨٣٧٢
جنس حيات سامّة من فصيلة الحشيشات . انواعه عديدة . اعطائها البلاد الحارة الافريقية والاسيوية . شكلها كالخنافس ، مستطيلة الجسم ، دقيقة النعق ، سريعة الحركة . اقواها الى السمرة التبراء الموقوتة .

٢٨٣٧٣ - نَاطِر مَآكِر ، رَاقِب حَدَّاع

Tarbophis fallax (S).
Tarbophis trompeur, Serpent chat (F).
حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحشيشات غليظيات الاغادي || جسمها مستدل النخاعة بطول نحو ١٠٠ سم . ثوبا الى السمرة الخطية الملوخ يتبعج ثلاثي الالوان لاقباسي الزاويقي ، يكثر فيه الرمادي والمخروي والاصفر ، عمدت من الرأس الى الذنب . ولها بيض الشوزن . عنقها متوسطة الطول . عينها كيرتان . عدد اسناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل ٢٤ في الفك الاعلى من اصلها اربعة عظام عذدة ، ثابتة ، شظفية الارتنكاز تبغ البسم في كل عضو تصببه عنقها يرق حتى مسنوها الصاعلي || تألف البراري والاطلال . قويا كل ما دب وطار . تنقش على فريستها انقضاض السنور على المفازة || تسرح في النهار وفي اوائل الليل . بياتها الشوي يستمر نحو خمسة اشهر . تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٣٢ بيضة مجموعة في سحبتين تطيرهما في الرمل || تعتبر من التمايين المؤقتة .



نصبة الورد

Palonnier (F). Swing-bar, Pole (E). - **نَاطِم** ٢٨٣٧٤
هو المزان ، قطعة من خشب أو من حديد مركبها مقدمة آلة الحرت أو البرية ، تعلق بها السيور لجر .

Culcivore (F). Culicivorous (E). - **نَاصِر** ٢٨٣٧٥
التامر من الطير والحيوان من كان قوته الشعر وما اشبه .

Aphrodiseque (F).
Aphrodisiac (E). - **نَاصِل** ٢٨٣٧٦

٢٨٣٧٧ - نَاصِقَان

الناصقان كوكبان من كواكب الجوزاء اي الجبار يتقدمان الرجل .

٢٨٣٧٨ - **نَاصِيقَة** هي القروية ، اطلاب .

Bupreste (F) Buprestis (E). - **نَاصِيقَة** ٢٨٣٥٧
هي الرقبتين ، اطلاب .

Bupreste du chêne (F). - **نَاصِيقَة البَلُوط** ٢٨٣٥٨
اطلب رقتين النديان .

٢٨٣٥٩ - **نَاصِيقَة الخَفُوح** * ، **رَقَتْنِبُوت الملوخ** ٥
Ptosima undecimmaculata (S) Bupreste du prunier (F).
حشرة من الناصقات . طولها نحو ١٠ م . لوها الى السواد الاسلم ، عمداء رباعية الخطوط المنترمة النارية اللون . رقبها شديدة الانثى تسردب سوق معظم اشجار الفصيلة الوردية اخصها الملوخ والشمش .

٢٨٣٦٠ - **نَاصِيقَة الدَّرَاقِين السَّوَدَاء** * ، **رَقَتْنِبُوت الدَّرَاقِين** ٥
Capnodis tenebrionis (S).
Bupreste noir du pêcher (F). Pêsch capnodis (E).
Capnodis tenebrionis (D).
حشرة من الناصقات . طولها نحو ١٨ م . لوها الى السواد الفضي تعلو ماجة غبراء . رقبها تسردب سوق الخوزيات اخصها الدراقان تصطبها وتؤنق بها اشد الانثى .

٢٨٣٦١ - **نَاصِيقَة الصَّنَوْبَر** (F). Bupreste des pins (F).
اطلب رقتين الصنوبر .

٢٨٣٦٢ - **نَاصِيقَة الورد** * ، **رَقَتْنِبُوت الورد** ٥
Coraeus rubi (S). Bupreste du rosier (F).
حشرة من الناصقات . طولها نحو ١٠ م . لوها الى السواد الازرق الملوخ . عمداء مجاهتان بخطوط غبراء معترضة . رقبها تنخر سوق الورد واغصانه .

٢٨٣٦٣ - **نَاصِيقَة خَضِرَاء** (F). Bupreste vert (F).
اطلب رقتين اخضر .

٢٨٣٦٤ - **نَاصِرَة** ٥
Spondylocladium (S).
جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة الطحيات ، جريه الكنيديية حنطية ، غصية التجميع . كئانه هليية انشكل ، مستندقة الاطراف ، ومنها حلزونية . || انواعه قليلة اعرفها ناصورة البطاطا .

٢٨٣٦٥ - **نَاصِرَة البَطَاطَا** ٥ ، **جَرَب فِصِي** ٥
Spondylocladium atrovirens (S). Gale argentée de la pomme de terre (F).
فطر مجهرية يتطفل على البطاطا في طور نموها الاخير ، قرب ادراكه الثمر . || مظهره الخارجي بقع مستديرة ، غبراء اللون ، غصية الملوخ ، تتصلبها بنور ثلثوية صغيرة مصدوعة الثلاث الاسود الشق ، تركيب الدرة تصطب البشرة مع قليل من الالباب || يكائن يتطهر البذار قبل الزرع ويذلل بنقع الشفط مدة ٢٠ دقيقة باحدى املاح الزئبق المحلولة ٥ د . %

٢٨٣٦٦ - **نَاصِيقَة** ٥
Toupet (F). Forestop (E).
غصلة الشمر اللدلية على جبهة الفرس .

٢٨٣٦٧ - **نَاصِج** ٥
Trop mûr (F). Overmature (E).
نعت ثمرين توصف به جميع المحاصيل الزراعية بعد اجيائها دور الانبات ودخولها في دور التفسخ .



ناظر

Vertex ٢٨٣٩١ - نَاعُورٌ (F).
أنافوخ هو قبة الرأس في تشريح الحشرات .

Chamele (F). She-camel (E). ٢٨٣٩٢ - نَاعُورٌ
الناقة هي الأنثى من الإبل . ج. نوق . كنيهاً أم بغ و أم حائل و أم حواري و أم السبق و أم مسعود || يحملها يستقيم سنة واملج حوارها يستمر سنة .

Dugong (F). ٢٨٣٩٣ - نَاعُورٌ البَحر
هي الأطوم ، راجعه .

Acidiphila (F). ٢٨٣٩٤ - نَاعُورٌ
لمت تعريفني توصف به النباتات التي ترطب في الأتربة الحمضية التي يراوح دالها من ٦,٥ الى ٥,٥

Afférent (F). ٢٨٣٩٥ - نَاعُورٌ ، مُرْسِل
Afférent (E).

Contage (F). ٢٨٣٩٦ - نَاعُورٌ العَدَوِي
Contagium (E). مادة تنقل ميكروب المرض المعدي .

Conductibilité (F). ٢٨٣٩٧ - نَاعُورٌ
هي الايسالية ، اطلبها .

Pic (F). ٢٨٣٩٨ - نَاعُورٌ
هي النكار ، اطلبه .

Regressif (F). ٢٨٣٩٩ - نَاعُورٌ
النكصي من ارتد الى ما كان عليه . راجع اشم .

٢٨٤٠٠ - نَاعُورٌ الكُتُب * ، قُصَل الكُتُب
Atropos
حشرة من فصيلة التامسيات، طولها نحو ٢ م. قوتها الى النيرة. اصطانها العالم. قوتها المواد السيلوزية، تفرس اوراق الكتب فتصلها .

Atropidae (S). ٢٨٤٠١ - نَاعُورِيَّات
Atropidés (F). Atropidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة القهلبات، انواعها عديدة، جميعها صغيرة القد، طول اجسامها يراوح من ١ الى ٣ م. اقواها الى الصغرة البدراء . قوتها المواد الصخرية والخشوية . نوع منها يدعى ناس الكتب يمتري اوراق الكتب والرقائص فيخربها ويمطها .

Formicivore (F). ٢٨٤٠٢ - نَاعُورٌ
Formicivorous (E).
لمت تعريفني يطلق على كل حيوان او طائر قوته النمل .

Myrmecophagidae (S). ٢٨٤٠٣ - نَاعُورَات
Myrmecophagidae (F). Myrmecophagidae (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الدرد الحشرات . قوتها النمل . راجع آكلات النمل .

Culcín (F). ٢٨٤٠٤ - نَاعُورٌ
هو البومض ، اطلبه .

Formicide ٢٨٤٠٥ - نَاعُورٌ
لمت تعريفني يطلق على جميع الادوية الموضوعة للقضاء على النمل .

Roue hydraulique (F). ٢٨٣٩٧ - نَاعُورٌ ، نَاعُورَةٌ (F).
Water-wheel (E).
دولاب مائي مركب من قواديس تحركه سرعة جري الماء فيفرغ ما غرقته القواديس في جدول يأخذ الماء الى حيث الحاجة .

٢٨٣٨٠ - نَاعُورٌ هَوَالِي ، نَاعُورَةٌ هَوَالِيَّة
Eolienne (F). Aeolian (E).
آلة لرفع الماء تحركها الريح . وتسمى ايضاً دولاب هوا .

Galliard (F). ٢٨٣٨١ - نَاعُورَةٌ
هي البيرديا ، اطلبها .

Noria (F). ٢٨٣٨٢ - نَاعُورَةٌ ، سَالِيَّة
Noria, Chain-pump (E).
آلة رافعة الماء تدور بوسطة الدواب او الحركات .

Nagana ٢٨٣٨٣ - نَاعُورَةٌ
مرض يصيب الحيوانات الداجنة سببه طفيلية تنقلها النشاة اللاسمة .

Naja indien (F). ٢٨٣٨٤ - نَاعُورَان
Indian cobra (E).
هو الصل الهندي ويدعى ايضاً انسى هندية وناشر هندي .

Vessie du musc (F). ٢٨٣٨٥ - نَاعُورَةٌ
Musk-bladder (E).
جراب المسك في الحيوانات التي تفرز هذه المادة .

٢٨٣٨٦ - نَاعُورَةٌ البَقَر * ، أَعْرِبِل الوَزَال
Agrilus cinctus (S). Agrile des genêts, Bupreste vert (F).
حشرة من الناصمات، طولها نحو ٨ م. لونها الى الخضار الاسقم الموج . تعيش على دسوق ازهار التفصيلة القرنية . تمنح كبتها على جذوع الوزال فينتفخ من رقات غاضلة تقضي على التقصان والافتان . || اما تسميتها بنافضة البقر فلان لانها عندما تكثر في بطون البقر من جراء ابتلاعها مع العشب ، تسبب الحباط وهو نفخة في الخوض قد تكون مؤذية .

٢٨٣٨٧ - نَاعُورٌ المَحْمُول ، تَنَقِيْدِي
Exécutoire (F). Executory (E).
ما كان يحمل الصيغة التنفيذية من اسكاف او اوامر او عقود .

Caducue, Caducifolié (F). ٢٨٣٨٨ - نَاعُورٌ
Deciduous (E).
اسم حال يوصف به النبات الذي ينفض ورقه كل سنة . راجع عايل .

Vésicants (F). Vesicants (E). ٢٨٣٨٩ - نَاعُورَات
فئة حشرات من مميزات الاجنحة تشل الترواط والذرايع والورقيات .

Mylabris (S). Mylabre (F). ٢٨٣٩٠ - نَاعُورَةٌ
جنس حشرات من النافطات الاجنحة . انواعها زهاء ٣٠٠ تعيش في المناطق الحارة والمعتدلة . جميعها من الحشرات النافقة ، تمنح مكبتها في مغارز الجراد واشباهه فينتفخ من رقات همة تلهم السوء .



نَاعُورَةُ البَقَر



نَاسِ الكُتُب

٧٨٤١٧ - **تَبَات** ، **تَبَّت** (F). **Végétal** (F). **Plant** (E).
كلمة شاملة تعني العشب والنباتية والشمرة . الواحدة نبتة
والجمع نباتات وأنبئة || والنبات هو احدى الملكتين
اللتين تنقسم اليها الكائنات الحية وهما الحيوان والنبات .
ويقسم النبات الى وسيدات الخلية وهي كائنات دنيا
ترتكز حل خلية واحدة تقوم بجميع الوظائف الحياتية .
والى عديدات الخلايا وهي كائنات راقية تتكون من بنفور
وسوق وأوراق خضر وأزهار وثمار وبنور .

٧٨٤١٣ - **تَبَاتُ الْفُ الْمَلْح** (F). **Plante salicole** (F).
Salt-producing plant (E).
كل نبات يعيش في الأترية المالحة .

٧٨٤١٤ - **تَبَاتُ النَّار** (F). **Plant** (E).
هو القراس الكري؛ اطليه .

٧٨٤١٥ - **تَبَاتٌ بَرْدِي** (F). **Plant** (E).
Uncultivated plant (E).
كل نبات تنبتة الطبيعة في الاراضي غير المزروعة .

٧٨٤١٦ - **تَبَاتٌ جَبِّي** ، **تَبَاتٌ جَبْرْدِي** (F). **Alpine plant** (E).
كل نبات يعيش طويلاً في الجبال العالية .

٧٨٤١٧ - **تَبَاتٌ رُحَافِي** ، **تَبَاتٌ رَحِيْقِي** ، **تَبَاتٌ مِعْشَرِي** (F). **P. nectarifère** (F). **Melliferous plant** (E).
النبات الرحافي كل نبات يفرز الرقيق من ازهاره او
ينضح المنقر من مسام اورلقه فيجرسه النحل ويحوه الى
عسل || اشهر النباتات الرحاقية ما جاء في الجدل التابع .

٧٨٤١٦ - **تَابِيْة** (F). **Dragoon, jet** (F).
Sucker, Shoot (E).
شط او قضيب في ريان نشأ على جدع او جذرالنبات.
٧٨٤١٧ - **تَاه** (F). **To vegetate** (E).
ناه النبات نهما واربلع .

٧٨٤١٨ - **تَاهِر** (F). **Raisin blanc** (F). **White grapes** (E).
لمت تعريفي يطلق على كل صنب ابيض من اي ضرب
كان .

٧٨٤١٩ - **تَاهِيْص** (F). **Sommet de l'omoplate** (F).
Extremity of shoulder-blade (E).
رأس المنكب في الحيوان وهما نافضان . ج نواض .

٧٨٤٢٠ - **تَاهِيْص** (F). **Polyphage** (F). **Polyphagous** (E).
نمت توصف به كل حشرة اكولة لتتلي بمواد شديدة
الاستنلاف .

٧٨٤٢١ - **تَاهُوْر** (S). **Ovibus nahoor** (S).
Moufflon bharal (F). **Bharal** (E).
نوع من الاراري موطنه جبال التيب وهضابها . يألف
المراعي المكشوفة البعيدة الاطراف . وهو ربع الجفة ،
كبير القرن غليظه عند الذكور ، دقيقه عند الاناث .
ثوبه الى الرinde الشهداء يمين عند ثوب الجاه ويبيض عند
البطن . اجله يراوح من ٧ الى ١٠ انفار يقوده نيزب
مائع .

جدول النباتات الرحاقية

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرْبَرِيْ ، بَرْبَرِيْ ، عُوْدُ الرَنْج	Barberry, Pimperidge	Berberis, Epine vinette
بَجَاص ، كُمَرِي	Pear tree	Poirier
أَنْعَرْدِيْة	Evening primrose	Aenothère, Enothère
أَنْحُوْر	Viper's bugloss	Vipérine
أَذْرُوْرُ الْمَاء ، سُرْمُوْس	Water butter-cup	Populage, Calthe
أَرْأِيْة	Angelica tree	Angélique sauvage
أَرْطَلُوْر	Burdock	Bardane
أَرْسِيْمُوْم	Erysimum	Erysimum, Vêlar
أَسْطَر ، نَجِيْة	Starwort	Aster
أَلْفَاقِي ، دُنْدُرَان	Tufted vetch	Vesce craque
أَيْسَاقُوس	Epipactis	Epipactis, Héliéborine
أَكُونِيْت ، يَشْر ، أَتْلَه	Aconite	Aconit
أَكُونِيْت ، مُشَقَّة بَاكَايِيْة	Japan medlar	Néflier du Japon, Bibaciar
أَكِيلَاجَا ، كُولِيْن	Columbine	Ancolie, Colombine
أَبْرُوْس ، كُرُوْرَاق	Coronilla	Coronille
أَنْشُوْرَة	Bugloss	Buglosse
بَاقِيْة ، يَنْقَه	Common vetch, Lints	Vesce, Pasquier
بُرُوْلَا ، سُنْدُر	Birch	Bouleau

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
بَرْيَلَا ، بَرْزَة	Common pea	Petit pois, Pois vert
بَسَلَة بَرْزَة	Wild pea	Pois sauvage
بَسَل	Onion	Oignon
بَطَيَاط - حَنْجَر - شَيْطَ الْعُور	Knot-grass	Renouée des oiseaux
بَطِيخ - خَس	Water-melon	Pastèque
بَقَس - شَشَاد	Box tree	Buis
بُنْدُق - جُلُوز	Hazel-tree, Filbert	Noisetier, Coudrier
بُورْقِيصَا ، دُرْدَار ، غُرْغَاء	Elm-tree	Orme
بُرْمُس	Lupine	Lupin
بُرْمُحَان - حَشِيصَة النَحْل	Bee-balm	Mélisse
بُرْمُشَاه ، بُرْمُشَان	Blue-bottle, Bachelor button	Bleuet, Aubifoin
بُقَاح	Apple-tree	Pommier
بُتُوب	Fir-tree, Silver fir	Sapin
جُرْمُجِير ، رُمَّة ، بُهَان	Rocket	Roquette
جُرْمُجِير بُرِّي ، بُهَان	Wild rocket	Roquette sauvage
جُلْيَان	Vetch	Gesse
جُحْل ، حَشِيصَة اللَّيْنَار	Hop, Bine	Houblon
جُولِيَانَا	Gilliflower	Julienne
جِيرَانِيُوم ، غُرْنُوق	Geranium, Shepherd's needle	Geranium, Gêranier
حُرْفِ الْعَاء	Buck's horn	Sénébière
حَشِيصَة الرِّقَّة	Lung-wort	Pulmonaire
حَشِيصَة السَّعَال ، دُوسَة الْحِمَار ، قُرْقَارَة	Cough-wort	Tussilage
حَشِيصَة الْمَلَاك	Angelica	Angélique
حَصَا الْبَان ، أَكْلِيل الْجَبَل ، نَدَى الْبَحْر	Common rosemary, Oldman	Romarin, Encensier
حَضَض ، غُرْقَد ، أَطَد	Boxthorn	Lycet
حَلَالَاب	Hare's-ear	Buplèvre
حِمِيم	Borage	Bourrache
حِمِص	Chuck-pea, Gram	Cicérole, Pois chiche
حَنْبَل ، قَاصُولِيَاء	Kidney-bean	Haricot
حَنْفُوق	Sweet-clover	Méhilot
حَقْد (جميع الأنواع)	Poplar	Peuplier
حَقِي الْعَاء ، حَيُون ، وَدَّة	Orpine, Stonecrop.	Orpin, Sedum
حَبَازِي ، حَبَاوَة	Mallow	Mauve
حَرْقَن	Hellebore	Hellébore, Ellébore
حَرْدَل	Mustard	Moutarde, Sénévé
حَرَام	Reseda	Réséda
حُرَامِي ، لَأُونْدَة	Lavander	Lavande
حَلَسَج ، شَنْطَلَف	Heath, Heather	Bruyère
حَلُود ، عَوِير	Jupiter's beard	Joubarbe
حَنَازِيرِيَّة	Figwort	Scrofulaire
حَوْج	Prune tree, Plum tree	Prunier
حِيَار ، قَدَد	Cucumber	Concombre
خِيَرِي ، شَتُور	Stock, Gilliflower	Groflée
دَبَاب ، نَمْع الحَقْل	Pudding grass	Pouliot
دَبَع	Scorzonera	Scorzonère

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
دُحريج	Spurred vetch	Vesce éperonnée
دُرَّالين، دُرَّاق، دُرَّاميك	Peach tree	Pêcher
دُهَّة حُود القار	Spurge laurel, Dwarf bay	Daphné laurêole
دُيجتال، زُهر الكُثَّائين، مُعجِنة	Finger flower	Digitale, Gautelet
رأس دُين، طَبَّاق، طَبَّون	Rock flea-bane	Inule conyze
رُيتان، رُجل المُعْفُور	Bird's-foot	Ornithope
رُغراع	Common flea-bane	Pulicaire
رُعي الحُمام	Vervain	Verveine
رُوييَّة سُنيَّة، سُطَّ كاذِب	Locust acacia, False acacia	Robinier faux-acacia
زُباد، زُراوى، سَحاء	Starwort	Pallénis, Petit mugue
زُفرين	Alaternus	Alaterne
زُوقا، جُسنى، حُسل	Common Hystop	Husope officinale
زُورقون	Linden	Tilleul
بِت الحُسن، بِلادُون	Dwale, Banewort	Atrope, Belladone
سُرَّته، (إسان الضُّفُور)	Hony wort	Cérinthe, Mélinet
سُرَّو	Cypress tree	Cyprès
سُطَّاقيس، سُطَّاقيس	Stachys	Epiaire
سُقرجل	Quince tree	Cognassier
سُقدَر لَاصِع	Knee holly	Fragon piquant
سُلسيل	Salsify	Salsifis
سُمارَّة، تُوْدُريج، فُجَل الجِمال	Hodge mustard	Sisymbre
سُبيسم	Common ling	Callune vulgaire
سُبيديان	Oak tree	Chêne
سُطَّ	Acacia	Acacia
سُستارون	Skirret	Chervis
سُيسم	Snapdragon	Muflier
سُيث، سُيث	Anet, Dill-seed	Aneth, Fenouil bâtard
سُكاعى، أَلُفُون	Scotch thistle	Onoporde
سُمار، سُمرَّة، سُمار	Fennel	Fenouil
سُمام	Melon	Melon
سُنداب	Eryngo	Panicaut, Erynge
سُرك، سُهَّاء	Thistle	Chardon
سُرك الجِمال	Globe thistle	Cardère
سُرينز، سُرينز	Black cumin	Nigelle
سُريمة الجُدَي	Caprifoly	Chèvrefeuille
سُتر، سُتر (جميع الاوانع)	Thyme & Marjoram	Thym et Origan
سُضَّاف، سُرَّو	Willow	Saule
سُضَّاء	Sophora	Sophora
سُغَلاب	Silk cotton	Asclépiade
سُنوبر	Pine-tree	Pin
سُمة	Echinops	Echinopse
سُمران، نَعْنَع الماء	Water mint	Menthe aquatique
سُشَقُون، هِنْدَب	Blow-ball	Pissenlit officinal
سُغُرُون	Germander	Germandrée
سُطَّان، كُرَّات البَر	Crow garlic	Porette

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
طَيم ، بَهْشِيَّة الدِّينِي	Holly, Christmas	Houx commun
طَفْرَاء ، نَمْنَع بَرِّي	Wild mint	Menthe sauvage
عَالِق	Delphinium	Dauphinelle
عَرَاوَة	Spiraea	Spirée
عَرَن ، سَكُون ، سَلَّة زِدَانِيَّة	Holy clover	Sainfoin, Esparcette
عَسَلِيَّة ، زَهْرَةُ السَّل	Honey flower	Mélianthe
عَشَقَّة	Ivy	Lierre
عَصَا الرَّاغِي ، قَرْدَب	Persicaria	Persicaire
عِنَّاژ	Lily grass	Butome
عَوَسَج	Bramble	Ronce
عَشِيرَاء ، صَرْبَة	Service tree	Sorbier
عَقَت	Eupatorium	Eupatoire
عَاشِرَا ، قَاشِر ، فُس	Bryony	Bryone
قَرَابِيُون ، بَاذَلَوْرْد	Horehound	Marrube
قَرَبِيُون ، يَتَوَع ، عُنْجَد	Spurge	Euphorbe
قِصَّة ، قِصَصَة ، قَصَب	Lucern	Luzerne
قِصَّة مَنِيْرِيَّة	Silver tree	Protée mellifère
قُوْدَنَج	Wild marjoram	Fausse marjolaine
قُول ، بَايَلِي ، جُمِي	Broad bean	Fève
قِيْتَمَة ، قُوْتَمَا	Rampion	Reipoce
قِيْرُونِيكََا	Veronica	Veronique
قَمَّة ، قِصَّة بَرِّيَّة	Sea hedgehog medick	Lazerne sauvage
قَرَطَم ، إِسْرِيض ، بَهْرَم ، مَرَمِي	Safflower	Carthame
قَرَع	Gourd	Courge
قَرَابُوس ، قَرَالِيَا	Cornel-tree	Cornouiller
قَسْرَوَان	Horse-thistle	Cirse
قَصَب اللَّذَب ، عَصَا اللَّذَب	Golden-rod	Solidage, Verge d'or
قَلَاع	Self-heal	Brunelle
قَصِيْط ، قَرْتِيْط	Cauliflower	Chou-fleur
قَنْدَل	Horse-chestnut-tree	Marronnier
قَطْرِيُون ، قَطَارِيُون	Centaury	Centauree
قَطْلُول	Canavalia	Canavale
قُوْبَسَة ، قُوْبَسَة ، نَاعِيَّة	Sage	Sauge
قَيْطَب ، اِسْتِنْدَان	Maple-tree	Erable
كَأَوَشِير ، جَرْد بَرِّي	Opopanax	Opopanax
كَرَاث مَعْرُوف	Lock	Poireau
كَرْد	Cherry tree	Cerisier
كَرْدِيَّة	Ers, Ervil	Ers, Ervillier
كَرَلِيْن	Carlina	Carline
كَرْب	Kohl-rabi	Chou-rave
كَحْمَتَة ، قَسَلَّة ، شَاة بَلُوْط	Chestnut-tree	Châtaignier
كَشِيْش	Currant-bush	Groseillier
كَشِي	Bitter vetch	Orobe
كَحْمَة مَنَادَة ، كِلَاب اَرُيْسِي	Ground ivy	Gléhome bédéracé
كَنْطَر	Gypsophile	Gypsophile

اسم النبات	بالانكليزي	بالفرنسي
كُوسَى	Vegetable marrow	Courgette
كُوسَى	Ploughman's spikenard	Conyza
لَارِيْس ، مَرْ	Common larch	Larix
لُزَان	Broom	Cytise
لِسَانُ الْكَلْب ، آذَانُ الْاَرْتَب	Gipsy flower	Cynoglosse
لُفْت	Rape	Rave, Navet
لُثَام ، نَمْعُ اخْضَر	Spearmint	Menhe verte
لُؤْيَاة	Black eyed delichos	Dolique
لُؤْز	Almond tree	Amandier
لُؤْلُؤِس ، لُؤْلُؤِس	Lotus	Lotier
لُيُون (جَمِيعُ الْاَنْوَاع)	Citrus	Citrus
لِيْنَارِيَّة ، حَبَاب	Linaria	Linair
مَازَزُون ، اَلْم ، دَقَّة سَاة	Mezereon	Daphné mézérton
مَحَلْب	Parfumed cherry	Mahaleb
مَرْن ، لِسَانُ الْمُصْفُور	Ash-tree	Frêne
مَرْغَابِيَلَا ، رَحِي الْاَبَل	Echinops	Echinops
مُشَطُ الرَّاعِي ، شَوْكُ الْمَرَاة	Teazle	Cardère à foulon
مُشْمِش	Apricot tree	Abricotier
مُشْمَلَّة	Medlar tree	Néflier, Merier
مُشْرِقِيَّة	Melick	Métique
مُطْفُوف ، كُرْتَب ، لَحْتَة	Cabbage	Chou
نَارُون ، سِيل	Valerian	Valériane
نُون	Alder	Nerprun
نَد ، حَبِيرَة	Willow-herb	Epilobe
نَدَاة	Savory	Sarriette
نَمْع	Mint	Menhe
نَمْعُ الْبَر	Cat-mint	Calament
نَقْل	Clover	Trèfle
نَدَال	Common mistletoe	Gul
نَرْتَلِيَّة	Heracleum, Parsnip	Berce
نُكُون	Asparagus	Asperge
نُجْنَاء	Endive	Chicorée endive
نُورِيَّة	Phacelia	Phacélie
وَزَال ، جُنْدَس ، جُونُك	Furze	Ajone
وَسْمَةُ الصَّافِيْن	Wood	Guède, Pastel
وَسْمَةُ حَمْرَاء	Red spur-valerian	Centranthe rouge
وَسْمُ ، فُفْر ، وَنَاقِيَّة	Privet, Privy	Troène, Prune
يَنْفِيْد ، يَنْفِيْض	Lion's tooth	Léontodon, Dent de lion
يَنْفِيْن اَقْرَع ، قَاوُون المِير	Squash	Pâtisson

٢٨٤١٨ - نَبَاتَاتٌ طَبِيَّةٌ Plante médicinale (F).
 Medicinal plant (E).
 النباتات الطبية كل نبات حوى بعض العناصر الفعالة
 لثانفة الصالحة للتطبيق . النباتات الطبية كثيرة العدد ،
 معظمها مشهور وبمنها لا يزال في دور التطبيق
 الاختباري || أشهر هذه النباتات ما جاء في الجدول التالى .

جدول النباتات الطبية

النبات	التعليق
أبست، شبح رومي	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها عطرية صفراء اللون
أبست بحري	عشبة معمرة متسلقة الساق. اوراقها مفصصة. ازهارها قليلة العرف باهتة الصفار
أخيليا أم ألف ورقة	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة مشطية. ازهارها الى البياض الوردية
أدونيس ربيعي، حين الثور	عشبة معمرة فرعاء. جذرها عسقلي. ازهارها فردية كبيرة صفراء اللون
آذرين عذري	عشبة حولية فرعاء. اوراقها ريشية خشبية النصال. ازهارها صغيرة
إرث، سرساد	جنية معمرة فرعاء. اوراقها كثيفة النصال. ازهارها عطرية زرقاء. ثمارها صغيرة كاللؤلؤ
أرضي شوكي، غرشف	عشبة معمرة، اوراقها كبيرة مفرصة ومشرمة، ازهارها رئيسية طرفية
أرطاة، ياسين اصفر	جنية معمرة متسلقة. اوراقها عروبة سنانية. ازهارها بوقية عطرية صفراء
أرطاسية جبليّة	عشبة معمرة غشوشية الساق. اوراقها سنانية. ازهارها رئيسية خضراء
أرقطيون	بجلة حولية. اوراقها كبيرة قلبية. ازهارها ارجوانية. تتميز بمشينا الغليظ
أرنكا جبليّة، زهرة الطاس	عشبة معمرة مستقطبة الجذر. اوراقها سنانية. رؤسائها الزهرية الى الصفار البرتقالي
أروم، تريفاي ابيض	عشبة دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب سهمية كبيرة. غشباتها صفراء المواج
أروم ثلاثي الورق	عشبة دوفضية. اوراقها قرصية الانتشاب ثلاثية الوريقات. غشباتها موشحة
أسارون، تاردين بري	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها لحمية كلوية الشكل. ازهارها صغيرة ارجوانية
اشنة بحرية	ضمة من الخيوط والحزم الفوقية سمراء اللون زيتية المواج
اطريفل نقل	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها صغيرة بيضاء
أقنى متوقفة	جنية معمرة فرعاء غليظة الازمولة. اوراقها مركبة. ازهارها الى الخضار الباهت
أصفوان حنين	عشبة حولية. ساقها ضعيفة. اوراقها صغيرة مشرمة. رؤسائها الزهرية صفراء
إكليل الجبل، حصا لبان	جنية معمرة فرعاء. اوراقها صغيرة لسنة. ازهارها زرقاء اللون
أتاروف، انجار	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها صغيرة وردية
أثشوة عذرية	عشبة معمرة او حولية. اوراقها لسنة مستخشنة. ازهارها الى الزرقا البنفسجية
أتيسون	عشبة حولية فرعاء. اوراقها مركبة. ازهارها بيضاء. ثمارها يزور عطرية خضراء اللون
أتيسون نحسي	شجيرة فرعاء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها لوزية دهنية اللباب
أوكالبتوس عريض الورق	شجرة ضخمة باسقة. اوراقها سنانية جامدة، بحرية الخضار
إيبرغة	جنية معمرة فرعاء. اوراقها اهليجية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل لثائية البلور
بايون عطر	عشبة معمرة متسلقة فرعاء. اوراقها مركبة خيطية. ازهارها رئيسية صفراء
بايون عطر	عشبة حولية صغيرة. اوراقها ثنائية التظليل الريشي. ازهارها رئيسية صفراء
بادوسه بوليتا	جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنانية جامدة النصال. ازهارها بيضاء اللون
بياط زراعي، ديكاء الهند	شجرة عديمة الفروع. اوراقها قلبية كبيرة سباعية التفصيص. ثمارها قرصية
بتولا يبيضاء	شجرة فرعاء. اوراقها قلبية كبيرة. ازهارها خيرة. ثمارها جوزية
بريريس، حود الريح	جنية معمرة فرعاء. اوراقها يبيضة جامدة. ازهارها صفراء. ثمارها صمغية
برقوق شالك	شجيرة شائكة فرعاء. اوراقها يبيضة مسننة. ازهارها بيضاء. ثمارها خروخية
برنق عسلي	جنية معمرة فرعاء. اوراقها يبيضة جامدة. ازهارها حمراء. ثمارها نووية جزئية
بزرقونه، عشبة اليراقط	عشبة صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب. ازهارها شمراخية. ثمارها يزور صغيرة
بطياط، شيط الفول	عشبة حولية فرعاء. اوراقها صغيرة. ازهارها بيضاء او وردية ثمارها يزور صغيرة
بطونقا طيبة	عشبة معمرة. اوراقها سنانية مسننة. ازهارها عطرية حمراء اللون
بقدنوس	عشبة حولية. اوراقها مركبة. وريقاتها ثلاثية التفصيص. ازهارها خضراء اللون
بقس، شمشاد اخضر	جنية معمرة. اوراقها صغيرة ابيدة جامدة. ازهارها وردية. ثمارها صمغية
بقلة الاوجاج	عشبة جذمورية معمرة. اوراقها سنانية مزغبة ومسنة. ازهارها صغيرة ليلكية
بقلة التريس	عشبة جذمورية شمراخية. اوراقها مركبة خماسية. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة
بلاذون، ست الحسن	جنية معمرة فرعاء. اوراقها كبيرة متمشجة. ازهارها وردية. ثمارها صمغية
بلاذر شرقي	شجرة معمرة للساق. اوراقها سنانية جامدة. ازهارها بيضاء. ثمارها قلبية لحمية مأكولة

الاعراض والصاحبة	المنافع والاستعمال
الأوراق والأزهار	مغلي الأوراق والأزهار ينشط الهضم والابلاع والطمث ويدفع الحشيات
الأوراق والأزهار	يستعمل مغلي الأوراق والأزهار كطارد للبلدان. وينشط الهضم
الأوراق والأزهار	مستحباً مغز، منبّه، مضاد للتشنج، وفيه للمعدة والأعضاء
العشبة برشتها	تنظم التبرش، ترفع الضغط الدموي، تزيد ادرار البول
العشبة برشتها	تقيحها يسكن آلام الحصى. مستحب الأزهار يفيد البنية عند الذكور
الأزهار والثمار	الثمار عمدة للقوة الجنسية. الأزهار والثمار هاضمة، طاردة للغازات وتدر البول
الأوراق وسلوعها	عصيرها يفيد الحفر والاستسقاء واليرقان واحتقان الكبد ويتر البول
الأرومة والجذور	مخففة للضغط الشرياني، تدفع الحمى والأمراض المعوية. استعمالها خطر لأنها سامة
اليزور والعشبة برشتها	مقوية تفيد الصدر والمعدة. مدرة للحيض
البنث والأوراق النضة	خارجياً تفيد الأمراض الجلدية والدمامل. داخلياً منبهة ومقوية للدم
الأزهار والجذر	مضادة للالتهابات والربو. تشفي جروح الاعوية الدموية
الدرن والأوراق النضة	عصيرها سهل، مفتت للحصى الكلوية. استعمالها خطر لأنها سامة
الدرن والأوراق النضة	من الداخل تفيد الربو والتهابات الزمنة والتهال المعوية. من الخارج منقعة
الجذامير والأوراق	تقيحها اوسحقها سهل شديد الوقع. ويستعمل كمغلي
النبات برشتها	يستعمل كطارد للدرور خاصة عند الأطفال
الأوراق	مقوية. تفيد المعدة. تدفع الحمى. تدر الطمث
الارمولة	مقوية للمعدة. تفيد الرقص الزنجي والروماتيزم المفصلي والقرص
العشبة برشتها	مضادة للتشنج. مطبقة. دافعة للحيمات. طاردة للدرور
الأوراق البلب والأزهار	تقيح الازهار ناعوظ. تقيح الأوراق يقضي على الصفراء. الأوراق والأزهار تشط الاغصاب والذاكرة
الأوراق والأزهار والجذامير	قائضة نشطة لا تضر الجهاز الهضمي
العشبة برشتها	ممرقة ومنقية للدم. تفيد الأمراض المعدية والحلقية
اليزور	مغلي اليزور ينشط الهضم ويسكن الغص ويزيل الانتفاخ ويتر البول
الأوراق والثمار	تستعمل استعمال الانيسون
الأوراق	منقيا منبش، ممرق، مضاد للحمى وفيه الطل الثرية والمالك البولية
الأوراق والأزهار والثمار	مقوية للقلب، مسطحة، مشهية
العشبة برشتها	تفيد المعدة وتطرد الغازات وتقوي الاغصاب. مضادة للتشنج
الأزهار	مضادة للتشنج. تدفع الحمى والريح. تقوي الاغصاب
الأوراق	مقوية. ناعضة، هاضمة. مدرة للبول
الثمار	عصارة الثمار قبل الادراك تخفف من سرعة خفقان القلب وفيه الهضم والمعدة
الأوراق	اوراقها من الخارج تفيد الروماتيزم المفصلي والمفصلي والقرص. عصيرها يفيد الكل والكبد
الأوراق والثمار واللحاء	تفيد المعدة وامراض الرئة واليرقان
الأزهار والثمار	مستحب الأزهار يفيد التهاب المثانة وصعوبة التبول. عصير الثمار يفيد الرعاف وفروح القم
الثمار	مستحب الثمار طارد للدرور لاسيما الدودة الرجيدة
الأوراق والشجائخ واليزور	منقيا يقضي على الامساك
العشبة برشتها	منقيا يقطع الاسهال وفيه الهضم والجهاز البولي. التليخ باوراقها المهروسة يفيد القروح
الأوراق	دافعة للحمى وفيه ضعف الاغصاب والطحال والكبد
اليزور والجذور والأوراق	تقيح اليزور يقي الدم ويتر البول. الجذور منبهة. والأوراق منبهة
الأوراق واللحاء والجذور	ممرقة. دافعة للحمى، تفيد الطل المعوية
الجذامير والأوراق	مقوية للقلب والمعدة. مضادة للتشنج. ضاد اوراقها يزيل الاوجاع
الجذامير	منبهة، منشطة، هاضمة وفيه الربو
الأوراق والأزهار والجذور	مضادة للتشنج والافرازات. تعمد حقة العين - مسحوق او صبغة
الثمار القوية	تستعمل للثمل والقوية استعمالاً خارجياً

النبات	الصليبة
بلدس ، شجرة الكبد	شجرة صغيرة فرعاء. اوراقها بيضيه ابيدة جامدة. ثمارها كائزمرورسكية مأكولة
يلسم مكّة	جنية معمرة فرعاء. اوراقها مركبة وثريّة. ورقاقها صميكة. ازهارها خيرة اللون
بنج اسود	شجيرة فرعاء. اوراقها متقابلة ابيدة. ازهارها بيضاء عطرية. ثمارها نوية ثنائية الحب
بندي هندي	شجيرة حويلية. اوراقها مفرّعة كرسية الرالحة. ازهارها كبيرة. يزورها مقلطحة
بنفسج عطر	جنية معمرة داسية. اوراقها مركبة شععية. ازهارها بيضاء. ثمارها حنابل. يزورها كروية
بشينة البقي، حود الخير	عشبة رملية معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب معتقة. ازهارها بنفسجية عطرية
بشينة الشاي	شجرة فرعاء. اوراقها جامدة ابيدة سننة شاككة. ازهارها صغيرة. ثمارها عنبية
برصير ابيض	شجرة كبيرة فرعاء. اوراقها بيضيه. ازهارها صفراء اللون. ثمارها الى الحمرة
بولوطاني مرّ، حشيشة البين المرة	عشبة ليفية حويلة. اوراقها بيضيه خملية البشرة. ازهارها عطرية صفراء اللون
يش ، اكليت هرمي	عشبة حويلية معمرة. اوراقها صغيرة رعيّة. ازهارها جلجلية زرقاء اللون
يلسان اسود	عشبة معمرة. اوراقها ريشية شديدة الخضار. ازهارها الى الزرق العاقبة
تافنست ، ملكة الحشائش	شجيرة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة صفراء اللون
ترنجان	عشبة جلمووية معمرة. اوراقها مركبة خاسية. ازهارها صغيرة كبيرة يسهل اللون
ترنشا	بجلة معمرة. اوراقها بيضيه بارزة المروق. ازهارها بيضاء فواسية الصبر
توت اسود، توت شامي	عشبة حويلية. اوراقها ضيقة الاتصال لانظامية. رؤسائها الزهرية زرقاء اللون
لثان حلونر	شجرة دالحة. اوراقها قلبية خشنة طابلة. ثمارها حسله جليوية للميدة الطعم
ثوبلا أكلة	جنية معمرة متسلقة. اوراقها معتقة شديدة الخضار. ازهارها بيضاء بنفسجية المواج
جرجير حقل	عشبة حويلية فرعاء. اوراقها قلبية بحرية اللون. رؤسائها وريدية
جروية ترسية	عشبة حويلية فرعاء. اوراقها شديدة التفريغ. ازهارها وريدية. ثمارها يزور تحيلة
جزر الرعاة، دوقس	شجرة دماعه جولاه الساق. اوراقها ترسية مفصصة. ازهارها حامية صفراء
جكرته بريوسيرا	عشبة معمرة جنيّة الجذر. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها صغيرة خيرة اللون
جلاب	شجرة فرعاء. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها كبيرة زرقاء اللون. ثمارها لحية مأكولة
جذليج صني	عشبة صفولية متسلقة معمرة. اوراقها قلبية. ازهارها كبيرة قرمزية.
جنبل شائع	عشبة حويلية مزغية فرعاء. اوراقها سنانية سننة. ازهارها بيضاء مستحبة العرف
جنس	عشبة معمرة عارشة. اوراقها مفصصة. ازهارها وحيدة للسكن
جوز عادي	جنية فرعاء مستغلطة الجذور. اوراقها مركبة حاسية. ازهارها وريدية اللون
جينكو	شجرة كبيرة دالحة. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها قلبية. ثمارها مأكولة الثياب
حب السك	شجرة ضخمة دالحة. اوراقها مروحية مشقوقة. ثمارها لوزية لحية السودي جمالية
حب معروف	عشبة حويلية زياء. اوراقها خاسية اوساعية القصور. ازهارها كبريتية اللون. يزورها بلسنية
حمرل	عشبة حويلية فرعاء. اوراقها لسة مائبة. ازهارها بيضاء. يزورها دقيقة كروية
حشيشة الحفر	بجلة معمرة مكادة. اوراقها مفرّعة ريشية التشمير. ازهارها بيضاء. يزورها صغيرة
حشيشة المطاف	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مستطيلة مفرّعة. ازهارها صفراء. يزورها دقيقة سمراء
حشيشة اللة المخزنية	عشبة معمرة درية الجذور. اوراقها قرصية مزراقية. ازهارها صفراء
حشيشة الثرجاج	عشبة معمرة لحمية زياء. اوراقها رعيّة مزغية. ازهارها وريدية لم بنفسجية
حشيشة السحال ، فرارة	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها لسة زياء. ازهارها خضره اللون
حشيشة الفزاز	عشبة حويلية فرعاء زياء. اوراقها بيضيه مزغية. ازهارها بيضاء اللون
حشيشة الملايح	عشبة حويلية صغيرة. اوراقها ملحية الشكل درماء الاتصال. ازهارها بيضاء
حشيشة الملاك	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها بيضاء اللون. يزورها منجحة
حشيشة مباركة	عشبة جلمووية معمرة. اوراقها القرصية ريشية اما العليا لفصصة. ازهارها برتقالية اللون
حلب روميه	عشبة حويلية. اوراقها مركبة ثلاثية الورقات. ثمارها حنابل. يزورها شبه كروية
حليب حويلي	عشبة حويلية صغيرة. اوراقها سنانية. ازهارها خضره اللون
حمحم عذري	عشبة حويلية زياء. اوراقها سنانية خشنة. ازهارها زرقاء اللون
حشيشة الحفل	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها سنانية مستطيلة داكنة الخضار
حشيشة زراعي	عشبة معمرة فرعاء. اوراقها رعيّة فاعمة الخضار. ازهارها خضره اللون

الاجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق	تستعمل في علاجات الكبد، مقوية، هاضمة
صمغ يستخرج بالحرق من الساق	يسكن السعال، يقوي المعدة
الحطب	مسحوق الحطب المحمص ومطليه ينضج الاعصاب
الأوراق واليزور	مسحوقها او صبتها ممتدة، مضادة للتشنج، تنيد للنفس الكلوي، تمدد حدة العين
الأوراق واليزور	مطليها مقو، مضاد لتهات الحسى المتقطعة
الازهار والأوراق والرواكب	نقيع الازهار الجافة لمائي وينفع الصدر والسعال، الأوراق والرواكب مقوية
الأوراق	نقيع الأوراق او مغليا يفيد الرشح المستعصي
الأوراق	مغلي الأوراق الجافة منضج وهاضم
الازهار	مستحلب الازهار يقطع السعال الجاف والتهاب الحنجرة، صبتها تنفع التهاب الجفون
الجذور والأوراق والازهار	مغليا ينشط ذو اللبن عند المرضع، مضادة للسعال، تنيد الحضم
الأوراق والازهار والجذور	العصبة والمستحلب المثير مسكن نشيط، يدر البول، مضاد للاحتقان
الأوراق واللحاء	مغليا يفيد التلات الصدرية والتهاب القلورزين والصداع
الجذور	مسحوقها منضج، معرق، يساعد الحضم، يرفع الريح ويدر البول
الأوراق	مغليا منبه، يفيد الآلام العصبية والصداع
الازهار	نقيعها يقوي الميود ويقضي على اليرم
اشجار	عصيرها قابض، يفيد المعدة والأمعاء
الفروع المحولة	مسحوقها الجاف يفيد الامراض الرئوية والعصبية والقرص
الأوراق	عصيرها ينشط افراز الكلب ويقيد التلة ويناد الدم
الأوراق واليزور	عصير الأوراق منضج وضاد للحفر، مسحوق البذور ناطق وينشط الباه
الأوراق والجذور	مغليا يفيد الربو والاستقاء وامراض الكبد
الجذور واليزور	مغليا منضج نشيط، يفيد السهول، يدر البول
الأوراق واللحاء	اوراقها تنيد الأمراض الجلدية، اللحاء مرقه ومدره للبول
العسافل	مسحوق العسافل سهل فكال
العصبة برستها	مغليا يفيد التشنج الربوي ويقيد الربو والتهاب الحنجرة
للمخاطر الاقوية	مغليا يسكن الاعصاب والاضطرابات، مضاد للحفر والامراض الجلدية
الجذور	مسحوقها منضج نشيط او شاي حسب الاستعمال، لا يسيء الى الجهاز العصبي.
الأوراق وقرفة اشجار الخضراء	مغلي الأوراق يفيد الآفات الجلدية، صبة قرفة اشجار منبهة
اليزور	طاردة للدود
اليزور	مستحلبها مضاد للتشنج
الأوراق والازهار	مغليا مقوي، مشه، هاضم، يزيل الصداع، مضاد للتشنج
اليزور	مسحوقها ومغليا يدر البلغم ويغضي، استعمالها خطر يوجب الحذر
الأوراق والازهار	مغليا دواء للحفر وضاد للسعال، نقيعها يفيد البحة والتهاب الحنجرة
العصبة برستها مع الجذور	تستعمل في معالجة البواسير مزوجة ببض المساحيق او للرام
الساق والأوراق	مغليا يفيد الصدر والالتهابات الشعبية والرئوية
العصبة برستها	مغليا ملين ويدر البول
الأوراق والازهار	مستحلبها مضاد للسعال والتهاب الحنجرة
العصبة القسمة برستها	مستحلبها يفيد ضعف القلب ويقضي على التلات الصدرية الخفيفة
العصبة برستها	شرايبها او صبتها منقطعة، مخروسة، مضادة للحفر، منقية للدم، تدر البول
الجذور	مغليا يفيد الجهاز التنفسي والمعدة ويقطع الحضم
الجذور	مغلي المسحوق يفيد القلب والدماع والذاكرة والاعضاء التناسلية
اليزور	مغليا يفيد الالتهابات الرئوية والاسماك والبواسير وينشط السنة
الأوراق	مغليا ملين وسهل
الأوراق والازهار	مغليا معرق، يدر البول، مضاد للسعال والامراض الصدرية والعصبية
الجذور والأوراق	مغليا مقو، يقي الدم، يفيد الامراض الجلدية
الأوراق	عصاريتها منبهة، تنفي الدم، تقضي على الاساك

النبات	الوصف
حنطوق حقل	عشب حول فراء. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها صفراء اللون كثيرة العدد
حنظل	عشب حولية مدادة. اوراقها كبيرة خشنة مزغبة. ازهارها صفراء. ثمارها قرعوية
عنب الرمال	عشب جذمورية معمرة. اوراقها عصفية حشوية البشرة مهدبة الحار
خيارية بريّة	عشب ليفية حولية او محولة. اوراقها مفصصة. ازهارها بتنجسية كبيرة
خيزرة مخزّنة	عشب ليفية معمرة. اوراقها ثلاثية او خماسية القصوص. ازهارها وردية
خلدوة، رجل الثلب	عشب معمرة. اوراقها خيطية متراكبة. ازهارها غبراء سنبله التجميع
غرين اسود	عشب صغيرة معمرة. اوراقها قرصية الانتشاب مركبة وثرة. ازهارها بوقية يضاء اللون
غريوق ابيض	عشب جذمورية معمرة. اوراقها سنائية زياء. ازهارها يضاء بطوها موج اخضر
غردل اسود	عشب حولية فراء. اوراقها كبيرة زياء. ازهارها صغيرة صفراء. يزورها دقيقة
غرز الصخوخ	من النباتات الدنيا. جامد البشرة. يعيش في المواد الضوية على الصخور الرطبة
غروب هندي	شجرة داحلة. اوراقها مركبة وثرة ابيدة. ازهارها خضراء اللون. ثمارها قرنية كثيرة البذور
خراسي مخزّنة	عشب معمرة فراء. اوراقها لينة خفيفة خيطية. ازهارها زرقاء اللون
خضخاش ابيض	عشب حولية عشوية الساق. اوراقها جلدية مقرّصة. ازهارها كبيرة. ثمارها جراء
خضخاش اعصى	عشب حولية صغيرة حشفة. اوراقها مقرّصة. ازهارها كبيرة حمراء. ثمارها جراء
خلة	عشب حولية فراء. اوراقها مركبة مقرّصة. ازهارها عطرية يضاء اللون
خنود السطوح	عشب لحمية معمرة عادية الفروع. اوراقها لحمية قرصية الانتشاب. ازهارها الى الحمرة الوردية
خلجان عزلي	عشب جذمورية معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها يضاء اللون
دازي رومي	عشب معمرة. اوراقها اهلجية كثيرة الجيوب المدببة. ازهارها صفراء. ثمارها جراء
دكسون ابيض	عشب معمرة فراء. اوراقها مركبة وثرة. ازهارها يضاء مقلّمة بالارجواني
دند اللوك	جنية معمرة. اوراقها اصحية مقرّصة. ازهارها غبراء. يزورها شبيه يزور الخروع
ديتال ارجواني	عشب حولية ليفية سرحة. اوراقها يضيئة. ازهارها قعبة ارجوانية
ديش مشوك	شجرة صغيرة فراء. اوراقها مركبة وثرة عطرية. ازهارها خضراء اللون
ذرة صفراء	عشب حولية متصبية. اوراقها عصفية سنائية مستطيلة
ذقة، زين الوادي	عشب جذمورية معمرة. اوراقها سنائية. ازهارها جلجلة يضاء
راسن طهي	عشب معمرة فراء. اوراقها قلبية كبيرة. رؤسها الزهرية صفراء اللون
راوند عزلي	عشب جذمورية معمرة. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها كثيرة خضراء اللون
ريرق	جنية معمرة. ساقها شائكة فراء. اوراقها كبيرة مفصصة. ازهارها بتنجسية او يضاء
رجل القطّ الشائع	عشب معمرة جنتية الجلس. اوراقها ملوكة. ازهارها رؤسية
رصاصية اوروبية	بجلة فراء. اوراقها ملفقة مسنة. ازهارها بوقية بتنجسية
رعي الحام الخزلي	عشب معمرة فراء. اوراقها يضيئة مقرّصة الحواشي. ازهارها عطرية وردية اللون
ركان	شجرة معمرة فراء. اوراقها رحيمة. ازهارها ارجوانية. ثمارها كروية
زداع شاين	جنية معمرة فراء. اوراقها جامدة. ازهارها يضاء. ثمارها حشفة. يزورها مستطيلة
زراوند لباني	عشب عارضة معمرة. اوراقها كبيرة رحيمة. ازهارها بوقية غبراء اللون
زراوند غلياني	عشب معمرة فراء. اوراقها ليلية. ازهارها قعبة صفراء. ثمارها كمامير
زربوك فيرجينية	شجيرة داحلة. اوراقها سنائية النصال الجامدة. ازهارها صفراء اللون عطرية
زعرور شالك	شجرة فراء شائكة. اوراقها مفصصة مسنة. ازهارها يضاء. ثمارها كروية
زعفران عزلي	نبات دوفضي حولي. اوراقه خيطية ضمية. ازهاره عطرية
زغدة عزلي	عشب نجمية معمرة. اوراقها سنائية قرصية الانتشاب. ازهارها جرسية. ثمارها حشفة
زنجبيل مخزّني	عشب جذمورية عقده. اوراقها كبيرة سنائية. ازهارها صفراء برتقالية البتلات
زوظا	عشب معمرة فراء. اوراقها عطرية سنائية. ازهارها عطرية عديدة الالوان
زيزوفون	شجرة كبيرة. اوراقها متقة قلبية. ازهارها عطرية تبنة اللون
ستريكوس ايبناس	جنية عارضة معمرة. اوراقها يضيئة. ازهارها يضاء. ثمارها كروية
سذاب مخزّني	عشب معمرة فراء. اوراقها مركبة مقرّصة. ازهارها فستية اللون
سرخس ذكر	عشب جذمورية معمرة. اوراقها كبيرة مستطيلة. مرجحتها حرشية
سرفل بغلي	عشب حولية فراء. اوراقها مركبة شديدة التفريغ. ازهارها يضاء يزورها صغيرة

الاجزاء الصالحة	التلغيع والاستعمال
الأوراق العليا والأزهار	منغليا قابض، مضاد للسعال. مرهم الحنثية الغصّة يحمل الروم الجامد.
لبّ الثمار	سهول شديد الريح. لا يستعمل إلا بأمر الطبيب.
الجذومور	منغلي مرقق ويترّ البول ويغيد الروماتيزم.
لساق والأوراق والأزهار	منغليا مضاد للسعال ويغيد التلذات الصدرية والتهاب اللوزتين.
الأزهار والجذومور	منغليا مسكن للسعال والأمراض الصدرية وسرقة البول. غرغرة في التهاب اللوزتين.
الطلع	مضادّ لداء الفواصل والصرع والتفتحة. يغيد الإكترنا الرطبة عند الاطفال.
الجذور	منغليا سهول هنيئ، مطعش، طارد للدمود.
العشبة برشتها	منغليا يغيد الثفوس ويسكن الآلام العصبيّة.
اليزور	منغليا حريف، ناطق، مرقق، يهّء الحضم والقلب.
الثبات برشته	سحوقه ومنغلي مضاد التقيء، مقه، يغيد الصدر.
لباب اليزور	تقيعها ومستحليها ملين يناسب الاطفال.
الأوراق والأزهار	منغليا يسكن الأعصاب ويغيد اضطرابات للمعدة.
مصارة الساق والجراه	منغليا يغلّث الأعصاب أو يسكنها.
مصارة الساق	مسكّنة، مرققة، تقيد السعال الديكي. مژومة.
اليزور	منغليا مقو، مضاد لداء الفواصل، يغيد الحضم ويترّ البول.
عصير الأوراق	يغيد القروح واللسامير والتآليل والتهاب اللثدي.
الجذومور	سحوقه منقطع شايق اذا تقع في الحليب. منغلي يغيد للمعدة والمغضم ويطرد الغازات.
الأوراق والأزهار	ثلم الجروح وتنشي الحروق وتوقف بصر الدم ويغيد الصرع العصبي.
الجذور	منغليا مضاد للصرع، مرقق، طارد للدمود.
لساق والأوراق واليزور	القليل منها منغلي ملين عمود.
الأوراق	منغليا يثقي القلب وينظم خفقانه. استعمالها خطر لأنها سامة.
الثحاء والأوراق	سحوقها ومنغليا منبه، منغلي، يغيد داء الفواصل ووجع الانسان.
شوشة الثمرنوس	منغليا يغيد التهابات الكلى والمبولة.
الأزهار	منغليا ينشط القلب ويخفف سرعة النبض ويغيد الغدة الدرقية.
الجذور	مستحلي مقو، منبه، مرقق. منغليا يشفي الجروح والقروح.
الجذومور	الجرعة الصغيرة من التقيع تقوي المعدة ويغيد الحضم. الجرعة الكبيرة مسهلة.
الأوراق	منغليا مسكن وملين.
الأزهار	منغليا مضادّ للسعال وملين.
الجذومور	سحوقها ومنغليا انتيبوتيك. يغيد وجع الانسان والجرب والقروح.
الأوراق والأزهار	مستحليها يغيد الرنم والصفص واحتقان الكبد. منغليا يغيد التهاب اللوزتين.
الأزهار ولحاء الجذومور	منغليا طارد للدمود. استعمالها حذر.
الأوراق والأزهار	القليل مقو الكثير سهول. تستعمل مخدّية.
الجذومور	سحوقها ومستحليها وتقيعها مقو، منغلي، مرقق. ويغيد الربو.
الجذومور	سحوقها مطعش. تقيعها ومنغليا مقو، ويغيد القروح والقدمال.
لحاء الجذومور والساق	منغليا يغيد الحرارة ويترّ الصفراء والبول.
الأزهار والثمار ولحاء الساق	مستحليها الأزهار وصيبتها مسكّنة للقلب ويخفف لضغط الدم.
الأزهار والبصلة	منغليا يغيد المعدة، مطعش ومنبه نشيط.
الأزهار والجذومور	منغليا مضاد للسعال والتشنج. يغيد الآلام العصبيّة.
الجذومور	سحوقها ومنغليا محرّض، منقطع، مقو، حاضم، طارد للغازات.
الأوراق والأزهار	منغليا منمش، يغيد الصدر، يقطع السعال.
الثمار واليزور	القليل القليل من سحوقها منقطع ناعض. استعمالها خطر لأنها سامة.
الأوراق	تقيعها ومنغليا ناطق، خافض للحرارة. مضادّ للتشنج، يترّ المغش.
العشبة برشتها	منغليا يغيد آلام الظهر والاعلى العصبيّة والصداع وينقي عن الدودة الوحيدة.
الأوراق	منغليا حاضم، يثقي الدم، يلين المعدة، يترّ البول.

النبات	الصلبة
سرو شائع	شجرة منتصبه رطبه. اوراقها نسيه هابطة الخضار. ثمارها اكواز كروية
سمن البر	عشب معمر. اوراقها اهليلجيه خمليه النصال. ازهارها ورديه
سفابل	عشب دولصيه معمر. اوراقها قرصيه الانتشاب عصفيه. ازهارها ارجوانيه
سفرجل	شجرة نازحه الاخضر. اوراقها خمليه النصال. ازهارها ورديه. ثمارها كرويه صفراء
سفندر لامع	جنبه معمره فرعاء. اوراقها رقائق جلديه النصل. ازهارها خضراء. ثمارها عتيبه
سكب الغرب	عشب جلصوريه معمر. اوراقها كلفيه مفصصه. ازهارها ورديه
سكع	عشب صفوليه حصيه معمر. اوراقها قرصيه الانتشاب قلفيه. ازهارها زائديه عطره
سقوطن غزلي	بجله معمره فرعاء. اوراقها ستانيه خشه. ازهارها انبوبيه ملونه
سمسم	جنبه معمر. اوراقها صغيره ابيده. ازهارها ليلكيه اللون
سنا سوري	جنبه معمر. اوراقها مركبه شفعيه ريشه. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبسطه
سنا مكسي	جنبه معمر. اوراقها مركبه شفعيه ريشه. ازهارها صفراء. ثمارها سنن مبسطه
سنديان مرند، دور	شجرة كبيره هرميه الشكل. اوراقها منقعه مفصصه. غطوها غطب الحراشف الصغيره
سورليمان الخريف	عشب دولصيه معمر. اوراقها قرصيه الانتشاب ضيقه مستطيله. ازهارها ليلكيه كبيره
سوس غزلي	جنبه جلصوريه معمر. اوراقها مركبه وثريه. ازهارها زرقاء. يزورها مستديره مفلطحه
سوس ابيض	عشب ارموليه معمر. اوراقها مستطيله منجلبه. ازهارها كبيره فيا اليبض والازرق والاصفر
سولع غزلي، آوة	عشب ارموليه لحميه معمر. اوراقها لحميه ليفيه منتصبه سننه المختار
شاهنرج غزلي	عشب حويله خيمه فرعاء. اوراقها مركبه مغرشفه. ازهارها عقودية ورديه
شالوا، كسر	شجرة كبيره. اوراقها مركبه. ورقاتها ستانيه. ازهارها صفراء اللون
شبت	عشب حويله منتصبه. اوراقها مركبه عيطيه. ازهارها يضاء. يزورها صغيره محدده
شرعطل متقي	عشب معمر. اوراقها مركبه مشرحة النصال. ازهارها يضاء. يزورها دقيقه خضراء
شقيق النعمان اللبلول	عشب صغيره معمر. اوراقها مركبه عيطيه. ازهارها كبيره قمرزيه. يزورها كرويه
شيار حلو	عشب معمر فرعاء. اوراقها مركبه ريشه. ازهارها صفراء. يزورها صغيره
شمره بحره	عشب صغيره معمر. اوراقها لحميه مركبه. ازهارها يضاء ثمارها يضيئه محدده
شمرضاض عارض	عشب عارشه معمر. اوراقها منقعه اهليلجيه. ازهارها ارجوانيه اللون
شنتجار غزلي	عشب غشوشيه معمر. اوراقها صغيره ضيقه مزرقه. ازهارها يضاء. يزورها كرويه صلبه
شوكه مباركه	عشب حويله فرعاء. اوراقها كبيره مضلعه حليه الزغب. ازهارها صفراء
شوكران	عشب حويله ليفيه الساق. اوراقها مركبه. ازهارها يضاء. ثمارها كرويه صغيره
شولاه	عشب غشوشيه معمر. اوراقها ثلاثيه التفصيص. ازهارها عطريه صفراء
شيلك	عشب راتليه معمر. اوراقها مركبه ثلاثيه خشه. ثمارها شموليه مأكوله
شيار معروف	نبات لحمي معمر. الساق وقروها الواح كبيره يضيئه. ازهاره كبيره نازحه اللون
صنتر شائع	عشب معمر فرعاء. اوراقها يفسيه خمليه النصال. ازهارها ورديه
صفصاف ابيض	شجرة منبسطه الفروع. اوراقها ستانيه النصال. ازهارها شريشه صفراء
صنوبر بري، برز	شجرة كبيره. اوراقها هديه شفعيه. اكوازها مردنيه. يزورها دقيقه مجتمعه
طوفرون غزلي	عشب معمر ليفيه. اوراقها اهليلجيه مستننه. ازهارها حمراء
طهيرة بلورية	عشب لحميه حويله. اوراقها لحميه كبيره. ازهارها يضاء. يزورها دقيقه موداه
عافر قرعا	عشب حويله فرعاء اوراقها ريشه ثنائيه التقليل. ازهارها صفراء. يزورها مجتمعه
مباد الشمس السنوي	عشب حويله. اوراقها منقعه قلفيه خشه. ازهارها كبيره صفراء. يزورها وثديه
مراوة ملكة المروج	جنبه معمره فرعاء. اوراقها مركبه ستانيه وثريه. ازهارها الى الخضار الباهت
مرمر شائع	جنبه معمره فرعاء. اوراقها ابيده هديه. ثمارها عتيبه حلوه اللذاق عطريه
مرمر كادي	شجيرة فرعاء. اوراقها ابيده هديه. ثمارها نوية حصيه القه والشكل
مرق الذهب المخزني	جنبه حويله معمر. جلصورها عيطيه. اوراقها منقعه صغيره. ازهارها فرديه
مرق انجبار	عشب مداده معمر. اوراقها مركبه خماسيه. ازهارها كبريتيه اللون
مرفلون غزلي	عشب حويله فرعاء. اوراقها صغيره منشاريه الحافه. ازهارها ورديه
عروق الصباغين	عشب معمر فرعاء. اوراقها مركبه مغرشفه. ازهارها صفراء اللون

الأجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأكزاز والخشب	صحبته قابضة ، مضادة للتزيف وتفيد البراسير
الأوراق والأزهار	ستحليها يقوي القلب والمعدة . مغليا يفيد السعال الديكي والزلة الوافدة
البزور	مسحوقها مسهل خفيف ، معطس ، يدرّ اللعاب ، استعمالها خطر
ثمار	عصيرها مضادّ للاسهال
البزور والأوراق	مسحوقها وتقيها هاضم ويدرّ البول
الأوراق	ستحليها يفيد التهاب اللوزتين غرغرة . ويشفي الجروح
الحصبة	صحبته تقيد طين الأذنين . مهروصها يقضي على الأورام والمعامل لصفًا
الايرومة والأوراق	مهوس الأوراق ليدًا يفيد التهاب الأعصاب وعرق النساء والدرالي . مسحوق الايرومة للتزيف للمهبل
الزهار والأوراق	ستحليها يدرّ البول ويفيد التهابات الكلى والمجاري البولية
الأوراق	تقيها مسهل شائع الاستعمال
الأوراق	تقيها مسهل شائع الاستعمال
الدواء	مغلي المسحوق أو تقيها قابض
الدوخة والبزور	مستحضراتها تقيد داء النطفة وتقضي على التقرس
الجذور	تقيها مسهل خفيف . مغليا يفيد التهابات الكلى والكتانة والحنجرة
الايرومة	مغليا منقث ويفيد الملل الصدرية
الأوراق	القليل من عصيرها مسهل . الكثير منه ماسط
العشبة يرستها	مغليا مقو ويقي الدم ويفيد البرقان والأمراض الجلدية
الأزهار	مغليا طارد للديد من أي نوع كان
الأوراق واليذور	تقيها يفيد الملحة والأمعاء ويمنع الارق ويدرّ البول
البذور	مغليا يفيد الأمراض الصدرية ويبلغ الحصى ويترّ البول ويسترّ الاصاب
العشبة يرستها	عصيرها أو مسحوقها الجفاف مضاد للزلة . مسكّن ومطعم
الجذور والبذور والأوراق	مغلي الجذور والأوراق يدرّ البول . مغلي البزور منه ، يدرّ الحليب والطمث
الأوراق وثمار	عصارة الأوراق وتقيع ثمار طارد للديد
للدواء	مسحوقها يفيد الملل الحسية ويسكّن ويقيد الملحة
البذور	مغليا يفيد علل السالك البولية وقد يلبب الحصى ويفيد في الزنطاري
الأوراق والأزهار	مغليا مقو ، دافع للحصى ، وضييقها دامل للجرح
الأوراق وثمار	تقيها مضادّ للتشنج ويفيد الربو والسعال الديكي . استعمالها خطر لانها سامة
الأوراق والأزهار والجذور	الأوراق والأزهار مطبوخة ، الجذور مضادة للتشنج والصرع والرقص الزنجبي
الايرومة والجذور	تقيها يدرّ البول وقابض ، مغليا يفيد التقرس ويذيب الرمل
الألواح	عصارتها مقوية للقلب . تقطع الزحار والاسهال
الأوراق والأزهار	مغليا يسكّن الشنجات الحسية . مسحوقها ينشط الشهية ويترّ البول
للدواء	مغليا مضاد للالتهاب والحصى ، يقرّح ، يسكّن الآلام ، يدرّ البول
البياض	مغليا يدرّ البول ويفيد التزلات الشعبية
الأوراق والأزهار	مغليا مقو ، محرّض ، هاضم ، يفيد علل الطحال
الأوراق	مغليا يفيد حصر البول والسعال التشنجي . مهوسها يفيد الحروق والجروح
الجذور	مسحوقها يدخل في عدة تركيب طبية اخضا معجونات الانسان
بتلات الأزهار	مغلي البتلات مضاد للحميات والملازيا . ولعابجة نوسحات القصبة الهوائية
الجذور والأزهار	الجذور قابضة ، تدرّ البول ، تقطع التزيف . تقح الأزهار يفيد الاستسقاء والالتهابات
ثمار	تقيها يقي الدم ، يدرّ البول ، يفيد الملل الكبدية والسالك البولية وتنشّاف الشرياني
الأوراق	تقيها مسهل وطارد للديد
الجذور	مسحوقها مقو ، منقث ، مضاد للاسهال . استعمالها خطر يوجب الحذر الكلي
الجذور	التكيد بمحتله يقضي على الأكزما ، للضمضة تقيد تزييف اللثة
العشبة يرستها	مسحولها يفيد الرشح والتزلات الشعبية ، ويقرّي المعون ، يفيد الرمد
العشبة يرستها	عصارتها تقضي على التاول . خلاصتها المائمة تقيد المعدة والأمعاء وتهيأ للمرارة

النبات	الصلحية
صم سندي	جنية معمرة فرعاء. اوراقها بيضيه ازهارها ورديه. يزورها دهنه
عشب القوى القويّة	عشب مدادة معمرة. اوراقها مركبة ثنائية الصف. ازهارها كبريتيه اللون
عُش جبار	شجيرة متبادلة الفروع. اوراقها ابيدة سنائيه بارزة العروق. ازهارها ورديه
عققة مبهلولة	جنية متسلقة معمرة. اوراقها ابيدة جلدية النصال. ازهارها يضاء. ثمارها نووتة
عُقد مزدوج السنايل	جنية معمرة فرعاء. اوراقها كالحراشف. ثمارها عنية
عنب الدب، عيران	جنية معمرة فرعاء. اوراقها ابيدة صغيرة. ازهارها جلجلية ورديه. ثمارها عنية
عود الانبياء	شجرة متوسطة الحجم. اوراقها مركبة شفعية. ازهارها زرقاء. يزورها صفراء اللون
عود الريح	عشب جلدمورية معمرة. اوراقها عصبية قرصية الانتشاب. ازهارها صفراء اللون
عصعج شائع	جنية شائكة معمرة فرعاء. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها ورديه. ثمارها شاميل كروية
عينون حطر	بجلة ليفية معمرة. اوراقها ابيدة ملتحمة جامدة. ازهارها عطرية زرقاء اللون
غافث خلواني	عشب معمرة شائكة الساق. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها عطرية صفراء اللون
غاليلون حقيقي	عشب فرعاء مضطمة الساق. اوراقها ضمية صغيرة خضيلة. ازهارها الى الصفرة الزاهية
غاليلون صليبي	عشب فرعاء مضطمة الساق والفروع. اوراقها بيضة ضيقة. ازهارها صفراء اللون
غيراء الحابلين	شجرة فرعاء. اوراقها مركبة وثريّة. ازهارها بيضاء كبريت الرائحة. ثمارها صغيرة كروية
غراسولة غزيرة	عشب جلدمورية معمرة. اوراقها ضيقة مسننة. ازهارها بيوتية وردية
غرندلية ضليحة	جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنائية جامدة. رؤسائها الزهرية صفراء اللون
غروق حطر	عشب معمرة فرعاء. اوراقها مفضضة مشرمة. ازهارها الى البياض الليلي المواج
غفت ابن سينا	عشب ليفية معمرة. اوراقها مركبة سنائية النصال. ازهارها ورديه. يزورها دقيقة
غلقة	جنية معمرة مداعة. اوراقها اهليلجية شديدة الخضار. ازهارها يضاء. ثمارها كعابر
فلأر يضاء	جنية متسلقة معمرة. اوراقها كثة مقرضة. ثمارها عنية. ثمارها زيتية اللباب
قاعية الختان	بجلة معمرة فرعاء. اوراقها ضيقة النصال. رؤسائها الزهرية يبيض اللسنيات
فجل حارّ	عشب حولية غليظة الجذر. اوراقها مستطيلة مقرضة ومسنة. يزورها كروية
فراسيون ابيض	عشب معمرة فرعاء. اوراقها يضية خشنة مسنة ازهارها يضاء
فراسيون ازغب	عشب عملة زهاء. اوراقها خشنة مزغبة ومسنة. ازهارها حمراء مرقوشة بالايض
فراسيون اسود	عشب معمرة فرعاء. اوراقها خملية النصال للسننة. ازهارها جزوتية منفرة
فراسيواز، عوصج ايله	جنية اوسلية معمرة فرعاء. اوراقها مركبة مزغبة مسنة. ثمارها شاميل مأكولة
فريون لسيرس	عشب ليفية عملة مداعة. اوراقها متصالبة سنائية. ازهارها وردية
فريون مخزني	جنية معمرة فرعاء. اوراقها اهليلجية جامدة النصال. ازهارها يضاء اللون
فشاغ مخزني	جنية ليفية معمرة. اوراقها قلبية جامدة النصال. ازهارها صغيرة صيرائبة
فلفل كبابه	شجيرة سريعة الفروع. اوراقها اهليلجية جامدة. ازهارها مرجائبة. ثمارها كروية
قوة	عشب جلدمورية معمرة. اوراقها ضمية متقابلة سنائية مزغبة. ازهارها صفراء
فولس حويصلي	نبات مجري قلدي الجذور والسوق والاوراق. لونه الى الخضار الاحبس
فول	عشب حولية جولاء الساق. اوراقها شفعية. ازهارها يضاء ككثفة الملب
فول كلابار	جنية عارشة معمرة. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها ارجوانية. ثمارها قرون تغلف الحبوب
قات	جنية معمرة فرعاء. اوراقها ابيدة اهليلجية بارزة الضلع مسنة. ازهارها خضراء اللون
قبطيس تيه، عيط ذهبي	عشب حولية صغيرة. اوراقها صغيرة مقرضة. ازهارها قرنية يضاء اللون
قنوايه	جنية معمرة فرعاء فناء. اوراقها سنائية جامدة. ازهارها وردية مرقوشة
قنّاء بريّ	عشب حولية مدادة. اوراقها ممثقة كبيرة. ازهارها صفراء. ثمارها ريفية صفراء
قراض يحرّق	عشب حولية فرعاء زهاء. اوراقها ناشرة العروق مسنة ككثفة الملب. ازهارها خضراء
قزة	عشب مائية معمرة. اوراقها مركبة ثلاثية. ازهارها برتقالية اللون
قرطم الصباغين	عشب حولية سرحة. اوراقها سنائية بارزة العروق. ازهارها برتقالية اللون
قرقة سرديب	شجرة منتصبه فرعاء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها عقودية غيراء. ثمارها عنية
قرنغول	شجرة فرعاء فناء. اوراقها ابيدة جامدة. ازهارها عقودية صغيرة حمراء. ثمارها نووتة
قسرة راحية	جنية عارشة. اروتها معمرة. ساقها حولية. اوراقها كثة خاسية التضصيص. ازهارها تبنية
قطرم الحرق، خشبة الحرق	عشب معمرة فرعاء. اوراقها سنائية مسنة. ازهارها عطرية يضاء

الاجزاء الصالحة	التألف والاستعمال
للحاء	مسحوقها يذيب الحصى الصفراوية
العشبة برنتها	تقيحها او مغليا يفيد جميع انواع التشنجات ويوقف النزيف
الجذور والحاء	للحاء نفيد الاسهال والقرطاري. الجذور لمعالجة الامراض الجلدية. قليها مقو، كثيرا مقيء
الاوراق والثمار والحاء	الثمار مسهلة خفيفة، الاوراق والحاء نفيد السفلس والقولاء
الانفاد المزهرة	مغليا يفيد داء الفواصل
الاوراق	مغليا قابض، يدر البول، يطهر الكلى ويفيد مجاري البول ويسهل الطاق
الخشب	صيته تليد اضطرابات الحصى والنقرس. مسحوقه يفيد السفلس
الجذور	صيته او مغليا تقوي الجهاز العصبي وتساعد الحضم ويفيد التلات الصدرية
الثمار والاوراق والجذور	عصير الثمار منشط ومضاد للحصيات. مغلي الاوراق يفيد اللدة. مغلي الجذور لربل الكلى
الاوراق والازهار	مغليا يفيد الحيات للطفلة والقيس للمستعصي. استعمالها حذر
الاوراق	مهلوسها او تقيحها يفيد الامراض الجلدية وغشاة العين والتهاب الحجرة
العشبة برنتها	مغليا قابض خفيف، مضاد للتشنجات والاسهال، مرقق
العشبة برنتها	مغليا مقو ويفيد للدة
الثمار	عصيرها او مستحليها مقو، منفض، مضاد للحرق والقرحار، يدر البول.
الجذور	مسحوقها مسهل خفيف، مقيء، يدر البول. استعمالها خطر يوجب شدة الحذر
الاوراق والازهار	مغليا منشط، يفيد الري وقطل الروية والسعال الديكي
العشبة وازهارها	يستعمل مستحلب الاوراق والازهار ضد القضم. اوراق الهورسة تنفي القروح
الاوراق	مغليا يفيد الكبد والتهابات المرارة وقد يحلل الرمل
الجذور	تقيحها منبه، مرقق، مؤوج ويذر البول
الجذور	عصارتها مسهل خفيف. استعمالها شديد الخطر. يقال انها تحرق الشعر
الاوراق والازهار	مغليا مضاد للتشنج، طارد للغازات، يدر الطمث والبول
الجذر	مستحلبه يدر الصفراء ويفيد احتقان الكبد والري والسعال
الاوراق	مغليا منفض، يفيد السعال، خافض للحرارة ويذر الطمث
الاوراق	مغليا يفيد الامراض العصبية والاستسقاء ويذر البول وينجب الحامض البول
الاوراق والازهار	مغليا يفيد للنص والسعال الديكي، مضاد للتشنج
الثمار	عصيرها يدر البول، مرطب، ملين
الاوراق والجذور	عصير الاوراق يحرق الشعر. الجذور مفتة ومقينة، استعمالها خطر
عصارة الساق	استعمالها خارجي ولا يجوز الا بمعرفة الطبيب
الجذور	مغليا يفيد الرشوحات والامراض الجلدية
الثمار	زيتها يفيد المالك البولية والسيان والتهاب الحجرة والتلات الشمية
الجذور	مغليا يفيد الكساح، مقو، هاضم، يدر الحصى والصفراء. يفتت الحصاة الفوسفاتية
النباتات كما هو	مغلي يزيل السمعة وتضخم الغدة الدرقية ويفيد تصلب الشرايين
الازهار	مغليا يدر البول. يفيد الرشح والمساك البولية، يذيب الرمل
الحبيب	مستحضراتها عديدة توصف بأمر الطبيب
الاوراق	القليل من مغليا يقوي الدماغ. استعمالها خطر
الجذور	مغليا مقو
الاوراق والحاء	خلاصتها السائلة تاعوظ مشهور. مضادة للسفلس وعشقة الفطخ
الثمار	عصارتها او مغليا مسهل خفيف يستعمل في الاستسقاء والشلل واحتقان الملح
العشبة الزهرة برنتها	مستحليها ينقي الدم ويعتد الشباب. بلورها مثرة للرغبة الجنسية
الفروع والاوراق والازهار	عصيرها مضاد للحرق، يفيد الطل العصبي وداء الخنازير. منبت ويذر اللعاب
البزور	مغليا مسهل ويفيد المال العصبي
للحاء	مسحوقها يبه الاغصان وينشطها، يقوي القلب، مضاد للتشنج
الازهار	صيتها ومغليا منفضة، محرقة، مضادة للغازات
الجذور	تقيحها مقو نشيط ويفيد للدة
الازهار	تقيحها يفيد اللدة، طارد للريح، مطح

البيات	الوصلة
قام آسي	جنية معمرة فرعاء فتاه. اورالها آسيه جامدة. ازهارها وردية. ثمارها عتيبة مأكولة
قنب	عشبة حولية. اورالها كفتية مركبة وثرية. ازهارها ثنائية للسكن. يزورها مكورة
قنة مهجونة	عشبة معمرة. اورالها مركبة قلبية الوريقات. ازهارها ثنائية
قتليل جدول	شجرة كبيرة لارضة. اورالها مركبة وثرية. ازهارها عتقونية. ثمارها كستنية الشكل والقد
قنصور شائع	جنية معمرة. اورالها مركبة وثرية. ازهارها برفالية اللون. ثمارها سنبلية
قنطريون صغير	عشبة معمرة فرعاء. اورالها رحيمة صغيرة. ازهارها وردية اللون
قوسية مخزنية	عشبة معمرة زياه فرعاء. اورالها صغيرة عمليّة النصال كالفورية العرف. ازهارها عطرية بنفسجية
قيصوم، رمان الأرض	جنية لينة فرعاء. اورالها بسيطة خطية. ازهارها ذهبية اللون. ثمارها لينة كحب الآس
كافور	شجرة كبيرة دائمة. اورالها اهليلجية جامدة. ثمارها زيتونية نوية
كثبان شائع	عشبة حولية صناعية. اورالها سنبلية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها جراه. يزورها زنبية
كراويا	عشبة عملة. اورالها ريشية مفلوكة. ازهارها صغيرة بيضاء. يزورها زنبية
كرفس	عشبة حولية ضخمة الجفت. اورالها قرصية الانتشاب مركبة. ازهارها بيضاء ممتحة بالاحضر
كرفس الماء	عشبة معمرة خليقة الجذر. اورالها مركبة وثرية. ازهارها بيضاء. ثمارها ككامير. يزورها دقيقة
كركم صباغي	عشبة صفولية معمرة. اورالها سنبلية مستطيلة. ازهارها سنبلية صفراء اللون
كروتن الثرى	جنية فرعاء. اورالها رحيمة جامدة. ازهارها جميلة. ثمارها حبوب شبيهة بالخروج
كررة البر	عشبة جنسورية معمرة. زناد اورالها ثنائي الانتشاب رباعي القروخ المروحة صغير الوريقات
كررة مزروعة	عشبة حولية فرعاء. اورالها مركبة مقرحة مشترية. ازهارها وردية. ثمارها يزور دقيقة
كستة	شجرة ضخمة دائمة. اورالها ناشرة العروق منشارة الحافة. ثمارها مأكولة اللباب
كشمش أحمر	جنية فرعاء فتاه. اورالها خلية مفلقة ومسننة. ازهارها موشحة بالاحمر. ثمارها مأكولة
كشمش اسود	جنية فرعاء فتاه. اورالها خلية مفصصة ومسننة. ازهارها حمراء. ثمارها مأكولة
كشوث السعز	نبات طفلي غطي ملتف. اورالها حرشفية دقيقة. ازهارها وردية
كالبه المروج	عشبة معمرة فرعاء. اورالها خلية مقرحة ناشرة العروق. ازهارها صفراء اللون
كشون	عشبة حولية فرعاء. اورالها مهلكة. ازهارها بيضاء. ثمارها ككامير. يزورها صغيرة
كنكلييه، عسم ربيع	شجرة صلبة فرعاء. اورالها مائسة النصال عاتقة الخضار. ازهارها وردية. ثمارها يزور
كنكينيا	شجرة فرعاء حمراء اللحاء. اورالها كبيرة النصال. ازهارها خنوية. ثمارها جراه يزورها دقيقة
كهنسة	شجيرة متسلقة فرعاء. اورالها جامدة النصال. ازهارها وردية. ثمارها لحسية عافسة
كوشاد اصفر	جنية سرحة مستغلطة الجذور. اورالها كبيرة. ازهارها صفراء اللون
كوكا	جنية معمرة فرعاء. اورالها اهليلجية ناشرة العروق. ازهارها صفراء. ثمارها نوية حمراء
كولا، كوله	شجرة قارضة. اورالها ابيدة جامدة. ثمارها قرون مبطلعة تلتف من لوزتين الى عشر لوزات
كبس فراعسي	عشبة حولية. اورالها لاياسية. ازهارها زرقاء اللون. ثمارها غرينيات. يزورها خردلية
لاييون ايض	عشبة معمرة فرعاء. اورالها سنبلية منشارة الحافة. ازهارها عطرية بيضاء اللون
لئين شالكة	جنية معمرة شالكة. اورالها سنبلية مسننة. ازهارها وردية
لسان الحمل السائي	عشبة معمرة مقرّة. اورالها قرصية جامدة النصال. ازهارها ثنائية
لسان الحمل الكبير	عشبة مسرة مقرّة. اورالها قرصية ملطية جامدة النصال. ازهارها صفراء اللون
لسان الكلب المخزني	بلعة معمرة فرعاء. اورالها سنبلية عمليّة النصال. ازهارها حمراء اللون
لوشيا ناعمة، حشيشة الجرح	عشبة مستطيلة الساق. اورالها مركبة وثرية. ازهارها صفراء. يزورها صغيرة
مازريون، دفنة سامة	جنية صغيرة معمرة فرعاء. اورالها جلدية النصال. ازهارها انوية عطرية. ثمارها حنية
مثنان، دفنة لاحقة	جنية معمرة فرعاء. اورالها عروة مستطيلة. ازهارها عطرية بيضاء. ثمارها حنية
مرآن شامخ	شجيرة باسقة فرعاء. اورالها وثرية. ازهارها بيضاء خضراء المواج. ثمارها جناحية
مشتركة فيرجينية	جنية معمرة فرعاء. اورالها يضيبة مسننة الحافة. ازهارها صفراء اللون
مضاهض أسود	شجيرة فرعاء. اورالها اهليلجية مسننة الحافة. ازهارها مجنونة. يزورها صغيرة
مئل	جنية فرعاء شالكة. اورالها مركبة ثلاثية. ازهارها فردية. ثمارها جراه
مكنانة مخزنية، مناب الماعز	بلعة معمرة فرعاء. اورالها مركبة وثرية. ازهارها الى الثرقعة
مسننة، فساء الكلب	عشبة حولية فرعاء. اورالها اهليلجية مخزنية. ازهارها بيضاء كحب الراحلة

الأجزاء الصالحة	للتأثير والاستعمال
الثمار	عصيرها يشفي الأمراض الجلدية الرطبة. مغليها يقطع الإسهال
البزور	مغليها يسكن تشنجات الأطفال ويفيد الربو والسعال
عصارة الساق	عَرَضَة، مَطْوَرة، مَنِيَّة، مضادة للتشنج، منقعة وتدرّ الطمث
تشور الثمار	مغليها مضاد لتجلط الدم، يفيد في معالجة الدوالي والبروسير واحتقان الكبد
البزور	مغليها ملين أو مسهل
العشب باستثناء الجذور	تقيها أو مسحوقها يفيد ضعف المعدة وينشط الشهية ويفيد فقر الدم
الأوراق	مسحوقها يفرّي الأعصاب ويكالفح الغم عند النساء. يفيد السعال الناشئ والتزيف الرحمي
الأزهار والثمار	مغليها مقو، منبه، مضاد للحمّيات، يزيل الطغيع الحمر من الجلد
زيت الكافور	جاف ومضاد للتشنج
البزور	اللبنة الساخنة تسكن آلام المعدة ويفيد التهاب الغدد النكفية وللصفارية
البزور	مسحوقها مقو، هاضم، يفتح الشهية، يدرّ اللعاب، ينشط العصائر المعدية
الجفت والأوراق	تنفث الصدر وتحلّل الورم وتدفع الحصى وتفتح الشهية
الجذر والأوراق والبزور	الجذر والأوراق مضادة للحرق وتدرّ البول. البزور مهيجة للقوة الجنسية
المساقل	تقيها ومغليها منمش ويدرّ البول
المحروب	مسحوقها منقطع، مسهل شديد الريح. تستعمل بمعرفة الطبيب
العشب برئتها	مغليها مضاد للسعال
البزور	مسحوقها ومغليها عَرَض، هاضم، يفيد القلب والاضطع الحوي
الأوراق	مغليها مضاد للسعال التيكسي
الثمار	عصيرها يدرّ البول ويفيد من الملل المعصية والقرس والشرور
الثمار والأوراق	عصيرها مرطب، هاضم، يفتح الشهية. مغلي الأوراق يفيد في التهاب المفاصل
النبات برئته	منليه يقضي على التقيض للصحى ويدرّ الصفراء
الأوراق	مغليها شاق ويوتر اغشية الكبد. يفيد الاقرازمات للهلية وينظم الحيش
البزور	مسحوقها ناعظ اذا مزج مع الفلفل والمسل. منبه للاعماه، طارد للغازات
الأوراق	تقيها يذيب الحصى الصفراوية ويفيد في بعض الحمّيات
التشور	مسحوقها مقو، دافع للحمّيات
الأوراق والثمار	عصارتها مقوية
الجذور	عصيرها منير للشهية، منمش، مقو، يحفض الحمّيات
الأوراق	تقيها ومغليها مقو، مضاد للاوجاع المعصية
الثلوزة	مأكولة منبهة مقوية، منشطة، تدرّ البول
العشب برئتها	مستحلب الأوراق والأزهار يفيد الاسااك الزمن، مرقق، مضاد للسعال ويدرّ البول
الأزهار	مسحوقها ينظم الحيش ويمنع اضطرابه ويمنع السيلائن الأبيض
النبات برئتها	تقيها يفيد الأمراض الكلوية والعلل المعصية ويدرّ البول
الأوراق والأزهار	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والإسهال
العشب قبل التبدير	عصيرها دافع للحصى ومضاد لتجلط الدم والإسهال
الجذور	مغليها بخدر، مسكن، مضاد ليعق الدم والإسهال
الأوراق والأزهار	مهورسها يطهر الجرح ويكفه ويقضي على الالتهاب
للحاء	تقيها او مغليها منقطع، مرقق، مهيج، يدرّ البول. الاستعمال عطر يوجب الحذر
للحاء	منقعة كآوبة
الأوراق واللىحاء	للحاء دافعة للحمّيات. الأوراق ملينة، مرققة، مقوية، تدرّ البول
الأوراق واللىحاء	مسحوقها ومغليها قافض، مضاد للتزيف. يفيد الملل الشرايكة والاحتقانات
للحاء	مسحوقها مسهل، يفرز الصفراء. يقيد الكبد والمرارة
عصارة الساق	منقعة، مقوية، مضادة للتشنج
الأزهار	تقيها يدرّ الحليب ويفيد السلس. خللاضتها او مغليها علاج للسكري
الأوراق والأزهار	تقيها ومغليها مضاد للتشنج ويدرّ الطمث

النبات	التعليق
مشور اصفر، خيري اصفر منكة نادرين مغربي	عشبة معمرة صغيرة. اوراقها سنائية عمليّة. ازهارها عطريّة صفراء. بزورها مستديرة مبطنّة شجيرة معمرة فرعاء. اوراقها خليّة عمليّة. ازهارها ليلكيّة. ثمارها حنيّة عشبة معمرة. اوراقها مركّبة وثريّة. ورقاتها سنائية مسنّنة. ازهارها ورديّة
نبق اسود نبق سهل نجير زاحف نسرين نمّع زراعي نومان اسود	شجيرة فرعاء. اوراقها بيضيّة ناشرة العروق، ازهارها خضراء اللون شجيرة شالكة فرعاء. اوراقها بيضيّة جامدة. ثمارها خويضة بتسجعيّة عشبة جلمودية معمرة. اوراقها عصبية صغيرة. ازهارها سنائية التجميع جنية معمرة فرعاء شالكة. اوراقها مركّبة وثريّة. ازهارها غبراء. ثمارها نوويّة عشبة معمرة مدّادة. اوراقها سنائية ناشرة العروق مسنّنة الخثار عشبة معمرة فرعاء. اوراقها بيضيّة. ازهارها بيضاء. ثمارها يزور نشوّة المادة عشبة معمرة مقرّرة. اوراقها قرصيّة الانتشاب مسنّنة. ثمارها جراء نبات جلمودي معمر. اوراقه سنائية كبيرة. ازهاره سنيليّة. ثماره جراء نبات طفيل معمر. ساقه مدّادة. اوراقه صغيرة جامدة. ثماره نوويّة دافئة عشبة جلمودية معمرة. اوراقها كلفيّة مضفّضة. زهرتها وحيدة بيضاء جنية معمرة فرعاء شالكة. اوراقها بيضيّة جامدة. ثمارها نوويّة زيتونيّة عشبة جلمودية معمرة. اوراقها قرصيّة. ازهارها صفراء. ثمارها جراء
هندب، طرخشقون هندباء بريّة مضبان، فجل الخيل وفير مدّاد وژال يوهبة	عشبة معمرة مقرّرة. اوراقها قرصيّة مستطيلة مقرّشرة. ازهارها صفراء اللون عشبة حوليّة حزائيّة الجذر. اوراقها مقرّشرة. ازهارها زرقاء اللون عشبة معمرة وتليّة الجذر. اوراقها سنائية. ازهارها صغيرة بيضاء. بزورها زيتيّة نبات معمر مدّاد. اوراقه عروّة بيضيّة جلديّة النصال. ازهاره جلجلية بيضاء جنية معمرة فرعاء. اوراقها سنائية صغيرة. ازهارها عطريّة صفراء شجيرة كبيرة داححة. اوراقها ابيدة بيضيّة حامدة. ازهارها بيضاء اللون صفراء المواج

٢٨٤١٩ - نباتات مُتَحَجِّر

Phytolithe

٢٨٤٢٠ - نباتات مُقَعَّدَة ، اَمْع

Plantes épiphytes (F). Epiphyte plant (E).

كل نبات يعيش على نبات آخر دون أن يستمد منه غذاءه .

٢٨٤٢١ - نباتات بِعُورِيَّة

Plantes marines (F).

Sea weeds (E).

هي النباتات المائية التي تعيش في البحار .

٢٨٤٢٢ - نباتات بِمَنَاطِيَّة

Plantes d'appartement (F). Apartment plants (E).

هي النباتات الزينة التي تُزَرع في المراكن وتعيش في المساكن .

٢٨٤٢٣ - نباتات جُمَالِيَّة

Plantes vénéneuses (F). Poisonous plants (E).

هي النباتات التي تحوي بعض العناصر الجسمية المؤذية أو المبيدة وهي : شديدة ، اشهرها ما جاء في الجدول التالي :

نوع النبات	الأعضاء الجسمية
أرطاة	الجذور
أروم ، ترياق أبيض	الأروية والأوراق
أزديشت	الجذور والثمار
أخمين ، شوك الملك	الجذور
اشقيل بحري ، عضل بحري	جميع الأعضاء
أطرب ، ست الحسن	جميع الأعضاء
الطروس	الأوراق بعد اكتمال نموها
أقي	جميع الأعضاء
أكزيت ، بيش	جميع الأعضاء
أكيلاجيا عقابية	جميع الأعضاء
أمارلس ، شيك	جميع الأعضاء
أيلنطس	الأوراق
أليس ، شمشاد	جميع الأعضاء
أينج	جميع الأعضاء
أيتسج	الرواكب واليزور
بومير ، مسكر الحوت	البزور
ترمس	جميع الأعضاء
تمم	جميع الأعضاء
ثلثان	الثمار
ثليب	الجذور
جبقيل ، حامول ، سبج	جميع الأعضاء
أبنوس كاذب	جميع الأعضاء
أجل ، حرمر سيته	الأوراق
أدوتيس ، زغاليل	الجذور
أذريون الماء ، قرفوس	جميع الأعضاء وتفقدها بعد التجفيف

الأجزاء الصالحة	المنافع والاستعمال
الأوراق والأزهار الثمار والجذور	مغليا يسكن الآلام العصبية والصداع ، ويقوّي القلب ، يدرّ البول . مضادّ للتشنج مسحوقها طاسث ، يجهض ، يقضي على الروماتيزم مسحوقها أو نقيها أو مغليا مضادّ للتشنج والصرع العصبي ودافع للحصى ويسكن وطارد للديدان
الحلءاء	مسحوقها ومغليا ملين وسهل
الثمار	عصيرها سهل
الجذور	مغلي مرطب ، يدرّ البول ، يفيد في الروماتيزم العضلي وداء الثفرس والتهاب المثانة
لبّ الثمار	منهض نشيط يقوّي مناعة الجسم . مسحوق الثبلات الجفّة يفيد التسلّحات
الأوراق	مغليا منهض عام . يفيد للعدّة . يسكن التشنجات ، يدرّ الصفراء
العشب برستها	مغليا يفيد التهاب الكلى ويدرّ البول
العشب برستها	مغليا مسكن للسعال الديكي ، مفيد للأمراض الصدرية اخسها الحلّ
الجذور والبزور	بزور مقوية ، حاضمة . ادهان البزور والجذور منقّية للقلب وقوّة الجنسية
الثبات برمتها	مغلي مخفّف للضغط الشرياني ، مضاد للتشنج ، يفيد الصرع واضطرابات الحصى
الثمار	مسحوقه ومنهلي يفيد للسالك الشرايية والبراسير والتزريف
الجذور	الناضجة ملينة . طبخة مسهلة ، طاردة للودود
	مغلي مقوّ ، يفيد انحطاط الاعضاء التناسلية ، يدرّ البول . يفيد سيلان الرحمي والحصى والاحتلام
الأوراق والجذور	مستحلبا مقوّ ، ينقي الجسم ، يفيد الكبد ، يدرّ البول
الأوراق والجذور	عصيرها يفيد احتقان الكبد ويقضي على البراسير وينقي الجلد من الدمل
الجذر	عصيرها منهض قتال يفيد للعدّة ويدرّ البول . مضادّ لداء الخفر
الأوراق والأزهر	مغليا قابض مضاد للاسهال
الأزهار	نقيع ازهارها الغضة يدرّ البول . ينهب الحصى الكلوية . يفيد للزلال والورم
الحلءاء	مسحوقها منقّظ . ويدرّ الحصى . ويكافح العدّة

نوع النبات	الأعضاء الجعالية	نوع النبات	الأعضاء الجعالية
جلسان	الأوراق والأزهار	دفنة سامة ، مازويين	جميع الأعضاء
سربل	الأوراق والأزهار	دليوث	الساق والأوراق والأزهار
حشيشة الفقراء	جميع الأعضاء	دند	البزور والكعب
حشيشة القمل	جميع الأعضاء	دقة ، زوان مسكر	الحب
حليوب	الأوراق والأزهار	دمجيثال ، زهر الكشتاتين	جميع الأعضاء
حمض النّيم	الأوراق تؤذي الدواب	ذرة صفراء	الأزهار الأكرية
حنظل	جميع الأعضاء اخسها الثّار	رازاياته	المجلور والأوراق
حيدّان	جميع الأعضاء وثقدها يهد	رشاخ	البزور
	التجفيف	رأس المنافع	الجذامير
حمّ العالم ، حيون	جميع الأعضاء	زراونه غلياني	الأوراق والثّار
خرشق	جميع الأعضاء	زئبق الوادي ، ذقة	جميع الأعضاء
خرشق	جميع الأعضاء	سذاب	الأوراق والأزهار
غرود حقل ، لسان	الأوراق يهد الأزهار	سريره ، حمام	عصارة السوق
مخرم الحنطة	البزور	سقمونيا	عصارة السوق
مخروج	البزور والكعب	سكك ، بخود مرم ، عرطنيا	المساق
عشقاتش منوم	جميع الأعضاء اخسها الكعاب	سماق جمالي	الأوراق
غناز بريّة	جميع الأعضاء	ستليل ، سم السمك	لباب عجائه
عوشان ، قرقد	جميع الأعضاء	سورجان	جميع الأعضاء
داتورو	جميع الأعضاء	سون اصفر	جميع الأعضاء
داذي ، هيذاريقين	جميع الأعضاء	سون المنافع ، برييت	جميع الأعضاء
دغل ، حبن	جميع الأعضاء	شاي المروج ، قصيص	الأوراق والأزهار

٢٨٤٢٧ - نباتات دهنية ، نباتات زيتية
Plantes oléagineuses (F). Oleaginous plants (E).
هي النباتات الممكن استهلاك ثمارها او بنورها لاستخراج
الدهن او الزيت .

٢٨٤٢٨ - نباتات سكرية
Plantes saccharifères (F). Sacchariferous plants (E).
هي النباتات التي يستخرج منها السكر ، اشهرها قصب
السكر والشوندر .

٢٨٤٢٩ - نباتات صبغية
Plantes tinctoriales (F). Tinctorial plants (E).
هي النباتات التي يستخرج منها مواد صبغية .

٢٨٤٣٠ - نباتات صناعية
Plantes industrielles (F). Industrial plants (E).
هي النباتات التي تزرع لاستعمالها الصناعي كالتبغ والقنب
والكتان الخ ...

٢٨٤٣١ - نباتات ضارة
Plantes nuisibles (F). Hurtful plants (E).
هي النباتات الطوعية او الدخيلة التي تكثر بين الزروع
وفي الميائل والحدائق فتستنزف خصب التربة وتسيء الى
النباتات المزروعة || النباتات الضارة كثيرة العدد تقتصر ،
في الجدول التالي ، على ذكر اضرارها واشهرها :


اسم النبات	اسم النباتات
سراخس	انجيليا ام الف ورقة
سمادي	اروم ، لوف مربع
سعد مستدير ، صلب الفجر	اريدارون ، شيخ الربيع
سورتيان الغريف ، قاتل الكلب	اسل
شقار	اكوتيت هرمي ، بيش
شقيق ، همي الدجاج	اسنوخ
شر الكلب	انجبار ، انارف
شوك	تفاف
شوكران	قوم بري
طحالب	ثيل
عراة	جفيل ، حامول ، سيج
عشبة القوي	حردل
عرج ، علق	حشيشة القمل
غيطل	جليوب
فريون ، عنجد ، يتوع	حمض
قرطب	حمض المنافع
قصون	سوزان
قطريون	عرمطك فتوا
كرسة	عرم
كرنس بطني	خان
كشوت	دنفة
لسان ، عرول بري	دوسة الحار ، فرفارة
لبلاب	دوسر
لنين	ديجيتال ، زهر الكشوتين
لسان الحمل	ذيل الثعلب
نجيل	رازيانة ، مشيل
هدال	ريخاخ
هيضان ، فجل الخيل	زوان مسكر

لوع النبات	الاعضاء الجعالية
شقار	جميع الاعضاء وتقدمها بعد التجفيف
شقيق ، همي الدجاج	جميع الاعضاء
شوكران	جميع الاعضاء
صريمة الجدي	الازهار والثمار
مقلاب سوري	عصارة السوق
مقلوس ، ذرب	الاوراق
مننينة	عصارة السوق ولباب البزور
عائق	جميع الاعضاء اعصها البزور
مير	جميع الاعضاء
مرمر فيرجيليه	الاوراق
مروق الصباغين	جميع الاعضاء
مشقة	الثمار
مصل	الاوراق والازهار
عنب الثعلب ، فناء	جميع الاعضاء
مفرو	جميع الاعضاء
فاشرا	الجذور والنبوي والثمار
فاشرشين	الثمار
فريون ، عنجد ، يتوع	الاوراق والازهار والثمار
قناه بري	جميع الاعضاء اعصها لباب التمر
قرطب الزروع	البزور
قنة مقلولة ، كلف	الاوراق حتى الازهار
كرز غاري	الاوراق
كريدان ، مشان	جميع الاعضاء
كلاجة	اللحاء والتجيب
لين المروج ، زغيلة	جميع الاعضاء
لذاح ، يروح	جميع الاعضاء
لكية مشارية الاسدية	الاوراق تؤذي النوايب
لويليه	عصارة السوق
لينتاويه ، حياجب	جميع الاعضاء
مايتا صفراء	الاوراق والازهار
مذيذ	عصارة السوق
مضاض	اللحاء والاوراق والثمار
ممزرون	جميع الاعضاء
ملعى سامة	الاوراق بعد اكتمال نموها
لبق	الاوراق والثمار
هدال	الثمار
هورة	عصارة الساق والبزور
هيضبان	الاوراق بعد ازهار النباتات
ينبوت تن	جميع الاعضاء


٢٨٤٢٤ - نباتات حولية
Plantes annuelles (F). Annual plants (E).
هي النباتات العشبية التي تعيش سنة او دون السنة .

٢٨٤٢٥ - نباتات عكلوية
Thallophytes
صف نباتات نظرية الجرم خالية من الجذور والسوق والاوراق والازهار . اغلب مشريات .

٢٨٤٢٦ - نباتات دنيا
Végétaux inférieurs (F). Inferior plants (E).
هي النباتات السيدة الخلية .



مخطط تسلسل أنساب المملكة النابتية



٢٨٤٣٢ - نباتات طوعية

Plantes spontanées, Végétation spontanée (F).
Spontaneous plants (E).
هي النباتات التي تعيش وتكثر من تلقاء ذاتها .

٢٨٤٣٣ - نباتات عطرية ، روائح

Plantes aromatiques (F). Aromatic plants (E).
هي التي يستخرج منها البطر .

٢٨٤٣٤ - نباتات علفية ، نباتات الكلاء

Plantes fourragères (F). Fodder plants (E).
هي التي تستعمل كعلف للحيوان .

٢٨٤٣٥ - نباتات علفية

Végétaux supérieurs (F). Upper plants (E).
هي النباتات العديدة الخلايا الكاملة التركيب، فيها الجذور والسوق والاوراق والازهار .

٢٨٤٣٦ - نباتات لحمية

Thick-leaved plants, Succulent plants (E).
هي نباتات تحمي الاوراق المكثفة بالماء .

٢٨٤٣٧ - نباتات معنولة

Plantes bisannuelles (F). Biennial plants (E).
هي التي تعيش نحو عامين .

٢٨٤٣٨ - نباتات مصلحة

Plantes améliorantes (F). Améliorating-plants (E).
هي النباتات التي تفيد التربة وتصلحها ، اشهرها الباقية والترمس .

٢٨٤٣٩ - نباتات معزوقة

Weeding-plants (E).
هي النباتات التي تستوجب الزق .

٢٨٤٤٠ - نباتات معمرة

Plantes vivaces, P. pérennes (F). Perennial-plants (E).
هي النباتات التي تعيش أكثر من سنتين .

٢٨٤٤١ - نباتات مفترسة

Plantes carnivores (F). Carnivorous plants (E).
نباتات مختلفة الفصائل والاجناس يصمها قاص مشترك واحد انفراس الحشرات || الانفراس يتم بواسطة الاوراق التي تنشر كل حشرة تقترب منها ، اغصانها للذباب والبعوض والحمام || اشهر هذه النباتات المذكورة في موطنها ، هي :

Cépalote (F).	الاجنية
Sarracénie (F).	البوقية
Grassetto (F).	حشيشة الدهن
Dionée (F).	خائق الذباب
Népénthe (F).	السلوس
Drosophylla (F).	القاص
Drosère (F).	التيمان

٢٨٤٤٢ - نباتات منبهة

Plantes épuisantes (F). Tying-plants (E).
هي النباتات التي تستنزف خواص التربة .

٢٨٤٤٣ - نباتات نسيجية

Textile-plants (E).
هي النباتات الصناعية للنسيج ، اشهرها القطن والكتان .

٢٨٤٤٤ - نباتات وعائية

Plantes vasculaires (F). Vascular-plants (E).
هي النباتات التي يشمل نسيجها اوعية يجري فيها النسج .

٢٨٤٤٥ - نباتة

Plante (F). Plant (E).
هي الينة واحدة النبات .

٢٨٤٤٦ - نباتي

Végétal (F). Vegetable (E).
نمت تعريف يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالنبات .

٢٨٤٤٧ - ثباح

Abollement (F). Barking (E).
هو صوت الكلب . وانبع الكلب واستنبح حله على الثباح .
قال الشاعر :

قوم اذا استنبح الاضباب كلهم
قالوا لأهم بولي هل النار
تفسك البيل بئلا أو تجود به
ويا تبول لم إلا بمقدار

٢٨٤٤٨ - ثباح

Guib
هو الجرج ، نوع من الجبل ، اطلبه .

٢٨٤٤٩ - ثباح *

Seslaire (F). Wentletrap (E).
جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرضويات المندبات الاصيل . انواعه المروفة نحو ١٥٠ صنفها بيض صفار ، هياكلها غروية الشكل ، حلزونية ، نافذة التصديد المستطيل . يكثر وجودها في بحار البلاد الحارة .

٢٨٤٥٠ - ثباح *

Albugo, Cystopus (S).
Cystope (F).
جنس فطور مجهرية من عارة الثغيات رفضلية الصناتيات .
انواعه المؤذية قليلة اشهرها الثباغ الابيض الذي يذى الثبع والصليبات .

٢٨٤٥١ - ثباغ الدبب الأبيض *

Albugo tragopogonis, Cystopus tragopogonis (S).
Rouille blanche des scoronères, Cystope blanc des scoronères (F). White rust of salsify (E). Weiber rost der schwarzwurzel (D).
وصم يصيب الدبب وغيره من نباتات فصيلة المركبات .
سببه فطر مجهرى من الثغيات ركب نسج الاوراق في طورها التثوي فيزول عملها التلافي والحياتي بما يسي الى نمو النبات وانجابه || مظهره الحاربي يشور بيض لا يباسية الترتيب والحجم تملو نصل الاوراق تقشورها وتمنعها عن القيام بعملها الجسودى على الوجه الاكل .
يكالغ باستعمال احد مركبات النحاس .

وصم يصيب الدبب وغيره من نباتات فصيلة المركبات .
سببه فطر مجهرى من الثغيات ركب نسج الاوراق في طورها التثوي فيزول عملها التلافي والحياتي بما يسي الى نمو النبات وانجابه || مظهره الحاربي يشور بيض لا يباسية الترتيب والحجم تملو نصل الاوراق تقشورها وتمنعها عن القيام بعملها الجسودى على الوجه الاكل .
يكالغ باستعمال احد مركبات النحاس .

٢٨٤٥٢ - ثباغ الصليبيات الأبيض *

Albugo candida, Cystopus candidus (S). Rouille blanche des crucifères, Cystope blanc des crucifères (F). White blister of crucifers (E). Weiber Rost der Kreuzblütler (D).
وصم يصي بعض نباتات الفصيلة الصليبية اغصانها التركيب واللفت والملفوف والتفاح والرشاد || سببه فطر مجهرى من الثغيات ركب السوق والازداد في طورها التثوي . مظهره الحاربي يشور بيض تملو نسج السوق والاوراق والازداد والتاخر تقشورها وتمنعها || يكالغ كسائر الصناتيات باستعمال مركبات النحاس .

وصم يصي بعض نباتات الفصيلة الصليبية اغصانها التركيب واللفت والملفوف والتفاح والرشاد || سببه فطر مجهرى من الثغيات ركب السوق والازداد في طورها التثوي . مظهره الحاربي يشور بيض تملو نسج السوق والاوراق والازداد والتاخر تقشورها وتمنعها || يكالغ كسائر الصناتيات باستعمال مركبات النحاس .

٢٨٤٥٣ - ثباغ *

Epimedium (S). Epimède (F).
جنس نباتات عشبية جلدومية من فصيلة البرباريسيات .



ثباح



ثباغ الدبب الابيض



ثباغ الصليبيات الابيض



ثباغ

Remugle (F). ٢٨٤٦٣ - نبد
Mustiness, Musty smell (E).
النبة : الرائحة الكريهة التي تكتسبها الاشياء المخزونة في
اماكن لا تصلح .

Plante (F). Plant (E). ٢٨٤٦٤ - نبتة
واحدة النبات تطلق على المشبة والفرسة .

Nemopteridae (S). ٢٨٤٦٥ - نبتوريات
Nemopteridés (F). Nemopteridae (E).
فصيلة حشرات من رتبة شارقاوات الاجنحة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اقطار البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة
مستطيلة الاعتدال . رؤوسها محرسة . عينها صغيرة ،
فاخرة . قرونها الاستشعارية غليظة ، قصيرة . ملاسها
الفكية مستطيلة ، منجلية الشكل . بطونها مستعرضة
محتلة التبطيط . اجنتها لاشاوية ، الزوج الامامي
صغير اللد ، الزوج الخلفي مستطيل ، مجلدي الشكل ،
يسطه تراوح من ٣٢ الى ٥٢ سم . تألف البراري والادغال .
يرقاتها مفترسة ، سريعة الحركة والانتفاخ في التربة ||
اشهر اجناسها النبتور .

٢٨٤٦٦ - نبتوس اذهب
حشرة تدعى هبون المساحف . اطلبها .

Neptune (F). Neptune (E). ٢٨٤٦٧ - نبتون
كوكب سيار يقع النظام الشمسي . اكتشف عام ١٨٤٦ .
قطر دائرته يعادل ضعف قطر الارض وحمه يبلغ ١٦
مرة حجمها اما وزنه النسبي فثلاث مرات اقل من وزن
الارض . دورته حول الشمس تستمر نحو ١٦٤ سنة
٢٨٥٠ يوماً . سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٩٥٤٨
كيلومتر بالساعة . يدور في فلكه قران : تريتون ونيريد .

Curage, Curement (F). ٢٨٤٦٨ - نبت
Cleansing, Water-pepper (E).
هو تنظيف المجاري والاقنية والانابيب ...

Platyodon (S). Platycondone (F). ٢٨٤٦٩ - نبتج
جلس نباتات عشية حولية برية وريضية من فصيلة
الجرسيات . انواعها المعروفة خمسة ، بعضها جامدة منتصبة
تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها متعاقبة او غمية ،
تصلها يبيض الشكل ، جامد الصلابة ، مسنن الحافة .
ازهارها فردية التنجيم ، ابطية وطرفية الارتكاز ، عديدة
الالوان يكثر فيها الازرق والابيض || ازهارها يستمر
من تموز الى تشرين .

Haut perchis (F). ٢٨٤٧٠ - نبتجة
هي الاجة المستطيلة النبت العالمي ج نتاج .

Clavelés, Variole ovine (F). ٢٨٤٧١ - نبتج
Sheep-pox (E).
النبتج او جدري الضأن مرض معد يصيب الغنم .

Advection (F). Advection (E). ٢٨٤٧٢ - نبتد
النبتد حركة الريح الاقنية الانتشار .

انواعها وضروبها البرية والبرية عديدة . جذاميرها
مدادة ممتدة . سطحها منتصبة حولية . اوراقها مركبة .
وريقاتها مسننة الحافة || اشهر انواعها ما يتبع .

Epimedium sinense (S). ٢٨٤٥٤ - نبتالة الصين
Epimède de Chine (F).
نوع من النباق التريبي . ساقها موقرة تعلو من ٣٠ الى
٤٠ سم . ازهارها عنقودي لبد التجميع . ازهارها صغيرة
القد يبيض اللون . تنورها يستمر من نيسان الى ايار .

Epimedium alpinum (S). ٢٨٤٥٥ - نبتالة جبليكية
Epimède alpin, Chapeau d'évêque (F).
نوع من النباق التريبي . ساقها موقرة تعلو من ١٥ الى
٣٠ سم . وريقاتها يرضية الشكل تعلو من ٤ الى ٦ سم .
وتعرض من ٢ الى ٤ سم . ازهارها عنقودي التجميع ،
هامي الارتكاز . ازهارها صغيرة اللد ، صفر البتلات ،
حر الفصل . تنورها يستمر من اذار الى ايار .

٢٨٤٥٦ - نبتالة ويشية الورق
Epimedium pinnatum (S). Epimède à feuilles pen-
nées (F).
نوع من النباق التريبي . ساقها عريضة تعلو من ٣٠
الى ٦٠ سم . اوراقها جبجية الانتشاب ، ويشية الشكل ،
مستطيلة الاسنان الشائكة . ازهارها عنقودي ، رمل التجميع .
ازهارها صغيرة اللد صفراء اللون . تنورها يستمر من
نيسان الى ايار .

٢٨٤٥٧ - نبتالة كبيرة الزهر
Epimedium macranthum (S). Epimède à grandes
fleurs (F).
نوع من النباق التريبي . ساقها موقرة تعلو من ٢٥ الى
٥٠ سم . وريقاتها دوقية الشكل مستطيلة الزناد . تصلها
جلولي الصلابة ، ذلق الزام الاخير . ازهارها كبيرة
اللدة ، عديدة الالوان التي تختلف باختلاف القرب ، منها
الابيض والاصفر والاحمر والبني . تنورها يستمر
من نيسان الى حزيران .

Enazon ٢٨٤٥٨ - نبتاكة
عارض يصيب اوراق النبات فيحجبها ويشو نصلها
بتريدات وثنية تعلو الاضلاع والورق .

Toxotes (S). ٢٨٤٥٩ - نبتالة
Toxote, Archer (F). Archer, Dartar (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السمكيات .
انواعها المعروفة ثلاثة موطنها المحيط الهندي والبحر الاحمر
والخليج || يدعونها نبتالة لانها تقذف الحشرات والحوام
الحائمة فوق سطح الماء بنقطة ماء من فيها يجعل الطريدة
تقتد توازنها وتسقط في الماء تنبتلها النبتالة .

Végétal (F). ٢٨٤٦٠ - نبت
هو النبات ، اطلبه .

Sous-bois (F). ٢٨٤٦١ - نبت الحركاج
Underwood (E).
كل نبات عشبي او بجلي او جنبي يعيش في ظل الاشجار
الحرجية .

٢٨٤٦٢ - نبتت
يقال نبت الشجر اذا غرسه ورباه . ونبت المحبوب اذا
بلدها للاستنبات .



نير الأبل

٢٨٤٧٩ - نِيرَبَاسُورِي *
Gastrophilus haemorrhoidalis (S). *Cêtre hémorroidal* (F).

نوع من النير، ذبابته تطول نحو ١٠ سم. ثوبها إلى السرة السوداء. صدرها إلى الكفة الصغرى غط متعرض أسود. بطنها أبيض المقدم، أسود الوسط، الشهب المؤخر. رواشها شفافة عادمة التشبيح. ريقاتها حمراء اللون طولها يراوح من ١٣ إلى ١٦ سم. تمر بالمعدة وتقيم فيها بعض الوقت ويتهين بها اللطاف إلى السرم حيث تعلق بعض الوقت تقسب الحكاك وزحف الدم || تركب الفلابة على اختلاطها وانعصامها الخيل.

٢٨٤٨٠ - نِيرِيدِيَّات ، شَعْرَانِيَّات
Cestridae (S). *Cestridae, Bot-flies* (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين. أجناسها وأنواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة الحجم، هليئة الجسم، أثوابها إلى المعطي للزركش بالاسمر والأسود. عظمها قريب الشبه من عظم النمل. أشرتها فباسة لكنها خالية من جهاز الوخز والرز. ريقاتها طفولية. بعضها يتطفل على الدوابن وانعصامها الجفارات.

٢٨٤٨١ - نِيرِيَّة *
Nebria (S).

نير (F). *Nébrie* (F). *Nébrie* (E).
جلس حشرات نافمة مقمرة من فصيلة النيريديات. أنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، طولها يراوح من ١٠ إلى ٢٠ سم. ألوانها زاهية، اعتمادها حشوية الملوغ. تعيش على الحياض البحرية تحت الحجاراة والانقاض والاختشاب. أشهر أنواعها :

Eurynebria complanata (S). نيرية الرمال
Nébrie des sables (F).
Nebria brevicollis (S). نيرية قصيرة العنق
Nébrie à cou court (F).

٢٨٤٨٢ - نِيرِيَّة قَصِيرَةُ الْعُنُق *
Nebria brevicollis (S). *Nébrie à cou court* (F).

Nebria brevicollis (E).

حشرة قانصة من فصيلة النيريديات ورتبة مضفات الاجنحة. تألفت الأراضي المزروعة والبساتين والغابات. قوتها ما تمسرها من الحشرات والديدان والحوام || جسمها متوسط القد بطول من ١٢ إلى ١٤ سم. ثوبها إلى السوداء الخديدي اللامع. رأسها مستعرض الجسم، قصيرة العنق. فكها عظيمتان. زباناها عظيمتان. عيناها صغيرتان. ظهورها قليل الاحدياب، مستدير الطرف اللامع، ثمانية التحزيز الفدي النظامي الخطوط. أرساها خابية المقل || الأني أصغر قدماً من الذكور وأبنت ثوباً منه وأقصر زبناً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة تجرح في التبار. تساند في آب. تمتع المكان تحت الحجاراة والليل || البرقة عند بلوغها الكمال الجسدوي تطول من ١٨ إلى ٢٠ سم. جسمها اسطواني الشكل، سداسي الأرواج، أحمر اللون، أسود الرأس والشرج والارواجب || طور الكمال الذي يستمر من ٥٠ إلى ٩٠ يوماً ينقضي في بيث صودي الفود تحفره البرقة على عمق ٥ أو ٦ سم.

٢٨٤٨٣ - نِيرِيدِيَّات
Nebriidae (S). *Nébridae* (F). *Nébridae* (E).

فصيلة حشرات نافمة مقمرة من رتبة عملية الاجنحة.

Centrifugation

٢٨٤٧٣ - نِيرِيدِيَّات

هو الانياز، اطباء.

٢٨٤٧٤ - نِير ، شَعْرَانِيَّة
Cestrus (S). *Cestrus* (F). *Botfly, Gadfly* (E).

جلس حشرات من فصيلة النيريات. أنزاهه قليلة العدد جميعها غليظة الشكل، هليئة الجسم، صغيرة العظم، دقيقة الذيل القصير، مزرقة الثوب، شفافة الجناح. أنثاها تلتقي المكان دون أن تمتص لانها عادمة المرازات النخزة || أضرارها تحصل من ريقاتها التي تدعى نغفا والتي تعيش في معدة الحيوان وتحت جلده. ج نبار وأنبار.

٢٨٤٧٥ - نِيرُ الْإِبِل * ، شَعْرَانِيَّة الْبَعِير
Cephalomyia maculata (S). *Céphalomyle du chameau* (F). *Botfly of the camel* (E).

نوع من النير. تركيب الأبل والجلابيس. ذبابته تطول من ١٠ إلى ١٢ سم. ثوبها إلى الخفي يملو تجذيع أصفر. تهرق مكنها بين الوبر على ظهورها وأطال الأبل يفتنف من ريقاتها خيطية هليئة تنقلها الأبل بالنسبة من جلودها إلى حلقها فيطونها حيث تلسل وترقي حتى تلصق الجلدية تنفث الجلدة مع أنفاه طورها البرقي وتنتف على الأرض وتصل إلى كزود ثم إلى حشرة تنيد سيرتها الأولى.

٢٨٤٧٦ - نِيرُ الْبَقَر
Hypoderma bovis (S).

هو لقاعة البقر، اطباء.

٢٨٤٧٧ - نِيرُ الْفَئَان * ، شَعْرَانِيَّة الْفَئَان
Cestrus ovis (S). *Cestra du mouton* (F). *Botfly of the sheep* (E).

نوع من النير يقضي الدم ويهزها. ذبابته تطول ١٠ سم. ثوبها إلى الكفة الصفراء الملوغ. صدرها أسود النقيض، بطنها أسود التشبيح. رواشها شفافة يملو عند قواعدها ثلاث نقط سود. تظهر من أيار إلى أيلول. أنثاها تمسرك المكان بين الحب الذي يحف بالأنت يفتنف عند وضعه أو يده بضع ساعات عن ريقات دقيقة تسمى إلى داخل الأنف فتصل في مجاريه وتجاوبه وتبقى حتى اكتمل طورها البرقي الذي يدوم من ١٠ إلى ١١ شهراً. والبرقة عند نهاية تطورها تطول من ٢ إلى ٣ سم. وتعرض نحو ١٠ سم. ثوبها إلى البياض الأصفر يملو حيد اسمر. يتكاثم بطنها بجاه الفئان بريت السلك الذي يمنع اقتراب النسر.

٢٨٤٧٨ - نِيرُ الْفَرَس * ، شَعْرَانِيَّة الْفَرَس
Cestrus equi, *Gastrophilus equi* (S). *Cestra du cheval* (F). *Botfly of the horse* (E).

نوع من النير، ذبابته تطول من ١٣ إلى ١٤ سم. الأني أكبر قدماً من الذكر. ثوبها إلى الصغار الاغبر تملو مزرقة سمراء. رواشها شفافة. يتوسطها تديش اسطوي. تظهر في اواخر الصيف ثم تلي مكنها على اجسام الخيل والبيدال والبعير. مكنها اسطوي الشكل أبيض اللون دابق الطرف يلسق بالسر إلى أن يفتنف من ريقات وشية الشكل هليئة الخيطية اللون، هليئة ينش في الجلد فيهيجها ما يدعو الدابة إلى لحسه تعلق البرقة بالسان الذي ينقلها إلى الحلق ومنه تهر إلى المعدة حيث تستقر بين طياتها المخاطية إلى أن تم انسلانها التي تدوم نحو عشرة أشهر فتخرج مع الروث وتصل إلى كزود صليبية الفلال مجها من ٣٠ إلى ٤٠ يوماً ثم تنشق الصليبية عن الحشرة الكاملة فتطير وتعيد سيرة حياتها المذكورة.



نير باسوري



نيرية قصيرة العنق

Faulbaum, Pulverfaulbaum, Schwarzhholz (D). Frangola, Ontano nero, Alno nero, Frangolo (I).

نوع من النبق، شجرته صغيرة القند تملو من ٣ الى ٧ امتار . فروعه سرسة لونها الى الاسود الازرق المواج تملو ريشة ريداء . براعمه خمرانية . اوراقه متعاقبة عابطة ، تصلها سبامي او تسامي المروق البارزة . ازهارها خاسية الاجزاء ، ابطة الاذنكاز ، لا قياسية التجميع ، ثماره طرية . شتوية خفيف الوزن يستخرج منه بعد التجميد نوع من البارود شائع الاستعمال . ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

٢٨٤٩٤ - **نَبَق الصَّبَاغِين** * ، **شَرَكَة الصَّبَاغِين** Rhamnus tinctoria, R. utilis (S). Nerprun tinctorial, N. des teinturiers (F). Dyer's buckthorn (E). Immergrün (D). Ramno dei tintori (I).

نوع من النبق وهو جنبة شالكة تملو نحو ثلاثة امتار . فروعهها زيتية اللون ، افنانها جذوية . اوراقها تطول من ١٢ الى ١٤ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ ، تصل الى الخضار الاصفر المواج . عروقها بارزة ملتفة قليلة العدد . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ثمارها عنابية اللون يستخرج منها صباغ اصفر || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٢٨٤٩٥ - **نَبَق المَسِيح** Nabka (F). هو السدر ، اطليه .

٢٨٤٩٦ - **نَبَق جَرْدِي** Rhamnus alpina (S). Nerprun alpin (F).

نوع من النبق وهو جنبة كبيرة تملو من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم . ساقه عرياء ، فروعه سرسة منتصبة . براعمه حشوية الخمار . اوراقه عابطة ، تصلها سنن الحافة عروية بارزة عددها يراوح من ٩ الى ١٢ زوجاً . ازهاره خاسية الاجزاء . ثماره صغيرة القند يقال انها طرية || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٤٩٧ - **نَبَق كَلِفُولِيَّة** Rhamnus californica (S). Nerprun de Californie (F). نوع من النبق ، شجرته صغيرة القند تملو من مترين الى خمسة امتار . ساقه كهباء . فروعه خلية اللحاء شالكة . اوراقه ابيدة ، تصلها جانبة الصلصة ، سنن الحافة قسبي اللون ، يارز المروق . ازهاره خلية الاجزاء الخارجية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٤٩٨ - **نَبَق لُبْنَانِي** Nerprun du Liban (F). هو الزفرين اللبناني ، اطليه .

٢٨٤٩٩ - **نَبَق مَرْدَاف** Alatern (F). هو الزفرين الجردى ، اطليه .

٢٨٥٠٠ - **نَبَق مَكْدُونِي** Rhamnus pumila (S). Nerprun nain (F).

نوع من النبق وهو جملة صغيرة مثقلة تعيش بين الصخور تملو نحو ٢٥ سم . ساقها وفروعها متعقبة سرسة . اوراقها تطول من ٣ الى ٦ سم . تصلها سنن الحافة يارز المروق التي يراوح عددها من ٥ الى ٧ ازواج . ازهارها خشوية خاسية الاجزاء . ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٢٨٥٠١ - **نَبَق مُسَهِّل** * ، **شَرَكَة الدَّمَك**

Rhamnus cathartica (S). Nerprun purgatif, Bourguépine, Noirprun, Epine de cerf (F). Common buckthorn, Purging buckthorn (E). Echter Kreuzdorn, Purgidorn (D). Ramno purgativo, Prognolino, Spina servina (I).

نوع من النبق وهو شجرة شالكة ، ترطب في الارتربة الجصية ،

اجناسها وازواعها عديدة ، جميعها صغيرة القند او متوسطة . قرونها الاستعمارية ثمانية الفواصل . اذواها مختلفة وكثيرة . تعيش على السواحل قرب الشواطئ البحرية . اشهر اجناسها النبرية .

٢٨٤٨٤ - **نِيرِيس** * Nebris microps (S). Nebris (F).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والذرع من شالكات الزعانيف وصفيحة البهرانيات . اعطائها بحار بعض المناطق الحارة . بكثرت ويوجدوا قرب شواطئ افريان || جسمها اهليجي الشكل مشدول الحميم والتطيل يطول نحو ٣٥ سم . ثوبا الى الشبهة الفضية يمتد في الرأس والظهر . تتميز برحابة شفها وبصر عينا || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٨٤٨٥ - **نِيرِش** و شجر ورقه كدروق السنور ارزن من الانبوس عشبه اخر تمل منه خماسر الجنايب . وهو اصفر من شجر السنور واثد اجنابها (اللسان) .

٢٨٤٨٦ - **نَبَقْ** Pouls (F). Pulse (E). هو الصوت الذي يحدثه اندفاع الدم من القلب الى الشرايين .

٢٨٤٨٧ - **نَبَقْ** Extrapoler (F). استخلص من سلسلة معلومات او وقائع مفروضة معلومات او وقائع جديدة تسمح باطلاة السلسلة .

٢٨٤٨٨ - **نَبَقْ** نبط الير : استخرج سامها .

٢٨٤٨٩ - **نَبَقْ** النبق : شجر تتخذ منه القسي ومن اغصانه السهام ينبت في قلة الجبل والنايات منه في السفح الشرياني وفي الخضيف الشواطئ . قال مرة : النبق شجر اصفر البود رزيتة تغليه في اليد واذا تقادم اجر - الواحدة نية . وفي الحديث ذكر النبق ، قيل : وكان شجراً يطول ويصلو فدعا عليه النبي صل الله عليه وسلم فقال لا اطالك الله من عند ظم يطل به (اللسان) .

٢٨٤٩٠ - **نَبَقْ ، قَطْع** Polliniser (F). To polliniste (E).

نوع ونوع وأخر : نقل غبار الطلع من متك زهرة الى مياسمها او مياسم غيرها من الازهار .

٢٨٤٩١ - **نَبَقِيَّات** Albugées, Cystopées (F). عبارة تطور مجهرية من فصيلة الصناليات ، تتميز بمشج غليزي يبي مجهز بمراشف حوصلية . تكاثرها غيبي ، خارجي ، مستقيم الانشعب ، سبي الرصيف البويي . اوزاعها قليلة العدد يجمعها جنس واحد يدعى النباغ .

٢٨٤٩٢ - **نَبَقِي** Rhamnus (S). Nerprun (F). جنس اشجار وجنابات حرجية من فصيلة النبقيات . ازوارها نحو ٦٠ مظها شالكة الاغصان والافنان . اوراقها متعاقبة ، منتفة ، بسيطة . ازوارها خشوية او ثنائية المسكن . ثمارها كروية خشوية صغيرة القند || اشهر اوزاعها ما يتبع .

٢٨٤٩٣ - **نَبَقِ اسود** * ، **جَلْهَم** ، **عَوَسَج** اسود Rhamnus frangula (S). Bourdaine, Bourguène, Aune noir, Bois à poudre, Bois de zhen (F). Alder buckthorn, Black alder, Glossy buckthorn (E). Gemeiner



نيريس



نبق اسود



نبق الصباغين



نبق مسهل

٢٨٥١١ - نيسب

صوت الخيس في زمن السغد . يقال بـ " الخيس " .

٢٨٥١٢ - نيسكة

Plantula (F). Small plant (E).

هي البتة الصغيرة لا تزال في طور النشوء البدائي .

٢٨٥١٣ - نيسكة

Curure (F).

Dirt, Muck, Sewage (E).

هي الاشباه والاسمال والباله والاصاخ التي تشترج من البئر والحوض والقتاة عند تنظيفها .

٢٨٥١٢ - نيسكة

Rhamnaceae (S).

Rhamnaceae (F). Rhamnaceae (E).

فصيلة نباتية من فوات الفلقين كثيرة . الثغلات اجناسها وانواعها زهاء ٤٥٠ اعطائها جبال وهضاب البلاد الممتدة الحارة والحارة . اشهر اجناسها اللبق والصاب . نباتات هجرات ونباتات . او راقها لا قياسية التشكيل ، منها البسطة والمركبة . انواعها ابطية خشبية او ثنائية السكن . ثمارها لحية منها المأكولة وبعضها طبي وصناعي .

٢٨٥١٣ - نيسكة

Souche (F). Stump (E).

النيسكة هي الجرثومة كقولك نيسكة الشجرة اي جرثومتها . ج نباك ونيلوك .

٢٨٥١٤ - نيسكة

Nebalia (S).

Nébalie (F). Nebalia (E).

جنس دوبيات بحرية من الفشريات العليا وبقعات الصدف . انواعها قليلة العدد تعيش في المواقع التي تكثر فيها الرسول البحرية والاسمال || اجسامها صغيرة قروية شبه بالقرقرس . ميرتها مزنة . قوامها الصدرية متساوية القد ، ثنائية الحادف .

٢٨٥١٥ - نيسكة

Sagitta (S).

Flèche (F). Sagitta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرسويات مديات الارجل وفصيلة الرسويات . انواعها المعروفة قليلة العدد . جميعا . اعطائها بحار البلاد الحارة والممتدة الحارة . اسرارها متوسطة العدد . تظهر على سطح الماء بعد غروب الشمس || اجسامها عريانة مستطيلة شبه وشمية الشكل ، هلامية المادة ، شفافة . افواهها غطسية مهدبة الحافة . زعانفها مستطيلة الشكل ، الذيلية منها مفلوكة .

٢٨٥١٦ - نيسكة

Népanthe (F).

نبات يعرف بالسنس ، اطلبه .

٢٨٥١٧ - نيسكة

Flora (F). Flora (E).

جاء النباتات في قطر او بلاد . يقال ثروت لبنان وثروت الشرق الادنى ، الخ .

٢٨٥١٨ - نيسكة

Flora aqueique (F).

Aquatic flora (E).

النباتات التي تعيش في الماء او في الخلف .

٢٨٥١٩ - نيسكة

Végétatif (F). Vegetative (E).

نعت تربوي يدل على المقدور الانباتي .

٢٨٥٢٠ - نيسكة

Forjet, Forjeture (F).

Projection (E).

النور تنو غير عمودي يحصل في النبات . او تنو غير مستقيم يحصل في التضليل .

٢٨٥١٨ - نيسكة النفل

Dothidella trifolii, Sphaeria trifolii, Polytetrinidium trifolii (S).

قطر مجهرى يصيب اوراق النفل ، حل اختلات انواعه ، قيعطها ويسبب بيلها || مظهره الخارجي لكت سود مستدرة الشكل قطرها نحو ١ م . تركب النفل على مسكت السفلى . تظهر وتكثر في الربيع قبل حلول الصيف . اضراره تمتد الى نسبة طبخ الازراق .



نبلة



نيسكة



نيسكة النفل



نيسكة النفل

Portée (F). Bearing (E).

٢٨٥٢٩ - نَبَاج

التاج مجموع ما تنمعه اثنى الحيوان البون من جراء في ولادة واحدة . راجع بحبل .

Produit (F). Produce (E).

٢٨٥٣٠ - نَبَاج

اسم يشمل وضع جمع البهائم .

Exsudat (F).

٢٨٥٣١ - نَبَاج ، نُبُوح ، نَتِي

Exudate (E).

Vis-à-vis (F). Opposite (E).

٢٨٥٣٢ - نَبَاق ، حَبِاق

بني داره تلاق داري أي قبلتها .

Apogamie (F).

٢٨٥٣٣ - نَبَاذَة ، نَقْل

Apogamy (E).

مجموعة الوسائل التي يمكن بعض النباتات الدليا من الكاثر في حالة فقدانها الشقية .

Transpiration (F).

٢٨٥٣٤ - نَبْش

Transpiring (E).

رشح الانزيمات المائية الزائدة عن حاجة اللسع الحيوانية والنباتية في بعض الظروف الخاصة .

Nitrification

٢٨٥٣٥ - نَبْرَجَة

تفاعل جزيئي كيميائي يحول الازوت الضوي الى امونيا في فنتري فينيرالي ولا يتم الا عن طريق الجراثيم التي تغير الحالة . لذلك فجراثيم النترجة حل ثلاثة انواع لثلاث حالات .

Nectastoma (S).

٢٨٥٣٦ - نَكْتَسْتُوم

Nectastoma (F). Nectastoma (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة النبتيات مفتوحة الفم . انواعها المعروفة قليلة العدد . اصطلحنا بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة اجسام الانقليس . رؤوسها واعناقها اسطوانية . عظامها مستطيلة مقطوعة الاطراف الفصليسية الشكل . اشدافها كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية تتقابل وتلتصم عند طرف الذنب . اعرف انواعها واشهرها تنسوم المتوسط .

٢٨٥٣٧ - نَكْتَسْتُوم اُرْبَد رصاصي * ، نَكْتَسْتُوم

Nectastoma melanura (S). النَقُوسَة

Nectastoma gris plomb, N. de la Méditerranée (F).

Nectastoma melanura (E).

سمكة بحرية بيضاء من تنسوم . اعطائها البحر الابيض المتوسط . تتميز من اسماك الجحاف والنفاف . مسطحها المادي في الطبقة التي يراوح عمقها من ١٠ الى ٣٠ مترًا || جسمها شبه انقليسي الشكل ، اسطوانية العنق والراس والحلم ، يطول نحو ٨٠ سم . مسكها حاد الحراشف تشبه مادة مخاطية لزجة || ثوبها الى الوردية الرصاصية الفضية الموانج || زعنفتها الظهرية تلتقي بالشرجية عند طرف الذنب || لحمها متوسط الصنف ، اجدود من لحم الانقليس .

Radicle (F). Radicle (E). نَقَش ، نَقِش

٢٨٥٣٨ - نَقَش ، نَقِش

جذر البزرة الجنيني .

Perspiration (F). Perspiration (E). نَقَع

٢٨٥٣٩ - نَقَع

التسرع صفور التسرع من المسام الجلدية على شكل بخار لا يشاهد بالعين المجردة ولا ينشئ منه الجله كما في العرق .

٢٨٥١٩ - نَبِيدِيَّات ، نَبِيدِيَّات

Nabidae (S). Nabidae (F). Nabidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، معتدلة البطيخ ، ملونة . رؤوسها صغيرة معتقة . اعطائها رباعية الاجزاء . عيناها جالبية الارتكاز . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، رباعية الفصل . كواسلها يرمية الشوزن ، ترتكز على قواعد شبه مستديرة . حجابها صغيرة محرمة . حناجها متباينة الحجم ، يكثر فيها الصغر والقصير . رواشها لاحقة . قوائمها نشيطة || جمع انواعها خاضعة نموتش على اوراق النباتات البرية .

Vin (F). Wina (E).

٢٨٥٢٠ - نَبِيد ، عَصَر

شراب كحول يحصل من اختار عصير الثمار اخضها العنب .

٢٨٥٢١ - نَبِيد الإِجَاص ، نَبِيد الكَمْثَرِي

Poiré (F). Perry (E).

شراب يتخلص من عصير الاجاص .

Enomel

٢٨٥٢٢ - نَبِيد العَصَل

شراب يتحصل عليه من تخمير العسل مع عصير العنب .

Fromage (F). Cheese (E).

٢٨٥٢٣ - نَبِير

هو الجبن ، تقبل اكلت التبير .

٢٨٥٢٤ - نَبِيس الخَلْج

Nabis ericetorum (S). Nabis des bruyères (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النبتيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٨ م . رأسها صغير الجرم ، بني اللون ، احمر الموانج . عظمها معتدل الطول ، طليق . عيناها صغيرتان . بارزتان . زباناها دقيقان مستطيلان . كوسلها بني مزدكس بالاسود . حجبها صغيرة سوداء . ظهورها لاحف ، وردي اللون . بنظها احمر الملب . قوائمها مستطيلة || تألف الحراج . قوتها اوراق الخلج والقطلب ...

Nabis ferus (S).

٢٨٥٢٥ - نَبِيس لَقَرِي

Nabis sauvage (F).

حشرة خاضعة من فصيلة النبتيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٩ م . رأسها صغير ، حطلي اللون ، احمر الموانج . عظمها طليق ، معتدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلان . كوسلها الى الحطلي الاسمر . حجبها صغيرة سوداء . ظهورها لاحف ، حطلي اللون ، وردي الموانج . اسود المروق والاصابع . بنظها احمر . كثيف الخمل والزيغ . قوائمها مستطيلة ، حطلي || تألف البراري والمراعي . قوتها اوراق الاصناف على اختلاف فصائلها .

٢٨٥٢٦ - نَبِيدَة

النبتية زيمة الكرك اذا عظمت . ج نباتي .

٢٨٥٢٧ - نَبِيدَكَة

هي الورقة التي احترتها النبتكة .

Ombon, Protuberance (F). نُتُو

Umbo, Protuberance (E).



تنسوم المتوسط

٢٨٥٥٣ - نَثْرَة

النثرة منزل من منازل القمر الشامية ، يقال لها أيضاً أنف الأسد . وهما كوكبان بينهما رقعة قدر شبر يملحا تطليخ أكبر كأنه قطع بحباب || يقبب النثرة يدعى سعد النابيع .



نوم اشهب

٢٨٥٥٤ - نَقَطُ Levée (F). Gathering (E).
هو أول ظهور النبات بعدما يصعد القربة ويقل أن يملأها .

٢٨٥٥٥ - نَكُورُ Prolifique, Multipars (F). Multiparous (E).
صفة الحيوان الكثير التاج || أثني الحيوان تلد عدة أولاد معاً .

٢٨٥٥٦ - نَكِيرُ Ebrouement (F). Snorting (E).
التثير هو طلس اللواب . تقول نثرت الدابة : عطست .

٢٨٥٥٧ - نَقِيطُ Embryon (F). Embryo (E).
هو الملقحة النباتية .

٢٨٥٥٨ - نَجَا نaja (F).
في السمل ، جنس حيات خبيثة من اميات الاخاذيد .



نجر

٢٨٥٥٩ - نَجَابُ Corticicole (F). Bark miner (E).
النجاية هي الحشرة التي تقضي التدوة البرقية من حياتها داخل لحاء الاشجار .

٢٨٥٦٠ - نَجَارُ Lactarius lactarius (S). Lactaire, Lactaire pêche-lait (F).
سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الاسقرليات . موطنها البحر الاحمر والمحيط وبحار الهند . جسمها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . رأسها مقطوم ، نصفها الشرجية فارقة . ثوربا الى الحصار القضي المايح . لحنها لليد الطعم جيد الصنف .



نجانة

٢٨٥٦١ - نَجَانَة * Pelamis (S). Pelamis (F). Pelamis (E).
جنس حيات خبيثة سامة من اميات الاخاذيد وفصيلة الهيدروفيات . انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها بحار مناطق المحيط الهادي || اجسامها مستطيلة شبه مزاوية الشكل . رؤوسها صلبة مخروطية الشوز . اذنانها باطلة محيطية .

٢٨٥٦٢ - نَجَالُ Dactyloctenium (S). Dactylocténion (F).
جنس نباتات عشبية ، برية ، مدادة ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة سبعة . منها بعض اقالييم البلاد الحارة من الشرق الادلى واfrريقية الشرقية || جميع انواعها شظية . عصفها ضيق مستطيل ، يكثر فيه التسنين الدقيق الحاد . ازهارها طرفي مكمل ، ليد الزغب .

٢٨٥٦٣ - نَجَالَة Agrostologie (F). Agrostology (E).
درس يبحث في نباتات الفصيلة النجيلية .

٢٨٥١٠ - نَتَل

النَتَل والنَتَلُ بيض النمام الفارغ .

٢٨٥٤١ - نَقْلَة Bourse (F). Purse (E).
هي الاينة النمرية استكملت جرمها المعيز .

٢٨٥٤٢ - نَتُوجُ Pleine (F). Full part (E).
التروج : الحامل من اللواب وجميع الحافر .

٢٨٥٤٣ - نَتُومُ Neotoma (S). Néotome (F). Neotoma (E).
جنس حيوانات لينة قاصصة من فصيلة الفأريات . انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض المناطق الامريكية . تألت المواع القريية من الماء . قوتها المواد النباتية والصفادح وبعض الثريات اغصها السرطان || اجسامها ريمة مستوية القد تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . بما فيها الذنب . وهي شبيهة بالجرزون وبالقناد في آن واحد . اقوابها تختلف مع الانواع || تنقل اجسامها في الحوم وفي عذقة من اثناف مستطيلة وحجر وسطى فسيحة وتعرض الانفاق من البين واليسار عدة داليز تخزن فيها مؤنة الشتاء || الاثاف تضع من ٤ الى ٨ ادراع ترصها نحو اربعة اسابيع || اعرف انواعه واشهرها :

٢٨٥٤٤ - نَتُومُ اشْهَبُ * Neotoma cinerea (S). Néotome gris (F).
طوله نحو ٣٠ سم . ثوربه الى الشبهة يسمر بعض الثير في الرأس والظهر ويغير في البطن . وبره معتدل الطول . ذنبه جيشيل يشبه ذنب النجايب الا انه اقصر منه .

٢٨٥٤٥ - نَتُومُ لَثُورِيدَا * Neotoma floridana (S). Néotome de la Floride (F).
طوله نحو ٣٥ سم . ثوربه الى الربعة السوداء . بطنه الى الربعة البضاء . وبره ناعم قصير . ذنبه حرشفي القشار عادم الذير .

٢٨٥٤٦ - نَتِيجَة Conclusion

٢٨٥٤٧ - نِجَاتُ Onguent (F). Unguent (E).
المزم ينش به الجرح .

٢٨٥٤٨ - نِجَارُ ، نَثْرُ Fécondité (F). Fecondity (E).
كثرة التاج في البائم .

٢٨٥٤٩ - نِثَالَة Déblai (F). Clearing, Cutting (E).
تراب الركبة يستخرج منها وكل تراب يستخرج من حفرة او ردم .

٢٨٥٥٠ - نَقْدُ Pointer (F). To point (E).
نقد : ينادي نقدا القطر وتندت الكماء : خرجت من الارض .

٢٨٥٥١ - نَثْرُ Epandra (F).
نثر الشيء : ذره بالساري .

٢٨٥٥٢ - نَثْرُ الأَسْمِدَة Epandra des engrais (F). Scatter of fertilizer (E).
هو ذر الاسمدة على التربة وقد تم اياها باليد او بواسطة آلات خاصة تقوم بهذا العمل .

Ecole poire (F). **٢٨٥٨٠ - نجمة القطب**
Pole-Star (E).
نجمة القطب أو القطب نجم نير بين الجدي والفردين
تنبئ عليه القبلة .

Ostracnidae (S). **٢٨٥٨١ - نجميات**
Ostracnidae (E).
فصيلة امحاك بحرية من تبة ملحومات الفكوك اجناسها
وانواعها عديدة ، اشهرها ابو صندوق .

Aster (F). **٢٨٥٨٢ - نجمية**
هي الاطر ، اطليه .

Nutrition (F). **٢٨٥٨٣ - نجوع**
راجع مادة اختداء .

Stelleridae (S). **٢٨٥٨٤ - نجميات**
Stelleridae (F).
شعبة حيوانات من صف الثوكيات يشمل نجوم البحر .

٢٨٥٨٥ - نجير * ، سيقون
Agropyrum junceum (S). Agropyre, Froment des
Jones (F). Sea wheat grass (E). Binsenquecke, Binsen-
weizen (D). Agropiro (I).
نبات عشبي بري مرعوي من الفتيات وفصيلة النجيليات.
يكثر بين الزروع وفي الاراضي الملساء وصل جوارب
الطرقات الريفية .

٢٨٥٨٦ - نجير زاحيف *
Agropyrum repens, Triticum repens (S). Agram,
Chlendent rampant (F). Couch grass, Quitch grass,
Twitch grass (E). Echte quecke, Grasquecken (D).
Gramigna, Caprinella (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات . ساقه عقدية
مدادة نشطة كثيرة الانشعاب والاذى لانها تنبئ التربة
وتبين الاحمال الزراعية وتسيء الى النباتات المزدرة ان لم
يقصر عليها .

٢٨٥٨٧ - نجيرة
سقيفة من خشب ليس فيها قصب ولا غيره .

Agrostis (S). Agrostide (F). **٢٨٥٨٨ - نجيل**
جنس نباتات عشبية مرجية معمرة من فصيلة النجيليات .
بعضها يزدهج في المروج ، اكثرها ينبت عرضاً ويسوء
الى الزروع وسائر النباتات || اشهر انواعه ما يلي .

٢٨٥٨٩ - نجيل ابيض * ، اُرْوَا ابيض
Agrostis alba (S). Agrostide blanche, Florin, Traine,
Pavine (F). White bent grass, Florin grass (E).
Velises Straussgras, Floringras (D). Agrostide
blanca, Pennacchini (I).
نوع من النجيل وهو نبات مرعوي بري معمر يملو من
٢٠ الى ٥٠ سم. حصفه ضيق النصل جليل الخضر .
سبيلاته صيطرة القد ، متباددة النجيج ، يضاء اللون .

٢٨٥٩٠ - نجيل احمر * ، اُرْوَا احمر
Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin
rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herden-
gras (D). Fieno rosso (I).
نوع من النجيل المرعي المرعوي المعمر يملو من ١٠ الى
٦٠ سم. حصفه مستطيل النصل الجامد . اتحاد غليظة
جزوية اللون . سنباله مستطيلة ، سبيلاته متفرقة .

Libar **٢٨٥٦٤ - نجب**
الطبقه السفلى من اللحاء تكون بين القشرة والخشب في
سوق ويولد النباتات الرمالية .

٢٨٥٦٥ - نجبة
هي قرصة النمل اي ضمن قريته المد خضن المازن .

Péricarde (F). **٢٨٥٦٦ - نجث ، نجث**
Pericardium (E).
هو الشف ، خلاف القلب .

Coteau, Pisteau (F). Slope (E). **٢٨٥٦٧ - نجد**
النجد ما اشر من الارض وارتفع . ج انجد وانجاد ونجاد
ونجد . والنجد المكان لا نجير فيه .

٢٨٥٦٨ - نجدة * ، زهرة النجدة
Coleus (S). Coleus (F). French nettle (E). Buntlippe,
Buntblättrigenesell (D). Coleus (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الشفويات . انواعه
المعروفة نحو ١٢ مظهرها بري طبي وبعضها زينة .
سوقها رفاه ، تملو من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اورانها متعاقبة
ممتدة كاملة ، فصالحا قليبة الشكل ، خلية البشرة ،
مسنة الحافة . انزاعها صيطرة القد ، غمية النجيج ، عديدة
الالوان ، يكثر فيها الازرق .

Dolsage (F). Planing (E). **٢٨٥٦٩ - نجز**
نحت الخشب وضعه وتركبه .

Simulie (F). Simulium (E). **٢٨٥٧٠ - نجيرس ***
النجيس والنقرس والقنرس : بوموس صغير اجزم الأنف
يشبه السكيت ، لسه مؤلم .

Transhumance (F). **٢٨٥٧١ - نجعة**
طلب الكلا في موضعه ، راجع انتجاع .

Pastoral **٢٨٥٧٢ - نجيرة**
٢٨٥٧٣ - نجف

Déboisement (F).
Deforestation (E).
النجف هو قطع الاشجار من اصولا وابادتها .

٢٨٥٧٤ - نجكة
القليل من الشيء .

Bloquer (F). **٢٨٥٧٥ - نجكل**
نجل التربة : شقها لثزامة .

Etoile (F). Star (E). **٢٨٥٧٦ - نجم**
بوجه عام كل كوكب سماوي ثابت او سيار يدعى نجماً ،
ما عدا الشمس والقمر . وبوجه خاص كل كوكب
نير يتلألأ في السماء ويبدو ثابتاً في مركزه الفضائي .

Acaule (F). **٢٨٥٧٧ - نجوم ، نجمة ، مكر**
Acaulous, Stemless (E).
اسم تعريبي وصني يطلق على كل نبات لا ساق له .

Ostracion cornu (F). **٢٨٥٧٨ - نجم اعظم**
سمكة بحرية مشهورة باسم ابوصندوق اعظم ، اطليها .

Alétris (F). **٢٨٥٧٩ - نجم لامع**
هو حشيشة الآخ ، اطليها



نجب



نجس



نجير



نجير زاحيف



نجيل ابيض



نجيل احمر

- Apis fasciata (S). نحلة مصرية
Abeille égyptienne (F).
Apis Indica, A. dorsata (S). نحلة هندية
Abeille indienne (F).
Apis cocopria (S). /
Abeille grecque (F). نحلة يونانية

٢٨٦١٠ - **نَحْلَة**
النحلة كوكبية نجوم مظهرها الجنوب مركزها تحت قدمي قنطريون بين كوكبة الحرياء وكوكبة السليوب . عدد نجومها ١٣ منها نجم واحد من المرتبة الرابعة .

- Apidae (S). **نَحْلِيَّات** ٢٨٦١١
Apidés (F). Apidae (E).
فصيلة النحل من رتبة غشائيات الاجنحة .

٢٨٦١٢ - **نَحْلُور**
هو الايتامد الانقياسي من الشكل الجسموي المعروف . اسبابه كثيرة تعود الى عوامل شتى اخضعها الاوصام وعلالية الادوية وبتى تأثيرها في النسيج المنسي .

- Anesse pleine (F). **نَحْوَص** ٢٨٦١٣
النحوص هي الاثان الوشعية الحامل . ج تحص ونحاص .

- Baratte (F). **نَحْصِي** ، **شَكْوَة** ، **سِقَاء** ٢٨٦١٤
Churn (E). وعاء تخفف فيه الكتلة لاستخراج الزبدة .

٢٨٦١٥ - **نَحْصِيَّة** *
Cadre (aplc.) (F). Section (E).
لوح من الشمع المصنوع يحضه اطار من خشب يوضع في القفاز فيقيد النحل عليه تخاريبه ويمر اقراصه . ج تحت .

- Substratum ٢٨٦١٦ - **نَحْصِيَّة**
ركيزة الصفات المميزة في الشيء .

- Amorphe (F). **نَحْصِي** ٢٨٦١٧
Amorphous (E). غير محدد الشكل .

- Abre petit (F). **نَحْصِيَّة** ٢٨٦١٨
هي الاروس النطر ، اطلبه .

- Sélectivité (F). Selectivity (E). **نَحْصَايَة** ٢٨٦١٩

- Mauglignon (F). **نَحْصَاس** ، **جَنْجَل** ٢٨٦٢٠
Horse-desler, Horse-coper (E).
هو تاجر الخيل . وتجارة الخيل تدعى نخاسة وجنيرة .

٢٨٦٢١ - **نَحْصَاشِي**
Oufes (des poissons). (F). Gillis (of fish) (E).
هي في الاسماك الخروق الفرجية التركيب القائمة عند مخرج جانبي الرأس . وظايفها صرف الماء الذي ترشفه الاسماك بمقامها عند التنفس . الواحد نخشوش .

٢٨٦٢٢ - **نَحْصَاع** ، **نَحْصَاع** (F). Marrow (E).
يقسم النحّاع الى ثلاثة اقسام : النحّاع النطفي او ريم النظم والنحّاع الشوكي او الحبل الشوكي والنحّاع المنطويل .
فالنحّاع النطفي نسخ دهي يحضه السمحاق الباطن ، ويريد في تجاريف العظام وفي ثياهايا الاسفنجية وهو حل نوتين ، ابيض اغبر مركزة في تجاريف العظام الطويلة واسمر احمر اللواج مركزة في فجوات الثيايا الاسفنجية || اما

٩ الى ١٥ م . ظهراؤها شفاف يطول عند الذكر من ١٠ الى ١٥ م . وعند الانثى من ٩ الى ١١ م . زباناها خيطية الشكل مجنحة الطرف . سيقانها الخلفية تطول من ٨ الى ٩ م . مرز الانثى جالس الانتساب يطول من ٦ الى ٨ م . يظهر النحوص الشفاف عند اوائل الصيف . يافضالا غداك والاصشاب الرقيقة . اناته ترز السره في سوق ودرور النباتات المختلفة اعصها الاقطين والحرفش والشنداب والبرراق والخيميات في اختلاف انواعها والقيح وسرورع الكربة || دباهه ونيفانهه وسحراته الكاملة تموش على اوراق الثبات والمواد العضوية || مسرعه دجوي يستمر من الغروب الى الفجر .

- ٢٨٦٠٦ - **نَحْص** ٥
Piedmont (F). اصل الجبل وصفه .

٢٨٦٠٧ - **نَحْصِي**
Asepsia (F).
Aseptic methods, A. treatment (E).
مجموعة الطرائق العلاجية التي تستعمل الميكروبات دون الاستعانة بالمواد المضادة لها .

- ٢٨٦٠٨ - **نَحْصِيَّة** هي اللهجة ، اطلها .

٢٨٦٠٩ - **نَحْل** *
Apis (S). Abeilles (F). Bees (E).
جنس حشرات مفيدة من فصيلة النحلويات ورتبة غشائيات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة ، اصطناعها المال . قربها الكبير ورسيق الازهار . اجسامها اسطوانية الشكل . عيونها مركبة ، اعطالها قارضة لاصقة . صدورها نشطة تحمل ثلاثة ازواج من الاجنحة الشفافة . بطونها مركبة من عدة طبقات وبرجات تدثي بسلام لامع عند المعاملات . والنحل يعيش عيشة اشترائية تعاونية في مستعمرات مستقلة مؤلفة من ثول قوامه ملكة او اثني كاملة تعيش نحو ٥ سنوات وظيفها تنج السره . جسمها مستعيل الشكل عادم الحظم اللدق مما يمنحها من تناول الغذاء تلقائيا وما يدنو وسيفاتها الى تزقيها للسحر . ثم اليمخور وهو الذكر الذي يكوم الملكة مرة واحدة في حياتها يموت له اثرها . والياخير لا يقل عددها في الثول الواحد من بضع مئات ، وهي اكبر حجما واغلظ جسما من المعاملات وهي عادمة الشقام اللامع . حياتها تطول من ٨ الى ١٠ اسابيع وتعيش بما تجنيه المعاملات . ثم المعاملة وهي اثني ناقصة التركيب ، عادمة الشوار الجني ، وظيفها جي الرقيق والمسل ومنع الدنج والشمع والمسل وسرارة الخلية وتدير شاتها وشان الخسنة والسلي . وهي مجوزة بسلام لامع تستعمله للدفاع عن النفس . والمعاملات التي يبلغ عددها عدة آلاف تشكل اكثر من ٩٩ ٪ من مجموع افراد الخلية او الثول . وهي تموش نحو ٣ الى ٥ اسابيع باستثناء فصل الشتاء حيث تموش نحو عشرة اسابيع . || اما أشهر انواع النحل فهي ما يلي :

- نحلة ايطالية
Apis ligustica (S).
Abeille italienne, A. ligurienne (F).
نحلة سوداء ، نحلة مدغشكر
Apis unicolor (S).
Abeille noire, A. de Madagascar (F).
نحلة سفيانية ، نحلة عربية
Apis arabica (S).
Abeille arabe (F).
نحلة شائعة
Apis mellifica (S).
Abeille commune (F).
نحلة صينية
Apis socialis (S).
Abeille de Chine (F).



نحوص شفاف



يمخور

نحل



نحية

وأوراقه حازمة مطعومة وباسطة عند الاكثار منها || تنورة يستمر طوال شهر تموز .

٢٨١٣٣ - نَخْرُط الصَّبَاغِين ، عَظْلِيم ، عَظْلِيم

Baptisia tinctoria (S). *Baptisia tinctoriale* (F).
نوع من النخرط الأزرق الصنابي . جلوده غليظة مستطيلة . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه ممتدة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . وريقاته بيضبة منتصبة مسوطة ؛ نصلها مائل البشرة ، عايق الحصار . أزهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، متوسطة القد ، صفراء اللون || جلوده صباغية ، غصنها أزرق اللون كالثنية || تنورة يستمر من تموز إلى آب .



نخرط

٢٨١٣٤ - نَخْرُط مَقْشُوب (F). *Baptisia perfoliata* (S).

Baptisia perfoliata (F).
نوع من النخرط الأزرق اللامر . ساقه منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم . أوراقه بسيطة ، مثقوبة ، مستديرة الشكل ، مائلة البشرة . أزهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز ، صغيرة القد ، صفراء اللون . || تنورة يستمر طوال شهر آب .

٢٨١٣٥ - نُخْرُوب (F). *Alvéole, Cellule* (F).

Alveolus, Cell (E).
هو من الشهاد المسماة الاضلاع التي يصنعها النحل ويضع فيها سره أو يضع فيها عسله . ج نخاروب .



نخربة الارز

٢٨١٣٦ - نَخْرِيَّات ° ، وَهْبِيَّات ° *Tilletiaceae* (S). *Tilletiáceas* (F). *Tilletiaceae* (E).

فصيلة فطور مجهرية من وقية الدعاميات تتميز بظاهاها اللائسية التركيب والانتظام . دعامتها بسيطة لا يفرية ، بؤبؤياتها عديدة فردية التجميع أو مدقوبة || أشهر أجناسها : الاتوريز ، الاتيلوية ، التيلية ، الطاعول ، الميلاوتوزيوم ، النخرية ، النخريضة .

٢٨١٣٧ - نَخْرِيَّه ° ، وَهْبِيَّه ° *Tilletia* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات يركب علة نباتات اخصها نباتات الفصيلة النجيلية . || جرمة ونفثه يتميزان بدعيات قصيرة غليظة مدقوبة البؤبؤات . بؤه اصغر اللون كزهر الزعفران يدور مملكا لزجا ثم ينسل فيصبح كالهاب || أشهر أنواعه ما يلي .

٢٨١٣٨ - نَخْرِيَّه الأُرْد ° ، وَهْبِيَّه الأُرْد ° *Tilletia horrida* (S). *Carle du riz* (F).

فطر مجهرى يصيب الارز فيلديه . امثاله فسيحة الاربعاء تقبل البلاد الاسيوية والامريكية . || يركب بعض اثمار الشكول فيسولوا الى بؤرة بولية تنعمر من فيار لزج كثيف لونه الى السرة الصفحية يتدل كالخيط المنقرقة من الزهرة الى الماء قبل ان يجف ويطار . اضراره زهيدة لا تستوجب الكمامة النباتية إنما يحسن مداركة البذر بإحدى العلاجات الوقائية كغسل القالب في بعض مركبات الزئبق أو الفرمول .



نخرية الحنطة

٢٨١٣٩ - نَخْرِيَّه الحِنَطَة ° ، وَهْبِيَّه الحِنَطَة ° *Tilletia tritici*, *T. caries*, *Uredo caries*, *Lycoperdon tritici* (S). *Carie du blé*, *C. du froment* (F). *Stinking smut* (E). *Steinbrand des weizens*, *Steinbrand* (D).

فطر مجهرى يصيب الحنطة على اختلاف أنواعها . يكثر في البلاد المعتدلة المناخ والباردة . يركب الحب فيسول

النخاع الشوكي فهو جزء من الجهاز العصبي يمتد في القناة الفقرية من النخاع المستطيل الى الفقرة القطنية الأولى . وهو ضفيرة من الالياف العصبية وظيفته نقل الاحساسات بين اطراف الجسم والمراكز العليا منها والى || واخيراً النخاع المستطيل الذي يقع بين مؤخر المخ والنخاع الشوكي فهو أحد اجزاء الدماغ الذي يمين على الجهاز العصبي ويسيطر على تفلط حركات القلب والتنفس والضغط الخ . وهو يشبه الحبل الشوكي من حيث تركيز المادة السمره في القسم الباطن وللمادة البيضاء في المحيط الخارج .

٢٨١٣٣ - نُخَالَة (F). *Son* (F). *Bran* (E).

هي الفضلات الخالية من نخل الحبوب بعد طحنها لا سيما الحنطية .

٢٨١٣٤ - نُخَالَة (F). *Pruine visqueuse* (F).

بادة عضوية طليسية التركيب لزجة تغطي بشرة سوق ولوراق بعض النباتات .

٢٨١٣٥ - نُخَالَة (F). *Select* (F). *Select* (E).

نخت الطائر الشرة : نخرها .

٢٨١٣٦ - نُخَالَة (F). *Picotee* (F). *Peck at* (E).

نخت الطائر الشرة : نخرها .

٢٨١٣٧ - نُخَالَة (F). *Bœufs de travail* (F). *Oxen* (E).

النخعة هي البقر الموامل دون تمييز .

٢٨١٣٨ - نُخَالَة ، دَهَب ° *Nécrose* (F). *Canker* (E).

داء في نسج النبات سببه فطور طليسية مختلفة .

٢٨١٣٩ - نُخَالَة الحَبُوب (F). *Carie* (F).

مرض فطري يمتري الحبوب لا سيما الحنطة . سبه بعض الفطور النخرية المجرية . احاطب نخرية .

٢٨١٣٠ - نُخَالَة ° *Baptisia* (S). *Baptisia* (F).

False indigo (E). *Farharhölz* (D). *Baptisia* (I).
جنس نباتات طيحية من الديداليات وفصيلة القنريجات الفراقية . انواعه عديدة مظهرها بري وبعضها صباغي او طلي . اوراقها مدادة ، سفيها منتصبة . اوراقها لا قياسية الشكل منها المركبة والمتعقدة والمخاضنة . ازهارها لا نظامية التجميع . ثمارها حبات اهليلجية قصيرة القد . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٢٨١٣١ - نُخَالَة اَبْيَض (F). *Baptisia alba* (S).

Baptisia blanche (F).
نوع من النخرط الأزرق . ساقه منتصبة تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية . وريقاته اهليلجية الشكل مقطوعة الطرف . أزهاره فردية التجميع ، محورية الارتكاز وابيطة ، كبيرة القد ، لونها الى البياض المالح . تنورة يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨١٣٢ - نُخَالَة البَر ° ، فَيْلَكَة بَرِيَّة ° *Baptisia australis* (S). *Baptisia australis* (F).

نوع من النخرط الطلي والزرني . جلوده غليظة . ساقه منتصبة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية الوريقات . وريقاته اهليلجية مقطوعة ، نصلها مائل البشرة ، جميل الحصار الزاهي . أزهاره عنقودي التجميع هامي الارتكاز . أزهاره ضفيرة القد زرقاء اللون || جلوده

سولية أيضاً وثلاثية التنسيت كما في الذكورية ، لكن توجيها ثلاثي البتلات المرسومة وأسدتها شقية حشرقية وبفاتها ثلاث وهي بنسية الشكل نجمة منفصلة وساماتها لائفة وأثمارها وريدة الزهرة . || أشهر أنواعه على الإطلاق هو النخل المعروف أي النخيل .

٢٨٦٤٦ - نَخْلُ الدَّقِيقِ *

Phoenix farinifera, Ph. puilla (S). Dattier à farine (F). نوع من النخل غليظ الجذع القصير . ساقه تملو نحو ٢٠٠ سم . بينما لا يقل قطرها عن ١٠٠ سم . سفعه كسفت النخيل وأشد أخضاراً . جريده يتصبن عند زامه الأخير . مهده منخفضة سهل الحشد الشرقية . رطب في الأثرية الدبالية المرورية . ثماره صغيرة اللد صفراء اللون لا تتوكل يستخرج من جماره ساقه الصمغ لبوب نشوي المادة مأكول يقال أنه كثير الفوائد الصحية . || يزرع خارج مهده الآن فقط .

٢٨٦٤٧ - نَخْلُ الدُّهْنِ * ، نَحْلَةُ الزَّيْتِ ، إلْوَيْس
Elaeis guineensis (S). Eléide, Eléis, Avolra, Palmier à huile (F). Oil palm (E). Olpalma, Guineische Palme (D). Palma avoira, P. da olio, Aouara di Guinea (I).

نوع من النخل ، مهده بلاد إفريقية الاستوائية أحصها غليظاً ، ساقه حلقة اللحم مرطاً ، سفعه ريشي التركيب . ثماره نورية الشكل ، جوزية اللحم ، صفراء اللون ، تحضن ثلاث حبات يستخرج من لها دهن أصفر طر يستعمل في صناعة الصابون . ويستخرج من صلام حباتها سمن نباتي أبيض اللون يستعمل للأكل .

٢٨٦٤٨ - نَخْلُ الشَّعْرِ * ، سِيرُوكِيلِ

Ceroxylon (S). Céroxyle, Palmier à cire, Arbre à cire (F). Wax palm (E). Andenwachspalme (D). Palma della cera (I).

جنس نخل أمريكي . أنواعه المروعة قليلة . سوقها ريفية تملو ٤٠ إلى ٥٠ سم . سفعها يشبه سفع النخيل لكنه يطول نحو ٦ أمتار . يتكرر ويوجد في بلاد البربر عند جبال الأندلس مقربة من الثلج الدائم . ثمارها نورية ، كبيرة ، بنفسجية اللون ، سكرية الطعم . عصارتها شمية تستعمل في عدة صناعات .

٢٨٦٤٩ - نَخْلُ القَطَبِ * ، نَخْلُ نَاتَالِ

Phoenix natalensis (S). Dattier du Natal, D. du Cap (F).

نوع من النخل الصغير اللد . جذعه جالس مستقيم يملو نحو ٣ أمتار . ساقه غروطية الشكل غليظة القاعدة دقيقة القرس السطحي . جريده سفعه يطول نحو ٣ أمتار . خوصه بحري اللون تملو شمة خضراء || مهده بلاد رأس الرجاء الصالح والنتال . يزرع الآن في جزيرة في جميع الأثرية ويصنع حل سفع شواطي البحر المتوسط || ثماره حامزة صلبة صفراء اللون .

٢٨٦٥٠ - نَخْلُ النَّفَا *
Sagoutier (F).

هو السافوتية ، أطباها .

٢٨٦٥١ - نَخْلُ بَرِّي

Phoenix sylvestris (S). Dattier sauvage (F). Wild palm (E). Wilder Dattelpalm, Tannenpalme (D). Palma salvatica (I). نوع من النخل الكبير اللد . جذعه يرتفع عن ١٠ إلى ١٢ م . سفعه كسفت النخيل ، يرم خوصه مستد الطرف طويل الهدبة ، لونه إلى الخضار الأزاعي . || مهده بلاد

كامل البر أو بعضه إلى كلفة من البرج || وهو لا يعلب السوق لكنه يسبب قصر السلايمان والثراف ثم عقر القسم الأعل من السنايل . || أضراره قد تكون فادحة إذا لامته البومال الجولية وأحصها امتداد الحرارة أو تدنيا || يكافح باستعمال أبج الفواطير القمالة منها زديخات النحاس أو املاح الزئبق أو مركبات الفرميل .

٢٨٦٥٠ - نَخْرَجَةُ الشَّعِيرِ * ، رُهَيْبُونُ الشَّعِيرِ
Tilletia panicis (S). Cario de l'orge (F).

فطر مجهرى يركب جميع أنواع الشعير . يكثر وجوده في أروبة الوطى . || طياله مستدرة الشكل أو بيضية لوئها إلى البسة قطيها مشعة بنفسجية حابكة . أضراره محدودة لا تتجاوز ، في أشد الإصابة ، ثلاث حبات في النسبة الواحدة . || يكافح مكافحة سائر النخرجات .

٢٨٦٥١ - نَخْرَجَةُ الشَّيْطَانِ * ، رُهَيْبُونُ الشَّيْطَانِ

Tilletia secalis, Uredo secalis (S). Cario de seigle (F). فطر مجهرى يسبب الشعير فيضيه . يكثر وجوده في المناطق الباردة أحصها بلاد الاتحاد السوفياتي . وهو على السنايل الملوقة مشعة من إزقة البيرة بينا يكون البر أصفر قدماً من المعتاد وأغلظ قطراً . || طياله كروية الشكل أو بيضية . بوه لبه الصبيب ، كرية الرائحة ، أسود اللون ، أزرق المولج ، دقيق القثيار . || أضراره فادحة تراوح بالنسبة إلى المواقع والموايل الجوية من ٢٠ إلى ٧٠ ٪ . || يكافح مكافحة نخرية الحطية ومن الأوجب اجتباب زراعة الشعير في الأماكن الرطبة .

٢٨٦٥٢ - نَخْرَجَةُ مُتَشَبِّهَةِ * ، رُهَيْبُونُ مُتَشَبِّهِ

Tilletia foetida, T. levis, Ustilago foetida (S). Cario féride (F). فطر مجهرى يركب بر الحطية في جميع المناطق الحارة والمستدلة المناخ . || طياله كروية الشكل أو بيضية ، بقرها مائلة السطح موشجة بالأصفر . بوهها كرية الرائحة . || أضراره شبة بأضرار نخرية الحطية تزداد مع ازدياد وطفه الحر . || يكافح مكافحة نخرية الحطية .

٢٨٦٥٣ - نَخْرَجُ *
Térébrer (F). To terebrate (E).

٢٨٦٥٤ - نَخْرُوشِ

Ouies des poissons (F).

Gills of fish (E). نخروش ج نفاشوش . هي أداة الصنع عند الأسماك وهي تقرب فلبية متصلة بالنفاشيم من عن بين الرأس ويساره .

٢٨٦٥٥ - نَخْلُ

Phoenix (S). Dattier (F). Palm tree (E). جنس أشجار ليفة من فصيلة النخلات حديد الأنواع والفردوب جميعها من نباتات المناطق الحارة . || جذوعها متصببة ريفية أو نجية وإلجاع عند وجوده يكون أسطواني الشكل وسيد الساق المستقيمة الكعرة الكروانية وغير المتفرعة . أو رافها سفية طولية الجريد غليظة الكرب وريشة الشكل . خوصها تجزل التركيب ، فتالي البزم الجليي التصل المستطيل المذهب الهدبة . || والنخل من النباتات الثنائية المسكن التي يتبين إزهارها بظلمة فناء وكافور بسيط . اما إزهارها فلامطة وقد يخلط تركيبها بالنسبة إلى كونها ذكورية أو أنثوية . فالإزهار الذكورية تتميز بكأس سولية الشكل ثلاثية التنسيت مع توجع ثلاثي البتلات وأسدية شقية وبآبر غليظة متصببة . || اما الإزهار الأنثوية فكأسها



نخرة الشعير نخرة الشليم



نخل الدقيق




نخل الدهن



نخل الشمع



نخل القطب



- 1 من - 2 لنگر، خرم مروارید - 3 خرم مشک - 4 من خرم - 5 لنگر - 6 خرم - 7 من مشال، پرتکوب - 8 لیس، شکب بخری - 9 لنگر - 10 کزکوب - 11 کزکوب - 12 کد بخری - 13 زوزم - 14 حکس - 15 رانیکه - 16 من خرم - 17 بالور - 18 بالور لنگر - 19 ملس - 20 کرکته، براد - 21 دشت - 22 ششک - 23 سرمان - 24 خشاک - 25 خشاک - 26 دم عود - 27 سرجه البحر، شککله - 28 غرنا غش - 29 دشکر - 30 شککله - 31 لور - 32 دانه - 33 جرس - 34 شککله - 35 لید الیه - 36 لید عودیه - 37 عاله - 38 ملین - 39 لید - 40 عک البحر



- 1 نباتات حرجية وصالحة : 2 طبخة مرف الكوك - 3 بيا ، مصيدية - 4 كريميس - 5 عائلة قايمة - 6 عسكار - 7 عسلية شامية - 8 عسلية حيلة - 9 نيشان - 10 دينة -
 11 طبخ - 12 ليلاب فلي - 13 شعور شعري - 14 شعور اصغر ، خيري - 15 خيرة مر - 16 عسلية مر - 17 حبل لبي - 18 حبل المسك - 19 عسلية وديك - 20 عسلية
 كالوركية - 21 فوسين - 22 زهر الكسكسين - 23 لسان الزنار - 24 دافور مصرية - 25 بديهة - 26 صليوت - 27 بديع الكاثول - 28 نباتات دوسيك وطلوويك : 29 اماريش ،
 لرجيس - 30 زهر الفهد ، لفلو - 31 زهر فريد - 32 زهر صر - 33 زهر برز ، سراس - 34 ينديا زليمة - 35 لدا - 36 امانيا ، دعلي - 37 امانيا كروية - 38 امانيا
 اريوانية - 39 امانيا زليمة - 40 امانيا ابراطورية - 41 دليوت ملطع - 42 دليوت الحصاد - 43 دليوت نسي - 44 سوس بريلي - 45 سوس اساني - 46 سوس شوان - 47 دمران -
 48 جن الطاووس - 49 حرا - 50 عيش ، انليل - 51 زليل ابيض - 52 زليل زليق - 53 زليل زهراني - 54 زليل ، زليق - 55 زليل الزمكرين - 56 زليل مكسي - 57 زليل فريج -
 58 زليل يسي - 59 فشاكر كوكي - 60 فشاكر ايلي - 61 حيوان الزمكرين




لپاغت مسمرة: 1 ادرم، 2 ارياق، 3 جريمة هريجة، 4 جريمة كيرة، 5 نخلوس، 6 كرفل كاشمر، 7 كرفل افرشكين، 8 كرفل صيني، 9 اسطر صيني، 10 اسطر ميلان،
 11 كرفل ميهات، 12 كرفل لولي، 13 كرفل علفي، 14 كرفل مرعب، 15 كرفل لطف، 16 كرفل مسلح لفر، 17 كرفل صبي، 18 كرفل كعب، 19 منبر كنديري،
 ناهور، 20 فزفان، 21 خردوب وري، 22 فزفان الفسي، 23 ردية، 24 لطفيل جيري، 25 مواريت، 26 صيون كير افر، 27 صيون خشك، 28 صيون ريغ، 29 صيون مشيق،
 30 قريمة، 31 جيلان هريش افرق، 32 فاقلة صافيي، 33 نردنيا، 34 پوكا، 35 خطي، 36 لولي اسفر، 37 لياافر، 38 غششان تاني، 39 شوكا، 40 شوكا
 دروس، 41 زلفه ليجي، 42 زلفه اذان ابد، 43 زلفه پايان، 44 زلفه قنطرة، 45 رصايب، 46 اكليجا سارة، 47 اكليجا قديت، 48 فزفان لپاغت، 49 روح صير لفر،
 50 روح صيني، 51 دهل، 52 سم، 53 سمكة، 54 دلقور مشيرة، 55 دلقور مشيرة، 56 دلقور مشيرة، 57 دلقور مشيرة، 58 دلقور مشيرة، 59 دلقور مشيرة، 60 دلقور مشيرة، 61 دلقور مشيرة، 62 دلقور مشيرة، 63 دلقور مشيرة




الفهرست و نامها : ۱ کلبه - ۲ لکجه - ۳ افروس لکلی - ۴ سرشته افندی - ۵ دوربانه - ۶ پلنگان عربان قرمز - ۷ کرل - ۸ صسل - ۹ نراک - ۱۰ بلنبه - ۱۱ دویچه وردبانه - ۱۲ سدرله کبره قرمز - ۱۳ مشوله بیه - ۱۴ خلی ملکی - ۱۵ خلی افندی - ۱۶ لیلک - ۱۷ لیلک چین - ۱۸ سرکجه - ۱۹ ملی - ۲۰ دوح مجری - ۲۱ کرز الزناری - ۲۲ کوز - ۲۳ سسله لیلک - ۲۴ ورد لیلک - ۲۵ ورد علی - ۲۶ ورد جا کبر - ۲۷ ورد المارشال لیلک - ۲۸ ورد دیمون - ۲۹ ورد قرسی - ۳۰ ورد لیلکون - ۳۱ ورد فستی - ۳۲ ورد کبیر قرمز - ۳۳ ورد سلونی - ۳۴ لعل - ۳۵ قیل - ۳۶ سنبه - ۳۷ پلنگان خدی - ۳۸ رنگان - ۳۹ چورن - ۴۰ آریتریا - ۴۱ جیکوس - ۴۲ کالندوم - ۴۳ ورش بیه - ۴۴ لوشیا چین - ۴۵ لوشیا طلقه - ۴۶ آلامه - ۴۷ اچلسیا بترله - ۴۸ اچلسیا حلقه - ۴۹ کامیلیا پانالیه - ۵۰ کامیلیا کبره قرمز - ۵۱ فسه - ۵۲ طرخون - ۵۳ ایلک - ۵۴ فلیکوس - ۵۵ سدره المرحبان




- نباتات كنعاني القرد : 1 لغير الانانيد - 2 زبادك جينكو - 3 الكوروم شرد - 4 الكوروم لوفس - 5 يابريه بروليا - 6 يابريه كندر - 7 تيلانسا سلف - 8 تيلانسا ليد - 9 فريه سبت - 10 اخين ، شرد - 11 خاليج - 12 كيد - 13 اسكوت - 14 فلوكنيد ، سلطان - 15 فوسك - 16 آسك ، جريانيك - 17 لاجيري - 18 ابر تاون ، فريه فراك - 19 يولغاليه ، جيسيه - 20 سكر ، بحر سم - 21 رداء الفين - 22 فريه سفل - 23 مرمرة - 24 سناميك - 25 براساوا - 26 نطق دوشا - 27 نطق شعوب - 28 كوروش هيل - 29 باربيك بكنال - 30 باربيك برورد - 31 باربيك لين - 32 باربيك سكر - 33 باربيك روشيك - 34 ددروب فريديت - 35 ددروب فريه - 36 ديز كيرا فريه - 37 جيل اصغر - 38 ليل دشيك - 39 ليل لوجواليك - 40 ليكسي - 41 فيكك سافا - 42 مكيت سكر - 43 ميلويه فريه - 44 سفلويه فريه - 45 سفل كيرا فريه - 46 سفل سفل - 47 سفل فريه - 48 سفل كيرا فريه - 49 سفلوه فريه - 50 سفلويه - 51 ليد سفل - 52 ليد سفل - 53 سفل فريه - 54 سفلوه فريه



1 كبريت طبيعي - 2 بيريت (كبريتور الحديد) غشبي ازديا - 3 بيريت (مكتنات راحة) - 4 بيريت (مكتن طليق) - 5 - 6 حمار بهن الذهب - 7 تير ذهب طبيعي - 8 تير بلاتين طبيعي - 9 نمتة بلونيت - 10 زرايع البيريت (ميتيكل) - 11 حديد اولمبيتي - 12 ساروز او حديد ماسيم - 13 نفاك ميكريت - 14 نفاك ماسيم - 15 رساس ميكريت - 16 لاصير ماسكند - 17 بيريت القشلي (كلكوبيريت) - 18 مغنيت - 19 نحاس طبيعي - 20 دمنج - 21 زنجار - 22 لآزورد فتي - 23 حبر او كوبران اصفر - 24 اسرب ، غزالوت



1. معدن لشفاف - 2. كوردالين وردى - 3. كوردالين اسود - 4. من الحجر الاسود - 5. ماس اسود - 6. ماس ابيض - 7. ماس ازرق - 8. سفير - 9. زبرجد - 10. كبريت - 11. بافلوت احمر، لؤلؤ - 12. من الحجر - 13. زبرجد - 14. جصت ابر - 15. جصت قرني - 16. مرو جصتي - 17. مرو جصتي - 18. ياقوت - 19. طيق - 20. شمسكيت - 21. شمسكيت - 22. صلبان - 23. دية من الفايغيت - 24. ميلان قرني - 25. كلسيت لؤلؤ - 26. كلسيت سيمي - 27. جص - 28. لافان - 29. لافان - 30. ملح لؤلؤ



- 1 أبو البحر - 2 عشاء البحر - 3 بردن بحري - 4 حبرية - 5 أم حوشة - 6 ظلم - 7 براني - 8 موطنة - 9 موطنة - 10 سيفاء - 11 صديرة - 12 خيعة البحر - 13 ترس البحر - 14 أبو جريون - 15 دسكس - 16 بناتل - 17 نقة - 18 طمسرة - 19 قبة - 20 نيشان (في أبو حوشة) - 22 علية - 23 زب البحر الحيطي - 24 زب البحر التلياني - 25 زب البحر النجيل - 26 دويلة - 27 دويلة الخ - 28 دويلة البحر الحمراء - 29 دويلة البحر المشبكة - 30 كوكبة - 31 نجمة الشاع - 32 بنتكرين - 33 كرمات مسيل - 34 عتكوپ - 35 دويلة - 36 لصفة - 37 تلاء البحر - 38 عريان الرمل - 39 حلة - 40 أم كلاب - 41 انتارة - 42 فلفوس - 43 أبو سحر - 44 بطريل



نخل بوتان



نخل شائك



نخل كرنبي



نخل كنارية



نخل معروف

جارة قلبه المأكولة . ويزرع للزينة في المراكب وفي المواقع التي لا تحشى السقيح . ساقه قصيرة . كرهه عدم الدرك . سلفه مستطيل الخوص جميل الخضار .

٢٨٦٥٨ - نخل كناريه * ، نخل الجزر الحامض

Phoenix canariensis, P. tinnis (S). Dattier des Canaries (F).

نوع من النخل المتوسط القد، جلعه يعلو من ٨ إلى ٨ أمتار . ساقه اسطوانية غليظة يبلغ قطرها نحو ١٠ سم . سلفه مستطيل القد ، كثيف الخوص ، متدلل الصنمين الذي يتوسط الزمان الثالث || مهده جزر كناريه ونهبا انتقل الى معظم مناطق حوض البحر المتوسط . ضروبه عديدة مظهرها زخيفي سريع النمو يعيش في جميع الاروبة وبعضها زراعي يفرس بلبي ثماره المأكولة الحمراء اللون .

٢٨٦٥٩ - نخل معروف * ، نخل

Phoenix dactylopera, P. excelso (S). Dattier fruitier (F). Datt palm (E). Dattelpalme, Palmbaum (D). Palme, Dattaro, Palmizito (I).

نوع من النخل، كبير القد، كثير القد، جلعه يعلو من ١٢ إلى ٢٥ متراً . جريد سلفه السوق المستقيمة تملأ من ١٢ إلى ٢٥ متراً . جريد سلفه يعلو من ٣ إلى ٤ أمتار وهو شائك الكرب غليظ الكرات . غوصه مستطيل البزج المذهب الحديث ، لونه الى الخضار الازرق || ازهاره عذكري التجميع عند الذكر والانثى، عذكوها يعلو افرصاً ، ينمو عند ظهورها محاطاً بقشيرة كبيرة تدعى القنن . اما الشكل الانثوي الذي يعمل الثمر فيدعى حرجواً . || ثمرة النخل مستطيلة الشكل ، لينة السق، سكرية الطعم ، مأكولة . نولها برة خشية قاسية يقطعها شق طولي عميق يدعى الثغر . وله الثمرة اسماء تعريفية عديدة تختلف مع تطورات مراحلها الحياتية من الارام الى الانواع . فهي بعد الارام سبابة ثم غلالة فيلسة نجدالة فيلسة قرطبة واشيراً ثمرة . || اصلاته فحوض البحر الاخر فصر فليبيا فالجزائر فراكش . يعيش ايتاً زرع غير انه يفضل الاروبة الرملية البدالية بالمواد العضوية والناصر الغذائية كلما ازداد حل النخل العميق الفور المسجمة الرطوبة . وكلما ازداد غناء التربة الحولي وانقطع عن المساحة . || اقليمه الافضل هو الاقليم الذي تشتد فيه الحرارة من ارباط ايار الى ابخر تشرين الاول حيث يبلغ مجموع الساعات الحرارية ، خلال هذه المدة ، نحو ٤٠٠٠ ساعة وكل ان يكون متوسط الرطوبة الجوية النسبية نحو ٤٠ ٪ || اشهر ضروبه وابجودها ما يليق .

- إيريجي - ثمرة تطلو نحو ٥ سم . حراء اللون تشبلك جافة .
- ماهات - ثمرة تطلو نحو ٣ سم . شديدة الحلاوة تؤكل رطبة وجافة .
- برتقالو - ثمرة تطلو نحو ٤ سم . تشبلك رطبة وجافة .
- بنت عهده - ثمرة تطلو نحو ٤ سم . تؤكل رطبة وجافة .
- لوي - ثمرة تطلو نحو ٦ سم . قليلة الالياف تؤكل جافة .
- جندالا - ثمرة تطلو نحو ٤ سم . تشبلك جافة .
- حلاو - ثمرة تطلو نحو ٤ سم . حشلية اللون تصعد بكثرة .
- حياي - ثمرة تطلو نحو ٥ سم . تشبلك رطبة وجافة .

الهند الشرقية ونهبا انتشر في معظم بلدان حوض البحر المتوسط . يزرع للزينة . ثماره صفيرة حامضة .

٢٨٦٥٩ - نخل بوتان * ، نخل سيكيم، نخل

المعنى

Phoenix rupicola (S).

Dattier des rochers (F).

نوع من النخل المتوسط القد، يتشيز بجذو جريدته من الكراتاف الثام بين الساق والكرب، جلعه يرتفع من ٧ أمتار . سلفه رشيق الشكل يعلو نحو ٤ أمتار . غوصه مريض البزج المذهب الطوف || مهده مناطق بوتان وسيكيم من اصمال الهند . وهو من اجمل انواع النخل شكاً وازقاً لذلك يزرع للزينة ويوجد منه حل بعض شواطي البحر المتوسط || ثماره حشلية اللون مأكولة يجمعها قدر كبير القد لا يقل طوله من ١٢٠ سم .

٢٨٦٥٩ - نخل زكوتينبار ، نخل مقوس

Phoenix reclinata (S). Dattier de Zanzibar (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جلعه رشيق القوام يرتفع من ٤ الى ٦ أمتار وكثيراً ما يتقوس عند زانه الثالث . سلفه مستطيل القد عجين الجريد . كرهه حاد الشكل . غوصه جميل الخضار اللامع || مهده زيبار وما قاليها من القارة الافريقية . وهو من الانواع السريعة النمو يفضل الاروبة الجصية ولا يتأذى من فيرها . يزرع للزينة . ثماره صفيرة القد . صفراء اللون لا تؤكل .

٢٨٦٥٩ - نخل سركديب ، نخل سيلان

Phoenix ceylanica (S). Dattier de Ceylan (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جلعه يرتفع نحو ٥ أمتار . سلفه يعلو نحو ٤ أمتار . كرهه شائك . غوصه مستطيل البزج المذهب ، لونه الى الخضار اللامع || مهده جزيرة سرديب يعيش في حصص ويصروح هضابها القاحلة . يزرع للزينة .

٢٨٦٥٥ - نخل سيكام

Phoenix siamensis (S).

Dattier de Siam (F).

نوع من النخل المقر العادم الساق . جريد سلفه يعلو نحو ٣ أمتار . غوصه كثيف التجميع جميل الخضار الزاهي . يزعم مذهب المقصعة ، طويل الحديثة || مهده سهل سوام الرملية . متطلباته الزراعية قليلة لانه من نباتات العادة وقد رغب في الاروبة الرملية التي لا تخلو من الدبال . ثماره اسطوانية اللون مأكولة .

٢٨٦٥٦ - نخل شائك

Phoenix spinosa, P. leonensis, P. senegalensis (S). Dattier épineux (F).

نوع من النخل المتوسط القد . جلعه متدلل الساق يعلو من ٤ الى ٦ أمتار . جريد سلفه يعلو نحو ٣ أمتار . غوصه جميل الخضار الباق ، يزعم مذهب شائك . مهده افريقية الاستوائية . رغب في الاروبة الطينية الكلسية ولا يحشى الرياح البحرية . يعيش حل شواطي البحر المتوسط || ثماره متوسطة القد ، عجيبة الجرم . سمرها مرجاني اللون . رطبها احمر خري . ثمارها كسني اللون . سكرى الطعم مأكولة .

٢٨٦٥٧ - نخل كرتوبي

Oreodoxa oleacea (S). *Oreodoxa oleacea*, Palmista franc, Chou-palmiste (F). Cabbage palm (E). Kohl-palme, Kohlrangende, Arelapalme (D). Palmisto, Palma cavolo (I).

نوع من نخل البلاد الحارة الاسيوية والافريقية . يزرع لحي

royal, Palmier royal (F). Royal wine palm (E). Königspalme (D). Palma regis (I).

نوع من النخل الزراعي الذي يزرع في جلدته ربيع الساق المنتصبة. يهرته تاجية الشكل جميلة القالب. سفه متوسط الطول قليل التحسين. غوصه جميل الخضار الزاهي. طلعته كبيرة القذ فائضة. ثماره صغيرة الحجم. ارجوانية اللون، ناضجة السوق، لا تكوّل. جارة قلبه ما كولة مستحبة الطعم.

Phoenix paludosa (S). نخيل متجمعي *
Dattier des marécages (F).

نوع من النخل المتوسط القذ. جلدته سفاه الساق المنتصبة يصل من ٨ إلى ١٠ أمتار. جريد سفه يصل نحو ٣ أمتار وهو شائك الكرب عجين الزمام الأخير. غوصه جميل الخضار القسبي. يزرع مذهب الطرف || مهدد منافع المخذ الشرقية وقد يعيش في جميع الأتربة الدهبالية الرطبة. ثماره لا تخلو من الحلاوة لونها إلى الصفار القاتم.

Phoenix aculis (S). نخيل تجصي *
Dattier acule (F).

نوع من النخل العادم الساق. سفه كبير القذ ريشي الخوص. يزرع صلب النصل، مذهب الطرف، جميل الخضار الزاهي || مهدد مرتقات سهل المخذ شرقي بحر الكنج || ثماره خرية اللون حاضرة الطعم لا تكوّل. يزرع للزينة وقد يعيش على الشواطئ اللبنانية ويعود في الأتربة الرملية القليلة الرطوبة.

Palmicole (F). نخلائي ٥

نمت تصريفي يطلق على كل ما يعيش على النخيل أو ينمو عليه.

٢٨٦٥ - نخلة الجوز هي الكروية، اطلها.

٢٨٦٦ - نخلة السكر *، أرثما

Arenga saccharifera, Borassus gomutus (S). Areng. Palmier areng, P. à sucre (F). Gomuti palm (E). Gomutepalme, Zuckerpalme (D). Palma arenga, P. dello zucchero (I).

نوع من النخل الهندي المنبت، تكثر زراعته في المخذ والكوشين وباروا وبلقه حيث يستخرجون السكر من ثماره. ساقه منتصبة رفيعة تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. سفه كبير القذ متعاهد الخوص. يزرع مقطوم الطرف، فصله عابق الخضار || ثماره لينة التجميع حلوة المذاق يستخرج منها هصاره سكرية شائعة الانتباه.

Palmaceae (S). نخلات

Palmacées, Palmiers (F). Palmae, Palm-trees (E). فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠ اصنافها البلاد الحارة والاشترالية من المالين القدم والجديد. جلوعها وحيدة السوق الريفية المنتصبة. اوراقها سمية التركيب حامية الازتكار. ازهارها وحيدة أو ثنائية المسكن. ثمارها لا تقياسية الشكل والحجم لينة السوق.

٢٨٦٨ - نخليين
Palmatine (F). Palmitein (E). مادة بلورية توجد في الدهن ويكثر وجودها في حافض النخل وقد تستحضر بتألف الحامض النخل مع الفلوسرين.

٢٨٦٩ - نخلوس هو النخس، اطلها.

٢٨٧٠ - نخيب
Sélectif (F). Selective (E).

خداوي - ثمرته تطول نحو ٤ سم. صفراء اللون. جيدة الصنف.

خلاوي - ثمرته تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وافضلها.

خاجانا - ثمرته تطول نحو ٤ سم. تسهل جافة.

خجلة النور - ثمرته تطول نحو ٤ سم. تعتبر من اجود الاصناف وافضلها.

خاهدي - ثمرته خضية اللب متوسطة القذ جيدة الصنف.

خطلولي - ثمرته كبيرة القذ شديدة الحارة فائضة الصنف تؤكل رطبة.

خطلاني - ثمرته كبيرة القذ حنطية اللون فائضة الصنف تؤكل جافة.

خمالي - ثمرته ريفية الشكل صفراء اللون تؤكل رطبة ورطب.

خهدي - ثمرته صغيرة القذ شديدة الحلاوة كثيرة الالياف.

خراسي - ثمرته صغيرة القذ تؤكل رطبة وجافة.

خريزي - ثمرته متوسطة القذ فائضة الصنف تؤكل رطبة.

خجلاني - ثمرته متوسطة القذ جيدة الصنف تسهل رطبة وجافة.

خروي - ثمرته تطول نحو ٧ سم. جيدة الصنف تؤكل رطبة وتصدر.

خطلوي - ثمرته متوسطة القذ فائضة الصنف تؤكل رطبة.

كسي - ثمرته متوسطة القذ متخارعة جيدة الصنف تؤكل رطبة وجافة.

خنجولي - ثمرته كبيرة القذ فائضة الصنف تؤكل رطبة.

مقطوم - ثمرته متوسطة القذ متخارعة جيدة الصنف تؤكل رطبة.

نرمياني - ثمرته كبيرة غليظة صفراء اللون جيدة الصنف رطب.

ومرة النخل ان رطبة أو جافة، أي، مخر، غنية بالأحماض

للمدينة القلوية التي تعادل حموضة الحوم والبيض والخبز

وهي غنية بالفيتامين (١) ومتوسطة البني بالفيتامين (ب)

و (د)، اما متوسط العناصر المختلفة الموجودة في ١٠٠ غ.

من لب النور فهو :

٣٠ ٪ من الماء

٩٥ ٪ من السكر

٣ ٪ من البروتين

١ ٪ من الأحماض

هذا مع العلم ان القيمة الغذائية للمواد السكرية الموجودة

في النور توازي نصف قيمة السكر العادي.

٢٨٦٦ - نخل معلاقي

Phoenix pedunculata (S). Dattier pédonculé (F).

نوع من النخل الصغير القذ. جلدته اسطواني الساق يصل نحو ١٠٠ سم. جريد سفه يصل نحو أربعة أمتار. غوصه مستعرض كبير يصل نحو ٣٠ سم. يزرع جميل الخضار الزاهي ينضبط عنه زامه الأخير. || مهدد بهبال المخذ الشرقية حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م. يعيش في جميع مناطق ساحل البحر المتوسط. يزرع للزينة. ثماره صفراء اللون حنطية المواجه غير ما كولة.

٢٨٦٦ - نخل مككي *

Oreodoxa regia, Roystonea regia (S). Oréodoxe



٢٨٦٧٦ - نَخِيرَة

Branchiostome (F).

النخيرة فوعة مبيقة تمكن الحواميس من الاتصال بالخارج .

٢٨٦٧٧ - نَخِيرَة * ، غُصْرِيَّة النَبِيح ، لَزْبُود رَمَه
Lasioderma serricorne (S). Lasioderma (F). Cigarette Beetle (D). Tabakkäfer (D).

سحرة من غدييات الأجنبية وفضيلة الفريطات . جسمها اسطواني الشكل ، صغير القد ، يطول نحو ٣ سم . قوبها الى الهي الكتستاني المراج يطوى خل الحبل . رتبته مضية الجسم ، فراء اللون ، ثمانية الرأس ، مهدبة الظهر والجنايب والاطراف ، تطول نحو ٤ سم || ابيها الحولية عديدة تراوح من ٣ الى ٦ ، جيلها يدمر من ٤ الى ٧٢ يوما . الحشرة الكاملة تعيش من ٣ الى ٦ اسابيع تنجح مكثها افراديا على التثنت فيقتف خلال مدة ادناها ٥ ايام واقطعها ١٠ . اما البرقة تنهش من ٣٠ الى ٥٠ يوما || تتصلب بعد انسلخها الثاني الى عذراء ثم الى حشرة كاملة . وهي من حشرات البلاد الحارة والمعتدلة تسرح في الليل وتألف الالساكن الاكل الاكلة . رقاتها تركب التثنت ولقائف التي فتقع بها الاضرار الجسيمة لانها تنطرحها وتطبخها . تكاثرها بواسطة مصائد النور او المصائد الكهربائية .

٢٨٦٧٣ - نَخِيرَة

Beurre (F). Butter (E).

من اسماء الزبدة ولعلها الزبدة الرقيقة كالزبد .

٢٨٦٧٤ - نَخِيرَة

هو النخل المعروف ، اطلبه .

٢٨٦٧٥ - نَد * ، غُصْرَاء

Epilobium (S).

Epilobe (F). Willow-herb (E). Waldweidenröschen (D). Epilobio (I).

جنس نباتات عشبية خشبية معمرة من فصيلة الاخدريات . انواعها المعروفة نحو ٦٠ معظمها بري ومنها الطبي ويضها تزيي . منها الاسواق المنضدة في جميع البلاد . سوقها فراء . اوراقها كاملة مستطيلة متعاقبة . ازهارها رباعية النصل والبتلات ، ثمانية الاسدية ، سنبلية التجميع ، عوربة الاوتكاكاز او حامية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٨٦٧٦ - نَد * وبُيَاعِيَّة الزَوَايَا ، اذُنَاب القطة

Epilobium tetragonum (S). Epilobe angulare (F).

نوع من التند البري الميول . ساقه صلبة صوية كثيرة الفروع مغلقة وباعية الزوايا . اوراقه متعاقبة ، رديعة النصل ، منشارية الحافة ، ناضرة الروق . ازهارها سنبلية التجميع . ازهاره انبوبية اللون وريدة المراج . يوجد في الالساكن الرطبة من الساحل الى الجرد حتى ارتفاع ٢٠٠٠ م . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٧ - نَد * سُبُلِيَّة

Epilobium angustifolium, E. spicatum (S). Epilobe en épi, Laurier de St. Antoine (F). Rose-bag willow-herb, Blood vine (E). Waldweidenröschen, Weidenrich, Antonskraut (D). Epilobia a spighe, Lauro roseo, L. di St. Antonio (I).

نوع من التند الزراعي التزييني الميول . اربوبة مائة . ساقه فراء تملو من ٨٠ الى ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة متضادة ، مضطربة سناني الشكل ناضر المروق على صفحاتها السفلى . ازهارها سنبلية التجميع حامي الاوتكاكاز . ازهاره قرزية اللون قطرها نحو ٣ سم . ومنه ضروب يبيض ازهاره وموحيه || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٨٦٧٨ - نَد * صَغِير الزهر

Epilobium parviflorum (S). Epilobe à petites fleurs (F).

نوع من التند البري الطبي الميول . ساقه فراء تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه زينية متعاقبة ، نصلها رديع الصفحة مسن الحافة . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة القد وريدة اللون || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٧٩ - نَد * عَفَايِي ، نَد * قُضْدِي ، عَفَص ، فَرْلُور

Epilobium hirsutum (S).

Epilobe hérissé, Nériette (F). Great willow-herb, Apple-ple (E). Zottig Weidenröschen (D). Epilobio amplicaulo, Peleso (I).

نوع من التند البري الطبي الميول . ساقه فراء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه حاشية متعاقبة نصلها كبير القد منشاري الحافة خالي البشرة على صفحاته . ازهارها سنبلية التجميع . ازهاره قرزية اللون قطرها نحو ٢ سم . || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٨٦٨٠ - نَد * قَسْوِي

Epilobium rosmarinifolium (S). Epilobe à feuilles de rosmarin (F).

نوع من التند الجلي الميول . ساقه فراء تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه متعاقبة تشبه اوراق القسوس . نصلها ضيق الصفحة الجامدة المادية المروق الناشرة . ازهارها عنقودي التجميع ، تأتي الاوتكاكاز . ازهارها صغيرة القد حراء اللون || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨١ - نَد * مَسْجِي

Epilobium palustre (S). Epilobe des marais (F). Marsh epilobium, M. willow-herb (E). Sumpfweidenröschen (D). Epilobio palustre, Garolanini di padule (I).

نوع من التند البري الطبي يكثر في المنطق والبراري الرطبة . ساقه صوية فراء تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه متعاقبة متعاقبة مستطيلة . نصلها جامد الصفحة مسن الحافة . ازهارها سنبلية التجميع . ازهاره وريدة اللون صغيرة القد . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٦٨٢ - نَد * لَعْنِي

Epilobium menthoides (S). Epilobe menthoide (F).

نوع من التند البري الطبي الميول يكثر في بعض الجرد البنيانية . ساقه فراء تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه ناعمة لامعة لا قياسية الترتيب وبشكل مسن الحافة ناذرة المروق . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة القد وريدة اللون يضاه المراج || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٨٦٨٣ - نَد * دَأَة

Couronne solaire (F).

Solar corona (E).

التند الذي دائرة الشمس .

٢٨٦٨٤ - نَد * كَحَة

Taxonomie, Taxinomie (F).

Taxonomy (E).

٢٨٦٨٥ - نَد * كَحَة ، عَدَا كَحَة الغاب

Luscinola melanopogon (S). Lusciniole à moustaches (F). Moustaches Warbler (E).

عصفور من الموازج وفضيلة الغابليات . موطنه يشعل معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اعطاه البنيانية تحت من السواحل الى الجرد والبراري || جسمه رشيق القوام يطول نحو ١٣ سم . وبسطه نحو ١٥ سم .



نخيرة (البرقة والاكثة)



نخيرة (الحشرة)



نَد



نَدَاخَة

والكوليت والنزك... لا وجودها إلزامي إن من الوجهة الإنشائية أو من الوجهة الغذائية.

2٨٦٩٢ - ندغة Bourrelet, Bourlet (F).
Pad, Cushion (E).

أثر الجرح بعد التآلم في النسيج الحيواني والنباتي.

2٨٦٩٣ - ندغة ٥، ندغة ٥ Barème, Barrème (F). Printed table, Schedule (E).

2٨٦٩٤ - ندغة الأسعار Barème des prix (F).
Price table (E).

2٨٦٩٥ - ندغة الجعائيل Barème des salaires (F). Wage table (E).

2٨٦٩٦ - ندغ ٥ Apponter (F). To land (E).
شد المركب بالصقالة المخصصة لربطه.

2٨٦٩٨ - ندغ ٥ Aborder un rivage (F).
Phototropisme (F).
Phototropism (E).

النند وتدعى جاذبية النور، خاصة تتميز بها بعض أعضاء النبات في توجيه أطرافها نحو النور.

2٨٦٩٩ - ندغ Satureia (S). Sarriette (F).
جنس نباتات برية مخشوشة قابلة من فصيلة الشفويات. أنواعه عديدة متفارقة الأشكال والأحجام منها المشية والبطية والنبية. أوراقها طرية لا تقياسية القد متعاقبة أو ضيقة. أزهارها أبطية الارتكاز أو تاجية يكثر فيها اللون الأبيض والبنفسجي والأحمر. بعضها مغرية يجرسها النحل. أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

2٨٧٠٠ - ندغ إكرويتي*، ندغ صغترى Satureia thymbra (S). Sarriette de Crête (F). Savory of Crete (E). Kretisches Bohnenkraut (D). Santoreggia verticillata, Tragorigano (I).

نوع من الندغ الطبي المعمر. عشته نجمة صغيرة الحجم. أوراقه ضيقة النسيج صغيرة القد، نصلها سنان الشكل خلى البصرة الرمداء اللون. أزهاره ثلاثية النسيج بنفسجية اللون ودية اللون || أزهاره يستمر من تموز إلى أيلول.

2٨٧٠١ - ندغ الجبيل*، زوباع البر، صغتر الجبيل Satureia montana (S).
Sarriette montagnarde (F).

نوع من الندغ الطبي المعمر. مجلته تملن من ٤ إلى ٨٠ سم. ساقه مخشوشة فراء. أوراقه سنانية مستطيلة مدهية المنصعة. نصلها جامد الصلابة اللامعة مذهب الحمار. أزهاره ودية اللون أو بنفسجية || تنوره يستمر من تموز إلى أيلول.

2٨٧٠٢ - ندغ بستانى*، زوباع، صغتر البر Satureia hortensis (S). Sarriette des jardins (F). Summer savory (E). Gartenbohnenkraut (D). Santoreggia, Timbra, Cunilia (I).

نوع من الندغ المهيول يكثر من النباتات الطبية الجزيلة النفع العديدة الفوائد الصحية وهو من التوابل المستحبة العلم والرف. أوراقه سنانية النصل، رطلة

ثوبه إلى النبي الأسفل. رأسه كسني اللون اسود المحلج. محسره إلى الكسني يتوسخ خط أبيض يملو العين. رذائله وظهوره وجناحاه رميزه وذنبه إلى النبي الأسفل يملو شمشج عايق. زوره أخير أبيض. صدره إلى الذبيرة البنية. حلقه صلبة بنية. سبكه وأفر الحلب وهو ما دعى إلى تلقيه و يأتي شوارب || الأثني أصغر قدماً من الذكر وأبهر ثوباً منه || يألف المقاصب والمآسل والآجام وصفاف مجاري الماء. تفرده صمداح لطيف متباين الانعام القصيرة يذئزئ عشه في الآجام والمفصاة على ارتفاع من عن سطح المتعم أو التربة || الأثني تحضن ثلاث مرات في السنة. حضنتها من ٣ إلى ٥ بيضات ترزفها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً || قوته الحشرات المنجعة أعضها الفرائش والذباب والحلوم ثم الديدان والوزاق || يعتبر من الصنابير النافعة.

2٨٦٩٦ - ندغ ٥ Photophile (F).
Photophilous (E).
نمت تفرقي يطلق على كل حيوان أو نبات لا يعيش إلا في النور.

2٨٦٩٧ - ندغ البسر*، ندغ البسر Ephestia calidella (S). Pyralis des dattes (F).
فراشة من التارود صغيرة القد براءه اللون مجلحة بالأسود. رزفها دقيقة نحيلة جوية للوب تقرض البسر وتطبه.

2٨٦٩٨ - ندغ الفيج*، ندغ البسر الجفك Ephestia elutella (S).
Pyrale des tabacs, Pyrale des fruits secs, Teigne du cacao (F). Tobacco moth, Cacao moth, Currant moth (E). Dürrobsteinsler, Kakaomotte, Henmotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة التارويات، بسطها نحو ١٧ م. ورشناها الإسماني إلى الكجبة الزرقاء المولج، ورشناها الحلفاني إلى الزبد. رزفها صغيرة دقيقة رمداء اللون تمش على غطت لئار الجففة وأغبر والبسكوت وأوراق التبغ الجافة المغزوة || أجيالها الحولية وهي مرقطة بموالم المناع تراوح من ٣ إلى ٥.

2٨٦٩٩ - ندغ الدقيق*، ندغ الدقيق الفجر Ephestia kuehneliella (S).
Pyrale de la farine (F). Mediterranean flour moth (E). Mehimotte (D).

فراشة صغيرة القد من فصيلة التارويات. بسطها نحو ١ م. ورشناها الإسماني إلى السرة الخطية يعترضها تجديس وتبييض. ورشناها الحلفاني مهدبا الحمار ثوبها إلى البياض الأفرير يملو شماع أشقر. أجيالها الحولية أشقر، تكثر في الأماكن الحارة وتقتل في الباردة. رزفها دقيقة الجسم، حنطية اللون سواد الرأس، تمش على مختلف أنواع الدقيق.

2٨٦٩٠ - ندغ أشدة*، ندغ ٥، كيمش حية Blochimia (F). Blochemistry (E).

قسم من علم الكيمياء يبحث في تفاعلات المادة الحية.

2٨٦٩١ - ندغ ٥ Oligo-éléments (F).
Trace elements (E).

تدريج دائر. اسم يطلق على العناصر التي تدخل في المركبات العضوية والنباتية بكميات متناهية الصغر كما هي الحال في اليود واليوتان والزنك والنيكل والحديد



ندغة البسر



فراشة



البقرة

ندغة اللبغ



ندغة الدقيق



ندغ إكرويتي



ندغ الجبيل



ندغ بستانى



ندوة



نداية سبدولة



نرتين



نرجس أخضر



نرجس اسلي



نرجس الشعراء

تطول من ٤ إلى ٧ م. أزهارها صفيرة ألقه خضراء اللون تنمو خلال شهر حزيران. ثمارها عنبية قدراها قدر الحصة الصغيرة لوئها إلى الحرة البرتقالية المواج.

٢٨٧١٤ - نَرْجِسِيَّة *
Neritina (S).
Nérítina (F), Neritina (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مميزات الارجل وفسحات الأظرفيات. أنواعها المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة. منظرها بهري ومتين وبعضها بحري. جميعها مفترسة || أصدانها شبيهة بالاشكال، يكثر فيها الشكل البريمي المنحرف القليل الحلزوني المحصورة في الاغاط. جميعها ملونة، قل فيها اللون السوي وكثر التصلب والتجديد والرشحية والزرقعة.

٢٨٧١٥ - نَرْجِسِيَّة *
Nérítica (F).
نمت ثمريني يطلق على كل منطقة رسوبية تنمرها المياه ولا يتجاوز غورها ٢٠٠ م.

٢٨٧١٦ - نَرْجِس، قَهْد *
Narcissus (S).
Narcisse (F).

جنس نباتات بصلية حولية سمرقوية من فصيلة النرجسيات. أنواعه وضروبه وأصرامه كثيرة العدد. أزهاره فواحة العرف لاقياسية للتجميع منها الفردية والثنائية والثلاثية والرباعية حتى العشارية. وفي تركت على شراخ أجوف يعلو شرافت قصير بسيط يحتمل توضع لاقياس الشكل منه القسيمي والبرقي والجبري والفلولي. أوارده قرصية الانتشاب، قديرة التصل، مستطيلة || يعيش ويوجد في جميع الأتربة الزراعية ولا يخشى سوى فوط الانتماج وكثرة الرطوبة.

٢٨٧١٧ - نَرْجِس أَخْضَر *
Narcissus viridiflorus (S), Narcisse vert (F).

نوع من النرجس الجادح. أوارده قرصية الانتشاب، أسطوانية التصل الحد. شراخه الزهري دقيق ونحيل. أزهاره عطرية الرائحة، وحيه البتلات اللحية الخضراء اللون. وفي لاقياسية التجميع يراوح مدحها من ١ إلى ٤. توجعها دولابية الشكل || ينمو في تشرين الثاني.

٢٨٧١٨ - نَرْجِسِ اسْكِي *، جنكبيل *
Narcissus jonquilla (S), Jonquille (F), Jonquil (E), Jonquille (D), Giunchiglia, Narciso d'Oriente (I).

نوع من النرجس السمرقوي. ضروبه وأصرامه كثيرة العدد. أوارده قرصية الانتشاب نصلها اسطوانتي الشكل، عند الصفحة، يطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. شراخه الزهري دقيق القسيمي يطول نحو ٣٠ سم. ينتهي بفصم من الازهار يراوح مدحها من ٢ إلى ٦، توجعها كروي الشكل، رائحتها فواحة العرف البرتقالي، لوئها إلى الصغار الحادق. ينمو في نيسان.

٢٨٧١٩ - نَرْجِسِ الْأَمَازُون *
هو نفس الامازون، اطليه.

٢٨٧٢٠ - نَرْجِسِ الشَّعْرَاء *، عَقُور *
Narcissus poeticus (S), Narcisse des poëtes, Herbe à la vierge, Claudinette, Moulin à vent (F). Poet's daffodil (E), Dichter Narcisse (D), Narciso dei poeti, Fior maggi (I).

نوع من النرجس السمرقوي. ضروبه كثيرة العدد. أوارده

الصلمحة، قاعة الخضار. أزهارها صفيرة ألقه يضاء اللون او وردية || تنموه يستمر من تموز إلى تشرين الاول.

٢٨٧١٣ - نَدِيَّة * هي البرويليم، اطليه.

٢٨٧١٤ - نَدَوَّة *
Cressa (S), Cresse (F).
Rosin weed (E), Harzkraut (D), Cressa (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة السبقونيات. أنواعها المعروفة ثمانية منها سواحل البلاد الحارة من الملين القديم والجديد. أزهارها حديدية الألوان عديمة العرف.

٢٨٧١٥ - نَدَوَّة زَرَّاعِيَّة *
Comice agricole (F).
Agricultural committee or show (E).

كل جمعية زراعية تعمل على انتشار الزراعة العملية الصليحية.

٢٨٧١٦ - نَدَوَّة عَسَكِيَّة * هي الارق، اطليه.

٢٨٧١٧ - نَدَوَّة *
Phototropique (F).
Phototropic (E).

ما هو منوط بالند.

٢٨٧١٨ - نَدِي *
Rosée (F), Dew (E).

واذ يتكاثف بسبب الرواء على النباتات والاشياء للموجودة في الغلا || وني التخصص يطلق الذي على ما سقط من بلل آخر الليل وما الذي يسقط اقله فهو السدى.

٢٨٧١٩ - نَدِي السَّحَر *
Romarin (F).
هو حصا البدر، اطليه.

٢٨٧٢٠ - نَدِيَّازَة سَبْدُولَة *، دَوْدَة السَّبْط *
Nadassa obsoleta (S).
الصبرية

فراشة من فصيلة الجفانيات، صغيرة ألقه طولها نحو ١٢ م. نوبها إلى الخطي البني. اجتمعتها موشة بثلاثة خطوط متعرجة متعرجة لوئها إلى السمرة الداكنة. زباناها مشطية الشكل. الانثى اكبر حجماً من الذكر وأضغ لوئها. تمتع مكثها الأخضر اللون على فروع واغصان السبسط ينثفث في رقات ثلثم الأوراق وتعمل الاشجار ثم تلصق شراخ، اسطوانية الشكل، مستدرة القطعين، دقيقة الوسط، خطوط حمريري اسمر، كبيت فيها وتتحول إلى حذوة || أما الزقعة فسواء اللون، هلبة القشار يقطبها غطان طويان لوئها إلى البرتقالي وتحصل في كل من حلقاها الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والحادية عشرة غدة جرابية عشوة بالمحب الاسود المتيق تستعمله للدفاع عن النفس ليلهب جلد الجسم الذي يلقى به.

٢٨٧٢١ - نَدِيَّان * هو التينمان، اطليه.

٢٨٧٢٢ - نَدِيَّيَّة *
Cicatricule (F).
Cicatrice, Tread (E).

النديية علامة يضاء تشاهد على حريق البية، اي صلاها، ويتكون منها الجزء البروتوبلاسمي حيث تشا الجرثومة الحية مزكوة كانت او غير مزكوة.

٢٨٧٢٣ - نَرْجِيَا *
Nertera (S), Nercara (F).

جنس نباتات عشبية معمرة وسولية من فصيلة الفويات. أنواعها المعروفة قليلة. مهمها بلاد زيلندا الجديدة. سوقها مشققة تملو من ٥ إلى ١٠ سم. أوارها يضيئة التصل

الصفار البرتقالي. شروبه وأصممه الزراعية عديدة
أوراقها استطالة الشراخ ولون الزهر .

٢٨٧٢٧ - نرجس نسيجي * هو الزئير ، اطلبه .

٢٨٧٢٨ - نرجس بّيغوب *

Sprekella formosissima (S). *Sprekelle magnifiqua*,
Lis St. Jacques, *Amaryllis à fleur en croix* (F). *Jacobe*
anilly, *St. Jame's-cross lily* (E). *Echte Jakobillie*
(D). *Giglio di St. Giacomo*, *Croce di St. Giacomo* (I).
نبات يصل من فصيلة النرجسيات بذرع اللزبين. أوراقه
مزجوجة التصفيف ، قرصية الانتشاب ، عصفية الشكل
تظهر بعد الإزهار . أزهاره مركب من زهرة كبيرة واحدة
ترتكز على شراخ يصل نحو ٦٠ سم. بتلاتها متدلية تطول
نحو ١٠ سم. لونها إلى البصرة القرمزية المائلة. زراعتها
لا تتطلب حناية خاصة إنما يرغب في الأتربة القليلة
الانتماس .

٢٨٧٢٩ - نرجسيات

Amaryllidaceae (S). *Amaryllidaceae* (E).

فصيلة نباتية من وحدات الفلقة . أجناسها وأنواعها كثيرة
المعد متشرة في جميع اصقاع العالم . أشهر أجناسها
النرجس والنرجوس والأماريلس والباهرة .

٢٨٧٣٠ - نرجس *

Hippeastrum (S). *Hippeastrum* (F).
جنس نباتات يصلية عشبية من فصيلة النرجسيات . أنواعه
وضروبه عديدة . أوراقها قرصية الانتشاب ، قدية الشكل.
شماريتها الزهرية مجوفة . أزهارها هامة وبحورية متدلية ،
قمية القالب ، سداسية البتلات ، عديدة الألوان المختلفة
التي تراوح من الأبيض إلى الأحمر القرمزي || أعرف
أنواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٨٧٣١ - نرجس أوجواني *

Hippeastrum rutilum (S). *Hippéastre écarlate* (F).
نوع من النرجس البروتي. يصلته ردية الجذور . أوراقه
مستعرضة جميلة الخضار الزاهي تطول نحو ٣٠ سم. شراخه
الزهرى يصل من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره ثنائية التجميع ،
مقاربة الانتكاز ، حادة العرف ، أرجوانية اللون .
تنوره يستمر طوّل فصل الربيع .

٢٨٧٣٢ - نرجس أميري *

Hippeastrum sulcum (S). *Hippéastre princier* (F).
نوع من النرجس البروتي . هذه البرازيل . أوراقه
عديدة جميلة الخضار تطول نحو ٤٠ سم. شراخه الزهرى
يصل نحو ٥٠ سم. ينتهي بزهتين كبيرتين لونياً إلى الأحمر
المغلف بالجوي أما التويج فخضر اللون ، مذهب التهديد .
تنوره يستمر طوّل شهر كانون .

٢٨٧٣٣ - نرجس الملكة كارولين *

Hippeastrum reginae (S). *Hippéastre de la reine*
Caroline (F).
نوع من النرجس الجانح . أوراقه عديدة مستطيلة النصل
الضيق . شراخه الزهرى يصل من ٥٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره
وردية التجميع كبيرة اللد أرجوانية اللون يتوسط تويجها
بجود خضري || تنوره يستمر من أيار إلى تموز .

٢٨٧٣٤ - نرجس بّيغاني *

Hippeastrum psittacium (S). *Hippéastre perro-*
quet (F).
نوع من النرجس البروتي الشائع الزراعة . أوراقه خضراء

قدية مستطيلة . شراخه الزهرى يصل من ٣٠ إلى ٥٠ سم.
ينتهي بزهرة واحدة ، كبيرة اللد ، عطرية الرائحة ،
بيضاء اللون ، ترتكز على تويج أسفر القالب ، أحر الأطراف .
ينور في الربيع .

٢٨٧٣١ - نرجس برّي * ، نرجس جبلي *

سيراس

Narcissus pseudonarcissus, *N. sylvestris* (S). *Nar-*
cisse sauvage, *N. trompette*, *N. des prés*, *Porlon*,
Clochette des bois, *Coucou*, *Jeannette* (F). *Wild*
narcissus, *Daffodil*, *Lent lily* (E). *Gemeine Narzisse*
(D). *Narciso del boschi*, *N. falso*, *Tromboncino* (I).
نوع من النرجس البروتي الملهول . أوراقه قرصية
الانتشاب ، خاسية أو سداسية المدد . نصلها منتصب
الصفيحة المنسطة . شراخه الزهرى يصل نحو ٣٠ سم.
ينتهي بزهتين كبيرتين بويّة التويج لونياً إلى الصفار
الكثيري || ينور في آذار . يعيش في جميع الموائل
والأتربة .

٢٨٧٣٢ - نرجس شرقي * ، مضطرب

Narcissus orientalis, *N. tazetta* (S). *Narcisse taz-*
zette, *N. à bouquet*, *N. de Constantinople* (F). *French*
daffodil, *Polyanthus narcissus* (E). *Tazetten-*
Narzisse (D). *Narciso a mazzetto*, *Tazetta* (I).
نوع من النرجس البروتي الملهول . شروبه وأصممه
لا تقل من ١٢٠ سم. جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط .
أوراقه قرصية الانتشاب قدية النصل البحري الخضار
الليلي التخفيف . شراخه الزهرى قوي القصبية يصل من
٣٠ إلى ٥٠ سم. ينتهي بضمة من الزهر . أزهاره مستطيلة
الان ، متدلية ، متوسطة الحجم ، لونياً إلى الأبيض الأصفر
الموّلج ، عرقها ذكي الرائحة القليلة || ينور في الربيع .

٢٨٧٣٣ - نرجس عطر * ، جرناء

Narcissus odoratus (S). *Narcisse odorant*, *Camper-*
nelle, *jonquille campernelle* (F). *Campernelle jon-*
quil (E). *Wohriechende Narzisse* (D). *Girasopo*,
Gracoli (I).
نوع من النرجس البروتي الشائع الاستعمال الزواحي .
أوراقه ميزانية الشكل ، جميلة الخضار الزاهي . أزهاره
ثنائية أو رباعية التجميع ، ذكية العرف ، صفراء اللون ، ترتكز
على تويج قسي الشكل يكمل حامة الشراخ الذي يصل
نحو ٣٥ سم. || ينور من آذار إلى نيسان .

٢٨٧٣٤ - نرجس عتكري *

Pancratier (F).
هي ألفتة ، من النرجسيات ، أطلبها .

٢٨٧٣٥ - نرجس مضطرب

Narcissus serotinus (S). *Narcisse tardif* (F).
نوع من النرجس الجانح المضطرب . أوراقه خيطية الشكل
راوح عددها من ١ إلى ٢ ، شراخه الزهرى دقيق ونحيل
يصل من ١٠ إلى ٢٥ سم. ينتهي بزهرة وسيلة كبيرة
اللقد ، عطرية الرائحة ، بيضاء اللون ، صفراء التويج . ينور
في تشرين .

٢٨٧٣٦ - نرجس مدوسي *

Narcissus bulbocodium, *Corbularia bulbocodium* (F).
Narcisse bulbocode, *Trompette de méduse* (F).
نوع من النرجس البروتي . أوراقه قرصية الانتشاب
قدية النصل الضيق المستطيل . شراخه يصل نحو ٣٠ سم.
ينتهي بزهتين كبيرتين . تويجها بوي الشكل لونياً إلى



نرجس برّي نرجس شرقي



نرجس عطر



نرجس مدوسي



نرجس مضطرب



نرجس

٢٨٧٤٦ - نُزْرَاة

النزاء : داء يأخذ الفم فتزود منه حتى تموت .

٢٨٧٤٧ - نُوْرَاع ، نَسْرَاع (F). Conflit (E).

هو التماس بين مؤقنين . وهو في القانون الإداري خلاف بين محكمتين على اختصاصهما في النظر بدمى واحدة .



نَزَّاق مِهْلُوق

٢٨٧٤٨ - نُزْرَاة (F). Litige (E).

خاصية تلقني إلى رفع دعوى .

٢٨٧٤٩ - نُزْرَاة

Vampyrus (S).

Vampire (F). Vampire (E).

جنس خفافيش من فصيلة الوقيثات . أنواعه عديدة ، موطنها البلاد المتتلة المنسقة نحو الحارة ، تكثر في أمريكا الجنوبية . أجسامها مستطلة القدة . رؤوسها ضخمة ، مستطيلة . فرائسها بارزة . زوالها المنقرية ستانية الشكل ، كبيرة ، ضيقة . أظفارها لا أثر لها . تألف الأجرع الكثيفة والأجرع القضة . تنوي مفردة . ذكورها تقرب أناثها عند الكرم فقط . مسرحها من السق إلى الفجر . قوتها الحشرات والآبار والدم تستنزف من مختلف الحيوانات انصمها الحيل والبقير * أرف أنولاه وأشهرها الزئاف المينول .



نَزَّاق

٢٨٧٤٩ - نُزْرَاة عَيْدُول * ، نُزْرَاة شَجِيحِي

Vampyrus spectrum (S). Vampire spectre, V. commun (F). Great vampire, False vampire (E).

نوع من الزئاف ، طول نحو ١٤ سم . وبسته ٣٥ سم . ثوبه خفي للملص كسني الرأس والفجر . أشبه البطن والموالي . موطنه فصح الإيباء يم أمريكا الجنوبية ، يكثر في الفوسان . يألف الأجرع الكثيفة . قوته الحشرات والآبار والدم .

٢٨٧٤٦ - نُزْرَاة * ، أُر عَكَن

Antidorcas enchora (S).

Gazelle à bourse, Sprinbok (F). Sprinbok (E).

نوع من الغزلان . حيوان لبن مجتر أجوف القرن ثنائي الاختلاف . موطنه إفريقية الجنوبية . تألف السباب . ملجأه الحيائي جامي . إجله بعد بعض المئات . جسمه ربع القامة ويثيق القوائم كسائر الغزلان . ثوبه إلى السمرة المحلطة . عتقه وصدره وبطنه قهقه إلى الأبيض اللبني المالح . قرنه متتابع الحيد ، ذرب الطرف المنطف . يتميز بالطفة وبسرعة الدم وبتياع التقفر الجهد المبال .



نَزَّاقَة

٢٨٧٤٧ - نُزْرَاة *

Pilea (S).

Pilea, Herbe au feu d'artifice (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الأنجيرات . أنواعها المنقرية عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية والحارة . معظمها معمر وبشها حولي . سوقها قرءاء . أوراقها متطابقة ، مستطلة ، ستانية الشكل ، مستطيلة التنبيب . قصاها كثيرة المروق والاعصاب ، خلية البشرة ، مسنة الحوافي . أزهارها وحيدة المسكن ، متفردية التجميع ، أبطية الارتكاز . مأبر أزهارها الذكورية تنضج عند ادراك الطلع وتقلد به بهيأا . منها أنواع تزيينية لزروع في المصاري اعصمها الزئاقه النخامية (Pilea mucosa) .

اللون طول نحو ٤٥ سم . شراخه الزهري يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أزهاره عوربة الارتكاز ومانية ، ثنائية التجميع ، لزها إلى الخصار المصلع والمخدع بالاجر الترمزي . لنوره يستمر من الربيع إلى الخريف .

٢٨٧٤٥ - نُزْرَجُوس جَرَل

Hippastrum bifidum (S). Hippéastre bifide (F).

نوع من النرجوس السبروي . أوراقه بحرية اللون طول نحو ٣٠ سم . شراخه الزهري يتقدم الأوراق ويعلو من ٢٥ إلى ٣٥ سم . ضمته الزهرية تجم من ٤ إلى ٦ أزهار . تزييها مهدب اختار ، أزهاره جزلة طول نحو ٥ سم . بلانها قرنية اللون يتوسطها خط اعصر لنوره يستمر من حزيران إلى ايلول .

٢٨٧٣٦ - نُزْرَجُوس قَهْدِي

Hippastrum pardinum (S). Hippéastre leopard (F).

نوع من النرجوس الجالح . أوراقه شديدة الخصار طول نحو ٦٠ سم . شراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم . أزهاره كبيرة القدة ، حابية اللون ، موطاة بالاجر الجوزي لنوره يستمر طول شهر شباط .

٢٨٧٣٧ - نُزْرَجُوس مَوْشَح

Hippastrum vittatum (S). Hippéastre à bandes, Amaryllis à bandes, A. de Rouen (F). Banded amaryllis (E). Bandirre Amaryllis (D). Amariil striscia (I).

نوع من النرجوس السبروي الشائع الزراعة . أوراقه حابقة الخصار طول من ٦٠ إلى ٧٠ سم . وتعرض نحو ٥ سم . شراخه الزهري غليظ القصبه الثلثية يعلو من ٩٠ إلى ١٠٠ سم . أزهاره لا قياسية التجميع تراوح ضمتا من ٤ إلى ٩ أزهار ، تكثر في الأوساط الشراخ وتقل مع اقترابها من الحامة . والزهرة كبيرة القدة مدبية البلات المحبنة وهي مطرقة الرائحة حابية يعلوها توشيح ودي كامل الخطوط . لنوره يستمر من حزيران إلى تموز .

٢٨٧٣٨ - نُزْرَجُوس * ، نَرْصِين

Narcissus (S).

Narcine (F). Narcinus (E).

جنس امالك بحرية من السفقيات وفصيلة الرمادات . أنواعها المعروفة خمسة ، اعطائها عمار المناطق الاستوائية والحارة . أجسامها مستطلة الطول ، يرمية الشكل ، مبططة القدم ، مستطيلة الاذناب . من ميزاتها النخامة اطلاق سجامه الخيشومية من أربع فصوص مستطلة مركزها في مقدم الرأس ، فمجان تحت كل عين . لحومها مأكولة ، مستطلة الصنف .

٢٨٧٣٩ - نُزْرَجُوسَة

Poliothyrsis sinensis (S).

Poliothyrsis de Chine (F).

بحرية وزيينية من فصيلة النصفيات . مهداه الصين . ساقيها متصبية لرهام تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . فرووها جر الحاء . أوراقها عابطة منقطة متعاقبة . نصلها قلبى الشكل مالم الصفحة العليا خفي السفل . أزهارها وحيدة المسكن ، عادمة التزيج ، صفيرة القدة ، يشبه القون . أزهارها مشكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . شمارها حقية الشكل ، رباعية المصارع . لنورها يستمر طول شهر تموز .

٢٨٧٤٠ - نُزْرَاة ، نُزْرُو

Salite, Monte, Coite (F).

Covering, Sarving, Cation (E).

النزاء والنزو هو جاع الحيوان الجاهل كالحيل والبقير .

٢٨٧٦٣ - نَزُونِيَّة *
Nasonia brevicornis (S).

Nasonia brevicornis (F).
حشرة نافقة من الصفريات النشائية الاجنحة. تصطف على معظم حشرات ذوات الجناحين اخصها الذباب المنزلي. طولها يراوح من ٢ الى ٣ سم. فويها الى الصغار الاسود الاسف المالح. زباناها قصيرة القذ صولجانية الشكل.

٢٨٧٦٤ - نَزِيرِب
Bramée, Bramelement (F).
Belling (E).

صوت الايائل والظباء.

٢٨٧٦٥ - نَزِيرِف
هو النَزَف ، اطلبه .٢٨٧٦٦ - نَزِيرِيَّة *
Amphipore (F).

جنس ديدان خموصية مبلولة في معظم بحار العالم .

٢٨٧٦٧ - نَزِيك * ، كَنَكُر
Nervalls (S).
Nasique Kakau (F). Nose-ape (E).

قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة الهباريات . موطنه جزر التوايح . يألف الغابات القائمة على ضفاف المنابع ويجاري الماء . طوله نحو ٧٦ سم. وزنه ٧٠ سم. يتميز بانفه المستطيل الارضية . ثوبه كثيف الشعر الناعم للمس ، لونه الى الكهبة الصفراء يبق عند الظهر ويمر عند الصدر والبطن .

٢٨٧٦٨ - نَزِيُونِس الشَرُونِيَّات *
Nysius senecionis (S). Nysius des senacons (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطيريات روية غطلفات الاجنحة. جسمها صغير القذ ، طوله نحو ٤ سم. رأسها شبه جزائي الشوزن ، مذهب اللون . غطلمها صغير . عينها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها مستطيلتان . كسولها والصفحة العليا من بطنها الى الصغار المذهب . الصفحة السفلى الى السرة السوداء . حقيقتها صغيرة بحمرية ، قشراتها شفافة || مسرهما البراري . تركيب نباتات فصيلة المركبات واعصها الشرونيات .

٢٨٧٦٩ - نَزِيُون *
Nisionades (S).

حشرة من المسيريات . لراشها صغيرة القذ ، مردلية الجسم . حنطية الثوب ، طوله نحو ٢٦ سم. في الذكور والاناث . رواشها كسنتية اللون سغم المالح ، حنطية التصديق والزركمة في الاناث ، بيض التنقيط في الذكور . يكثر وجودها من نيسان الى حزيران . رماها تركب معظم النباتات التريينية دون ان تفرجا شديدة الاذى .

٢٨٧٧٠ - نَزِيُون تاج *
Nisionades tages (S).

Nisionades tages, Thanaos tages (F).
Nisionades tages (E).

حشرة من فصيلة المسيريات روية حشرشقيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاقصى واروية . فراشها واشمة قوتها رقيق الازهار . سرقتها تمش على اوراق الشندان والاروس واكثر نباتات القرنيات القراضية || جسمها متوسط القذ يطول نحو ١٣ سم. بسطها نحو ٢٧ سم. رأسها كسنتية اللون . عينها كبيرتان . زباناها صولجانية . جوشها وبطنها الى الكسنتية الاسمر الاسف المالح || رواشها الذكر الى الكهبة الغبراء تملوها في الربيع الاسامي اربع جدات متقطعة كسنتية اللون ويملونها في الربيع الخلفي تحضيب كسنتي متفاوت السرة || رواش

٢٨٧٤٨ - نَزْر

النزرد ودم في فصرع البقرة . يقال بقرة منزورة اي واردة الفصرع .

٢٨٧٤٩ - نَزْرِعَاصِم

Ebourgeonnage, Ebourgeonnement (F). Nipping of buds, Dis budding (E).

هو التثديف اي انتزاع البراعم الزائدة أو القذارة لتحويل ما تستهلكه من نسج الى سائر ما تبقى من اعضاء النبات الهوائية .

٢٨٧٥٠ - نَزْرِعَ المُنَكِيَّة ، اِسْتِمْلَاك

Expropriation
هو سلب المالك ملكه قانونيا لقطع العام على ان يطلع عنه المقدم اليه .

٢٨٧٥١ - نَزْرَعَة ، نَزْرُوع

Atavisme (F).
Atavism (E).
هي البنج والبنوج اي زمة الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اجتمعت عنه اقسامها السابقة أو السالفة .

٢٨٧٥٢ - نَزْرَعَة

|| بقلة كالخضرة تكون بالمرض وليس لها زهر ولا ثمرة ، تأكلها الابل اذا لم يجد غيرها * (ابو حنيفة) .

٢٨٧٥٣ - نَزْرَف ، نَزْرِف
Hémorragie (F).
Haemorrhage (E).

خروج الدم من مجاريه الطبيعية .

٢٨٧٥٤ - نَزْرَف الرَحِم
Métrorragie (F).
Metrorrhagia (E).

نزف دمجي يحصل اثناء الحمل يؤدي الى الابهاس .

٢٨٧٥٥ - نَزْرِكَة

Hemipenis (F). Hemipenis (E).
النزركه تقصيب الذكر عند الزواح كالحبات والسلاحف والاعطاء . وهو يتميز بانزواجيته وباشكاله المختلفة وبتماليه للمدية الاطراف أو المسنة التي تمكنه عند انتشارها من الالتحام وعدم الافلات .

٢٨٧٥٦ - نَزْرُك
Produit (F). Produce (E).

النزرك والنلة من محاصيل الارض الزراعية .

٢٨٧٥٧ - نَزْرُكَة

Catarrha (F). Catarrh (E).

التهاب الشفاء الحاطي وسيلانه .

٢٨٧٥٨ - نَزْرُكَة والكَنْدَة

Grippe (F). Influenza (E).
هي الزؤافة والانفلونزا والزؤكة الصدوية الوبائية ، مرض مد يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٥٩ - نَزْرُكَة وقُوِيَّة ، نَزْرُكَة صُدْرِيَّة

Broncho-pneumonie (F). Broncho-pneumonia (E).
مرض التهاب الشعب الرئوية يصيب الانسان والحيوان .

٢٨٧٦٠ - نَزْرُكَة شَحْبِيَّة ، بَرُونِيَّت

Bronchite (F). Bronchitis (E).
مرض التهاب الشعب يصيب معظم الحيوانات الداجنة لا سيما الخيل والضان .

٢٨٧٦١ - نَزْرُوع

هو النَزَاء ، اطلبه .

٢٨٧٦٢ - نَزْرُوع
Atavisme (F). Atavism (E).

هي زمة الاحياء في الرجوع الى الاصل الذي اجتمعت عنه اقسامها السالفة . اطلب زمة .



نَزُولِيَّة



نَزِيك



نَزُون



نَزُون تاج

٢٨٧٨١ - نِسِيَّة
Proportionnalité (F).
Proportionality (E).
حالة الأعداد أو الأشياء المتناسبة فيما بينها .

٢٨٧٨٢ - نِسَّة * و نِسْ
Nyssa (S).
Nyssa, Tupéto (F). Tupéto tree (E). Tupelobaum (D). Nissa (I).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة النسيات . أنواعها المعروفة قليلة، جميعها أشجار و شجيرات عابلة . جلورها حشفة تستعمل استعمال اللبلين . سوقها رقيقة منتصبة الأضراس . لشفاها لينة المادة يسهاء اللون . أوراقها متعاقبة جامدة للتصل للاعم . أزهارها لا نظامية التركيب منها الحشوية الخاسية الاسمية ومنها الذكرية الشاورية الاسمية المتفردية التجميع ومنها الانثوية الثلاثية التوردة . || ثمارها حبيبة النواة ، لبنة السويق || احرف انوعها واشهرها ما يلي .



نِسَّة

٢٨٧٨٣ - نِسَّة بَيْشَهَاء
Nyssa candicans, N. ogeche (S). Tupéto blanchâtre (F).
نوع من النسة ، شجرتها متوسطة القد سرية لثنتو تملو من ٦ الى ١٦ م . أوراقها قصيرة الاثاق طول نحو ١٥ سم . نصلها اسفلي الشكل مائل الصفة العليا على النسل التي تلمر كأنها مغطاة بالرماد الأبيض || عناقيد أزهارها الذكرية صغيرة الحجم . أزهارها الانثوية فردية التجميع مزينة الاضواء . ثمارها بيضيه الشكل حراء اللون تملو من ٣ الى ٤ سم . سوقها حاضز اللحم . صفتها عميقة التحديد الطولي .

٢٨٧٨٤ - نِسَّة جَبَّارَة
Nyssa aquatica, N. uniflora (S). Grand tupéto (F).
نوع من النسة ، شجرتها كبيرة الحجم سرية للتو ترغب في المناطق والمواقع الرطبة . تملو نحو ٣٠ م . أوراقها كبيرة القد ، أهليلجية الشكل ، مديبة العضة ، مجعزة بثلاثة اسنان كبيرة القد مستقيمة الاطراف . نصلها مائل الصفة العليا ، على الشكل . خلقه فني التجميع اخبر اللون . أزهارها الانثوية فردية التجميع . ثمارها بيضيه الشكل تملو نحو ٣ سم . لونها الى الزرقه المائقة .



نَسْر

٢٨٧٨٥ - نِسَّة جَبِيَّة
Nyssa sylvatica (S).
Tupéto de montagne (F).
نوع من النسة ، شجرتها كبيرة الحجم سرية للتو تملو من ١٢ الى ٣٦ متراً . أوراقها مسطيلة الاثاق تملو نحو ١٢ سم . نصلها أهليلجي الشكل لامع البشرة على صفتيه . عناقيد أزهارها الذكرية مسطيلة . أزهارها الانثوية شفعية التجميع براوح مدعما من ٢ الى ٨ . ثمارها حبيبة القد والشكل لونها الى الزرقه المائقة .

٢٨٧٨٦ - نَسْتَر *
Amorpha (S). Amorpha (F).
Amorpha (S). Amorpha (F).
Amorpha blanchâtre (F).
جنس نباتات برية و زيبينة من فصيلة القرنيات . انواعه المعروفة قليلة جميعها جنات وشجيرات لاقياسه القالب والبرمة . أوراقها ريشية ، وريية التركيب ، عابلة . أزهارها مستحبة الرائحة ، سفلية التجميع ، بنسجية اللون || احرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٨٧٨٧ - نَسْتَر أَيْص
Amorpha canescens (S).
Amorpha blanchâtre (F).
نوع من النستر البوروني الزبني . جنسه صغيرة القد تملو نحو ٩٠ سم . أوراقها تملو نحو ١٠ سم . ورقها

الانثى قريبة الشبه برواشن الذكر الا انها اجت مابة || لها جيلان في الجيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في القبار . تظل عند ظهورها بنسور اربعة اسابيع وتحتج الممكن مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرة عند بلوغها الكمال تملو نحو ٢٢ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستقيم الوسط ، مائل الشارب ، اجمر اللون ، تملو مابة غصراء زرقاء . رأسها اسيد . مدنها ورواجها الى السرة القائمة || طور الكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوم ، يستمر في الجيل الثاني نحو ١٨ اسبوعاً وينتهي ضمن سلجة تحببها السرة بين الاوراق الابيدة .

٢٨٧٧١ - نَسَاح * و نَسَح *
Lézarde (F).
Crack (E).
انصداح في جدار البناء سببه مرور الزمن أو عيب في البليان أو خلل في الهيكل نتج عن ظرف قاهر .

٢٨٧٧٢ - نَسَاس *
Délisquent (F).
Delisquent (E).
نمت تعريفي يطلق على الاجسام التي تتأخ من تسرحها بطرية الهواء .

٢٨٧٧٣ - نَسَاسَة
Délisquencia (F).
Delisquencia (E).
صفة الاجسام التي تتأخ من الرطوبة التي تمتصها أو تكثر بها من الهواء .

٢٨٧٧٤ - نَسَاف
طائر له مقام كبير (ابن سيدة) ج . ناسيف .

٢٨٧٧٥ - نَسَاف و نَسَافَة
Tarare, Vanneuse (F). Winnowing-machine (E).
آلة تنظف الحبوب بواسطة تيار هواء يتسلط على غرابيلها المزانة .

٢٨٧٧٦ - نَسَاقَة *
Taxologie (F). Taxology (E).
النساقه علم يبحث في تنسيق جميع معارف البشر .

٢٨٧٧٧ - نَسَاف و نَسَاف *
Lignage (F). Lineage (E).
هو القرابة في الآباء خاصة . وهو نومان نسب مستقيم وهو ما كان بين الآباء والابناء . ونسب عرشي وهو . ما كان بين الاخوة وبني الاخوة وبني الاعلام . ج . انساب

٢٨٧٧٨ - نَسَاف *
Généalogie (F). Genealogy (E).
هو سلسلة تتابع الانسال في الاسرة الواحدة أو العرق الواحد .

٢٨٧٧٩ - نِسْبَة هَذَالِيَّة * و نِسْبَة هَذَالِيَّة *
Relation nutritive (F). Nutritive relation (E).
هي نسبة للمواد الأتروية الى غيرها من المواد الغذائية القابلة الهضم في كل حلف أو مخنة .

٢٨٧٨٠ - نِسْبِي * و نِسْبِي *
Proportional (F). Proportional (E).
نمت تعريفي توصف به مناسبات الأشياء المختلفة .

وهو من القواطع يحبب أجواء آسيا الوسطى وأفريقية الشرقية والهندية وأروبة الجنوبية . سربه يتألف من ثلاثة إلى ستة أزواج || قوته الجيف على اختلاف أنواعها وإذا جاع تملأ على اللحم والماعز والبطايا || الذكر لا يفارق أنثاه مدى الحياة . يلدن وكه بين فروع شجرة دامية على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض || أثناء تبيض رقتين كبيرتين لونهما إلى الرماد الاطلح تملو رقة حمراء . اخضن يستمر نحو ستة أسابيع تقارب عليه الاثنى والذكر .

٢٨٧٩٤ - نَسْرٌ أَمْرِيكِيٌّ Condor (F).
هو الكنتور ، اطلبه .

٢٨٧٩٥ - نَسْرٌ طَائِرِ Altaïr (F). Altaïr (E).
النسر الطائر ويدهى الطير ، نجم نيز من كوكبة العقاب .
راجع طير .

٢٨٧٩٦ - نَسْرٌ قَتَّاع Condor (F).
هو الكنتور ويدهى النسر الامريكى ، اطلبه .

٢٨٧٩٧ - نَسْرٌ قَتَّارِيٌّ * ، نَسْرُوس Vultur occipitalis (S). Vautour huppé (F). White headed vulture (E).
نوع من النسر ، كبير الهامة قدرة قدر نسر الجواء . ثوبه الى البياض الاغبر ازراي المواج . قرص رأسه متوج بفتحة صغيرة زغبية الريش ناصعة البياض . عنقه اغفر الريش الاغبر ، راثله اصفر باهت || موطنه افريقية الوسطى . يألث الاحراج ويجاري الماء ، اخلاقه وطباعه لا تختلف عن اخلاق وطباع نسر الجواء .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ وَاقِع Vêga (F). Vega, Wega (E).

النسر الواقع نجم نيز لامع من كوكبة القيثارة . يعتبر من ألم نجوم السماء . يبدد عن الارض نحو ٢٦ سنة شمسية . يبدو ان النظام الشمسي بكامله يسير باتجاهه اي انه يجذبه نحوه .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّات Vulturidae (S).
Vulturidés (F). Vulturidae (E).

فصيلة من لمة النسور وفئة كواسر النهار وربة الجوارح ، تشمل النسر والرخة والأتوق والقشام والبيات والنسل . جميعها كبيرة الجثة والسفك . رأسها اصلع او اغفر . راثلها كبيرة . عنقها اغفر الريش الناعم . ارسافها عارية بخلاف ارساف المتبان الكاسية السرولة . غالبا فريقة لذلك فهي لا تقوى على حمل فريستها كما تعمل العقاب وهذا مما يجعلها تقع على الجيف وقتها تصيد .

٢٨٨٠٠ - نَسْرِين * ، جَلْنَسْرِين ، وَرْدَبَرِّي * وَرْدُ السِّيَاح

Rosa canina (S). Eglantier, Eglantine, Rose sauge, Rosa canina (F). Canker flower, Dog-rose, Dog-briar, Hypeose (E). Hundrose, Hundrose (D). Rosa canina, R. delle siepi, Cinorrodo (I).

نوع من ورد البري . ساقه تملو من مَر الى ثلاثة أمتار . شوكه متتابع الدرز ، حاد الطرف المخبين . وريقاته وريفة الشجيع ، مستطيلة الاعناق ، ناشرة المروق والاعصاب . مستندة الحافة . ازهاره خرداء اللون ، ووديه المراج ، مستحبة العرف الذي الرائحة ، بتلاتها وحيدة الصف . حمراء نووية

كثيرة العدد البري الذي يراوح من ٢١ الى ٤٩ ، نصلها خلى البشرة على صفحته السفلى . سنباله الزهرية مستطيلة . ازهاره يستمر طوال شهر تموز .

٢٨٧٩٨ - نَسْرٌ مُشَجَّرٌ Amorpha fruticosa (S). Amorpha arbuscul, Indigo bistrard, Faux indigo (F). Bastard Indigo (E). Bastard-Indigo, Strauchige Uniform (D). Amorfa, Indaco bastardo, Falso Indaco, Amorosa (I).

نوع من النسر البروتي الشائع الزراعة . شجيرة كبيرة اللد تملو من ٣ الى ٤ أمتار . اوراقه مستطيلة الاعناق طولها نحو ٢٥ سم . وريقاتها تد من ١١ الى ٢١ نصلها يبعثي الشكل يطلى من ٢ الى ٣ سم . سنباله الزهرية طرية لمدة تطول نحو ٢٠ سم . || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران .

٢٨٧٩٩ - نَسْرِيَّس * Agonostoma (S). Nestis (F).
جنس اسماك نهيرة من شالكاك الزعانيف وفصيلة البوريات . انواعه المعروفة نحو ١٥ اسماها انهر افريقية الاستوائية || اجسامها اهلالية الشكل ، مستعدة التبطيد ، تطول من ١٥ الى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة مغلطحة كركؤوس البري . زمانها الظهيرة ثنائية ، الخلفية منها تقابل الشريية . زمانها الذيلية كبيرة مقطوعة الاطراف او قليلة التقدير . اثوابها تراوح من الركة المفاخرة السرة الى الشبهة . غصاب رؤوسها وظهورها ابيض من غصاب بطونها الذي يفر عند بعض الانواع || عيوبها متوسطة الصف ، مأكولة .

٢٨٧٩٠ - نَسْرٌ عَظَمَ Epandré (F). To scatter (E).
نسخ السباد والقراب والقتش ... اذراها .

٢٨٧٩١ - نَسْرٌ Fourchette (F). Frog (E).
من اجزاء حافر الخيل وهو القسم البارز من باطن الحافر .

٢٨٧٩٢ - نَسْرٌ Vultur (S).
Vautour (F). Vultura (E).

جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريرات . انواعه قليلة العدد كبيرة الجثة الضخمة . رؤوسها صلغ غفر . مناسرها مستطيلة جالسة تنتهي بكرة منقطة حادة . اعناقها زغبية الريش الاغفر . قواعد اعناقها مطوقة ببرائل مهدلة الزغب . سوطها مستطيلة منفرجة . اذنانها قصيرة مستديرة . ارسافها قوية عارية || والنسر شره نهم زغب ، اذا وقع على جيفة وأتلا منها لم يستطع الطيران حتى يثب وثبات متالية يرتفع على اثرها شيئا فشيئا || ويقال للنسر عريف الطير . كنيسة ابو الازد وابو الاصم وابو مارك وابو المبال وابو يحيى . والاثى يقال لما تم قضم . ومنى لسرا لانه ينسر الشيء . ويستهله . جمه في القلة أنسر وفي الكثرة نسور || اعرف انواعه واشهرها نسر الجواء والنسر القنبراني .

٢٨٧٩٣ - نَسْرٌ الْجَوَّاء * Vultur monachus (S). Vautour moine, V. cendré, V. arrian, Grand vautour (F). Hooded vultura (E).

نوع من النسر ، طولها نحو ١٢٥ سم . وفتحة سفليها نحو ٢٥٠ سم . ثوبه الى السرة الخلفية البهراء . رأسه اصلع . عنقه اغفر الريش الاطلح . راثله سفلي اللون . منسره كبير اللد ، حاد البكرة الزرقاء الشديدة الانعقاد .



نيس



نسر الجواء



نسر قنبراني



نسرين

Crédit (F). **٢٨٨٤٠ - نسيجة ، إشمكان**
Crédit (E).
الزمام يقطعه مصرف أو شخص لمن يطلب منه أن يميز له استعمال مال معين نظراً للغة التي يشرح بها نحوه . وقد تطلق اللفظة أيضاً على المال نفسه .

Amidon (F). Starch (E). **٢٨٨٤١ - نشأ ، نشاء**
النشأ مادة عضوية لا متبلورة ، يضاف اللون ، مادة الطعم والرائحة ، ناعمة للمس ، تلويب في الماء اللدني . وهو ينتمي كإحدى إلى فئة مركبات هيدرات الكربون ويتكون مجهرياً من حبيبات ذرية يختلف شكلها وحجمها باختلاف مصدرها || يوجد النشا في معظم أجزاء النبات وأخصها الأوراق الخضر ويكثر في بعض الحبوب والفاصوليا كالخلة والارز والشعير والقرطم والحمص والفاصوليا والبطاطا والأتياح الخ ...

نسيجة الخلة نحو ٧٠ ٪ من النشا
وحبة الارز نحو ٨٠ ٪ من النشا
ولبوب البطاطا نحو ٢٥ ٪ من النشا

Météorite (F). Meteorite (E). **٢٨٨٤٢ - نَشَاب**
شذرة معدنية التركيب مصدرها الاجرام السماوية . يقال انها من حطام النيازك التي تحترق الاجزاء الارضية . راجع نيزك .

Serpent volant (F). **٢٨٨٤٣ - نَشَاب**
نوع من الثعابين يدعى السف ، اطلبه .

٢٨٨٤٤ - نَشَادَر ، نَشَادِر
هو الامونياك ، اطلبه .

Vermoulure (F). Worm-hole (E). **٢٨٨٤٥ - نَشَارَة**
حريق الخشب الذي يخرج من الثقوب والانفاق التي تخلدها الحشرات في الاخشاب والاعشاب || وهي أيضاً سميت الخشب الناتج عن النشر .

Osyris blanc (F). **٢٨٨٤٦ - نَشَاس**
لبات زيبية يعرف بأبي ليله ، اطلبه .

Cirro-cumulus **٢٨٨٤٧ - نَشَاص ، نَمَرَكَة**
نوع من الغيوم البنية السميكة ، مظهرها كتل صغيرة تشبه القطن المنثوق || يقال صحاب نَشَاص وغيوم نَمَرَة .

Dynamique (F). **٢٨٨٤٨ - نَشَاطَة ، دِيْنَمِيْكَ**
Dynamica (E).
هي علم القوى .

٢٨٨٤٩ - نَشَان هو كركدن سويترا ، اطلبه .

Chromosome **٢٨٨٥٠ - نَشْبَة ، نَشْبَة ٥**
مواد جبرية شكلية لونية معدودة تكون في الخلية اثناء انقسامها . اما عدد النشب فهو نوعي لا يتغير .

٢٨٨٥١ - نَشَج النشج هو مجرى الماء الطبيعي .

Phototactisme (F). **٢٨٨٥٢ - نَشَج ٥**
Phototactism (E).
النشج مدى تأثير النور باعضاء النبات .

Plasmon **٢٨٨٥٣ - نَشْجَة ٥**
الآثرات الوراثة الخارج عن نطاق النشب .

Tissu adipeux (F). **٢٨٨٥٥ - نَسِيج شَحْمِي**
Adipose tissue (E).
كل نسيج في الحيوان تحولت خلاياه وحويت شحماً من جراء التسمين .

Tissu conjonctif (F). **٢٨٨٥٦ - نَسِيج شَمَام**
Conjunctive tissue (E).
هو في النبات نسيج الرِّبْش الذي يتكون من خلايا عادية التميز تصنف بمقدورها الانسيابي الذي يؤهلها الى الدخول في تركيب مختلف النسيج .

Tissu nerveux (F). **٢٨٨٥٧ - نَسِيج عَصَبِي**
Nervous tissue (E).

Tissu de soutien (F). **٢٨٨٥٨ - نَسِيج عَقْدِي**
Support tissue (E).
هو النسيج الدعامي الذي يمد النبات بالصلاية النوية اللازمة .

Tissu musculaire (F). **٢٨٨٥٩ - نَسِيج عَضَلِي**
Muscular tissue (E).

Tissu osseux (F). **٢٨٨٦٠ - نَسِيج عَظَامِي**
Osseous tissue (E).

Tissu cartilagineux (F). **٢٨٨٦١ - نَسِيج غُضْرُوفِي**
Cartilaginous tissue (E).

Tissu de revêtement (F). **٢٨٨٦٢ - نَسِيج كِسَاكِي**
Revetment tissue (E).
هو النسيج الذي يغطي الاعضاء النباتية المولائية فيجمعها من البلب والنشاف ويختلف المواضع الخارجية .

Tissu méristématique (F). **٢٨٨٦٣ - نَسِيج مَتَمِي**
Meristematic tissue (E).
كل نبات وعاقي يحوي مجموعة من الخلايا غير الممتعة تتكاثر في مناطق معينة ، توجه تخصيصها النسيجي ، تدعى المناطق المنسية . وهي تقسم الى قسمين قسم النسيج المنسية الاولى او الحامية وقسم النسيج المنسية الثانوية او القلبية .

Tissu conducteur (F). **٢٨٨٦٤ - نَسِيج مُوَصِّل**
Conducting tissue (E).
هو النسيج الوعائي والانبوبي الذي يؤمن النقل السريع بين مختلف اعضاء الجسم النباتي .

Textile **٢٨٨٦٥ - نَسِيجِي**
لعت تعريفي توصف به كل مادة يمكن حلها الى خيوط صالحة للحياكة .

Humidité normale (F). **٢٨٨٦٦ - نَسِيس ٥**
Normal humidity (E).
الرطاب الطبيعي المألوف الذي يكون في سائر المواد الاستهلاكية وهو ما يبرهن عنه بالرطوبة النوية .

Nucelle (F). **٢٨٨٦٧ - نَسِيْلَة**
هي نسيارة اطلها .

٢٨٨٦٨ - نَسِيْلَة هي ازروان للمصر ، اطلبه .

Brise, Vent très faible (F). Breeze, Weak wind (E). **٢٨٨٦٩ - نَسِيم ، رِيْدَكَة**
كل ريح ضعيفة لا تحرك مجراً ولا تعني أراً . ج. نسام .

٢٨٨٧٢ - نضج الزرع *

Helminthosporium gramineum, Pleospora graminea, Pyrenophora graminea (S). Helminthosporiose des graminées, Maladie des stries de l'orge (F). Stripe disease of barley (E). Streifenkrankheit der gerste (D).

نظر مجهرى يصيب النجيليات اغصانها الشيرى والحلقة والشليم والدخن والذرة || مظهره الخارجى يقع مستطيلة قديمة الشكل تملو نصف حيدو عايقه اللون ثم شاحبة وتنتهى بالسرة || يركب الزرع بعد ابداهه باديه او خمسة اسابيع وينتقل من صفة الى اخرى اعل منها حتى السلة فينتهى عن التطعيم او يسبب اغلاص مقعدا . يكافح اما باستعمال بلار جديد خال من فطر المرص او بتطهير البذار الموجود بواسطة الاملاح النحاسية او مركبات الزئبق .

٢٨٨٧٣ - نضج الشعير *

Helminthosporium teres, Pleospora teres, Pyrenophora teres (S). Helminthosporiose de l'orge (F). Net blotch of barley (E). Blattfleckenkrankheit der gerste (D).

نظر مجهرى يركب القلت وجع انواع الشعير الزراعية والبرية . مظهره الخارجى ، في اول هيد ، يقع حائمة لا قديمة الشكل والحجم تملو نصل نصف ويستقر بين الاغصان ، لونها الى الحلى الزيتونى اللامع ، ثم تتسجم وتأخذ شكل المستطيلات || اغصانه في القالب محودة وقد تبلغ في بعض المواقع الرطبة والغروف الحامضة نحو ٥ ٪ . يكافح بتطهير البذار بالاملاح الزئبقية او غيرها .

٢٨٨٧٤ - نضج الشوفان *

Helminthosporium avenae, Pyrenophora avenae (S). Helminthosporiose de l'avoine (F).

نظر مجهرى يصيب الشوفان فيطيه . مظهره الخارجى يقع صغيرة مستديرة شاحبة اللون ثم مستطيلة زاهية قديمة ركب اواسط نصل النصف ثم تمه قسب ذبول وبهيه . اغصانه في غالب الاحيان زغبية || يكافح بتطهير البذار كغيره من فطر النضج .

٢٨٨٧٥ - نضج

Plantation (F). Planting (E). النصب هو زرع الفراس في التربة . وقد يتم حل حدة اشكال اعماها الزدقة والتخسيس .

٢٨٨٧٦ - نضج

Plant (F). Young plant, Slip (E). النضج والذرة والفروية في كل نبات صغير نمتي تمته جلوه من استمرار الحياة متروا .

٢٨٨٧٧ - نضج

Chloroleucite, Chloroplaste, Chloroplastide جسم مشرب الخضيب يوجد في ورقة الخلية النباتية . ج . صايع .

٢٨٨٧٨ - نضج

Oiseau femelle (F). She-bird (E). النضج في المصفورة ، انثى المصفور .

٢٨٨٧٩ - نضجيات الجناح

Hemiptera, Hemipteroides (S). Hémiptères (F). Hémiptères (E). طبقة حشرات من شعبة السليات ، فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى رتيبتين : متجانسة الاجنحة ومختلفة الاجنحة .

Slage (F). Sawing (E).

٢٨٨٥٤ - نضج

هو قطع الخشب بالمشار .

Bulletin (F).

٢٨٨٥٥ - نضج

٢٨٨٥٦ - نضج جوية

Bulletin météorologique (F). Weather forecast (E). مزين الاحوال الجوية وعواملها التي حصلت في فترة معينة . وقد تبحث ايضا في الاحوال الجوية المرتقبة .

Doer (F). To proportion (E).

٢٨٨٥٧ - نضج

نضج وركز وصاير : حدد مقادير المواد المختلفة بالنسبة الى بعضها . او عين مقدار المادة الفعالة بالنسبة الى كمية محدودة من الماء او غيره .

Dose

٢٨٨٥٨ - نضج

هي المقدار الكافي من المادة الفعالة .

Dose létale (F).

٢٨٨٥٩ - نضج ذاهية

Lethal dose (E). هي الكمية اللازمة من كل مادة جمالية او سامة لقضاء على كائن معين موصوف .

Déterrage (F).

٢٨٨٦٠ - نضج

هو اخراج اغصان من التراب في آخر ابلت .

Micocoulier (F).

٢٨٨٦١ - نضج

هو الميس ، اطليه .

Fabreoulier (F).

٢٨٨٦٢ - نضج ابيض

هو ميس الجبل ، اطليه .

Micocoulier oriental (F).

٢٨٨٦٣ - نضج شرقي

هو ميس الشرق ، اطليه .

Micocoulier de China (F).

٢٨٨٦٤ - نضج صيني

هو ميس الصين ، اطليه .

Anabae (F).

٢٨٨٦٥ - نضج

هي الاناباز ، اطليه .

Affleurement (F).

٢٨٨٦٦ - نضج

ضرب من السلك (السان) .

٢٨٨٦٧ - نضج

ضرب من السلك (السان) .

٢٨٨٦٨ - نضج

نبات الزك من اودته اول ما يبدو حين يصعد الارض .

Odeur naturelle (F).

٢٨٨٦٩ - نضج

Natural odour (E). النضج : قلة الحرارة .

Pyrenophora (S).

٢٨٨٧٠ - نضج

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات . تتميز باصنافها السوداء الحلية المسام . تكاثرها دويوية الشكل مرموقة . ينفجها شفتي التجميع ، ثمالي الاونكاز ، وثيري الخلية || انواعها الاقتصادية قليلة اشهرها :



نضج الزرع



نضج الشوفان

٢٨٨٩١ - نَضَارٌ ، كَامَلِينَة

Camelina (S).

Caméline (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة البصلبيات . أنواعها عديدة معظمها بري ، يكثر بين الزروع فيلذها || أشهر أنواعها النضار المزروع .

٢٨٨٩٢ - نَضَارٌ مَزْرُوعٌ * ، كَامَلِينَة مَزْرُوعَة

Camelina sativa, Myagrum sativum (S). Caméline cultivée, Sésame d'Allemagne (F). Cameline, Gold of pleasure (E). Echter Dotter, Leindotter (D). Camelina, Sésamo di Germania, Dardella (I).

نوع من النضار الاستاثاري يزرع لبزوره الزيتية الشائعة الاستعمال الصناعي || عشبته فراء . أوراقه صغيرة اللد ، سنانية النصل الأخضر . ازهاره عقودي التجميع . ازهاره صفراء ، صفراء اللون ، تنور في اوائل الصيف . ثماره غردلية ، بزورها دقيقة يضيء الشكل برتقالية اللون تحوي نحو ٣٥ ٪ من الزيت الصناعي الذهبي اللون .

٢٨٨٩٣ - نَضَارٌ

Requin-marteau (F).

هو مطراق البحر ، سمكة من القرشيات ، اطبله .

٢٨٨٩٤ - نَضَارِيَّات

Chrysomelidae (S).

Chrysomélidés (F). Chrysomelidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة عذبات الاجنحة . اجتماعها وأنواعها بضعة آلاف . معظمها حشرات صغيرة اللد . اجسامها مائلة البشرة ، زاهية الالوان . قرونها الاستشعارية عديدة الاشكال فيها الخيطي والحلبي والصورياني والمشاري ، ابرافها خماسية التكوين ، رباعية المظهر الخارجي . قوتها اوراق واليابس وازهار النباتات . مكثها تبني اللون ، تختلف الاشكال تكثر فيه الاستطالة ، تمتص النبات على التبات العائل او لتلقيه في التربة قرب العرائل || ريقاتها خاضلة ، سداسية الاربعة ، عديدة الالوان ، تركب النبات تقضم الاوراق وتغتر السوق عند جفاف التربة وبعضها يركب الجلود || سورياتها صغيرة اللد تلصق بشرقة تصنعها من الطين والمواد العضوية .

٢٨٨٩٥ - نَضَارِيَّةُ الْحَمَاضِ *

Gastrophysa raphani (S). Chrysomée de l'oselle (F).

حشرة من النضاريات . طولها نحو ٥ سم . قوتها الى الخضار الزرجدي الزاهي المالح . تظهر في اواخر الربيع وتضع لطيح مكثها على الصفحات السفلى من اوراق الحماض لينتفخ خلال شهر ايار عن رقات سمراء اللون نمة تقضم الاوراق وتؤذيها .

٢٨٨٩٦ - نَضَارِيَّةُ الْحَمَاضِ * ، لِينَا الْحَمَاضِ

Lina populi, Melasoma populi, Chrysomela populi (S). Lina du peuplier (F).

حشرة من النضاريات طولها نحو ١١ سم . رأسها ودقها الى الخضار الازرق المالح . جمداهما الى الحشرة يملونها عند طريقتها بقيق اسود . اجسامها الخولية ثلاثة . صغيرة اللد ، وردية الجسم ، سوداء الرأس ، تركب اوراق الحمر تقضم الخشب ولا تترك سوى الاغصان والكشرايين . وقد تصدى على النواحي وعلى ابرام اللحية فتقضي عليها .

٢٨٨٩٧ - نَضَارِيَّةُ الزُّوَائِ

تعرف بأرما مرجناتا ، اطبلها .

٢٨٨٩٠ - نَضَارِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ

Hémipère (F).

نعت تعريفي يطلق على جميع الحشرات التي لتني الى طبقة نضاريات الجناح .

٢٨٨٩١ - نَضَلٌ ، حَافِيَّةٌ ، حَكْرَةٌ ، حَكِيحَةٌ

Limbe (F). Limb (E).

هو الجزء المنبسط المستطيل العريض من ورقة النبات .

٢٨٨٩٢ - نَضَلِيٌّ

Limbaire (F). Limbaire (E).

نعت تعريفي توصف به الاضياء التي تولد النصل كقولك خلايا نضلية .

٢٨٨٩٣ - نَضَلُ الْحَافِرِ

Avalure (F).

Sloughing of the horny part of the hoof (E).

مارض يصيب الحافر فيسبب جبهوله في الخيل .

٢٨٨٩٤ - نَضِيٌّ *

Sasa (S).

Bambou (F). Bambou (E).

جنس نباتات قصية برية وزراعية من عائلة الخيزرايات وفصيلة النجيليات . انواعها عديدة ترطب في المواقع الرطبة والأثرية قليلة الاندماج الغنية بالمواد العضوية || أشهر أنواعها ما يتبع .

٢٨٨٩٥ - نَضِيٌّ أَلْبَقُ

Sasa variegata (S).

Bambou bandé (F).

نوع من النضي يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه مزدوجة التصنيف ، نصلها مائل الصفعة العليا الخضراء اللون ، خلي السفل المبلقة بالابيض || يرغب في الأثرية الرطبة المتوسطة الاندماج .

٢٨٨٩٦ - نَضِيٌّ مَذْهَبٌ

Sasa auricoma (S).

Bambou à chevelure dorée (F).

نوع من النضي يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . سلامياته بتقسيمية اللون . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٧ سم . نصلها خلي البشرة على صفحتيه ، يعلو توشيح ذهبي || يرغب في الأثرية الرملية الدالية الرطبة .

٢٨٨٩٧ - نَضِيٌّ مَزْدُوجُ التَّصْنِيفِ

Sasa disticha, Bambusa nana (S). Bambou distique (F).

نوع من النضي يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه ضيقة مستطيلة مزدوجة التصنيف تطول من ٤٥ الى ٦٠ سم . وترعى من ١٠ سم . نصلها اخضر الصفحة السفلى مخضب العليا ، خضبا ارجواني يهيك عند الازراباب . يرغب في الأثرية العميقة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٢٨٨٩٨ - نَضِيٌّ يَابَانِيٌّ

Sasa japonica (S).

Bambou japonais (F).

نوع من النضي يعلو من المترين الى الخمسة امتار . سلامياته الى الخضار الاصفر . اوراقه تطول من ١٠ الى ٢٥ سم . وترعى من ٣ الى ٥ سم . نصلها سنن الحامة ، مائل الصفحة العليا الباقية الخضار . خلي السفل الزرقاء اللون . يرغب في الأثرية الخفيفة الغنية الرطبة .

٢٨٨٩٩ - نَضِيٌّ

Part, Quote-part (F).

Share, Part, Portion (E).

هو جزء من ذمة مالية يختص بها أحد المتقاسمين . وهو حصه المرء في شيء او مال مشاع .

٢٨٨٩٠ - نَضٌ ، وَشَكْلٌ

Suint (F).

Grease of wool, Yolk (E).

هو نضيف الصوف اخضره صوف الكتم .



نصي



نضار مزروع



نضارية الحماض



نضارية الحمر

لثلاثة عطوط يمر تملحوا كشاش من الحلب الدقيق ||
طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقوى ضمن
جرباب في التربة .

٢٨٩٠٥ - نُضَارِيَّةٌ مُشَبَّحَةٌ

Chrysomela fastuosa (S). *Chrysomèle guindée* (F).
Chrysomela fastuosa (E).

حشرة خاضعة من فصيلة النضاريات ورقية مهددات
الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة
الشفوية واعصها الصنوبر . خنافسها تمشي على الاغصان
والشواطي . يرقاتها تركب الاوراق || جسمها صغير القد
يطول من ٦ الى ٧ م . ثوبها الى الخفسار الاسفع المورج
يعلو في الظهران تحشيش طولي ارجواني وازرق . رأسها
كبير الجرم . عينها صغيرتان بارزتان . زباناها غبيطيان ،
دقيقان . ظهرانها مستدير الزوايا والظفران اللاحش .
غدهاها متناهية التنقيط الخفيف . ارسافها رباعية المقل
الظاهرة || الاثنى اميز قدما من الذكر وايست ثوباً منه
واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة
الجملانة في لواتل حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول . تخرج
في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام نموا تطول
نحو ١٢ م . جسمها رمشي الشكل ، قليل التقويس .
مستغلظ المقدم ، مستدق المؤخر ، سداسي الرواسب . ثوبها
الى الطحلة المحتلطة المورج . رأسها وشربها درواجها الى
السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع
يتقوى في القرية تحت الجملانة وتحت الحماجرة .



نضارية الصفات الخضراء



نضارية الصفات الزرقاء



نضارية القرية



نضارية القرية

٢٨٨٩٨ - نُضَارِيَّةُ الصَّفَصَاتِ الْخَضِرَاءِ *

Phylloctecta vitellina (S). *Chrysomèle verte de l'osier* (F).

حشرة من النضاريات . طويلا براوح من ٤ الى ٥ م . ثوبها
الى الخفسار الزبرجدي . تركب مع يرقاتها اوراق وبراعم
الصفصاف تقذفها اشد الاذى .

٢٨٨٩٩ - نُضَارِيَّةُ الصَّفَصَاتِ الزَّرْقَاءِ *

Phylloctecta vulgarissima (S). *Chrysomèle bleue de l'osier* (F).

حشرة من النضاريات ، طويلا نحو ٥ م . ثوبها الى الزرق
القائمة . تركب مع يرقاتها اوراق الصفصاف فتخرمها
وتقضم النواهي وبراغها تقذفها اشد الاذى .

٢٨٩٠٠ - نُضَارِيَّةُ الصَّنِيصِيَّاتِ

هي الخدوش ، اطليه .

٢٨٩٠١ - نُضَارِيَّةُ الْقَرْصَةِ *

Phaedon cochleariae (S). *Chrysomèle du cresson* (F).

حشرة من النضاريات بيضبة الشكل عمودية ، طويلا نحو
٤ م . ثوبها الى الزبرجدي يعلو مورج ازرق . زباناها
الى السوداء الفسفي . تركب مع يرقاتها اوراق القرعة فتجملها
كالمسد وتسد على اوراق العجل واللفت والمفوف فتضل
فيها فعلها بالقرعة .

٢٨٩٠٢ - نُضَارِيَّةُ الْقَرْصِيَّاتِ * ، رَقِيصْد ،

عُطْرُوقِ الشَّمَامِ ، نُضَارِيَّةٌ قَرْصِيَّةٌ

Raphide raphidocollis (S). *Raphide, Galérucque du melon* (F).

حشرة من النضاريات ، طويلا نحو ٧ م . ثوبها الى الحمرة
البرقانية . تمشي على اشباب المرابي الطبية والقصبة
والبرسيم . انثاها تلقي مبعها على التربة قرب موائلها ، انصها
القرصيات ، يتنقش المكان عن رقات صغيرة تبتلية اللون
تركب وتفسر سوق الشمام والطبخ والخيار والكوسى وسائر
نباتات الفصيلة القرصية .

٢٨٩٠٣ - نُضَارِيَّةُ الْكَرْمَةِ

هي رموس الجملنة ، اطليه .

٢٨٩٠٤ - نُضَارِيَّةٌ أُنَيْقَةٌ * *Chrysomela polita* (S).

Chrysomèle élégante (F). *Chrysomela polita* (E).

حشرة خاضعة من فصيلة النضاريات ورقية مهددات
الاجنحة . تألف المورج الرطبة وفضاف مجاري الماء .
خنافسها ويرقاتها تمشي على جميع انواع الصنع البري
والزراعي تنقضم الازراق وتؤذيها || جسمها صغير القد
يطول من ٦ الى ٨ م . ثوبها متراكب الالوان كوسلها
الى الشقعة النحاسية الخفساء المورج ، ظهرانها الى الشقعة
الصنابية الملهمة المورج . رأسها معتدل الجرم . عينها
صغيرتان . زباناها غبيطيان دقيقان . ظهرانها معتدل
الاحاديذاب مستدير المؤخر اللاحش . غدهاها معتدلة
الصلاة ، نظاميتها التنقيط الخفيف . ارسافها رباعية
المقل الظاهرة || الاثنى اميز قدما من الذكر واكد قوباً
منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحبل . تظهر
الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتبقى حتى اواخر
الصيف . تخرج في النهار || والبرقة عند ادراكها للكمال
المجموعي تطول نحو ١٥ م . جسمها رمشي الشكل ،
قليل التقويس ، احمل اللون . رأسها غليظ الجرم اسمر
اللون . رواجبها الى السرة . تمحل في ظهرها ويانجبها

٢٨٩٠٦ - نُضَابٌ

Tarir (F).
To drain, To exhaust (E).

نضاب التبع : انقطع مائه . ونضاب الماء : غار في الارض .

٢٨٩٠٧ - نُضُجٌ

Pleine maturité (F).
Full maturity (E).

هو بلوغ الثمرة كالها الجسومي ويصورها آثر دور
من ادوار حياتها . والنضج يأتي بعد الادراك والابتاع .

٢٨٩٠٨ - نَفُجٌ

Bassinage (F). *Sprinkling* (E).

هو الاسقاء بالرزاذ اي الاسقاء الخفيف .

٢٨٩٠٩ - نَفُخٌ

Pulvérisation (F).
Pulverization (E).

هو رش الماء او اي سائل آخر بواسطة جهاز ضاغط خاص
يدفعه بمف .

٢٨٩١٠ - نَعْدٌ

Stratifier (F). *To stratify* (E).

نعد البذور ، جعل بعضها فوق بعض صليفاً مَرَصَفةً
متناهية .

٢٨٩١١ - نَعْفٌ

هو الصنوبر البري ، اطليه .

٢٨٩١٢ - نَعْفَكَةٌ

Nauderus (S).
Naucière, Milan-hirondelle, Epervier à serpent (F).
جنس طير من هجرة الحداة وفضيلة القرقيات . انواعه
المعروفة قليلة العدد ، تتميز باجسامها الجاه . دروسها
صغيرة . اصنافها قصيرة . موائلها مستيلة ذلقة الاطراف .
اذنابها شديدة الطول نازقة . مناسرها قوية ، منقطة البهرة
الحلدة . ارسافها قصيرة ، مخالبها قوية ذوية . || تألف
الحياة الجاهية سربها براوح من ١٥ الى ١٠٠ زوج .
قوتها الحشرات والوزغ والسماء والحيات ، تفتن اركانها
في تفتن الاشجار اعصها السديان والصنوبر . انثاها تضع



نضارية انيقة

وهو سريع النمو ولادراك يحد في الإثابة الكليسة التي لا تصلح للزراعات الأخرى .

٢٨٩١٨ - نَشْتَاهُ * قُنْطَدُ التَّمَل

Echidna (S), Echidné (F), Echidna (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جامة من وحدات المسلك .
أنواعه المعروفة قليلة ، أعطانها جبال أستراليا وفيها الجديدة .
أجسامها مكورة تطول من ٣٠ إلى ٣٥ سم . يغطيها شوك دقيق كثيف ذرب الأطراف كشوك الكفتل . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل تلتقي بطن مستطيل كالمنقار .
جرايمها مسطحة بأظفار قوية سادة تمكها من الحفر .
السننبا مسطحة ديفة اخاذة اندفاعية تمكها من ارتشاف الحشرات والتمل . تألف المواقف القليلة الإدخال . تسرح في الليل . حاجرها دحاليذ منجنبل عديدة التتابع وسيدة المنفذ .

٢٨٩١٩ - نَشَوْرَة Fer & cheval (F), Horseshoe (E).
سفينة تمثل بها حوافر الدواب .

٢٨٩٢٠ - نَشِي Verge des équidés (F).
Penis of the equidae (E).
النشي قضيب ذكور الخيل وحمى الوشش .

٢٨٩٢١ - نَشِيْد Couche (F), Layer, Stratum (E).
كل صاف مرصوف من الشيء المنصود .

٢٨٩٢٢ - نَشِيْر Eucharis
جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات منها المقدر بلاد أمريكا الجنوبية . أنواعه المعروفة قليلة ، مملها بري وبعضها ترابي . أوراقه قدية الشكل مخددة التصل .
ثماره مجوة تنهي بفسه من الاثمار عطرية العرف الفلج ، حيلة الشكل ، مخطفة الألوان . أشهر أنواعه الترينية نصير الامازون .

٢٨٩٢٣ - نَشِيْرُ الْأَمَازُون * نَشِيْرُ الْأَمَازُون Eucharis amazonica (S), Eucharis de l'Amazone (F), Amazon lily (E), Amazonische Lilie (D), Eucaris (I).
نوع من النصير الترييني السروني . أوراقه قرصية الانتشاب مستطيلة التصل القدي الشكل المخددة الصفة . ثمرها الزهري يحمل فسه من الاثمار الناجية العطرية العرف .
يجود في جميع المواقف والأثابة ولا ينشئ سوى الرطوبة المستمكة .

٢٨٩٢٤ - نَشَاة Cupule
هي قم الزهرة والثمرة . ج . أنطاه .

٢٨٩٢٥ - نَشَاة * أَوْ حَرَبَة Monacanthus (S).
Monacantha (F), Monacanth (E).

جنس اسماك بحرية من ملحوبات الفك ، قاسيات الجلد ، تنتمي الى مجموعة النفر اي من الماء .
خسة أعطانها بجانر البلاد الحارة . أجسامها ربة تطول نحو ٤٠ سم . رؤوسها كبيرة القدي ، مخروطية الشكل ، متوجة بقرن كالخرية ينشئ في القدي . زفافها الصديرة والبطنية والظهرية شائكة . أنوثها الى الطحلة السراء المبقية والمؤنثة بالابيض والاصفر والافضر . زفافها صفراء اللون . لحويها متوسطة الصنف ، مأكلة .

٢٨٩٢٦ - نَطَّار Epouvantail (F), Scarecrow (E).
هو الجدار ، ينصب في الزرع والمباقر مزجرة لطير والوشش .

من رفعتن الى اربع رفعتن تحضنها بملاوة الذكور .
اصرف أنواها واشهرها ما يتبع .

٢٨٩١٣ - نَصْفَةُ أَفْرِيقِيَّة *

Naucerus ricouart (S), Naucière d'Afrique (F).

نوع من النصفه ، موطنها يشمل قطار أفريقية الجنوبية والشرقية والوسطى . جسمها يطول نحو ٥٥ سم . رأسها وشفها وصدرها وبطنها الى البياض الناجي . سقطاها وطورها وذهبا الى السواد اللامع تملو ماجة غصراء .
ملسها اسد اللون . حقة فيها كاليقوت . أرساها كاسية . تألف الاسراج بجماري الماء . تجوب البلاد في طلب الرزق . سرها يمد من ١٠ الى ٥٠ زوجاً .

٢٨٩١٤ - نَصْفَةُ أَمْرِيْكِيَّة *

Naucerus fuscatus (S), Naucière-martinet, Naucière d'Amérique (F).

نوع من النصفه ، موطنها فصح الاربابا يشمل أمريكا الجنوبية والشمالية . جسمها يطول نحو ٥٧ سم . رأسها وشفها ورجوها وبطنها الى البياض الثلجي وما تبقى اسد اللون أزرق المراج تملو غصرة صفراء . مشرها عاقب السرة . حقة فيها جؤوية . أرساها الى الصفار الاخضر المراج . تألف الاسراج . تجوب البلاد الأمريكية في طلب الرزق والملصيف والمشي . سرها يمد من ٢٠ الى ١٠٠ زوج .

٢٨٩١٥ - نَقْم * سَرَّازَان Fagopyrum (S), Sarrasin

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة البطياطيات .
سوقها متصبة قليلة الصلابة . أوراقها متعاقبة منقطة .
نصافها قليلة الشكل او هسية ، خماسية العروق ، عاقبة .
انثراها معتوي التجميع . انثراها خشوية .
صفيرة القدي ، خماسية البتلات ، عادمة التويج . ثمارها حقان لا قياسية الشكل والحبي يكثر فيها المخروطي .
بفورها حبة المادة ، دقيقها غذائي شائع الاستعمال في صناعة الماخن . ولف الدواجن . أصرف أنواها واشهرها مايتبع .

٢٨٩١٦ - نَقْم شَالِح * سَرَّازَان شَالِح ،

حَنْطَة سَوْدَاة ، قَمَحُ الْبَقَر

Fagopyrum esculentum, Polygonum fagopyrum (S).
Sarrasin commun, S. ménager, Blé noir, Buckwheat, Tatarian buckwheat, Sarrasin corn (E), Buckenweide, Echter Buchweizen (D), Saraceno, Fagopiro, Grano nero, Fraina (I).

نوع من النقم الزراعي ، ساقه متصبة فراء . أوراقه سهمية التصل ، مستطيلة المثلث ، لائحة القدي . انثراها بيضا اللون . حقاها مخروطية الشكل حادة الزوايا . بلوره سود .
وهو سريع النمو لادراك دورته الحياتية تستلزم من ١٨٠٠ الى ١٩٠٠ سرة تنهها ينحو ١٠٠ يوم . وهو يجود في جميع الأثابة باستثناء القويصة الاندماج الرطبة .

٢٨٩١٧ - نَقْم هِنْدِي * سَرَّازَان تَقَرِي ، حَنْطَة تَقَرِي ، قَمَحُ الْبَقَر الْهِنْدِي

Fagopyrum tataricum (S), Sarrasin de Tartarie, S. de Sibirie, S. galeux, Blé de Tartarie (F), Indian wheat, Tatarian buckwheat (E), Grüner Buchweizen (D), Saraceno di Siberia (I).

نوع من النقم الزراعي العلفي . ساقه متصبة فراء .
أوراقه قليلة التصل ، أمحاده مجنمة لا حاضرة . انثراها الى الخضار الاصفر . حقاها رباعية الحروف مستطيلة الشكل .
بلوره صفيرة حرة سراء اللون مغلفة غزيرة المادة الفضائية .



نصفه الأفريقية نصفه الأمريكية



نقم شالح



نقم هندي



نصفان



نصير الامازون



نطاح

٢٨٩٢٧ - نَظَّاشُ الْكُورِيل °

Crotalaria segyptica (S). *Crotalaire d'Egypte* (F).
Rattle-box (E). *Klapperhölse* (D). *Nacchera* (I).

نوع من النطش المعمر. جنبته مشققة القذ، فراء الساق، صغيرة الأوراق السنانية الباردة. أعطانها فسيحة الأرجاء تمتد من صمرها سينا الى الصخاري المصرية.

٢٨٩٢٨ - نَظَّاشَةُ °

Chromosome

هي الشبكية والكروموزوم.

٢٨٩٢٩ - نَظَّاشٌ ، طَعْمُ الْمُرْدَرَعِ °

Goût de terroir (F). *Native tang*, *Raciness* (E).

طعم خاص يطعم بعض الحاصلات الزراعية كالعنب والتينغ لوشيايا بعض الثمر وهو يمدد الى بعض عناصر التربة الامتجاسة الدائمة.

٢٨٩٣٠ - نَظَّاشٌ °

Vin de presse (F).
ما يسيل من عصر العنب وقد تكون خمر اذا حسن صنعها فاعرة الصنف.

٢٨٩٣١ - نَظَّاشَةُ ° ، نَظَّاشٌ °

Nothura (S). *Nothure* (F).

جنس طير من الدجاجيات وفصيلة الزرقويات. انواعه المعروفة سبعة منتشرة في جميع بلاد امريكا الجنوبية. شكلها قريب الشبه من الزفر. اجسامها مستوية القذ. اذناها جددة. اثنوا الى الصهبة المشقة والمخففة بالاسود. اعطانها وصلوها ويطرها الى الصهبة السنانية الزاهرة || قوتها الحشرات والبلور البرية. تألف حواشي الغابات. صيدها مرغوب فيه لانها من الطرائق السمينة المستحبة الطعم.

٢٨٩٣٢ - نَظَّاشَةُ °

Natica (S). *Naticae* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات معديات الارجل وفصيلة النطشيات. انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها مفترسة قوتها الرضويات والديدان || اصداؤها مألوفة ، شبه كروية الشكل ، صهبة العقب المحزن اللديب. اجسامها بيضبة الشكل ، مستعرضة الاربدة ، عريضة القروص المبطله ، ثنائية القواس المعبقة ، كبيرة الارجل || تعيش في الاسمال ويحل رمال الشطوط المغمورة بالماء.

٢٨٩٣٣ - نَظَّاشَاتُ °

Naticidae (S). *Naticidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات معديات الارجل وحيوانات الاجهزة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاراضي الطباشيرية والجبورية ، وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصداؤها شبه كروية الشكل ، صغيرة القبة ، قصيرة القلوب ، فسيحة الفمحة. اسفلها كبيرة ، قرنية للمادة او كلسية ، توصد الفمحة عند الحاجة || جميع انواعها مفترسة تقضي على الديدان والرضويات الصغيرة. اعراف اجناسها واشهرها النطشية.

٢٨٩٣٤ - نَظَّاشٌ °

Alintam

النظام نجم ثير من كوكبية قيطس مركزه على اصل اللب .

٢٨٩٣٥ - نَظَّاشٌ ، نَظَّاشٌ °

Statut (F). *Status* (E).

هو اتفاق او قانون يضمن حسن انتظام العمل .

Lestoteuthis Kamtschatica (S).

Lestoteuthis de Kamtschat (F).

حيوان بحري مفترس وجسد الجنس والنوع من الرضويات رأسيات الارجل ، مزدوجيات الخياشيم ، عشاريات الجرامز وفصيلة الطردسيات. اعطانها جزر الكوريل || جسمه مخروطي الشكل ، كبير القذ ، يطول نحو خمسة اذار. زعنفته طريقتان ، كبيرتان ، مزدوجتان . جرامزه معبقة ، طليقة ، لامساوية الطول ونها زوج لثيف شديد الطول ينتهي برسي سنانية الشكل تملوها حناجر وكلايب .

٢٨٩٣٨ - نَظَّاشُ مُخَضَّرٌ °

هو القيروط الاخضر ، اطليه .

٢٨٩٣٩ - نَظَّاشَاتُ °

فصيلة حشرات من نمديات الاجنحة تعرف بالساوليات ، راجعها .

٢٨٩٤٠ - نَظَّاشُ ، نَظَّاشُ الجَزْوَءِ °

Baudrier d'Orion (F). *Ahliak* (E).

النظاش او نظاش الجوزاء ثلاثة انجم مستعرضة وباصة في وسط الجوزاء تسحبها العرب النظم وهي مثل في الانتظام والانتظام .

٢٨٩٤١ - نَظَّاشٌ °

النظاش نجم ثير من كوكبية برج الحمل .

٢٨٩٤٢ - نَظَّاشُ نَظَّاشُ °

Notornis (S). *Notornis* (F). *Notornis* (E).

جنس طير من طراى الساق وفصيلة النطليات. انواعه المعروفة ستة افترض خبة منها وبقي نوع واحد يسير في طريق رفاقه . موطنه غابات نيوزيلندا واحواجا || جسمه يضاهي اجسام الحبشيات لكنه صغير الجناح ، عادم الذنب ، ضليع المنقاد القصير المخروطي الشكل || قوته الاعتشاب والبلور والحبوب البرية . مسرعه عند الصباح وقبل الغروب . يمدد بسرعة فائقة ولا يستطيع الطيران || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

٢٨٩٤٣ - نَظَّاشُ °

Nitra (F).

هو ملح البارود ، اطليه .

٢٨٩٤٤ - نَظَّاشُ نَظَّاشُ °

لعت تمريني يدل على جيل النطرون ، ككوك حامض نطروني وزراب نطروني .

٢٨٩٤٥ - نَظَّاشُ °

Crotalaria (S). *Crotalaire* (F).
جنس نباتات حولية وبصرة من فصيلة القرليات الفراضية. انواعه زهاء ٢٠٠ . جميعها جذبات واعشاب برية . منهاها البلاد الحارة من المابين القدم والجديد . اوراقها وانفاتها مرصوة تتلفق للماشية . ازهارها مفترسة تجرورها النمل .

٢٨٩٤٦ - نَظَّاشُ البَنَغَالِ °

Crotalaria Juncea (S). *Crotalaire du Bengale*, *Chanvrier du Bengale* (F). *Bengal hemp plant*, *Sunn hemp plant* (E). *Bengalischer Hanf* (D). *Nacchera del Bengala* (I).

نوع من النطش يكثر في بعض مناطق الهند اعصابها البنغال. ساقه اسلية الشكل يستعملون لانها استعمال القتب .



نظروس



نطش



نظرون



نطية

Paranuculées (F). **نظيرة النوايين** ٢٨٩٦٢

Zygomycètes (F). **نظيريات** ٢٨٩٦٣
مرتبة من رتبة الفطور البيضاء، أجناسها وأنواعها كثيرة
المدد تنقسم إلى فصيلتين: المصليات والمغليات.

Corbillat, Corbillot (F). **نَعَاب** ٢٨٩٦٤
Young raven (E). فرخ الغراب.

٢٨٩٦٥ - **نَعَار *** ، نَعَر سُوْرِي
Serinus syriacus (S). Serin de Syrie (F). Syrian
canary (E).

نوع من النعر حسن الصوت يكثر وجوده في البلاد القبلانية
السورية. طوله نحو ١٢ سم. ثوبه رنجي اللون يعلو في
ظهوره وجناحه مشيح اسمر. زوره وبجوشه ربطته إلى
الصغار البرتقالي المواجه تلوو دقة مستطيلة سمراء. مقار
وصدقة عينه وصدقه سمير. || يألف الحدائق والجنان
والأبنائات القريبة من المزارع. يأن عشه في الأشجار الكثيفة.
اكتاه تقسم من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٣
يوماً.

Embryologia (F). **نَعَارَة *** ٢٨٩٦٦
Embryologie (E).

٢٨٩٦٧ - **نَعَارَة نَبَاتِيَّة ***
Embryologie végétale (F).
Vegetable embryologie (E).

النعار النباتية علم يبحث في التكوين النباتي وفي المراحل
المتتابعة التي يمر بها كل نبات.

٢٨٩٦٨ - **نَعَاسَة النَع ***
Dicyphus minimus (S). Dicyphe minime, Punaise du
tabac (F). Suck-fly (E).

حشرة ثاقبة ماصة كرجية الرأعثة صغيرة القد مستطيلة الشكل
من فصيلة خاسيات الفواصل. طولها يراوح من ٨ إلى
١٠ سم. رأسها اسود اللون. زباناها خيطية مستطيلة
منتقفة إلى الدواء. ظهورها ملون وموشع بالخطوط واللوري
والاسمر والاخضر والاسود. يطها إلى السمرة المابقة.
انثاها تمتح الممكن أفرادياً في وبن التصل يفتتح بحد متحه
بنحو ٧ أيام عن يرقات دقيقة مرقالة تركيب التصل وتمصص
غلايا نسيجه || الحشرة الكاملة تمتص عصارة قة الساق
وضلوع الاوراق الحامية تقتسب لها الذبون والالتواء نحو
الارض فتبدو كأنها عادمة الجبل لا تقوى على متابعة
شماخها ودورتها الحياتية || اغراضها قد تكون جسيمة اذا
اعترت الشجر في زمن الشايع. تكافح عند الحاجة باستعمال
احد الحوافير النافذة الذي يؤثر في اعصاب الحفم.

٢٨٩٦٩ - **نَعَاعَة** بقلة ناعمة كالناعمة. ج نعام.

٢٨٩٧٠ - **نَعَام ، نَعَام**
النعام أو النعام منزل من منازل القمر البانية. وهي ثمان
كواكب على اثر الشولة، اربعة منها في المجرة وهي النعام
الواردة لانها شرعت في المجرة كأنها تشترب. واربعة خارجة
عن المجرة وهي النعام الصادرة كأنها شربت ثم صدرت ||
رقيب النعام يدعى الهنة.

٢٨٩٧١ - **نَعَامَات**
النعامات خمسة نجوم من كوكبية قيطس مركزها في اواسط
البذن.

٢٨٩٦٦ - **نِظَام ، أَسْئُوب** Régime (F).
Rufes, Regulation (E). مجوعة القواعد المفروضة أو المنية.

٢٨٩٤٧ - **نِظَام** Système (F). System (E).
مجوعة مقالة أو مبادئ مرتبطة بشكل مذهب أو اتحاد
خاص.

٢٨٩٤٨ - **نِظَام الاستغلال، طريقة الاستغلال**
Système de culture (F). Cuiélation (E).
الطريقة التي يتبعها المزارع في استغلال ارضه.

٢٨٩٤٩ - **نِظَام الاستنزاف**
Exploitation patronale (F). Sweating system (E).
هي المضاربة التي ترمي إلى خفض اجور العمال حتى الحد
الادنى.

٢٨٩٥٠ - **نِظَام الأملاك العامة**
Domainialité publique (F). Public property (E).
نظام قضائي خاص من الاملاك العامة.

٢٨٩٥١ - **نِظَام الحِصْر**
Régie (F). Stewardship (E).
ادارة الاموال وحصرها وتوجيهها توجيهاً اقتصادياً محمياً.

٢٨٩٥٢ - **نِظَام المطر، مَنَجَن الأمطار**
Régime des pluies (F). Rain regulations (E).
كية الاطوار المحلية وكيفية توزيعها على مختلف شهور
السنة.

٢٨٩٥٣ - **نِظَام النُكَابَات**
Syndicalisme (F). Syndicalism (E).

٢٨٩٥٤ - **نِظَام دَوْرِي** Système circulaire (F).
Circulation systemic (E).
نظام دورة الدم في المجسومة العلوية الجسدية.

٢٨٩٥٥ - **نِظَام عَيْشِي** Statut réel (F).
Real status (E).
صفة تقليدية تدل على القانون الذي يعالج موضوع الاموال
المنقولة منفردة.

٢٨٩٥٦ - **نِظَام وَرَقِي** Foliation
النظام الورقي هو الشكل الترتيبي الذي يتخله الورق
على الفصن. ويدعى الاوراق.

٢٨٩٥٧ - **نَظَرِيَّة** Théorie (F). Theory (E).
مذهب علمي او علم نظري لا علمي.

٢٨٩٥٨ - **نَظَرِيَّة** Théorème (F). Theorem (E).
قضية يطلب برهانها.

٢٨٩٥٩ - **نَظَرِيَّة الطَوْرِي** Théorie de l'imprévision (F).

٢٨٩٦٠ - **نَظَم**
النظم ثلاثة انجم من الجوزاء قديم النطاق، راجع نطاق.
٢٨٩٦١ - **نَظِير ، نَظِير السَمْت ، سَمْت السَمْت**
Nadir
نقطة السماء التي تحت قديم الراصد وهي تقابل سمت الرأس.



نعار



ناعسة النع



نعام



نميرك باشا



نمرة البقر



نمرة المائي



نمرة المزن



نمرة سوداء



نمرة مزججة

٢٨٩٧٩ - نعام * هودعة

Brebis (F). Ewe (E).

أنثى القسان منذ اجتيازها الشهر الخامس عشر من عمرها أي من وقت صلاحها للسداد .

٢٨٩٨٠ - نمر

Tabanus (S).

Taons (F). Gadflies (E).

جنس حشرات من النمرات. أنواعه عديدة، ذكورها تعيش على ريق الإزهار، أنثاها تعيش على ما تهمته من دم وهي تلص الحيوان ولا تنف عن الإنسان، وبعضها ينقل مرض الدباب من الإبل إلى الخيل فيبترسها. الواحدة منها تنمي نمره. أعرفها وأضرها ما يلي .

٢٨٩٨١ - نمرقة

Embryon d'animal (F).

Animal embryo (E).

٢٨٩٨٢ - نمرقة البقر *

Tabanus bovinus (S).

Taon des boeufs (F). Ox-fly (E).

ذبابة من النمرات، طولها يراوح من ١٨ إلى ٢٥ سم. ثوبها اللمسة. صدرها وسيقانها صفر. أرسافها سود. يكثر وجودها في فصل الصيف والخريف. أنثاها تنمي على البقر والخيول والحير.

٢٨٩٨٣ - نمرقة المائي *

Chrysops caecutiens (S). Taon aveuglant (F). Horse-fly, Breeze fly (E).

ذبابة صغيرة من النمرات، طولها يراوح من ٦ إلى ١٠ سم. خطها قصير القند. حورياتها خضر يطلها موج ذهبي لامع. أنثاها تنمي على الخيل والحير والبقير ولا ترتد عن مائها.

٢٨٩٨٤ - نمرقة المزن *

Chrysosoma pluvialis (S). Taon pluvial (F). Cleg (E).

ذبابة صغيرة من النمرات، طولها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم. حورياتها خضر النصف الأعلى، زرد النصف الأسفل. يكثر وجودها من حزيران إلى أواخر أيلول. أنثاها تنمي على جميع الدواب وتقتحم الإنسان.

٢٨٩٨٥ - نمرقة سوداء *

Tabanus morio, Pangonius micanus (S). Taon noir (F).

ذبابة من النمرات، طولها يراوح من ١٥ إلى ٢٥ سم. ثوبها أسود اللون، زباناها ألي الصلبة، خطها مستطيل المنك. يكثر وجودها من حزيران إلى تموز.

٢٨٩٨٦ - نمرقة مزججة * نمرقة الربيع

Tabanus bromius (S). Taon bryant (F). Gadfly (E).

ذبابة من النمرات، طولها يراوح من ١١ إلى ١٥ سم. ثوبها أسمر اللون مبقع بالأسود. مقدمها أبيض. حورياتها ال الخضار المشج بالاحمر. يكثر وجودها من أيار إلى حزيران. ذكورها لا تفرق أزيداً للنمليات. أنثاها تقتحم جميع الحيوانات ولا تنف عن الإنسان.

٢٨٩٨٧ - نمرات

Tabanidae (S). Tabanidae, Gadflies (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها من الدباب الكبير. أعطالها مستطيلة، أناسها ثاقبة ماصة ولاعة. قربها الاستعمارية ثلاثية الفواصل. حورياتها كبيرة القند، مصلة في الذكور، مفترقة متباعدة في الإناث. اجنسها غاشية التركيب شائعة. ذكورها تعيش على نشر الإزهار ودماعة الأنهار.

٢٨٩٧٩ - نعام * هودعة

Struthio camelus (S). Austrucho (F). Ostrich (E).

طائر من البراري وحيد الجنس والنوع من فصيلة النعاميات. اسم الجنس نعام والذكر ظلم والآنثى ريداء وقلوص والصغير رائل والجماة بنات الحق ويودع. وكنيتها أم البيض. صياح الظلم يدعي عرازا وصياح القلوص زبارا. || تعتبر النعام الأكبر وأضخم الطيور المعاصرة، تملو نحو ٢٦٠ سم. والذكر أنف من الأنثى. ريشها ناعم مبدل منسك. لونه يراوح من الأسود القاتم إلى الرمادي فالبني ثم البني. أعفها منتصب مستطيل، عادم الريش، كثيف الزغب الأفرع، يثني برأس صدر القند ويتقار مفلطح. ساقها قويتان ريفتان تساعداها على العدو السريع. بيضها كبير القند، حاجي اللون، أصفر المواجه، وزن الواحدة منه ١٤٥٠ غ. قوتها الأضباب والبقول والصبان والبلور والحجوب والبار والحشرات والمطاط اللغ ... || تدن في النصوص من الأول تموز ١٠٠ سم. ومعه ٣٠ تضع فيمن ١٢ إلى ١٨ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر من ٤٢ إلى ٤٨ يوما.

٢٨٩٧٣ - نعام أمريكي

Nandou (F).

هي الرساء، أطولها.

٢٨٩٧٤ - نعامي

Vent du sud (F).

South wind (E).

النعامي ديع الجنوب لأنها أبلى الرياح وأطولها.

٢٨٩٧٥ - نعاميات

Struthionidae (S). Struthionidae (E).

فصيلة طير من رتبة البراري، اجناسها المعروفة ثلاثة النعام والرحاء والأمو. جميعها سريعة العدو، كبيرة القند، مستطيلة المنق الدقيق الأتظب الريش. أرسافها ريفية قوية تنمي بآسعين أو بقلادة أصابع. اجنسها صغيرة ضيقة لا تمكها من الطيران. أرسافها رطلة متباعدة لا مياكة. تعيش من ٢٥ إلى ٣٥ سنة. موطنها المناطق الحارة من افريقية وأستراليا.

٢٨٩٧٦ - نميرك

Spilornis (S). Buse huppée (F).

جنس طير من السقاوت وفصيلة الصقريات. أنواعه عديدة جميعها من أربيد المناطق الحارة. اجسامها ريمة، أروهاا مختلفة الألوان التركية. تتميز برووهاا القوية بكشفة تقنية الارتكاز. || تعيش في الجبال الجرداء وفي القياتي المتخللة. قوتها القرواصم والزسافات والأفامي والحشرات. أشهر أنواعها نميرك باشا.

٢٨٩٧٧ - نميرك باشا *

Spilornis bache (S).

Buse huppée bache, Bache (F).

طائر من النميرك، طولها نحو ٦٥ سم. ويصلته ١٥٠ سم. ثوبه أطلل القرن، حاجي الظهر والسط، أفر البطن، يطلع توشم أبيض مستدير. كشته بيضاء الانتشاب سوداء الطرف، صدقة عينه بطورية القرن. مثاله صفر، منسره أزرق أليل أفر المواجه || موطنه فصح الأرباء بين من افريقية الجنوبية إلى الشرقية فالحند فالصين. يثن وكته في شخايف الصغور اللاتنة. أثناء تقسم من رفنة إلى ثلاث رفئات تحضنها وسداها نحو خمسة أسابيع.

٢٨٩٧٨ - نميرك

النميرك هو الذئب: الذكر من الصبيان.

٢٨٩٩٥ - نَمْلُول

Otiorrhynchus (S). Otiorrhynque (F). Weevil, Broad-nosed weevil (E). Schwarzer Rüsselkäfer, Dickmaulrüssler (D).

جنس حشرات رابطة من فصيلة السوسيات. أنواع عديدة، أعطاهما العالم أجناسها صغيرة القد، رؤوسها وأنتاجها مستطيلة. قرونها الاستشعارية مكبرة منفردة الزوايا تنقلب في مقدمة المنك، أحدها صلبة، سيقانها مسنة. أرسافها رباعية، أطوارها تراوح من الحطلي إلى الأسود. قشورها دقيق السهف والحلب تملؤا أعاديدي وزوايق مختلفة. تسرح في الليل وترقد في النهار. ريقانها تعيش في التربة على الحواد الضعوية ونها تقضم الجلود كما هو الحال في نملول السكك. || أفرق أنواعه وأشهرها ما يلي .

٢٨٩٩٦ - نَمْلُول أَحْمَر السَّاق

Otiorrhynchus lugdunensis (S). Otiorrhynque à pattes rouges (F).

نوع من النملول، مرثمه الانجرار المشرة ومشارها. يكثر في المناطق الجبلية. طوله يراوح من ١٥ إلى ١٤ سم، ثوبه إلى السوداء اللامع. سيقانه حمراء اللون. قشار ظهرانه عادم السهف، عشاري الاخاديد. || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية والبرام.

٢٨٩٩٧ - نَمْلُول الزَيْتُون

Otiorrhynchus cribricollis (S). Otiorrhynque de l'olivier (F).

نوع من النملول، مرثمه الاول نجمة الزيتون ثم الدراق والوز. طوله يراوح من ٧ إلى ٨ سم، جسمه بيضي الشكل. ثوبه إلى السوداء، متك محروطي قصير. زبانه مستطيلان منفردا الزاوية. شبكته رافعة الطرف. مقدم جوشته بالغ التحصين. قشار ظهرانه عشاري التحديد. | اخاديده مهدبة الحروف، منتظمة التتيط. || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية ولتيمها بشراة.

٢٨٩٩٨ - نَمْلُول السَّكَّك

Otiorrhynchus rugosostriatus (S). Otiorrhynque des cyclamens (F).

نوع من النملول. مرثمه الورد وبعض نباتات الزينة. طوله يراوح من ٦ إلى ٧ سم، ثوبه إلى السوداء. زبانه إلى الجفوة، متك يبدو كأنه استطالة الرأس. ظهرانه كثير التحديد الطولي، كثيف الركيات السفلية، صمير الهلب || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية. إذاه الأكبر يأتي من ريقانه التي تعيش في التربة وتلتهم جلود السكك تقضي عليه.

٢٨٩٩٩ - نَمْلُول الكاشن

Otiorrhynchus ligustici (S). Otiorrhynque de la livèche (F). Lovage weevil (E). Liebesstöckelrübier (D).

نوع من النملول، مرثمه الكاشن والنفل ومعظم القربليات. وبعض الانجرار المشرة. طوله يراوح من ١٥ إلى ١٢ سم، ثوبه إلى السوداء الريداء. متك أسطواني الشكل. مقدم جوشته متظم التحصين. ظهرانه سهي القشار، منقب الحطوط || يسرح في الليل. قوته الأوراق الفتية.

٢٩٠٠٠ - نَمْلُول الكَرْمَة

Otiorrhynchus sulcatus (S). Otiorrhynque de la vigne (F). Vine weevil (E). Gefurchter Lappenrübier (D).

نوع من النملول، مرثمه الكرم ولا يمتد من الانجرار المشرة والحرجية. طوله يراوح من ٨ إلى ١٠ سم، جسمه

الخشيشة والثار الناجية المطربة. اما انثاها فقربها قوت الذكور يضاف اليه الدم الذي تنصه من الحيوان لانها لا تستفي عنه في تكوين المنك. مكشبا وشي الشكل تنصه الاناث صفوفا متتابة متراسة فيتفت بعد متصه بمدة وجيزة تراوح من ٢٤ إلى ١٢٠ ساعة || ريقانها مدوية الشكل، غبراء اللون او صفراء، يطغوا بتجميع اسود رمي تمشي في الماء والثريل والوسل والرمال الرطبة والأصابع الكثيفة المنحلة.

٢٨٩٩٨ - نَمَصَّة

Fagne (F). Upland moss-hug (E). نَمَصَّة

هي الارض الرطبة كثر اشغالها الطوعية التي ترتادها الجيم.

٢٨٩٩٩ - نَمَصَّة

Flacourtia (S). Flacourtie (F). الناحية نضفة، جنس اشجار ونجيرات برية وزراعية من فصيلة النضفيات. أنواعه المعروفة ١٢ مهدا الهند وسائر بلاد الشرق.

جلوبها معتدلة السوق. اغصانها فارشة. اوراقها متعاقبة. انفرارها ثنائية المسكن. انفرارها سنبلي التجميع، تاجي الانكناز، ثمارها مأكولة، كرزية الشكل صغيرة القد، كثيرة العدد، تتحول نحو ثلاثة اشهر. اعرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٢٨٩٩٠ - نَمَصَّة سَرَحَة

Flacourtia inermis (S). Flacourtie inermis (F). Lovli (E).

نوع من النضف، ثمرته تملو من ٤ إلى ٥ اطار. ساقها اغصانها سرسة. ثمارها كرزية الشكل ولقد تتحول من ٨ إلى ٩ اشهر، لونها إلى الحمرة الزاهية. | سوقها قليل الحوصلة، غزير العصارة، يؤكل ويربب.

٢٨٩٩١ - نَمَصَّة مَدْعَسَكْر

Flacourtia ramontchi (S). Prunier de Madagascar, Ramontchi, Marroche (F). Governor's plum, Madagascar plum (E). Achte Flacourtia (D). Pruno del Madagascar (I).

نوع من النضف، جنبته تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها سرسة. اغصانها فتاة قليلة الشوك. ثمارها كروية الشكل قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى الجفوة اللامعة، سوقها متصحب الحوصلة يكثر استعمالها في المربيات. حلاه ساقها حولي القلانة. قلقة دباغي المادة شائع الاستعمال.

٢٨٩٩٢ - نَمَصَّة هِنْدِيَّة

Flacourtia astaphracta (S). Flacourtie de l'Inde, Prunier malgache, P. de l'Inde (F). Indian plum, Rumea plum (E). Flacourtie (D). Pruno d'Inde (I).

نوع من النضف، ثمرته تملو من ٦ إلى ٦ اطار. ساقها اغصانها شائكة. انفرارها صغيرة القد تستفي اللون. ثمارها غرضية الشكل، كشمشية القد، كرزية اللون، جامدة السوق، ظاهرة الحوصلة، تستعمل قريبا. قلقة حلاه سوقها اغصانها دباغي المادة.

٢٨٩٩٣ - نَمَصَّات

Flacourtiaceae (S). Flacourtiacées (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القملات. اجناسها وانواعها عديدة، منها الانجرار والشجيرات، معظمها بري وبعضها زراعي مأكول الثار. || اشهر اجناسها النضف والايريير والطر والبرجانية والريسة.

٢٨٩٩٤ - نَمَصَّة

هي المصدة القاسدة في الم.



نملول اجر الساق



نملول الزيتون



نملول السكك



نملول الكاشن



نملول الكرمة

منها يهبطية والوسطى قلبية والعليا رديحية مدببة او مقطوعة الطرف . نصلها نائض الاصاب ، قليل الخمل ، ازهاره سنبل التجميع ، طرفي الازهار . ازهاره متراكبة ، لينة ، حمراء اللون || اوراقه وازهاره ليمونيه اللون . نقيهما يطهر المعدة ويذهب بالمض || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠١٩ - نَعْنَعَ مُسْتَدِيرُ الْوَرَقِ

Mentha rotundifolia (S). *Mentha à feuilles rondes* (F).

نوع من النعنع البري المبلول . ساقه منتصبه زباد متقاربة الفروع تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه شبه مستديرة . نصلها نائض الاصاب ، رافع التجميع المتصع ، خلي الصفحة السفل || ازهاره سنبل التجميع ، طرفي الازهار . ازهاره كثيرة العدد غيراء اللون صفراء الموانج || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٠٢٠ - نُعْنَعَة

Jabot (F).

النعنة هي الحوصلة ، اطلها .

٢٩٠٢١ - نَعُور

النور هي الريح التي تهاجلك ببرد وانث في حر او بحر وانث في برد .

Croassement (F).

Croaking, Cawing (E).

٢٩٠٢٢ - تَعِيبُ ، تَعِيقُ

هو صوت الغراب ويدهى ايضاً زبيب .

٢٩٠٢٣ - نَعِيم

نيم وصليب الجنوب اسمان لكوكبية نجوم واحدة مركزها الجنوب . اطلب صليب الجنوب .

٢٩٠٢٤ - نَعِيم

هو الاغبرانتوس ، اطله .

٢٩٠٢٥ - نُعْمَة

هي السج ، اطله .

Pedionomus (S). *Pédionome* (F).

٢٩٠٢٦ - نَعَاش

طائر وسيد الجلس والنوع من فصيلة التنيويات . واحده نفاشة . وهي صغيرة الجثة طويلاً نحو ١٧ سم . ثوبها الى الصهبة بعلها تأذي وتوشم اصفر واجر واسود . راسها مضط بالاجر || قربها الحبوب والحشرات . تألف الاماكن القليلة الاشجار ، الكثيرة الشب العالي || تنثر في الحوص قدرة بين الاشباب . تعيش من ٨ الى ١٠ في بيضات تحضنها وسدا نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٠٢٧ - نَعَاش *

Meconopsis (S). *Méconopside, Méconopsis* (F). *Flaming poppy, Wind poppy* (E). *Mohlnig, Mohngescht* (D). *Papavero cimbrico, Meconopsis* (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الباذنجانيات . انواعه عديدة ، اعطانا العالم ، معظمها بري وبعضها تربي . سوقها منتصبه . اوراقها كاملة او مفرصة . ازهارها منتصبه . منها الاصفر والازرق والبيجسي . عصارها لينة دقة صفراء اللون جعالية المادة || احرف انواعه وازهارها ما يتبع .

Meconopsis grandis (S).

٢٩٠٢٨ - نَعَاش رَفِيع

Méconopside élevée (F).

نوع من النعناض المعمر . ساقه مزينة انتصبه تملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه ضمية التجميع طرفية الازهار

٢٩٠١٣ - نَعْنَعَ بَرِّي * ، ظَهِيرَة ، ظَهْرَاء

Mentha sylvestris (S). *Menthe sauvage, M. sylvestre* (F). *Wild mint* (E). *Wilde Minze* (D). *Mentastro, Menta salvatica* (I).

نوع من النعنع البري الشائع الاستعمال الطبي . ساقه فروع تملو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقه اهليلجية ذرية نصلها نائض الاصاب مابق الخصار بطول من ٢ الى ٣ سم . ازهاره ضمية التجميع ابطية الازهار فواحة اللون الاخضر .

Mentha crispata (S).

٢٩٠١٤ - نَعْنَعَ جَعْدَرِي

Mentha crispata (F). *Curled mint* (E). *Krause Minze* (D). *Menta crespata, Mantone* (I).

نوع من النعنع البري المبلول . ساقه منتصبه متباعدة الفروع الزيادة تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقه اهليلجية الشكل ، نصلها نائض الاصاب متصع الصفحة المتشارية الحافة || ازهاره سنبل التجميع طرفي الازهار . ازهاره صغيرة ، دقيقة ، غيراء اللون بعلها موانج ليكي || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٢٩٠١٥ - نَعْنَعَ زُرْعَائِي ، نَعْنَعَ بُسْتَائِي

Mentha piperita (S). *Menthe poivrée* (F). *Peppermint, White mint* (E). *Pfefferminze, Pfeffer-Wassermünze* (D). *Menta prima, M. peperina, M. pepe, M. piperita* (I).

نوع من النعنع الزراعي البقي الشائع الاستعمال . فروعها المشهورة ثلثة : الحزني والابيض والاسود . سوقها متصبة الانتصاب فروع تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها معتقة . اذنية ، لاطلة الاذنيات . نصلها سنائية الشكل ، مدببة المقصبة ، انزرة الاصاب ، ميخرة الزيب ، حافة الخصار ، خشنة للمس . ازهارها سنبل التجميع طرفي الازهار . ازهارها وردية اللون او بيضاء || مداته القمالة تنه اللمدة وتقدر الاصاب وتتمع الانتفاخ وتفيد الصدر وتقضي على البلغم .

٢٩٠١٦ - نَعْنَعَ صَعْتَرِي ، نَعْنَعَ يَابَاطِي

Mentha arvensis (S). *Menthe des champs, M. du Japon, Pouliot thym* (F). *Corn mint, Field mint* (E). *Feldminze* (D). *Menta campestris, M. coltivate* (I).

نوع من النعنع الزراعي المشهور هذه اليابان . ساقه منتصبه فروع تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم . فروعها متراكبة جلفة . اوراقه اهليلجية الشكل تملو من ٤ الى ٦ سم . نصلها خلي الصفحة ، نائض الاصاب ، سنن الحافة . ازهارها وردية اللون ، ابطية الازهار ، ضمية التركيب ، صويونية الشكل || يزود لاستخدام المتول .

Mentha canadensis (S).

Mentha du Canada (F).

نوع من النعنع الصناعي يزود لاستخدام طهر . مده كندا وهو يزود في جميع الاقاليم المتعددة المنخفضة نحو الباردة . ساقه فروع تملو من ٢٥ الى ٧٥ سم . اوراقه معتقة سنائية الشكل . نصلها ازغب البشرة ، نائض الاصاب ، سنن الحافة ، بطول من ٥ الى ٨ سم . ويعرض من ١٢ الى ٢٥ سم . || ازهاره وردية اللون ، ضمية التجميع ، ابطية الازهار || يزود ويحوي في جميع الاربية الغنية الرطبة المتوسطة الانساج . يستعمل طهره من الازراق والازهار .

Mentha citrata (S).

٢٩٠١٨ - نَعْنَعَ لَيْمُونِي

Mentha citronnée (F).

نوع من النعنع الازيني . ساقه فروع مستقيمة تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه معتقة لا نظامية الشكل ، السفل



نعنع بري



نعنع زراعي



نَعْنَاع

٢٩٠٣٥ - نفاض واليش (S). Meconopsis wallichii (F).

نوع من النفاض المحول . ساقه فروع متشعبة تملو من ٨٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه ملتصقة ريشية غزيرة . ازهاره زرقاء اللون متدلية ، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة رباعية الحروف النافرة الخدعة الجانب || ساقه وفروعها مزينة البهجة ، زفيها حلبي الشكل اسمر اللون ، عادم الصلابة || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٢٩٠٣٦ - نفاضات (F). Amiboides (E).

رتبة كائنات حيوانية دينا من الجليات .

٢٩٠٣٧ - نفاضة (F). Amibe

هي الابه ، اطليه .

٢٩٠٣٨ - نفاض (F). Hypodermose

مرض يحده نفث النبر في الخيل والبقر والافان .

٢٩٠٣٩ - نفاض * ، أم شيقوكة (F). Buphaga (S).

جنس طير من فصيلة الزروريات ، انواحه قليلة . طوله يراوح من ٢٤ الى ٢٧ سم . راسه وعقه وسنوده وبنته وتظهر الى الجؤرة . سقاطه وذنبه الى السرة الباقية . نيكاه الى الصهبة . منقاره غليظ الشكل والقند ، اصغر القناعة والجسم ، اجر الملقط . عياله الى الحجرة الجؤرية ، رساه ونحاليه سمر || يعيش برفقة الحمر والحيتات من ابقار وابل ويترها يلتقط ما عليها من قراد وذباب ويستأصل من جلوجها النمر والثعلب وما اشبه .

٢٩٠٤٠ - نفاض (F). Turnix (S).

نفس الطائر : حسا من الماء ما يكفي .

٢٩٠٤١ - نقيول * (F). Turnix (S).

جنس طير من فصيلة النقيليات . انواعه قليلة العدد ، جميعا صغيرة لحد طويلا يراوح من ١٦ الى ١٨ سم . اولها الى الصهبة الباقية الموشحة والمؤددة بالاصفر والاسود . رؤسها موشحة بثلاثة خطوط صفر || اناله تكد بين الاشجار والادغال ترصع اقليصها بالحبش . تبيض من ٦ الى ١٠ بيضات مخضها وسحها نحو ثلاثة اسابيع || قوته الحبوب والحشرات حل لاختلاف انواعها وانحسها النسل . يألف الليالي والاراضي المسخاة || اعراف انواعه واشهرها النقيول الاقربى والنقيول القتال .

٢٩٠٤٢ - نقيليات (F). Turnicidae (E).

فصيلة طير من رتبة الدجاجيات . اجناسها خمسة . شكلها بين الحيل والحبارى . تتميز بفتحة المنقار والسان . بمطاطة قزاد المنقار وبقصر الانثى || اجناسها خمسة : النقيول والتكرو والحقم والشونس والنفاض .

٢٩٠٤٣ - نقيول (F). Trachycarpus (S).

جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة النقيليات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جلوجها اسطوانية مستقيمة تملو من ٥٠ سم . الى عشرة امتار . اوراقها مستطيلة الزناد ذرفية الشكل او موزية قطرها يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . لونها الى الخضار الاملس الازرق المولج يملو تمصيح فضي .

يملوها ازهار مركب من ثلاثة ازهار جلوية اللون سباعية او تساعية البتلات قطرها يراوح من ٨ الى ١٠ سم . تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٤ - نفاض شايك (F). Méconopside à épineuse (F).

نوع من النفاض المسمر . ساقه شاذكة منتصبة تملو نحو ٦٠ سم . شوكها هربي الشكل ذرب الحسة . اوراقه قليلة الشكل ، كبيرة اللد ، خاسية التفصيص . ازهاره ارجوانية اللون ، صفر الاسدية ، متوسطة اللد ، قطرها نحو ٥ سم . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٠٤٥ - نفاض عشقودي (F). Méconopsis racemosa (S).

نوع من النفاض المسمر . ساقه شاذكة منتصبة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه كاملة عادمة للتشريح . تصلها الى الخضار الاصفر المولج . ازهاره عشقودي التجميع . ازهاره بنفسجية اللون قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم . بتلاتها لا نظامية التركيب والتمد الذي يراوح من ٥ الى ٨ || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٦ - نفاض كامل الورق (F). Méconopsis integrifolia (S).

نوع من النفاض المحول . ساقه منتصبة تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم . فروعها متبادلة لا منتصبة . زفيها حلبي الشكل ، اسمر اللون ، متوسط الصلابة . اوراقه سنانة للتصل مستطيلة . ازهاره صفراء اللون ، مزدوجة البتلات ، كبيرة اللد ، قطرها يراوح من ٧ الى ١٥ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٧ - نفاض كميري (F). Méconopsis cambrica (S).

نوع من النفاض المسمر . ساقه فروع متشعبة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه ملتصقة ريشية غزيرة . ازهاره متوسطة اللد تعرض من ٣ الى ٤ سم . تيلو كبريتية الصفار ثم تنحرف نحو البرتقالي . ثماره حفية الشكل . سقاها صفة ، مستطيلة ، رباعية الحروف الحادة وينها سداسية . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٠٤٨ - نفاض مشعر (F). Méconopsis sinuata (S).

نوع من النفاض الحولي . ساقه شاذكة منتصبة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . فروعها متبادلة لا منتصبة . اوراقه لا قياسية التفصيص والتشريح ، تصلها كبير اللد عايق الخضار . ازهاره عشقودي التجميع ، زرقاء اللون ، رباعية البتلات ، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٢٩٠٤٩ - نفاض هاليك (F). Méconopsis heterophylla (S).

نوع من النفاض الحولي . ساقه فروع متشعبة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه لا قياسية التفصيص والتشريح . ازهاره حرار اللون ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم . ثماره جراء مستطيلة سداسية الحروف النافرة || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .



نفاض



نقيول

قليلة المدد ، جميعها وسيدة الجبل الحولي . تظهر في أوائل الربيع ثم تمتع مكانها الذي على نصال ومناطق بعض النباتات المرصوة فينتفج عن رقات تقصي على الأوراق . أشهرها نغريل الفصّة .

٢٩٠٥٣ - نغريل الفصّة

هو سويد الفصّة ، أطّله . (F). *Négril de la luzerne*

٢٩٠٥٤ - نغصيات
Gymnosaccae (S).
Gymnosaccae (F). Gymnosaccae (E).
مرتبطة فطور مجهرية من رتبة الزيات تكتيز بأزائها المرماطة ، اجناسها وأزواها كثيرة المدد تجسمها ثلاث فصائل : الخريات والحيدبات والوقصيات .

٢٩٠٥٥ - نغص
Veron (F). Bot, Bott (E).
برقة النبر اي دعوصه . ج ل ف . تنفج حل ظهور الخيل والأبال واليشر التي تلمسها وتنفجها بالسلما الى الوفاها فحلوقها فاساها حيث تستقر بعض الوقت ثم ترق مع النسيج الى الجلد او تمكث بين طيات الجلد الى ان تخرج مع الرؤوس .

٢٩٠٥٦ - نغسل
Hybride (F). Hybrid (E).
هو في الحيوان من كان ابيو من غير جلس امه كالبخل الذي يتولد من الحمار والفرس .

٢٩٠٥٧ - نغص
Crétillon (F). Comb (E).
من عرف الديك .

٢٩٠٥٨ - نغصية ، سبثورية
Septoria (S).
يكتديتها جلس فطور مجهرية من فصيلة النغصيات . يكتديتها كروية او بيضية تكشا محصورة في الطبقة الادمية . منها شارب الاذكار . جوبا مثل النسيج القديم . يورديتها مستطيلة او عيطية ، مستقيمة او منقطة ، شفافة ، شفعية الانقسام المرضي ، تحمله الزئفرة || انواعه عديدة . قدرها نحو ٩٠٠ منها حيوية لا ضرر فيها ومنها مؤذية وبعضها شديد الالذ . أشهرها ما يلي .

٢٩٠٥٩ - نغصية الازالية ، نغصية الجلسان
Septoria azalae (S). Septoriose de l'azalée (F). Leaf scorch (E).
فطر مجهرى يركب الأوراق الفتية عند قاعدة عروقها الاول فيسبب احمرار النسيج واممرار ثم ييبس ، وتفسد الأوراق ويخشو النبات . وقد يكون اذاه شديدا فيؤثر على النمو ويمنع الاثمار || يكافح منه ظهوره بمركبات النحاس او الزنك ويحرق الأوراق الساقطة لانها تحافظ على بوح الفطر .

٢٩٠٦٠ - نغصية الازحوان

٢٩٠٦١ - نغصية البُرْتَقَال
Septoria callistephi (S).
فطر مجهرى يصيب اوراق سطر انواع الاسفوان الزراعي فيسبب النبات ويؤثر في نمو واثماره || مظهره الخارجي يقع لاهامة الشكل والحجم تركب نصل الاوراق بين الاعصاب والعروق . تبدو سطحية ، غيراء اللون ثم عميل نحو السرة التي يمتلئها الياس والاصحات . يكافح بقتلح النباتات المروسة وبطحنه التربة بالكلس او بسلقات النحاس .

٢٩٠٦٢ - نغصية البُرْتَقَال
Septoria tibia (S).
فطر مجهرى حادم الالذ يركب البُرْتَقَال والحامض واليوسني

كرها شائك الحافة ، شوكه صلب النسيج ، ساد الحمة . ثماره طليقة التجميع ، منية الشكل والقند ، ليلية الجباب الناشف للأماكول || والنغريل يعيش ابنا ذرع وفي اي ربة كانت شرط ان لا تنخفض الحرارة الدنيا عن ثلاث درجات مئوية . || اعراف انواعه وأشهرها ما يتبع .

٢٩٠٤٤ - نغريل أزعب
Trachycarpus nana (S).
Palmer à tige rudimentaire (F).

نوع من النغريل الزبني السبروتي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية قصيرة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه دقيقة الشكل لامعة النصل الاخضر اللامس . ثماره جزوية اللون ، منية الشكل والقند || وهو يعطي النمو ، جميل الشكل ، يزرع في المراكب والحدائق .

٢٩٠٤٥ - نغريل القيب
Trachycarpus excelsa (S). Palmer à fibre, Palmier-chavvre (F). Fibre palm (E). Faeerpalm (D). Palma de fibra (I).
نوع من النغريل السبروتي الصنابي الشائع الزراعة . ساقه اسطوانية رفيعة تملو نحو ١٠ أمتار تطوقها شباك من الخيف متراكبة الحياك حنطية اللون . اوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٤٠ الى ٦٠ سم . وزنادها يطول نحو ٥٠ سم . || ثماره منية الشكل والقند لونها الى الزرققة المايقة || الباثه مرغوب فيها تستعمل في صناعة الاكياس والحبال .

٢٩٠٤٦ - نغريل مخزبات
Trachycarpus khasians, T. martiana (S). Palmer de Marcins (F).
نوع من النغريل السبروتي الزبني . ساقه ناشرة الخيد ، مسمرة الالياف الرطبة ، تملو من ٣ الى ٥ أمتار . اوراقه مروحية الشكل قطرها يراوح من ٦٠ الى ١٠٠ سم . وزنادها يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . نصلها حائق الخضار اللامس يملو تمسح فضي . ثماره عنية الشكل والقند لونها الى الصفار البرتقالي .

٢٩٠٤٧ - نغص
Aune (F).
هو المثلث ، أطّله .

٢٩٠٤٨ - نغز
Pycnonota (F).
هو الزليل ، أطّله .

٢٩٠٤٩ - نغز
Serinus (S). Serin (F). Canary (E).
نفرج . نفران . جلس حصارير خريسة من نصيلة الشرشوريات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القند . اثنواها الى الصفرة والصفرة الزرقية والورشة . جميعها تألت القفص وتقتبس ادب التنريد || أشهر انواعه النفر الكناري المعروف بالكناز .

٢٩٠٥٠ - نغز سوري
Serin de Syrie (F).
هو النصار ونوع من النفر تنجي اللون حسن التنريد يألف البلاد الجبانية السورية .

٢٩٠٥١ - نغز
Serine (F). She canary (E).
اثنى النفر . جسها اصغر قدأ من جسم الاكر ورأسها اقل استدارة وثوبها اقل لمة ونخسب .

٢٩٠٥٢ - نغريل
Colaspidea (S).
Colaspideum, Négril (F).
جلس خنافس صغيرة القند من فصيلة النشاريات . انواعه



نغريل



نغيلة البرتقال



نفل ابيض

ويعتبر النفل في الوقت الحاضر من أهم وسائل التلقيح التي تستخدم في تحريك الاليات المختلفة من النباتات والسفن الى السيارات واجهزة الصائم. || أهم البلاد المنتجة النفل هي الولايات المتحدة وروسيا وأمريكا الجنوبية والبلاد العربية وإيران.

٢٩١٠٣ - نَفْطُور ٥

Micro-organisms (F).
Microorganism (E).
اسم يطلق على كل عضو مجهرى نباتي أو حيواني. ج. فطريات. ف. منهم من قال فمضكري. ج. فمضكريات.

٢٩١٠٤ - نَفْطِيَّة ٥

Utilitarism (F).
Utilitarianism (E).
النفعية مذهب فلسفي يقول بأن المنفعة إن خاصة أو عامة هي سمة العمل البشري.

٢٩١٠٥ - نَفَقَات ٥

Impenses (F). Expenses (E).
هو ما ينفقه المرء على حين ثابتة قابلة للاسترداد والنقطة قد تكون :
نفقات ترفيه
Impenses voluptuaires (F).
Voluntary expenses (E).
نفقات ضرورية
Impenses nécessaires (F).
Necessary expenses (E).

نفقات مفيدة ٥

Impenses utiles (F).
Useful expenses (E).
٢٩١٠٦ - نَفَقَّة ، مَعَاش
Pension (F).
Pension, Allowance (E).
النفقة أو المعاش دين يؤتى بملصقات دورية وقد تكون عمرية لقولم المعيشة أو التقاعد أو بسبب زمانة.

٢٩١٠٧ - نَفْل ، نَفْلَة ، نَفْلَة ٥

Trifolium (S).
Trèfle (F). Clover (E).
جنس نباتات عشبية من القرنيات القرناشية. أنواعه البرقية زباد ١٥٠ معظمها بري مرعوي وبعضها زراعي على ريشها الحولي والهيل للممر. جلورها جنية تدور في الأرض. سوقها فراء. أوراقها مركبة ثلاثية الوريقات مستطيلة الزناد. أزهارها رؤيبي التجميع أو سنبل. أزهارها منثرية بخلفة الألوان. ثمارها سنبلية. بزورها كلوية الشكل، صغيرة القد، سمار اللون. || أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٢٩١٠٨ - نَفْل اَبْيَض ٥

Trifolium repens (S).
Trèfle blanc, T. rampant, T. d'agneau (F).
نوع من النفل المرعوي. تكثر زراعته في الأرض العربية. ساقه مفادة فراء. وريقاته بيضية مستطيلة. أزهارها رؤيبي التجميع. أزهارها بيضاء. بذورها كلوية الشكل. سنبلية. || يوجد في جميع الأرض أعصها المنتجة ولا ينشئ الكلسية. علفه جيد الصنف مرعوب فيه بكثر استعماله لبقير الحلوب.

٢٩١٠٩ - نَفْل إسْكَنْدَرَانِي هو البرسيم ، اطلبه .

٢٩١١٠ - نَفْل البَرِّ ٥ ، رَجُل الأرْبَب

Trifolium arvense (S). Trèfle des champs, Pied de lièvre (F). Field clover, Hare's foot clover, Stone clover (E). Feldklee, Hasenpötschenklee (D). Mosci-maggiore, Erba lepre, Pie di lepre (I).
نوع من النفل البري المرعوي للممر. ساقه وفروعه زباد



نفل البرِّ

٢٩١٩٢ - نَفَث الدَّم ٥

Hemoptysis (F).
هو يسق الدم ، اطلبه .

٢٩١٩٣ - نَفْج ٥

Ecdosis (F). Hatching (E).
هو التفنن والتفقيص. تقول نفج القوب أو الصمصص أو الكتكتوت أي خرج من البيضة .

٢٩١٩٤ - نَفْحِيَّة ٥

Pneumatologie (F).
Pneumatology (E).
النفسية مذهب فلسفي لاهوتي يبحث في كل ما هو خاص أو منوط بالكمائنات الوسيطة بين البشر والاله أو الآلة .

٢٩١٩٥ - نَفْثَرُوب ٥

Néphrops (F).
دورية من القشريات تدمى برفوث البحر ، اطلبه .

٢٩١٩٦ - نَفْثَرُود ٥

Nephrodium (S).
Néphrodie (F). Nephrodium (E).
جنس نباتات جذورية معمرة من السراخس وعضلة البسباجيات. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم أصقاع العالم || أوراقها مستطيلة ، مركبة ، وقرية التجميع ، جميلة الخضار اللانس . مزاجها ريشية أو مفرشية . سدابها كلوية الشكل . زكاتها شبه ملحومة || بعض الأنواع التفرد بزروع في المراكز للزينة .

٢٩١٩٧ - نَفْثَرِيد ٥

Néphridies (F).
نفرجيد نفايريد أعضاء الإفراز عند بعض الحيوانات الدنيا كاللوزارات وضفديات الارجل والديدان . وهي عبارة عن أنابيب مسككة ، مهدبة الجدران الداخلية تحترق الجسم وتنفتح الى الخارج .

٢٩١٩٨ - نَفَض ٥

النفس : ما تساقط من الورق والثرر .

٢٩١٩٩ - نَفَض ٥

Gaulge (F). Beating (E).
هو الفوط أو المبط أي جني الثار بواسطة الضرب بالحصا.

٢٩١٠٠ - نَفَض ٥

Egronage (F). Picking (E).
فصل الحبوب أو البورر عن السنابل والمطر وما أشبه .

٢٩١٠١ - نَفَضَة ٥

المطرطة تصيب بقعة من الأرض وتغطي بقعة .

٢٩١٠٢ - نَفْط ، نَفْطُول ٥

Pétrole, Naphte (F).
Petroleum, Naphtha (E).
زيت معدني يوجد في جوف الأرض مركب من حمضي الكربون والهيدروجين الاصليين . أنواعه عديدة ومختلفة الأغراض من لين ورأحة وصفاء ولزوجة . ومنه ما يكون مصفراً قليل المتناثر الثانوية وهو أجوده ومنه ما يكون غمراً كذا ومنه ما يفرغ الى الحفرة أو السواد ويكون بمهفه شفافاً وبمفهه الآخر كذا كثيراً . قلته النعني يراوح من ٧٨٠° الى ٨٣٠° || يستخلص منه بالنفطير المواد التالية :

سحق ٧٠°
إير البرول
من ٧٠ الى ١٢٠°
الغازولين
من ١٢٠ الى ١٥٠°
البترين
من ١٥٠ الى ٢٨٠°
زيت الآلات المعروف بالبرول
من ٢٨٠ الى ٤٠٠°
الزيوت الثقيلة والشحم المذني
من ٤٠٠° وما فوق
البرافين والغازولين
وأخيراً المازوت الذي يعتبر رأسب التفتير

٢٩١١٦ - نفل بلقاني ، نفل دلتاسي

Trifolium pannonicum (S). Tréfle pannonien, T. de Dalmatie (F).

نوع من النفل المرصوي الممر . ساقه زياء منتصبه قزواء تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ازهاره وريسي التجميع غروي الشكل . ازهاره كبيرة القذ عاجية اللون يملوها موالج اصفر . وريقاته اهلبيجية تطلو من ٤ الى ٥ سم . تصلها ازغب البشرة باهت الخفسار || وهو من النباتات السبروتية التي تمشي حتى ارتفاع ١٨٠٠ م . ويجود في جميع الارربة العميقة النور .

٢٩١١٧ - نفل ثرؤسي

Trifolium lupinaster (S). Tréfle à feuilles de lupin, T. faux-lupin (F).
نوع من النفل التريبي الممر . ساقه منتصبه قليلة الفروع تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه خاسية او سباحية الوريقات ، نصلها ستانية ذرية تطلو نحو ٢ سم . ازهاره مستطيل الشكل . ازهاره ارجوانية اللون تطلو نحو ٢ سم . تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩١١٨ - نفل قريزي

Trifolium incarnatum (S). Tréfle incarnat, T. anglais, T. du Roussillon (F). Scarlet clover (E). Incarnat-Klee (D). Trifoglio incarnato (I).
نوع من النفل المرصوي الزراعي الممر : ساقه قزواء زياء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . وريقاته ملوكة الشكل . ازهاره سبلي التجميع . ازهاره قريزية اللون . يزود الى الصفار الملعب الموالج || يجود في جميع الارربة الصالحة . يكثر استعماله كنبات حولي لانه سريع النمو وجيد الانتاج في اول عهسه . ضروده المشهورة حسة فوارقها الصلوات بسرعة الادراك وصلاحتها الى اربة معينة .

٢٩١١٩ - نفوح

صفة الصرع الذي لا يجبس لينة . فتقول صرع نفوح . والبقرة النفوح تلك التي يخرج لبنها من غير حلب .

٢٩١٢٠ - نكيد ٥

Usable (F).
Liable to wear out (E).
صفة ما يمكن استعماله او ما يمكن ان ينفى .

٢٩١٢١ - نكيد ٥

Terebratula (S).
Térébratule (F). *Terebratula* (E).
جنس حيوانات من الرغويات مفصليات الارجل وفضية الفيلديات . انواعه المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الديفونية والبعض الآخر ، اي الماصر ، منتشر في جميع بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، شبه غرويية الشرنق ، لامتساوية المصاريع المائلة || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة .

٢٩١٢٢ - نكيد يات ٥

Terebratulidae (S).
Térébratulidés (F). *Terebratulidae* (E).
فصيلة من الرغويات المفصليات عضديات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها من احافير الاباج القدم والحبة الديفونية . اما اجناسها المعاصرة فنتشرة في معظم بحار العالم || اصداها صغيرة القذ ، متباينة الاشكال والاروان || اعراف اجناسها واشهرها النغيدة والتقيشة والماس والفسيث والدليمة .

٢٩١٢٣ - نغير

Stramoine (F).
هو الدائوره الشاذكة ، اطليا .

تملو من ١٠ الى ٢٥ سم . وريقاته ثلاثية التركيب قليلة الشكل . ازهاره سبلي التجميع . ازهاره وريدية اللون .

٢٩١١١ - نفل الماء *

Menyanthes trifoliata (S). Ménélanthe, Ménéyanthe, Tréfle d'eau, T. des marais (F). Bog-bean, Buckbean, Marsh trefoil (D). Bockabohne Flaberklee, Sumpfflaberklee (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua, T. caprino (I).
نبات عشبي جلمودي متعقي معمور فصيلة الجنطيانات . اوراقه مركبة ثلاثية تشبه اوراق النفل وهي متعاقبة ، منقطة ، حاشية . ازهاره عشقودي التجميع . ازهاره صغيرة القذ يضاء اللون موشحة بالوردي || اوراقه طيبة عديدة المنافع الصحية وقد تستعمل استعمال الجنجل . راجس المطرفل .

٢٩١١٢ - نفل المروج * ، نفل بنفسجي ، برسيم احمر ، رطب

Trifolium pratense (S). Tréfle commun, T. des prés, T. violet, T. rouge, Tramène, Triolet, Lucotte (F). Red clover, Purple clover, Meadow clover (E). Klee, Rotarklee, Wiesenklee (D). Trifoglio rosso, T. dei prati, Moschino (I).
نوع من النفل المرصوي السبلي الممر الثاني الزراعة . ساقه منتصبه نزعاء جواء تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه ثلاثية الوريقات البيضاء الشكل . تصلها مالم المستعص يملو عند قاعدته تجذيع ابيض حل شكل ٨ . ازهاره وريسي التجميع . ازهاره بنفسجية اللون تملوها ماجة ارجوانية . يزود بنفسجية القطن الطليظ ، صفر القطن اللين || يجود في جميع الارربة الفائرة المواد الضوية اعصها المتدنية ، العميقة النور ، الرطب || متطلباته الخاصة الكلس والبوتاس .

٢٩١١٣ - نفل اثيني

Trifolium elegans (S).
Tréfle élégant (F).
نوع من النفل المرصوي الممر . ساقه كثيرة الفروع ، متوسطة الطول ، زياء . وريقاته ملوكة النصل ، عاقبة الخفسار . وريقاته الزهرية متوسطة القذ ، كثيرة العدد . ازهاره الى الحفرة الوردية السوية || يجود في جميع الارربة ولا ينشئ القفيرة والخفيقة والرملية .

٢٩١١٤ - نفل احجن *

Trifolium hybridum (S). Tréfle hybride, T. de Suède, T. d'Alsace, T. bätard (F).
نوع من النفل المرصوي الثاني الزراعة في المناطق الباردة الرطبة . ساقه دقيقة قزواء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . وريقاته بيضية مستطيلة . وريقاته الزهرية كبيرة القذ . ازهاره وريدية اللون مخلفة الموالج الذي يراوس || حله جيد الصننط مرغوب فيه .

٢٩١١٥ - نفل برتقالي

Trifolium aurantiacum (S). Tréfle orangé (F).
نوع من النفل التريبي الممر . ساقه قزواء مشبة تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . وريقاته ستانية النصل المسن . ازهاره وريسي التجميع ، يضي الشكل ، يملو من ٥ الى ٧ سم . ازهاره صغيرة القذ برتقالية اللون || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .



نفل الماء



نفل المروج



نفل احجن



نفل قريزي



نغيدة

٢٩١٢٩ - نقيضة الأرز *

Mycosphaerella oryzae (S).



نقيضة الاجاص

نظر مجهرى يركب عصف الارز في شعري تموز وآب
يلوذه ويهيء الى اسباله || مظهره الحاربي يقع مبشرة
لاقياسية الشكل والترتيب تملو نصال الصفب تسبب
ذويها وييساهم الباكر بما يؤدي الى سوء الاسبال وتدني
الانتاج || اعساله نودلية الشكل . بويقاته ثنائية الخلية
تطول من ١٤ الى ١٥ م. وتعرض نحو ٤ م. || اضراره
الحققة حتى الآن لا تتسبب المكافئة لانها لم تتجاوز
٢٪ .

٢٩١٣٠ - نقيضة البزيلة *

Mycosphaerella pinodes, *Ascochyta pisal* (S).
Anthraxose des pois (F). Blight of peas, Leaf spot of
peas (E). Brannfleckenkrankheit der bohnen und
erbsen (D).



نقيضة الاراشيد

نظر مجهرى يمتري اوراق وصف البزيلة والبيقية والجلبان
والخمر والترمس || مظهره الخارجي يقع لاقياسية الشكل
والترتيب لوها الى المصلحة يحيطها حثار اسمر . تركيب الوراق
والسنت والسوق فتشوها وقد تسبب ذبول القرون وييساهم
قبل اكتمال الحب || وهو من القنطور الزهية التي لا تتكاثر
الا في ظروف بيئية محدودة تساندتها حوامل مناعية خاصة
تولمها تدني الحرارة وثقل الضع وكثرة الرطوبة الجوية
النسبية .



نقيضة الاراز

٢٩١٣١ - نقيضة البطيخ *

Mycosphaerella citrullina, *Dipodina citrullina*, *Ascochyta cucumis* (S).



نقيضة البزيلة

نظر مجهرى يركب البطيخ والتام والخيما والكوس وغيرها
من القرعيات فيؤذيها اشد الاذى || مظهره الحاربي يقع
سحر لاقياسية الحجم والترتيب تعيب نصل الوراق تسبب
يباس التفسخ ثم تصيب السوق فتسقطها يثور قرعية
تحول دون وصول كامل التفسخ الى الفروع والاوراق
تتسبب اسودادها وييساهم || بكتيدات نودلية الشكل ،
حتلية اللون ، مبيسة الخن ، تطول نحو ١٦٥ م. . بويقاته
شفافة ، ثنائية الخلية ، شبه اسطوانية الشكل تطول من
١٠ الى ١٨ م. . وتعرض من ٣ الى ٥ م. يكافئ عنه
ظهوره باستعمال احد الادوية الفطورية للتعفير على
النبات والرتبة .



نقيضة البطيخ

٢٩١٣٢ - نقيضة التفاح *

Mycosphaerella pomi, *Cylindrosporium pomi*, *Phoma pomi* (S). Fruit spot, Brooks' fruit spot (E).



نقيضة التفاح

نظر مجهرى يركب ثمار التفاح . مظهره الحاربي يقع
دقيقة قطرها نحو ٥ م. . تصيب بشرة الثمرة تبتو حتلية
اللون او غصافا حافية او سمراء . يركب التفاح في آب
ويستمر في نشاطه حتى الخزن بالبراد حيث يتوقف ويركن
الى ثبات البنيات || اعساله التي تمسح على الوراق الساقطة
والتي يراوح قطرها من ٧٠ الى ١٠٠ م. . تحسن بعض
الارتقاك التي لا يقل عددا من ٣ . بويقاته شبه اسطوانية
طولا ١٩ م. . وعرضها ٣ م. || اما بكتيدات التي
تركب الثمار فهي تلتفط العديد من الكائنات الخيطية
المستعينة او الموصية التي تطول من ٥ الى ٨ م. . وتعرض
البشرة لانها تقلا تملب السوق اذ لا تغفل فيه اكثر من
مليتين || يكافئ مكانة التفاح .

٢٩١٢٤ - نقيضة Labile, Caduc (F). Deciduous (E).

قابل الاعبال أي السقوط .

٢٩١٢٥ - نقيضة *

Mycosphaerella (S).
جنس فطور مجهرية من النخاميات وتصلية المشطيات .
اصنافها بسيطة ، ككثاها مديمة النكدة ، يوضع خفاف
او زيتوني اللون يحمل وثيرة متعرجة تقصده الى خطين
متوازيين القدر . منها هامي الاكثر في التفاح شبه
تعلولي || انواعه الفارة عديدة اعزلها ما يتبع .

٢٩١٢٦ - نقيضة الاجاص *

Mycosphaerella sentina, *Sphaerella sentina*, *Sphaerella pyri*, *Septoria pyri*, *Septoria piricola*, *Septoria nigririma* (S). *Septoriosa du polier* (F). *Leaf spot of pears* (E). *Weibfleckenkrankheit der birne* (D).

نظر مجهرى يمتري اوراق الاجاص وقد يصيب الثمار .
مظهره الخارجي يقع صغرية مبشرة ، قطرها من ١
٤ م. . لوها الى الخلي يحيطها اطوار احمر اللون يتضجعي
المواج ، تركب نصل الوراق فتؤذيها ومنعها من القيام
بوظيفها على الوجه الاكل || بكتيدات نائكة نودلية تطول
من ١٥٠ الى ١٨٠ م. . بويقاته اسطوانية مقوسة شفافة
مستتة الاطراف ثنائية الانقسام ثلاثية الخلايا تطول من
٢٣ الى ٤٣ م. . وتعرض نحو ٣ م. || تكاثره مشروط
بالموئل الجوية المرافقة || يكافئ كسائر فطور جنسه .

٢٩١٢٧ - نقيضة الاراشيد *

السوداكي *

Mycosphaerella arachidicola, *Cercospora arachidicola*, *C. arachidis* (S).

نظر مجهرى يركب اوراق النبات وسوقها . مظهره الحاربي
يقع زيتية ثم حتلية لجووية قطرها يراوح من ١ الى ١٠ م
تطو نصال الوراق على صفحاتها السفلى ثم تنتشر على
السوق والمخاليق فتؤذيها ومنعها عن القيام بوظيفتها على الوجه
الاكل || كوانبه ربادية اللون ملتوية الاطراف . ككثاها
صغرية الشكل مستعينة الجسم او مقوسة ، طولا يراوح
من ٣٧ الى ١٠٨ م. . وعرضها من ٣ الى ٥ م. . انقسامها
شديد التباين يراوح من ضعف الى ٣ اضعاف || يكافئ
باستعمال الادوية الفطورية التي لا يمتح من تراكم
عناصرها المتعالة . ومن المستحسن تطهير البذار قبل
استعماله بمحلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ مدة ساعة
من الزمن .

٢٩١٢٨ - نقيضة الاراشيد المستديرة *

نقيضة بيرسكي *

Mycosphaerella berkeleyi, *Cercospora personata*, *Cladosporium personatum*, *Septogloeum arachidis* (S).

نظر مجهرى يركب سوق الاراشيد واوراته ليؤذيها وقد
يصيب ذويها وييساهم || مظهره الحاربي يقع مستديرة
تبدو حتلية اللون ثم تسمر وتنتهي باليباس والانفجرات .
كوانبه نودلية الشكل جووية اللون . ككثاها اسطوانية
الجسم ، مستتة الاطراف ، حتلية ، تطول من ١٨
الى ١٠ م. . وتعرض من ٥ الى ١١ م. . انقسامها شطرها
بنسبة ضغين الى ٩ اضعاف . اصنافها وارتقاها برمية
الشكل . بويقاتها ثنائية الخلايا لا متساوية الشكل والحجم .
يكافئ مكانة نقيضة الاراشيد .

٢٩١٣٢ - نَيْطَلَةُ الثَّوْتِ *

Mycosphaerella morifolia, *Cylindrosporium mori*, *Septoria mori*, *Septogloeum mori*, *Chelaria mori*, *Phleospora mori* (S). Fausse-routille du mûrier (F). فطر مجهرى يركب أوراق الثوت. مظهر الخارجي يقع مزاوية سفاه اللون، سمراء الاطراف، تتري نصل الأوراق وتسب جفاف النسج || اضراره محصورة بمدى السلب الذي يحل بالنسج وقد يصل في بعض المراتب انطالية والظفر المتأخية للملاعة الى نحو ٥ ٪ من مساحة النصل. هذا مع العلم ان قدر القتر يرضى اكل النسج الشالية. يكافح بنسج الاشجار قبل اوراقها باسد المركبات النحالية.



نَيْطَلَةُ الثَّوْتِ

٢٩١٣٤ - نَيْطَلَةُ التَّيْنِ *

Mycosphaerella bolleana (S). فطر مجهرى يركب التين في اوراقه فيؤذيها. مظهره الخارجي يقع مزاوية تملو النصل على صفحته السفلى ضمن حدود العروق والأعصاب، تبدو مابقة اللون الى ان يكتسبها الحمل الاطمل فتتأخها اذ ذلك على الصفحة العليا يقع سمر واضعة مقروسة || كئائله وشية الشكل زيتونية اللون تطول من ٣٥ الى ٤٥ م. وتعرض من ٧ الى ٨ م. انتشاشها يراوح من ضعفين الى ٦ اضعاف. اضراره تافهة لا تستوجب لمكافحة.



نَيْطَلَةُ الزَّرُوعِ

٢٩١٣٥ - نَيْطَلَةُ الثَّوْمِ *

Mycosphaerella alliecia (D). فطر مجهرى يركب أوراق الثوم والكرات فيؤشوها وقد يؤذيها ويصيب يباسها || مظهره الخارجي يثور صغيرة كثيرة مبيضة تبدو يفساد اللون ثم يوداء وتنتهي بالسمرة واليباس || افسانه تتكاثر على صفحي النصل. ثقافته تطول من ٥٥ الى ٦٠ م. وتعرض نحو ١٤ م. يوربانه ثنائية الخلية تطول من ١٦ الى ٢٠ م. وتعرض نحو ٥ م. اضراره لا تتعدى الأوراق.



نَيْطَلَةُ السُّوسَنِ

٢٩١٣٦ - نَيْطَلَةُ الخَمْصِ *

Mycosphaerella rabiei, *Ascochyta rabiei*, *Phyllosticta rabiei* (S). Anthracnose du pois chiche (F). فطر مجهرى يصيب الحمص في جميع اعضاءه الهوائية. مظهره الخارجي يقع بقضية الشكل او مستدرة تركب السوق والاوراق والسلف. تبدو حنطية اللون ثم تنحرف الى البنية اوتتأخها اطراف اخر. وعند اشتداد اذاها تفرح السوق وتذبل الاوراق وتسبب اتملاس السلف. يوربانه اسطوانية الشكل تطول من ١٢ الى ١٤ م. وتعرض نحو ٤ م. || يكافح اما بتطهير الحمص قبل بلده وذلك بتمه نحو خمس دقائق في محلول سلفات النحاس المركز ٥ ٪ او بنسج زراعته قوياً بعد ازهارها بمحلول يورود المركز ١ ٪.



نَيْطَلَةُ الثَّوْمِ

٢٩١٣٧ - نَيْطَلَةُ الخَمَزِ *

Mycosphaerella populicola, *M. populorum* (S). فطر مجهرى يركب الخمر في اوراقه فيؤشوها. مظهره الخارجي يقع مزاوية صغيرة ألق حنطية اللون تملو النصل فتقرحه || تشوبه لا يستوجب لمكافحة.



نَيْطَلَةُ الشَّيْثَانِ

٢٩١٣٨ - نَيْطَلَةُ الزَّرُوعِ *

Mycosphaerella tulasnei, *Cladosporium herbarum*, *Hormodendron cladosporioides* (S). Noir des céréales, Mouchetage, Moucheture (F). Black point, Dark, Brown-tip (E). Schwarzen des Getreides (D). فطر مجهرى يمتري صنف الزرع وصنفيات السنايل في الخطة والشعير والشوفان والتيلم || مظهره الخارجي

يقع حنطية تركب العصف قسب ذبوله ثم تسب مصيفات الحب فتؤشها بنسج سود. وقد يركب البرة في نطيلها فيلور كنطعة سوداء داكنة || كوابية بسيطة التركيب لاقياسية الجسم والاستطالة لونها الى السمرة. كئائله طرية الايتكار. يوربانه بقضية الشكل، حنطية اللون، فردية او ثنائية الخلية تطول من ١٨ الى ٢٤ م. وتعرض من ٧ الى ١٠ م. || اضراره قليلة لا تستوجب لمكافحة المكافهة.

٢٩١٣٩ - نَيْطَلَةُ الزَّرِّيْزُونِ *

Mycosphaerella miliagrana, *M. microscora* (S). فطر مجهرى يصيب الزريزون في اوراقه فيؤذيها وفي قضبانته القنطة فيقرسها ويصلها. || مظهره الخارجي يقع كثيرة سمراء اللون، مستدرة الشكل، قطرها يراوح من ٣ الى ٤ م. تركب فصل الوراق قسب يباس النسج والشباب. وهو حل القضيبان يقع مستطيلة لا قياسية الشكل والحجم تركب بشره السام قرب ابط الورقة فتقرسها وتحرقها يطار رافق جوي اللون. || كوابية غسية التجميع متصية. كئائله سوية صفراء اللون تطول من ٣٠ الى ٤٦ م. وتعرض من ٣ الى ٥ م. افسانه كروية الشكل قطرها يراوح من ٥٥ الى ١٠٠ م. ثقافته وشية تحفن اربعة اذواج من البوربات الشفافة التي يراوح طولها من ١٦ الى ٢٠ م. وعرضها من ٣ الى ٤ م.

٢٩١٤٠ - نَيْطَلَةُ السُّوسَنِ *

Mycosphaerella macrospora, *Didymella macrospora*, *Heterosporium gracile*, *Scolecotrichum cladosporioides* (S). فطر مجهرى يصيب أوراق السوسن والذبول فيؤذيها. || مظهره الخارجي يقع مستطيلة حنطية اللون جويية الخمار خيماء. الاطراف الخارجي تطول من ٤ الى ١٠ م. وتعرض من ٢ الى ٥ م. تركب النصل على صفحاتها العليا فتقرسها وتؤشوها وتسبب افسارها وذبولها. || كوابية اسطوانية الشكل ملتوية الاطراف تطول نحو ٢٠٠ م. وتعرض نحو ١٢ م. كئائله طرية الانتشاش طولها يراوح من ٤٥ الى ٨٠ م. وعرضها من ١٥ الى ٢٠ م. وهي لا نظامية الاقسام الذي لا يقل من ضعفين ولا يفوق الخمسة. || يكافح قبل الانزعاد باستعمال سائل يورود المركز ١ ٪.

٢٩١٤١ - نَيْطَلَةُ الشَّوْكَزِ *

Mycosphaerella tabifica, *Sphaerella tabifica* (S). Pourriture du cœur de la betterave, Pied noir de la betterave (F). Dry heart rot of beets (E). Herzfleule der Runkelrübe (D). فطر مجهرى يصيب أوراق الشوكر ويجلوره فيصلها. مظهره الخارجي يقع مستدرة تبدو محطاه اللون ثم سمراء تركب الاوراق، في اواسط الصيف، على صفحات نصالها العليا قسب افسارها وذبولها ثم تنتقل بواسطة الاوعية الشبكية الى داخل الجذور فتصلها وتوقع بها اشد الاذى || يكافح باستعمال محلول يورود من مرتين او ثلاث مرات ابتداء من اول تموز.

٢٩١٤٢ - نَيْطَلَةُ الشَّيْثَانِ *

Mycosphaerella fragariae, *Sphaerella fragariae*, *Stigmata fragariae*, *Septoria fragariae*, *Ascochyta fragariae*, *Cylindrosporium grevilleianum*, *Ramularia tulasnei* (S). Maladie des taches rouges du fraisier, Taches brunes des feuilles du fraisier (F). Leaf spot of strawberry (E). Weißfleckenkrankheit der Erdbeerblätter (D). فطر مجهرى يصيب الشيك باراقره فيؤذيها. مظهره

فطر مجهرى يصيب الشيك باراقره فيؤذيها. مظهره

مستطيلة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٣ الى ١٢ .
بويضاته ثنائية الخلية . || اخراره زجيدة لا تستوجب
المكافحة .



نقطة القزقل

٢٩١١٧ - نَقِيطَةُ الْكَشْكَشَةِ *

Mycosphaerella maculiformis, *Phyllosticta maculiformis*, *Cylindrosporium castaneicolum* (S).

فطر مجهري مركب أوراق الكستنة والبنلق وبعض الانجبار
الحرجية كالاسفندان والثلث والبيلا والشرم والسندباد .
مظهره الخارجي بقع صغيرة مزوانية تصيب نصل الأوراق
على صفحاتها السفلى فتبدو يضاء اللون ثم سمراء .
بكتيادته مميّزة التجميع لا قياسية الترتيب لونها الى السرة .
بوه اسطواني الشكل رباعي الانقسام او خماسي . بويضاته
تطول نحو ٥ م . وتعرض نحو ١ م . || اخراره تنحصر
بما يلبسه من اذى بالاوراق وما يسببه من نقص في الغذاء
يؤدى الى الاجبال الباكر .



نقطة القطن

٢٩١٤٨ - نَقِيطَةُ الْكَشْكَشِ *

Mycosphaerella ribis, *M. grossularia*, *Septoria ribis*, *Phyllosticta grossularis* (S), *Septoriosa du grossellieri* (F), *Septoria leaf spot* (E).

فطر مجهري مركب أوراق الكشكش . مظهره الخارجي
بقع فسيحة مزوانية الشكل تظهر في نموز وأوب لونها الى
الصعبة الخضراء الملوحة ثم تيل الى البنية وتستقر على الون
الاضمحل يعلو توتيس اسود . || بويضاته خيطية مستطيلة
شاذة لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ٢ الى ٥ .
اخراره زجيدة . يكافح كسائر فطوره جنسه .



نقطة الكرز

٢٩١٤٩ - نَقِيطَةُ الْمُرَّانِ *

Mycosphaerella fraxini (S).

فطر مجهري مركب المران في اوراقه فيصيب بياضا .
شبيهه بتكار مستوى الخلد بين الفلحة الحاكية والبقعية
مظهره الخارجي بقع مستديرة حطية اللون اسطوانية الختام .
كثافته خيطية الشكل ، مستطيلة او مقوية الاطراف
تطول من ٣٠ الى ٤٠ م . وتعرض من ١ الى ٢ م .
اخراره لا تستوجب المكافحة .

٢٩١٥٠ - نَقِيطَةُ الْمُرَّانِ *

Mycosphaerella brassicicola, *Sphaeria brassicicola*,
Dothidea brassicae, *Phyllosticta brassicae*, *Ascospora brassicae*, *Phoma oleracea* (S), *Ring-spot* (E).

فطر مجهري يصيب الملفوف في اوراقه الخارجية فيضبطها
ويهي الى التسوق فيؤثره وقد يؤذي . مظهره الخارجي
بقع مستديرة يدها اللون سيد المحور ظهريا يراوح من ٥
الى ١٠ م . تركب التصل تقديب اصفرار يذوبه .
اصانه وبكتيادته تراكب وتتشابك في البقعة الواحدة
فتضلوا الى بقرة سوداء تتحاري من مقلها الون البورفات
التيقة الشفافة التي تطلو نحو ٥ م . وتعرض نحو ١ م .
اخراره التي تجين عليها حويل الرطبة تراوح من ١ الى
٢٥ % يكافح بتطهير البدار وتطهير تربة الماشاتل او
باصتعال مائل جديدة .



نقطة الكستنة

٢٩١٥١ - نَقِيطَةُ السَّيْهَوْتِ *

Mycosphaerella manihoti, *Cercospora castvae*, *C. manihoti*, *C. henningsii*, *Septoglossum manihoti* (S).

فطر مجهري يصيب النسيوت في اوراقه فيضبطها ويؤذي .
مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل ، يدها اللون
تركب الاوراق تقديب يباس النسيج وانفثاته .
كثافته تطلو من ٢٠ الى ٢٥ م . وتعرض من ٥



نقطة الملفوف

الخارجي بقع صغيرة لا قياسية الترتيب والشكل والحليم
تركب نصل الاوراق على صفحاتها العليا ولا تمتع من
المعاليق . تبدو جوية اللون بتسجعية الملوحة ثم تتحرف
الى السرة وتستقر على البنية يحولها اطار اخر داكن .
كوابه فارشة ، كثافته مستطيلة او مقوية وهي شاذة
اسطوانية مستندة الاطراف . بويضاته لا قياسية الانقسام
تطول من ٢٥ الى ٥٥ م . وتعرض من ٢ الى ٣ م .
اخراره محصورة بحطب النسيج وحرمانه من التياه يسله
الجسموري على الوجه الاكل . || يكافح قبل الانثوار
وبعد الفلغ . وقد تنمطس جلود الشيك قبل زرعها
بمحلول الحامض الكبريتي المركز ٢ % الذي يقضي على
هذا الفطر وغيره من الفطوره الفساره .

٢٩١٤٣ - نَقِيطَةُ الْعَلَقِيقِ *

Mycosphaerella rubi, *Septoria rubi* (S).

فطر مجهري مركب أوراق العليق والمويج البري والوجي .
مظهره الخارجي بقع مزوانية صغيرة اللثد ضلها يطلو من
٢ الى ٣ م . لونها الى اللطلة تملوها شمة سمراء تركب
نصل الاوراق منذ انتشاب المروق تسبب يباس النسيج
ثم انفثاته وسقوطه . || كثارته يحصل عادة بعد جني الثار
وهو اذا لامته الموالل الجوية يحش الاوراق الفية
فيحسبها ويلدجا . || يكافح كسائر فطوره جنسه .

٢٩١٤٤ - نَقِيطَةُ الْقَرْفَلِ *

Mycosphaerella dianthi, *Didymella dianthi*, *Heterosporium echinulatum*, *Helminthosporium echinulatum* (S).

فطر مجهري يصيب القزقل بجميع اعضاءه الهوائية .
مظهره الخارجي بقع مستديرة الشكل او يضيعة ، حطية
اللون ، مهدية بطار اخر او بتسجعية تركب الاوراق ثم
الاسوق وتعد الى تسوق الزهرة وبتلها . || كوابه فسيحة
التجميع ، موجية الغلام ملتوية . كثافته اسطوانية الشكل
لا قياسية الانقسام الذي يراوح من ضعف الى اربعة
اصناف . بويضاته تطلو من ٣٥ الى ٤٥ م . وتعرض
من ١٢ الى ١٦ م . || يكافح باصتعال سائل بودو
المركز ١ % قبل الانثوار .

٢٩١٤٥ - نَقِيطَةُ الْقُطْنِ *

Mycosphaerella gossypina, *Cercospora gossypina* (S), *Cercosporiosis du cottonier* (F).

فطر مجهري مركب أوراق القطن فيؤذيها دون ان يهي
الى التسوق والانتاج . || مظهره الخارجي بقع صغيرة سمراء
اللون مهدية بالاحمر تلو اوراق القطن القريبة من التربة
التي لا تطلها اشعة الشمس . || كوابه هريبة الشكل
تعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ م . كثافته شاذة تطلو من
٧٠ الى ١٠٠ م . وتعرض نحو ٣ م . وهي سداسية او
سباعية الاجزاء . اصانه حطية الشكل ظهريا يراوح من
٦٠ الى ٩٠ م . انثاقها اسطوانية تطلو من ٤٥ الى
٥٠ م . وتعرض من ٨ الى ١٠ م . بويضاتها وضيعة ،
ثنائية الخلية تطلو من ١٥ الى ١٨ م . وتعرض من ٣
الى ٤ م . || اذله لا يستوجب المكافحة .

٢٩١٤٦ - نَقِيطَةُ الْكَرْزَةِ *

Mycosphaerella cerasella, *Cercospora cerasella* (S).

فطر مجهري مركب اوراق الكرز والهلج . مظهره الخارجي
بقع صغيرة مستديرة حطية اللون مهدية بالاحمر تنصل
نصل الاوراق ثم تقيس . وقد ينفضها الريح فيبدو النصل
كالغربال الملبس بالثوب . || كثافته حطية الشكل

والانثى تمتنع المكن محبداً في بطون الاثارة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تقطع نحو ٦ م. ثوبها في اول مدها الى الجفوة ثم ينصرف الى البنفسجي الفاتح تملو خطوط قاطبة من النقط السود .

Humerus

٢٩١٥٦ - نَقَّاذ

النقا هو عظم العضد .

Purété (F). Purité (E).

٢٩١٥٧ - نَقَاءٌ ، طَهْرٌ

هو غلر الثشي من العناصر الغريبة منه .

Picolde tridactylus (S).

٢٩١٥٨ - نَقَّابٌ *

Picolde tridactyle (F).

طائر من فصيلة النقايات ورتبة المشفقات . موطنه يشمل المناطق الجبلية من الشرق الادلى واروية || جسمه معتدل القدر يطول نحو ٢٠ سم . بعينه نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السواد الفضي الملبق بالابيض في الصق والاباحر . صدره ويمنه الى البياض المشيز بالبنفي . جبهة ورقته وصغره الى السواد اللامع . قنة رأسه ذهبية اللون يطولها تشيز قصي . حذقة عينه زرقاء اللون . منقاده وساقاه الى السمرة السوداء . ثوب الانثى لا يختلف من ثوب الذكر الا بمضاب الفتة البنفي المشيز بالاصفر || ويتميز النَقَّاب بكونه ثلاثي الاصابع خسوفاً لسائر اجناس النقايات الرباعية الاصابع || قوته الحشرات واساريمها وبعض البذور البرية || يفتن عنه في تجاوبت الاشجار . الانثى تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

Syndicat (F). Syndicate (E).

٢٩١٥٩ - نَقَابِيَّةٌ

هي جمعية اشخاص يتصلون الى مهنة واحدة او مهنة متشابهة للغناح المشروع عن مصالحهم المهنية .

٢٩١٦٠ - نَقَابِيَّةٌ

Charrua défonceuse, Défonceuse (F). Trenching plough (E). سكة خضفة مقنطرة تستعمل لفلج التربة او سحرها وانتراع حيايتها على اعماق تراوح من ٦٠ الى ١٢٠ سم .

Coccothraustes (S).

٢٩١٦١ - نَقَّاذ ، نَقَّاذ

Gros-bec (F). Hawfinch (E).

جنس طير من فصيلة الشرشوريات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها من صافير المناطق الحارة والمعتدلة . مسرهما العالم القديم والجلدية . تتميز بمنطقها الضخمة التي تمتلئ من كسر حزمة الموز والخواخوخ والكرز . قوتها الثمار والحبوب والاشجارات . تكثر في الاجنار الغذاء انماها تنقع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها متواصلة الاكوار نحو ١٥ يوماً . اعرف انواعه واشهرها النَقَّاذ المبدول .

٢٩١٦٢ - نَقَّاذ مَبْدُولٌ *

Coccothraustes vulgaris (S). Gros-bec vulgaire,

Gros-bec commun (F). Common hawfinch (E).

طائر من النقاذ وهو اشيع انواع جنسه واكبرها واضخمها قُدراً وبشفاً . يطول نحو ١٩ سم . رأسه كشي اللون . قفته الى الصبغة الرمدا . زرقاه وزروره سود . ظهره وصدره الى الصبغة الحمرة . بطنه ابيض . جناحه سود القاعدة ومغظ الاطراف . يبيض الريس وبعض الاطراف . ذنبه اسود اللون ينتهي بقمة بيضاء . منقاره الى الزرق العائقة . حذقة عينه وردية . ساقاه الى الحمرة الطلحة . يألف

الى ٦ م . انقسامها لا نظالي الترتيب يراوح من ٢ الى ٩ . اصابتها سطحية الاوتكاز . كروية الشكل تطرها يراوح من ٩٠ الى ١١٠ م . انزلقها رمية تحسن اربعة ازواج من البويضات الشفافة الثانية الخلية .

٢٩١٥٢ - نَفِيطَةُ الْمَوْزِ *

Mycosphaerella musicola, Cercospora musa (S). Cercosporiose du bananier (F). Sigetka disease (E). فطر مجهري يركب الموز في اوراقه فيقطعها ويسبب ذبولها ويهيء الى الفكاسات ان لم يندنها . || مظهره الخارجي نقاط دقيقة زيتية اللون تظهر في اوائل الصيف على الاوراق الجديدة ثم تقسم وتتفرق نهائياً على شكل مستطيلات يراوح طولها من ٣ الى ١٠ م . وقد تتصل بعضها فتصبح بقعاً فسيحة مستطيلة لا تقياسه الخيم . اما لونها فيسحب على الصبغة الخفيفة يحرقها اطراف اسير اللون . اطول التهديد . كرابيه ضمية التجميع . كتالده سوية الشكل تطول من ٢٠ الى ٨٠ م . وتعرض من ٢ الى ٦ م . انقسامها يراوح من ٣ الى ٧ اصناف . بويضاتها شفافة ثنائية الخلية تطول من ١٤ الى ١٨ م . وتعرض من ٣ الى ٤ م . اغراض منقولة بمدى انتشاره لانه يسبب يباس الاوراق وتذللن للكيلة او احداها وعدم تكوينها . يكالغ باستمال سائل يورود المركز ٢ ٪ يضاف اليه ١ ٪ من الدبس و ٥ ٪ من الفشا .

٢٩١٥٣ - نَفِيقٌ (F). Canaliculus (E).

Nephila (S).

٢٩١٥٤ - نَفِيلَةٌ *

Néphile (F). Nephila (E).

جنس ريلات من المناكب الكبيرة القد . انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في معظم المناطق الحارة من العالم القديم والجديد || ذكورها اصفر قداماً من انثيا . انثيا مراكبة الانوان يطلب فيها الاصفر والاحمر والاسود . جراحها سم الاطراف || يربو بها في بعض البلاد الاسيرية والامريكية لاستخراج نواصها الحريري الاصفر اللون || اشهر انواعها الصالحة للربية :

N. chrysogaster (S).


نَفِيلَةٌ ذهبية اللون

N. clavipes (S).

نَفِيلَةٌ لوزيائه

N. madagascariensis (S).

نَفِيلَةٌ مدغشكر



نَفِيلَةُ الْمَوْزِ (١) نَفِيلَةُ الْمَوْزِ (٢)



نَفِيلَةٌ



نَفِيلَةُ كَرْدِيَانِي



نَقَّابٌ



نَقَّاذ مَبْدُولٌ

٢٩١٥٥ - نَفِيسٌ كَرْدِيَانِيٌّ * ، فِيدَالِيَّةٌ

كَرْدِيَانِيَّةٌ *

Novius (Macronevius) cardinals, Vedalia cardinals (S).

Novius cardinal (F). Vedalia cardinals (E).

حشرة عاتلة من فصيلة الدعسوقيات ورتبة مدهدات الاجنحة تألف بساتين الحشيشات والمياقل والحدائق . خنافسها ويرتلها تيش على الاثارة الذي يفتك بالخشيشات والورد والميموزا ... || جسمها صغير القدر يطول من ٣ الى ٤ م . ثوبها احمر يطول تقيج اسود . رأسها صغير الحجم . اسود . عيناها صغيرتان . زباناها صغريان . صغريان . لكاهها نيشطان . ظهرها شديد الاحمضاد . مستدير المظهر اللامع . الاثاف . غداها كهيئة الحمل . اسافها رباعية المقل || ايجلها الحولية ستة . تخرج الحشرة الجسلانة من بيائها الشتوي في اوائل الربيع . تسرح في الثمار . جيلها يستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً باستثناء الجيل السادس . الى الشتوي ، الذي يستمر نحو ٦٠ يوماً || تساف بعد ظهورها باسبوع



نقار احمر الرأس

٢٩١٦٩ - **نقار كبير** * ، **نقوبة الصنوبر**
Picus major (S). *Pic épéche* (F). Great spotted woodpecker (E).

نوع من النقار موطنه فصح الاربعاء يمتد من اواسط الشرق الى اطراف اربوة الغربية. || جسمه يطول نحو ٢٤ سم. ثوبه متباين الالوان الزاوية. ظهره واعلى جسمه الى السواد اللامع. عنقه وخراره وحناءه مبقعة بالابيض. رأسه اسود. قنقه ويؤخر بطنه الى الحمرة. صدره وبطنه الى البياض الاخير. حلقه عينه جردية اللون. منقده وربطه الى الكمية الرصاصية. انشاء سره التقف. يألف اشرار الصنوبريات ولا يقرب من الحقائق والجائز الا عند سوس الحاجة الى الطعام.



نقار اسود

٢٩١٧٠ - **نقاريات**
Picidae (S). *Picidae* (F). *Picidae* (E).

فصيلة طير من رتبة المقلقات اجناسها وانواعها عديدة تبسها ثلاث عمارات. اشهر طيورها النقار والواو.



نقار صير

٢٩١٧١ - **نقار** *
Penelope (S). *Pénélope* (F).

جنس طير من فصيلة الترناسيات. انواعه قليلة، جميعها مستطيلة الشكل الرقيق. قوة المنقار الاجسن. رؤسها قزمية الريش المستطيل انثام، عشاره ملط. اجنحتها مستديرة، اذنيها طويلة. الواها الى السرعة اللاذكية يطوها وتوشم وتوشح || تألف الاشرار. تمش اشرار كبيرة قوتها الثار والجوب والحشرات. تدش اعاشتها في الاشجار. اناتها تبش نحو ٤ يضاات تحبها وسدها اربعة اسابيع.



نقار كبير

٢٩١٧٢ - **نقاص** *
Drosophylla (S). *Drosophylla* (F).

ثبات معمر مقدس وسيد الجنس والوع من فصيلة البسمانيات. سانه مقرة. اوراقه عصفية مستطيلة منصبة تحفة التمثل للفرور بازيب البايق الشكل الذي يشعر كل حشرة تقرب من يفضي طبا ويمحصها. انعامه صفراء اللون، حلقية التجميع، هابة الازكار، تقوم حل شراخ مودق قومي الانتشاب.

٢٩١٧٣ - **نقاص، سحابة، سحابة** *
Burretta (F). *Curet* (E).

٢٩١٧٤ - **نقاق**
Bombina, *Bombinator* (S). *Bombinateur*, *Sonneur* (F). *Bombinator* (E).

جنس صفاد من فصيلة الصفاجيات. انواعه المرولة قليلة العدد، مهدا البلاد المعتدة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد. اولها تواوج من ه الى ٧ سم. جلدها مثاقلة تفرز عند المس رفوة يضاء تير العناس والتدعيم. الواها السطوية الى السرعة تملوها سرجة قائمة. الواها السفلية تواوج من الصفرة الباهتة الى الحمرة تملوها رقة طحلاء زرقاء المواج || تعيش في القاع وجاري الماء تركها في الليل وتبعي لها عند الفجر || اجرية دميها وشية الشكل تحوي من ٢٠ الى ٤٠ دمية مبطلة تنفد بهد التشرة بنحو ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه النقاق الاصفر البطن والنقاق لثاري البطن.



نقار

٢٩١٧٥ - **نقاق أصغر البطن**
Bombina salza (S). *Bombinateur à ventre jaune* (F). *Bombinator* (E).

نوع من الصفاد النقالة ينتمي الى فصيلة الصفاجيات. موطنه يمتد من الشرق الاطل الى اطراف اربوة. يألف



نقاص

الاشراج والنباتات انحصا اشرار الصنوبر والصنوبر ولا يقرب من الحقائق والجائز الا في فصل الشتاء وعند الحاجة القاهرة الى القوت.

٢٩١٦٣ - **نقار، قزاع، نقوبة**
Picus (S). *Pic* (F). *Woodpecker* (E).

جنس طير من فصيلة النقاريات. انواعه عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء استراليا. جميعها مستطيلة تركب جذوع الاشجار فتقرصها ويترق قشورها وتقبب شكيرها لاستخراج ما فيها من اساريج وديدان. اجسامها متوسطة القد، الواها ملونة. منقارها قوية، مستطيلة، غمدية، اجنحتها منفرجة الاطراف. اذناها متوسطة الطول. ارباغها قصيرة. جزئية التسرول. قوتها الحشرات ورقاتها واساريفها ويذنها من النسل الى المناكب والجنادب ولا تمت من الثار والجلوز والصنوبر عند الحاجة. || تدش في تجاويف الاشجار اناتها تدش من ٤ الى ٥ يضاات تحبها وسدها من ١٤ الى ١٧ يوما. تعتبر من الطيور النافذة التي تستحق الحماية. || اشهر انواعها واسرفها ما يتبع.

٢٩١٦٤ - **نقار أحمر الرأس** *
Picus medius (S). *Pic mar*, *Pic à tête rouge* (F). *Middle spotted woodpecker* (E). *Mittlerer Buntspecht* (D).

نوع من النقار. موطنه الشرق الاوسط واربوة. جسمه يطول نحو ١٨ سم. ثوبه لوب النقار الكبير الا انه احمر الرأس. || يألف اشرار السنديان دون سواها. انشاء تحبها بمناوبة الذكر من ٥ الى ٧ يضاات.

٢٩١٦٥ - **نقار أخضر**
Pivert (F). هو الشسة الخضراء، اطلها.

٢٩١٦٦ - **نقار أسود** * ، **ناقوبة سوداء، دزكوب**
Dryocopus martius (S). *Dryocope noir*, *Dryocope noir*, *Pic noir* (F). *Black woodpecker* (E). *Schwarzspecht* (D).

طائر من النقاريات. موطنه جبال الشرق واربوة. جسمه يطول نحو ١٧ سم. وبطنه ٧٧ سم. ثوبه الى السواد السوي القائم الداكن يستثنى منه قة الرأس القرمزية. جناحه متوسط القد، ذاك الطرف. حلقه عينه صفراء اللون. يألف النباتات والاشراج. قوته الحشرات والذناير والثار العنية ويض الجوب والصنوبر. || الاثي تحب بمناوبة الذكر من ٣ الى ٤ يضاات نحو ١٥ يوما.

٢٩١٦٧ - **نقار الفيلك** هو الحون، اطلها.

٢٩١٦٨ - **نقار صغير** * ، **نقوبة السنديان**
Picus minor (S). *Pic épéchetta* (F). *Lesser spotted woodpecker* (E).

نوع من النقار. موطنه يشمل الشرق الاوسط واربوة باستثناء المناطق البالية. || جسمه يطول نحو ١٥ سم. ثوبه الى السواد الماين اللامع يطوه تجديع ابيض مقوس ومستطيل. جبهته وخراره الى البياض الاخير. قة رأسه قزمية اللون. يتوسط صدره سيالة سوداء تمتد من قاعدة المنقار الى اواسط الجوش. حلقه عينه حمراء اللون. منقاه وربطه الى السرعة الرصاصية. انشاء لا حرة في رأسها. يألف الاشرار حل اختلاف انواع اعجابها اما بفعل اشرار السنديان والزان. || قوته الحشرات واساريفها ورقاتها ويكها. انشاء تدش من ٥ الى ٧ يضاات تحبها بمناوبة الذكر ١٤ يوما.

ه يضاة لونها الى البياض الناصع تملوه رقشة جلوية .
أعرف أنواعه وأشهرها ما يلي :

نقشارة الحدائق Phyl. trochilus (S). Pouillot fits (F).
نقشارة الشمال Phyl. borealis (S). Pouillot boréal (F).
نقشارة زرقالة Phyl. sibilatrix (S). Pouillot siffleur (F).
نقشارة صناعية Phyl. rufa, Phyl. collybita (S).
Pouillot vélocé (F).

٢٩١٨٥ - نقص
Déficience (F).
Deficiency (E).
عطل بعض العناصر الغذائية أو صغر في عيها الأدق
يؤدي إلى خلل ملموس .

٢٩١٨٦ - نقص القيمة
Moins-value (F).
Decrease in value (E).
نقص القيمة أو النقص هو انخفاض قيمة الشيء بين زمني .

٢٩١٨٧ - نقطة
Point

٢٩١٨٨ - نقطة الإرتكاز
Point d'appui (F).
Support-Point (E).

٢٩١٨٩ - نقطة الإستصراة ، نقطة الجليد
Point de congélation (F). Congélation-Point (E).

٢٩١٩٠ - نقطة الإنصهار
Point de fusion (F).
Fusion-Point (E).

٢٩١٩١ - نقطة الإنطلاق
Point de départ (F).
Starting-Point (E).

٢٩١٩٢ - نقطة الإنقلاب
Point d'inflexion (F).
Inflexion-Point (E).

٢٩١٩٣ - نقطة البُخار
Point d'ébullition (F).
Boiling-Point (E).

٢٩١٩٤ - نقطة البروز
Point d'émergence (F).
Emergence-Point (E).

٢٩١٩٥ - نقطة الجذم ، نقطة التقاطع
Point de section (F). Section-Point (E).

٢٩١٩٦ - نَقَطُور
Necturus (S). Necture (F).
جنس حيوانات قازية من السرفويات وفصيلة القطرسيات .

أنواعه المعروفة قليلة العدد موطنها أمريكا الشمالية . تألف
المنافع وصفات مجاري الماء || أجسامها شبه أسطوانية
الشكل ، طولها من ٣٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها شبه
عزوية الشكل . عيونها شديدة الصغر . قوائمها قصيرة ،
رباعية الأصابع || أوتارها الى السرة المرقشة بالأسود ||
قوتها الديدان والدويبات الصغيرة .

٢٩١٩٧ - نَقَطُول
Noctule (F).
نوع من الخفافيش المفيدة يدهى عُشَّاف السَّق ، اطلبه .

٢٩١٩٨ - نَقْص ، نَقْصِيص
Eclosion (F).
Hatching (E).

هو في الطير زمن انفلاق البيض عند اكتمال الخلقة وهو
في السلك زمن إنتاج السرة اما في الحشرات فهو زمن
نقب المكن .

٢٩١٩٩ - نقل الحق
Transfert (F).
Transfer, Conveyance (E).

هو ان ينقل المرء سقاً له الى غيره . وفي القانون التجاري

المائع ومجاري الماء . مسرعه دجوي . يعيش نحو عشر
سنوات . قوته الحشرات الصغيرة والديدان والذباب || جسمه
صغير القد يطول نحو ٥ سم . عند الذكر ونحو ٦ سم .
عند الانثى . رأسه صغير الحجم : عيناه جاحظتان . حنكه
مستعرضة الشق ، سنن الفك العلوي . قاعته الامامية
قصيرات ، رباعية الاصابع الطليقة ، اما الخلفيات
فمستديتان ، خاصيتا الاصابع المقيدة بحجاب كامل .
جلده مغطى القشار يقرض عنه لحمه رغبة بيشاء نافذة
تثير العطاس والدوس . ثوبه العلوي الى السرة الخطية
السخاء المواج تملوها نمشة قائمة ومرتجة خضراء . بطنه
وسائر صفحته السفلى الى السرة الناعمة تملوها مشحة
صفراء ورقشة زرقاء خفيفة || بياتها الشتوي يستمر نحو
اربعة اشهر . يتميز ببلته الصنوية الرائحة الجوزية
الشكل والقد . نقيقه قصير التنبه ، متتابع الارتفاع ،
شديد الازعاج .

٢٩١٧٦ - نَقَّالَة
Brouette (F). Wheelbarrow (E).
عجلة يدوية بمحور دولاب واحد يستعملها الانسان لنقل
الايام الخفيفة .

٢٩١٧٧ - نَقَب
Défonçage, Défoncement (F).
Subsoil ploughing (E).
كري التربة الزراعية لقلبها وتفتيت مدرها وتنظيفها
واعدادها لزراعة القابلة .

٢٩١٧٨ - نَقَح
Silice pure (F). Pure flint (E).
أخالص من الريل .

٢٩١٧٩ - نَقْدًا ، عَدًا
Comptant (F).
Spot cash, Ready (E).
طريقة دفع ثمن مبيع عند تسلمه او اجرة عمل عند نهايته .

٢٩١٨٠ - نَقْدَة
هي النصفه ، اطلبها .

٢٩١٨١ - نَقْدَة
هي الكروية (الانثري) والكزبرة (ابن الاعرابي) .

٢٩١٨٢ - نَقْرَة مَرَّة
Taches amères (F).
Bitter pit or stippen (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المغزونة في البراد ، اسبابه المعروفة
حتى الآن تعود الى الشرط في التخذية والري والى مناخ بعض
المناطق || مظهره الخارجي يقع مستديرة منخفضة السطح
قطرها من ٣ الى ٦ سم . وضعها الداخلي يغور من ٢ الى
١٠ سم . فيصيب تغير لون اللب المظروب ويكسبه مرارة
المذاق .

٢٩١٨٣ - نَقْرِيص
Simulle (F).
هو التجرس والقرس ، اطلبها .

٢٩١٨٤ - نَقْشَاكَة
Phyllopeuste, Phylloscopus (S). Pouillot (F). Wil-
low warbler (E).

جنس طير من فصيلة الدغليات . أنواعه المعروفة عديدة ،
أصغرها لمام القديم ، منها الارباب والقواطع التي تجوب الشجر
والقرب ، بعضها صغيرة القد ، متراكبة الالوان بكث
فيها الاصفر والاشقر . قوتها الحشرات والحوام . تألف
الحادق والجئاتن القريبة من الصمران . تدن في الشجيرات
والاشجار المنخفضة . أعشاشها عزوية الشكل جانبية الداخل .
تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام . مسكنتها نحو



نقشارة



نقوس

أرجح من ٨ إلى ١٢ م. ثوبها رصاصي اللون لامع الملمح. يكثر وجودها في الصيف. تمتص مكباتها على دود القطن فيشتف من يرقات ذرية دقيقة كدمل وتقتل على جسم المائل وتعيه.

٢٩٢١٠ - **نُقْرِيَّة فَصِيَّة** *
Gonia capitata (S).
ذبابة نافثة من التقرينات طويلة أرجاس من ١١ إلى ١٣ م. رأسها فصي اللون. جسمها رصاصي اللون مملوء خلة لفضية مضطرب سم. تمتص مكباتها على البودرة المتناثرة فيشتف من يرقات نمة تقتل على جسم المائل وتعيه.

٢٩٢١١ - **نُقْرِيَّة صَبْدَلِيَّة** *
Phryxe vulgaris (S).
حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفضيلة التقرينات. جسمها بطول من ٦ إلى ٩ م. قشورها متكاثف الخمل والحلب. ثوبها إلى الطحلة الموشجة بالأبيض. رأسها كبير، اطبل اللون. غطوها مستدل الطويل. زباناها صغيران، نحيلتان. عينتاها نافشتان، أرجوانيتان. ورشها كيرتان، أصفر القاعدة. قوائمها إلى السرة السوداء. تظهر الحشرة الجملانة من نيسان إلى تشرين الثاني. وهي مبدولة في كل مكان تكثر فيه الأزهار || يرقاتها تتطفل على أساريع الحشرات من مختلف الفصائل.

٢٩٢١٢ - **نُقْرِيَّة مَدْمَلَكَة** *
Gymnosoma rotundatum (S). *Gymnosoma arrondi* (F).
حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفضيلة التقرينات. جسمها صغير القد، متكاثف الخمل، ويطول من ٤ إلى ٧ م. رأسها كبير الجرم، أصفر اللون، ملبس بالملمح. غطوها مستدل الطويل. زباناها دقيقتان، صغيران، عينتاها كيرتان، أرجوانيتان، صمدرا إلى الصفار المذهب. بطبها شبه مكدور الشكل، أصفر اللون، صماني الملمح. تملوه، في قمه، ثلاث نقط سود. ورشها موشجان بالأصفر. قوائمها إلى السرة السوداء || تظهر الحشرة الجملانة من أيار إلى آب. سرسوها البراري حيث تكثر النباتات الصيوانية الأزهار || يرقاتها تتطفل على نصفيات الاجنحة.

٢٩٢١٣ - **نُقْرِيَّات** *
Tachinidae (S).
فصيلة حشرات ذبابة نافثة من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وأنواعها كثيرة الكلد مختلفة الألوان والأحجام. تحمل على بطونها مستوى سطحها الطرية بعض الهلج الشائك القاسي. قوتها مدثر الأزهار وأزوارها || يرقاتها طفيلية تركب أكثر الحشرات انحصا مستحيات الجناح ونصفيات الاجنحة والنشائيات والحرفقيات والمعدسات. وهي لا تفرق بين الحشرة والأسروع والمخادعة.

٢٩٢١٤ - **نُقْرِيَّات** *
Bothrioccephalidae (F).
فصيلة دود من المنطقيات الرغيفات تتميز بجلقاتها المسرقة العادة الحبيرات التناسلية.

٢٩٢١٥ - **نُقْرِيَّة** * ، **قَيْشِيَّة رَشْمَاء** *
Bothrioccephalus (S). *Bothrioccephalus* (E).
جنس ديدان قدية مستطيلة من فصيلة التقرينات. أنواعها عديدة جميعها مؤذية تتطفل على الحيوانات الفقارية.

هو نقل ملكية السند الاسمي من اسم البائع الى اسم المشتري .

٢٩٢٠٠ - **نَقْلُ الْمِلْكِيَّة** *
Mutation (F). *Transfer* (E).
هو كل عمل قانوني ينقل من شخص الى آخر ديناً او حقاً صيباً.

٢٩٢٠١ - **نَقْم** *
Point de pivot
النقم هو وسط الشيء، او النقطة المحورية التي ترتكز عليها قياسات المدار.

٢٩٢٠٢ - **نُقُوس** *
Copernicia (S).
Copernicia (F). *Wax palm* (E). *Carnaubapalma* (D).
Copernicia (I).
شجرة من فصيلة النخلات، أعطانها الإقليم الحارة الرطبة. جلدتها مالمس اللحاء بطول نحو ٨ أمتار. أرواقها مامية الأركاناز مرمسية الشكل مستطيلة الزنار المدم الشوك. نصلها جامد الصلصة، مالمس البشرة، جميل الخشار الزامي. نسيجه مضروب فيه يستعمل في صناعة القناديل ثماره زيتية المادة يستخرج منها دهن النقوس السالم الاستعمال.

٢٩٢٠٣ - **نُقُوي، عَصْبِدِي** *
Huméral (F).
Humeral (E).
نمت تعري في يطلق على كل ما له صلة بالنقا.

٢٩٢٠٤ - **نُقْبِيَّة** *
Lacunelle (F). *Lacunula* (E).
٢٩٢٠٥ - **نُقِير** *
هو الانقود، أمليه.

٢٩٢٠٦ - **نُقِير** *
Auge (F). *Trough* (E).
جرن مستطيل يستعمل لإطعام الماشية او لاسقاها.

٢٩٢٠٧ - **نُقِير أَصْفَقُ الْجَنَاح** *
Phsis crassipennis (S). *Phasie crassipenne* (F).
حشرة ذبابة من ذوات الجناحين وفضيلة التقرينات. جسمها متوسط القد، متكاثف الخمل والملمح القصير، ويطول من ٨ إلى ١١ م. رأسها كبير، أطلس، أصفر اللون. غطوها مستدل الطويل. زباناها نحيلتان، صغيران، عينتاها كيرتان، أرجوانيتان. صمدرا قدي الشكل، أصفر اللون، يتفسي الحمار والقاعدة والتطبيع. بطبها انصفي الشكل. أصفر اللون، تملوه بقعة بنفسجية. ورشها كيرتان، مسامكان، أبيضان، أصفر الحمار الاسمي. قوائمها إلى الخنطي الصماني. أرباعها سود || تظهر الحشرة الجملانة من حزيران إلى أيلول. سرسوها البراري وكل مكان تكثر فيه الأزهار || يرقاتها تتطفل على مستحيات الجناح ولا تصف عنه الحاجة من نصفيات الاجنحة.

٢٩٢٠٨ - **نُقِير أَهْلَب** *
Mimtho lila (S).
ذبابة نافثة من التقرينات. طولها نحو ١٥ م. رأسها وصمدرا إلى الزرقعة اللامعة. بطبها آخر اللون مملوء حلب كتيب اسمر || يرقاتها تعيش على مكن غديات الاجنحة. ج. أنقرة.

٢٩٢٠٩ - **نُقِير رَصَاصِي** *
Eutachinus larvarum (S).
ويدعى تاكنيا كبيرة. ذبابة نافثة من التقرينات. طولها



نقير أصفر الجناح



نقير اهلب



نقير رصاصي



نقير نفسي



نقير مدلول



نقير مدملك

انها تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٧ الى ١٨ يوماً || احرف انواعه واشهرها النكات الاسود الذيل .

٢٩٢٢٥ - نَكَاتٌ أَسْوَدُ الذَّيْلِ *

Recurvirostra avocetta (S). *Récurvirostre avocette*, *Avocetta* (F). *Avocet* (E).

طائر من النكات طوله براوح من ٤٧ الى ٥٠ سم. قو به الى البيض الناصع باستثناء منقار ورأسه وظهور وذنبه وكل جناحيه وأبهرها السود || يحوي العالم القديم في طلب المصيف والمشي . يرتاد الشواطئ والأغوار والمناقع ويجاري الماء || يعيش أسراباً كبيرة براوح عددها من ٥٠ الى ٥٠٠ .

٢٩٢٢٦ - نَكَاتِيَّاتٌ

Récurvirostridae (F). *Recurvirostridae* (E).

عامة طير من فصيلة دجاجيات الارض وسيدة الجنس قليلة الانواع تتميز ببساطة ودقة منقبيها المدية للملاط المتخففة الى اللامد . اجنحتها مستطيلة ذلقة تلتف القش . ارسافها رقيقة ، مستطعة ، سرديّة البشرة . اصابعها كفية ، حشائها كامل موصلة .

٢٩٢٢٧ - نَكَاسٌ

النكاس والأنكاس نوع من السلك عظيم جداً (التاج) .

٢٩٢٢٨ - نَكَافٌ

Parotidite (F). *Parotitis* (E). النكاف ويدهى الباب اللثة هو التهاب الغدة التكتفية .

٢٩٢٢٩ - نَكْبَاءٌ

هي الريح التي تلوذ دون ان يتعين لها مهب .

٢٩٢٣٠ - نَكْبَيْبٌ جَبَّارٌ *

Nyctibius grandis (S). *Ibijau géant* (F).

طائر راس من فصيلة السديات . موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية . يألف الاجراع الكثيفة البعيدة عن كل عران . يسرح في الليل ويبعث طول النهار جاثماً على غصن شجرة لا يتحرك البتة || جسمه كبير القد يطول نحو ٥٥ سم. بسطه نحو ١٣٠ سم. ريشه شديد التنعيم متوسط اللون . قو به الى الطحلة الصفراء المراج يعلوها تجمع اسمر وتشيز اشجع ورقيقة ربداء . رأسه مستعرض الجرم . عيناه كبيرتان كمتنتان . رموش عينيه طويلة . سباله كثيف مستطيل . منقاده قليل الامتداد الخارجي . عنبه محبين البهرة ، عريض القاعدة ، عظيم الشدة . عنته بالغ القصر . جناحه رجب مستطيل . ذنبه مستدير الطرف . رشفاه قصيران . اصابعه مستطيلة قوية || طائرانه خفيف الحركة ، سريعها . سعيه على الارض احرق . قوته الحشرات من جميع الفصائل والرتب ومن جميع الاحجام . يلدن عشه في تجاريف الاشجار . الاثن توضع من بيشتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

٢٩٢٣١ - نَكْبَيْبٌ

Noctilio (S). *Noctillon* (F). جنس غفائش من عائلة الرامسات يتميز ببساطة رأسه وفروطيه . بانشرام شفته العليا المتصبة يطول جناحه . له نوعان موطنها جزر الانتيل || يعيش جماعات قليلة العدد . يسرح من الفسق الى القصر . قوته الحشرات على اختلافها والاسماك الصغيرة . يألف الماوار وأقواب الصخور البحرية .

تميش حياتها البدائية في الماء حيث تتطفل على بعض الاسماك وتنتقل منها الى معدة الانسان || احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٩٢١٦ - نُفَرِيَّةٌ عَرَبِيَّةٌ

Bothriocephalus latus (S).

اكبر انواع الديدان النفرية القدية التي تتطفل على الانسان طولها نحو ١٠ امتار . رأسها ثنائي الوافس ، عادم الكلايب ، مغروطي الشكل ، مقطوع المقدم . جسمها عديد السكم المستعرض الضيقة . يعتقد ان مفرسحاتها المهدية التي تميش في الماء وتتطفل على بعض الاسماك منها السلمون والرتوة ، تتطفل بذات الاسلوب على بعض الناس الذي يتسبحون في بعض المياه المذبة .

٢٩٢١٧ - نُفَيْشَةٌ * ، فُبَّةُ الْأَمْرَاطُورِ

Spirifer (S). *Spirifère*, *Chapeau de l'Empereur* (F). *Spirifer* (E).

جنس حيوانات من الرغويات عصفيات الارجل وضعية التفيديات . انواعها المعروفة عديدة مظهرها من متحجرات الطبقة القوية . انواعها المعاصرة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداها صغيرة القد ، شوزها قريب الشبه بالقبعة التي كان يرتديها الامبراطور نابوليون . جميعها نظائرية التركيب ، متساوية المصارع الا ان اليسارية منها أقل احداً منها في البيئية || تعيش لاصقة بالصخور المدفونة .

٢٩٢١٨ - نُفَيْصٌ

Imperfecti تمت قربي توصف به الفطور الناقصة التركيب او الشاذة الخروية من بعض مراحل التطور .

٢٩٢١٩ - نُفَيْصِيَّاتٌ ، نُفَيْصَاتٌ

Infusorios (F). *Infusoria* (E).

صنف حيوانات دنيا من الاولاي تشمل السوطيات والميديات وعدة رتب وفصائل .

٢٩٢٢٠ - نُفَيْقَةٌ

Néonate (F). *Neonate* (E). تمت ترعفي يطلق على الحشرة المسجدة الثق .

٢٩٢٢١ - نُفَيْقٌ

Cassement (F). صوت الصفدع . نق الصفدع : صات .

٢٩٢٢٢ - نُفَيْمٌ

Ligne médiane de la route (F). خط وسط الطريق .

٢٩٢٢٣ - نُفَيْكَةٌ

Paraphysa (F). اخلية المستطيلة في نكة الفطور الزقية والدعامية .

٢٩٢٢٤ - نَكَاتٌ

Recurvirostra (S). *Récurvirostre* (F).

جنس طير من النكاتيات . انواعه اربعة جميعها كبيرة القد طولها براوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. منقبيها مستطيلة ، متخلفة الى اللامد ، قش السيف . ألوانها بلفاء اللون يكثر فيها الابيض || تجوب السلاسل الاسوية والاروية والافريقية . يرتاد غشاق الانهار وشواطئ البحار والمناقع والاعوار . قشها القشريات والرغويات والديدان والدعاميس والحشرات . تنكت الحما والخز والربان في طلبها || تدم اعشائها في التراب اماحجها مستطيلة الشكل قليلة السمق .



نفرية



نفيسة



نكات اسود الذيل



نكب جبار

٢٩٢٣٢ - نَكْدَة حشب المرضى أو البرية .

٢٩٢٣٣ - نَكْرُوبَة *
Necrobia (S).
Nécrobie (F). Necrobis (E).

جنس حشرات خنفسية من فصيلة الزرنيخيات. ورتبة
مخديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد || اجسامها
مضفرة اللد. اطولها تراوح من ٤ الى ٧ سم. اذواها وحيدة
اللون او ثنائية. الريحدة اللون زرقاء. اما الثنائية فزرقاء
وجراء || مسرجها جدوي. تعيش على المواد العضوية
والجلود الجافة والفراء.

٢٩٢٣٤ - نَكْرُور الشَّط

حشرة تسمى ذقة الشواطىء *، اطلها .

٢٩٢٣٥ - نَكش، نِكاش
Plochage (F).
Digging (E).
اصلاح التربة الزراعية واقتلاع الدغل منها او اصلاح التربة
المخرصة وتفتيت مدمرها وتنظيفها من الاشباب .

٢٩٢٣٦ - نَكَمَة
Hyménium, Chapeau (F).
Hymenium, Pileus (E).
هي غلفة الفطر اي قبعته التي تحوي جهاز الانصباب
والنكاش .

٢٩٢٣٧ - نَكَمِي
Hyménial (F).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة خاصة بالنكمة .

٢٩٢٣٨ - نَكَمَة
Parotide (F). Parotid gland (E).
هي الغدة النكفية اي بنت الاذن .

٢٩٢٣٩ - نَكُون *
Nucéon (F). Nucleon (E).
التكون هامة تولى نواة اللديرة (يوجد نكتونات ايجابية
تدعى بروتون ونكتونات حيدة تدعى نوترون).

٢٩٢٤٠ - نَكُونِي *
Nucéonique (F).
Nucleonic (E).
نمت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالنككون .

٢٩٢٤١ - نَكَمِي *
Nécomien (F).
ساف حصيلي يعتبر قاعدة سافات الطبقة الطبائية السفلى.

٢٩٢٤٢ - نَكِب
التكيب : دائرة الحافر والحف .

٢٩٢٤٣ - نَلَك
Aubépine azérolier (F).
هو الزعرور البادي ، اطله . الواحدة نلكة .

٢٩٢٤٤ - نَلْمِبُ
Nelumbo (S).
Nélombo (F). Nelumbo (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية مائية من فصيلة النيلوفرديات.
انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها مياه البلاد الحارة.
جذاميرها ممددة. اوراقها مستطيلة الاضلاع مستديرة التصل.
ازهارها كبيرة اللد. ثمارها كروية الشكل مغموسة في طست
مستعرض الاطار . بزورها نشوية المادة للمأكولة || اشهر
انواعها ما يتبع .

٢٩٢٤٥ - نَلْمِبُ اصْفَر * ، نُوْطُ اصْفَر
Nelumbo lutea (S). Nélombo jaune (F). Yellow
nelumbo (E).
نوع من النلمبو البروتي . مهد البلاد الامريكية .

اوراقه كبيرة فارشة قطر تصلها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم.
ازهارها صفراء اللون قطرها يراوح من ١٠ الى ٢٥ سم.
ممايقها تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. || جذاميره
نشوية للمادة ، سكرية الطعم ، مأكولة . تنوره يشتر
من حموز الى آب .

٢٩٢٤٦ - نَلْمِبُ الشَّرْق * ، نَلْمِبُ قُبْطِي *
نَلْمِبُ قُبْطِي * ، جَمَسَة
Nelumbo nucifera, Nelumbium speciosum (S). Né-
lombo d'Orient, Fève d'Egypte, Lis rose des Egypt-
iens, Rose du Nil (F). Nelumbo, Egyptian bean (E).
Nelumbo, Nussmummel (D). Nelumbo (I).

نوع من النلمبو البروتي الميزل . مهد مياه الهند وافريقية
الشرقية . يكثر في مياه النيل. اوراقه كبيرة اللد مستديرة
التصل قطرها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اعطائها
شالكة . ازهاره وردية اللون او عاجية ، مستديرة العرف
الفتح . كبيرة اللد ، قطرها يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم.
ممايقها تطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. || ثماره نشوية
المادة ، مأكولة . تنوره يشتر طوال فصل الصيف .

٢٩٢٤٧ - نَم *
Philoptère (F).
هو القردوس جنس حشرات جلدية ذرية القد من التمنيات.
انواع عديدة منها نَم البط والجوام والمهام والزنج والنسور .

٢٩٢٤٨ - نَمَكة
Trichodactes (F).
هي النمة ، من الحشرات الجلدية التي ترتب الحشرات
الناجعة .

٢٩٢٤٩ - نَمَكة *
Platystoma (S).
Platystome (F). Platystoma (E).

جنس حشرات من فصيلة الناميات ورتبة ذوات الاجنحين .
انواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اقطار العالم
اغصها البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول
من ٥ الى ٨ سم. رؤوسها مستديرة . عينها كبيرة ،
فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية
الفصل ، تنتهي بنسيلة دقيقة . اعطائها معتدلة الطول .
ملاسها صغيرة . كواسلها شبه بيضيه الشكل . بطونها
يرمية تنتهي بمزقات ذرية . رؤوسها مبيجة . قوائمها
نشوية بطولها في اقتناذها حلب دقيق || جميعها واضحة .
تألف الحراج والقنايات وكل مكان تكثر فيه الاضرار .
يقاها عازلة او دامة .

٢٩٢٥٠ - نَمَاسِيَات *
Platystomidae (S).
Platystomidae (F). Platystomidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الاجنحين . اجسامها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم ||
اجسامها متفارقة اللد ، تطول من ٤ الى ١٢ سم. رؤوسها
مستديرة . عينها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها
الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . كواسلها شبه
بيضية الشكل . بطونها يرمية . رؤوسها مبيجة . قوائمها
قياسية || الحشرة الجلجلة واضحة اما البقرة فعاضة وبضها
دامن وبها التي تعيش على الجبل وفي قووس الزنايق ||
اشهر اجناسها النامسة .

٢٩٢٥١ - نَمَاشَة
Odontoglossum (S).
Odontoglossée (F). Odontoglossum (E).

جنس نباتات اممية برية وتربيتية من فصيلة السحليات .
انواعها المعروفة تقارب السنين جميعها من نبات جبال



نكروبة



نلمبو اصفر



نلمبو اشرق



نماشة كبيرة الزهر



نمت النعم



نمة البقر



نمة الخيل



نمة الضأن



نمة النمر



نمة الكلب

امريكة الاستوائية . بعضها جميل الزهور كبيرها شائع
الزراعة التريبتية المركبة في المصاري والمنازل || اوراقها
قرصية الانتصاب ، مستطيلة ، قليلة المدد . ازهارها
عقدية التجميع ، تتركز على شرايخ ليفية مصمتة ||
اعرف انواعها واشهرها ما يلي :

٢٩٢٥٢ - نماشة كبيرة الزهر *

Odontoglossum grande (S).
Odontoglossum à grandes fleurs (F).
نوع من النفاشة . اوراقها سنائية النصل ، مستطيلة ،
قليلة المدد ، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . شراخها يحمل
من ٤ الى ٩ ازهار ، قطر الزهرة يراوح من ١٠ الى
١٨ سم . لونها الى الصفرة البرتقالية يعلوها تمشيش جزوي .
شيفات الازهار تبتية اللون صفر الحراج || تنويرها
يستمر طوال فصلي الخريف والشتاء .

٢٩٢٥٣ - نماشة مختنجة

Odontoglossum crispum (S).
Odontoglossum crispé (F).
نوع من النفاشة . اوراقها مصفية الشكل تطول نحو ٤٠ سم .
شراخها يحمل من ١٥ الى ٢٥ زهرة . قطر الزهرة يراوح
من ٨ الى ١٢ سم . بتلاتها وفصلها متجاوئة النصل لونها
الى البياض العاجي تملو نمشة كستنية سفراء لانهائية
الترتيب . شيفات الازهار صفراء اللون ، احليجية
الشكل ، مدنية الاطراف || تنويرها يستمر من اوائل
شباط الى اواخر نيسان .

Fil fin (F). *Fine thread* (E).
نميش الابرة من اي مادة كان .

Vertex
٢٩٢٥٥ - نماشة
التأفة : اعل الرأس وتعرف بالنافوخ .

Myrmecophile (F).
نمت تعريفي يطلق على النبات الذي يأوي النمل ويعوله .

Thym ghebre (F). *نمَامُ الملك*
هو النمير الامير ، اعطيه .

Pigamon (F).
٢٩٢٥٨ - نماشة
هي التليب ، اعطيه .

Anabolisme (F). *Anabolism* (E).
٢٩٢٥٩ - نماشية
علم يبحث في دور شيوخ الكائنات الحية .

Hippocrepis (S). *Hippocrépide* (F).
٢٩٢٦٠ - نمشة
جلس نباتات برية من فصيلة التريبتات الفرائسية . انواعه
المعروفة ١٢ منها الجنبات والجنبات والاعشاب . اوراقها
مركبة مشطية مستطيلة الاضلاع . ازهارها صفراء اللون ،
سيوانية التجميع طويلة المالحق . ثمارها قرين ملفطة
ورقية غمره الاطراف || اشهر انواعه واكثرها انتشاراً
نمت النعم .

٢٩٢٦١ - نمشة النعم *

Hippocrepis cornosa (S). *Hippocrépide à toupet*,
Hippocrépe à toupet, *Fer à cheval* (F). *Tufted horse-*
shoe vetch (E). *Schopfußeisenklee* (D). *Ferro di*
cavallo, *Mandorlo dei boschi* (I).
نوع من النمات الطيخي البري المرصوف . تتغلف النعم بشهوة

ويحمي عليه درعا . عشته مصرة فراء . اوراقه مركبة
وريشية وترية التجميع . وريقاته يضيبة النصل ، داكنة
الخضار . ازهاره طرفي ، سيوانية ، دهاهي التركيب او
خاصية . ثمار قرين ملفطة ، مقبضة ، غمره الخار .
اوراقه وازهاره وبلوره طيبة ، مرة المذاق ، قابضة ، تفيد
المعدة وتقويها ، تمل الجراح وتقوي اثرها .

Trichodes scalaris (S).
٢٩٢٦٢ - نمشة البقر
Trichodecte du boeuf, *Petit pou du boeuf* (F).

حشرة من النيمات . تركيب الانقسام وتعيش على فوف
واوساخ جلودها . طولها يراوح من ١ الى ٢ سم . لونها الى
الصفرة راسها وسدرها متساويا الغرض . نمش في وسط
كل سكة من سكة بطنها نقطة صفراء بيضاء . تكثر في الظل
والالامل والفضاء . نمش بتقيضا يقود الى الحكاك .

٢٩٢٦٣ - نمشة الخيل

Trichodectes varius (S). *Trichodecte du cheval*,
Petit pou du cheval (F).

حشرة من النيمات تركيب الخيل وسائر الدواب . طولها
نحو ٢ سم . فوفها الى الصفرة راسها قصير مستعرض . نمش
في اواسط السج سكة الاول من بطنها يتبعج متعرض اسف .
تمش على فوف الاكشاف والمعاير فتضيق الدواب وتصلها
على الحكاك .

٢٩٢٦٤ - نمشة الضأن *

Trichodectes spherocephalus (S). *Trichodecte du*
mouton, *Pou du mouton* (F).

حشرة من النيمات تركيب الانعام فتؤذيها . طولها نحو
١ سم . وخمسة خطوط . لونها الى البياض الاعبر يعلو موج
اسف . تعيش على فوف الجلد وتقترن الصوف وتقلق راحة
النعم وتزعجها .

٢٩٢٦٥ - نمشة العنز *

Trichodectes climax (S). *Trichodecte de la chèvre*,
Pou de la chèvre (F).

حشرة من النيمات تركيب الماعز . طولها نحو ١ سم واربعة
خطوط . لونها الى الصفراء الخشنط يعلو بتابع اسف .
تمش على فوف الجلد وتقترن الشعر فتؤذي وتنبس سكاكا
مزعجا يبيح الجلد وقد يدميه .

٢٩٢٦٦ - نمشة الكلب *

Trichodectes latus, *T. canis* (S). *Trichodecte du*
chien, *Gros pou du chien* (F).

حشرة من النيمات تركيب الكلاب الفتية والهرمة . طولها
يراوح من ١ الى ٢ سم . لونها الى الصفراء الفاتح الباهت
يعلو توشيح اسف . تعيش على الفوف وتقترن الور . وتنبس
الحكاك الدامي .

Felis pardus (S).
٢٩٢٦٧ - نمير ، نمير

Panthère, *Léopard* (F). *Panther*, *Leopard* (E).

حيوان مفترس من فصيلة السنوريات ورتبة الثورام .
يقال انه وسيد النوع حديد الضروب فوارق ضروره
تقوم على قدر الجسم ولون الثوب ورطنته || جسمه منسحب
الانطباع ، اهيف القد ، مستدير الرأس ، جميل الشكل ،
مرقط الثوب ، مالح اللمعة . يطول من ١٥٠ الى ٢٤٥ سم .
يما في ذلك اللب الذي يراوح طوله من ٩٥ الى ٩٠ سم .
مزاجه كراجل الأسد الا انه اقهر واغضب واعنف ، لا ترويه
سلطو اسد . رغب ضمت مزه وشديد حرمه || كنيته
ايو الاربد وايو الاسيد وايو جددة وايو جهل وايو خطاف



نمر أسود



نمر الأطلس



نمر الحيشة



نمر الشرق



نمر الهند



نمر ملطخ



نمرود صومرا

٢٩٢٧٨ - **نَمِرُود** Cirro-cumulus
هي انقشاص ، نوع من النسيم العالية .

٢٩٢٧٩ - **نَمِرُود** Némorrhœus (S).
Némorrhœus (F). Némorrhœus (E).

جنس حيوانات لبونة عاشية مجترية من فصيلة الإيليات .
أنواعه المروفة ستة موطنها يمتد من الهند إلى الصين وصومرا
واليابان . تألفت غابات المصايف والجبال ، ملجأها الجباني
جامعي . جاعاتها إجمال قليلة البدن || أجسامها متوسطة
القد . قرونها صغيرة ، غروطة الشكل ، متناوبة الحدب
منقطعة إلى الزوائد . ضرور أنثاها ثنائية الاختلاف .
يحمل الأنثى يولم نحو ستة أشهر تضع في تمامه بفوراً
واحداً || أشهر أنزاعه التالية :

٢٩٢٨٠ - **نَمِرُودُ حَمَلِيَّات** Némorrhœus bubalinus (S).
Némorrhœus bubalin, Chamois de l'Himalaya (F).

نوع من النمرود . موطنه يمتد من كشمير إلى حلايا
وشنجان . يسرح من ارتفاع ١٨٠٠ إلى ٣٦٠٠ م . عن
سطح البحر || جسمه ردية يطول نحو ١٦٠ سم . بما فيه
الذنب الذي يبلغ نحو ١٠ سم . ارتفاعه ٩٣ سم . وزنه
نحو ١٠٠ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٣ سم . عند الذكر
وغو ١٧ سم . عند الأنثى . رأسه مستدل الجرم . عيانه
أذناه كبيرتان . قوائمه شديدة اللشظ ، ثوبه إلى الكهبة
السراء رأسه وشيخ ظهره إلى السمره السابقة . عنقه وصدره
إلى الشققة . ذنقه ويطع إلى الأبيض الآخر || أجله
يد سبعه انفار ، ذكر مانع وثلاث وثلاثه شوائد .

٢٩٢٨١ - **نَمِرُودُ صُومَرَا** Némorrhœus sumatrensis (S).
Némorrhœus de Sumatra (F).

نوع من النمرود . موطنه يمتد من شرقي حلايا إلى بيرمانيه
والسيام وصومرا . يسرح من ارتفاع ١٣٠٠ إلى ٣٠٠٠ م .
عن سطح البحر || جسمه يطول نحو ١٥٠ سم . بما فيه
الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه ٨٥ سم . وزنه نحو
٨٥ كيلو . قرنه يطول نحو ٢٠ سم . عند الذكر ونحو
١٥ سم . عند الأنثى . رأسه مستدل الجرم . عيانه كبيرتان
مكحللتان . أذناه مستطيلتان . ثوبه إلى الشققة السراء
يقب في الرأس والظهر ويغير في البطن || أجله يمد
سبعة انفار .

٢٩٢٨٢ - **نَمِس** Rancissement (F). Rancidity (E).
نساف في المواد اللعنية يمي إلى ملاقتها ورائحتها .

٢٩٢٨٣ - **نَمِس** Herpestes (S).
Mongoose (F). Mongoose (E).

جنس حيوانات لبونة لامة من فصيلة الزباديات . أنواعه
المروفة ٢٠ جميعها مستطيلة الجسم والذنب ، قصيرة
الآذان ، حادة الأطراف . رؤوسها صغيرة مخروطية الشكل .
أذناها صغيرة مستديرة . عيونها حمراء . اقربها إلى الكدرة .
موطنها يشمل العالم القديم . تألفت المناطق الحارة . تعيش
قرب مجاري الماء في المقاصب والآبار والنايات . قوتها
الإقاضي والجفذان والمظاء وكل ما استطاعت إليه سبيلا من
الحيون والطيور . تدجن بسهولة تربى لقتلها في أفار
والجفذان والحيات || أنثاها تضع من جرورين إلى
أربعة جراء . جاعيرها أذناك منخفضة ، ضيقة ، مستطيلة ،
قروية النعالين || اعرف أنواعه وأشهرها ما يلي .

وأبو الصبب وأبو قنار وأبو سهل وأبو عمرو وأبو المرحال .
والأنثى نمره وألجم آثار ونغور ونغار || موطنه تسبح
الإرجاء يشمل منقط البلاد الآسيوية والأفريقية || يعيش
منفرداً إلا في زين النجوم وقد يستمر على اللغة الأثلى
ما بعد وضعها بثلاثة أسابيع . يقال أن يحمل الأنثى لا يفوق
٩٠ يوماً تضع عند تمامه ثلاثة جراء أو أربعة تبصر به
ويعمر بأسبوعين وتعيش برقة أمها نحو ٦ أشهر .
اعرف غروبها وأشهرها ما يتبع .

٢٩٢٦٨ - **نَمِرُ أَيْبَس** Irbis (F).
هو البر بيس ، أطبله .

٢٩٢٦٩ - **نَمِرُ أَسُود** Felis pardus melas (S).
Panthera noire (F). Black leopard (E).

ضرب من النمر ، متوسط الجثة أسود اللون كشي القرقة
الكاملة . يكثر في جنوب الهند وفي جزر الزانج .

٢٩٢٧٠ - **نَمِرُ الإِجَاصِ** Tigre du poirier (F).
حشرة مؤذية تدعى ببر الإجاص ، أطبله .

٢٩٢٧١ - **نَمِرُ الْأَطْلَسِ** Felis panthera (S).
Panthera de l'Algérie, Grande panthere (F).

ضرب من النمر ، يقال أنه أكبر النمرود شقة ، صنير
الرقطة ، كمال الحفلة التي تسع مع إصباحها من ثيج النهر
واقترابها من البطن . موطنه يشمل كامل إفريقيا الشمالية
أخصها جبال الأطلس .

٢٩٢٧٢ - **نَمِرُ الْحَيْشَةِ** Felis pardus nimr (S).
Panthera de l'Afrique (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة أسود الرقطة أنمر الحفلة
الثاقفة . موطنه الحيشة والصومرا .

٢٩٢٧٣ - **نَمِرُ الشَّرْقِ** Felis pardus orientalis (S).
Panthera de l'Amour (F).

ضرب من النمر ، كبير الجثة يؤوي الرقطة الصنائية المختار .
موطنه حوض نهر الأمور وجباله .

٢٩٢٧٤ - **نَمِرُ الصَّيْنِ** Felis pardus chinensis (S).
Panthera de la Chine (F).

ضرب من النمر . متوسط الجثة أسود الرقطة الكبيرة
والمتقلعة . موطنه الصين والمندلن .

٢٩٢٧٥ - **نَمِرُ الْهِنْدِ** Felis pardus antiquorum (S).
Panthera de l'Inde (F). Leopard (E).

ضرب من النمر ، كبير الجثة أنمر الرقطة الصغيرة اللقائية
الشكل . موطن الهند .

٢٩٢٧٦ - **نَمِرُ سُورِيَّ** ، **نَمِرُ الْفُرْسِ** ، **بَمَلْتَك** ،
قَبْتَان Felis pardus taillans (S).

ضرب من النمر متوسط الجثة ، أسود الرقطة ، أصعب الحار ،
متشقق الحلقاء المفتوحة . موطنه يشمل الفرس وسوريا
وتركيا .

٢٩٢٧٧ - **نَمِرُ مَلَطُخ** Felis nebulosa (S).
Panthera longibande, Diardi (F). Clouded leopard (E).

ضرب من النمر ، يتميز باستطالة رقطة وسلطاته اللقائية
الحجم . موطنه جبال الهند وريمانيا وقلعه وجزر الزانج .

٢٩٢٩١ - نمّشة الزيتون * Aonideella maleti (S). Cochenille vermillon de l'olivier (F).

حشرة دسبوسية من القرمزيات تمرّي الزيتون في أوراله قسوة إلى حله. موطنها بلاد المغرب. يكثر وجودها في مراکش والجزائر || جلبها الرسي عند الاثنى مستدير الشكل، قرمزي اللون، نولي السرة المركزية النتم، ظهره يراوح من ٢ م. إلى ٢ م. وثلاثة خطوط. وهو عند الذكر يضيء الشكل، قطبي السرة، قرمزي اللون، يطول نحو ١ م. وأربعة خطوط || لها جيلان في الحول. أنثاها تضع من ٤٠ إلى ٦٠ مكنة بطوف ثلاثة أسابيع. أضراسها لاقسية لأنها منطبة بكثرة وجودها عند الأوراق. وهي تركب النصل حل صفحتيه تنصص عصارة الخلايا وتسبب بالنتيجة نيباس الأوراق || تكافح باستعمال أسد الحواشير الفعالة مزوجاً بالزيت المعدني الأبيض أو بالزيت النباتي.

٢٩٢٩٢ - نمّشة الليمون الحامض * Chrysomphalus dictyospermi (S). Pou rouge des oranges (F).

حشرة ناعمة من القرمزيات، تركب الكثير من النباتات الشجرة والأشجارية أنصها الحفشيات || يقال أن موطنها الأصلي كان الشرق الأقصى وقد انتشرت في معظم أقطار العالم وأصبحت من آفات حوض البحر المتوسط وبلاد القرم بهد الصين واليابان وزيلندا الجديدة وأستراليا والانتيل وجاباكا والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة ... جلبها الرسي يضيء الشكل ثلاثي التخذيد نولي الأطراف القطبي الاصل لونه إلى الحمرة المفرأ القاعة يحيطها اطار اطمل. الاثنى يطول نحو ٢ م. والذكر ١ م. وثلاثة خطوط. والحشرة عند تجميدها عن رسيها ذكرًا كانت أو أنثى تلبو ريمية الشكل صفراء اللون خضراء الموانج الاعم || أجسامها الحولية يراوح من ٢ إلى ٤ م. وهي تتحمل الحرارة القصوى المطلقة حتى ٤٥ م.غ. والحرارة الدنيا المطلقة حتى ١٠ درجات تحت الصفر || أضراسها في الحفشيات شديدة الاثنى لها تركب الأوراق والافانث الغنية فتتوصف العصارة وتسبب الذبول وتركب الثآثر فتتبع نموها وقد تنفص وتسبب بجفاف الالباب وتقسيم الحصوص || تكافح باستعمال التبخير السيانيدريكي ومنهم من استعمل الزيت البيضاء عن أسد الحواشير الفعالة غير أن نتائج التبضخ لا توازي التبخير || وهناك عدة حشرات عائلة تقضي على هذه النمّشة أنصها من الصفرجات أي بنات النقا ومن الدسبقيات أي بنات العيد.

٢٩٢٩٣ - نمّشة فلوريدا Chrysomphalus aonidum, C. ficus, Aspidiotus ficus (S). Pou de Floride (F). Black scale (E).

حشرة ناعمة من القرمزيات تركب الكثير من النباتات أنصها الحفشيات والنخل والاهوكاتيه والذفأ والخروع والذغل واللباب والمضاض || يقال أن موطنها الأصلي كان فلوريدا وقد انتشرت في معظم مناطق القرم من اليابان إلى الصين وفروموزا والمند وبرندوب والانتيل وكوبا والمكسيك والبرازيل وبلاد أفريقيا. وهي شديدة الاثنى في مراکش والجزائر وتونس وليبيا ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا || جلبها الرسي وهو عند الاناث مستدير الشكل ظهره يراوح من ٢ إلى ٢ م. لونه إلى السرة الصفحية الموانج تنصص سرة مركزية جزوية اللون ثلاثية الخطوط الدائرية. وهو عند الذكور يضيء الشكل يطول من ١ م. وسطين إلى ١ م. وأربعة خطوط. والحشرة عند

٢٩٢٩٤ - نمّشة أشعل * Herpestes albicaudus (S). Mangousté à queue blanche (F).

نوع من النمس كبير القد طوله نحو ٥٠ سم. وذنبه ٤٥ سم وهو أبيض قاعة من المصري وأهل منه. ثوبه إلى الغيرة يطولها نأذير حطلي. ذنبه أبيض اللون الأشمل، جلث الور. موله الحبشة والتالال وغينيا والسنگال.

٢٩٢٩٥ - نمّشة بني * Herpestes fuscus (S). Mangousté brune (F). Brown mongoose (E).

نوع من النمس متوسط القد والارتفاع طوله نحو ٤٢ سم. وذنبه ٤٥ سم. ثوبه إلى البني يطولها تجلج متعش أسمر. رأسه حالك السرة. قوامه سيد.

٢٩٢٩٦ - نمّشة فارسي * Herpestes persicus (S). Mangousté à points dorés, M. de Perse (F). Persian mongoose (E).

نوع من النمس صغير القد جيل الثوب المرط بالايض والأصفر الندي. موطنه العراق وبلاد فارس وبيرواها يكثر وجوده في أحواش النخل وقرب ضفاف الأنهر.

٢٩٢٩٧ - نمّشة مصري * Herpestes ichneumon (S). Mangousté ichneumon, ichneumon, Rat des Pharaons (F). Egyptian mongoose, ichneumon (E).

نوع من النمس موطنه حوض البحر المتوسط. يكثر في البلاد المصرية حيث كانوا يحولونه في زمن الفرادة. جسمه مستطيل الشكل، قصير القوائم، طوله نحو ٥٥ سم. وذنبه ٤٠ سم. ثوبه إلى الصفار الأشهب يطولها توشم اطمل. رأسه وظهره أمين لونا من سائر جسمه. قوامه سيد.

٢٩٢٩٨ - نمّشة هندي * Herpestes griseus, H. mongo (S). Mangousté mungo (F). Indian mongooses (E).

نوع من النمس متوسط القد والطر طوله نحو ٤٠ سم. وذنبه ٣٥ سم. ثوبه إلى الصفار الخطي الموانج يطولها توشم اطمل ونمّشة بيضاء. رأسه عاقب اللون. قوامه إلى السرة. موطنه الهند والافغان.

٢٩٢٩٩ - نمّشات * Ichneumonidae (F). Ichneumonidae (E).

فصيلة حشرات من عشائيات الاجنحة المضمرة. اجناسها وانواعها زهاء ٣٠٠٠٠ جميعها مستقلة الاجسام. اطولها يراوح من ٥ إلى ٢٠ م. ألوانها عابكة يكثر فيها الاسود وبعضها عرز البيلن بالأصود والأصفر || رقاتها طفيلية تتوشم بأكثر يها على حوائليها من حششيات الاجنحة والندبات.

٢٩٢٩٠ - نمّشة * Ichneumon (S). Mouche vibrante (F).

جلث حشرات صغيرة من النمّشات أنوعها المعروفة زهاء ٥٠٠ جميعها مستقلة الاجسام المستطيلة. أطولها يراوح من ١٥ إلى ١٦ م. ألوانها مختلفة الانوان يكثر فيها التحيز بالأصفر والأبيض. وأضراسها ثنائية الزوج شغافا تملأ شحمة خفيفة من الالوان الزاهية || رقاتها تنطقل حل الكثير من الحشرات أنصها النامية إلى حششيات الاجنحة ومنها الملوطف والكزنييه والانتونوم والأصل. الخ ...



نمس اشعل



نمس فارسي



نمس مصري



نمس هندي



نمّشة



نمّشة الزيتون

٢٩٢٩٩ - **نَمَص** ، **نَمَص** (F). *Jonc des nattiers* (F).
هو الأسل العربي أين المود تصنع من الخياطين والغلف .

٢٩٣٠٠ - **نَمَصَة** (F). *Apex, Sommet* (F).

Apex, Summit (E).

النشبة هي ذروة كل عضو من الأعضاء إن في الحيوان أو في النبات . وللذروة من كل شيء أعلاه .

٢٩٣٠١ - **نِمْفُولَةُ الْبَشِينِ ***

Nymphula nymphæsta (S).

Nymphule du nénuphar, Teigne du nénuphar (F).

Nymphula nymphæsta (E).

حشرة من فصيلة الناريات حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد احرارة والمعتدلة الحرارة . فراشها واحة قوتها رحيق الازهار وطلحها . رسلها غاضلة تمش على اوراق البشينة وعرائس الماء وكلوات الماء || جسمها يطول نحو ١٢ مم . بسطها تراوح من ٢٦ الى ٣٠ مم . رأسها مستدل الجرم ، قصير الخطم . عينها صغيرتان . زباناها غيطيان . ملاسها قصيرة . رشفها مستدل الطويل . جوشها وبطنها الى الشبهة || رواشها الى الكلبة العاجية الموجاج يعلمها في الزوج الامامي زراكل بنية وصنانية ويعلمها في الزوج الخلفي تجلجع مغرغص ويتقيج بني صناني . احداها قضبة || لها جيل واحد في الجيل . قتلها القرائنة

في ايار وتبقى حتى آب . تسرح في النهار . تماطل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام وتتبع المكن حياضها على الصفحات السفلى من نصال الازهار || الخلود البرقي يستمر نحو ٢٨ اسبوعا والسرعة عند ولوها الكمال الجسدي تطول نحو ١٥ مم . جسمها شبه اسطوانتي الشكل ، واضح التقسيم السحكي ، مستعدل المقدم والمؤخر ، اسمر اللون ، تنبي الموجاج ، تملو حمة خطوط خافتة من الملب القصير . رأسها اسود اللون . مدها ورواجها الى الطحلة || طول الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتفقي ضمن صلبة تسجها اللفة تحت الجفلة او بين شقوق لاه الانجار . تكافح مكافسة النشبة الحمراء .

٢٩٣٠٢ - **نَمَل** (F). *Fourmis* (F). *Ants* (E).

جنس حشرات من فصيلة النمليات . انواعها عديدة منتشرة في اكثر اصقاع العالم . معظمها صغير القدد . تألف الحياة الاجتماعية ، مجوسها تلحق جالية ودية تقم في قرية او قرية مؤلفة من عدة سرابح وانفاق ودعايز وسرير ورياء . والنمل كالتنمل يقسم الى ثلاثة اقسام ، الذكور والاناث والخنات . الذكور لاهل لما سوى كرم الاناث وهي تأكل ما تجميعه العاملات . والاناث بعد كويها ورجوعها الى القرية تستقبلها العاملات بالترحاب فتخلصها من اجنحتها ثم تلتقيها وتقودها الى الخاضع تحت المائت . اما العاملات اي الخنات فهي التي تقوم بجميع الاعمال . تشيد القرية وهي الطعام وربي الدبا والكلر وتشر على سلامة القرية تقودها فزيرة ابقاء والحياة الاجتماعية المنتظمة في سبل مصلحة عامة لا تنصرف الى غيرها || ذكورها واناثها مجنسة بامرة . عاملاتها عادمة الجناح والسر تنصرف على نظراتها وصل الاشياء بواسطة قوتها الاستشعارية المرفوعة الاساس . رؤوسها مسلحة بفكين حادين قاضمين . قوائمها دقيقة رشيقة مستطيلة تمكها من السير السريع . اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٢٩٣٠٣ - **نَمَل أَحْمَر** ، **سَمَسَة** ، **جَمَنِي**

Myrmica rubra (S). *Fourmi rouge* (F). *Red ant* (E).

يجريدها من ترسها ذكراً كانت او انثى تبدو صفراء اللون زاجية المالح . اما ذكورها المجنسة فبرتقالية اللون ، ثنائية الجناح الابيض || اجيالها الحولية تراوح من ٤ الى ٥ اناثها تبض نحو ٥٠ مكنة متسما يستمر نحو اسبوع . اضارها في الحشويات شديدة الوقع والاذى لانهما تركب الازراق فتتمصص مصارة خلاياها وتسبب اصفرارها وذوبان وتركب الثار فضتها من النمو وقد تسبب جفاف اللحاء وتسمم خصوصها || تكافح بشق الحلوشر للذابة المعزوجة بالزيت البياض وله يحسن امتصاص التبخير السيانيدريكي لانه افضل من النشع اذ يدخل في جميع غباها الانجار .

٢٩٢٩٩ - **نَمَشَة نَارِيَّة** ، **نَمَشَة نَضْوِيَّة**

Chrysomphalus aurantii, Aspidiotus aurantii, Aonidiella aurantii, A. taxus (S). *Pou fer à cheval* (F). *Citrus yellow scale* (E).

حشرة ناعمة عارفة من القرمزيات تركب الكثير من النباتات اغصها الحشويات وقد تغفل الليمون الحامض على البرتقال وتركب السلق والخروب والياسمين والبرت والموذ والرزين والسنبل والورد والصفصاف والال والخرع . موطنها قسح الاربعاء يشمل جميع اقالم الليمون الاسيوية والافريقية والامريكية والاروبية || جلبها البرسي عند الاثى مستدر الشكل قليل الاحتدباب مركزي السرة لونه الى السمرة النارية البياض يحرقها اطار سبق اختار اكبه اللون قطر يراوح من ٢ مم . وعطير . وهو عند الذكر يضي الشكل يطول نحو ٢ مم . وثلاثة خطوط . والحشرة عند تجريدها من ترسها ذكراً كانت او انثى تبدو نضوية الشكل حنطية اللون || اجيالها الحولية تراوح من ٢ الى ٥ . اناثها تبض نحو ٥٠ مكنة متسما بمدة تراوح من شهر الى شهرين || اضارها شديدة الاذى لانهما تركب كامل اغصاء النبات الحوامية اغصها الاثان التي تجميعها الازوار التي تذهبها والثار التي تمطها وتصلب لبها . تكافح مكافسة النشبة الحمراء .

٢٩٢٩٥ - **نَمَشِيَّة** *

Sporotrichum (S).

جنس فطور مجهرية من الطليسات وفضيلة الزولحيات . انواعها قليلة العدد والاذى . هيئه ممدد زسغ على سطح العائل . جرابه الكتيدي بسيط التركيب قصير القدد . كنانده بيضيه الشكل ترتكز على اطراف الشغيرات وهي شفاقة او ملونة ونها القرية للتجميع والقضية || اعرف انواعها الثلاثة التالية :

٢٩٢٩٦ - **نَمَشِيَّة الْفُتَّاح**

Sporotrichum malorum (S).

فطر مجهرى يركب الثار اخضرة الملوثة او الحمراء ، فيغن البشرة دون ان يتسدى حدود اللب .

٢٩٢٩٧ - **نَمَشِيَّة الْحُمُفِيَّات ***

Sporotrichum citri (S).

فطر مجهرى عادم الاذى يركب اوراق الحشويات على اختلاف اجنسها وازواها فيزها يقع خلية صغيرة لا قياسية الشكل لونها كالرصاص .

٢٩٢٩٨ - **نَمَشِيَّة الصُّوْقَان**

Sporotrichum mycophilum (S).

فطر مجهرى يركب الصوقان فيمسقه بوشاح من الخمل اللبد البرتقالي الذي يقضي على نمو .



نَمَشِيَّة الْحُمُفِيَّات



نَمْفُولَةُ الْبَشِينِ



نَمَل أَحْمَر

ومصباتها || كلالها قوية ، سوقها وأوراقها شبه مستديرة
علاية المادة حمراء اللون .

٢٩٣١٨ - نَمْلَامُ البَطِّ *

Dacophorus icterodes (S). *Dacophore bilieux* (F).
حشرة جلدية من النمليات . طولها نحو ١ سم . ثوبها الى
الحمرة الجلوية . رأسها مثلث الزوايا . بطنها يضيئ الشكل
مبهض المقلب اللقيص القصير || تركيب البط . تكافح
بمستحضرات الفريدب .

٢٩٣١٩ - نَمْلَامُ التَنَدُجِ *

Goniodes distimilis (S). *Goniodes dissemblable* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من ٢
م . الى ٢ م . وخمسة خطوط . جسمها رمعي الشكل .
عرض رأسها يفوق طوله . لها غضيبي التجميع . ثوبها الى
البياض الاخير يملو بتيجع اصفر . || تركيب التندرج
والحمل والدجاج . تكافح بالفريدب .

٢٩٣٢٠ - نَمْلَامُ الحَمَامِ *

Gonlocotes compar (S). *Gonlocote companson* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من مليمتر واحد
الى مليمتر وخمسة خطوط . ثوبها حطلي اللون اصفر المراح .
بطنها يضيئ الشكل مبهض المقلب اللقيص المستطيل .
تركيب الحمام قضيضه . تكافح بمستحضرات الفريدب .

٢٩٣٢١ - نَمْلَامُ الدَّجَاجِ *

Gonlocotes gigas (S). *Gonlocote géant* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م .
ثوبها الى الصفار الحطلي المراح . بطنها يضيئ الشكل
قصير المقلب القضيبي التجميع || تركيب الدجاج لتؤذي .
تكافح بالفريدب .

٢٩٣٢٢ - نَمْلَامُ الغِرْفَرِ *

Goniodes stylifer (S). *Goniodes stylifère* (F).
حشرة جلدية من النمليات طولها يراوح من ٣ الى ٤ م .
جسمها اجاصي الشكل . رأسها كالقبة الثانية القرون .
عليها كثيف التجميع . ثوبها الى السمرة السفاه || تركيب
الغرفر والحجش . تكافح بالفريدب .

٢٩٣٢٣ - نَمْلَاتِيَّاتِ *

Phloopteridae (S). *Phloopteridés* (F). *Phloopteridae* (E).
فصيلة حشرات جلدية من رتبة القليلات . اجناسها وانواعها
عديدة . جميعها صغيرة القد ، مفطحة الجسم ، كثيرة
الحلب ، واخصه القرون الاستمرارية الحامية العقل . اصغرها
عاشدة ثنائية المقاطع . تعيش على اوضاع جلود الطير
وديشه . اشهر اجناسها النمام والفرود والفرودع .

٢٩٣٢٤ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Ride (F). *Ripple* (E).
هو الاثر الذي تنتجه الريح على التراب والماء .

٢٩٣٢٥ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

هو الملقح ، هو الملقح ، هو الملقح .

٢٩٣٢٦ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Accroissement, Végétation (F). *Increase, Vegetation* (E).
هو استمرار دور النشوء والنضارة وازدياد الجسم في النبات .

٢٩٣٢٧ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Nemura (S). *Némura* (F). *Nemura* (E).
جنس طير من الجوامئ سنيا المتغير وفصيلة الدغليات .

٢٩٣٢٨ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Lasius niger (S). *Fourmi brune* (F). *Dun ant* (E).

٢٩٣٢٩ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Formica rufa (S). *Fourmi fauve* (F). *Drab ant* (E).

٢٩٣٣٠ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Lasius flavus (S). *Fourmi rousse, F. jaune* (F). *Yellow ant* (E).

٢٩٣٣١ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Formica animosa (S). *Fourmi féroce* (F). *Bold ant* (E).

٢٩٣٣٢ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Formica nigra (S). *Fourmi noire* (F). *Black ant* (E).

٢٩٣٣٣ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Atta structor (S). *Fourmi molssonneuse* (F).

٢٩٣٣٤ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Fourmis de Salomon (F). *Fourmi salomon* (F). *Robber ant* (E).

٢٩٣٣٥ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Formica flava (S). *Fourmi blonde* (F). *Golden ant* (E).

٢٩٣٣٦ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Formica sanguinea (S). *Fourmi sanguine* (F). *Robber ant* (E).

٢٩٣٣٧ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Formica (S). *Fourmi* (F). *Ant* (E).

٢٩٣٣٨ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

النملة واحدة النمل الذكر والانثى . نمل ونمل ونمل .

وارض نملة ذات نمل بطعام منبسط اذا اصابه النمل . ويضئ

النمل يضيئ مازنا ويضئ اوسفره يضيئ ذرا وكنتيه ايشوشول

وكنتيه النملة ام مازن وام نوية . وصيت النملة نملة لتنتلها

وهو كثره سركبها وقلة قواشها || وين شر الامام تاج الدين

البيبي في منزل فيه نمل قوله :

مالي ادرى منزل المولى الاديبي به

نمل تجميع في اربابله زمر

فقال لا تجميع من نمل منزلنا

فالنمل من شأنه ان تتبع الشرا

٢٩٣٣٩ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Fourmi de l'Argentine (F).

هي النملة ، نملة مهلهلا بلاد الاربعين وقد انتشرت في

جميع اقطار العالم .

٢٩٣٤٠ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Fourmi de Pharon (F). *Fourmi pharon* (F). *Pharon ant* (E).

نوع من النمل يضيئ سداك ، اطلبه .

٢٩٣٤١ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Formicidae (S). *Formicidés* (F). *Formicidae* (E).

فصيلة حشرات . من رتبة شفاقيات الاجنحة . انواعها

المعروفة زهاء ١٢٠٠ منتشرة في جميع اقطار العالم .

اعداها واكبرها قد الانواع التي تعيش في المناطق الاستوائية .

٢٩٣٤٢ - نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ ، نَمْلَامُ *

Nemalion (S). *Némale, Némallion* (F). *Nemalion* (E).

جنس نباتات مائية من الخيايات الحمر . انواعه المعروفة

عديدة . يكثر وجودها عند شلالات الانهر ومداسق الاسداد



نمل جور



نمل حصاد



نمل مدسى



نملين



نمام البط



نمام الدجاج



نمام الدجاج

منها في أواسط النمر البنياني، وقد تطور القسم الآخر الذي اختلف، على ما يبدو، الإجناس المعاصرة.

٢٩٢٢٤ - نَمُوزِيَّات (S). Nummulitidae (S).

Nummulitidae (F). Nummulitidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من المنغريات الجذريات. اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد، معظمها الساقط من متحجرات الحقبة الجوروية. أما الناصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة. اعرف اجناسها النَمُوزَة.



نموزة

٢٩٢٢٥ - لَمِيزَة Trichodectidae (S).

Trichodectidae (F). Trichodectidae (E).

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القمليات. اجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، بيضية الشكل، مفلطحة البطن. كثيرة الحلب. قربها الاستشارية لثلاثة العقل. ارساها عايدة، تركيب المقاطع. تركيب الحوانات البنية كالحمل والبقر والتمز والقلم والكلاب والسرابيب والصابا والأيايل...

٢٩٢٢٦ - لَمِيزَة Oogone

على نباتية تحف من وربي الاجرام الانثوية. ج. تخايا.



نموزة

٢٩٢٢٧ - نَمِيزَة مَلَطَحَة Venilia macularia,

Pseudopanchera macularia (S). Vénille maculée,

Pseudopanchère maculée, Panchère (F). Venilia

macularia, Pseudopanchera macularia (E).

حشرة من اللافيات سرشقيات الاجنحة. موطنها الاصقاع المعتلة الحارة من الشرق الاوسط الى اربوة. فراشها واثمة قوتها مغر الازهار. مرقها تميش على اوراق الشجريات وازهارها. جسمها خفيف ابيض يطول نحو ٩ م. بسطها نحو ٣٠ م. رأسها اسمر. عيناها صغيرتان.

زناها مشطيان عند الذكر، عظيماني عند الانثى. مرقها معتدل الحجم والطول. جنتها وعلها الى السورة. يعلوها ولج اكلف. رشناها الاماميان الى الصفار الباهت

تعلو ورقشة كستنية. رشناها الخلفيان الى الصفار الاكلف المالح تعلو نمرة كستنية تمتد حتى الخار. اهداها الى الشقة. لها جيل واحد في الجيل. تظهر القراثة في ايار

وتبقى حتى تموز. تروح في الليل. تماثل بعض ظهورها بنموسه اسابع وتنتج المكن لطخا على ماء البوق وتعال الاوراق. الكسرة عند بلوغها الكمال تغول نحو ٢١ م.

جسمها اسطواني الشكل، دالس القشار، يعلو ثلاثة ازرار من الفصائل الصغيرة المتقابلة. قوتها يمان البيت التي تميش فيها لذلك فهو غالبا بلون الارزاق. رأسها وثمولا وشرجها الى الكسني. شرجها ينثني بزاويتين صغيرتين. طول الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوما

ينثني ضمن صلجة تحميها الكسرة بين الاوراق التي تلتاس التربة.

٢٩٢٢٨ - نَمِيزَة Nemesia (S).

Némésia (F). Nemesia (E).

جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الخنازيريات. مهدها بعض المناطق الافريقية الحارة والمعتلة الحارة. سبطها هزيلة. اوراقها متعاقبة. ازهارها لولبية. مزودجة. مجهزة بهمايز تغول في تزرع التربين في الماكن والحدائق. انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.



نميرة ملطحة

انواعها المعروفة سبعة، ستة منها اسبوية وواحد افريقي. جميعها مصافير صغيرة القد، ورشقة الحركة، ثنائية الفين. يكثر فيها الرداء الاطلمل والبطن الابيض التي الموالج. قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والحوام. قد تن في الادفال القلدة. حطتها من ٤ الى ٥ بيضات يتناوب عليها الذكر والانثى نحو ١٣ يوما.

٢٩٢٢٨ - نَمُوزَة Nemosis (S). Némosis (F).

جنس طير من الاجرام غروطيات المناقرات وفصيلة التئثرينات. انواعها المعروفة نحو ١٠ موطنها المناطق الاستوائية الامريكية. تألف اللابات وصفات مجاري الماء. ملجها الحيائي جامي.

جامعاتها متوسطة العدد الذي يراوح من ٢٠ الى ٧٠ زوجا. قوتها الحشرات والبلور والثار المنية البرية. اجسامها صغيرة تغول من ١٢ الى ١٥ سم. متناقروها غروطية الشكل.

الواها شباينة الالوان جميعها زاهية انضاب عند الذكور باعثة عند الاناث. قد تن اعشاشها في الادفال. اناتها تحضن بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات. الترخيم يستمر نحو ١٣ يوما.

٢٩٢٢٩ - نَمُوس Nomeus (S).

Noméus (F). Nomeus (E).

جنس اسماك بحرية من شاكسكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة. اجسامها احليلجية الشكل تغول من ٢٠ الى ٣٠ سم. زعانفها الظهرية فارقة. زعانفها الصدرية تنتشر وتنتفي، عند الانضاض، في تجايف خاصة.

الواها الى الرتبة القفصية يعلوها يتبع اسم لاتياني التوزيع انما يكثر ويبقى عند الرأس والظهر. ملحها متوسطة الصفت، مأكولة.

٢٩٢٣٠ - نَمُوش الصمتر Turanana baton (S).

حشرة فراشية من فصيلة القفصيات. جسمها يطول نحو ٢٢ م. وراثن ذكورها الى الزقة الرمادية الموالج يطولها حمار اسود اطار ابيض اسمر حططه الاصاب السود. وراثن اناتها حططية اللون سم الموالج يعلوها تنميش بنفسجي ويعلوها اطار ابيض المذهب تترسب الاصاب السود.

مراقها تركيب اوراق الصمتر ففونها.

٢٩٢٣١ - نَمُوش بات يدمي لقة الحمل، اطلها.

٢٩٢٣٢ - نَمُوزَة Nummulites (S).

Nummulites (F). Nummulites (E).

جنس حيوانات بحرية من المنغريات الجذريات وفصيلة التئثرينات. انواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الحقبة الجوروية والطلاشيرة. أما الناصر منها فيعيش في بحار البلاد الحارة. اصدافها كبيرة، مستديرة، قرصية الشكل، عديدة الحجيرات الثلاثية او الثلاثية التجويل الانفي.

٢٩٢٣٣ - نَمُوزِيَّات Nummulitidae (F).

Nummulitidae (E).

نعت ترميفي يطلق على الحقبة الاولى من الاباج الثاني المعروف ايضا بالاباج الحديث. وهو يشمل العصر الباليوسيني والمصر الاساني والمصر الاوليوساني. تتميز هذه الحقبة بوفرة الكثير من اسافير النَمُوزَة في جمراتها الرئيسية. ويظهر بعض التدييات التي انقرضت قسم

٢٩٣٣٩ - تمیزة حادبة. *Nemesla strumosa* (S).

Némésie gibbeuse (F).

لوع من النيرة. عشة تزينة حولية. ساقها خلية
للآلهة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقتها اهليجية
مسوالية، الجذعية منها لاطفة، منشورية الختار. ازهارها
حراء اللون، منها ضروب بيضاء اللون وزرقاء ووردية ||
تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٣١٠ - تَمِيْزَةُ كَثِيْرَةِ الزَّهْرِ

Nemesia floribunda (S). *Némésia floribonde* (F).

نوع من النيمية . عشبة تزيينية حولية . ساقها تملأ من
٢٠ إلى ٣٥ سم . أوراقها العليا لاطئة ، سنانية ، وأوراقها
السفل منقطة ، بيضية . أزهارها عاجية اللون يعلوها موج
بنفسجي . عرفها عطر فواح || تنويرها يستمر من أيار
إلى آب

Nemesia suffisa (S). * نميسة قايمة ٢٩٣٤١

Némésio fumigée (F). Nemesia (E).

دودية من النكيب القانصة الساعية رباعية الروايا والمشتان
إلى فصيحة الخلدنقيات || جسمها متوسط القدر يطول
نحو ١٤ مم. عند النكيب ونحو ١٨ مم. عند المنكبة .

بجانبها من سادات العرب ، فلو انهم لم يتركوا الحارة
لليلة الممعد ، جميعها من اسماك المناطق الاسيوية الحارة
اجسامها متوسطة القد . شكلها قريب شبه
الافرنج . ظهورها محدودة . زعانفها الظهرية مستطيلة
شاذكة . زعانفها الشرجية مقطوعة || اذنها الى السرة
السفاه المواجه يملؤها بتيج اسود متباين الزخابة || لحمها
متوسطة الصنف ، مأكولة .

Nandina (S). Nandine (F). ۲۹۳۴۹ - نَندِینَا ۵

جنتية شجرة معمرة أبيض (Aurum) من فصيلة البراسيديات.
 يهددها الشرق الأقصى . تميز وتكثر في الاقاليم المعتدلة
 المنحرفة نحو الحارة . جنبها قليلة الفروع تملو من متر
 الى مترين . اوراقها متعاقبة مركبة . وريقاتها اهلجية
 الناصب ودية التيجع . ازهارها عشكولي التيجع طرني
 الارتكار . انهارها عابية اللون فواحة العرف المطري .
 ثمارها غنية جواء اللين مأكولة .

Paraffine (F), Paraffin (E)

هو البرافين، نوع من الشمع الأبيض الجامد المكسر يستخرج من النفط . وأهم نفعه .

٢٩٣٥١ - نهاية نوع من الودع

Méthodologie (F).

Methodology (E).

النهاية قسم من علم المنطق يبحث في مقتضيات ونتائج المناهج المختلفة.

Outardeau (F). Young bustard (F). 155 - 29302

فرخ الحبلى . قالت العرب احمق من نهار . وقد اختلف
المؤيدون في النهار فقال قوم هو فرخ اللقطة وقال قوم انه
ذكر اليوم والاثنى صيف . وقيل انه ذكر الحبلى
الاثنى ليل . ج انهرة ونهر .

۲۹۳۵ - نهارى ، صوفى ، ضيائى

Diurne (F). Diurnal (E).

معتمدين تعريفي يستعمل للدلالة على الشيء الخاص بالنهار
والذي لا يحصل الا في الفضايا اي النهار .

Bengaluru - ۲۹۳۵۰۱ ، هندوستان

Diurnal (D) Diurnal birds of prey (B)

سعد قسبي جوارح الطير المروفة بجوارح او كواسر النهار
قائلها جوارح او كواسر الليل



نُحْبِذُ قَائِمَةً



نخبة الصيغور

٢٩٣٥٦ - نَهَاس

هو الاسد ، الطيه .

Lion (F).

٢٩٣٥٧ - نَهَام *

Nyctala funerea (S).

Nyctale, Chouette pattue (F).

طائر من البوميات ورمزة الفداديات . جسمه صغير القد بطول نحو ٢٦ سم . رأسه مستدلل الحجم . صدره ابيض القرس . منفره شديد الانحناء اسود اللون تعلوه مشحة صفراء . ذنبه مستطيل الريش تبرزه خمسة خطوط بيض . ارساغه كاسية لبداء || موطنه فسيح الارياض يشمل البلاد الاسبورية والارودية والامريكية . يألف اصراع الجوار والتنبو والمخلولا يقترب اهداً من الاسماك الالهة . يلتصق قوته في الليل ، يصيد الجرذ والقصار والزباب والخشرات . يثنى عنه في صمدح الاجنار وبين فروعها . انقضاء نضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمتابعة الذكر من ١٧ الى ٢٠ يوماً .

٢٩٣٥٨ - نَهَبُوغ ، زَقَرَأَق مَسَّح

Hoplopterus (S). Hoploptère (F).

Hoplopterus (E).

جنس طير من طول الساق وفصيلة الزرقائيات . انواعه المعروفة ١٠ واحد ، منها امريكي موطنه يمتد من الاربستين الى البرازيل وتسعة اسبورية واربعية || جميعها قريبة الشبه من الزرقاق المطوق . اجسامها صغيرة . اذنانها قصيرة . اجنتها سلسلة بمتاخس قرنية المادة ، مدبية ، ناعسة . ارساغها دقيقة مستطيلة . اصابعها ثلاثة || قربها الحشرات والديدان والحمار || انثاها تدث في افاحيص تحفرها في رمال شفاف الاثر والبيسرات . وفي تحضن وسعها من ٣ الى ٤ بيضات || اعرف انواعه واشهرها التهبوج التناخس .

٢٩٣٥٩ - نَهَبُوغ نَخِيس ، زَقَرَأَق نَخِيس

Hoplopterus spinosus (S).

Hoploptère épineux, Vaneux à éperon (F).

Hoplopterus spinosus (E).

طائر من التهبوج الفصالب القواطع . اعطانه تمتد من الحيشة الى السودان وصغر والجزيرة العربية والفرانق وسائر اقطار الشرق الاوسط حتى تركيا واليونان يحوب بعض اصنافها ككل عام في طلب الرزق والمصيف والمشق || جسمه متوسط القد . طوله نحو ٣٠ سم . ظهره وبنجناه الى الصبغة السمر . رأسه وبيشته الى السواد الفضي . عجماره ومنقعه وكفاه ويطنه وانفيكه واراسط جناحيه الى البياض الناصع . اطراف قوادمه سود || يألف الاخوان وصفات الاثر والبيسرات ، سره متوسط البد . قوته الحشرات والديدان والحمار .

٢٩٣٦٠ - نَهْدَكَة ، نَهْدَكَة ، نَهْدَكَة

Beurre (F). Butter (E).

من اسماء الزبدة . وله تستعمل للدلالة على مقدار في الالبان بالتردد فتقول نهدة هذه الالبان ... نهدية هذا اللبن .

٢٩٣٦١ - نَهْر

Fleuve (F). River (E).

يجرى من المياه العذبة ينساب على الارض ويسب مياهه في بحر او بحيرة . يمتد النهر على التنايع والامطار والطقس الدافئة وهو يتألف عادة من مجرى رئيسي تغلقه السواعد والفرور . وان صغر وكثرت مياهه فهو النبع (Rivière) ج اطباع وساعده يدمي جملرا ج . جداول . وان كبير فهو النهر وساعده يدمي رافدا ج . روافد .

٢٩٣٦٢ - نَهْر ، اُرِيدَانُوس

Eridan (F).

Eridani, Eridanus (E).

النهر او اريدانوس كوكبة نجوم جنوبية المقيم . مجريها اربعة وثلاثين . شكلها كالنهر ، يتبعه عنه قدم الجوزاء قمر في المغرب على تعرج الى قرب صدر قيطس ثم يمر في الجنوب على ثلاثة انجم ثم تستط الى الشرق قمر على ثلاثة انجم ايضا ثم تستط الى الجنوب فالجنوب قمر على كوكبا مدينة وتنتهي بنجم نير يدمي آخر النهر || اشهر نجوم هذه الكوكبة : الثلاثة التي في المنطف الثاني وتسمى « منطف النهر » ، ويديها ايضا « آخر النهر » ، الرابع وتسمى « ادسي النعام » . والكواكب التي حولها تسمى « البيض » ، ثم « نير الزروق » ، ثم « القربة » ، ثم « العلم » ، وهو اشهرها ، ويديها ايضا « آخر النهر » . وبين هذا العلم والظلم الذي حل في الحوت كوكب كثيرة تسمى « الرئال » .



نهام

٢٩٣٦٣ - نَهْرَة اَلْاَصْدَايَة

Conjoncture économique (F).

Economic situation, Trend (E).

النهضة اتفاق الظروف في وقت ما .

٢٩٣٦٤ - نَهَس

Pie-grèlèche écorcheuse (F).

Red-backed shrike (E). ج. نهسان .

هو الصرد الأستر . ج. نهسان .

٢٩٣٦٥ - نَهَسُور *

Enneoctonus (S).

Ennéoctone (F).

طائر من القرب يتنحى الى فصيلة الصردييات . يألف القنابات والبروج والمرابي . قوته الحشرات والبوبيات والنظام والمغارب والمناكب ... || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٢ سم . رأسه مستعظم الجرم . منقاده غليظ وجليح . ثوبه الملوي الى الشبقة السمر . يطها شمشيح اسود . جبهة وعجماره الى البقرة . عيناه مكشكشان بالاسود الذي يمتد حتى القفن . زوره وصدره ويطه الى الشبقة التبراء . جناحاه متدلا الطويل . ذنبه مستطيل الشكل مقطوع الطرف || يثنى عنه في الاجنار الرقيقة . الاثى تحضن وسعها من ٤ الى ٥ بيضات بينا الذكر يثنى لها اللذان .

٢٩٣٦٦ - نَهْن

Cathetus (S).

Cathetus, Taligalla, Dindon des buissons (F).

جنس طير من فصيلة الثقبانيات . انواعه قليلة العدد جميعها كبيرة القد طولا يراوح من ٧٥ الى ٩٠ سم . تتميز برووسها الصلحاء القليلة الزغب . متناقدها قوية حادة . اعاقها سرحة ، هادمة الريش ، حواء الجلود المجددة المسترخية . اجنتها مستدرة ضيقة . اذنانها متوسطة القد . ارساغها قوية . غلابلها كبيرة . اذنانها الى السرة يطها مزاج حنطلي وتأذير فضي . || تألف الاجراع . تبيض ذكرا وأثى كالحمام . سرها يمد من ١٥ الى ٢٥ زوبيا . قربها الحبوب والخشرات . انثاها لا تحضن البيض بل تقسه في حاضن خاصة تشيدها بالتراب والقفيسبات والانتان والقش والورق تجعلها هرية الشكل مستديرة القاعدة ظهرا يراوح من ٢٨٠ الى ٤٢٠ سم . وارتقاعها من ١٢ الى ٢٠ سم . || ولاثى تضع في مومها الحولي من ١٥ الى ٢٥ بيضة بين الواحدة والواحدة ١٢ او ١٤ يوماً . اما البيضة فتتفق بدم وضعها ياسويين من فرخ نشيط انقب الريش يدر امر نفسه بولن عنه .



نيسخ ناهس



نهر



نهن

٢٩٣٦٧ - نَهْمَكَة

Roquette sauvage (F).

نحو ١ م. ثوبها الى الخشنى الاسمر. رأسها اسود. نمداهما الى الصلبة الزاهية. || تميش تحت الحجارة والاشعاب في البراري وقرب البيوت وبينها. قوتها المواد العضوية ويرقات الحشرات وتلات الازهار.



نِهيك أنقب

٢٩٣٦٨ - نَهْمَكَة

النَهْمَكَة طائر طويل المنقار والرجلين والرقبة، اغبر اللون، (السان).

٢٩٣٦٩ - نَهْمَكَة

Troque (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم عتيل، اطلية.



نِهيك الاخجار

٢٩٣٧٠ - نَهْمَكَة

Trochidae (S).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات تسمى أيضاً صتليات، اطلية.

٢٩٣٧١ - نَهْمَكَة

Bralmont (F). Bray of an ass (E). نَهْمَكَة صوت الخيـر. والنهـاك كلكـ.

٢٩٣٧٢ - نِهيك، نَالِبِ الْأَذْن، أَبُو مَقَصْ

Forficula (S). Forficula, Perce-oreille, Pince-oreille (F). Ear wig (E). Ohrwurm (D).

جنس حشرات مباشرة صغيرة من فصيلة النيهيكيات. انواعه عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. اجسامها مفلطحة مستطيلة سداسية القوائم. قرونها الاستشعارية خطيلة الشكل لا قياسية الطول والتركيب يراوح عدد مقلها من ١٠ الى ٣٤. كرواسها مثلفة الزاويةا مهمة الحمار الخالسي. اعماها قصيرة مقعولة. رواشها شبيانية الاشكال والاحجام. جالسة الاوتكان. تحمل في مؤخر بطونها ملاحظ لا نظامية الشكل، مقوسة كلابية في الذكور، مستقيمة في الاناث. يزعم اهل القرب انها تلتصق بالاذن وزعم غيرهم انها تمض اطر الرقيق وقوف الجوارى. || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.



نِهيك الحقل الصغير

٢٩٣٧٣ - نِهيك الزغب

Forficula pubescens (S). Forficula pubescens (F). نوع من النيهيك، حشرته دقيقة الجسم الازغب تطول من ٦ الى ١٢ م. قرونها الاستشعارية مركبة من ١٢ مقله. ثوبها الى الخشنى الاسفر المالح. ملاحظ ذكورها كلابية الشكل دائرية التفوق. ملاحظ اناثا مستقيمة تميش على الاشعاب والجنات الصغيرة. قوتها مكن الحشرات ويرقاتها وسيق الازهار وتلاتها.



نِهيك الحقل الكبير

٢٩٣٧٤ - نِهيك الأشجار

Forficula decipiens (S). Forficula des arbres (F). نوع من النيهيك، حشرته تطول من ٧ الى ١٣ م. قرونها الاستشعارية مركبة من ١٣ مقله. كوسلها وعمداها الى الصفار الخشنى. ثوبها الى السمره الخطية المالح. رأسها اصعب. ملاحظ ذكورها كلابية الشكل تطول نحو ٥ م. ملاحظ اناثا مستقيمة تطول نحو ٣ م. تميش على الاجهار. قوتها مكن الحشرات وبرقاتها والافرازات النباتية السكرية.



نِهيك مبدول

٢٩٣٧٥ - نِهيك الحقل الصغير

Labia minor (S). Labia (F). نوع من النيهيك، حشرته تطول من ٦ الى ١٠ م. قرونها الاستشعارية دقيقة مركبة من ١٠ الى ١٢ مقله. نمداهما ورواشها مستطيلة. ملاحظ ذكورها كلابية الشكل قليلة التفوق، تطول نحو ٢ م. ملاحظ اناثا مستقيمة تطول نحو ١ م.



نؤ

٢٩٣٧٦ - نِهيك الحقل الكبير

Labidura riparia (S). Labidura (F).

نوع من النيهيك الكبير القد، حشرته تطول نحو ٢٥ م. زباناها مستطيلة محببة كثيرة القمل التي يراوح عددها من ٢٧ الى ٣٠ احمداها ذلقة. اجنتها بارزة. ملاحظ ذكورها منجلية الشكل متراكبة الاطراف تطول نحو ١٢ م. ملاحظ اناثا مستقيمة تطول نحو ١٠ م. || ثوبها الى الخشنى الاصعب المالح. تميش تحت الحجارة في الحقول وفي الرمال وقرب مجاري الماء. قوتها برقات الحشرات وبعض المواد النباتية || جسرهما نفق بحد الفور طوله يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. وحده نحو ١٢ سم.

٢٩٣٧٧ - نِهيك مبدول، نَالِبِ الْأَذْنِ

Forficula auricularia (S). Forficula commune (F). Common earwig (E). Gemeine Ohrwurm (D).

نوع من النيهيك المبدول الشائع في معظم اقطار العالم. حشرته مستطيلة الجسم المالح. طويلا يراوح من ١٠ الى ١٥ م. زباناها مركبة من ١٥ مقله. ظهورها قصيرة مقعولة سفدية التركيب. رواشها بارزة. ملاحظ ذكورها كلابية الشكل مسننة الاطراف تطول من ٣ الى ٥ م. ملاحظ اناثا شبه مستقيمة تطول من ٤ الى ٧ م. ثوبها كسني اللون اسفر المالح اصعب الطرف والجوانب. وهو يالغ الاماكن الآفلة. يعيش تحت الحجارة والاشعاب. يسرح في الليل ويبيت في النهار. انشاء تقص نحو ٦٠ مكنة تحتها عند اوائل الربيع في قروص مستطيل تدبره في القرب تحت الحجارة. مكنها يضي الشكل ايض اللون يطول نحو ١ م. ويتفقد به منته بنحو ١٠ ايام عن رقات نهمه تلهم ما وصلت اليه من بوادر النباتات العشبية. اما الحشرة الكاملة فقوتها المواد العضوية والحيوانية والنباتية اغصها بوادر البلور الناتجة والتأثر السكرية. افرازها زبدية الا في بعض الظروف. ككاف كثيرها من الحشرات اترية الدجوية المسرح.

٢٩٣٧٨ - نِهيكيات، نَالِبَاتِ الْأَذْن

Forficulidae (S). Forficulidae (F). Forficulidae (E). فصيلة حشرات من رتبة جلدنيات الاجنحة الرواكس. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم اغصها الاطوار الاستوائية. جميعها من حاملات الملاحظ الشريفة للشبيانية الاشكال والاحجام || اشهر اجناسها النيهيك.

٢٩٣٧٩ - نِهيم

Barrissement (F). Trumpeting (E).

هو صوت القليل في جميع ظروفه.

٢٩٣٨٠ - نؤ

Connochaetes (S).

Gnou (F). Gnu, Wildebeest (E).

جنس حيوانات لبونة من بقرة الوحش ذوات الظلف. انواعه ثلاثة. اشكالها مزيج من مخلقة المياه والاشور والحسان. اجسامها كبيرة القد شديدة النشط. سواركها رفيعة. رؤوسها مسطحة مستقيمة. معارفها مستقيمة السبيبة. اللب. يلددها رعية. اذنانها كاسية مستطيلة السبيبة كا في الخيل. قرونها غليظة، مستعرضة القواعد، قوية التحبين، متشعبة الى اللداء || اناها تقص اريا واحدا

ترضعه نحو ٦ أشهر || موطنها فسح الارياء يشل كامل إفريقيا الشرقية والجنوبية وبعض البلاد الاسيوية .

٢٩٣٨١ - تَوَاشُلُ الدَّبَب

٢٩٣٨١ - **تَوَاشُلُ عَيْشِي** ، **كَيْرِيَّة** Carriera (S). Gnou à queue blanche, Carrière (F).

شجرة برية وزيينية من فصيلة النضيات . مهددا الصين . ساقها منتصبه فروعها تمل من ٥ الى ١٥ م . اثمارها واثانها حمر الحام . اوراقها عابطة متعاقبة . نصلها اعليجي الشكل لامع البشرة عل صفحتيه . ازهارها صغيرة القد ، عذمة القملات ، خاسية الفصل البيض ، كثيرة الاسدية . ثمارها جرداء وشمية الشكل ، ثلثية المصارع || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٣٨٢ - تَوَاشُلُ الْحَبِيبَةِ

٢٩٣٨٢ - **تَوَاشُلُ أَلْبُو جُبَاتُ** (S). Gnou à barbe blanche (F).

اكبر انواع النر جثة واقفا خلاطة واطولها عفرة ولحية . جسمه طويل نحو ٢٨٠ سم . ويرتفع نحو ١٤٠ . قرله افي الالتشاب مدب الطرف الاحجن . ثوبه الى السرة الخطية الصهباء المواج . عفره شديدة السرة يتغللها صيب ابيض . طبعه يضاء اللون ومنه ضرب اسود الحية . اجله يد من ٨ الى ٤٠ نفراً . موطنه افرقية الشرقية حتى بحيرة فيكتوريا نيارزا .

٢٩٣٨٣ - تَوَاشُلُ مَسَلَح

٢٩٣٨٣ - **تَوَاشُلُ مَسَلَح** (S). Gnou taurin, G. rayé (F).

نوع من النور كير اجله غليظا ، طوله نحو ٢٢٠ سم . وارتفاعه ١٢٠ . ثوبه الى السرة الخطية معلقا تسليج اشهب . اجله يد من ١٥ الى ٩٠ نفراً . يعيش برقعة النعام ويحير الزرد || موطنه يشمل معظم اقطار افرقية الجنوبية .

٢٩٣٨٤ - تَوَاشُلُ

Noyau (F). Nucleus (E). هي عضو الاستمرار في الخلية تركب من شبكة مكونة من النشب الساعية في السائل النووي .

٢٩٣٨٥ - تَوَاشُلُ

Noyau (F). Stone (E). هي النجمة ، اطلها .

٢٩٣٨٦ - تَوَاشُلُ الثِقَلِ

Barysphere (F). Barysphere (E). نواة الثقل اسم يطلق عل كتلة الارض المركزية ذك لان جميع مركباتها من المعادن الثقيلة الماثمة .

٢٩٣٨٧ - تَوَاشُلُ

Nucléine (F). Nucléine (E). هي عناصر نواة الخلية وقد تكون ازوتية ودهنية وسفورية وكبريتية ويصنف من مدها نكلين .

٢٩٣٨٨ - تَوَاشُلُ

اقصى الاغراس وهي اربعة في اقصى الانسان بعد الاراء . وتسمى غرس الحلم لانه ينبت بعد البلوغ وكال الغل ، وقيل النواجد التي تلي الاثياب . وقيل هي الاغراس كلها نواجد . قال الجوهري : وقد تكون النواجد الغرس . وهي الاثياب من الخف والسولج من الظلف .

٢٩٣٨٩ - تَوَاشُلُ

Eperon (F). Spurs (E). حطب مؤلفة تملر سوك بعض الحشرات .

٢٩٣٩٠ - تَوَاشُلُ

نمت وصفي يطلق عل كل عضو نباتي يحلل زهرة او عدة زهور .

٢٩٣٩٤ - تَوَاشُلُ

Eutoca (S). Eutoque (F). Eutoca (E).

جنس نباتات عشبية حولية وسمرة من فصيلة النجميات . انواعها المعروفة ١٢ . جميعها امريكية الهيد ، بعضها شام استعمال التريبي || سقها غشائية . اوراقها صغيرة متعاقبة زياء النصال . ازهارها جملة ، خافتة السرف ، ملونة ، منها الازرق والاريجاني والايض || أشهر انواعها الزراعية التريبية نواره يورجيليانا (Eutoca Wrangeliana)

٢٩٣٩٥ - تَوَاشُلُ

Anthophora (S). Anthophore (F). Anthophora (E).

جنس شحرات جارية لاقعة من غشائيات الاجنحة المحمويات وفصيلة التواريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد المحتلة الحارة والحارة . قوتها رحيق الازهار وطلها . ملجها الحياتي انتمالي || جسمها متوسط القد قريب الشبه بجسم ذكر النحل . تتميز بكتافة الزغب الذي يكتنفها من قة الرأس الى طرف البطن || عطلها عشاء تينبه بالعين في الموقع المهيجرة اغصها الحيطان الحوية .

٢٩٣٩٦ - تَوَاشُلُ

هو اسطرغاليس ثوريس ، اطلها .

٢٩٣٩٧ - تَوَاشُلُ

Anthophoridae (S). Anthophoridés (F). Anthophoridés (E).

فصيلة شحرات جارية لاقعة من غشائيات الاجنحة المحمويات . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الباردة || ملاجئها الحياتية تختلف مع اختلاف الاجناس ، بعضها جامي والبيض الآخر انتمالي . واجلها منها قليل البند . الذكور والاثان تمل في سبيل الحياة والبقاء اذ لا يولد عذلات كا في النحل || أشهر اجناسها النواره والفتارة .

٢٩٣٩٨ - تَوَاشُلُ

Ri d'araignée (F). عيط المنكبوت ونسجه . وفي المثل اربي من نواس المنكبوت .

٢٩٣٩٩ - تَوَاشُلُ جَوِّيَّة

Perturbations atmosphériques (F).

هي التقلبات الجوية المازفة غير المألوفة . والنتيجة هي ازوتية من الرياح . ج نوج .

٢٩٤٠٠ - تَوَاشُلُ مَسَلَح

Neoborus ornatus (S). Néobore armé (F).

سمكة نهريه يبيض من مفتوحات المانة . موطنها بحيرات ومنغشقات نهر الكنفو . تعيش بين الاشجار المائية



نواره



نور مسلح

٢٩٤٠٦ - نُوتِيرِيَات • Noteridae (S).

Notéríds (F). Noteríds (E).
 فصيلة حشرات مائية من غمديات الأجنحة. أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة || أجناسها صغيرة ، أهليجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٦ إلى ١٢ سم. رؤوسها قصيرة ، مستعرضة ، حيزتها صغيرة ، تألفتها وفكوكها قياسية. قرونها الاستشعارية شبه وشعية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محدبة ، مستعرضة ، المحادها لاسفة ، حادة التعقيد. قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للوم || جميعها مفترسة. تعيش في المياه الراكدة أو الجارية البطيئة الانسياب || أشهر أجناسها النوتيرة .

٢٩٤٠٧ - نُوتَد Calodon (S). Calodon (F).

جنس تطور من فصيلة الأبريات . أنواعه قليلة العدد اصطناعيا بعض اقاليم مناطق البلاد المعتدلة الحارة . جميع أنواعه كاعثة الصنف لاماكولة . تتميز ببوطها الشفوي المتصنجع اللين ، وبسوطها القصيرة الضفصنة ، وينكأها الخلدوية الهضبة الشبه ليلية المادة || اُعرف أنواعه وأشهرها الاربئة التالية .

٢٩٤٠٨ - نُوتَد بُرْتَقَالِي اللون * Calodon suranticum (S). Calodon orangé (F).

نوع من النوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه غليظة ، قصيرة ، صفراء اللون ، يرتقالية المواج . نكته غروفيية الشكل ، كثيرة الحداب الاستشعارية ، قطرها نحو ٨ سم. سطحها خلي برتقالي اللون . لحية كالفلين ، صفراء اللون ، كاعثة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢٩٤٠٩ - نُوتَد حَدِيدِي اللون * Calodon ferrugineum (S). Calodon ferrugineux (F).

نوع من النوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة شبه غروفيية الشكل ، لامشايوية السطح الخشن ، لونها الى الكستني الاسمر . نكته ريمية الشكل قطرها نحو ٨ سم. سطحها خلي البشرة ، متتابع الحداب ، لونه الى الشقمة السمره يعلوها تنقيط احمر يطقه الابيض || لحية قاسية كالجلد ، كالجلك ، كاعثة الصنف ، لا تؤكل .

٢٩٤١٠ - نُوتَد رَعْلِي * Calodon geogenium (S). Calodon terrestre (F).

نوع من النوتد . يسكن في الغابات . يعيش في المواقع الرطبة المشبعة بالطحالب . ساقه شديدة القصر تؤلف مع النكته شكلا شبيها بالقصع الثلاثي الاعنادر . قطر النكته نحو ٢ سم. لونها كالكاسق الى الصفار الكبريتي || لحية كاعثة الصنف ، لا تؤكل .

٢٩٤١١ - نُوتَد عَدَب * Calodon suaveolens (S). Calodon suave (F).

نوع من النوتد . يعيش في ظلال الصنوبريات . ساقه قصيرة ، غروفيية الشكل ، رباعية الحداب المستطيلة ، لونها الى الزرقة السمره . نكته قمية الشكل ، كثيرة الحداب الجانبية والبطنية ، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصبغة يعلوها تمجج ازرق ومواج اسف || لحية جلدية المادة ، كاعثة الصنف ، خزامية الرائحة العذبة ، لا تؤكل .

قوتها الاسماك والحيوانات والدماميس والديدان || جسمها مسطع الجرم ، مستطيل الشكل ، يطول نحو ٣٥ سم. رأسها غروفيي . عظمها مستطيل كالجلد . فكاهما مسلحان بسانن قوية ذرية . حيزتها صامتتان . زعنفتها الظهريية الاولى كبيرة اللد شرعية الشكل . الثانية جدعة . زعنفتها الصدرية والغروفيية والشرعية متصلة اللد . الذيلية كبيرة ، فارقة ، ثوبها الى الشبهة البنيصحية المواج . جانباها الى الخصار الزئبق المشوح بالفضي . نكته الى القبرة الناجية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٩٤٠١ - نُوتوسِيرَة Notoceros (S). Notocère (F).

جنس نباتات عشبية برية ، حولية ومحولة وبعمرة من فصيلة الصليبيات . أنواعها المعروفة عديدة اصطناعيا فسيحة الاربعاء تمتد من البلاد الحارة الى الباردة || سرقها زهاب متصبية او مستطيلة ، غمره او قليلة الفروع . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، سنانية النصال . ازهارها صغيرة يضاء اللون او تبيته او صفراء .

٢٩٤٠٢ - نُوتِيلِيَات • Nautilidae (S).

Nautilíds (F). Nautilíds (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات وأسيات الاريل ورياحيات الخياشيم . أجناسها وأنواعها المنقرضة القارية كثيرة العدد ، أما المعاصر منها فجنس واحد موكل المحيط الهندي والبحار المحاورة . يدعى نوتية .

٢٩٤٠٣ - نُوتِيلِيَة • Nautilus (S).

Nautilé (F). Nautilus (E).
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات وأسيات الاريل ، رياحات الخياشيم وفصيلة التوتيات || أنواعها المعاصرة المنقرضة ثلاثة اصطناعيا المحيط الهندي والبحر الاحمر || اصطناعيا كبيرة ، شبه قروية الشكل ، متتلة التبطيط . اجسامها غروفيية ، صغيرة الرءاء . رؤوسها صغيرة . عيونها كبيرة جاسطة . لراسها عديدة ، فسيحة ، ونها اثنتان مجهزتان بما يشبه الحاجم . اصطناعيا نشيطة ولوية || أشهر أنواعها وأكثرها انتشارا النوتية الجاعة .

٢٩٤٠٤ - نُوتِيلِيَة لَمَاعَة • Nautilus pompilius (S). Nautilé lambé (F).

نوع من النوتية يكثر وجودها في بحار الهند . اصطناعيا لامة ، لؤلؤية الصفحات الداخلية ، لونها الى اليباض الهذم بالصناني || لحمها مأكولة . اصطناعيا مرغوب فيها شائعة الاستعمال الصناعي .

٢٩٤٠٥ - نُوتِيرَة • Noterus (S).

Notère (F). Noterus (S).
 جنس حشرات مائية مفترسة من فصيلة النوتيريات وربة غمديات الأجنحة . أنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من اليابان الى اوردية . تألف المناطق والياه الراكدة || اجسامها صغيرة ، أهليجية الشكل ، محدبة ، تطول من ٧ الى ١٠ سم. رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشور . حيزتها صغيرة بارزة . فكوكها وفكوكها وملاسها قياسية . قرونها الاستشعارية وشعية الشكل . كواسلها مستعرضة . المحادها لاسفة ، عديمة التعقيد . قوائمها نشيطة ، الخلفية منها مجهزة للوم . ألوانها سوية الخصب الكستني او الجوزي || الجملانة قانصة والبرقة ايضا .



نوتية لَمَاعَة



نوتيرة



نوتد بَرْتَقَالِي اللون



نوتد حَدِيدِي اللون



نوتد رَعْلِي



نوتد عَدَب



نودي



نوسة الاجاص



نوسة الاجاص



نوسة الحفصيات



نوسة

مظهره الخارجي يقع رادية اللون او يضاء لا قياسية الشكل والحجم تركيب نصل الاوراق وصفات الحياء الاديبة تصطبها يعد ان تقضي على النسيج والخلايا. وقد يركب كآلة الناضجة فينمو البقرة ببقعه اسمر دث ان يذوي لياح السورق. يكالغ كثير من الفطور التي تصطب الكبريت والنحاس .

٢٩٤٢٣ - نَوْسَة الحَمْصِيَّات *

Oospora citri-aurantii (S).
فطر مجهرى صمم الانتشار يركب ثمار الحفصيات المدركة والمحفوفة على اختلاف انواعها || يصيب القشور فيفسدها بعد ان يصبب النسيج والخلايا التي تنمل وتنفق خاصة الباسك || يكافح بتطهير الثمار الملمدة لحفظ او للتصدير وباجتناب الاماكن الحارة المشبعة الرطوبة .

٢٩٤٢٤ - نَوْسَة * *Nasiterna* (S). *Nasiterna* (F).

جنس طير من النسلقات وفضيلة البيضاوات . انواعها المروفة ١٢ صوبها غنية الجديدة ويبرز سلالان . تألف الثفبات الكثيفة الاشجار والمواقع القريبة من الماء . ملجنيا الحياني جماعي . قوتها الثمار واسارع الحشرات . تنسلق الاشجار كالتفاز وتغير بشفة النوري || اجسامها صفيرة ، ربة ، تطول من ٨ الى ١٢ سم . اجنتها لاسفة . اذناها قصيرة مستنيرة الاطراف . الثوابها تختلف مع الانواع ، جميعها زائرة الالوان || اشهرها النوسة القنزعة .

٢٩٤٢٥ - نَوْسَة قَرَمَة * *Nasiterna pygmaea* (S).

Nasiterna pygmaea (F).
طائر من النوسة . جسمها صغير لقد يطول نحو ٨ سم . ثوبها الى الخضار المتفاوت المجات . رأسها ومقنها صفر . رفاق ذنبا الجانية الى السواد اللامع باستثناء الزام الاخير فاته اصفر ، اما الرقائل اسود فرقاها اللون .

٢٩٤٢٦ - نَوْسَل * *Métamère* (F). *Metamere* (E).

٢٩٤٢٧ - نَوْسَكَة * *Métamérie* (F). *Metamerism* (E).

Oosporées (F). *Oosporae* (E).
نَوْسَكَات *
عارة فطور مجهرية من فصيلة الطحليات . اجناسها ستة : الازداد والنجع والسداع والسيلندريوم والمزليبه والنوسة .

٢٩٤٢٩ - نَوْسَادِر * هو الامويك ، اعطيه .

٢٩٤٣٠ - نَوْشَان * *Rhinocéros de Sumatra* (F).

هو كركدن سومترا ، اعطيه .

٢٩٤٣١ - نَوْس * النوس هو الحمار الوحشي .

٢٩٤٣٢ - نَوْس ، بَنَل * *Imbibet* (F).

ربط القتيه بالماء أو باي سائل آخر .
To imbibet (E).

٢٩٤٣٣ - نَوْسَرَة * *Diopsis* (S).

Diopsis (F). *Diopsis* (E).
جنس حشرات من فصيلة النضريرات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المروفة ستة اصطنابا البلاد الحارة || اجسامها مضمورة ، خفافة ، تطول من ٥ الى ٨ سم . رؤوسها مكورة تملوها زواك مغترفة الانشباب تحمل في اطرافها الزباني واللون . صينها بارزة صفيرة . قرونها الاستشعارية صفيرة ، نحيلة ، تستيق الميون . اعطيلها ولاسفا صفيرة . كولسلها

٢٩٤١٢ - نَوْجَل * *Heteropogon* (S).

Hétéropogon (F). *Heteropogon* (E).

جنس نباتات عشبية حولية زركوية من فصيلة النجيليات انواعها المروفة نحو ٢٥ اصطنابا البلاد الحارة والمتندة الحمرارة . سوقها جامدة نحيلة عادمة الفروع . اورثاها صصلية . انزهارها سنبل التجميع سنابلها فردية . بعضها ينبت طويلا في بعض موائل الساحل البنياني والوسط .

٢٩٤١٣ - نَوْغَة * *Ecade*

نتيجة البينة الموسمية في التكيف او التبدل . كترك نوسة الظل والشمس والجفاف والرطوبة ...

٢٩٤١٤ - نَوْر * هو النقص ، اعطيه .

٢٩٤١٥ - نَوْرَة * *Corymb* (F). *Corymb* (E).

النورة والمعدن ككل من اشكال الانزهار صيوليا التركيب هديد الانزهار المتشابهة الجعد من المهور الرئسي . يكثر في الفصيلة النورية || والنورة هي الزهرة .

٢٩٤١٦ - نَوْرَج * هو الجرجر والحال ، اعطيه .

٢٩٤١٧ - نَوْرِي * *Mouette* (F).

هو نرج الماء ، اعطيه .

٢٩٤١٨ - نَوْرِيَّات * *Laridae* (S).

Laridés (F). *Laridae* (E).

فصيلة طير من كليات القدم ، طويولات الرئش . اجناسها وانواعها المروفة عديدة || اجسامها متباينة الحجم . اجنتها مستطيلة ذلفة الاطراف . متاقدها عادمة الزحف . اصابعها نصيلة الخطاب . قصاصها مجرة بزويون من الفراض الجانية || زوج ابن وزوج امير || اشهر اجناسها النورس ونرج الماء والمجهوم .

٢٩٤١٩ - نَوْرِي * *Nurie* (S).

Nurie (F). *Nurie* (E).

سمكة نهريه وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الشبليات . موطنها انهر الهند || جسمها وشي الشكل يطول من ٤٥ الى ٥٥ سم . رأسها مثلث الجرم ، مقطوع الخلف . شفتها معتدل الانفرج ، وباهي الذبابت المستطيلة . صينها ماصحان . زعنفتها الظهرية غلفية الازنكاز تقابل الشرة . الذيلية مقترنة الطرف . ثوبها الى الخضار البصري ينير وتعلو ساحة وريدية في البطن ويسمر ويبقي في الظهر || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٢٩٤٢٠ - نَوْرِيَّه * *Pétale* (F). *Petal* (E).

هي بتلة الزهرة عامة وقد تستعمل تقصيصا للدلالة على البتلة المستغلة .

٢٩٤٢١ - نَوْسَة * *Oospora* (S).

جنس فطور مجهرية من النوسيات وفصيلة الطحليات كثير صميجها النحيل الثراب المتشابه التراكيب الذي يفسن النسخ المتشابه ويتكاثر خارجيا . جرابها الكندي مثدالي الشكل . كتالده سببية التجميع || انواعها عديدة ، معظمها دمي يعيش على المواد الغذائية المحفوفة على الاعشاب اليابسة وفي اثرية || احرف انواعه المؤذية ما يلي .

٢٩٤٢٢ - نَوْسَة الاجِاص * *Oospora piricola* (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الاجاص وانفاده ومثاره .

٢٩٤٤٢ - نُؤُفَر اَزْعَب (S). *Nuphar pumilum* (S).
Nufar nain (F).
 نوع من النوفر المبلول . اعطاه مياه البلاد المحتلة الحارة .
 اوراقه تطلو من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٤ الى ١١ سم .
 ازهاره صفراء اللون صغيرة القد ، قطرها يراوح
 من ٢ الى ٣ سم . || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٤٤٣ - نُؤُفَر اصْفَر
Nuphar luteum (S). *Nufar jaune*, *Lis jaune des étangs*, *Plateau* (F). *Yellow water-lily*, *Brandy-bottle* (E). *Gelbe mummel*, *G. wasserrose* (D). *Ninfes gialla*, *Ercules gialla* (I).
 نوع من النوفر المبلول في مياه البلاد الحارة . اوراقه كبيرة
 متصل الاخضر الباهت ، تطلو من ١٥ الى ٣٠ سم .
 وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره صفراء اللون متراكبة
 البتلات عديدة الصفوف قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم .
 ثماره اجاصية الشكل . بلوره ويهدأ به مأكولة || ينور
 من حزيران الى ايلول .

٢٩٤٤٤ - نُؤُفَر سَهْمِي
Nuphar sagittaeifolium (S). *Nufar sagittal* (F).
 نوع من النوفر الامريكى ، اوراقه سهمية الشكل تطلو
 من ٢٠ الى ٤٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ . ازهاره صفراء
 اللون متوسطة القد قطرها يراوح من ٤ الى ٦ سم . || تنوره
 يستمر من حزيران الى آب .

٢٩٤٤٥ - نُؤُفَر يَابَانِي
Nuphar japonicum (S). *Nufar japonais* (F).
 نوع من النوفر البروقى الوافر النشط والتمو . مهد
 اليابان ، اوراقه اهلجية الشكل . تصلها اخضر الصفحة
 العليا ، اخر السفلى يطول نحو ٣٠ سم . ازهاره كبيرة
 القد صفراء اللون تطلوها شمسة حراء . اسديها وبأربها
 ارجوانية || تنوره يستمر طوالم فصل الصيف .

٢٩٤٤٦ - نُؤُفَس
Bronza
 سبيكة ، متطابقة السب ، من النحاس والقصدير والزنك .

٢٩٤٤٧ - نُؤُفَصِيَّات
Dibamidae (S). *Dibamidés* (F). *Dibamidæ* (E).
 فصيلة حيوانات زساق من العفاليات قصيرات الالسن .
 انواعها المعروفة ثلاثة يصممها جنس واحد . اعطاهنا بعض
 اقالم افريقية الاستوائية || جميعها جاسة تسرح في الليل
 وببيت في النهار || اجسامها دودية الشكل تطلو من ٢٠
 الى ٢٨ سم . وهي عادمة القوائم الامامية ، صامخة الخلفية .
 عينها طامسة تلحفها اغشية مدهشة .

٢٩٤٤٨ - نُؤُكَّة
Nucula (S). *Nucule* (F). *Nucula* (E).
 جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات احيائهم
 وفصيلة التوكليات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
 منتشرة في معظم بحار البلاد المختلفة الحارة || اصدافها
 شبه مخروطية الشكل ، متساوية المصاريح ، لاشاوية
 الاضلاع . الوانها عديدة ينفذ فيها الاغبر ثم انهي الفاتح .
 اصفاها للؤلؤة الماددة من الداخل || تعيش منعزلة في
 الرمال المتوسطة الغور .

٢٩٤٤٩ - نُؤُكِّيَّات
Nuculidae (S). *Nuculidés* (F). *Nuculidæ* (E).
 فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات احيائهم .

شبه اهلجية ، مجهزة باربعة منخاس ذرية . بطونها شبه
 مدقية الشكل . رواشتها شافهة يطوها بعض البقع السمر .
 قوامها مستطيلة || الجلاطة واسعة اما اليرقة فخاضعة
 ترطب في عصف النجيليات .

٢٩٤٤٤ - نُؤُصْرِيَّات
Diopsidae (S). *Diopsidés* (F). *Diopsidae* (E).
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
 المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة ||
 اجسامها صغيرة تطلو من ٥ الى ٨ سم . زروها مستدلة
 الجرم مجهزة بزوائد سنمية الارتكاز ، متفرجة ، مستطيلة ،
 تحمل الميون في اطرافها . عينها بارزة . قرونها الاستشعارية
 صغيرة تنشب في الزوائد قرب محيط العين . كراسلها شبه
 يضيبة . بطونها مستعرضة المؤخر . اجنحتها شافهة يعلوها
 بعض البقع السمر . قوامها مستطيلة || يرقاتها خاضعة
 تركب عصف النجيليات || اشهر اجناسها النوصرة .

٢٩٤٤٥ - نُؤُصَّة
Venericula succenturié (F).
 اسد اجزاء جهاز الهضم عند الطير . اوها الهوصلة ثم
 النوصلة ثم القانصة ثم الامعاء || فالهوصلة هي الجراب الاول
 الذي يلي المريء ، يتجمع فيه الطعام بعض الوقت ثم ينتقل
 الى النوصة (البطين العصاري) وفي جراب مستطيل يفرز
 العصارة الهاضمة على الاطعمة من حب وغيره التي صار
 تليينها بالهوصلة ثم ينتقل الطعام من النوصة الى القانصة
 حيث يسحق مع الحصى والزلزل ويدخل في الامعاء حيث
 يتم الهضم والنفاد .

٢٩٤٤٦ - نُؤُصَّر
Nothure (F).
 طائر يدعى نظوره ، اطلبه .

٢٩٤٤٧ - نُؤُص
Espèce (F). *Species* (E).
 النوع هو جماع الفروبو اي جملة الافراد المتشابهة التي
 تحدثت من اصل واحد او جديدا مشتركة .

٢٩٤٤٨ - نُؤُصَم *
Cystoseira (S). *Cystoseire* (F). *Cystoseiræ* (E).
 جنس نباتات بحرية من احيات السمر . انواعها المعروفة
 نحو ٣٠ اعطاهنا معظم بحار العالم || كلالها قصيرة .
 سويقها فراء . اوراقها خطيطة ، صغيرة . كثيرة العدد ،
 متراكبة . تنبذ بمحوصلاتها الشبه يضيبة الشكل ،
 السبيعية التجميع .

٢٩٤٤٩ - نُؤُصِي
Spécifique (F). *Specific* (E).

٢٩٤٥٠ - نُؤُصَة
Cardiosperme (F).
 هي البكت ، اطلبه .

٢٩٤٥١ - نُؤُفَر *
Nuphar (S). *Nufar*, *Nuphar* (F).
 جنس نباتات عشبية جلمورية مائية من فصيلة النوفريات .
 انواعها المعروفة ١٥ اعطاهنا مياه انهار واهوار وبعض
 بحيرات البلاد الحارة والمعتدلة . جلاطيمه مدادة . اوراقه
 مستطيلة الاعناق طافية . ازهاره عديدة البتلات المتناوبة
 الصفوف . ثماره جراء ريمية الشكل ، زروها نشوية
 الماددة || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .



نوعم



نوفر



نوكلة

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. انواعها النادرة من متحجرات اقدم التكاوين الجيولوجية. اما الحاصرة فمتشرة في معظم بحار العالم || اصنافها شبه غروية الشكل، متساوية المصارع، لامساوية الاصلع. اصنافها خشفة ملوثة من الخارج، مائلة للزوجة من الداخل. حيواناتها مائعة المصارع، كبيرة الاصلع الاحليلية المسطحة || ارفع اجناسها المعاصرة واشهرها النوكلة.

٢٩٤٥٦ - نُولِيْنَا ٥

Nolina (S), Nolina (F).
جلس نباتات من فصيلة الزنبقيات مفردة التعريف على اسم البوتاني الفرنسي ونولان. انواعها المعروفة قليلة، مهدا بلاد المكسيك. سيقانها ليفية التركيب، لغتية الجذث والقاعدة، دقيقة الجلع. اوراقها خيشة لتصل، مستطيلة متعقبة. ازهارها جرسية الشكل، عقدية التجميع، هامة الانكاز || ترطب في الازرة الفنية المتوسطة الاندماج والمادة الكلوية. تحصى الموانع الباردة والرطوبة المستحكمة. اشهر انواعها الزنبينة ما يليج.



نولان

٢٩٤٥٧ - نُولِيْنَا مُعْتَبَرَة ٥

Nolina recurvata (S), Nolina arquata (F).
نوع من النولان الزنبينة، ساقها تعلو من ٤ الى ٦ أمتار. اوراقها جميلة الخضار تعلو نحو ١٠٠ سم. وتعرض ٢ سم. ازهارها هامة بشكل الساق بمقتوده للتلشب الكبير الحجم. ازهارها بيضاء اللون. تنزرها يستمر طوال الصيف.

٢٩٤٥٨ - نُولِيْنَا مُسْتَطِيلَة الورق ٥

Nolina longifolia (S), Noline à longues feuilles (F).
نوع من النولان الزنبينة، ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها شديدة الخضار المايك تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهارها هامة الانكاز يتوج الساق بمقتوده للتلشب الكبير القد. ازهارها بيضاء اللون، غبراء الموانع. تنزرها يستمر طوال الصيف.

٢٩٤٥٩ - نُولْمَان ، حَقِيْقَة الحَقَق

Herniaria (S), Herniaire (F).
جنس نباتات خشية برية من فصيلة النوليات. انواعها المعروفة ثمانية تكثر في الاماكن الرملية الجافة. سيقانها فراء اوراقها متعاقبة لائفة صغيرة القد. ازهارها ابطية الانكاز او تاجية. ثمارها زور نشوية المادة || اشهر انواعها النولان الامرد.

٢٩٤٦٠ - نُولْمَان اَمْرَد * ، حَقِيْقَة الحَقَق

الزُدَّاء ، نَبَات الحَقَق
Herniaria glabra (S), Herniaire glabre, Herniole, Herbe au cancer, Turquetze (F), Rupture-wort, Turk's herb (E), Glattes bruchkraut (D), Ernliaria, Erbs turchetta, Erniola (I).
نوع من النولان المشي البري الطبي المعمر. ساقها فراء مراء، اوراقها صغيرة القد، متعاقبة، لائفة، بيضة النصل، مائلة البشرة. ازهار ابطية وتاجية الانكاز، نورية التجميع، صغيرة الحجم || كان شائع الاستعمال في علاج الحَقَق.



نولان امرد

٢٩٤٦١ - نُولْمَانِيَات

Illecebrina (S), Illecebrina (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القنالات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. نباتاتها اشباب حوية وممرة تعيش في الماراض الحادة وفي الازرة القليلة الرطوبة. اوراقها كاملة. ازهارها غسية التجميع لا قياسية الانكاز. ثمارها بغور نشوية المادة. || اشهر اجناسها النولان والحريط والشعير ومشفهة القنارييل.

٢٩٤٥٠ - نُولَان *

Nolans (S), Nolane (F).
Nolans, Chilian bell-flower (E), Glockenwinde (D), Nolans (I).
جلس نباتات برية وزراعية زنبينة من فصيلة النوليات. انواعها عديدة منها المشي والجانيبي والحولي والحول والمعمر. سيقانها لا نظامية الجلوس منها المتصبية والمستطيلة والمادة. اوراقها كاملة متعقبة متعاقبة او توائية. ازهارها فردية التجميع، محورية الانكاز، جرسية الشكل، غارفة الاطراف كالبرق. ثمارها نورية لا قياسية الشكل والحجم. بلورها خشية المادة. شديدة الصلابة || ارفع انواعها الزنبينة واشهرها ما يليج.

٢٩٤٥١ - نُولَان مِرْمِيْجِي الْوَرَق

Nolana scripifolia (S), Nolane à feuilles d'arroeche (F).
نوع من النولان الزنبيني الحولي. موطنه الاصل بلاد كولومبيا. ساقه مستطيلة مدادة زياء اللحاء. اوراقه الجلعية كبيرة القد مرميية الشكل. ازهاره زرق الابواب، صفر الانابيب والفجاج || تنزرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٤٥٢ - نُولَان سِنَانِي الْوَرَق

Nolana lanceolata (S), Nolane lancéolée (F).
نوع من النولان الزنبيني الحولي. موطنه بلاد الشيلي. جلعه جني الجذر. ساقه مسطحة زياء. اوراقه لائفة، ساعدة، سنانية النصل، خلية البشرة، الجلعية منها ضمية التجميع والاخرى توائية. ازهاره كبيرة القد سمانجولية الابواب، صفر الفجاج والانابيب المسننة بالنفجسي. تنزرها يستمر من حزيران الى ايلول.

٢٩٤٥٣ - نُولَان مُسْتَقِلِس

Nolana paradoxa (S), Nolane paradoxe (F).
نوع من النولان الزنبيني الحولي السبروتي. موطنه الاصل بلاد البرازيل. ساقه متصبية فراء، زياء اللحاء، تعلو نحو ٣٥ سم. اوراقه توائية ساعدة، لصلها مسوية الشكل، خلي البشرة. ازهاره بنفسجية الابواب، صفر الانابيب، حمر الفجاج || تنزرها يستمر نحو ٥٥ يوما.

٢٩٤٥٤ - نُولَان مُسْطَح

Nolana prostrata (S), Nolane couchée (F).
نوع من النولان الزنبيني الحولي السبروتي. موطنه الاصل بلاد البرو. ساقه مستطيلة مدادة. اوراقه متعقبة متعاقبة، نصلها اهليلجي الشكل، مائل الصفحة، جبل الخضار الزاهي. ازهاره زقاء اللون، مسننة بالنفجسي كورسها هرمية الشكل، حاسبة الفصوص المتساوية الزحيرة الاطراف. تنزرها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٤٥٥ - نُولْمَانِيَات

Nolanaceae (S), Nolanaceae (F), Nolanaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها قلية العدد.

٢٩٤٧٤ - نِيْسَالَة ٥ Orogenèse, Orogénie (F).

النياقة فرع من الجيولوجية والجغرافية الحكومية يبحث في تكوين الجبال انطلاقاً من السدانة والكثافة .

٢٩٤٧٥ - نِيْسَاهِكَة ٥ Zoogenie (F), Zoogeny (E).

النياهة فرع من الزولوجية يبحث في نشوء الانواع الحيوانية وفي مدارج نموها .

٢٩٤٧٦ - نِيْسَة Animus (F).

هي الدافع الباطني الحقيقي للعمل .

٢٩٤٧٧ - نِيْسَة التَدَلِيْس ، نِيْسَة الغش ٥

Connellium fraudis (F).

هي قبة اجرامية يستدل عليها من معرفة المدين مدى الضرر الذي يلحق بخدماته عند قيامه بعمل يجعله مفسراً او يزهد في اصراره .

٢٩٤٧٨ - نِيْسَة التَمَتُّك Animus domini (F).

هي ان يتصرف المرء في المال كتصرف المالك له سواء كانت ملكيته حصرية أم غير حصرية .

٢٩٤٧٩ - نِيْتَرَات Nitrate (F).

النترات، كبريتات، ملح يحصل من تآكسد الحامض النيتريكي مع احد الاجسام . وهو من الاسمدة الازوتية المشهورة الشائعة الاستعمال نظراً لسرعة انفعاله في التربة وقرب تناوله من النبات الذي يغطها دون جهد او عناء . النتراتات او الاسمدة النيتريكية عديدة غلظة التراكيب والمصادر اعرفها واشهرها استعمالا ما يتبع .

٢٩٤٨٠ - نِيْتَرَات الامُونِيَاك ، نِيْتَرَات النشادر Nitrate d'ammoniaque (F).

احد السمدة الازوتية التركيبية يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع الامونياك . يحوي نحو ٣٥٪ من الازوت الصافي منها ١٧.٥٪ ازوت نيتريكي و ١٧.٥٪ ازوت امونياكي . لذلك فهو يجمع بين سرعة انفعال وتحميل النترات وبين بقاء انفعال وتحميل الامونياك الذي يوافق اقسام الاكبر من دورة النبات الشولية او الحولية .

٢٩٤٨١ - نِيْتَرَات البوتاس Nitrate de potasse (F).

سماد ازوتي بوتاسي يستحضر من تكرير ملح البارود وتصنيعه مع البوتاس . يتميز بفسالة نسبة رطوبته اي لا تفوق ٤٪ وهو يحوي من ١٢ الى ١٤٪ من الازوت النيتريكي ومن ٤١ الى ٤٦٪ من البوتاس . || مظهره الخارجي ملح يتبلور ابيض اللون . ارتفاع نمته يجعل استعماله عسوراً بزيادة الانحلال .

٢٩٤٨٢ - نِيْتَرَات الجير ، نِيْتَرَات الكلس Nitrate de chaux (F).

سماد كبريتي مركب من تآكسد الحامض النيتريكي مع الكلس . وهذا الحامض النيتريكي يستحضر اما مباشرة بتسليط القوس الكهربائي على الازوت الجوي او باكسدت الغاز الامونياكي . يسهل استحصاله من ازوت الجو . وهو يحوي ١٥.٥٪ من الازوت النيتريكي ونحو ٢٨٪ من الكلس . تأكله مع الكلس يجعله اسرع الاسمدة انفعالا وتحميلاً وأكثرها ملائمة لجميع الارابة . || اما محاذيره فهي سرعة تحمله وتقلصه من التربة ، انقلاص نسبة رطوبته التي تبلغ ٥٥٪ . علم قابليته المزج مع الاسمدة الاخرى

٢٩٤٧٢ - نُؤُون الكئين هو الحوت . ج نينان وأوان .

٢٩٤٧٣ - نُؤُون بَحْرِيّ Anguille de mer (F).

سمكة بحرية تسمى زرقونية مبلولة ، اطلبها .

٢٩٤٧٤ - نُؤُونَة ٥ ، أَفِيَا Aphya pellucida (S).

Athérine naine, Nounat (F). Athérine (E).

سمكة وصيدة الجنس والنوع من فصيلة القويديات . جسمها عادم السيف ، صغير القد ، دقيق الشكل ، يطول نحو ٥ سم . || يكثر وجودها في بعض الانواع قرب الشطوط البليانية . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

٢٩٤٦٥ - نُؤُونَة ٥ Phytogénèse (F).

Phytogenasy (E).

النوعة نمو النبات وشماحه .

٢٩٤٦٦ - نُؤُونِيَات Pileoporaceae (S).

Pileoporaceae (E).

فصيلة الفطور الثورية من رتبة الزقيات .

٢٩٤٦٧ - نُؤُونِيّ Nucléaire, Nucléal (F).

٢٩٤٦٨ - نُؤُونِيّ Drupe (F), Any stone-fruit (E).

كل ثمرة لحية ذات نواة اي عجينة كالمشقة والفرزة يكون فيها السويق اي الجزء المتوسط الكائن بين القشرة والعجينة لحمي التركيب ، ويكون الجزء الداخلى الذي يحيط بالبررة قاسياً صلباً كما في عصمة الزيتون والحمصة ...

٢٩٤٦٩ - نُؤُونِيّ ٥ Oospore (F), Oospore (E).

النوية بوفرة غقيات الوليج .

٢٩٤٧٠ - نُتِيم

هو الصبيح اي صوت اليوم . قال الاعشى يصف لالا :
« لا يسمع المرء فيها ما يؤنس »
بالل الّا نُتِيم اليوم والنضوا »

٢٩٤٧١ - نُتِيَادَات ٥ Unionidae (S).

Unionides (F), Unionidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحيرات وانهار العالم || اصداؤها نظامية ، متساوية المصارع ، لامتناهية الاصلع ، ملونة ، يمشها ادمة خضراء . اجسامها مائحة المنحني ، مستطيلة الاربعين الصفيحية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها النيسادة والندرية والمربنة والمربنة والوثينة والمربنة .

٢٩٤٧٢ - نُتِيَادَة ٥ Unio (S).

Mulette (F), Unio (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة النياتاد . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منتشرة في جميع انحاء العالم وتبصراته || اصداؤها كبيرة القد او متوسطة ، بيضية الشكل ، متساوية المصارع ، يمشها من الخارج ادمة يكثر فيها اللون الاخضر ويمشها من الداخل طبقة صميكة للؤلؤة المادة شائعة الاستعمال الصناعي || تعيش منتشرة في الاسماط والارمال .

٢٩٤٧٣ - نُتِيَاط

التباط نجان نيران من كوكبة برج العقرب موضعها قدام القلب وعقله .



نِيَادَة

٢٩٤٩١ - نِزْدُون - خِبر مَتْن .

أصعبها السوروفوسفات ونترات الصودا وسلفات الامونيوك والاسمدة العضوية .

٢٩٤٩٢ - نِزْكَة Curura (F), Dirt, Muck (E).

وسل مستخرج من قنار أو خثثق .

٢٩٤٩٣ - نِزْدَنَات Phrynomeridae (S).

Phrynomeridae (F), Phrynomeridae (E).

نفسلة حيوانات ديداء قارئة شائعة من لمة الخديجات وبرتية السفليات ورتية البترانيات أي عديمات اللبب || اجناسها وانواعها قليلة العدد مهدها بلاد افريقية الشرقية والجنوبية . جميعها من الصفاد الصغيرة القته . تتميز بساوات سطح عضلي قويها الصدري في مركز تلافيها وتندد التنوات العظمية الجانبية في فقرة العنبر . وروسيا صغيرة . فكوكها العليا مسننة . اصابع قوائمها الانامية والخلفية طويلة من كل صلاب تحمل في اطرافها طباط حبيبية تمكها من لسق السطح المسننة ، جلوهها مائلة ، عادمة القمل ولكنها تفرز ، مع اللقيح عليها ، مادة كاثوية تعمل في اليد ما يفسد نبات القراص الحرق || انجاسا مختلفة الالوان يكثر فيها الاسمر الداكن والرقشة الصفراء وبعض الخطوط القاطبة || سطح انجاسها يعيش على النباتات والاشجار القريبة من الماء .



نِزَل

٢٩٤٩٤ - نِزْشَر Propagula (F).

النَّزَر جهاز التناسل عند العنكب . وهو مركب من عدة حبيبات زئبدية ، وشية الشكل ار عسكية . يسقط عند الادراك اتمام نيتش في التربة ويمد الدورة الحياتية .

٢٩٤٩٥ - نِزْدَنَة Melanargia galatza (S).

Mélargie galatze, Demi-douil (F).

Melanargia galatza (E).

حشرة من فصيلة المانبات ورتية حشرقيات الاجنحة . موطنها يحد من الشرق الاوسط الى معظم الاقطار الاروية . قرايتها واسعة قوتها مشر الاضرار . سرقتها تعيش على صنف الذكيتل والرفول والعصوية والنف || جسمها متوسط القند يطول نحو ١٨ م . مسقطها نحو ٤٨ م . راسها الى الربعة . حينها كبيرتان . زياناها صوبلانيان اسودان . جوشها الى الربعة السوداء . يغطيها الى الربعة || رواشها ، عند الشقين ، الى البياض الاخير يطول يتبعج وتزويق وتتميق اسود || لها جبل واحد في الخيل . تظهر القراشة في حزيران . تسرح من الخفض الى قمة الجبل . تماثل بعد ظهورها بنحو ثمة اسابع وتمتد المكنر لخطا على الصفصعات السفلى من نصال الصف || السرعة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ م . جسمها اسطواني الشكل . قشورها ناعم الحمل القصير . ثوبها الى الربعة اخضرها يطولها عطان جانبيين اصفران يشع بجسي اسود . راسها اسود . شرجها ينتهي بزايدة مغلقة . منها ودراجها الى السورة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في التربة ضمن غلاف عضوي المادة .



نِزْدَة

٢٩٤٩٦ - نِزْدَة Neda (S), Nédas (F), Neda (E).

جنس حيوالات بحرية من الرخويات مديات الاربل خلفيات الخياشيم وفصيلة الكتكتيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصطلها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط . تعيش لاصقة بالصخور القريبة من الشواطئ || اصداها داخلية ، مستديرة ، رقيقة ، شديدة الصغر . اجسادها نحلة ، مستطيلة ، مدببة المقدم والمؤخر . اعطائها

٢٩٤٩٣ - نِزَارَات الشَّيْبِي ، نِزَارَات الصُّودَا Nitrate de soude de Chili, Nitrato de soude naturel (F).

سماد ازوتي يستخرج من كلش مناج الشيلي بعد تقويته وتسبيبه ويصير مائه . مظهره الحاربي ملح ابيض اللون يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي وبعض القوي الزئبد من عناصر اليود والبروم واليورق والمينزا يضاف اليها بعض تولاه الاكثار الثانوية . || وهو سريع الانفعال في التربة قريب التمثيل من النبات غير انه يملط تماسك ذرات التربة الذي يحد من رفايتها . لذلك ينصح باستعماله في التربة الخفيفة القليلة الانساج وبعد استعماله في التربة المتصبة او الحامضية الدائف لانه يحميد تفاعلها نتيجة تماسك ذراتها .

٢٩٤٩٤ - نِزَارَات الصُّودَا التَّصْنِيعِيَّة Nitrate de soude synthétique (F).

سماد كبري ازوتي سريع الانحلال والتشليل ، يستخرج من ازوت البحر ، يحوي من ١٥ الى ١٦ ٪ من الازوت النيتريكي . يقال فيه ما قيل بنترات الشيلي من حيث نتائج الحكمة والكبرياء على ذرات التربة وانفعالاتها .

٢٩٤٩٥ - نِزَارَجِين Nitragine (F).

مستحضر ازوتي سائل المادة ينتج من تكثير جرالم التربة صناعيا . || يستعمل حشا بالتربة لمدها بجرالم النيتروجين .

٢٩٤٩٦ - نِزْرُوبَتَان Nitropotasse (F).

سماد كبري يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع البوتاس . تركيبة ٢٥ ٪ بوتاس و ١٦,٥ ٪ ازوت نصفه تماما نيتريكي والنصف الاخر امونياكي . يستعمل في الاسمدة الجلييلة للتع والفايدة غير انه يشكو من ارتفاع نسبة رزفه التي تبلغ ٣٤ ٪ .

٢٩٤٩٧ - نِزْرُوجِين Nitrogène (F).

نور الازوت ، الخلية Nitrogen (E).

٢٩٤٩٨ - نِزْرُوسُفَات Nitrophosphate

سماد كبري يستحضر من تفاعل الحامض النيتريكي مع السلفات المهدق . تركيبة ١٤ ٪ من الحامض السلفوري الذي يلوي في الماء و ٧,٥ ٪ من الازوت النيتريكي السريع الانفعال . يستعمل في الاسمدة النشطة التي تحسن النبات على الاضرار .

٢٩٤٩٩ - نِزْرُوسُفِيل Nitrophile (F).

نعت ترميني يطلق على كل نبات يرغب في التربة الننية بالنترات وقد يطلق على التربة ايضا قنطول تربة نيتروفيلية .

٢٩٤٩٠ - نِزْكَة Nitala (S), Nitala (F).

جنس حشرات نائمة من الصغريات الغشائية الاجنحة المنصورة . انواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها صغيرة القند طولها يراوح من ٢ الى ٥ م . انجاسا مختلفة الالوان يكثر فيها الاسود والاصفر الصنالي . قوتها الاستعمارية غيطة منفرجة الاطراف . مرانها شذانية الامة الحادة . || قوتها التزويبات من اي نوع كانت تعلمها بشذائها فتصدر اعصافها وتغفلها الى حيث تلتهمها .

غروبية متوسطة الطول . لولاسها ثنائية ، انبوية مفلوجة السطوح الخارجية .

٢٩٤٩٧ - تيدمس قمصية *

Neides tipularius (S). *Néide tipulaire* (F).

حشرة خاضعة من فصيلة البروسيات ورتبة عثفلات الاجسنة . جسمها صغير القدي بطول نحو ١٠ سم . شكلها وشركتاتها في اتفانها شبيهة بشكل القمص وحركاتها || ثوبها الى الخطي الاسمر . رأسها مكور ، مستطيل الخلف . ميتاها جانبيتان ، صغيرتان . زباناها دقيقتان ، مستطيلتان كوسلها شبه غروبي الشكل . حجبها ضيقة ، صغيرة . ظهورها ضيق لاحق . قوائمها مستطيلة . الصفحة السفلى من بطنها وصدرها الى السرة السوداء || تألف الجبراي والمواقع التي تكثر فيها الاعشاب اعصها الجراب . قوتها الاوراق .

٢٩٤٩٨ - تيدمان * ، ليدمان ، وزد الشمس
Drosara (S). *Drosara*, *Rosée du soleil*, *Rosella* (F). *Sundew*, *Lustwort* (E). *Runder Sonnentau*, *Rosellkraut* (D). *Drosara*, *Rosolida*, *Erba da gottau* (I).

جس نباتات عشبية مفترسة ممرمة من فصيلة النيدمانيات . انواعها المعروفة زهاء ١٠٠ . جميعها ميناغة تعيش في المناطق والمطارب والمواقع الرطبة . سوقها مقرة . اوراقها قرصية الانتساب مستطيلة الاعناق . ازهارها خماسية الاجزاء تقوم على شاربغ دقيقة متصببة توسط الاوراق . || اقتراشا الحشرات يم بواسطها اوراقها المستترة ، للمفترسة التصل للمروز بالولاس الدافقة التي تقصر كل حشرة تقرب سها تم تقضي عليها وتمتصها بعد ان تفرز لولاسها الصمارة الحامضية الحامضة اللازقة . وعند نهاية عملية الامتصاص يعود التصل الى ما كان عليه وتعود اللولاس الى الانتصاب وفرز المواد النافقة بانتظار فريسة جديدة .



تيدمان

٢٩٤٩٩ - تيدمانيات

Droseraceae (S).

Droseraceae (F). *Droseraceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القامات مرتفعات المبيض . انواعها المعروفة عديدة تجتمع الى ستة اجناس اشهرها التيدمان والكنافش والديونه . جميعها اعصاب مقرة معمرة ترطب في المناطق وفي الارربة الطرية الرطبة . اوراقها قرصية الانتساب . ازهارها خماسية الاجزاء . ثمارها جراد يضيء الشكل . بزورها آسية الصلام . معظم انواعها من النباتات المفترسة التي تحول اجسام الحشرات الى مواد منبهة تمتصها بلولاسها .

٢٩٥٠٠ - فيتر

Joug (F). *Yake* (E).

عشبة مختلفة الاشكال والاحجام توضع في حق اللوزر او على راسه يستطيع بواسطها من جر الاثقال والحشرات وما اشبه .

٢٩٥٠١ - فيتر *

Lucicola (F).

نمت ترمي ي يقلل على الحشرات التي تنس في الظلام .

٢٩٥٠٢ - فيتر التوامين

نجم ثير من برج التوامين . مركزه قبالة رأس التوام الماؤسر . يبعد عن الارض نحو ٢٨ سم ضوئية .

٢٩٥٠٣ - فيتر احصامه

نجم ثير مزدوج من كوكبة الحماة ، يدهي الفاعنة ، اطلها .

٢٩٥٠٤ - فيتر الرأس

فير الرأس نجم ثير من كوكبة المرأة المسلسلة .

٢٩٥٠٥ - فيتر الزورق

فير الزورق نجم ثير من كوكبة النهر .

٢٩٥٠٦ - فيتر السرة

فير السرة نجم ثير من كوكبة المرأة المسلسلة .

٢٩٥٠٧ - فيتر السرطان

فير السرطان نجم ثير من كوكبة السرطان .

٢٩٥٠٨ - فيتر الفكة

فير الفكة نجم من كوكبة الاكليل الشمالي ، يوجه خلف الهالك الرابع ويدهونه قصعة المساكين .

٢٩٥٠٩ - فيتر القدم

فير القدم نجم ثير من كوكبة المرأة المسلسلة .

٢٩٥١٠ - فيتر قنطورس

فير قنطورس نجم من كوكبة قنطورس يدهي حضار ، اطله .

٢٩٥١١ - فيتر نعيم

Alpha de la Croix du Sud (F). *Cruix* (E).

فير نعيم نجم ثير من كوكبة صليب الجنوب المعروفة ايضاً بنعيم . يبعد عن الارض نحو ١٠٠ سنة ضوئية .

٢٩٥١٢ - فيتر

Nereia (S). *Nérée* (F). *Nereia* (E).
جس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل خلفيات انباشم وفصيلة السلييات . انواعها المعروفة قليلة العدد اطلها تمخ من المحيط الهندي الى البحر الاحمر || اجسامها عريضة حلالية مستطيلة محدبة الظهور الثنائية الاخاذيد ، رباعية الزوائد الجناحية الشكل . رؤوسها صغيرة مكورة ، ثنائية اللولاس الدوسية . عياشيمها انبوية الشكل تطلق الزوائد .

Sui generis

٢٩٥١٣ - فيترج

لكل زهرة او ثمرة او مادة ضوئية او جسم حيواني زائفة خاصة فارقة مميزة . فالترج هو تلك الزائفة الخاصة المميزة

٢٩٥١٤ - فيتر فيترجيه

Nierembergia (S).

Nierembergia (F).

جس نباتات عشبية مدادة ممرمة من فصيلة الباذنجانيات . صفوية التبريف على اسم العلامة « ليربيرج » . سوقها تطول من ٢٥ الى ٩٠ سم . اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام . ازهارها بيضاء اللون او ليلية . انابيبها مستطيلة . بتلاتها فارقة . منهاها بعض مناطق اريكة الجنوبية || انواعها المعروفة ، متوسطة المدد اشهرها التالية .

٢٩٥١٥ - فيتر فيترجيه كدنة

Nierembergia frutescens (S).

Nierembergia frutescens (E).

منها الشيلي . ساقها كدنة خلية اللحاء تطول من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقها صغيرة معتدلة المرض . نصالها خلية

٢٩٥٢٤ - نيسان (F) April (E).

يعرف أيضاً بأبريل. الشهر الرابع من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع التي تنتفح فيها بنشاط طاقة النشو الطبيعية. مدته ثلاثون يوماً.

لقومه الزراعي : الاعمال الزراعية الواجب تنفيذها في هذا الشهر أو الممكن إنجازها فيه منوعة وعبدة انحصار.

في الزراعات العامة الموصية

— بلر القطن بعد تحضير التربة وتوزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة لانه من النباتات المبكرة التي تستدق خواص التربة والتي تتطلب الكثير من المواد الغذائية.

— متابعة تحضير التربة وتثر الاسمدة الكيماوية الحديثة لزراعة التبغ قبل انقضاء التوتيرة الأولى من هذا الشهر.

— متابعة الاعتناء بمشاكل التبغ وقلعها من الحشرات والأمراض الفطرية.

— توزيع آخر وجبة من الاسمدة الأزوتية النباتية على ذروع القمح المتناغرة.

— الأسراع في زرع البصل المتأخر قبل حلول التوتيرة الثانية من الشهر.

— مباشرة زرع الشتول السكري بعد تحضير التربة ومدا بالاسمدة اللازمة مع العلم ان الشتول يرغب في التربة الغنية بالمواد العضوية.

في الاشجار المثمرة

— متابعة التطعيم في المناطق المتناغرة.

— السهر على حياة الاشجار المثمرة من صقع بعض الياالي الصافية الايام وقد يتم ذلك باستهلاك غيوم اصطناعية من النحاس الكثيف.

— متابعة جمع اعمال مكافحة الحشرات والاصنام النباتية.

— مباشرة مكافحة ديدان الثمر في التفاح والاباجوس والخوخ .. على اثر سقوط ثمرات الزهرة.

— الابتداء بحرق التربة او ركاها مع طمر الاشباب التي كانت فيها شرط ان يكون العقد قد جاوز حجم حبة الخمس.

في المحاصيل

— حرق تربة البساتين واقتلاع جميع الاشباب وطمرها.

— تشليب الاشجار واقتلاع الفروع الزائدة او الاستئناسة.

— متابعة توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة.

— حضن المطاطيم الجديدة عروقاً عليها من لدنة الشمس.

— عدم تأخير تقاطف الاشجار التي بشرت بالانزهار.

— مباشرة مكافحة ذبابة البحر للنشوط.

في الموز

— اقتلاع جميع الشتول الفتية الضعيفة او الزائدة عن الحاجة.

— توزيع النشوب القريبة من الاكباس بقليل من الاسمدة السريعة التشتيل.

في الزيتون والكرمية

— متابعة حراثة الزيتون وانجازها قبل ابتداء الثل.

— حراث الكرمية حفاظاً على رطوبة تربتها ولقصاء على الاغصان الضارة.

— تغيير اوراق الكرمية بالكبريت الميكروبي، على سبيل الحيلة، في المواعيد المعرضة للارصاد.

في الخضر

— بلر وزرع جميع الخضار الصيفية التي تملد ذرعها في الشهر الماضي نظراً لمطغ التربة ونوعيتها.

البشرة لونها الى الخضار الباهت. انجازها ليلكية الين قمرها نحو ٢٥ م. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف.

٢٩٥١٦ - نيرمبرجيه نهريه

Nierembergia rivularis (S).

Nierembergia des ruisseaux (F).

منبتها ضفاف نهر البلات. ساقها مسطحة تطل نحو ٤٠ سم. اوراقها مسطحة الشكل. فصاعداً عادةً، أمل، جيلة أخضر المايق، تطل نحو ٣ سم. انجازها عاجية الين، فواحة الثرف. تطرها نحو ٤ سم. طولها من ٣ الى ٥ سم. || تنويرها يستمر طول شهر تموز.

٢٩٥١٧ - نيرمبرجيه نهريه

Nierembergia gracilis (S).

Nierembergia grêle (F).

منبتها الاربعين. ساقها هزيلة مسطحة تطل نحو ٥٠ سم. اوراقها ضيقة، شبه خطية الشكل. ساقها واوراقها كثيفة الخمل والذنب. انجازها ليلكية الين يملوها مبالغ بنسفي. توزيعها الى البياض الارزق المواج || تنويرها يستمر من حزيران الى آب.

Nérôl (F), Neroli (E).

٢٩٥١٨ - نيرولي

هو عطر القنداق أو دهن القنداق المستقطر من زهر النارج المعروف بالقنداق.

٢٩٥١٩ - نيرون الزيتون *

Philcötribus olea (S). Néiroun, Rongeur de l'olivier, Scolyte de l'olivier (F). Philcötribus olea (E). Ölbaumborkenkäfer (D).

حشرة من الكرشيات القدييات الاجنعة. طولها نحو ٧ م. قوما الى السواد اللامع يملطو تجلجخ خلي اخير. زيانها دقيقة صفية الاطراف. || تركب الزيتون واليالك والمراش. انماها تنجح الممكن في العماء وقد تخلج الانثان عند اقتحاب السنايل الزهرية. ينشق الممكن عن مرققات خائبة تخلج الشكير تنصلب. || يكافح باقتطاع وحرق الاجزاء الصافية في غضون شهر نيسان.

Nerinea (S).

Nérinée (F). Nerinea (E).

جلس حيوانات من الرضويات معديات الارجل وفضيلة اثرينيات. افرها المرفوقة قليلة العدد جميعها من متحيرات الاحقاب الثانوية || اصداها مردنية مستطيلة قريبة الشبه بالسرديات.

Neriniidae (S).

Neriniidae (F). Neriniidae (E).

فضيلة من الرضويات معديات الارجل. اجناسها وانواعها المرفوقة قليلة العدد جميعها من متحيرات الاحقاب الثانوية || اعرف اجناسها الثريية.

٢٩٥٢٢ - نيريب

النيرب هو قصب ذكور الاغنام والظباء.

Bolide

٢٩٥٢٣ - نيريك

جسم صلب اللد شارد في القضا يعبر الاجواء الارضية وقد يستقر على الارض.



نيرون الزيتون



نيرية

Désinsectisation (F). ٢٩٥٣٣ - نَيْسَبَة

Arête d'une montagne ٢٩٥٣٤ - نَيْسَب
Ridge, Crest (E).
أعلى نقطة أو مِيق في قمة جبل . ج. نَيْسَب وَأَنْسَبَاق وَنُسُوق .

Patricola (S). ٢٩٥٣٥ - نَيْسَب *
Pétricola (F). Petricola (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة النيكيات . أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في
معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة القد . تعيش
شعابها بارزة طليقة . أصدانها شبه مظلية الشكل . تعيش
في الانفاق تنقبها في الصخور المغسورة بالماء . لفيها غزير
المادة .

Patricolidae (S). ٢٩٥٣٦ - نَيْسَبِيَّات *
Pétricolidae (F). Petricolidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم ،
تنتمي إلى مرتبة النوتيات . أجناسها وأنواعها الغالبة عديدة
أما الممارسة فقليلة جميعها مصفدة رباعية الأضلاع
كانخياشيم ولثامها والأذنين . أعطانها معظم بحار العالم .
تعيش في انفاق تنقبها في الصخور المغسورة بالماء ||
أعرف أجناسها وأشهرها النَيْسَب والناريس .

Nika (S). Nika (F). ٢٩٥٣٧ - نَيْسَكَة *
جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل
وفصيلة النيكيات . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في
معظم بحار العالم || ملحيها الحيواني جماعي . تسرح قرب
الجبال والشطوط جميعها جيدة الصنف مأكولة كالعنبر .

Nickel ٢٩٥٣٨ - نَيْكِل
معدن أكهب ألون الفاتح اللامع ، شديد الصلابة ولثامته ،
يزنه (في Ni) وزنه الذري ٥٨.٩٩ ، ثقله الذري ٩
ينصهر في ١٤٥٠ °س . وهو قليل التأثير بالهواء
الجوي ، قابل للتلفظ والطرع والسحب . يدخل في تركيب
أكثر السبائك لانه يكسبها من صلابته وبتأثيره ويزيدها
من قابليته للسحب . وهو يستخدم أيضاً بكثرة في عملية
طلاء المادن .

Nicotine (F). ٢٩٥٣٩ - نَيْكُوتِين
وهو من قائل تبين . مادة قلوية جسمية شديدة اللطخ
والقوة لتسخر من التبغ . || وهي تستعمل تحت شكل
سلفات النيكوتين في القضاء على بعض الحشرات الزراعية

Nicotianées (F). ٢٩٥٤٠ - نَيْكُوتِيَّات
هي التنباتات ، راجعها .

Nikidae (S). ٢٩٥٤١ - نَيْسِكِيَّات *
Nikidae (F). Nikidae (E).
فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل ،
طويلا الذليل . أجناسها وأنواعها عديدة منتشرة في جميع
بحار العالم || أجسامها صغيرة قريبة الشكل بالشبه بالعنبر .
مناكها قصيرة . الزوج الامامي من قوائمها مجهز بمخالب
صغيرة . الزوج الثاني مجهز بمخالب ذرية || أوتابها جميلة
الألوان القسطنطينية الزاهية || أشهر أجناسها النَيْسَكَة .

في الزهور
- بلر الأنواع المتخارة ونقل الثقل الصالحة إلى مستقراتها
- المحافظة على التباينات والورود من عبث الحشرات
المتطفلة والأوصام الفطرية .
- الاحتناء بالنسب والتقليم .

في الدجاج والنحل
- متابعة حفر وترعيم البيض والعناية بالصيصان .
- تحصيل التفراؤ أو الخلايا اللازمة لتقبل الاثوال
الجديدة .
- البدء بنقل الناحل إلى الاماكن الموصوفة بمجدة مرثما
المعري .

٢٩٥٢٥ - نَيْسَب ، نَيْسَبَان
طريق النمل إلى زيبه .

٢٩٥٢٦ - نَيْسَم *
Event (F). Blow-hole (E).
مخرج بخار الماء من فتحة الحيتان وبعض الاسماك . ج. نياسم .

Nysson (S). ٢٩٥٢٧ - نَيْسُون *
Nysson (F). Nysson (E).
جنس حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة
الحمويات . وفصيلة النيسونيات . أنواعه المعروفة نحو ٩٠
منتشرة في جميع اقطار العالم القديم || أجسامها صغيرة
مخسورة . رؤوسها مستديرة . تذكراها نظيفة ، حادة .
عينها كبيرة ، نافذة . قرونها الاستشعارية عجيطة ،
مستطلة . اجنتها شبه شفافة . بطونها اهليلجية . أثوابها
إلى السرة المتفاوتة السود يعطيها في بطونها تبايع طوي
يراح من التبي إلى الاصفر النحبي .

Nyssonidae (S). ٢٩٥٢٨ - نَيْسُونِيَّات *
Nyssonidae (F). Nyssonidae (E).
فصيلة حشرات قانصة مفترسة من غشائيات الاجنحة
الحمويات . أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في
جميع اقطار العالم || جميعها جهالة تقيم عشوائها في التربة .
أجسامها صغيرة ، مخسورة ، ملونة . اجنتها وقوائمها
نظيفة . قرونها الاستشعارية عجيطة ، مستطلة ، متعقدة
الاطراف . تلص طرائدها فتضدعها وتنقلها إلى عشوائها ||
أشهر أجناسها النيسون والفوريت .

٢٩٥٢٩ - نَيْسَان
Epi (F). Tufe (E).
هو الدائرة من الشعر .

٢٩٥٣٠ - نَيْسَ
Porc-épic commun (F).
هو الشيم الملبول ، اطلبه .

٢٩٥٣١ - نَيْسَمِيَّات *
Chiloptomates.
Chiloetomés (F).
رئيسة من الحيوانات الطليعية الفيكليات . فصائلها
وأجناسها عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة
والبعض الآخر معاصر . جميعها منزلة ضمن حبيرات
قرنية المادة أو كسبة تعلوها اسفاط نافذة كالكشاه تنقسم
وتنصل حسب الحاجة .

٢٩٥٣٢ - نَيْسَبَة غِذَايِيَّة
Relation nutritive (F).
Nutritive relation (E).
هي النسبة الغذائية أي نسبة المواد الازوتية إلى غيرها من
المواد الغذائية القابلة للانقسام في كل حلف .



نَيْسَب



نَيْسَكَة



نيل

٢٩٥٤٩ - نيل هندي
Indigofera indica (S).
Indigotier hirsuta (F).
 نوع من النيل الأزرق، يجلبه تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها فناء. أوراقها كبيرة عديدة الوريقات الانطوائية الترتيب التي يراوح عددها من ١١ إلى ٣٣، نصلها سناني الشكل، خلى البشرة، أصعب الملوخ. أزهارها عقودي التجميع كبير اللد محوري الارتكاز. أزهارها إلى الحفرة الزامية البنفسجية الملوخ. انتاجه الحضاني وافر المادة متوسط الصنف.

٢٩٥٥٠ - نيلكة
Indigo
 خشاب أزرق يستخرج من ورق النيل وسوقه.

٢٩٥٥١ - نيلكة صينية
 هي البساط النيل، اطبله.

٢٩٥٥٢ - نيلنج
 هو اليك، اطبله.

٢٩٥٥٣ - نيلك *
Dryobalanops aromatica (S).
Dryobalanops aromatique (F).
 شجرة حرجية وصناعية وصيد الجنس والنوع من فصيلة التيفليات. اعطائها نحت من الهند إلى الهند الصينية وجزر الزايج || هيكلها جميل القلب. ساقها لمساء. أوراقها متعاقبة معتقة. نصلها جامدة، سنانية الشكل، شديدة الحصار الزاوي. أزهارها عقودي التجميع. ثمارها تقية وفيه بطولها تفروق خالي القصل المستطيلة، الميتة || وصنما يبلغ هر الشجرة نحو ١٥ سة تتشقق ساقها طولا ويرشح منها دهن كالغوري فاجر الصنف، يدعى كافور بورنيو أو بورنيوط.



نيلك

٢٩٥٥٤ - نيلن
 سد نسيجي تركيبى شائع الاستعمال.

٢٩٥٥٥ - نيلنج
 هو النيل، اطبله.

٢٩٥٥٦ - نيلوفر، نيلوفر، بنشين
Nymphaea (S). *Nénufar*, *Nénuphar* (F). *Water-lily* (E). *Seeros* (D). *Ninfea* (I).

جس نباتات عشبية جلمودية مائية من فصيلة النيلوفر.ات. انواعه المعروفة ٢٥ اعطائها مياه البلاد الحارة والمنتدلة. جلموديرها مبددة. أوراقها وزايعها مسطيلة المعانق طافية. ثمارها جراء كروية الشكل. يزودها نشوية المادة. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.



نيلوفر ابيض

٢٩٥٥٧ - نيلوفر ابيض، بنشين ابيض، عرايس النيل، حفيضة السك

Nymphaea alba (S). *Nénufar blanc*, *Lis des étangs*, *Blanc d'eau*, *Lune d'eau*, *Volet* (F). *Flatter dock*, *White water-lily* (E). *Walse Seeros* (D). *Ninfea bianca*, *Nensafar*, *Luna d'acqua*, *Regina dei laghi* (I).
 اشهر أنواع النيلوفر واشبهها. جلمودية خفيفة متبادلة. اللقد. أوراقه كبيرة اللد تعرض من ١٠ إلى ٣٠ سم. نصلها أخضر البشرة مل صفحية. أزهاره يضاء اللون، عادمة العرف، نظرها يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. ثماره ويطايرها مأكولة. تنوره يستمر من حزيران إلى ايلول.



نيلوفر أزرق

٢٩٥٥٨ - نيلوفر أزرق، بنشين أزرق، كرتب الماء
Nymphaea coerulea (S).
Nénufar bleu, *Lotus bleu* (F). *Blue water-lily* (E). *Blaue Seeros* (D). *Ninfea caelesta d'Egitto* (I).
 نوع من النيلوفر البهري الشائع في مياه بحيرات وأنهار

٢٩٥٤٩ - نيل * ، نيلنج ، حلة

Indigofera (S). *Indigotier*, *Anil* (F). *Indigo plant* (E). *Indigopflanze*, *Anilpflanze* (D). *Indaco*, *Endeco* (I).
 جس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القرنيات القراضية. انواعه زهاء ٢٥٠ منها الحوي والحويل والسر. سوقها فرعا عشوية. أوراقها متعاقبة مركبة زرية الترتيب. أزهارها لا قياسا التجميع بالارتكاز. أزهارها صغيرة اللد تكثر فيها الااليان الوردية والحرارة. جميعها من نباتات المناطق الحارة. معظمها بري وبعضها صنعي يستخرج من أوراقه وسوقه صباغ نيل اللون. اشهر انواعه الزراعية والنزيرية ما يلي.

٢٩٥٤٣ - نيل الصباغين
Indigofera tinctoria (S). *Indigotier des teinturiers* (F).

نوع من النيل الأزرق المشهور. جنته تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه فرعا. أوراقها صباغية أو تساعية الوريقات الرقيقة. أزهارها عقودي التجميع محوري الارتكاز. أزهاره وردية اللون يملؤها موالج اسف. انتاجه الحضاني وافر المادة جيد الصنف.

٢٩٥٤٤ - نيل أنثي
Indigofera decora (S). *Indigotier élégant* (F).

نوع من النيل التزييني. يجلبه تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقه لا قياسا التركيب منها الحامية الوريقات والصباغية والتساعية. وريقاته الهليجية النصل الامرد المالس. طولها يراوح من ٧ إلى ٩ سم. ورضها نحو ٣. أزهارها عقودي التجميع، محوري الارتكاز. أزهاره وردية اللون المايق. تنوره يستمر من ايار إلى آب.

٢٩٥٤٥ - نيل بحري
Indigofera glauca (S). *Indigotier glauque* (F).

نوع من النيل الأزرق. جنته متوسطة اللد تملو نحو ١٥٠ سم. ساقه فرعا. أوراقه مستطيلة، عديدة الوريقات البحرية اللون، الحلية البشرة. أزهارها متكوئي التجميع محوري الارتكاز. أزهاره إلى الحفرة القاحلة. انتاجه الحضاني وافر المادة متوسط الصنف.

٢٩٥٤٦ - نيل حروي
Indigofera arabica, *I. anil* (S). *Indigotier anil* (F).

نوع من النيل الأزرق. يجلبه تملو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. ساقه فناء. أوراقه عديدة الوريقات البيضية النصل الصغيرة اللد. أزهارها متكوئي التجميع. أزهاره إلى الحفرة الزامية. انتاجه الحضاني متوسط اللد والصنف.

٢٩٥٤٧ - نيل فيضي
Indigofera argentea (S). *Indigotier argenté* (F).

نوع من النيل الصناعي والنزيري. يجلبه صغيرة اللد تملو من ٩٠ إلى ٩٠ سم. أوراقه ثلاثية أو خلية الوريقات. وريقاته خلية النصل اللضي، بيضية الشكل، مغطوية الطرف. أزهارها عقودي التجميع. أزهاره وردية اللون بنفسجية الملوخ. انتاجه الحضاني قليل المادة فاجر الصنف. تنوره يستمر من تموز إلى آب.

٢٩٥٤٨ - نيل قمريري
Indigofera atropurpurea (S). *Indigotier cramoisi* (F).

نوع من النيل التزييني. يجلبه تملو نحو ١٢٠ سم. أوراقه مركبة من ١١ وريقة. وريقاته الهليجية الشكل، خلية النصل المتجمع الحار. أزهارها عقودي التجميع. أزهاره قمرزية اللون المايق. تنوره يستمر من تموز إلى آب.



نيلوفر أصفر



نيلوفر الروس



نيلوفر عطر

البرقية الشرقية . أوراقها مستطيلة الاضلاع ، كبيرة النصل القارص . أزهارها كثيرة البتلات مستطيلة المالحق تطفو على سطح الماء . اما اجناسها الخمسة فهي النيلوفر والنوفر والنلنوب والندامة والكبيسه .

٢٩٥٩ - نِيلُوفَرُ أَصْفَرٌ * Nymphaea flava (S). Néoufar jaune (F).

لوع من النيلوفر الأزبى . هذه اهورا فلوريدا ويجربها . جذائره نجيله مستدقة . أوراقها مستوية القند تطفو من ١٥ الى ١٥ سم . وتقرض من ٩ الى ١٢ سم . نصلها عجز الحار ، اخضر الصفحة العليا ، اسفح السفلى . ازهارها مستوية القند لونها الى الصفار الكبريتى . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٦٠ - نِيلُوفَرُ الْعَرُوسِ * Nymphaea lotus (S). Lotus, Nénufar blanc d'Egypte, Lotier d'Egypte (F). Egyptian lotus, White lotus, Sacred lotus (E). Agyptische Lotusblume, Weisses Lotus (D). Loto, L. sacro, L. egiziano (I).

نوع من النيلوفر البربرى للبلول في مياه البلاد الحارة . هذه حوض النيل . أوراقها مستوية القند تعرض نحو ٢٠ سم نصلها اخضر الصفحة العليا بحري السفلى . ازهارها كبيرة الحجم ، بيضاء اللون . ثماره وجذائره واحاق أوراقها مأكولة . تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٦١ - نِيلُوفَرُ عَطَر * Nymphaea odorata (S). Nénufar odorata (F).

نوع من النيلوفر الأزبى . أوراقها مستدقة كبيرة القند قطرها يراوح من ١٢ الى ٣٠ سم . نصلها اخضر الصفحة العليا ، احمر السفلى . ازهارها عطرية العرف ، كبيرة القند ، قطرها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم . لونها الى الياض المالحى . تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٦٢ - نِيلُوفَرُ مَعْدَد * Nymphaea tuberosa (S). Nénufar tubéreux (F).

نوع من النيلوفر الأزبى . هذه البلاد الامريكية . ضروبه عديدة . جذائره متقاربة القند الغنية الفرية الشكل . أوراقها كبيرة مستدقة قطرها يراوح من ١٥ الى ٣٠ سم . نصلها يبدو احمر اللون ثم يتصرف شيئا فشيئا الى ان يستقر على الاخضر الباقي . ازهارها كبيرة القند ، عديمة العرف ، متباعدة الانوار ، منها الياض واللويدي والاجر والقرزوى . تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٦٣ - نِيلُوفَرُ هِنْدِيّ * Nymphaea indica (S). Nénufar des Indes (F). Water-lily, Water nymph (E). Nymphenblume, Seeros (D). Ninfes Indica (I).

نوع من النيلوفر البربرى للبلول في معظم مياه انهار الهند . أوراقها كبيرة القند ثنائية الشكل ، نصلها اخضر الصفحة العليا حطى السفلى . ازهارها كبيرة الحجم ، عديمة العرف ، ثنائية اللون . ثماره وجذائره مأكولة . || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٢٩٦٤ - نِيلُوفَرُ رِيَات * Nymphaea (S). Nymphaeaceae (F). Nymphaeaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القامات . اجناسها خمسة ، انواعها عديدة . جميع نباتاتها جلدورية

٢٩٥٥ - نِيلُوفَرُ * Indigotina (F). Indigotin (E).

هي المادة الملونة في النيل وهي رباعية التركيب بيضاء اللون تتأكسد في الهواء وتزرق . الصناعة الحديثة تستخرجها من النفلتين .

٢٩٥٦ - نِيلُوفَرُ * Nematostylis (S). Nématostyle (F). Nematostylis (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية سرورية من فصيلة السوسليات . منها بعض مناطق امريكة الشمالية . شاربها منتصب ، معتدلة الارتفاع . أوراقها صغيرة ، ضيقة النصل . ازهارها مستطيلة الاذن تتكرر في اباط الشرايف . تزود للزئين في الحدائق . تربى في الارابة المتوسطة الاندماج المنسوبة التركيب المتصنعي الزاخرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة مستقلة العدد ، اشهرها التالية .

٢٩٥٧ - نِيلُوفَرُ * Nematostylis purpurea (S). Nématostyle pourpre (F).

عشبة تزيينية دوفسية جادسة . منها التماسكاس ولوزيانا . شراخها يرتفع نحو ٢٥ سم . أوراقها صغيرة القند ، ضيقة النصل ، زرقية الخضار . ازهارها متباعدة الحجم ، ارجوانية اللون . اسديتها ملتحمة القواعد . متاكها منتصبه المحيوط الجالسة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٥٨ - نِيلُوفَرُ * Nematostylis caelestina (S). Nématostyle céleste (F).

عشبة تزيينية دوفسية جادسة . شراخها يرتفع من ٥٠ الى ٦٠ سم . أوراقها صغيرة ، ضيقة النصل ، زاهية الخضار . ازهارها كبيرة زرقاء اللون . اسديتها ملتحمة القواعد . متاكها حلزونية المحيوط || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٩٥٩ - نِيلُوفَرُ * Nematostylis brunhea (S). Nématostyle brun (F).

عشبة تزيينية دوفسية سرورية . منها المكسيك . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . أوراقها صغيرة الحجم ، ضيقة النصل ، خضلة الخضار الزاهي . ازهارها سماء اللون بنفسجية الموالج . بتلاتها الداخلية موهجة بالاصفر . متاكها جالسة المحيوط || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٠ - نِيلُوفَرُ * Nemespora (S). Némésopore (F).

جنس لطور مجهرية من فصيلة الرغفيات . انواعها قليلة العدد والاذى تتميز بسرطانها الزرقية الملوثة الشج . كئالها اسطوانية ، منقطة ، حلبي الاطراف .

٢٩٥١ - نِيمُوزُومَا مُسْتَيْطِلَةٌ Nemosome elongé (F).

حشرة تدعى اسطوانية الماء ، اطلسها .



ثِيُوت مَبْدُول

Néogène (F).

٢٩٥٧٣ - نِيُوجِين

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الثالث المعروف أيضاً بالاباج الحديث . وهو يشمل العصر الميائي والعصر البليستي || تتميز هذه الحقبة بتطور الثبوت وابتقاء العلم ، بوجه عام ، إلى الحالة الحاضرة . كما وأنها تشهد ، في الزمن الأخير منها ، ظهور أول إنسان على الأرض أو أول شبه بالإنسان .

Neovoasia (S).

٢٩٥٧٤ - نِيُوفُوسِيَه

جلس فطور مجهرية من فصيلة التشريرات . بوله يحمل في اطرافه خيطوط مشجية شفافة . انتاش بوله يتميز بدعيات غروطية الشكل تحمل العديد من البويضات المحلية الضمنية الجميع || الزواحه المؤقتة قليلة الضرر لا تستجيب الناية

Néolithique(F). Néolithie(E). ٢٩٥٧٥ - نِيُولِيثِي

نِيُولِيثِي أو العصر النِيُولِيثِي هو زمن الحجر المصقول .

٢٩٥٧٢ - ثِيُوت مَبْدُول * ، مَبْدُول المَاء المَبْدُول ، مَبْدُول مَبْدُول ، مَبْدُول مَبْدُول

Molge vulgaris, Triturus vulgaris (S). Triton vulgaira, Triton punctué (F). Smoot Newt (E).

حيوان زحاف قازب يبرس من فصيلة السمندليات ورتبة السرفوقيات . موطنه يمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا || جسمه مستطيل الشكل بطول من ١٤ إلى ١٦ سم . الذكر اصفر من الالقي . رأسه غروطي الشكل . عيناه صغيرتان . حنكه كامل التسنين في الفكين . قاعته الإماميتان رباعيتا الأصابع أما الخلفيتان فخاسيتا . جلده مائل للشفار . ثوبه البلوي ، مدبج ووزكش وصنيج بالأسمر والأخضر والأصفر والأسيد . مدبه إلى الكلبة الطحلاء تتوسطها جدة حراء تمتد من الزور إلى المزوق || يتميز بقفل الهمة . يألف التبايع والمناقع . قوته الحشرات والتشرييات والرخويات || يعتبر من القوازب المفيدة النافعة .



٢٩٥٨٣ - هاذة قلبية الورق

Ampelopsis cordata (S). Vigne vierge à feuilles en coeur (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته مدادة عارشة تطول من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها قلبية الشكل، قليلة التفصيص تطول وتعرض من ٥ الى ١٢ سم. تصلها رقيق الصفحة، انضغ القرن، عادم الخمل || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٥٨٤ - هاذة كبيرة الورق

Ampelopsis megalophylla (S). Vigne vierge à grandes feuilles (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته دغلية الشكل تملو من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها ريشية التركيب وريقاتها كبيرة القذ بيضية الشكل تطول من ٦ الى ١٠ سم. تصلها مالم الصفحة اللبسا، خلى السفل، احمر المروق والاخصاب. ازهارها صيدانية التجميع. يزورها سود. ازهارها يستمر طول شهر تموز.

Ampelopsis arborea (S). هاذة مشجرة. *Vigne vierge arborescente* (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته متبعية تملو نحو ٥ امتار. اوراقها ريشية التفصيص، تصلها مالم الصفحة العليا خلى السفل. ازهارها خماسة الاجزاء || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٥٨٦ - هاذة هاتكة

Ampelopsis heterophylla (S). Vigne vierge à feuilles variables (F).

نوع من الهاذ التريبي. جنته عارشة تطول من ٥ الى ٦ امتار. ساقها وفروها جزوية السماء. اوراقها هاتكة لاقياسية التفصيص الذي يراوح من ٣ الى ٥، تصلها مالم الصفحة العليا، خلى السفل. بلورها الى الزرقه التزاوية. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٥٧٦ - هابط، وابط

Descendant (F). *Descending* (E).

هو نقيض الصاعد.

Hétérophylle (F).

Heterophyllous (E).

نمت تعريفي يوسف به كل نبات لانظامي الاوراق تركيا وشكل وارتكازا.

Grenouille female (F).

She-frog (E).

الصفدة الاث. ج حاجات، تصغيرها حويجة وهيبة.

Méridien (F). *Meridian* (E).

النط الزمسي الذي يرتكز عليه قياس درجات الطول.

٢٩٥٨٠ - هاجكة

الهاجة هي النقلة تحمل صلبة.

Ampelopsis (S).

نوع من الجلفة الطراء. انواحه المعروفة ١٢ تتميز بحملتها البسيطة الخالية من الاطياب المحمية وبمخاضن تبين ازهارها القدسية الشكل. واسمته هاذة. || اشهر انواحه التريبية ما يتبع.

٢٩٥٨٢ - هاذة شرقية

Ampelopsis orientalis (S).

Vigne vierge du Proche-Orient (F).

نوع من الهاذ التريبي. هذه الشرق الاوسط. جنته دغلية الشكل تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها ريشية. وريقاتها تملو نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٤. تصلها مالم البشرة على صفحية. ازهارها رباعية الاجزاء. ازهارها يستمر طول شهر آب.



هاذة كبيرة الورق

٢٩٥٩٥ - هَارِجَة الْمَاء *

Acrocephalus paludicola (S). *Phragmites aquatilis* (F).
Aquatic warbler (E).

طائر من الموارزج ، صغير القد طوله نحو ١٤ سم . ظهوره اخضر اللون يجلع بالاسمر . يطن الى البياض الخشن يعلو تسليق اكعب || يأنف ضفاف الانهر والبحيرات ويجوب البلاد في طلب المصيف والمشي .



هَارِجَة الْبَطْلَان

GEIL de l'éléphant (E).

٢٩٥٩٦ - هَارِجَة

هي عين الفيل .

Digestif (F).

٢٩٥٩٧ - هَارُوم ، هَضَام

Digestive (E).

هو ما له قوة الهضم التي تحوّل الاطعمة ويجعلها قابلة للتشبع كالصناعات الهضامة ...

٢٩٥٩٨ - هَات - هَات ورق الشجر ، سقط .



هَارِجَة الْقَصَب

٢٩٥٩٩ - هَاتِل * ٥

Alactaga (S). *Alactaga* (F).
جنس حيوانات ليلية قاضية من فصيلة البوميات . أنواعه عديدة موطنها الشرق العربي ومصر والتركستان والتبت || شكله شكل الجرذ . طوله نحو ٢٠ سم . ذنبه ٢٧ . رأسه صغير القد . عيناه كيرتان . اذناه مستطيلتان .

طول جوارحه الخلفية يبلغ أربعة أضعاف الامامية || قويه الى الصفرة الزهرية ويلبها موانج اصباح . يطن الى البياض . ذنبه صناعي اللون اما الحصلة فبقا . يأنف الاراضي الطينية . جمره فسمرة رحيمة يحمها عن عمق ٦٠ او ٧٠ سم . يغطي فيها بيانه الشفوي . يمتدحها فوق طول مرجع اما مخربها فتقع مستقيم معتدل الانحدار || قوته المولد التنايت على اختلاف أشكالها وانواعها || انشاء تحمل ثمانية اطباء ويقع من ٤ الى ٦ ادراس على ثلاث مرات في السنة .



هَارِجَة الْمَاء

٢٩٦٠٠ - هَات ، هَاتِل ، هِيلُو ، تَاتِلَة ،

شَوْشَمَرَة

Anomom (S). *Cardamoms* (E).

جنس نباتات جلمودوية طيبة عطرية برية وزراعية من سبط الهاليات وفصيلة النجيليات . انواعه عديدة جميعا من نباتات المناطق الحارة || جذاميرها لبرية التركيب . سوقها منتصبة عادمة الفروع . اوراقها لمدية الانتساب متعاقبة . انهارها سليلية التجميع او حكيولية . ثمارها جراد ثلاثية الاضية . بولورها كدعي حب الحال يستخرج منها ادمان عطرية طيارة كانت تفسد في اشهر الطوبير المستصلحة في التحنيط || لبوب جذاميرها وبلورها وادعائها هاضمة ومثبتة للقلب وبقوة الجنسية . مضادة للقتنج ، طاردة الرياح ، سكتة للمص وينارة للعث .



هَاتِل

٢٩٦٠١ - هَال جَاوَا ، قَاتِلَة مُجْتَمَعَة

Anomom maximum (S). *Cardamom allé de java* (F). *Java cardamom* (D). *Cardamom* (E).

نوع من الهال التابل الشائع الاستعمال . تكثر زراعتة في بلاد جاوا . ساقه رفيعة ، اوراقه كبيرة القد ، بولوره جيدة الصنف وافرّة ادمان العطرية الطيارة .

٢٩٥٨٧ - هَادَّةٌ هَلَالِيَّةٌ الْوَرْق

Ampelopsis aconitifolia (S). *Vigne vierge* à feuilles d'aconit (F).

نوع من الهاذ الزنبقي . جنبته حارشة تطلو من ٥ الى ١٠ امتار . فروصها دليقة ، جذوية السهام في اول مهدا . اوراقها اصيبة الشكل لاقباسية التفريغ الذي يراوح من ٣ الى ٥ ولا متساوية التسكم الذي يطلو من ٥ الى ٨ سم . نصلاها مالة الصلصة ، مابقة الخضار . صنفه الحاقلة . يزورها برتقالية اللون || انهارها يستمر طوال شهر حزيران .

٢٩٥٨٨ - هَادَّةٌ يَابَانِيَّةٌ

Ampelopsis japonica (S). *Vigne vierge du Japon* (F).

نوع من الهاذ الزنبقي . جنبته حارشة تطلو نحو ٧ امتار . جدها رافع السنع والاردم . اوراقها كبيرة القد ، لاقباسية التفريغ السكي ، الذي يراوح من ٣ الى ٥ نصلاها حاقب الخضار اللامع || انهارها يستمر من ايار الى تموز .

٢٩٥٨٩ - هَارُوب

Déversoir (F). *Overflow* (E).

الفترة المدة لتصريف الفائض من المياه .

٢٩٥٩٠ - هَارَبَا ، هَارِبِي

Ashérine (F).

هو الحساس ، سمكة صغيرة القد مأكولة ، اطله .

٢٩٥٩١ - هَارِجَة

Acrocephalus, Calamoherpe (S). *Rousserolle* (F). *Sedge warbler* (E).

جنس طير من فصيلة اللخليات . انواعه المعروفة كثيرة اتد جميعها صغيرة القد تتميز باجنحتها المستطيلة الذرية الاطراف . اذنانها رتاجية الريش غروبية الشكل . متاورها مستعرضة القاعدة ، مذبذبة للاقط || تألف المنافع والضفاف والمقاصب والرياح . قوتها الحشرات والحوام اخصها الياسيب والتمر والبوس || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢٩٥٩٢ - هَارِجَة الْبَطْلَان *

Acrocephalus palustris, Calamoherpe palustris (S). *Rousserolle verderolite, Verderolite* (F). *Marsh warbler* (E).

نوع من الموارزج ، صغيرة القد طوله نحو ١٤ سم . ظهورها الى الطحلة الزرنيقية المبرج . يطن الى الصفرة . زورها الى البياض الاكدر . تألف الاماكي الرطبة والمخلة وضفاف الماء . تدن في الخل وفي الشجيرات المتفرقة . جنبتها يراوح من ٤ الى ٥ يعضات ترخها بمناورة الذكر من ١٤ الى ١٥ يوما .

٢٩٥٩٣ - هَارِجَة السُّد

طائر من الموارزج يدهى ام لوح ، اطلها .

٢٩٥٩٤ - هَارِجَة الْقَصَب *

Acrocephalus arundinaceus, Calamoherpe turdoides (S). *Rousserolle turdoides, Grive de rivière* (F). *Great reed warbler* (E).

طائر من الموارزج . طوله يراوح من ١٩ الى ٢٠ سم . ظهرها الى الصبغة الصفراء المبرج . يطن الى البياض الاشعث . زورها ابين اخضر . جوشها الى الكهبة المسنجة بالاسمر . تجوب البلاد في طلب المصيف والمشي . تألف المقاصب والالاجام . تدن منها حل القصب . تبيض من ٤ الى ٥ يعضات تحضنها بمناورة الذكر نحو ١٥ يوما .

الفصيلة الباذنجانية، ساقه غليظة جارية اللون، ازهاره كبيرة القذ متراكبة الالوان فيها الالبيص والاصفر والبرتقالي والاحمر والارزق. يزود خذبة القذ مستديرة الشكل سنطية اللون تحفظ بقوى انباتها نحو عشر سنوات.

٢٩٦١١ - **هالبيات**، **قالبيات** (E). Amomum
سبط من فصيلة الزنجبيلات، اشهر اجناسه المال.

٢٩٦١٢ - **هالبيزة**، **هالبيزة**، **تعل**
Haleisia (S). Haldesia, Haldesier (F). Silver bell-tree,
Snowdrop tree (E). Schneeglöckchenbaum (D). Ale-
sia (I).

جلس نباتات برية وتربيتين من فصيلة الاصطركيات.
انواعها ستة جميعها اشجار وغطيات متوسطة القذ. ساقها
متعصبة متقاربة الفروع. اوراقها عابطة، مدققة،
متعاقبة، تصلها يفيش الشكل مسنن الحافة. ازهارها
محورية الازتكاز، قمية التجميع، عديدة الاسدية
مستطيلة الزناد. ثمارها جراء مجتمعة || احرف انواعها
واشهرها ما يلي.

٢٩٦١٣ - **هالبيزة ثنائية الجناح**
Haleisia diptera (S). Haldesia à 2 ailes (F).

نوع من الهالبيزة التريبية. ثمرتها تملو نحو ١٥ سم. اوراقها
بيضية الشكل تملو نحو ١٥ سم. وتعرض نحو ١٥ سم. نصلها
جامد اللون، اخضر الصفحة العليا، خلى السفلى. ازهارها
بيضاء اللون تملو من ٢ الى ٣ سم. وتعرض من ٢ الى
٥ سم. ثمارها جراء ثنائية الجناح وشعبة الشكل تملو من
٤ الى ٥ سم. || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

٢٩٦١٤ - **هالبيزة رباعية الجناح**
Haleisia tetraptera (S). Haldesia à 4 ailes (F).

نوع من الهالبيزة التريبية، ثمرتها تملو من ٥ الى ٩ امتار.
اوراقها ايليبسية الشكل سنانة الزايم الاخير. نصلها
جامد اللون اللقيق، اخضر الصفحة العليا خلى السفلى.
ازهارها متدلية، ثلاثية التجميع، ويضاء اللون، صغيرة
القذ. ثمارها جراء رباعية الجناح مخروطية الشكل تملو
من ٤ الى ٥ سم. || ازهارها يستمر من اذار الى ايار.

٢٩٦١٥ - **هامكة**
Efrisia commune (F).

هي البطة، اطلها ج. هام وهامات. قال ذو الرية :
قد اصفت النازح المجهول مصفه
في ظل اخضر يدور حامة اليوم

٢٩٦١٦ - **هامكة**، **ميشتركة**
Trayouse mécanique (F).
عدة مجهزة باريح شفافات تستخرج الحليب من صبرع
البقرة وتقله الى رماء الحفظ الحكم البد.

٢٩٦١٧ - **هامين**
Marcascent (F).
Marcascent, Wichering (E).

نمت تعريفي يطلق حل كل نبات او جزء من النباتات
يكون في حالة الامن.

٢٩٦١٨ - **هامبي**
Apical
نمت تعريفي يوصف به كل عضو مركزة الذروة.

٢٩٦١٩ - **هامبيلا** *
Hamelia (S). Hamélia (F).
جلس نباتات برية وتربيتين من فصيلة الفويات. انواعها
المعروفة ١٥، اصلها المناطق الاستوائية الامريكية. ساقها
فرداء. اوراقها متعاقبة، كاملة، سنانة النصل. ازهارها

٢٩٦٢٠ - **هال حبشي**، * **قالبة حبشية**
Amomum angustifolium (S). Amome de Madagascar
(F). Madagascar cardamoms (E). Madagascars Carda-
momen (D). Cardamomo maggiore, C. massimo (I).
نوع من المال الزراعي الشائع الاستعمال في جزيرة مدغشقر.
اوراقه مصفحة النصل اللقيق. لبوب جذابه تابل مشهور.
بلوره وافر المواد الدنية الطرية المتوسطة الصنف.

٢٩٦٢٣ - **هال حبصا**، **حبصا**، **قالبة**
عقودية، **امومين**
Amomum cardamomum (S). Amome cardamome
(F). Cardamom (E). Cardamomen (D). Cardamome,
Cardamomo, Amomo (I).

ويروف ايضاً بالمال العقودي. نوع من المال الجيد الصنف
تكثر زراحت في الهند الصينية. ازهاره عقودية التجميع.
بلوره جيدة الصنف ثائمة الاستعمال وافر المواد الدنية
الطرية.

٢٩٦٢٤ - **هال ذكر**، * **قالبة ذكرية**، **عيريو**
Amomum melegueta (S). Méleguette, Méliguette,
Graines de paradis (F). Melegueta-pepper, Grain
of paradise (E). Malaguettapeffer (D). Grana pa-
radisi, Sami di paradiso (I).

نوع من المال، تكثر زراعت في بعض مناطق افريقية الشرقية
والوسطى. اوراقه مستطيلة النصل اللقيق. بلوره متوسطة
الصنف والمواد الطرية.

٢٩٦٢٥ - **هال صغير**، **قالبة صغيرة**، **حبهان**
Eleteria cardamomum (S). Cardamomo petit (F).
Bastard cardamon, Lesser cardamon (E). Kleine
Kardamomen (D). Cardamomo minore (I).

نوع من المال الجيد الصنف، تكثر زراعت في سريليب
وميلبار. ساقه واوراقه صغيرة القذ. ازهاره سنبلي التجميع.
بلوره وافر المواد الدنية الطرية الفاعلة الصنف.

٢٩٦٢٦ - **هالو**
Halo
دائرة خضبة تحيط بالقمر سبها انكسار النور الذي
يشرق ببلورات الجليد المتصقة في اليوم التالية البعيدة.
اما الدائرة التي تحيط بالشمس فتدعى طفاوة.

٢٩٦٢٧ - **هالوجبة**، **قرونية**
Halogeton (S).
Halogète, Halogéton (F). Salwort (E). Salztraut
(D). Alogeton (I).

جلس نباتات برية وزراعية من السمرائيات واصله
البريقيات. انواعه ستة منها الاشباح والجنبايات. ساقها
وطرفها زياء الصماء. اوراقها خمبة متعاقبة. ازهارها
فردية التجميع، محورية الازتكاز جميلة الشكل || اشهر
انواعها الهالبيزة الزراعية المأكولة.

٢٩٦٢٨ - **هالوك ديشي**
Philipée d'Egypte (F).
هو الطرثوث المصري، اطلبه.

٢٩٦٢٩ - **هالوك قروني**
Clandestine du Levant
هو الطرثوث الاحمر، اطلبه.

٢٩٦٣٠ - **هالوك لحيبي**

Orobancha caryophyllacea (S). Orobancha du gail-
let (F). Clove scented broom-rape (E). Nelken-som-
merwurz (D). Erba scalogna, Succiamela garo-
fanato (I).
نوع من الجفيل يتطفل على الفالين ويمل معظم نباتات



هال حبشي



هال حاما



هال ذكر



هالبيزة



هامبيلا



هبار انتلوس

- S. obscurus (S).
S. obscur (F).
S. Burdang (S). S. maure, Budang (F).
هبار جرمان S. Germani (S). S. de Germain (F).
هبار جونني S. Johni (S). S. des Nilagiris (F).
هبار ديني S. ursinus (S). S. ourson (F).
هبار خالب S. saenx (S). S. blanchêtre (F).
هبار منقج S. mitratus (S). S. mitré (F).
هبار ملايلوف S. melalophus (S). S. mélatophe (F).

٢٩٦٢٥ - هَبَارَكَة
Scolecotrichum (S).
جنس تطور مجهرية من همارة الزناخيات رضية الطحيات.
جره الكنيديه اسطوانية قصيرة تعلوها كتلة صرطنانية
مضغية الأسك ثنائية الخلية || أنزاع قليلة السدد
والاذني اعرفها هبارة التنبيليات .

٢٩٦٢٦ - هَبَارَة التجميليات
Scolecotrichum graminis (S).

قطر مجهرية يركب بعض التنبيليات البرية والكلالية
فيقش الاوراق دون ان ينفذها || مظهره الخاضعي يقع
صغيرة تركب نصل الصف ثم تنقسم وتنتج فيبلغ طولها
نحو ٣٠ م. تبدو شقراء اللون او سمرراء ثم تبيض بياض يبيض
ستارها .

٢٩٦٢٧ - هَبَارِيَّات ، وَهَبِيَّات

Semnothecidae (S). Semnothecidae (F).
Semnothecidae (E).
فصيلة قريد من سفليات المنخرين تشمل أربعة أجناس :
الهبار والحوبر والزيك والقنطرب .

٢٩٦٢٨ - هَبَاش *
Homola (S).

Homola (F). Homola (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل
قصيرات الذيل وفصيلة الهَبَاشيات . انواعها المعروفة عديدة
منتشرة في جميع بحار العالم || اجسامها شبه مجنبة الشكل ،
تطول من ٤ الى ٨ سم . قوائمها مستطيلة ، قليلة التلافط
بامتتاع الزوج الاول للمفصلي الاطراف ، الكثير التنسج
أشائك والزوج الاخير الذي يتركز في كفتي الظهر
والذي يتميز بالصغر واللقه والشرائط الاطراف . اثنائها دائما
حراء اللون يعلوها موانج براوح من الصنابي الى الجوي ||
لهومها مأكولة .



هَبَاش

٢٩٦٢٩ - هَبَاشِيَّات
Homolidae (S).

Homolidae (F). Homolidae (E).
فصيلة حيرانات بحرية من القشريات عشاريات الأرجل
قصيرات الذيل ، حاملات القوائم . اجسامها وانواعها
عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || جميعها مستطيلة القد
الذي براوح من ٤ الى ٨ سم . تتميز بصر ولصر الزوج
الاخير من القوائم الذي يتركز في كفتي الظهر || اشهر
اجناسها واعما انتشارا الهَبَاش .



هبال

٢٩٦٣٠ - هَبَال * ، وَهَبَقِي ، مَرْمُوزَة
Hapale (S). Oulisti, Marmoset (F). Marmoset, Oulisti (E).
جنس قريد امريكية من فصيلة القريد الندية . انواعها ٧
موطنها حوض الامازون والبلاد الجابرة || اجسامها
صغيرة القد ، مجنبة الشكل ، مستطيلة الشعر الناعم

هبار الام

هبار بودن *

هبار جرمان

هبار جونني

هبار ديني

هبار خالب

هبار منقج

هبار ملايلوف

٢٩٦٢٥ - هَبَارَكَة

٢٩٦٢٦ - هَبَارَة التجميليات

٢٩٦٢٧ - هَبَارِيَّات ، وَهَبِيَّات

٢٩٦٢٨ - هَبَاش *

٢٩٦٢٩ - هَبَاشِيَّات

٢٩٦٣٠ - هَبَال * ، وَهَبَقِي ، مَرْمُوزَة

كبيرة القد ، مجنبة الشكل ، منبيلة التجميع ، تاجية
الارتكاز . ثمارها نووية غير مأكولة || اشهر انواعها
المايليا الزياء الورق ويسمونها قاتلة الجردان ، انزاعها
حراء اللون ، ثمارها حساسية المادة تقضي على الجردان .

٢٩٦٢٠ - هَبَار ، وَهَبِين ، لَرْد هَبْدَس

Semnothecus (S). Semnothèque (F). Solemn
spes, Simpal (E).

جنس قريد من فصيلة الهباريات تدعى القريد المقدسة
لان الهندي لا يسمونها وقد يخلطونها || انواعها كثيرة العدد .
اجسامها رقيقة ، مجنبة ، متوسطة القد . اذنانها مستطيلة .
انوارها لامة الشعر . جباهها مكللة بخمار من الهلب الاسود .
موطنها الهند وجوارها . اقلها يمتد من الشط الى ارتفاع
٤٠٠٠ م . || تعيش على الاشجار . قوتها المواد النباتية
من الثمار والبرود والجلود الى البرام والتواشي || اثنائها
تنصع من جرور الى جرورين || اشهر انواعها ما يتبع .

٢٩٦٢١ - هَبَار أَتْلُوس * ، لَرْد هَبْدَس

Semnothecus entellus (S). Semnothèque en-
telle, Entelle, Singe saint des Hindoux, Houleman,
Houneiman, Mandi, Mabus (F). Manuman, Hoonu-
man, Entellus (E).

نوع من الهبار ، جسمه يطول نحو ٦٥ سم . وذنبه ٩٦ سم .
لونه ابيض اللون ، مستطيل الشعر . وجهه اسود البشرة .
خمار جهته اسود الهلب المنتصب || موطنه شمال الهند
حتى حدود الهند والبنجاب . يعيش جماعات متوسطة العدد .
يفضل التفاسات والاحراج الظليلة على مجاري الماء .
يقترب من الناساكر والبيوت الالهة || قوته الثمار والحبوب
ياخذها اينما كانت .

٢٩٦٢٢ - هَبَار حَمَلَايَا

Semnothecus schistaceus (S). Semnothèque de
l'Himalaya, S. ardois (F).

خرج من الهبار . جسمه يطول نحو ٦٥ سم . لونه الى الرقبة .
شعره كثيف وطويل . ظهره عايق اللون يعلو موانج جوي .
وجهه اسود البشرة . خمار جهته اسود الهلب المنتصب .
اذناه صغيرتان . ذنبه يطول نحو ١٠٠ سم . وينتهي بقصبة
شعلة . موطنه حاليها وبلاذ الكشمير . اقليمه يمتد من
ارتفاع ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ م .

٢٩٦٢٣ - هَبَار دُوك ، هَبَار لَيْسَم ، دُوك

Semnothecus nemaeus (S). Semnothèque douc,
Douc (F).

نوع من الهبار ، جسمه يطول نحو ٥٠ سم ، لونه متباين
اللون . رأسه اطراف يديه وربليه سود . وجهه اصفر .
عنقه وساعدها وفخذه الى الجفوة . ذقنه وصدره وذنبه يبيض .
بلته ابيض . ظهره الى الرقبة || موطنه غابات الكوتشين
جماعاته كثيرة العدد ، مؤذية ، تتلف كل زراعة
تصل اليها .

٢٩٦٢٤ - هَبَار فَيْرِي

Semnothecus phayrei (S). Semnothèque de
Phayre (F).

نوع من الهبار ، جسمه يطول نحو ٨٠ سم . لونه رمادي
اللون . عايق الظهر . رأسه حربي الشعر الاسمر . يعلو
وباطن يديه وربليه الى البياض الاخير . كفاه الى
الفضة . ذنبه ابيض اللون . اسمر الطرف . يطول نحو ٧٦
سم || يأنث الفايات الكثيفة الاشجار واجام الخيزران .
قوته الثمار والحبوب والبرود والجلود .
ومن انواع الهبار المعروفة تخص بالذكور :

يلوه يتقيج ثني وزركشة كستنية ورشة طلاء. روشناها الخلفيان الى الخطي الاطمل. حناها الكلف. اعداها الى الشقة || لها جيل واحد في الحول. تظهر القروا في ايار ويقي حتى تموز. تسرح في الليل. تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع المكن لطحا لانتالة الحجر على الصفحات السفلى من نصال الارواق || السرة عند بلوغها الكال تطول نحو ٢٧ سم. جسمها شبه اسطوانة الشكل مستطيل المقدم، مستدق المؤخر. ثوبها الى الطحلة السمره يعلوها تجاميع مغرغس اخضر اللون عند حل الجانبين من السكة البطنية الثالثة الى التاسعة. رأسها شديده السمره ومدنها ورواجها || طول الاكامل الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٢ اوجوا يتقضي ضمن غلاف رقيق شفاف في الجفالة او تحت الارواق الساقطة.

Hoploptaronus (S). هَبَرَس ٢٩٦٤١ -

Hoplopteron (F). Hoplopteronus (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات ممديات الارجل وفضيلة الاوليبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار الصين || اصداها صغيرة لناعمة، مردنية الشكل، مغلزنة، بمنجحة الغالب، زاهية الالوان الفاتحة.

Matthiola graeca (S). هَبَس ٢٩٦٤٢ -
Matthiola maritima (F).

نوع من المتطور البري، نبات عشبي بري معمر من فصيلة الصليبيات. منبتة تهاج حوض البحر الابيض المتوسط، من اليونان الى لبنان || ساقه منتصبه قروا تملو من ٣٠ الى ٧٥ سم. اوراقه متناحية، سنائية النصال الضيقة الزيادة. ازهاره عقودية التجميع، طرفي الارتكاز. ازهاره ذكية العرف عديدة الالوان منها الاحمر والبنفسجي والوردي والابيض والاصفر || تنويره يستمر من اذار الى تموز

Hypsipetes (S). هَبَسِيَت ٢٩٦٤٣ -

Hypsipète (F). Hypsipates (E). جنس طير من الجواثم سنيات المنابر وفصيلة الكتيبات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ مولينا يمتد من الهند الى الصين وبعضها يعيش في الحيشة وندفسكر. ملجئها الحيائي جماعي. جماعتها قليلة العدد. تألف الغابات وفضات مجاري الماء. قوتها الحشرات المختلفة والحوام || اجسامها صغيرة قريبة الشبه بالبلابل، اطوالها تتراوح من ١٧ الى ٢١ سم. رؤوسها معتدلة الجسم. مناقيرها مخززية ذرية. اجنتها ذلقة. اذنانها مستطيلة، فاقرة الاطراف. اوزنها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود الاسم اللامع والكسني الاشعث والرماذي الازرق المواج ... || تذلن اعاشاها في الاجمار الريفية القريبة من مجاري الماء. اناثها تحسن من ٤ الى ٦ بيضات حل مرئين في الحول. الذكر و تتناب مع الاناث في الحفن.

Ane noir (F). Black ass (E). هَبَج ٢٩٦٤٤ -
هو الحمار الاسود.

Strelitzia (S). Strelitzia (F). هَبَل ٢٩٦٤٥ -

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الموزيات. انواعها المعروفة ٦ جميعها من نباتات البلاد الحارة. سيقها ليفية متراكبة الانابيب. اوراقها معتقة، كبيرة القد، ثنائية التصفيف، متقابلة النصال. جرشها خشوية. تردد للترين || اشهر انواعها ما يلي.

الريو. رؤوسها مستديرة. اذنانها مروحية الور. اذنانها مستطيلة جتلة || جميعها شامية تألف الغابات والاحراج البعيدة والقريبة من الممران. قوتها التار والحشرات. اطلاقها هنية، رضية. تألف حياة الديدن وتتملق باصحابها.

٢٩٦٣٦ - هَبَال
شجر تملق منه السهام. الواحدة هائلة.

٢٩٦٣٧ - هَبَايَة Ecorces sèches (F). Dry peels (E).
حياة الشجر : قشرها الناشف.

٢٩٦٣٣ - هَبَا Legs (F). Legacy, Bequest (E).
هو كل محبوب في وصية مكتوبة.

٢٩٦٣٤ - هَبَج Broussin (F).
ردم يمتري طلاء سوق واغصان واغناد الشجر، سببه الصقح او بعض الجراثيم.

٢٩٦٣٥ - هَبَد، هَبِيد Graines de colocynthe (F). Seeds of the colocynth (E).
هو حب الخنظل الواحدة هبيدة.

٢٩٦٣٦ - هَبَر Filasse (F).
هو المشاقة، اطليبا.

٢٩٦٣٧ - هَبَر Diacope rivulata (S).
سمكة من الشطف وفصيلة القرشيات. جسمها كبير القد مبطل الشكل. طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. وعرضها من ٤٠ الى ٤٨ سم. ثوبها الى الزرق البنفسجية المواج. لحمها مستحب اللحم مرغوب فيه. اصطلها فسيحة الاجزاء تمتد من البحر الاخر الى بحار استراليه.

٢٩٦٣٨ - هَبَرِيَّة Haberlea (S).

Haberlée (F). Haberlea (E). عشبة صغيرة معمرة من فصيلة الجسترييات. منبتها يمتد من الشرق الادنى الى اللقان. ترضب في المواقع الصخرية. ساقها جدعة. جمرعها الزهري يملو من ١٠ الى ١٥ سم. اوراقها اعليجية مقنطرة. نصالها جلدية مسننة المختار. ازهارها ليلكية تطول نحو ٥ سم. قطرها ٤ سم. بتلاتها خلية || تنويرها يستمر طول شهر حزيران.

٢٩٦٣٩ - هَبَرَوِيَّة Habrosta (S). Habroste (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الزنونايات. انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض اصفاق حوض البحر الابيض المتوسط || سيقها نخلة قروا. اوراقها صغيرة، متعاقبة، شبه عرطية الشكل. ازهارها صغيرة وردية اللون. تنويرها رديي.

٢٩٦٤٠ - هَبَرَوِيَن اَسْبَد

Habrosyne derass (S). Habrosyne rasé (F).
Habrosyne derass (E).

حشرة من فصيلة الشمرقيات ورتبة حشرغيات الاجنسة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروب. فراشها جارسة قريبا رقيق الازهار. سمرتها تعيش على اوراق النوج || جسمها وشي الشكل يطلو نحو ١٢ سم. بسلطها نحو ٣٨ سم. رأسها اسمر اللون. عينها كبريتان. زيانها عيطان. رشفها مستطيل ملتف. جرشها وعلتها الى الخنظل الاسمر || روشناها الاساميان الى الخنظل الاسمر



هَبَايَة



هَبَسِيَت



هَبَس



هَبَل



هَيْبَل



هَيْبَل



هَيْبَل

وانواعها المرفقة عديدة منتشرة في معظم بحيرات وناحيات وأهوار البلاد المتعددة الحرارة || أجسامها صغيرة ، شبه بيضوية الشكل ، مدببة الخصر ، طولها من ٢ الى ٥ سم . روثها صغيرة ، مستعرضة ، هيونها نازلة . قرونها الاستشعارية غليظة مركبة من حشر فصل . كواسلها عميقة ، مستعرضة . الحامدا لائحة ، نحيلة التمديد . قواها نحيلة نشطة || جميعها مفرقة وعضلية . تبيض بين النباتات المائية قرب الشطوط وعلى الصفات في فصل الصيف || أشهر أجناسها الهليل .

٢٩٦٥٣ - هَيْبَلِيَّة (Habenaria) (F). هَيْبَلِيَّة (Habenaria) (S).
جنس نباتات شبيهة سمرة من فصيلة السحليات . أزهارها نحو ٤٠٠ مظهرها أمريكي المنبت . أقاليمها المناطق الحارة والمعتدلة . بعضها زراعي زينة . أشهرها الهيباترية الثنائية النصل .

٢٩٦٥٤ - هَيْبَلِيَّة ثنائية النصل ، وَكُونْدِي (Habenaria bifolia) (S). هَيْبَلِيَّة (Habenaria bifolia) (F). Butterflies orchids, Fringed orchids (E). Kleine Ständelwurz (D). Orchide bianca (I).
نبات عشبي زينة معمر . جذوره دنيئة شجيرية الشكل . أزهاره قرصية مقلية ثنائية النصل . أزهاره جميلة الشكل ، يبيض اللون ، سطيحة التجميع ، ترتكز على سراج قروصي الالتشاب .

٢٩٦٥٥ - هَيْبَلِيَّة (Hypnum) (S). هَيْبَلِيَّة (Hypnum) (F). Feather moss (E). Astmoss (D). Ipne (I).
جنس نباتات طحلبية من العريشيات . أنواعها المرفقة نحو ٧٠٠ نوعها نحيلة مدادة متفرعة . أزهارها دقيقة متراصة متناوبة تلحف السوق بكاملها || وهي تعيش وتتمد في التراب وعلى الصخور ويطوح الانجراس . تستعمل للزينة وتستخدم خاصة في سر الآلات الخزفية والبلورية لألوانها من الكسر .

٢٩٦٥٦ - هَيْبَلِيَّة (Hippomyx) (S). هَيْبَلِيَّة (Hippomyx) (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الأربل أمانيات الخياشيم وحيدات الاجهزة وفصيلة الهيباترية . أنواعها المرفقة قليلة العدد أعطائها بعض مناطق المحيط الهادي . بعضها يعيش على الاصداف المهيجرة والبعض الآخر على الصخور || أصدافها مخروطية وحيدة المصارع قرنية الشبه بالقرن القصير المنحني الطرف . أجسامها بيضوية الشكل . روثها مكورة . نواصها مخروطية . هيونها كبيرة ترتكز على قواعد الأقراس . خياشيمها نظامية . أرجلها وحيدة كبيرة محمية .

٢٩٦٥٧ - هَيْبَلِيَّات (Hippomyxidae) (S). هَيْبَلِيَّات (Hippomyxidae) (F). Hippomyxidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الأربل أمانيات الخياشيم وحيدات الاجهزة . أجناسها وأنواعها المعاصرة المرفقة قليلة العدد . أعطائها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش قرب الشطوط || أصدافها قرنية لثينة بالحافر وبالقرن القصير . سقاط الصدفة يتطرد مع العمر فيصبح كالنفساء || أعرف أجناسها وأشهرها الهيباتية والمرفولة .

٢٩٦٦٦ - هَيْبَلُ الْمَلَكَةِ (S). Seralitza regina (S). Seralitza de la reina (F).
نوع من الهبل الزينة ، يطو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . أزهاره مستطيلة الاثناق . نصلها جامد الصلبة المنتمية الاطراف ، لونه الى الخضار البحري . أزهاره كبيرة اللد ، ذمية الفصل ، سميكية البتلات .

٢٩٦٦٧ - هَيْبَلُ صَغِيرُ الْوَرَق (S). Seralitza parvifolia (S). Seralitza à petites feuilles (F).
نوع من الهبل الزينة ، يطو نحو ١٢٠ سم . أزهاره اسلية الشكل ، عادية الساق ، عابقة الخضار . أزهاره متصلة اللد ، ارجوانية الفصل ، بتسية البتلات .

٢٩٦٦٨ - هَيْبَلُ قِصْرِي (S). Seralitza augusta (S). Seralitza augusta (F).
نوع من الهبل الزينة ، يطو من ٣ الى ٦ أمتار أزهاره كبيرة اللد معتدلة . أعطائها تطويل من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . نصلها من ٦٥ الى ١٠٠ سم . وهي اعليجية الشكل ، قلبية القاعدة ، شديدة الخضار المايق . أزهاره كبيرة اللد ، يبيض اللون .

٢٩٦٦٩ - هَيْبَلُ (Lévrier) (F). Greyhound (E).
هو للكلاب السلوقي او السلاقي ، مستطيل الجسم الخفيف . يتميز بخصه وبسرعة عدوه . يستعمل في صيد النزال .

٢٩٦٧٠ - هَيْبَلُ (Hapaloderma) (S). هَيْبَلُ (Hapaloderma) (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من المتسلقات وفصيلة الطيرغيات موطنه بعض مناطق افريقية الحارة . يألف الغابات الرطبة . ملجئه الحياتي زوجي . قوته الحشرات على اختلاف أنواعها وبعض آثار الغنية || جسمه متوسط اللد ، يطو نحو ٣٢ سم . ثوبه الى الخضار اللطيف المواجه . زوره وبدي اللون . يطو الى الشهية . يتميز بكثافة سياه وبكر ذنبه الذي يشبه المروحة . جناحاه معتدلا الطول ، ذلقا الاطراف || يدخن عشه في صدور الاشجار الحرة . الاثني تحضن نحو أربع بيضات على ثلاث مرات في الحول . الذكور ينون لها الغذاء .

٢٩٦٧١ - هَيْبَلِيَّة (Halipius) (S). هَيْبَلِيَّة (Halipius) (E).
جنس حشرات مائية مفرقة من فصيلة الهليلديات ورتبة غمديات الاجنحة . أنواعها المرفقة نحو ٥٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة والباردة || أجسامها صغيرة ، شبه اعليجية الشكل ، مدببة الخصر ، تطويل من ٣ الى ٥ سم . روثها صغيرة ، مستعرضة . هيونها نازلة . قرونها الاستشعارية غليظة . ناصرها وكوكها لائحة ، شبه مبنية الشكل ، نحيلة التمديد . قواها نشطة . اثارها مبنية || تألف الناحق والبيحيات التي تكثر لها الاصاب المائية . قوتها كل ما تستطع تصه من دوبيات .

٢٩٦٧٢ - هَيْبَلِيَّة (Halipidae) (S). هَيْبَلِيَّة (Halipidae) (F).
فصيلة حشرات مائية من غمديات الاجنحة . أجناسها

Hétéroplode (F).
Heteroploid (E).

نمت تعريف يطلق على الاجهزة المضوية الانكسائية المنطش.

Antherozoides (F).
Antherozoides (E).

هي عنصر الاخصاب الذكري عند معظم النباتات. وهي التي بالتحامها مع العنصر الانثوي تكون البويضة المخصبة والاستمرار.

Rainette (F).

٢٩٦٩٤ - هَجَاة

هي الشفدع ، اطليه .

Cercopithecus (S).

٢٩٦٩٥ - هَجَرَس

Cercopithecus (F). Tailed spes, Leslopyges (E).

جلس قرود ذيلية من فصيلة الهجربيات . انواعه المعروفة ٤٤ ، موطنها اسراج وغابات القارة الافريقية . جميعها صغيرة القامة ، وشيقة القوام ، مستطيلة الاذنان ، قصيرة الاربعة ، وسيدة الاضواء . اثوابها زاهية الالوان يكثر فيها التوضيح . تعيش على الاشجار ، قوتها اثمار والحبوب والجلود . جماعاتها متوسطة العدد . اناثها تقنع جروا واحداً رضعه نحو ٦ شهور || اعرف انواعها واشهرها :

٢٩٦٩٦ - هَجَرَسُ احْمَرُ *

Cercopithecus patas, C. ruber (S). Cercopithecus patas, Singe rouge (F). Patas (E).

موطنه بعض اسراج وغابات افريقية الشمالية . ظهوره واطلاءه فضفاضة وباعداة وذنبه الى الصهوة الجلوية . بطنه وبراعن قوائمه الى البياض الاطمل . وبجبهه واذاؤه سود .

٢٩٦٩٧ - هَجَرَسُ اخضر *

Cercopithecus callitrichus (S). Cercopithecus callitrichus, Singe vert (F). Green monkey (E).

موطنه ضفاف النيجر . جماعاته كثيرة العدد . ثوبه الى الخضار الزيتوني . بطنه الى البياض الاخضر . وبجبهه اسود اللون ، حنجره بيضاء ابيض . ذنبه اصفر المذهب .

٢٩٦٩٨ - هَجَرَسُ اخضر

Cercopithecus pygerythrus (S). Cercopithecus ver-vet, Vervet (F). Vervet (E).

موطنه افريقية الجنوبية . جماعاته متوسطة العدد . ثوبه الى الخضار الاصفر يميلو موج اصفر . بطنه وحناجره وبجبهه الى البياض الاصفر .

٢٩٦٩٩ - هَجَرَسُ اسنبل ، اَبُو شَسْب

Cercopithecus capus (S). Moustac

موطنه الغابات القائمة بين الدانوب والكنغو . ثوبه الى الصهوة ، رأسه زيتوني اللون ، وبجبهه الى الزرقعة السوداء ، حناجره ابيض . كفه اسود . ذنبه اربد اللون ، اسمر المذهب والظرف || اخلاقه رضية هنية . وهو سريع الالتفات والسيان .

٢٩٧٠٠ - هَجَرَسُ البَحْرِيات

Cercopithecus brazzae (S). Cercopithecus de Brazza (F). Brazza monkey (E).

موطنه مناطق بحيرات الكونغو . جسمه رشيق القوام يميل نحو ٧٠ سم . وذنبه ٧٥ سم . ثوبه الى الصهوة . حناجره وجهه تاجي الشكل سناخي المقدم ، اسنبل الخضر . يذاه ورجلاه سود . طرف فخذها الخارجي ابيض اللون . يذاهه عند من حدود الساق الى الجمارة . ذنبه اسود لامع .

تخلدها على غشاف مجاري الماء . قوتها المواد المضوية المنحلة والعيان وكل ما تستطيع قصه .

٢٩٦٨٧ - هَتَلَى *

جلس نباتات جلومورية بيرة وزراعية ترابية . انواعها المعروفة قليلة ، منها مناطق البلاد الحارة . اوراقها اسلية الشكل ، جلدية الانتصاب . ازهارها غشافية ينتهي بزهرة خشوية ، ثلاثية التويجات وتلاتات . ميسمها ثلاثي المسكن . عديد البويضات . بتلات ازهارها بياض اللون او وردية .

٢٩٦٨٨ - هَتُولِيَّة

جلس نباتات مائية من فصيلة الربيديات . انواعها قليلة . اوراقها مركبة ريشية مستطيلة الاعتناق توضع على صهوة الماء . ازهارها عتيدي التجميع طرفي الزنكاز . ازهارها خاسية التركيب || اشهر انواعها واعما زراعة المختبرية المنغمية .

٢٩٦٨٩ - هَتُولِيَّة متعقبة *

Hottonia palustris (S). Hottonie des marais, Mil-le-feuilles aquatique, Plumeau, Giroflée d'eau (F). Featherfol, Water gillflower, Water violet (E). Wasserfeder, Feder-Garbe (D). Garofano d'acqua, Erba militare, Penne d'acqua (I).

نوع من الهتولية . يكثر ويبيدها في المنطق والمياه الراكة . تزدهج في اسواق الماء القريين . ازهارها حيلة الشكل . بتلاتها حر الصفة صفر القاعدة .

٢٩٦٩٠ - هَتُولِيَّة

جلس نباتات طرية جلومورية زخافة من فصيلة الصرويات . معقبة التعريف على اسم العلامة الدائري هتولين . انواعها المعروفة قليلة ، منها بعض اصناف آسية الشرقية ، تعيش على غشاف مجاري الماء . سوقها تحيلة حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها معتقة متعاقبة . نصلا قلبية الشكل . منطب المصقة ، بارز المروق ، حشوي الصفة السفلى . ازهارها سبلي التجميع . ازهارها صغيرة القد شراة اللون ، عصاره جلومور سريفة الطعم . اوراقها مغطاة .

٢٩٦٩١ - هَتِيرِيَّة * ، سَكَنْدُون *

Sphenodon punctatus (S).

Sphenodon, Hatteria (F).

حيوان يبيض وحيد النوع والافصيلة من رتبة مغطيات البروس . موطنه جزر زيلندا الجديدة || شكله شبيه بالظاء ، اما الهانز النوزي والجمهوري يكتمان في التركيب وفي القد . جسمه يطول نحو ٧٠ سم . جلده مغطى القليل ويملو في قة رأسه وفي ثقب ظهوره وذنبه حروف فضروني التركيب سمن كالنشار . رأسه مكمل . المنطقة الصدفية من الرأس مغطية التركيب . بطنه مغطى بالاضلع . مديه مغطى بزحف جلدي . ذنبه مستطيل ، قابل التجديد عند الانفصال . قوائمه نشيفة . خاصة الاصابع المنيقة بحظاظ قادمي . غلايه حادة الاطراف المنيقة . اسنائه شارقة ، مرتزة في الحافة الخارجية من الفك الاصل || الاثني اسن قدامي الفك واسنم بطانة . ثلثي من ١٠ الى ١٢ شلقة في سفره بين الصخور التي ترتادها برفقة طيور البحر . ينفق الشلق بعد وضعه بنحو ٤ اسبوعا || يسرح في الليل . انتقاله سريع الحركة في البر وفي الماء || قوته السطاع والقضاد والديدان والقواصم الصغيرة .



هتل



هتولية متعقبة



هتيرة



هجرس احمر



هجرس اخضر

٢٩٧٠١ - هجرس الغاب * تستنس

Cercopithecus pyrrhonotus (S). *Cercopithecus nisnas* (F).

موطنه افريقية الشرقية اصحابها الصموال وكردفان ودفور. ثوبه سوي اللون الاصهب الصنابي. حمار وجهه الى البياض الاخير || وهو من القردة الشديدة الحذر المكيدة، التي تقتبس العلم ببطء ولا تفسى .

٢٩٧٠٢ - هجرس ديانا *

Cercopithecus diana (S). *Cercopithecus Diane* (F). *Diana monkey* (E).

موطنه ليبريه والكنكو . ثوبه جميل الالوان . ظهره ارجواني. بطنه الى البياض الاخير . ساعده وضداه سود الطاهر ، صفر البطن . اما الذكر فيتميز بخمار جهته الاسود وبلمسحه وبسالة البهيش .

٢٩٧٠٣ - هجرس سبأ * ، شاذي ، هيتنج ، طلون

Cercopithecus saabaus (S). *Cercopithecus de Sabs, Grivet, Tota* (F). *Grivet* (E).

موطنه افريقية الشرقية يكثر في الحبيشة وسنار وكردفان . جسمه صغير القدر ريع انتفاطع . ثوبه الى الخضار المايمن . قوائم ذنبه موشمة بالابيض . وجهه واذناه سود .

٢٩٧٠٤ - هجرس سكتسار ، سكتسار

Cercopithecus talapoin (S). *Talapoin, Mitopithecus* (F).

موطنه الغابون . ثوبه كثيف الشعر الناعم . ظهره الى الخضار الاصفر . بطنه الى البياض الاخير . حمار جهته تبري الشكل ، ابيض اللون || اخلافة هنية رضية . يقتبس العلم بدهن نفور واخراج .

٢٩٧٠٥ - هجرسيات ، قورود ديبالة ، قورود

Cercopithecidae, *Lastopygidae* (S). *Cercopithecidae* (F). *Cercopithecidae, Lastopygidae* (E).

الهجرسيات والهجرايس فصيلة قرد من صفات المنخرين تشمل ستة اجناس الهجريس والحويد والمالك والشدم والقشة والقردوح .

٢٩٧٠٦ - هجسين

Mécis (F). *Cross-bred* (E). هو في الحيوان تاج التجين اي الاسفاد بين سمولين من نوع واحد ولكن من سلالتين مختلفتين .

٢٩٧٠٧ - هجين

Hybride (F). *Hybrid* (E). هو في النبات نتيجة تلج زهرة بطلع زهرة اخرى من نوعها اما من غير سرها او سرها . وهو يدعى هجلاجا

٢٩٧٠٨ - هدياب *

Parnassius (S). جلس سفرات فراشية من حمارة اللثانيات . اكواوه عديدة جميعها متوسطة القدر ، بطنها ترارح من ٥٥ الى ٦٥ م . اجسادها اسطوانية مهدبة . رواشها مستعرضة مستديرة ، لونها الى البياض الاخير بلموها تمشج ليكي وتمشج اطول وتبقيج اسود وافر || تظهر في اوائل الصيف تمتع مكها على نباتات فصيلة الهلدات فينتف من رقات مغلطلة خضرة جوزية اللون حلية الجسم مهدبة بالحلب القصير ومنشقة بالاحمر .

٢٩٧٠٩ - هدياب الجرود *

Parnassius montivagus (S). *Parnassien des montagnes* (F). *Mountain Butterfly* (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات وريقة حرشيات الاجنحة . موطنها بئس جبال الشرق الاذن . فراشها وائمة قوتها رقيق الازهار . سرها تمشج على اوراق اشطريون والهلدات || جسمها متوسط القدر يطول نحو ١٧ م . بسطها نحو ٥٤ م . رأسها اكبه اللون . عينها نافذتان . زياتها صولجانيان . جوشها الى الشبهة السوداء المرج . بطنها الى الشبهة الرصاصية القفبة المراج || رواشها عند الشقين الى البياض الاخير بلموها تمشج اربعة ويلكي وتمشج اسمر وتبقيج اسود || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواخر الربيع تسرح وتمشج المكن محاذيا على ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمشج المكن محاذيا على الصنمات السفلى من نصال الاوراق || الفترة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٢ م . جسمها مغلطع الشكل . ثوبها الى السمرة الجوزية تعلوها ثلاثة خطوط سود قاطبة وتنقبط جانبي احمر واصفر . قشورها كثيف الخمل والحلب القصير . رأسها اسود . فكها نشطان . رواشها وبديها الى الربعة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر من ٣٢ الى ٣٤ اسبوعا ينتهي ضمن صلبة نبتة التنج .

٢٩٧١٠ - هدياب

Filaridae (F). *Filaridae* (E). ردف من كيدان السلكية الوليدة . تتميز باجسامها الدقيقة التحلية الحليطية الشكل . انواعها عديدة تعيش في الاجسام الحية فؤذها وقد تمسحها . اغلب هدياب .

٢٩٧١١ - هدياب * ، فيلاريكية ، عركة

Filaria (S). *Filaira* (F). جنس ديدان سلكية من الهدياب . انواعها كثيرة المفرد تصيب الانسان والحيوان . جميعها دقيقة الجسم النحيل ، غشبية الشكل، مستطيلة، تعيش في الجواز الدوري وفي التسج الضام تقبب اضطرابات حيلة واختلالات داخلية قد تكون سببا للموت || اعرف انواعها ما يتبع .

٢٩٧١٢ - هدياب الخيل

Filaria equina (S). *Filaire du cheval* (F). نوع من الهدياب تطول من ٤ الى ١٢ م . تصيب الخيل وانثيال والحجير . تتركز في الغشية المدة . تسب بعض الاضطرابات الداخلية فلما تكون وشية الماتية .

٢٩٧١٣ - هدياب الدئع

Filaria lacrymalis (S). *Filaire lacrymale* (F). نوع من الهدياب تطول من ١٠ الى ٢٥ م . تركيب البقر وتعيش في مجاري خدد الدئع تقبب التهاب ملتصقة . يقضي عليها باستئصالها .

٢٩٧١٤ - هدياب الطيباء

Filaria cervina (S). *Filaire des cervidés* (F). نوع من الهدياب تركيب الطيباء والايالي في نسجها الضامة . طولها يراوح من ٣ الى ٥ م .

٢٩٧١٥ - هدياب الكلب

Filaria immitis (S). *Filaire cruelle* (F). نوع من الهدياب تطول من ٢٥ الى ٣٠ م . تركيب الكلب تقبب في الجهاز الدوري وتستقر في بطن القلب الايمن . يكثر وجودها في الصين واليابان وفي ايطاليا وليتوان .



هجرس الغاب



هجرس ديانا



هجرس سبأ



هدياب



هدياب الجرود



هدياب

Cloporte commun (F). - **هَدْبَكَة** - ٢٩٧٢٥

رايح حمار قيان .

Fulcre - **هَدْبَكَة** - ٢٩٧٢٦

هي غويوط جهاز التناسل في فطر الازمديات .

٢٩٧٢٧ - **هَدْبَكَة** طائر (السان) .

Tigre mâle (F). He-tiger (E). - **هَدْبَس** - ٢٩٧٢٨

الهدبَس البر الذكور عنه بلوغه كامل النشاط .

Cillés (F). Cilla (E). - **هَدْبِيَّات** - ٢٩٧٢٩

شعبة من التقييمات من الحيوانات الدنيا الالوان .

Thysanoptéroïdes - **هَدْبِيَّات الجناح** - ٢٩٧٣٠

طبقة حشرات من شعبة المليئات تشمل رتبة واحدة تسمى هدية الأجنبية ، اجناسها وأنواعها زهاء ١٠٠٠ تجسمها حدة فصائل .

Thysanoptères (F). - **هَدْبِيَّة الاجنحة** - ٢٩٧٣١

Thysanoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة هديات الجناح . فصائلها واجناسها وأنواعها كثيرة العدد . اجسامها صغيرة دقيقة يصعب تمييزها بالعين المجردة . اضطامها غروية الشكل . امتاها ثنائية ماصة . قرونها الاستشعارية عديدة العقل التي تراوح ٦ الى ٩ . اجنسها عند وجودها هدية التركيب مستطيلة . أنثوانها سوية الالوان منها الاسفر والاسمر والكتني والاسود || حشرات الكاملة وبقائها تركيب العديد من النبات . قوتها الخفيف والنفس وصارة الخلايا || اشهر حشرات التريسي .

Thysanoures (F). - **هَدْبِيَّة الأذنان** - ٢٩٧٣٢

Thysanura, Bristle-tails (E). Borstenschwänze (D).

طائفة من الحشرات المذبة المدعية الجناح . فصائلها واجناسها وأنواعها كثيرة العدد تجتمع الى ربتين رتبة لاطئات المنك ورتبة ظاهرات المنك .

Hydrines (F). - **هَدْرَات** - ٢٩٧٣٣

هي الهدارات ، رتبة حيوانات مائية من المحفوفات .

Hydra (F). Hydra (E). - **هَدْرَة** - ٢٩٧٣٤

المهدة في المدار ، جلس حيوانات مائية من الهداريات .

Hydrogénation (F). - **هَدْرَجَة** - ٢٩٧٣٥

المزج بالهيدروجين .

Hydrostatique (F). - **هَدْرَسَة** - ٢٩٧٣٦

Hydrostatics (E). علم توازن السوائل وضغطها .

Hydrobia (S). - **هَدْرُوب** - ٢٩٧٣٧

Hydrobia (F). Hydrobia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وفضيلة الهيدروبيات . أنواعه المعروفة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاقباغ الثالثة والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم . يكثر وجودها عند مصبات الانهر || اصنافها صغيرة ، ماصة ، مذبذبة الاقباغ ، قروية الاسقاط .

Filaria caprae (S). - **هَدْبَاة الماعز** - ٢٩٧١٦

Filaire des caprins (F).

نوع من الديدان طويلة يراوح من ٢ الى ٥ سم . تركيب الماعز في نسجه الضامة فتقرح جلدها وتفسدها .

٢٩٧١٧ - **هَدْبَاة المدينة** ، عرق مدني

Filaria medinensis (S). Filaire de Médine, Ver de Médine (F). Guinea-worm (E).

نوع من الديدان تكثر في البلاد الحارة . تقيط تحت الجلد في نسج الجسم الضامة عند البشر والخيول واليقر وناثر البهم . انثاءها طويل من ٥٠ الى ٨٠ سم . وقد يصل طولها في بعض الاحيان الى ٤٠٠ سم . تستقر في اي مركز كان انما تغفل اسفل الساق فتسبب دملة تنتهي بمخرج مقروح . يقال ان كيشها يدخل المدة مع الماء . فاجتنابها يكون اما بغير الماء او بتغييره .

٢٩٧١٨ - **هَدْبَاة بآسورية**

Filaria haemorrhagica (S). Filaire des boutons hémorragiques (F).

نوع من الديدان طويل من ٣ الى ٧ سم . تركيب الخيل والبهائم والخيول . تتركز في الساق والكفط والحاروك . تسبب دمل تنز القبح والدم .

٢٩٧١٩ - **هَدْبَاة الأرجل**

Cirripèdes, Cirropodes (F). Cirropoda (E).

رتبة حيوانات دنيا من القشريات . فصائلها واجناسها كثيرة العدد صيرة القند تعيش طفيلية على الاسماك والحيات وكل شيء تستطيع الالتصاق به . قرونها الاستشعارية مجوفة يمحاجم ممكنا من الالتصاق .

٢٩٧٢٠ - **هَدَاكَة** - Frigidité (F). Frigidity (E).

حالة مقاومة سلبية أو قنور في وظائف الأعضاء التناسلية تجعل المرأة تنفر من التكاثر أو لا تقبض بمارسته لانها قلما تتحسن الجهور الجنسي .

٢٩٧٢١ - **هَدَكَل** * - Viscum album (S).

Gui, Gui blanc, Morvé (F). Common mistletoe (E). Gemeine Mistel (D). Visco quercino, Vischio comune, Panis (I).

نبات طفيلي معمر من فصيلة المشيات . يعيش على اخضار الاشجار القنطرة والحرجية اخضار الفتح . فيقاس هائله النسخ ويؤذي . برته تنش في السطح الذي يلصقها بالنصن . تجوده تشب في لحاء الشائل . فروعه ثنائية التركيب . أزوائه متعاقبة جامدة النصل الاخضر الاس . انزاعها وسيدة الشق ، غسية التجميع ، ابطية الارتكاز ، ثمارها نورية الشكل ، يبيضه اللون ، دافقة للمادة . برورها دقيقة مغلطمة || ثمارها مأكولة من بعض انواع الطير اخضار الشبان التي تنقل البرور مع السمل الى اي شجرة كانت || والهدال يستعمل ضد الربو والشفاق ويستخرج منه نوع من الدقيق جيد الصف . الواسدة هدالة .

٢٩٧٢٢ - **هَدَاكَة** هو الحمد ، اطلبه .

٢٩٧٢٣ - **هَدْبَة** - Cuellir (F). To gather (E).

هدب الشجرة : اجتماعه وهدب واحده ايضاً .

٢٩٧٢٤ - **هَدْبَكَة** ، **هَدْبَكَة** - Aiguille (F). Needle (E).

الحدة والمذبذبة . ج هذب وهذب وأهداب . كل ورقة ابرية الشكل لا غير لها ولا مرض كورن الصنوبر واللائل ...



هدال

الملمس، سواءً اللون ، قسبة الملمح ، تعتبر من أخطر وأجمن القراء .

٢٩٧٤٦ - هيدروبيات * Hydresna (S).

Hydrina (F). Hydresna (E).
جنس حشرات من فصيلة الهيدريات ورتبة غديات الراجعة . أنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم || أجسامها صغيرة ، أطليجية ، هيفاء ، تطول نحو ٣ سم . رؤوسها مستديرة ، جبينها بارزة . قرونها الاستشعارية غيطية . تأثيرها قصيرة ، ملابسها مستطيلة ، منقطة ، كواسلها شبه مكورة الشكل . الحامدا لائحة . قوائمها مستطيلة ، أطواها سوية اللون تكثر فيها البصرة السوداء والحلوة ثم البني والكنسني || تألف مجاري الماء . تعيش تحت الحجارة المغمورة .



هريس

٢٩٧٤٧ - هيدروبيات * Hydranidae (S). Hydranidae (F). Hydranidae (E).

فصيلة حشرات مائية من غديات الراجعة . أجسامها وأقوامها المعروفة عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم || أجسامها صغيرة ، أطليجية الشكل ، مثقلة الإحدياد ، تطول من ٣ إلى ٥ سم . رؤوسها مثقلة الجرم ، عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية غيطية ، ساعية الفصل . تتميز بامتطالة ملابسها الفكية المنقطة . كواسلها نظامية . الحامدا لائحة . قوائمها مستطيلة || تعيش في المنطق والبحيرات ومجاري الماء تحت الحجارة المغمورة أو بين أوراق النبات . ونها أنواع تعيش تحت طبقات الصفقات . يرقاتها مغمورة || أشهر أجسامها الحديثة .

٢٩٧٤٨ - هُدَس Myrta (F). هُدَس هو الأس ، أطليه .

٢٩٧٤٩ - هُدَك ، هُدُوك Frigide (F). Frigid (E). الهُدَك والمُهَدُك من تميز بهذاك .

٢٩٧٥٠ - هُدَكَّة ، لِيَسْتُرُوءَ Leptostroma (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهُدَكات . أنواعها عديدة جميعها روية لا مؤذية . بكينداتها غارشة ، طبائية الشكل ، سوداء اللون ، قرسية الانفلاق . يودلتها بجوار اللون غطلة الاشكال ، منها البيضاء والخرطوية والمنقطة .



هدرية

٢٩٧٥١ - هُدَكِيَات Leptostromatasea (S). Leptostromatases (F). Leptostromatasea (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزرويات . أجسامها وأقوامها كثيرة البد ، بكينداتها مجتمعة ، فحبة اللون ، شافية الارتكاز أو محصورة . يودلتها بخلفة الاشكال ، متباينة التركيب . || أهراف أجسامها الثالائية التالية : انتسويورديم (خشاء) ، يوفويه ، ديجوكويه ، خلوس ليتيربيورم ، لريولا ، مسلميه ، هُدَك .

٢٩٧٥٢ - هُدُكِي هو المنسل للملمس التوابط .

٢٩٧٥٣ - هُدُن Fertilité (F). Fertilité (E). الهُدُن هو التحبب في الإنتاج .

٢٩٧٥٤ - هُدُود ، هُدُود Huppe (S). Huppe (F). Hooops (E).

جنس طير من الهدهديات . أنواعها المعروفة ستة ، جميعها

٢٩٧٢٨ - هيدروبيات * Hydrobilidae (S). Hydrobilidae (F). Hydrobilidae (E).

فصيلة حيوانات مجهرية من الرخويات مديات الاربل أميات الهياشم المشطية . أجسامها المعروفة ٢٢ وأنواعها بعض المات منتشرة في معظم مجار العالم وخاصة عند مصبات الأنهر لانها ترطب في الماء الإجاب || أهراف أجسامها وإعراها المهدروب .

٢٩٧٢٩ - هيدروبيات * Hydroscaphidae (S). Hydroscaphidae (F). Hydroscaphidae (E).

فصيلة حشرات مائية من غديات الراجعة . أجسامها وأقوامها المعروفة قليلة البد . أصطانها منلق وعييرات البلاد المنقلة الحارة || أجسامها شبه بيضية اللون ، مثقلة البسيط ، تطول من ٨ إلى ١٤ سم . رؤوسها مستديرة ، خرطوية . جبينها بارزة . تأثيرها وتكونها نظامية . - قرونها الاستشعارية ساعية الفصل . كواسلها شبه مربعة الشكل . الحامدا لائحة || تعيش على القنابات المائية في البحيرات والمنلق || أشهر أجسامها المهدروس .

٢٩٧٤٠ - هيدروبيات Hydrotides هي المديريات من الهيدويات تشمل ثلاث رتب . المديريات والمديريات المرجانية والجلبيات .

٢٩٧٤١ - هيدروبيات مَدُوسِيَّة Hydroméduses (F). هيدروبيات من الهيدويات من الهيدويات تشمل المديريات والمديريات والمصليات .

٢٩٧٤٢ - هيدروبيات مَرَجَاتِيَّة Hydrocorallaires رتبة حيوانات مائية من الهيدويات .

٢٩٧٤٣ - هيدروبيات Haldreichia (S). Haldreichia (F). هيدروبيات جنس نباتات عشبية ، معمرة ، برسية ، من فصيلة اللصلييات . أنواعها المعروفة قليلة البد منها جبال بعض مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط || سقها زساعة فراء . أرقاقها متعاقبة ، متقاربة لحمة النصال . أزهارها طرفي الارتكاز . أزهارها صغيرة ، بيضاء اللون . ثمارها غريقات وحيدة البزرة || أشهر أنواعها المهدريخ الحلبياني الورق .

٢٩٧٤٤ - هيدروبيات حَبَلَاتِي الْوَرَق Haldreichia buplevifolia (S). Haldreichia à feuilles de buplèvre (F).

عشبة معمرة برية من فصيلة اللصلييات . منها جرد لبنان . ساقها زساعة فراء . فروعها منتصب . أوراقها لحمة مليقة النصال . أزهارها طرفي الارتكاز . أزهارها صغيرة ، بيضاء اللون . ثمارها غريقات وحيدة البزرة || أشهر أنواعها المهدريخ الحلبياني الورق . تنويرها في أواخر الصيف .

٢٩٧٤٥ - هيدروبيات * Enhydria marina (S). Enhydria marina, Grande loutre de mer (F). Kalan, Sea otter (E). Kalan, Groosser Seewotter (D).

حيوان بحري لبون وحيد المجلس والنوع من فصيلة البحرصويات . قوته الأسماك والقشريات . أطعته مجامح مضيق بجرين . طولها نحو ١٦٠ سم . يتنيز باستدارة رأسه ومغطاف قائميه الخلفيتين الذي يكتنف كامل البراش دون الأظافر . فروها قصيرة الور الناعم الكثيف ، خلية

٢٩٧٦٠ - هُدُودُ يَحْيِيَّات (F). Flagellés (F). Flagellates (E).
قطة من الاولاي ، غالباً مجهرية ، مجهزة بأهداب دقيقة قابلة الانحياز تدعى هدييات تحمكها من اعموم والانتقال في الماء . بعضها فسفوري اما اكثرها تنبعث من الخشب . ومنها انواع طفيلية تعيش على الحيوانات .

٢٩٧٦١ - هُدُودُ يَف (F). Allergène (F).
نمت تمرغفي يطلق على كل مادة قد تسبب الانهداف .

٢٩٧٦٢ - هُدُودُ بَيْل (E). Pigeon milie (F). Dove male (E).
الهديل هو ذكر الحمام . قال فيه جبران العبد .

كان الهديل الفاعل الرجل وسطها
من البهي شرب يفره مسنن
والهديل صوت الحمام من هدل . والهديل كما جاء في القدير
و فرخ كان على عهد لورح فصاده جارج من الطير فليس
من حامة الا وثبكي عليه الى يوم القيامة . قال نصيب :
فلقت اثبكي ذات طروق فذكرت
هدلاً وقد ادوى رنسا كان تبع

٢٩٧٦٣ - هُدُودُ يَحْيِيَّات (F).
الهديم : باقي نبات العام السابق .

٢٩٧٦٤ - هُدُودُ يَحْيِيَّات (F).
Hadena scalis, Hadena didyma (S).
Hadenè du seigle, Noctuelle du seigle (F).
Hadena scalis (E).

حشرة مؤذية من فصيلة اللقنات حشرغيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا واربقة الشالية . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها خاضلة تركيب التيجليات البرية والزرارية الى جسمها مستقيم الجرم يطول نحو ١٣ م . بسطها تراوح من ٣ الى ٤ م . رأسها مستعرض الشكل . عيناها صغيرتان . زباناها عيطان . ملاصقا صلبة . مرشقا مستدل الطول . جوفها وبطنها الى الخنثي الى راشاتها الى الخنثي الاصغر تعلو في الزوج الامامي زراکش مخرشة وزخارف تراوح بين الكسني والجملوي . وتعلو في الزوج الخلفي ماجة قاعدية سمراء لا تتجاوز حدود الزام الاول . لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع المكث في عطوط مستقيمة على عصف النبات العائل الى الطور الاسروي الذي يستمر نحو ٤٠ اسبوعا ينقضي على النبات والسرقة عند بلوغها الادراك تغلظ من ٢٥ الى ٣٠ م . جسمها اسطواني الشكل ، باهت الغضار يعلو خطان تيجيان اممران يمتدان من الكويل الى الشرج . رأسها اسمر اللون ، مبهر الخلف النقيض . مدنها ورواجها الى الخنثي الى طور الاكمال الذي يستمر من ٢١ الى ٢٨ يوماً ينقضي في التربة حيث تنمدن السرقة وتكتمنق بجلباب من الطين .

٢٩٧٦٥ - هُدُودُ يَحْيِيَّات (F).
Hadena reticulata (S). Hadenè reticulée (F).
Hadena reticulata (E).

حشرة من اللقنات حشرغيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الايطي المتوسط . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقتها تدش على اوراق العلوك والقرنفل البري والزراري وتقتب الكماير وتلتهم البور

من طور العالم القديم . اجسامها رقيقة ، رؤوسها متربة يتنازع مروحية الشكل . اثارها جيلة الانلون المتراكبة الزامة يملؤها تجميع وتنسج . الى حكي القزوي ان الهدود قال لسليان اريد ان تكون في سنياتي قال انا وسدي قال بل انت واهل عسكريك كذا في يوم كذا فحضر سليان بمجنده فطار الهدود فاصطاد جرادة فضغنها ورمى بها في البحر وقال كلنا يا نبي الله من فاته الله ناله المرق ففسكح سليان ورجنوده من ذلك حولا كاملاً وفي ذلك قيل :

« جاءت سليان يوم المرض هدهدة
اهدت له من جرادة كان في فيها
وانشدت بلسان الحمال قالته
ان الهدايا على مقصدار مهديها
لو كان على الى الانسان قيمته
لكان على لك الدنيا وما فيها »
اعرف النواحه واشهرها الهدود الشائع .

٢٩٧٥٥ - هُدُودُ شَائِع * ، دُودُكَ الْجَبَل (F).
Upupe apops (S). Huppe commune, H. vul-gaire (F). Common hoopoe (E).

نوع من الهدود المملوك في لبنان وفي سائر الشرق الاوسط . كنيته ابو الاصهار وابو ثلمة وابو قلعة وابو الربيع وابو وروح وابو جهاد وابو حباد . ج هدهد وهدهيد . الواحدة هدهدة . الى وهو طائر الشرج الثوب متوسط الجسم طوله يراوح من ٢٧ الى ٢٨ سم . منقاره دقيق مستطيل . قوته كبيرة لئلا سوده الاطراف . فوهه الى الصلبة الطعلاء . جناحها وظهور الى الصلبة الناعمة يملؤها تنسج اسود وايضاً يتخلله الاصفر . ذنبه مقعوم الطرف اسود اللون ايضاً الجانين والوسط . الى يأنف الاماكن المبررة الازهار . قوته الحشرات والديدان . يدن حته في تجاويف الازهار . الاثنى تحمن وسحها من ٤ الى ٧ بيضات نحو ١٦ يوماً . الذكر يزين لما الاكل . الى يتجر من الطيور الناعمة الواجب حياتها .

٢٩٧٥٦ - هُدُودُ يَحْيِيَّات (F).
Upupides (S). Upupides (F). Upupides (E).

فصيلة طير من الجوارم الرقيقات المتأخر . انواعها عديدة تجتمع الى جيلين الهدود والهدير . اجسامها رقيقة . اجنحتها ذلقة . الشفا قصيرة . ارساها قوية . اثارها جيلة الانلون الزامة .

٢٩٧٥٧ - هُدُودُ يَحْيِيَّات (F).
Hedobia (S). Hédoobie (F).

جنس حشرات خاشبة من فصيلة القزريات . انواعها المروقة ١٠ ، اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها صغيرة ، القدة مسطلة الشكل ، اثارها مزركمة مختلفة الانلون . يرقاها تركيب الاشباب الميتة تنخرها وتعلها . اشهرها الهدوبية الامبراطورية .

٢٩٧٥٨ - هُدُودُ يَحْيِيَّات (F).
Hedobia imperialis (S). Hédoobie impériale (F).

نوع من الهدوبية طير من ٥ الى ٥ م . فوهها مستطيل اللون اسمر اللون تعلو زراکش مخلفة خلية التركيب طلاء زاهية . الى يرقاها تركيب احصان الازهار الميتة من اي نوع كانت .

٢٩٧٥٩ - هُدُودُ يَحْيِيَّات (F).
Flagello (F). Flagellum (E).



هدود شائع



هدوبية امبراطورية



هدوبية الشيلم



هدوبية مشبكة

إذا ازدحت هوم الصدر قلنسا
عسى يبرأ يكون لها انفرج
ندمي هري وانيس نفسي
فأتر لي ومشتوي السراج

٢٩٧٧٢ - هَرَكْس Acacia blanc (F).
هو السط الابيض . الزائدة هرامة .

٢٩٧٧٣ - هَرَامِكَة Astrologus (F). Astrologers (E).
الحراسة طلاء النجوم . النجمين والمتنجين .

٢٩٧٧٤ - هَرَب Harp (F).
الحرب . ثوب البطن .

٢٩٧٧٥ - هَرَبُود Harpagod (F). Harpagodus (E).
جنس حيوانات بحرية من الرغويات مميزات الابليل
وفصيلة الكيتيات . انواعه المرموقة قليلة العدد اعطاهما
بعض مناطق المحيط الاطلسي للمراجعة لاربيكة التالية ||
اصداؤها متوسطة القد وشبيهة عازلة جزوية اللون . فوطها
متعددة الانفرج ثلاثية الفلق التي تسمى كريل البش شكلا
رحطابا .



هَدَاب

٢٩٧٧٦ - هَرَبُوت Harpactes (S). Harpactes.
Courouc flamboyant (F). Harpactes (E).
جنس طير من فصيلة الطرطريات . انواعه المرموقة نحو
١٠ موطنها يشغل معظم مناطق آسيا الشرقية والجنوبية
جميعها متوسطة القد . متناجها قوية بحبة الاطراف ،
مقمرة الحاطم العليا . اجنتها متوسطة الطول ، ذلقة
الاطراف ، رتاجية الريش . اذانها مسطيلة ، رتاجية
التركيب . جملة الالوان تشتمل على قوتها الحشرات
على اختلاف انواعها وبعض الهدويات || اعرف انواعه
واشهرها الحريق الملقوق .

٢٩٧٧٧ - هَرَبُوتِ عَطُوق Harpactes fasciatus (S).
Harpactes a bande, H. kondoa (F).
نوع من الحريق . اصطانه بلاد الهند وصوتها . يأتف
النابات الكثيفة || جسمه متوسط القد بطول نحو ٣٠ سم .
ثوبه جبل الالوان الصافية . رأسه ورقة الى السواد القصبي
اللامع . صدره وبطنه الى احمر القرمزية الكثيفة اللمعان
وكذلك عصبه تنطق رأسه من اللون الى اللون . سوله عنده
واحرار صدره مفسولان بطق ابيض كالساج . طوره
وافنيكه وزلال ذنبه الى الجروة تطوفا حاشية سوداء
بلفها حشار مستعرض ابيض . جناحاه الى السواد المسج
بالابيض . متقاده ورصاه الى الزرقه || طرانه العادي
قصير الشوط يكثر فيه التصعيد والتجيط . قوته الحشرات
والهدويات اعصها المتناكب || يذفن حده في صخور
الاشجار الحرة . الاثن تبيض من ٤ الى ٥ بيضات
تفصتها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما .



هَرَبُوتِ

٢٩٧٧٨ - هَرَبُوتِوس Harpalus (S).
جنس حشرات من فصيلة المربليات . انواعه كثيرة
العدد جميعها صغيرة القد ، دجوية المسرح ، تعيش تحت
الحجارة والاعشاب والارواق اليابسة . قوتها البزور
والحيوب وبعض الثآير . ريقاتها غاشية تعيش على اوراق
النبات . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

الفئة || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م . بطنها
نحو ٤١ م . رأسها الى الخطي الاسمر المواج . حينها
كبريتان . زياتها خيميان . جوشها وبطنها الى الخطي
الاسمر || روشنها الاماميان الى الخطي الاشجع للمواج
تعلمو شيكة من الخطوط الكستية . روشنها الخلفيان
الى الخطي التني المواج يسر عنه الاطراف الخارجية .
اهدابها الى الشقمة الصنانية || لها جبل واحد في الحول .
تظهر الفرائة في اواسط ايار وتبقى حتى تموز . تسرح
في الليل ، تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتتمتع
المكن لطعا مربية على الصفحات السفلى من نصال
الارواق || السرعة عند بلوطها الكمال تطول نحو ٤٠ م .
جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . قوتها الى
البركة تقيم في الظهر وتجت في الجانبين ويملوها غطان
جانبيا احمران ونسمة خطوط ممتدة صفراء اللون . رأسها
الى الجفوة . مدها الى الحطة الفراء . رواجها الى السرة ||
طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي في
التربة ضمن جلاب من العلين تلتصقه السرعة .

٢٩٧٧٦ - هَدْيُوتِس Hedyotis (S).
Hedyotis, Hedyote, Hédiote, Hédiote (F). Dog-
wood (E). Süsahr (D). Ediotide (I).
جنس نباتات برية وزراعية محمرة من فصيلة الفويات .
انواعه قليلة منها الاششاب والجنيات . اوراقها متعاقلة .
ازهارها محورية الاثكاز ارجية . ثمارها جرد ثنائية
اللفة . || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٢٩٧٧٧ - هَدْيُوتِوس سَرَكْدِيب Hedyotis auricularia (F).
نوع من الهدويوتيس . اصطانه سردييب . جنته مصر .
اوراقها حاشنة ذكية الريف الطري . ازهارها تاجية
الاثكاز عاقلة البرق . يستخرج من اوراقها بالتقطير
عطر الهنديين .

٢٩٧٧٨ - هَدْيُوتِوس هَشْدِي Hedyotis a ombelle (F).
نوع من الهدويوتيس . اصطانه الهند . حشيتة عجلة . جلورها
صباغية يسمونها "وي" غصنها احمر اللون شائع الاستعمال

٢٩٧٧٩ - هَدْيُوتِوس Hedyotis (S). Hedyotis (F).
واحدته هداية . جنس طير من فصيلة الهذيات . انواعه
قليلة العدد . اجسامها متوسطة القد ، طولا براوح من ٢٧
الى ٣٥ م . جراتها وراسها وغالبها مسطيلة . اذانها
عريانة . جوارحها لامعة ذلقة . اذانها قصيرة غروبية .
الوايل الى الصفة المائقة يملوها توشج خفيف . جوارحها
ويطوفا الى الصفوة الموشة بالاسود . اصغلتها ثقبية اللون .
قوتها البزور والحويوب والخشرات على اختلاف انواعها .
تنش عشها في النصوص بين الادلغال والاششاب الرقيقة .
حشنتها من ٨ الى ١٢ بيضة .

٢٩٧٨٠ - هَدْيُوتِوس Hedyotis (S). Hedyotis (F). Hedyotis (E).
فصيلة طير وسيدة الجلس من رتبة الدجاجيات . انواعها
المروفة قليلة ، جميعها من طيور مدحسك . قوتها البزور
والحويوب والخشرات .

٢٩٧٨١ - هَرَبُوس Chat (F).
هو السنور . اطلبه . ج هرة والاثن هرة . قال احد بن
فارس صاحب الجبل في اللغة :

Scutellaria altissima (S). هَرَبُلُوسْ رَقِيعْ ٢٩٧٨٧

Toque élevée (F).

نوع من الهربوس. حشرته تطلع من ١١ إلى ١٣ سم. ثوبه إلى الصبغة الخفيفة الفاتحة. يألف الأتربة الرملية. قوة البرور والحروب وإثّار الجافة الساقطة. رقاته خاضعة قليلة الأذى.

Harpalus rufus (S).

نوع من الهربوس. حشرته تطلع من ١١ إلى ١٣ سم. ثوبه إلى الصبغة الخفيفة الفاتحة. يألف الأتربة الرملية. قوة البرور والحروب وإثّار الجافة الساقطة. رقاته خاضعة قليلة الأذى.

٢٩٧٨٠ - هَرَبُلُوسْ أَطْحَلْ الظَهْرْ *

Harpalus distinguendus (S).

نوع من الهربوس. حشرته تطلع من ١٤ إلى ١٦ سم. ثوبه إلى السمرة السفماء الملبج. ظهره أطحل اللون، اسم التشطيط المستطيل. يركب شمائل الفيلك لالتهام زوردها الدقيقة فيضبط الشاميل ويشربها.

٢٩٧٨١ - هَرَبُلُوسْ مَلُونْ *

Harpalus senescens (S).

نوع من الهربوس. حشرته تطلع من ٧ إلى ١٠ سم. ثوبه إلى الأخضر الأصفر المتلو مشعة جوية. زبانه وجرارمه إلى الحمرة. يعيش تحت الحجارة والأشخاب. قوة البرور والحروب. رقاته خاضعة قليلة الأذى.

٢٩٧٨٢ - هَرَبُلُوسِيَّاتْ *

Harpalidae

فصيلة حشرات من ثعديات الاجنحة. اجناسها وأنواعها كثيرة للعدد. اصطلحها العالم. منظرها دأبل وبعضها مقترس. رقاتها خاضعة ناعمة ومنها المقترسة التي تنصب النديان القراشة. أشهر اجناسها الهربوس والروس والياح والديموس.

٢٩٧٨٣ - هَرَبُلُوسْ *

Pseudope

جنس عظم من فصيلة المنجويئات المادامات القوام. أنواعه قليلة، اصطلحها البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اسطوانية تطلع من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. رؤوسها مقطعة. اذنانها دقيقة. سراففها مرية متتابعة. قوتها الحشرات تنبت من الزبافات الخفيفة.

٢٩٧٨٤ - هَرَبُلُوسْ ، دَرَكَة

Scutellaria (S).

Scutellaire, Toque (F).

الدركة من الامير مصطلح الشهابي المأخوذ إلى مصدر الاسم العلمي. جنس نباتات برية وثرينية من فصيلة الشفويات. انواعه عديدة. نباتها الشرق الاقصى وافريقية الشمالية. سوقها عشوية خجلة. اوردها صغيرة للد لاطئة أو معتقة. ازهارها سلبية التجميع، غنظلة الالوان. زوردها دقيقة حنطية اللون. اعرفت انواعه واشهرها ما يليق.

٢٩٧٨٥ - هَرَبُلُوسْ أَيْتَقْ

Scutellaria albidia (S).

Toque blanche (F).

نوع من الهربوس التريبي الممر. ساقه زياء اللحاء تطلع من ٤٠ إلى ٨٠ سم. اوراقه معتقة اعليجية الشكل. نصلها جامد الصفحة، خلى البشرة، مسن الحافة، دبل المسام. ازهارها سلبية التجميع تطلع نحو ٢ سم. لونها إلى البياض العاجي. تنوره يستمر من حزيران إلى تموز.

٢٩٧٨٦ - هَرَبُلُوسْ أَلْبِي

Scutellaria alpin (S).

Toque des Alpes (F).

نوع من الهربوس الجبلي البري الممر. ساقه تطلع من ١٠ إلى ٣٠ سم. اوراقه لاطئة بيضية النصل تطلع من ١ إلى ٢ سم. ازهارها بيض الالوان، زرق الاطراف، سلبية التجميع. تنوره يستمر من حزيران إلى آب.



هربوس اصهب



هربوس اطحل الظهر



هربوس ملون



هربول



هربون



هربلة نيكة

٢٩٧٨٨ - هَرَبُلُوسْ كَثِيرْ الزَهْرْ

Scutellaria macrantha (S). Toque à grandes fleurs (F).

نوع من الهربوس التريبي الممر. ساقه تطلع من ٢٠ إلى ٣٠ سم. اوراقه لاطئة، بيضية الشكل، نصلها قليل الحمل، مسن الحافة. ازهارها سلبية التجميع، متقابلة الارتكاز تطلع نحو ٣ سم. لونها إلى الزرق الزاهية. تنوره يستمر من تموز إلى ايلول.

٢٩٧٨٩ - هَرَبِيلَكَة نَبِيكَة ، قَوْبَعَة اخْطَب

Harpella forficella (S). Harpella perce-bois,

Taigne du bois mort (F). Harpella forficella (E).

حشرة من فصيلة القروبيات مرشقيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط إلى اوروبا. فراشها جارية قوتها رقيق الازهار. سرفتها خاشية تمشي على جنود الاشجار اليابسة والاعصان والافناد. جسمها قصيف يطول نحو ٧ سم. يقطها تراو من ٢٢ إلى ٢٤ سم. رأسها مكور الشكل. عينها صغيرتان. زبانهها غليظة. ملامسها دقيقة. مرشفتها معتدل الطول. جوشها ويطنها إلى النبي الصناعي المواج. رؤسها الامانيان إلى الصغار القام يملو تشيح بني. رؤسها اخفياض إلى الصلبة السمراء المواج. اعدانها شعراء اللون. لها جيل واحد إلى الجيل. تظهر القراشة في اوائل حزيران تبقى حتى اواخر تموز. تسرح في النهار. تماثل بد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويختج المكان مبعدين في شقوق الخشب ويخت القشور اليابسة. السرقة عند بلوغها الادراك التام تطلع نحو ١٦ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، مستقيم المقدم والمخضر، ميمر الحلب القصير. ثوبها إلى الحنطلي الاسمر. رأسها شديد السمرة. منها ورواجها الصدرية والبطنية إلى الحنطلي الباهت. طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي بخارج الخلق الحنطسي ضمن صلجة تنسجها السرقة تحت القشور أو بين الشقوق.

٢٩٧٩٠ - هَرَبَلَكَة

الهربة: السواد بين منخري الكلب وسائر الحيوانات من ذوات الفطسية.

٢٩٧٩١ - هَرَجْ

هو المازريون الهندي، اطلبه.

٢٩٧٩٢ - هَرَجَكَة ، كَجْ

اسدى سلالات جبل النيب الهابط. يمر منها طمياً بحرف ٧ يتيمه رقم السلالة. فاذا اودت التبرير من السلالة الاولى كتبت ١ ٧ دلالة على السلالة الثالثة كتبت ٣ ٧ على السلالة السابعة ٧ ٧ الخ ...

٢٩٧٩٣ - هَرَجُوجْ

هو التالينوم، اطلبه.

Talin (F).

٢٩٧٩٤ - هَرَجُود ٥

Heterogynis (S).

Hétérogynis (F). Heterogynis (E).

حشرة من فصيلة الهرجوديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . اعطاهنا بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف البراري والمزارع المبيضة بالاشجار || جسمها صغير ، نحيل ، كثيف الخمل الناعم . مسطحة نحو ٢ سم . رأسها صغير . صينها صغيرتان ، بارزتان . غطتها وبلاستها شديدة القصر . زباناها مشطيان ، مستطيلان . اجنحتها كبيرة || الاثنى مرقلة ومهادمة الخناج . السرة شبه اهليجية الشكل ، مسطحة ، غاشية ، تعيش على اوراق فصيلة القزليات الفرائشية ونسبا الزوا ، مرتها المفصل .

٢٩٧٩٥ - هَرَجُودِيَّات ٥

Heterogynidae,

Epiconopterygidae (S). Hétérogynidés, Epiconopterygidae (F). Heterogynidae, Epiconopterygidae (E). فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها شحالية الاصلان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، يلفها خمل ناعم . مسطحة تراوح من ١٨ الى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة . هيبتها بارزة . اعطاهنا وبلاستها شديدة القصر . قرنوسا الاستشارية مسطحة . اجنحتها غشقة للاشتاب . مسطرة العروق . الزوايا الى السرة الخشنة المتفاوتة الماخجات | انثاها مزارق مرقلة . اساريها شبه اهليجية الشكل ، مسطحة || اشهر اجناسها الهرجود .

٢٩٧٩٦ - هَرَجُودُوم ٥

Damalique du Sénégal (F).

Korrigum (E).

هو سلحوم السنغال، موطنه يمتد من السنغال الى افريقية الشرقية والغربية .

٢٩٧٩٧ - هَرْد ٥

Curcuma (F).

هو الزركم السباعي . اطبله .

٢٩٧٩٨ - هَرْدَاء ، هَرْدَاك ٥

Thamnocalamus (S).

Bambou (F). Bambou (E).

جنس نباتات قصيرة برية وزراعية من حمارة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . انواعها قليلة العدد ترطب في الاربة الخفيفة العميقة القور الوافرة المواد المنصوية .

٢٩٧٩٩ - هَرْدَاء هِنْدُوسِيَّة ٥

Thamnocalamus hindel (S). Bambou de l'Inde (F).

نوع من الهرداء يطول من القرنين الى الخمسة امتار . سلباته شديدة الخضار . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ١٠ م . نصلها جلدي السنج ، صفحة العليا غفراء اللون طحلاء المواجه ، صفحة السفلى بيضاء اللون زياه . يربط في الاربة البدالية الرطبة .

٢٩٨٠٠ - هَرْدِيَّات ٥

Phalangides, Opilions, Faucheurs (F). Phalangides, Opilions (E).

رتبة من صف التيكوتيات . اجناسها وانواعها عديدة تنقسم الى اربع فصائل منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها صغيرة ، ملحونة الصدراس بالطين ، عيشونية التنفس ، عادمة المشاق ، مسطحة الجرامز الدقيقة اشهر فصائلها الكهوليات .

٢٩٨٠١ - هَرْدِي ٥

Hourdis (F).

الحردى او الحردى ، كلمة عربية اصيلة تصصل الآن للدلالة على المجارة المحفوفة من الباتون (اطاب حردى) .

٢٩٨٠٢ - هَرْدِيْب مُصَبَّج ٥

Chlorophorus varius (S). Chlorophore tachéé (F). Chlorophorus varius (E).

حشرة وائمة غاشية من فصيلة القزليات ورتبة ممدات الاجنحة . تألف البراري القريبة من السران . خنافسها تعيش على ازهار الصيوانيات ولا تمت من الاوراق . يرقاتها تركب الجروع والاصنان والقشبان المقطوعة اليابسة وقد تسردب سانيك الكرمه ويزاوح الاجنحار الشمرة وسالسا || جسمها متوسط القد بطول من ١٠ الى ١٤ سم . ثوبها الى الصغار الكبريتي تلوها بقع وتناويع سود . رأسها ممدل الجرم . صينها كبيرتان نازرتان . زباناها غيطيان دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، ضيق المؤخر المستدير الفارق . غدها ممدلتا الصلاة ، متناهتتا التميزز النحيل القاطب . اسرارها خاسية النعل || الاثنى ابرز قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واكثر زرباً || جيلها ثنائي الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام ادراكها تطول من ١٨ الى ٢٤ سم . جسمها محذوب الظهر ، مبط اللب ، قصير الرواجب الخشنة الشكل . ثوبها الى الصفرة الزيتية يملوها تنقيط اسمر . رأسها احمر .

٢٩٨٠٣ - هَرْدِيْب مُصَصَّب ٥

Chlorophorus trifasciatus (S). Chlorophore trifascié (F). Chlorophorus trifasciatus (E).

حشرة وائمة غاشية من فصيلة القزليات ورتبة ممدات الاجنحة . تألف المواقع التي تكثر فيها نباتات التفصيلة الصيوانية . خنافسها تعيش على الازهار . يرقاتها تركب اروسات النباتات الحولية والحولة وتسردب حماء جقوع الاجنحار باستثناء الصنوبريات || جسمها صغير القد بطول من ٨ الى ١٠ سم . ثوبها تمتد الاثلاث في الاسود والاحمر والاسمر الخشن والثنى الاصفر المواجه . رأسها صغير الجرم . صينها صغيرتان ، نازرتان . زباناها غيطيان ، دقيقان . ظهرها مستطيل الشكل ، مسطير الطرف الفارق ، اسود اللون كالطين . غدها متناهتتا التميزز الخفيف القاطب . اسرارها خاسية النعل || الاثنى ابرز قدماً من الذكر واكثر زرباً منه واطول مرؤاً || طاً جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل حزيران ويقي حتى اوائل آب . تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند الادراك التام ، تطول من ١٦ الى ٢٠ سم . جسمها محذوب الظهر ، مبط اللب ، نودلي الرواجب . ثوبها الى الصفرة الصنائية المواجه يملوها تنقيط اخر . رأسها جلوي اللون .

٢٩٨٠٤ - هَرْدِيْل ٥

Haridelle (F). Sead, Nag (E).

الحرديل الصفائح اللصقة من السبور . الواحدة هرديلة .

٢٩٨٠٥ - هَرْدُوك ، هَرْدُون ٥

Autruche malle (F).

هو الظلم ، اطبله .

٢٩٨٠٦ - هَرَشَان ٥

Caragana (S).

هرشان تعريب الاسم التتري . جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القزليات الفرائشية . مهدها بعض بلاد الشرق الاقصى وبعض مناطق سيريير . انواعها عديدة . جميعها معمرة ، معظمها جنبي وبعضها جملي . اوراقها عالية مركبة ،



هرجود



هرجود مبيج



هرجود مصعب



هرشان

٢٩٨١٣ - هَرَشَانْ كَدَلْ ٥
Caragana frutex (S).
Caragana frutescent (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو نحو ٢٥٠ سم. أوراقها رباعية التركيب. ورقاتها لاقامية الشكل والحجم تملو من ١ إلى ٣ سم. وتعرض من ٤ إلى ١٢ سم. نصلها يضي الشكل، اذنياتها حادة شائكة. ازهارها كبيرة القد، فردية التجميع، لونها الى الصغار الزاهي || تنوره يستمر طول شهر ايار.

٢٩٨١٤ - هَرَشَانْ ٥
Clous (F).
 بشور صغيرة جامدة تملو للسج النباتية.

٢٩٨١٥ - هَرَشَانْ ٥
Ver (F). *Worm* (E).
 هي البودة. ج. هَرَشَانْ.

٢٩٨١٦ - هَرَشَانْ ٥
Polymnatus (S).
 جنس حشرات فراشية من فصيلة المرحشات، انواعه عديدة، اصطلحوا بمطر اصفاق العالم. اجسامها صغيرة القد كثيفة المرحاشات المستطقة الخلفية الاطراف. اقواها ملونة. قرونها الاستعمارية مستطبة دبوسية الشكل || تسرح في النهار. قوتها طلع الازهار وريحها || ريقاتها غاشلة وقوامه تركب أوراق النبات وتماز || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٢٩٨١٧ - هَرَشَانْ الباقية ٥
Polymnatus amandus (S).
 فراشة من المرحش، جسمها احمر اللون رصاصي الملاج. طولها نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة البانجونية الزاهية يطوقها حنار اسود وامار ابيض المذهب. رواشن انثاها حنطية اللون يملوها رقشة سمره وامار ابيض الشهديب. ريقاتها صغيرة القد، خضراء اللون، تركب الباقية في اوراقها وقرونها.

٢٩٨١٨ - هَرَشَانْ البَقُولُ ٥ * اَبُو دَقِيْقُ الْأَزْرَقُ
Polymnatus baeticus (S).
 فراشة من المرحش، جسمها حنطي اللون احمر الملاج يطول نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة الجميلة الزاهية يطوقها اطار ابيض الشهديب. رواشن انثاها خضراء اللون يملوها تنميش اسود. ريقاتها خضراء اللون تقو بها كدرة خضراء || تركب البَقُولُ وتقرض الحبوب قبل ادراكها اغصنها الفول واللوبيا والترس.

٢٩٨١٩ - هَرَشَانْ التُّورُوسُ ٥
Polymnatus damon (S).
 فراشة من المرحش. جسمها يطول نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها الى الزرقعة الخضراء الملاج يطوقها اطار اسود وتهدب ابيض. رواشن انثاها حنطية يملوها تنقيط اسود ونقط ابيض وحنار اسود وامار مهدب ابيض. ريقاتها تركب معظم الباتانات القرنية اغصنها الترس.

٢٩٨٢٠ - هَرَشَانْ الرُّمَانْ، قَرْمَكُولَه ٥ دَوْدَه
Virachola livia (S).
 فراشة من المرحش. جسمها حنطي اللون اخضر الملاج يطول نحو ٣٥ سم. رواشن ذكورها برتقالية الصفحة العليا، رباعية السفلى، كستنية اطراف المذهب. رواشن انثاها بنسجية الصفحة العليا سمره السفلى، حنطية الطوق

وريشية، شعبة، متقابلة، تنهي باذنية شائكة مكنوة من امتداد الضلع. ازهارها غصية التجميع او فردية يكثر فيها اللون الاصفر. ثمارها قرنية. بزورها بيضية الشكل. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٢٩٨٠٧ - هَرَشَانْ اُرْغَب ٥
Caragana pygmaea (S). *Caragana pygmée* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. قرونها متدلية. اوراقها رباعية التركيب نصلها ضيق الصفحة السنائية الشكل يطول نحو ٢ سم. ويعرض نحو ٣ سم. ازهارها فردية، لونها الى الصغار الزاهي || تنوره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٨٠٨ - هَرَشَانْ الصَّيْنُ ٥
Caragana chinensis (S). *Caragana de la Chine* (F).
 نوع من المرشان جنيته تملو نحو ١٥٠ سم. اوراقها رباعية التركيب. ورقاتها بيضية الشكل تملو من ١ الى ٣ سم. وتعرض من ٦ الى ١٥ سم. نصلها مائل البشيرة على صفحيه اذنياتها شائكة. ازهارها فردية التجميع، كبيرة القد، متدلية لونها الى الصفرة يملوها تنسج اريواني ازرق الملاج. تنوره يستمر طول شهر سزيان.

٢٩٨٠٩ - هَرَشَانْ صَغِيرُ الْوَرَقِ ٥
Caragana altaiana, *C. microphylla* (S). *Caragana à petites feuilles*, *Acacia de Sibérie* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو نحو ٢٥٠ سم. ورقاتها تمد من ١٨ الى ١٨ وهي بيضية الشكل مستديرة الطرف. نصلها يطول نحو ١٠ سم. وهو خالي البشيرة على صفحيه. ازهارها فردية او ثنائية التجميع، لونها الى الصفرة الجلييلة. تنوره يستمر من ايار الى حزيران.

٢٩٨١٠ - هَرَشَانْ بَرْتَقَالِي ٥
Caragana aurantiaca (S). *Caragana orangé* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها فراء. قرونها متدلية. اوراقها رباعية التركيب غيقة النصل الذي يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ٣. ازهارها فردية، برتقالية اللون || تنوره يستمر طول شهر سزيان.

٢٩٨١١ - هَرَشَانْ شَالِكَه ٥
Caragana spinosa (S). *Caragana épineux* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها فراء، اوراقها لاقامية التركيب منها الرباعية الاصبعية الشكل ومنها السداسية والثمانية الورقيات. نصلها يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض نحو ٥ سم. صفحته العليا خضراء اللون، صفحته السفلى خالية البشيرة حملاء. راشات اوراقه شائكة تملو من ٣ الى ٤ سم. ازهارها الى الصفراء الكبريتي. تنوره يستمر من نيسان الى ايار.

٢٩٨١٢ - هَرَشَانْ كَبِير ٥ * شَجَرَةُ الْحَمَصِ
Caragana arborescens (S). *Caragana arborescent*, *Arbre aux pois* (F).
 نوع من المرشان. جنيته تملو من مترين الى خمسة امتار. ورقاتها لاقامية العدد الذي يراوح من ٦ الى ١٢ نصلها تملو من ٢٠ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٥ سم. ازهارها ذهبية اللون، ثلاثية التجميع او فردية. بزورها مأكولة وهي كالحصص شكلاً وقذاً وطعماً || تنوره يستمر من ايار الى سزيان.



هرش الباقية



هرش البقول



هرش الترس

هَرَضُ الشَّيْلَك - هِرْبَلَّة



هرض الشيلك



هرض الصغر



هرض المرث



هرض النصف



هرض القطايات



هرمة الكوباي



هرغ

من نصال الازراق || السرة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٥ م. جسمها محبب الشكل ، مستنق المقدم والمؤخر . ثوبها الى الخضار الاسود تملوه ثلاثة خطوط صفر وخطان اسودان وتجميع سكي غير . رأسها اسود . منها ورواها الى السرة الداكنة || طول الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقريبا المخادرة متدلية برجلها متفردة الحصىفة .

Lycenidae

٢٩٨٢٦ - هَرَضِيَّات

فضيلة حشرات قراشية تترنق بالفتيات ، اطها .

٢٩٨٢٧ - هَرَضُ ، هَرَضِيَّة

علم الحيوان المتهزل انحصار علم النجبة الكبيرة المهزولة .

Gaudinta (S).

٢٩٨٢٨ - هَرَضَام ، غَوْدِيَّا

Gaudinta (F). Gaudinta (E).

جنس نباتات معقودة التعريف على اسم الدلالة وفدين . وهي نباتات عشبية ، بيرة ، حليسة ، من فصيلة التنبليات . انواعها المروقة قليلة العدد منها حوض البحر الابيض المتوسط || جميعها شتى ، سيقان مائلة او خالية . عصفها سطح النصال الباحة الخضار . انزاعها سنبل . ستيلاها متصبية .

٢٩٨٢٩ - هَرَضَمَان هو الخراط البري ، اطها .

٢٩٨٣٠ - هَرَمَّة الكُوْبَاي *٥

Gyropus ovalis (S). حشرة جلدية دقيقة من فصيلة الحمرجات . طولها نحو ١ م. جسمها مبسط الشكل . زياناها وثاقيرها ورباعية التركيب . مقاطعها عديدة الاطراف الحادة || تركب الكوباي وتؤديه .

Gyropidae

٢٩٨٣١ - هَرَعِيَّات *٥

فضيلة حشرات جلدية من رتبة القمليات . اجناسها وانواعها كثيرة البدن جميعها صغيرة القند مغلفة الجسم مقنعة الارصاد تنطرق على الحيوانات الجبونة من ذوات الور الجمل النام .

٢٩٨٣٢ - هَرَفِس ، هَرَفِس *٥

Improllique (F). الطقم من النبات .

Nyctes nivea (S).

٢٩٨٣٣ - هَرَفِع *٥

Harfang des neiges (F). طائر من البويات وحماره اللغديات . موطنه جيم الاصفاق الشمالية الباردة . طوله نحو ٧٠ سم . ويسكن لا تفل من ١٥٤ سم . لونه الى البياض الناصع في الطائر البالغ وهو متمش ويمش بالسرعة في الطائر الفرخ . رأسه صغير القند . عنقه قصير قافر القرقص . منسره اسود والجسم والجره . عيناه الى الحمرة الصنائية . ذنبه مستطيل الريش . ارساه وغالبه قصيرة القند كاسية . || يشق منه في تخاليف الصخور . انشاء تصنع من ه الى ١٠ يضايت تحضنها بتلوابة الذكر . قوته الجرد والفار والدين والمروم والسلك .

Heracleum (S). Berce (F).

٢٩٨٣٤ - هَرَكَلِيَّة

جنس نباتات عشبية كبيرة القند من فصيلة الحمرجات . انواعها المروقة قليلة لا تتعدى الثانية . مهدا جبال اخيشة والهند والشرق الاوسط واروبة الفرية وامريكية الشمالية . منها النباتات المعمرة والمحولة . ابروتها ريشية مغلقة او كفية النصل . يستخرج من سيقانها واروقها وزاعمارا

المهدب || ريقها صغيرة القند سوداء الرأس قبلو في ازل مهدا خضراء الجسم كيفية الحلب الاسود ثم يثف عليها ويحول لونها الى الحمرة ويبلغ طولها نحو ١٢ م . تركب ثمار الزمان والدولة وقد تترنق في البحر .

٢٩٨٢١ - هَرَضُ الشَّيْلَك *

Polyommatus icarus (S).

فراشة من الهرض . جسمها اسطواني الشكل مخضور الوسط اطبل الثوب يطول نحو ٣٢ م . رواشن ذكورها الى الزرقاة البنفسجية يطوقها حنار اسود واطار من المهدب الابيض . رواشن انثاه حنطية اللون صفراء المواج يطولها تمنيض اسود وايض واجر . اطارها ابيض المهدب || ريقها تركب اوراق مختلف النباتات انحصارها الثقيل .

٢٩٨٢٢ - هَرَضُ الصَّغَر *

Polyommatus meleager (S).

فراشة من الهرض . طولها نحو ٣٦ م . رواشن ذكورها الى الزرقاة البوارية الالامية يطوقها حنار اسود وتهدب ابيض . رواشن انثاه الى الطحله الصفراء المواج يطولها تنقيط اسود وتسنج اسمر . قواصها ذرق الانتشاب اطولها غير المهدب || ريقانها ناهة تركب الصغرة وسائر النباتات البرية .

٢٩٨٢٣ - هَرَضُ العَرْن *

Polyommatus dolus (S).

فراشة من الهرض . جسمها يطول نحو ٤٥ م . رواشن ذكورها الى الزرقاة النبراء المواج يطوقها حنار اسمر واطار من المهدب الابيض . رواشن انثاه الى المحتلي الاصهب المواج يطولها تنقيط دقيق اسود ويطوقها حنار مهدب غير . || ريقانها تركب اوراق وسنق المرث والقص .

٢٩٨٢٤ - هَرَضُ النَصْف *

فراشة من الهرض . جسمها يطول نحو ٣٠ م . رواشن ذكورها الى الزرقاة النصفية المواج يطوقها حنار اسمر يتخلله بعض النقط السود واطار مهدب ابيض . رواشن انثاه حنطية اللون زرقاء المواج يطولها تمنيض وتنقيط وتسنج واطار من المهدب الابيض . || ريقانها تركب سطح نباتات المراعي انحصارها النصف .

٢٩٨٢٥ - هَرَضُ القَطَايَات *

Polyommatus coridon (S). Polyommatus coridon (E). P. des légumineuses (F).

حشرة من فصيلة القمليات ورتبة حشرجات الاجنسة . موطنها يشمل معظم اقطار البلاد المحتلة الحارة من العالم القديم . فراشها جارية قوتها رقيق الازهار . سرقها تمنيض على اوراق القطايات وجوبها قيل ان تبلغ الادراك تمام || جسمها مخضوب القند يطول نحو ١٣ م . بسطها نحو ٣٤ م . رأسها مبتدل الجرم . عيناه كيرتان . زياناها صرغانيان . جوشها ازرق اللون عند الذكر ، كستنية عند الانثى . بطنها كستني اللون عند الشقين || رواشن الذكر الى الزرقاة يطولها مواج لفي وبنق كستنية وخطوط سود . رواشن الانثى الى السرة الكستنية يطوقها في الزوج الامامي تهديب ابيض تترنق خطوط حنطية ، ويكتنفها الزرور الخلفي حزام نصفي اللون من النقط الحمر يتوسطها الاسود || لها جبل واحد في الحلق . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح في الثمار : تماطل بد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتقع المكن ميعاديا على الصفحات السفل

ثوبه الى الزرقاء السمراء المراج، يطنه اقل صرمة واكثر ييانسا. يتميز بفكيه المستطيلين وبزئافنه الصدرية المستعرة. قوته الاسماك والقشريات. || موطنه جنوب المحيط الاطلسي بين امريكة وافريقية.

٢٩٨٤١ - هرْكُولُ القُطْبُ

Balaenoptera borealis (S). Rorqual boréal (F). نوع من المراكلة. طوله نحو ١٥ م. يتميز بصغر زئافنه الظهرية والصدرية. يعيش اسرابا كبيرة العدد. قوته السلك والقشريات والرخويات والحث. || موطنه القطب الشمالي وقد يقترب، في بعض فصول السنة، من شطوط ايسلندا والنرويج.

٢٩٨٤٢ - هرْكُولُ حَيْرُوسِي

Balaenoptera rostrata (S). Rorqual à rostre (F). اصغر انواع المراكلة. طوله يراوح من ٧ الى ١٠ متر. اشتهر الى الكهنة السمراء المراج. يطنه الى اليابس الكندر. زئافنه الصدرية سمر القواعد والاطراف بيض القسم الاوسط. قوته الاسماك دون سواها. || موطنه شمالي المحيط الاطلسي وبحار التروج وقد شوهد في المتوسط.

٢٩٨٤٣ - هرْكُولُ مَعْرُوفٌ * و مَتَارَكَة

Balaenoptera musculus (S). Rorqual commun (F). Finback, Finner (E). نوع من المراكلة. طوله يراوح من ١٨ الى ٢٠ م. ظهره احمر اللون، وصاحي للمواج. يطنه ابيض الكندر. موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد في المتوسط. يعيش جماعات. سره يحد من ١٥ الى ٢٠ نفرا. قوته السلك والقشريات يرافق اسراب الزئكة حيث تتجه.

٢٩٨٤٤ - هرْكُولِيَّاتٌ * و Balaenopteridae (F). Balaenopteridés (F).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة فصليحات الاذنك ورتبة الحويئات || انواعها المعروفة عشرة، جميعها كبيرة الجرم ضخمة. اشتهرها الهركل الازرق والهركل الحزوي وهركل القطب والهركل المعروف الذي يدعى منارة وكعبة الجنوب وكعبة الخليج وكعبة القطب المعروفة بجمل البحر.

٢٩٨٤٥ - هرْمُ

الهرم: ضرب من الحفش فيه ملحوة وهو اذله واشده اتساعا على الارض واستطاحا. ا. م.

٢٩٨٤٦ - هرْمِيلَة

Triton (F). هي التروته، من اسماك المياه العذبة. اطلها.

٢٩٨٤٧ - هرْغُوسٌ *

Hemipterus (S). Hémiptère (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القديات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطتها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها وشعيبة الشكل، مستعينة، تقطوع من ٤ الى ٦ سم. رؤوسها كبيرة، مستعينة طولها زعانف واطراف متباينة الاشكال عديدة. اشكالها كبيرة. زئافنها الظهرية والصدرية والقشرية كبيرة، كثير المناسخ الحادة. زئافنها الخلفية صغيرة، والذيلية مقبولة. اذوابها الى الربعة الرصاصية المراج يملوها في ظهورها تتجبع اسمر. رؤوسها حفرها اللون فضلة والحطني الاسمر || حومها كاعنة الصنف.

نوع من الكحول جيد الصنف. وقد تستعمل اورلقها في صناعة مشروب خاص قريب الشبه من الجعة || اشتهر انواعها ما يلي.

٢٩٨٣٥ - هرْكِلِيَّةُ اِيْرَانِيَّةٌ *

Heracleum persicum (S). Berce de Perse (F). نوع من الهرقلية المصرة القواعد العرف المستحب. مهدا بلاد ايران. يجلتها تملو من مترين الى ٣ متر. اورلقها مركبة. فصوصها ذرية. تصلها حايق الحصار الالسي. ازهارها كبيرة القذ، يشاء اللون. اورلقها وعماها صناعة يستعمل منها صغر فاخر الصنف ويستخرج منها مشروب شائع الاستعمال. || تنورها يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٨٣٦ - هرْكِلِيَّةٌ زُغْيِيَّةٌ و هرْكِلِيَّةٌ صَنْبِيَّةٌ

Heracleum pubescens, *H. gummiferum*, *H. speciosum* (S). Berce duvetée, B. pubescente (F). Downy cow-parsnip (E). Flaumiges Herkuleskraut (D). Panace (I). نوع من الهرقلية المصرة العامة العرف. مهدا بلاد القفقاز. يجلتها تملو من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. ساقها زغيبه البهاء. اورلقها مركبة. وريقاتها كبيرة القذ. تصلها شائك الحافة، اخضر الصفعة العليا، خلى السفلى. ازهارها الى اليابس الكندر. || سويقها تنضج عند حرها او تلقها مادة سكرية مأكولة يقال انها جزية النفع. ويستخرج منها وين اورلقها مادة كحولية شائعة الاستعمال. تنورها يستمر من حزيران الى آب.

٢٩٨٣٧ - هرْكِلِيَّةٌ صَوْبِيَّةٌ

Heracleum lanatum (S). Berce laineuse (F). نوع من الهرقلية المصرة. مهدا امريكة الشمالي. يجلتها تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقها وفروعها زغيبه البهاء. اورلقها قلبية الفصوص المسننة الحافة. تصلها اخضر الصفعة العليا، ازغب السفلى. ثمارها صغيرة القذ. تنورها يستمر من حزيران الى تموز.

٢٩٨٣٨ - هرْكِلِيَّةٌ نَافَعَةٌ * و سَنَدَلِيَّونٌ و غَيْطَلٌ

Heracleum sphondylium (S). Berce branche-ursine, Patte d'ole (F). Meadow parsnip, Cow-parsnip, Hogweed (E). Heilkraut, Welsenherkuleskraut (D). Spodillo, Panace ercule, Zampa d'oca (I). اشتهر انواع الهرقلية واكثرها انتشارا. تتميز من النباتات الفائرة لان عناصرها القلبية حساسية تؤذي المواشي التي تاكل اورلقها. ومع ذلك فزراعها شائعة ويستخرج منها كحول جيدة الصنف ويصنع من اورلقها مشروب مستحب الطعم قريب الشبه من الجعة.

٢٩٨٣٩ - هرْكِلِيَّةٌ

Balaenoptera (S). Balaenoptère, Rorqual (F). Rorqual, Fin whale (E). جنس حيوانات بحرية لبونة من الحويئات. انواعها المعروفة اربعة ومنهم من قال ١٢. جميعها كبيرة القذ وشعيبة الشكل، ضخمة الرأس الذي لا يقل طوله عن الزمام الاول من الجسم. اعناقها مستطيلة التنفذية. زئافنها الظهرية محببة الى الزرد. زئافنها الصدرية ذرية الاطراف. موطنها جمع البحار تجوبها في طلب الحصيد والحش.

٢٩٨٤٠ - هرْكُولُ اَزْدِي

Balaenoptera sibbaldi (S). Baleine bleue, Rorqual de Sibbald (F). اكبر انواع المراكلة واخصها جنة. طوله نحو ٢٦ م.



هرقلية ايرانية



هرقلية ناعمة



هركل معروف



هرغوس



هرنة الشروش



هرندي



هرنوع اسفغ



هرنوع يرتقالي



هرنوع جامد



هرنوع غيث

٢٩٨٦٠ - هرنوع نبات

Hermandiaceae (S). Hermandiaceae (F). Hermandiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين كثيرة النباتات منخفضة المبيض. اجناسها وانواعها قليلة العدد، اعطائها بعض المناطق الاستوائية من المالحين القديم والجديد || نباتاتها اشجار كبيرة، فراء. اوراقها مضقة، متعاقبة، جامدة، الاتصال القلبية الشكل او البيضاوي، ازهارها متكررة || تتجمع، طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة صفراء اللون او نيتية. ثمارها مسهلة، اغشائها صناعية.

٢٩٨٦١ - هرنوع، هرنوع، بوليتس

Boletus (S). Bolet (F). Boletus (E).

جنس فطور من فصيلة السيات الشثلية. انواعه كبيرة العدد تألف الفنايات والاشراج القليلة اصغرها حراج الستيدان. بعضها مأكول مستحب الطعم وبعضها جعلي هار او كثير الاذى. اشكالها واجناسها واولاها مختلفة، جميعها قطنوية المسائل الجلمدة اللادة || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٢٩٨٦٢ - هرنوع اسفغ

Boletus aereus (S).

Bolet bronzé (F).

نوع من الهرنوع المأكول. يعيش ويتكاثر في التربة. ساقه غليظة اللد، وردية اللون. صفاته كبير القد، فارش القطنوس، كسني اللون، اسفغ المالح. مكروه ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٣ - هرنوع البقر

Boletus bovinus (S). Bolet des boeufs, Albarelle (F). Boletus bovinus (E).

نوع من الهرنوع ينتمي الى فصيلة السيات الشثلية. ينتشر من الفطور المأكولة. يعيش على اشجار الخور والكتنة || جلعه اسطوانية الساق المنصبة. صفاته كبير، فارش، جامد اللحية، حنلي اللون، اصفر المالح. مكروه الى البياض التي ينحرف الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٤ - هرنوع برتقالي

Boletus aurantiacus (S). Bolet orangé (F).

نوع من الهرنوع المأكول مستحب الطعم. يعيش على جذور الستيدان. ساقه غليظة. صفاته كبير. القد، يرتقالي اللون، وزن من ٦٠٠ الى ١٠٠٠ غرام. مكروه ابيض اللون ينحرف الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٥ - هرنوع جامد

Boletus scaber (S). Bolet rude, Roussille (F).

نوع من الهرنوع المأكول مستحب الطعم. يعيش على جذور الستيدان. جلعه يشي الشكل، صفاته كبير القد، جامد اللحية، حنلي اللون، اسفغ المالح. مكروه ابيض اللون ينحرف قليلا الى الوردي عند تأكله من الهواء.

٢٩٨٦٦ - هرنوع غيث

Boletus luridus (S). Bolet pernicieux, B. bième (F).

نوع من الهرنوع الجسامي اللادة، صريف الطعم، مر اللذان. ساقه غليظة حراء البشرة. صفاته كبير القطنوس القارضة، حنلي اللون، اسفغ المالح. مكروه ابيض اللون ينحرف الى الزرقه عند تأكله من الهواء.

Pyramidal (F).

٢٩٨٤٨ - هرمي

نمت وسمي يطلق على ما كان شكله يشبه الهرم.

٢٩٨٤٩ - هرميس

هو الكركدن الابيض، اعطيه.

٢٩٨٥٠ - هرميسكة

اثنى الحيطان.

٢٩٨٥١ - هرميسيوم

Hormiscium (S).

جنس فطور مجهرية من الدغيات وعسيلة الطحيسات. سمجها مفطور التركيب. جبرها الكندية سمجية الانظام، متعققة الاطراف، ملونة اللادة. || انواعه قليلة العدد تعيش على المواد المصفوبة والنباتية السائرة الى الانحلال.

٢٩٨٥٢ - هرميسكة

Hermella (S).

Hermella (F). Hermella (E).

جنس ديدان حلقيه فصائية من فصيلة الهرميسيات انواعها المعروفة عديدة تعيش في رمال الشواطئ التي لا تنشق منها المياه، ضمن انايب هريذة الارتكاز تضم فروعها بملاسها الراسية الكثيفة المسد.

٢٩٨٥٣ - هرميسيات

Hermellidae (S).

Hermellidae (F). Hermellidae (E).

فصيلة من الديدان الحلقيات النقصية. اجناسها المعروفة قليلة العدد موطنها رمال الشواطئ البحرية في الاقاليم الجارية والمعتلة الحارة || اشهر اجناسها الهرميلة.

٢٩٨٥٤ - هرمين

Hermine (F).

هو القاتم، حيوان من السرايبي.

٢٩٨٥٥ - هرميسكة

مفي اللودة.

٢٩٨٥٦ - هرنوع

الواحدة هرنوع. جنس حشرات جلدية من فصيلة الهرميسيات. انواعها عديدة تركب الطيور الجوارح. جميعها ذرية القد، مستطيلة الجسم والرأس، دقيقة الانواع، متباعدة الحلب النظامي الارتكاز. || اعرف انواعها هرنوع الشروش.

٢٩٨٥٧ - هرنوع الشروش

Ricinus (S).

حشرة جلدية من الهرميس. طولها نحو ٣ م. راسها مبط المقدم، تكتنرها قوية، زباناها جمدة. بطها بيضي الشكل. || تركب الشراشير والمصانير الفريدة فتؤذيها وقد تقتضيها.

٢٩٨٥٨ - هرنيسيات

Ricnidae

فصيلة حشرات جلدية من رتبة القلذيات. انواعها عديدة. اجسامها دقيقة، مستطيلة الشكل، مفلطحة، طولها يراوح من ٣ الى ٣ م. تعثر الطيور الجوارح انصبا الشروش والمصانير الفريدة || اشهر اجناسها الهرميس.

٢٩٨٥٩ - هرنندي

Hernandia (S).

Hernandia (F).

جنس نباتات مجهرية من فصيلة الهرميسيات. النوع المعروفة سمجة جميعها من اشجار المناطق الاستوائية. اوراقها متعاقبة، متعققة، قليلة النصل الجلمدة المنهدبة الصفحة. ازهارها متكررة التجمع، طرفية الارتكاز. ثمارها مسهلة اغشائها صناعية. تقع اوراقها منشط شايق يستعمل حقناً بالسرم.

٢٩٨٧٤ - هَرِيَّات ، قِيدِيَّات Amentacées (F).

Amentaceous plants (E). هي النباتات التي تكون أزهارها الذكرية على شكل حريرة أو قدة تلك الفلجوزيات والبقيصيات والسندانيات إلى آخره جميعها من الهريات .

٢٩٨٧٥ - هَرِيَّاع Feuilles mortes (F).

Dead leaves (E). الورق تنفضه الريح فيتناثر على الأرض .

٢٩٨٧٦ - هَرِيرَّة ، قِيدَة Chaton (F).

Setting of a gem (E). نظام هجرة قوائم سنبله مركبة من أزهار وسيدة الشق .

٢٩٨٧٧ - هَرِيَّصَة Mare d'eau stagnante (F).

Pool (E). مستنقع الماء الساكن .

٢٩٨٧٨ - هَرِيَّعَة Pelcaris (S). Peltaire (F).

جنس نباتات برية حولية أو معمرة من فصيلة السليبيات . أنوعها المعروفة أربعة أعطتها الشرق الأوسط وأروبة الشرقية . أوراقها متعاقبة . أزهارها عنقودية التجميع ، طرفية الإزتكاز . ثمارها غريدلية مبطة || أشهر أنواعها هريمة الثوم .

٢٩٨٧٩ - هَرِيَّعَة الثَّوْم * Pelcaris alliacea (S).

Peltaire alliaire (F). Shiefdwort (E). Knoblauchs-helbenkraut (D). Peltaria (I). نوع من الهريمة المبولة المسومة . أوراقها متعاقبة يغبية الشكل حاضنة ، فصلها حايق الخضار البحري ، ناشر الاصباح . أزهارها يضاء اللون || أوراقها ثوبية الرائحة عند المس . يقال أنها طيبة تفيد المعدة وتظهر الاسماء .

٢٩٨٨٠ - هَرَاوَر Luscina, Philomela (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). جنس طير من فصيلة الشغليات . أنوعه ثلاثة الهزار الأشرق والتندليب والمزقة . أجسامها صغيرة القد مستطيلة الشكل . مناقيرها دقيقة مدنية الملاقط . أجنتها وأذنانها متوسطة الحجم . أرساغها طويلة . أصابعها بحيلة . أطافرها ضيقة . ألوانها بحيلة الألوان المتخالفة المتراكبة || جميعها غريزة تألف المواقع الربطية . تجوب البلاد في طلب الحصيد وللشق . تنقن في الإذفال وقد تركر شعبها على الحضيض بين الشب . قوتها الحشرات .

٢٩٨٨١ - هَرَاوَر أَشْرَق * Philomela major, Luscina luscina (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). جنس طير من فصيلة الشغليات . أنوعه ثلاثة الهزار الأشرق والتندليب والمزقة . أجسامها صغيرة القد مستطيلة الشكل . مناقيرها دقيقة مدنية الملاقط . أجنتها وأذنانها متوسطة الحجم . أرساغها طويلة . أصابعها بحيلة . أطافرها ضيقة . ألوانها بحيلة الألوان المتخالفة المتراكبة || جميعها غريزة تألف المواقع الربطية . تجوب البلاد في طلب الحصيد وللشق . تنقن في الإذفال وقد تركر شعبها على الحضيض بين الشب . قوتها الحشرات .

٢٩٨٨٢ - هَرَاوَر هَرِيد * Philomela major, Luscina luscina (S).

Rossignol (F). Nightingale (E). جنس طير من فصيلة الشغليات . أنوعه ثلاثة الهزار الأشرق والتندليب والمزقة . أجسامها صغيرة القد مستطيلة الشكل . مناقيرها دقيقة مدنية الملاقط . أجنتها وأذنانها متوسطة الحجم . أرساغها طويلة . أصابعها بحيلة . أطافرها ضيقة . ألوانها بحيلة الألوان المتخالفة المتراكبة || جميعها غريزة تألف المواقع الربطية . تجوب البلاد في طلب الحصيد وللشق . تنقن في الإذفال وقد تركر شعبها على الحضيض بين الشب . قوتها الحشرات .

٢٩٨٦٧ - هَرُونُوع لَئِيد * ، بَليطس كَاف Boletus edulis (S).

Bolet. comestibilis, Cèpe, Ceps (F). Esculent boletus, Polish mushroom (E). Edelhöhrling (D). Boletus comestibilis (I). أشهر أنواع الهرونوع للأكل . لذيق الطعم ، مستحب اللذاق يعيش ويتكاثر على التربة في ظل الأشجار الحرجية اغصبا السديان . صفاته قلنسوي الشكل ، كبير القد ، جامد الصلبة ، لونه إلى البياض إلا كندر الأصفر الملوخ . مكسره أبيض اللون ينصرف إلى الوردي عند تأكله من الخوا .

٢٩٨٦٨ - هَرُونُوع نِيلِي * Boletus cyanascens (S).

Bolet. indigotier, B. bleusant (F). نوع من الهرونوع الجمال المؤذي المر اللذاق . ساقه خفيفة حمراء اللون . صفاته كبير القد قريب الشبه من صفات الهرونوع الأسفع . مكسره أبيض اللون ينصرف إلى الزرق النيلة عند تأكله من الخوا .

٢٩٨٦٩ - هَرُونُوعِي * ، هَرُونُوع Apera spica-venti (S).

Agrostide des champs, Jouet du vent, Epi du vent (F). Corn grass, Silky bent grass. Wind grass (E). Windhalm, Echter Windhalm (D). Spica venti (I). نبات عشبي بري مرعوي معمر من فصيلة النجيليات . يكثر بين الزروع وفي الأراضي البرية المنسأة .

٢٩٨٧٠ - هَرِينِيس * Heliornis fulica (S).

Héliorne (F). Heliornis (E). طائر وسيد الجنس والنوع من فصيلة التفلقيات . قريب الشبه بالنعاس والفرقة . يألف المستنقعات والبحيرات وصفات الانهر . قوته الحشرات والنباتات المائية || جسمه متوسط القد ، يطول نحو ٣٠ سم . يتميز بطول عنقه ويقصر ذنبه المستدير . رأسه مثقل الجرم . متقاده ضليع مدبب الطرف . جناحا فارشان ، لاضفان . ساقه قصيرتان . أصابعه مستطيلة محظبة تمكته من السير على الأعشاب المائية . ثوبه العلوي متداخل الأسود والأصفر . ثوبه السفلي إلى البياض إلا كندر . رأسه وعنقه بلون الصفر تملوها جذة سواد أول تمتد من قاعدة المنقاد إلى الرءاء . وجدته ثانية تمتد من طرف العين إلى الظهر || يندثن عشه على ضفاف الماء بين القصب والاسل . الألق تحضن سدما نحو ١٢ بيضة بيضاء الذكر بلون لها الفلاء . الترخيم يستمر نحو ثلاثة أسابيع .

٢٩٨٧١ - هَرَهَرَة Bèlement (F). Bëasting (E).

صوت الفأن .

٢٩٨٧٢ - هَرِهِير Pempéhride (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف . الوانها المعروفة قليلة العدد ، أعطتها مجاور البلاد الحارة . أجسامها صغيرة القد مفطحة . مبرتها مستديرة كبيرة ، أثوابها إلى السرة . ظهورها ينسجية الملوخ . بطونها فضية . لحويها مأكولة تعتبر من الاصناف المادية .

٢٩٨٧٣ - هَرُونِي Granier (F).

Granary, Corn-loft (E). هو الانبار ، مستودع رطب الجوانب تجمع فيه الحبوب . ج أمراء .



هرونوع لذيق



هرونوع نيلي



هرونوي



هريس



هريمة الثوم



هزار أشرق



هَزَان



هَسَس جِل



هَسِيرُ الْهَزَايَاتِ



هَسِيرُ الشَّيْكَ



هَسِيرُ الْعَرَسِجِ



هَسِيرُ الْفَرَايِسِ



هَسِيرُ الْقَرْطَمِ

٢٩٨٩٠ - هَسِيرُ ٥

Hesperia (S).
جنس حشرات من فصيلة الهسيريوات. أنواعه المروفة كثيرة العدد اما الصادرة قليلة. فرائدها صغيرة القند طولها ٢٣ الى ٣٣ م. اجسامها مودية الشكل. اوتارها الى السمرة. دراشتها مزركشة وبمقبة. مكها كروي الشكل تنحصر على صفحات الاوراق السفلى. اشهر انواعها واشهرها ما يليق.

٢٩٨٩١ - هَسِيرُ انْخِيزَانِيَاتِ ٥

Hesperia mahve (S). Plain-chant (F).
حشرة من الهسير. فرائدها صغيرة القند طول نحو ٢٣ م. ثوبها الى السمرة السوداء تملوها مابة نفية. دراشن ذكورها واناثها قريبة الشبه لا يفرقها سوى الساع التيقيع الابيض في الذكور. يكثر وجودها في نيسان وايار وفي تموز وآب. يرقاتها مؤذية تركب الخيازيات والنباتات والشجيرات والشجك والبرج.

٢٩٨٩٢ - هَسِيرُ الشَّيْكَ ٥

Hesperia serrata (S).
حشرة من الهسير. فرائدها تطول نحو ٢٢ م. ثوبها الى السمرة الخفيفة. دراشن ذكورها الى الطلعة يتخللها وتيقيع اخضر. دراشن اناثها كستية اللون يتخللها تجلجج وتيقيع ابيض. يكثر وجودها من تموز الى آب. يرقاتها مؤذية تركب اوراق الشجك.

٢٩٨٩٣ - هَسِيرُ الْعَرَسِجِ ٥

Hesperie des ronces (F). *Hesperia sao* (E).
حشرة من فصيلة الهسيريوات وربة حشرقيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم. فرائدها واسعة قوتها رقيق الانوار. سربها تمشي على اوراق السورج والبلان. جسمها صغير القند يطول نحو ١٠ م. بسطها نحو ٢٣ م. رأسها كستي اللون. عيناها كيرتان. زياتها صانديليان. جوتها وبطنها الى الكستي القاتم. دراشن الذكر الى السمرة الكستية تملوها رشفة بيضاء. دراشن الانثى اقل لمة وروبوقا. ما جيلان في الخيل. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. ترحل في التبار. تماثل بده ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن مبعادي على امان الاوراق ونصالحا. رائحة منه بلوطها الكمال تطول نحو ٢٥ م. جسمها اسطواني الشكل. مائل القشار. اطول اللون، اصفر اللوح، جروي الرأس، اسمر اللبد والرواسب. طوره الاكمال الذي يستمر في الجبل الاول نحو ١٥ يوما، يستمر في الجبل الثاني نحو ١٨ اسبوعا وينتضي ضمن صلجة تحميها السرعة بين الاوراق.

٢٩٨٩٤ - هَسِيرُ الْفَرَايِسِ ٥

Hesperia proo (S).
حشرة من الهسير. فرائدها تطول نحو ٣٠ م. ذكورها واناثها متساويان في القند. ثوبها اسمر كستي المزاج. دراشنها مزركشة ومقبة وهي في الذكور زاهية الالوان المزركزة على الخيطي الاخير. يكثر وجودها من حزيران الى تموز. يرقاتها تركب الفراسين وشار النباتات الخيانية.

٢٩٨٩٥ - هَسِيرُ الْقَرْطَمِ ٥

Hesperia carthami (S).
حشرة من الهسير. فرائدها تطول نحو ٣٠ م. ثوبها الى

٢٩٨٩٤ - هَزَان * *Ophthocomys* (S). Hoazin (F).

جنس طير من فصيلة الراسيات. انواعه قليلة تتميز بالحميا المسجونة التي تشبه رائحة الفئوس. جميعها مستطيلة القند الرقيق، قوية المخار، قزمية الرأس، نحيلة المنق، مستدرة الاجنحة، مستطيلة الذيل، اوتارها الى السمرة السوداء يملوها تأثير ابيض وتوشج وتوشج. عنقا وجوتها الى الفياض النقي. تالفت الاحراج. تمشي اسراب كبيرة. قوتها النار. تشن عشا، في الاذغال والاشجار المنقمة، فوق الماء. اناثها تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها وسدها اربعة اسابيع.

٢٩٨٩٥ - هَزِيرُ ٥

من اسماء الاسد المشهورة.

٢٩٨٩٦ - هَزْرُوجُ ٥

Pied du champignon (F).
هو ساق الفطر.

٢٩٨٩٧ - هَسَّاسُ ٥

Pelidna (S). *Pelidna* (E).

جنس طير من دجاسيات الارض. انواعه المروفة قليلة العدد. جميعها من القواطع. اجسامها صغيرة القند، قريبة الشبه من الجهلول. اوتارها الى الربة الخفيفة، تمشي وترقش بالاسمر في الظهر والجناب، تفرز وتقيض في المنق والجوشن والابل والبلطن. متألها مستطيلة، دقيقة. اذنانها قصيرة. اجنتها لاسفة. قوتها الحشرات والديدان والحزوين والرعويات. اعرف انواعه واشهرها الحساس الجبلي.

٢٩٨٩٨ - هَسَّاسُ جَبَلِيٌّ *، جَهْلُولُ الشَّرْقِ

Pelidna alpina, *Tringa subarctica* (S).

Pelidne alpina, *Bécasseau corcoll* (F).

Curlew-Sandpiper (E).

طائر من الحساس. اصطنه قسيمة الارواء تحت من اليبان الى اودية. مصيفه جبال البلاد المعتدلة الحرارة. مشتاه ساحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر ويصر والسودان والحبشة. جسمه صغير القند. طوله نحو ١٦ سم. ثوبه الى الربة الخفيفة. ظهره عاين اللون يملوه تميمين اسمر واخضر. عنقه وجوتته وبطنه الى الفياض الاخير يقيم بقية التي في المصدر. متقاده اسمر اللون، رصاصي المزاج. هيئة الى السمرة الكستية. يذثن في الغرض قليل المنق، صاحي الشكل، يططه بانم الحاشاش. حشسته من ٣ الى ٤ بيضات ترخها الانثى دون الذكر نحو ١٧ يوما.

٢٩٨٩٩ - هَسِبَّةُ ٥

Hipse (S).

Hipse (F). *Hipse* (E).

جنس حشرات خافضة من حفيات الاجنحة وفضيلة الضاربات. انواعها المروفة نحو ٣٠٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد الاسرائيلية والحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. اجسامها صغيرة القند تطول من ٧ الى ١٠ م. دروسها صغيرة. هيوتها بارزة. قوتها الاستشعارية عجيطة منتصبة. كراسلها وامدادها وحواشي بطرتها مدرزة بالشوك اللدن الحاد. امدادها شبه جنية الشكل مستديرة المؤخر الاذن. اوتارها متباينة الالوان والمخاطبات، يكثر فيها الاسود وشفتها ثم الجروي ثم الكستي والقي.

(١٦٩٥-١٧٣٣) أنواعها عديدة تنتمي الى فصيلة القنويات. أصلها البلاد الأمريكية. جميعها أعصاب سريوية ممرية. أوراقها متقابلة. أزهارها قلبية الشكل، مستطيلة المالحق || أشهر أنواعها ما يتبع.

٢٩٩٠٣ - هسپيرنثه أرجوانية

Houstonia purpurea (S). *Houstonia purpurea* (F).
نوع من المستوية. ساقها خضراء تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. أوراقها بيضوية النصل، صغيرة القد، ثلاثية أو خماسية الفصوص. أزهارها أرجوانية اللون، حامية الزينة. تنورها يستمر من أيار الى أيلول.

٢٩٩٠٤ - هسپيرنثه كرسية

Houstonia carulea (S). *Houstonia bleue* (F).
نوع من المستوية. ساقها خضراء تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها بيضوية أو أحليبية النصل، صغيرة القد، فردية الفص. أزهارها الى الزرقاء البنفسجية الملوحة. أزهارها يستمر من نيسان الى تموز.

٢٩٩٠٥ - هسپيرنثه صخرية الورق

Houstonia serpyllifolia (S). *Houstonia à feuilles de serpolet* (F).
نوع من المستوية. ساقها خضراء نحيلة تملو من ٨ الى ١٥ سم. أوراقها كالأوراق الصخر البري شكلًا وقد ولوًا. أزهارها زرقاء اللون، فردية التجميع. تنورها يستمر من أيار الى آب.

٢٩٩٠٦ - هسپيرنثه

Hister (S).
جلس حشرات مفترسة من فصيلة الحشرات. أنواعها عديدة، جميعها صغيرة القد بطول يراوح من ١٥ الى ١٠ سم. ألوانها الى السواد اللامع يملو تنقيط وتبييض آخر || رقاتها قانصة مفترسة لا تمت من كل حشرة تستطيع اليها سبيًا. أشهر أنواعها :

هستير أحمر الغمد *Hister purpurascens* (S).
هستير أحمر النقطة *Hister uncinatus* (S).
هستير رباعي النقط *Hister quadrimaculatus* (S).
هستير لا متساوي الفك *Hister inaequalis* (S).

٢٩٩٠٧ - هسپيرنثه أحمر الغمد

Hister purpurascens (S). *Hister pourpré* (F).
Hister purpurascens (E).
حشرة نائلة جامة من فصيلة الحشرات وريقة غدييات الاجنحة. تألف المراعي وبساتين الطرقات والمروج القريبة من العمران وكل مكان يكثر فيه البردق والزليل والقمامة || جسمها صغير القد بطول نحو ٥ سم. ثوبها الى السواد المالحق غمدًا الى الحمرة الأرجوانية. رأسها صغير الحجم. عينها صغيرتان. زباناها صلبتان، ظهرها سداسي التخديع الدودي، يلحف ثلاثة أرباع البطن. أرساها خماسية النعل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجبلانة في أوائل الربيع وتعيش حتى أواخر الصيف. تسافد في أوائل آب وتضع المكن في إكرام الزبل ... || البرقة عند كمال نموا تقطو نحو ١٢ سم. جسمها شبه أسطواني الشكل، أخضر اللون، كسني الرأس والشرج والرواجب، مشلل الجانبين، مهذب النعل.

السمة السوداء الملوحة. رواشن ذكورها جرداء اللون، خضر الزراكش والتبايع والتجاذيع. رواشن أنثاها الى السمة يملوها تبييض أبيض. يكثر وجودها من أيار الى آب. رقاتها تركيب القرمط وسائر الخبازيات.

٢٩٩٠٦ - هسپيرنثه، زهرة الخبز

Hesperantha (S). *Hesperanthe* (F).
Hesperantha (E).
جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السونيات. منتبها بعض مناطق افريقية الجنوبية. أوراقها ثنائية الصف، خضراء النصل، أزهارها سبيل التجميع. أزهارها صغيرة القد، قزاحة البرق المطري تنفتح عند غروب الشمس || أنواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية :

٢٩٩٠٧ - هسپيرنثه زبانه

Hesperantha pilosa (S). *Hesperanthe velue* (F).
نوع من الحسپيرنثه. ساقها شراخية ترتفع من ١٥ الى ٣٠ سم. أوراقها خلية وزيقية. أزهارها سبيل التجميع. أزهارها صغيرة القد، يضاء اللون من الخارج والداخل || تنورها يستمر من نيسان الى أيار.

٢٩٩٠٨ - هسپيرنثه قزينة العرف

Hesperantha cinamomea (S).
Hesperanthe à odeur de cannelle (F).
نوع من الحسپيرنثه. ساقها شراخية ترتفع من ١٥ الى ٢٠ سم. أوراقها جرداء خضراء السطح. أزهارها سبيل التجميع. أزهارها صغيرة القد، قزينة البرق. يتلأها الحاربية الى الحمرة الحمرة. يتلأها الداخلي يضاء اللون || تنورها يستمر من نيسان الى أيار.

٢٩٩٠٩ - هسپيرنثه منحنية

Hesperantha recurvata (S).
Hesperanthe recourbée (F).
نوع من الحسپيرنثه. ساقها شراخية نشيطة ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقها مقعرة السطح، جرداء النصل. أزهارها سبيل التجميع. أزهارها كبيرة القد محببة الانابيب، من التلات الحاربية، يبيض الداخلي || تنورها يستمر من أيار الى حزيران.

٢٩٩٠٠ - هسپيرنثات

Hesperilidae (S).
Hesperilidae, *Hesperilidae* (F). *Hesperilidae*, Common Skippers (E). *Dickcopfalter* (D).
فصيلة حشرات من حشريات الاجنحة. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد. جميعها صغيرة القد. رؤوسها خليقة. قربها الاستشعارية دقيقة منفردة. أربطها الامامية تامة النمو. بطونها كبيرة. مكها قلنسوي الشكل. رقاتها حارية أو مبشرة الحلب، مستدة الاطراف، خضراء السطح. خادراتها تتلف بخلات يقيق الصفعة متين الحياك يشبه الشرفة تتسجم بين الأوراق المتشابكة || أشهر أنواعها وأمرها بالانقراض الزراعي الحسپيرنثه والزيون والياوروز واليانوف والكركرود.

٢٩٩٠١ - هسپيرنثه

Funkia (F).
هي الفسكة، نبات من الزنبقيات. أغلبها.

٢٩٩٠٢ - هسپيرنثه

Houstonia (S).
Houstonie (F).
جلس نباتات مفردة التريف على اسم العلامة حسن



هسپيرنثه



هستير



هستير أحمر الغمد



هليونير

الاسفر . ثماره جزئية اللون . اغاليجه مستطيلة ، قليلة
التخانة ، ذكية الطعم ، قاهرة الصنت .

٣٠٠٠٧ - هليون عارشي

Asparagus scandens (S). *Asperge grimpante* (F).
نوع من الهليون التريبي السرح . ساقه متسلقة . فروعه
تحمل اقية الالتشاب مثلية . ردياته ثلاثية التجميع ،
تصلها ميطة الصفعة يطول من ٦ الى ١٢ سم . ازهاره
الى الخضار المائق . ثماره حراة اللون وسيدة البرقة .

٣٠٠٠٨ - هليون معروف * هليونيس * هليونيس

Asparagus officinalis (S). *Asperge commune* (F).
Common asparagus, *Sparrow-grass* (E). *Echter*
Spargel, *Asparagus* (D). *Asparago comune*, *Sparago*
coltivato, *Asparago* (I).

هو الهليون البقلى المشهور . ضرره واساره الزراعة
عديدة . جميعها مأكولة الاغاليج . اربوته قهيرة . اغاليجها
غلظة . ساقها سرعة فراه تطول من ٦٠ الى ١٥٠ سم .
ردياته حزنية التجميع تدم من ٣ الى ٦ . تصلها خيل
الشكل يطول من ٦ الى ١٥ سم . ازهاره خضراء اللون .
ثماره الى الحمرة الناعقة .

٣٠٠٠٩ - هليونيات ، هليونيات ، هليونيات

سبط من فصيلة الزنبقيات ، اشهر اجناسه الهليون .

٣٠٠١٠ - هليونين ، آسفرجين ، آسفرجين

Asparagine (F). *Asparagin* (E).
مادة حيوية قابلة التبلور عادمة المرف تاقية السط لاتتوب
في الكحول ، تلويب في الماء ، اقلالي وفي الخواص والقتل .
توجد في صارة معظم النباتات تكثر نسبيا في اغاليج
الهليون . تشمل لدر البقلى .

٣٠٠١١ - هليشاة

Platyzepe (S). *Platyzepe* (F). *Platyzepe* (E).

جنس حشرات من فصيلة الهاشيات رتبة ذوات الجناحين .
انواعها المروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد
المتحدة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٥ سم .
رؤوسها مستقيمة . عينها متلاصقة عند الشقين . قرونها
الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل ، لتتهي بنسيلة
دقيقة . اعظامها قصيرة . ملاصقا وسيدة العقلة . كولسلها
شبه سرية ، مبرشة الملب . بطونها باردة الحدة ، مبرشة
الملب . رواشها كبيرة ، قسطانية التخفيف ، قراشها
فسيطة || تألف المواقع الدفلة والحراج المبرشة الانجبار .
يرقاتها عاردة تعيش على الفطور .

٣٠٠١٢ - هليشيات

Platyzepeidae (S). *Platyzepeidae* (F). *Platyzepeidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وازواعها
المروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع البلاد المتحدة
الحرارة . تألف المراعي والمروج والنباتات || اجسامها
صغيرة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها مستقيمة . عينها
متلاصقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية
الفصل . ملاصقا وسيدة العقلة . اعظامها قصيرة .
شفاها السفلى لاقعة او ثاقبة ، كولسلها شبه سرية
الشكل ، مبرشة الملب اللينق . رواشها كبيرة . شفاها
بطونها مردنية ، خلية انتشار . قواشها قياسية || يرقاتها
ميطة تعيش على بعض انواع الفطور وعلى المواد النباتية
الجزئية الاغوال || اشهر اجناسها الهليشاة .



هليون معروف

اوراقها صفعية . يكثر وجودها في المناطق وفي الموانع
الرطبة .

٣٠٠٠٠ - هليونير

Héliomètre (F). *Heliometer* (E).
هو المبرام ، جهاز يستخدم في قياس قطر دائرة الأجرام
السموية .

٣٠٠٠١ - هليونين ، هليونين

Asparagus (S). *Asperge* (F). *Asparagus* (E).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الزنبقيات . انواعه
المروفة نحو ٥٠ جميعها احشاش قهيرة ممررة . معظمها
بري وبعضها زراعي وتريبي . ساقها متسلقة وعارشة
وبتدلية . ازهارها رديية . ازهارها تحمل خضراء اللون ،
ثمارها عنية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٠٠٢ - هليون اجعد

Asparagus crispus, *A. decumbens* (S). *Asperge cré-*
pue (F).

نوع من الهليون التريبي . ساقه دقيقة متسلقة حترية كثيرة
التفرع المتوسطة المتدلية العادة الشوك . ردياته ثنائية
او ثلاثية التجميع ، تصلها جامد الصفعة يطول من ٤ الى
٧ سم . ثماره حراة اللون مداسية البزور .

٣٠٠٠٣ - هليون بري ، هليون شالك

Asparagus acutifolius (S). *Asperge piquante*, *A. sau-*
vage (F). *Wild asparagus* (E). *Strauchspargel* (D).
Asparago salvatico, *Sparagio agreste*, *Corruda* (I).
نوع من الهليون البري يكثر في المناطق الجبلية . ساقه
تحمل مستطيلة متقلبة . فروعه قليلة متعاعدة . ردياته
ضمية التجميع ، حزنيها تدم من ٤ الى ١٢ . تصلها جامد
الصفعة ، شالك القصعة ، يطول من ٥ الى ٦ سم . ازهاره
عطرية المرف . ثماره سواء اللون . اغاليجه صغيرة القدر
تحمل القدر مأكولة .

٣٠٠٠٤ - هليون ريشي

Asparagus plumosus (S). *Asperge plumosae*, *A. plu-*
mée (F). *Asparagus fern*, *Feather asparagus* (E).
Zierapargel (D). *Asparago filiforme*, *A. plumoso* (I).
نوع من الهليون التريبي الدائم الاخضرار . ساقه فراه
شائكة ، فروعه ريشي التركيب غزويية الشكل ، ردياته
حشرقية دقيقة شائكة تطول من ٣ الى ٦ سم . حزنيها تدم
من ٦ الى ١٢ || ضرره واساره عديدة جميعها تريبية
تزرع في المرائن .

٣٠٠٠٥ - هليون سرخسي

Asparagus filicinus (S). *Asperge fougère* (F).

نوع من الهليون التريبي السرح . ساقه متسلقة تطول نحو
١٥٠ سم . فروعه اقية الالتشاب والجلوس شكلها
كالسرخس . ردياته عجنة لاقسية لثاقية الطول حزنيها تدم
من ٣ الى ٥ . ازهاره الى الخضار الاسفر . ثماره رديية
اللون .

٣٠٠٠٦ - هليون ضمي

Asparagus verticillatus (S). *Asperge verticillée* (F).

نوع من الهليون البقلى . مهده التفتاز . اقليمه البلاد
الباردة . ساقه لينة غشوية تطول نحو ٢٥٠ سم . ردياته
ضمية التجميع حزنيها تدم من ٣٠ الى ٤٠ . تصلها جامد
الصفعة يطول من ١٢ الى ٢٥ سم . ازهاره الى الخضار

٣٠١١٣ - هَمَاق مَرَقُوش *

Cinclosoma punctatum (S).
Cinclosoma punctat (F).



هَمَاق مَرَقُوش

طائر من الجرائم سيات المساقير ينتمي الى فصيلة
الشحروبديات بأف الغابات والاسراج القريبة من الحدائق
والخنان. قوته الحشرات الصغيرة وتأثر على اختلاف
اجناسها باستثناء الموز والبرتقال || جسمه متوسط القد
يطول نحو ٢٤ سم. ثوبه الى الطحلة يعلوه موج اشجع
ورقشة سوداء. راسه مملح بالابيض. عسراء الى البياض
الناجي. زوره الى الجؤرة. بطنه الى القبة المنمشة
بالصبغة. ذفيه محتدل الطول، ضيق الطرف. قائمته
رديتان دقيقتان، لونهما الى السمرة الزرقية || يدخن حشه
في الاجار الزينة الورلة الطل. الاثنى تحضن وحدها من
٣ الى ٥ بيضات بينا الذكر يزين لها الغذاء.

٣٠١١٤ - هَمَامِيلِس
Hamamile (F).
هو المشتركة، الحليها.

٣٠١١٥ - هَمَمِيَّتِي * هَجَرِ الدَم * شَادَكِج
Hématis (F). Haematis (E).
معدن حديدية اديس الاون يعرف كياريا باسم اكسيد
الحديد الطبي. انواعه عديدة شهرا واكثرها انتشاراً
اليوميت. راجع سجر الدم.

٣٠١١٦ - هَمَمِيَّتِي أَسْمَر *
Hématis bruna (F).
هو اليوميت، اطله.

٣٠١١٧ - هَمَجَة
Drosophila (S). Drosophile (F).
جنس حشرات من فصيلة الميجيات. انواعها المعروفة
عديدة جميعها صغيرة القد، سوية الثوب، شفافة الجناح
التائر الاصصاب || رقاتها مضيائة، نيرة، هواكة،
ناثلة، تعيش على جميع المواد المنخصرة او السائرة نحو
الاغيار والاخلال.



هَمَجَة الاجاث

٣٠١١٨ - هَمَجَة الْأَبْعَاث *

Drosophila melanogaster (S). Moucheron des
caves (F). Common fruit fly, Pomace fly (E).

Taufige, Essigfigie (D).
نوع من الهمة. طولها نحو ٢ مم. ثوبها الى الصفرة
البرتقالية. تركيب جميع انواع البار الساقة المطوية
وتجلبب بنشاي مختلف الاختبارات الكحولية والمضوية.
تمنع مكانها او تلقى حيث تعيش يتفقد عن رقات دقيقة
طولها نحو ٦ مم. ثوبها الى القبة || كزودها كستنية
الون، قصيرة القد، خليقة الشكل، تقضي طورها البدري
في نفس المحيط || وهذه الهمة هي التي يستخدمها علماء
لوراة والوث في اجابهم الحياتية والتتاسلية.

٣٠١١٩ - هَمَجِيَّات
Drosophilidae
فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها
زهاء ١٠٠ جميعها صغيرة القد بطيئة الطيران تعيش على المواد
النباتية المنخصرة || رقاتها نيرة هواكة وناثلة تعيش ايضاً
على مختلف المصارات والانتانات النباتية.

٣٠١٢٠ - هَمْدَاو *
Haemodorum (S).
Hémadore (F).
جنس نباتات جلمورية معمرة من فصيلة الهمداريات.
انواعه عديدة جميعها ترابية. ازهارها هامة الالوان الزاهية.
عشوية التجميع او سلبية، جميلة الاشكال والالوان الزاهية.



هَمُوِيلَة الْوَزَال

٣٠١٢١ - هَمْدَارِيَّات *
Haemodoraceae (S).
Hémodoracées (F). Haemodoraceae (E).
فصيلة نباتية من وحدات اللقطة. اجناسها ٢٠ انواعها
زهاء ١٠٠ معظمها جلموري معمرة وبعضها عشوية.
اوراقها باغليتها مزججة الصفيغ. ازهارها نظامية.
اسديتها ثلاث او ست. مدقاتها لا قياسية الارتفاع لذلك
لستوى سطحها قد يكون انفع او اسفل من مستوى الاسدية.
اشهر اجناسها الهمدار.

٣٠١٢٢ - هَمْدَاكَة
Apoplexie de la vigne, Folletage
وصم فبائي شديد الوق مجهول الاسباب يصيب الكرمة
فيذبل اوراقها ويسم سرعها التي تجف في بضع ساعات.

٣٠١٢٣ - هِمْرُوِيلَة الْوَزَال *

Hemerophila abruptaria (S).
Hémérophila à ailes denticelées, Phalène des
genêts (F). Hemerophila abruptaria (E).

حشرة من فصيلة الاياثية ردية سرشقيات الاجنحة.
موطنها معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط والاقليم
الداخلية المتاخمة. فراشتها جابسة قوتها رقيق الازهار.
سرقها تعيش على اوراق الوزال والزنان ... || جسمها
ابيض الشكل يطول نحو ١٢ مم. بسطها نحو ٣٨ مم.
راسها كبير الجرم. عينها كيرتان. زباناها مشطيان
عند الذكر، عيطيان عند الانثى. جوشها وبطنها الى
الحطلي الكلف المواج || روشاها الاماميان الى الحطلي
الاكلف تملو سرجة معتزفة سمراء وزراکش وتزاورق
كستية. روشاها الخلفيان الى الحطلي الاشجع يملو
تشيط اصم وصرجة كستية. كستياها الحطلي القروض اصم
الختار. اهدابها الى القصعة || لها جيلان في احر.
تظهر فراشة الجيل الاول في اواخر آذار وتظهر فراشة
الجيل الثاني في اواسط تموز. تسرح في الليل. تماثل
بند ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتع الممكن مسحايا على
الصفحات السفلى من نصال الأوراق || السرعة عند بلوغها
الكامل تطول نحو ٤٠ مم. جسمها شبه وشي الشكل.
ثوبها الى الشبهة الخنطية المواج يعلوها في كل سكة ابتداء
من الرابعة زوج من النقط جانبية الازركار، سمراء اللون.
راسها شديد السمرة. رواجها البطنية الوسطى ماضة بما
يحملها تقطوس منه الانتان || طور الاكمال الذي يستمر
نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحبكهما السرعة في كل
مكان باستثناء التربة.

٣٠١٢٤ - هَمَمَع
الصغير من النباء.

٣٠١٢٥ - هَمَقِي
Herbes tendres (F).
الكلاء الحش الين.

٣٠١٢٦ - هَمَقِي
Boeava (S). Bordave (F).
نبات عشبي حولي يري وحيد الجنس والنوع من فصيلة
الصليبيات. منته بعض اصقاع الشرق الاذن || ساقه
ماسة فرعاء منتصبة تملو نحو ٦٠ سم. اوراقه متعاقبة،
شبه قلبية النصال المستطيلة الاطراف الحادة. ازهاره
طري، ازهاره صغيرة، لونها الى الصفار الباهت.
تنويره ويبي.

٣٠١٢٧ - هَمَقِي
Hemmatolobium (S).
Hemmatolobion (F).
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة القرنيات.

٣٠٠٣٦ - هَمْشَقُ الصُّخُورِ

Haemanthus rupestris (S). *Haemanthe des rochers* (F).

نوع من الحمّس. دوفسته ثنائية الساق القطبية الانتشاب: ساق قصيرة تحمل من وريتين إلى اربع وريقات رساق شمرانعة تحمل الازهار. اوراقه اطيحية جميلة الخضار. نصلها يطول نحو ١٥ سم. ويعرض نحو ١٠ سم. شراخه يطول نحو ٣٠ سم. يتونه صيوان قطره نحو ٨ سم. يضم من ٦٠ الى ٧٠ زهرة قرمزية اللون، فارقة البتلات. تنوره يستمر طوال شهر ايار.

٣٠٠٣٧ - هَمْشَقُ بَيْيْ

Haemanthus magnificus (S). *Haemanthe magnifica* (F).

نوع من الحمّس. دوفسته مستطيلة الشكل. اوراقه طرفية الانتشاب تتركز على ساق جعدة، نصلها يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. ويعرض من ٨ الى ١٠، عروقه شععية الترتيب بارزة، ثنائية أو عشادية الازواج. شراخه الزهري يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. صيوانه كبير القطر يراوح من ٢٥ الى ٣٥ سم. انصافه كثيفة التجميع لوها الى البرتقالي الازرقاني المالح. || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول.

٣٠٠٣٨ - هَمْشَقُ زُجْجَرِيّ

Haemanthus cinnabarinus (S). *Haemanthe cinabre* (F).

نوع من الحمّس. دوفسته مستديرة الشكل. اوراقه قرصية الانتشاب، شععية المد الذي يراوح من ٤ الى ١٦ نصلها شيق الصفحة يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. شراخه الزهري يتوسط الاوراق ويطول نحو ٣٠ سم. صيوانه يد من ٣٠ الى ٤٠ زهرة جملة اللون الاحمر العالق الاصفر المالح. تنوره يستمر طوال شهر نيسان.

٣٠٠٣٩ - هَمْشَقُ كَثِيرِ الزَّهَرِ

Haemanthus multiflorus (S). *Haemanthe multiflora* (F).

نوع من الحمّس. دوفسته وحيدة الساق الشمرانعة. اوراقه وريّة، ثلاثية او خاسية. نصلها يارز العروق السداسية او الثمانية الازواج، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. شراخه الزهري يطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. يكمله صيوان قطره يراوح من ١٥ الى ٢٥ سم. يضم من ٧٠ الى ١٢٠ زهرة قرمزية اللون، حجة البتلات. || تنوره يستمر طوال شهر نيسان.

٣٠٠٤٠ - هَمْشَقُ لِيْثْدَنْ

Haemanthus lindenii (S). *Haemanthe de Linden* (F).

نوع من الحمّس. دوفسته كالاروية. اوراقه بمنقة دائمة الخضار. نصلها اطيحي الشكل، سناني الزام الاخير، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ويعرض من ١٠ الى ١٢ سم. شراخه الزهري يطول نحو ٤٥ سم. يتونه صيوان قطره نحو ٢٠ سم. يضم نحو ١٠٠ زهرة ارجوانية اللون. تنوره يستمر طوال شهر ايار.

٣٠٠٤١ - هَمْشُشُ أَخْضَر

Chironomus tendens (S). *Chironome vert* (F).

حشرة من هموش طويلا يراوح من ٧ الى ٨ سم. لوها الى الخضار الاصفر المالح. قربها الاستعمارية مركبة من ١٤ حلقة عند الذكر ومن ٧ حلقة عند الانثى. ابراغها الامامية مهدية مستطيلة || رقبها تلم اوراق النباتات المائية.



همشَق



همشَق



هموش أَخْضَر

انواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض اصناف الشرق الاوسط والبرقية الشرقية والشمالية || سوقها مزينة مستطيلة مستدلة الانشعاب. اوراقها مركبة وريسية التجميع ووريقاتها صغيرة بيضية النصال المستطيلة. ازهارها ذهبية اللون او ارجوانية. تنورها ديمي.

٣٠٠٤٨ - هَمْشَقِيّ

Tiareella (S). *Tiarella* (F).

جنس نباتات جذموية معمرة من فصيلة الفلييات. انواعها المعروفة قليلة العدد. سوقها عشوية منتصبة فراء. اوراقها مركبة، مستطيلة الاصل، لا لياسة للتفريش والتسكين. نصلها الى الخضار الزاهي. ازهارها عشودية التجميع، صغيرة القد، بيضاء اللون او صفراء. ثمارها جرد لا متساوية المصارع. || تنورها يستمر من نيسان الى ايار.

٣٠٠٤٩ - هَمْشَلَج

Hybride (F). *Hybrid* (E).

هو المجين النباتي، ج. هاليج.

٣٠٠٣٠ - هَمْشَلَجَة، رَهْوَكَة

Amble (F).

ضرب من سير. الدواب.

٣٠٠٣١ - هَمْشَق

Marcissance (F). *Marcissance, Withering* (E).

حالة كل زهرة او نبات في طور الذبول او القحامة.

٣٠٠٣٢ - هَمْشَقُ

Haemanthus (S). *Haemanthe* (F).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة الزجسيات. انواعها عديدة، مهدا البلاد الحارة والاستوائية. سوقها شمرانعة تنهي بازهار صيواني التجميع يرتكز على شمران عديد المصارع. ثمارها فردية الخدر. عنية الشكل، وسيدة الزرة. || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٣٠٠٣٣ - هَمْشَقُ أَبْيَض

Haemanthus albus (S). *Haemanthe blanc* (F).

نوع من الحمّس. دوفسته مستديرة صفيرة القد. اوراقه رباعية المد، خمسة التركيب، صفعية الشكل؛ نصلها يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ويعرض من ٦ الى ٨ سم. حطاره مهدب الحافة. شراخه الزهري يطول نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم قطره نحو ٧ سم. ازهاره كثيفة التجميع بيضاء اللون. || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٠٣٤ - هَمْشَقُ أَحْمَر

Haemanthus coccineus (S). *Haemantheponceau* (F).

نوع من الحمّس. دوفسته صغيرة القد، ثنائية الاوراق الكبيرة التي تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم. شراخه الزهري يطول نحو ٢٠ سم. صيوانه صغير الحجم، قطره نحو ٨ سم. ازهاره كثيفة التجميع حراء اللون. || تنوره يستمر من آب الى تشرين.

٣٠٠٣٥ - هَمْشَقُ أَرْجَوَانِيّ

Haemanthus puniceus (S). *Haemanthe écarlate* (F).

نوع من الحمّس. دوفسته مستديرة الشكل. اوراقه قرصية الانتشاب ثنائية. نصلها جميل الخضار الزاهي، ضيق الصفحة، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ويعرض من ١٢ الى ١٤ سم. شراخه الزهري يتوسط الاوراق ويطول نحو ٤٠ سم. صيوانه يحمل من ٤٠ الى ٥٠ زهرة جملة اللون الارجواني. || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول.



هَمْشُوش رَيْشِي



هَمْشِيَّة صَيْبِيَّة



هَمْشِيَّة الْبَنْ



هَمْشِيَّة

٣٠٠٤٧ - هَمْشِيَّة الْبَنْ ، هَمْشَر الْبَنْ ، هَمْشَر الْبَنْ

Hemileia vascatrix (S).

Rouille du caféier (F).

فطر مجهرى يصيب اوراق الين فيطها ويثقل عليها التصبيري الواجب يؤذي الشجرة ويهيء الى حلهسا وانتاجها || مظهره الخارجى يقع صغيرة مستديرة قطرها ١٢ الى ١٠ م. تركيب نصال الازراق على سطحها السفل. تبدر مبدرة رتقالية اللون ثم تتكاثف وتكثف بفشاه خلى الشكل ، لزوج المادة ، يسبب جفاف النسيج ويهاسه || يكاثف باستعمال سائل بورود المركز من ١ الى ٢ ٪ على ثلاث او اربع مرات ابتداء من نهاية فصل الشتاء .

Marcasibie (F).

٣٠٠٤٨ - هَمْشِيَّة

الحديد ما كان قابلاً للذوب .

Haminea (S).

٣٠٠٤٩ - هَمْشِيَّة

Haminea (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مملات الارجل وفصيلة الغاليات . انواعها الماعسة المعروفة متوسطة المدد ، منتشرة في معظم بحار العالم || اصداؤها شبه بيضيه اللون ، شفافة ، ملساء ، متساوية الالوان الوعيدة الخضاب . اجسامها فضفاضة الرداء اللامع .

Hémione (F).

٣٠٠٥٠ - هَمْشِيَّة

هو فراء الثوب ، نوع من الحر الحرشية وفصيلة الخليات .

٣٠٠٥١ - هَمْشِيَّة

هي البساج الشبكي ، اطلبه .

Péduncle (F). Peduncle (E).

٣٠٠٥٢ - هَمْشِيَّة

هو ملاق الثمرة ويقال له إهان . ج. أمن .

Sirens (F). Sirens (E).

٣٠٠٥٣ - هَمْشِيَّة

رتبة حيوانات قاذرة من صف الضفديات ، لها ، حتى الآن ، فصيلة واحدة تشمل ثلاثة انواع || جميعها من مستقرات الخياشيم . اجسامها مستطيلة ثنائية القوائم ، رباعية الاصابع || تعيش على ضفاف المستنقعات وبحاري الماء . بلاعيطها مائية || قوتها الديدان والبرديات الصغيرة .

Lavande spic (F).

٣٠٠٥٤ - هَمْشِيَّة

هو الخزامى الذكورية ، اطلها .

Anon (F).

٣٠٠٥٥ - هَمْشِيَّة

هو الجيش ابن الاثان .

Moqueur (F). Mocking-bird (E).

٣٠٠٥٦ - هَمْشِيَّة

جنس طير كان في التصنيف الماضي ينتمي الى فصيلة الخلدات وهو في التصنيف الحديث ينتمي الى فصيلة مستقلة تسمى هنريات || انواعه المعروفة ١٢ اعطائها المناطق الاستوائية . مظهرها افريقي وبعضها اسويي وامريكي || تتميز بطول مناقبها المحدودة وباستطالة اذنانها الرتاجية الريش . اجنتها قصيرة تكاد لا تلتصق قاعته الانفيك || جميعها تألف الغابات والحراج ، قوتها الحشرات اعصها الخنافس والارض والديدان والجراد والنمل والخنزيرات .

٣٠٠٤٧ - هَمْشَر رَيْشِي

Chironomus plumosus (S). Chironome duvetoux (F).

حشرة من الهمشوش طولها يراوح من ٩ الى ١٢ م. ثوبها اطلل اللون يغطي غط اسود ويمتدحه جميع اسفر . سيقانها صفراء اللون . اوساخها الاسمية مهدية مستطيلة . رقتها حمراء اللون تعيش على النباتات المائية وقد تلثم اوراق بعضها .

٣٠٠٤٨ - هَمْشِيَّة

Chironomidae, Tendipadidae (S). Chironomidae (F). Midge (E). Zuckmücken (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القدد قريبة الشبه من الهمشوش . اجسامها عديمة الخراف . قرونها الاستشعارية ريشية . رؤوسها صغيرة . اعظامها وثوبها قصيرة لا تمكنها من انقاص الدم || تكثر على الاعشاب المائية وعلى المواد العضوية المختصرة قرب مجاري الماء . تعتبر من الهمشوش المزعجة غير الضارة .

Dette non réglée (F).

٣٠٠٤٩ - هَمْشِيَّة

كل دين لم يدفع بتاريخ استحقاقه .

٣٠٠٥٠ - هَمْشِيَّة صَيْبِيَّة

Hemitea aestivaria (S). Hémitea estivale (F). Hemitea aestivaria (E).

حشرة من فصيلة الازيات حرشيات الاجنحة . موطنها بعض الامساق المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط والاندلس وادوية . فرائشها جارية قوتها رقيق الانياز . رقتها تعيش على اوراق السديان || جسمها قصيف يطول نحو ١٠ م. يسطها نحو ٣٠ م. رأسها معتدل الحجم . عيناها نازلتان . زباناها مسطبان عند الذكر ، غيطبان . عند الانثى . جوشنها ويطها الى الخفسار الزرقى الخليلي المواج وراشها عند الشقين الى الخفسار الزرقى الاسمر المواج يتوسطه خط متعرج متعرج ويملوء عند الذكر تسع نقط حارية سماء اللون ، وسبع نقط حارية عند الانثى || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفرافة في حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل . تماطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد الكنك لطعاً صغيرة مربعة على الصفحات السفل من نصال الازراق || السرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٢٢ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مقوس المؤخر . ثوبها الى السرة الزرقية المواج تعلوها رشفة فراء وسبع خطوط متعرجة جذوية . رأسها الى الجلاوة رواجها البطنية الوسطى ماسحة بما يحملها تقويس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يسمر نحو ١٥ يوماً يتقوى تحت القشور وبين قشور الصاء ضمن صلجة خالوية تحببها السرقة بالقل من اربعة ايام .

٣٠٠٤٩ - هَمْشِيَّة

Hemileia (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة السحاميات . تتميز بنحماها المتلاصقة التي تلب فيها الاشكال المردنية والبرمية . مشيها يمش ويتكاثر في التسج النباتية السطحية . هيئها مجهز بمرواشف خضرة . تكاثرها حزبية التجميع ، اسطوانية الشكل او صوانية || انواعها المعروفة ٢٣ جميعها من فطور البلاد الحارة والاستوائية . اعرفها واشهرها هَمْشِيَّة الْبَنْ .

٣٠٠٥٧ - هَبْرَ أَحْمَرُ الْمُتَقَار *

Irisor erythrorhynchus (S). Moqueur à bec rouge (F).

نوع من الهبْر. موطنه أواسط أفريقية. جسمه أبيض اللّذ يطول نحو ٤٥ سم. قوته إلى الزرقعة السّماء يطيرها مراح يراوح من الإريترالي إلى الأخضر اللّامس، جناحاه وذنبه مبهجة بالأبيض. عينا سلتان. منقاره وساقه إلى الحمرة || يألف القبابات والأراج الكثيفة. سربه بعد من ٤ إلى ١٠ أزواج. قوته الحشرات والديدان وتلت الهبْر || يدين منه في تجاويف الأشجار. انشاء تحنن ٨ بيضات نحو ١٦ يوماً.

٣٠٠٥٨ - هَبْرِيَّات *

Mimidae (S). Mimidae (F). Mimidae (E). فصيلة طير من لافقات التمل ورتبة الجواثم. أجناسها وانواعها المعروفة عديدة. معظمها من طيور القضاة الأمريكية وبعضها الإفريقي وأسيوي || التسم الذي يستوطن أمريكا الجنوبية آبد في مناطقه. أما التسم الذي يستوطن أمريكا الشمالية فانه من القواطع التي تجرب البراد في طبل الحصيد والمشي || أشهر أجناسها الهبْر.

٣٠٠٥٩ - هَبْرُوع

نوع من الطيورث يركل. هَبْرُوع هو الجبل الشائع، الطليه.

٣٠٠٦٠ - هَبْرُون

جنس حيوانات قازية من فصيلة الهبليات. أنواعها المعروفة ثلاثة. موطنها بعض مناطق أمريكا الشمالية وكندا.

تألف غشاف مجاري المياه البنية. تعيش معظم حياتها في الماء || أجسامها شبه قريشة الشكل تطول من ٣٥ إلى ٧٥ سم. رؤوسها قصيرة، أسنينة، أعطاشها مستعرة الاشدق. عينا شديدة الصغر. اعناقها مجهره بأطراف مجمدة وبشرة. وهي مجهره أيضاً بقامتين فقط. قاعها صغرتان، أماميتا الارتكاز || قوتها الكبدان والديدان الصغيرة.

٣٠٠٦٢ - هَبْرِيَّات *

Sirenidae (S). *Sirenidae* (F). *Sirenidae* (E). فصيلة حيوانات قازية من رتبة الهنابل. كانت، قبل التصنيف الأخير الذي يبع إلى ١٩٦٥، تنتمي إلى رتبة السرفقيات. أما الآن فهي الفصيلة الوحيدة التابعة إلى رتبة الهنابل || أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق أمريكا الشمالية وكندا.

٣٠٠٦٣ - هَبْرَد *

Tricyrtis (S). *Tricyrtis* (F). *Tricyrtis* (E). جنس نباتات جذمورية جاذحة مصرة من فصيلة الزنبقيات. أنواعها المعروفة سبعة مهددا الشرق الأقصى || سوقها غمرائية مرققة. أوراقها حافصة متعاقبة سانية التصل. أزهارها طرفية يضاء اللون أو مرققة بالبنفسجي || تزرع للزينة ولا تحصى البرد. ترضب في الأتربة المعتدلة الانساج، للتساوية التركيب المنصري، الذنية بالمواد الضوئية والأزوت || أشهر أنواعها الهنداء الشائكة والمزينة والمستطيلة الزئبد.

٣٠٠٦٤ - هَبْرَد شائكة *

Tricyrtis hirsuta (S). *Tricyrtis hirsuta* (F). نوع من الهنداء. مهددا اليابان. ساقها متعصبه كثيفة

المقلب النقيع الشائك، ترتفع من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها حافصة متعاقبة تطول من ١٥ إلى ١٥ سم. نصالها سانية، ذرية، مرققة الصفحات العليا. أزهارها يضاء اللون مرققة بالبنفسجي، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها ديبى أو غريفي.

٣٠٠٦٥ - هَبْرَد هَبْرِيَّة *

Tricyrtis pilosa (S). *Tricyrtis pilosa* (F). نوع من الهنداء. منبها الهند. ساقها خلية السواء، قليلة الفروع، ترتفع من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها حافصة متعاقبة، خلية التصل السانية الشكل || أزهارها إلى الأبيض الماجي، قطرها نحو ٢٥ سم. تنويرها يستمر طول شهر أيار.

٣٠٠٦٦ - هَبْرَد مُسْطَلِطَة الزَّئْبِد *

Tricyrtis macropoda (S). *Tricyrtis long pedicella* (F). نوع من الهنداء. منبها الصين. ساقها غليظة الخمل والزغب ترتفع من ٥٥ إلى ١٠٠ سم. أوراقها متعاقبة مسطحة؛ نصالها أحليجية مائلة تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. || أزهارها مستطيلة الزئبد، قطرها نحو ٣ سم. لونها إلى النياض الماجي يطو تمسح برتقالي ينصرف نيا بعد إلى الأصفر || تنويرها ديبى.

٣٠٠٦٧ - هَبْرَد * طَرَحَقُون

Taraxacum dens leontis, *T. officinale*, *T. vulgare*, *Leonodon taraxacum* (S). *Pissenlit officinal*, *P. commun*, *Dent-dellon* (F). *Dandelion*, *Blow-ball*, *Canker-wort* (E). *Echte Kuhlbiene*, *Löwenzahn* (D). *Tarassaco*, *Tarassaco*, *Dente di leone* (I). نبات عشبي بري مسمر من فصيلة المركبات. ينبت في جميع الأراضي المزروعة ويحتر من النباتات الكاسية الضاربة. جلوره غليظة أسفلية. أوراقه قرصية الالتشاب ضحية. أزهاره رؤسية التجميع. أوراقه اللينة مأكولة عديدة المنافع الصحية || غمره الزراعية البقية المشهورة نحو ٨. يتكاثر بالبزور. تبرز حشائنه من أوائل الربيع إلى أواسط الصيف. تدرس للشرق في مستقرها على أبعاد تراوح من ٤٠ إلى ٥٠ سم.

٣٠٠٦٨ - هَبْرَد * هَبْرَدَاء

Chichorium endivia (S). *Chicorée endive*, *Endive* (F). *Endive*, *Batavian endive* (E). *Endive*, *Endivien*, *Endivienwegwarte* (D). *Endivia*, *Cicoria degli orti* (I). نبات يقل من فصيلة المركبات السنية. أصراة عديدة تجمع إلى ضربين الهنداء الجعدة والهنداء أنسية. جلوره خلية حزامية الشكل. أوراقه قرصية الالتشاب. أزهاره إلى الزرقعة السانجورية.

٣٠٠٦٩ - هَبْرَدَاء بَرِّيَّة * هَبْرَدَاء مَرَّة

Chichorium intybus (S). *Chicorée sauvage*, *Ch. amère* (F). *Succory*, *Wild chicory* (E). *Zichorienwegwarte*, *Zichorienwurz* (D). *Cicoria*, *C. amara*, *C. da toglia*, *Radichio* (I). نوع من الهنداء وهو نبات يقل بري وزراعي. غمره المشهورة عديدة فوارها الممدرة شكلية، خواصها الصحية والطبية واحدة، جميعها تاتي بالدم. جلورها حزامية مستطيلة. سوقها فراء تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها



هَبْر أَحمر المتقار



هنداء شائكة



هندب



هندباء



هندباء برية

٣٠٠٨١ - هندسة ريغية
Génie rural (F).
Rural engineering (E).
علم يتناول التشييد الزراعي عل اختلاف أنواعه من الابنية الى الاقنية .

٣٠٠٨٢ - هندسة زراعية
Génie agricole (F).
Agricultural engineering (E).
علم يتناول التربة والنبات والحيوان والاسثمار .

٣٠٠٨٣ - هندسة سطحية
Géométrie plane (F). Plane geometry (E).
علم يبحث في السطوح ذات البدين ويشمل دراسة خصائص الخطوط والزوايا والأشكال من مثلثات ومربعات ودوائر .

٣٠٠٨٤ - هندسة قراعية
Géométrie dans l'espace (F). Geometry of space (E).
علم يبحث في الاشكال ذات الابعاد الثلاثة اي الاجسام كالكرة والمكعب والمهرم .

٣٠٠٨٥ - هندسة كهربائية
Génie électrique (F). Electric engineering (E).
علم يتناول انتاج طاقة الكهرباء واستثمارها .

٣٠٠٨٦ - هندسة معيارية ، هندسة مدنية
Génie civil (F). Engineering (E).
علم يتناول البناء باكمل معانيه .

٣٠٠٨٧ - هندسة ميكانيكية ، هندسة آليّة
Génie mécanique (F). Mechanic engineering (E).
علم يتناول الميكانيكا وما يتنق منه من آليات .

٣٠٠٨٨ - هندس
Connaissance (F).
Counoiseur (E).
المهندس من كان علمه أو اختصاصه يمكنه من تحليل ومعرفة الشيء المطلوب . ج هندسة .

٣٠٠٨٩ - هندسة
الحفنة منزل من منازل القصر الشاذية وهي مجموعة من حسة كواكب يقال لأجزاء الرز والثاني الميسان . وفي ثقبه بشكلها الألف الكوفي في رقيب الحفنة يدعي النام .

٣٠٠٩٠ - هنيكة
Volvula (S).
Volvule (F). Volvule (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدنيات الاربل وفصيلة البايغات . انواعها المعاصرة المرفوعة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة في اصداها شبه اسطوانية الشكل ، صلبة القد ، وسيدة الألوان السوية . فوهاتنا مستطيلة الفلوج القاطبة .

٣٠٠٩١ - هنيكة المروج
Paroplia scamia (S).
Paroplie des prairies (F).
حشرة من فصيلة اليزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يقطر من ٣ الى ٤ مم ، في لونها حطلي اللون تملوه رقعة سوداء تمتد من الرأس الى اواسط الظهران . رأسها عريض . خطمها مستدل الطول . عيناها صغيرتان . زباناها شديدة الصغر والدة . كوسلها يلحف القسم الاكبر من الرأس . سجعها بحمرية . ظهرانها كابل

مستطيلة مفرقة . انزاعها الى الزرقاة الزاجية في زراعها تسويج بعض النائية اخصها الطمر بالثش او بالمواد الدبالية للحصول عل اوراق عادمة الخصب .

٣٠٠٩٠ - هندبات جعدة
Chlorée frisée (F).
حرب من الهندبات الزراعية المأكولة . اوراقها قرصرة لبد جعدة النصل الكثير التشرم والتسنين .

٣٠٠٩١ - هندبات حسية
Escarole, Scarole, Scarole (F). Endive (E).
حرب من الهندبات الزراعية المأكولة . اوراقها نازقة مستعرضة متراكبة . نصلها متجم الصلصة ، مفرس الخبار .

٣٠٠٩٢ - هندبات زرقاء
هي الطليسة ، اطلبا .

٣٠٠٩٣ - هندبات وثلث
Witloof, Chiorée de Bruxelles (F). Witloof (E).
نوع من الهندبات الزراعية تتميز بجلودها الحرجلية الشكل والقد وباوراتها الضمية المنتصبة . راجع وثلث .

٣٠٠٩٤ - هندرسونيه
Hendersonula (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات . انواعها قليلة لا مؤذية . ونباتها سمراء اللون تحسن القصات البكيدية التي تخترقها فتقوب الحق . بوفاتها اطليجية الشكل ، عديدة الخلايا حطية اللون .

٣٠٠٩٥ - هندرسونيه
Hendersonia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنبيات . انواعها المرفوعة زهاء ٢٠٠٠ معلنها يبي علم الاذي او قليله في يكتنداتها كروية الشكل او مغلطة ، محصورة الارتكاز او شارقة . جودها طلي السنج اسمر الصفصة الخاضية . بوفاتها وشعية ، مؤثرة ، حطية اللون في اشهر انواعها ما يتجم .

٣٠٠٩٦ - هندرسونيه إبرية
Hendersonia acicola (S).
فطر مجهري من الهندرسونية يركب اوراق الاجاص فيوشها برقعة حطية لا نظامية الشكل والحجم والترتيب تني الى النصل اذا لمتها العوامل الطبيعية وتسبب الاحبال الباكر .

٣٠٠٩٧ - هندرسونيه إصاعية
Hendersonia picicola (S).
فطر مجهري من الهندرسونية يركب اوراق الاجاص والفرجيل والتفاح فيوشها برقعة مزوانية الشكل سمراء اللون تسبب تقسيم تسبب النصل والاحبال الباكر .

٣٠٠٩٨ - هندرسونيه وردية
Hendersonia canina (S).
فطر مجهري من الهندرسونية يصيب اخصان اللورد ولمان . مظهره الخاربي يقيم صيطرة مزوانية مبشرة سواء اللون تملر الاخصان والبار دون ان تقع بها شديدة الاذي .

٣٠٠٩٩ - هندسة الإلكترونيكية
Génie électronique (F). Electronic engineering (E).
علم يتناول الاكترونيك وتجهيزاته .

٣٠٠٩٠ - هندسة تحليلية
Géométrie analytique (F). Analytic geometry (E).
علم يبحث في تطبيق القواعد الجبرية عل الهندسة .



هنيك

٣٠٠٩٨ - هَوَاجِلِي ، اَيُرُوِيَّة Aerobique (F).
Aerobic (E).
نمت تعريف يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء.



هَوَاجِل

٣٠٠٩٩ - هَوَاجِلِي الجُدُر Exorhize
نمت تعريف يطلق على كل نبات ينشعب جذبه في الهواء اي خارج التربة.

٣٠١٠٠ - هَوَاجِلِيَّة ، اَيُرُوِيَّة Aerobie (F).
Aerobe (E).
صفة للكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع النيش متقطعة عن الهواء.

٣٠١٠١ - هَوَاجِلِيَّة Pulsatilla (F).
هي شقيق النيران ، اطلية .

٣٠١٠٢ - هَوَاجِلِيَّة ، هَوَاجِلِيَّة Rhinopithecus (S).
Rhinopitheque (F).
جنس قرد من فصيلة المباديات . انواعه قليلة العدد ، موطنها بلاد التبت . تعيش في الاجراج الجبلية التي ينفذها الثلج نحو ازمة شهر || اجسامها متصلة الجسم تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم . ويوها الى الخضار الاصفر . مناسيرها زينة الاربعة . اذنها طويلة الشعر المزمري الشكل والقد ، لونه الى الزينة الصنافية ، اكبه القاعدة اصفر الطرف يعلو موانع فني . اذناها جثة تطول نحو ١٠٠ سم . || تعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٦٠ الى ١٠٠ قوتها التبار والاحتساب والجوار والبرام والتولي . اذناها تنص جرواً اسفلاً ترضع نحو ٦ شهور.



هَوَاجِل

٣٠١٠٣ - هَوَاجِلِيَّة الارض المنخفضة .

٣٠١٠٤ - هَوَاجِلِيَّة Hutchinsia (S).
Hutchinsia (E).

نبات معقود التصريف على اسم العائلة الايرلندية السيدة هوتنيز . عشية صغيرة معمرة من فصيلة الصليبيات . اعطائها تشمل بعض اقاليم البحر الايضر المتوسط || ساقها فراء قصيرة ، تملو نحو ١٠ سم . اوراقها متناوبة مركبة ، وريقة البد ، خاسية او سباعية او تساعية الوريات السانبة الصغيرة . ازهارها متفرقة التسبيح . ازهارها بيضاء اللون || تنموها يستمر من ايار الى آب .

٣٠١٠٥ - هَوَاجِلِيَّة Hotinus (S).
Hotine (F). Hotinus (E).

جنس حشرات وائمة من نصفيات الاجنحة المتجانسة وفصيلة البرانيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها تحت من الهنت الى الصين . تألف النباتات والحيات قوتها سحق الازهار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣١ الى ٣٦ سم . رؤوسها صغيرة . حريشا صغيرة نادرة . قربها الاستعمارية دقيقة ، شديدة الصغر ، سفلية الانتساب ، مركزها تحت الايمن . جاعها نائفة تكثر كالقرون المتسلسلة الشفافة . اولها نهاية الالوان تكثر فيها السمرة الصنافية المزاج . رواشها لاسطة مبيضة بالاعصر والاصفر .



هَوَاجِل

٣٠١٠٦ - هَوَاجِلِيَّة Hugonia (S).
Hugone, Hugonie (F). Hugonia (E).

جنية طيبة برية معمرة من فصيلة الكتيانيات . مهدا

الجنسية ، لاسح ، حنطلي اللون ، اسمر المروق . رواشها خشاكيان ، شفافان . بطنها الى الحنطلي ، يسر في الصفحة السفلى ويصغر في العليا . قوتها حنطية سمراء || سرعها المروج والمراعي . قوتها التسبح .

٣٠٠٩٢ - هَوَاجِلِيَّة ، هَوَاجِلِيَّة Heniochus (S).
Hénioque, Cocher (F). Whip-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكات الزمانف وفصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك عمار اليلاد الحارة || اجسامها مبططة ، رقيقة الظهور ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . بطونها دالقة المنظر . زمانها الظهرية تنتهي برق غفيري المادة يشبه سوط الخوي . اولها الى الزينة الخضراء او الزينة الفضية يعطها تجديع متعرج اسود || حولها مأكولة ، متوسطة الصنت .

٣٠٠٩٣ - هَوَاجِلِيَّة As
هو ما يستشق كل حي لحياته . وهو مادة غازية مركبة تفلت سطح الكرة الارضية فتكون السكالك او السحاب ، وتقتل كائناتها كما ارتفعت عن سطح البحر . ومن المسلم به ان نصف مجموع الهواء الارضي يقع في المنطقة الكائنة بين مستوى سطح البحر او مرسى المنح وارتفاع ٦٠٠٠ م . اما العناصر التي يتكون منها الهواء ونسبها فهي :
ازوت نحو ٧٨ جزءاً
اكسجين نحو ٢١ جزءاً
ثم النيز من الايون غاز الكربون والاوزون والنيون والكريبتون والهليوم ، الخ . وهو يحتوي ايضاً على بخار مائي يعرف بالرطوبة النسبية .

٣٠٠٩٤ - هَوَاجِلِيَّة Sylviadés (F).
في الدخليات ، اطلية .

٣٠٠٩٥ - هَوَاجِلِيَّة Saprophage (F).
Saprophagous (E).
الحشرات المواكة هي التي تعيش على المواد النباتية للمحلة .

٣٠٠٩٦ - هَوَاجِلِيَّة Caloramphus fuliginosus (S).
Caloramphie fuligineux (F).

طائر من المستلغات وفصيلة البقائيات . موته بعض اصقاع الهند والبلاد المجاورة . يألف الادخال والحراج البميتر الانجار ولا يستقر في مكان اكثر من خمس دقائق . ملبسته الحالي جماعي ، فوسه قليل العدد لا يتجاوز خمسة ازواج || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٥ سم . رأسه كبير الجرم . منقاده شبه مخروطي الشكل ، كبير الحجم ، ارتفاعه عند القاعدة يفوق عرضه . جناحاه صغيران ، ذلفان . ذنبه معتدل الطول ضيق النرس ، مغطوم الطرف . ثوبه الى السمرة السانبة المتفازة الماججات . منقاده وقامتته الى السمرة الزرقية || صوته مزيج طنان . قوته الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها والتبار النسيبة البرية || يثن عشه في غنايب الانجار . الانثى تحض رسعها من ٣ الى ٤ بيضات بين الذكر وبين لها الغذاء .

٣٠٠٩٧ - هَوَاجِلِيَّة Aérhydrique (F).
نمت تعريف يطلق على ما يتنقل بالهواء والماء او يسبح بالهواء والماء .

المنه . جلوهها ولحاء ساقها وفاندها مرقمة وتدر البول .
ساقها فراء تملو نحو ثلاثة امتار . انفاها فردية او
ثنائية الحلق . اوراقها متناقية ، متعفة . نصالها اهلجية
الشكل ، سنانية الاطراف . ازهارها حلقى التجميع ،
عمودي الانكناز وطرفي . ازهارها صغيرة الحجم
النباتات ، وردية اللون . ثمارها سيقية تلعب حبة
صغيرة عمدة السطح . ازهارها وجلوهها عطرية العرف
المستحب الشبيه بالبنفسج .

Phaeostilbaceae

٣٠١١١ - هُوْدَئِيَا ٥

عارة بطور مجهرية من فصيلة الكحيويات . تتميز بأعضائها
الموالية النابضة الالوان . تشمل عدة انواع تنتمي الى
ثلاثة اجناس : الارايوبسيس والسيزانوس والشفلة .

Ranella (S).

٣٠١١٢ - هُوْدَئِيَا ٥

Ranella (F). Ranella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات محليات الاربل
وفصيلة اليسويات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة
منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي ||
اصنافها شبه اهلجية الشكل محاذية يعلوها جذبان
جانبيان ضخمان او مائلان او شاككان يكتنفانها من
طرف الفتحة الى العقب .

Stigmatopella (F).

٣٠١١٣ - هُوْدَئِيَا ٥

طائر من فصيلة الحاميات قريب الشبه بالثلثة . مهد
المناطق الحارة من العالم القديم يوجهها في طلب المريع
والمصيط والمشي || جسمه متوسط القد ، يطول نحو
٢٧ سم . ثوبه الى الطلعة الصنائية المورج تسر في الرأس
والظهر والجناح والذنب ، وقطر في المنصر والعنق والصدر
والبلع والافتيك . متعافه حنلي اللون . يرجاه الى السمرة ||
يدئن عنه في الانهار المتوسطة الارتفاع . حضنته بيضتان .
الانثى تقوم بالترميم اما الذكر فيقوم لها القوت .

Surnia funerea (S).

٣٠١١٤ - هُوْدَئِيَا ٥

Surnia, Chouette-épervière (F).

طائر من البويات ورمارة الفناديات . ثوبه الى البياض
الاكعب يطو تسليج اسمر يطوق العين والاذن . رأسه
عادم القزعة مستعرض وقصير . محصره لاطى . القزور
منسره قوي البهرة . سقطه كبير القد منطرج الزاوية .
ذنبه منصف الريش ، مستطيل . ارساغه ومخالبه قصيرة كاسية .
موطنه تسبح الاربعاء يشمل معظم المناطق المعتدلة . يألف
اسراج الصنوبر والملاز . يسرح في النهار وفي الليل يستريح
من الساعة العاشرة الى الرابعة من بعد الظهر ومن العاشرة
ليلا الى الثالثة بعد نصف الليل . || يدئن عنه في مجاري
الانهار وحقائيل الصنوبر . الانثى تضع من ٤ الى ٨
بيضات تحضنها بمنوبة الذكر . || يرجه الجرد والغار
والحشرات حل اختلافها . ج هود .

Monstruosité (F).

٣٠١١٥ - هُوْدَئِيَا ٥

Monstrosity (E).

الانحداد المشبهين عن الشكل المألوف ان في الحيوان
او في النبات .

Etang naturel (F).

٣٠١١٦ - هُوْدَئِيَا ٥

Natural pond, N. pool (E).

بحيرة صغيرة تفيض بها مياه خياض وأجام فتتسع .
ج اهور .

Haworthia (S).

٣٠١١٨ - هُوْدَئِيَا ٥

Haworthia (F). Haworthia (E).

جنس نباتات لحمية مرقمة معمرة من فصيلة الزنبقيات .

Heodes phlaeas (S). هُوْدَ البَطْبَاط ٥
Cuivré de l'oreille (F). Heodes phlaeas (E).

حشرة من فصيلة القنليات ورتبة حشرقيات الاجتمعة .
مولتها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فرائها حارة
قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق البطباط
والحميض . جسمها صغير القد يطول نحو ١١ م .
سبطها نحو ٢٨ م . رأسها صغير الحجم . عينها ناشزتان .
زبانها شبه صولجان . جوفها حنلي اللون كسني
المورج سبطها كسني اللون || روشنها الاماين الى الصهبة
المنجية يعلوها سبع نقط كسنية وحار حاربي من اللون
نفسه . روشنها الخلفيان الى السمرة الكسنية الثوراء المورج
يعلوها قرب الطرف الخارجي حدة مقلبة الاطراف لونها
الى الصهبة المنجية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة
الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب .
تسرح في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع
وتتبع للمكن ميحاديا الى نصال اوراق المائل || السرة عت
يعلوها الكمال تطول نحو ١٥ م . جسمها اهلجي الشكل ،
المنسج والظهر . كيف الحول القصير . ثوبا الى الخضار
الامس يعلو خط قاطب اسمر وتسمه اطواق سكية بطورية
اللون . رأسها ارجواني اللون . منها ورواجها الى الطلعة
السمراء || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول
نحو ثلاثة اسابيع ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٢ اسبوعا .

٣٠١١٨ - هُوْدَ الحَمَاض ٥

Heodes virgaurea (S).

فراشة من فصيلة القنليات . طولها نحو ٣٣ م . ذكرها
اسمر الجسم خفيف الصدر مستدق البطن . رواشه الى الصفرة
الحمر المورج يطوقها حار اسمر ويعلوها تنقيط لاقياسي
الحمر والبهرة . انفاها سمراء الجسم خفيفة الصدر والطول
رواشها الى الصفرة الخفيفة يطوقها حار اكعب ويعلوها
تنقيط اسمر اسود || يألف المناطق والمراعي . يسرح من
من حزيران الى آب . يرجه خاضعة تركب اوراق الحامض .

٣٠١١٩ - هُوْدَ المتناقع ٥

Heodes chryseis (S).

فراشة من فصيلة القنليات . طولها نحو ٣٢ م . ذكرها
اصهب اللون يعلو مورج ملهب . رواشه الى الحمرة
الصنانية يعلوها تنقيط اسمر وتمشج ازرق ، حارها حاب
اللون ، ابيض الطرف . انفاها سمراء الجسم ، خطية الراوش
المزخمة بالاصفر والاخضر يعلوها تنقيط اسود ويعلوها
حار اسمر || يألف المناطق والمواقع الرطبة . يسرح من
حزيران الى تموز . يرجه تركب اوراق معظم النباتات
المنجية .

٣٠١٢٠ - هُوْدَ الوَزَال ٥

Heodes doritis (S).

فراشة من فصيلة القنليات . جسمها مخروطي الشكل اسمر
اللون يطول نحو ٣٠ م . ذكرها كسني الراوش المنقطة
بالاسود . انفاها خضمة الشكل ، رواشها الى الصهبة الخضراء



هود البطباط



هود الحامض



هود المتناقع



هودمة



هودلة



هودة

مهدا بعض مناطق افريقية الجنوبية . سوقها متدلة لا إثر لها . اوراقها صغيرة الجرم ، خضية النصل . ازهارها بيضاء اللون || تزدهر اقل من ضمن الليوت . تربي في الارضية المعتدلة الاندماج ، والرافرة الخصب ، الفنية بالمواد الغذائية العضوية والمعدنية || انواعها عديدة اشهرها التالية :

٣٠١١٩ - هَوْرَتِيَا جَامِيْدَة (S) Haworthia rigida

Haworthia rigida (F). نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة ، خضية الصفوف ، عسوية الارتكاز ، تطول من ٧ الى ١٢ سم . نصلها شديدة الصلابة ، بحرية الخضار ، يطولها موج اسمر . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٢٠ - هَوْرَتِيَا سَوْدَاءَ

Haworthia acrovirens (S). *Haworthia noirâtre* (F). نوع من الهورثيا . اوراقها متصببة ، ضيقة النصل ، غززية الشكل ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٦ الى ٨ سم . نصلها مثاقلة ، منشارية الحفاف . لونها الى الخضار الالامس الشديد السمرة . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٢١ - هَوْرَتِيَا لَوْرَجَة (S) Haworthia viscosa

Haworthia visqueuse (F). نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة ، ثلاثية الصفوف النظامية الترتيب ، عسوية الارتكاز ، تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٢٠ الى ٣٥ سم . عفتها شالكة . عصارة نصلها لزجة . ازهارها بيضاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٢٢ - هَوْرَتِيَا مَرْدَقَة (S) Haworthia fasciata

Haworthia zébrée (F). نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة اقية الارتكاز ، تطول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . نصلها نالس الصفحة العليا ، لولوي الخطوط المتعرجة النظامية الشكل والترتيب ، خشن الصفحة السفلى . ازهارها بيضاء اللون ، تبينة الموج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠١٢٣ - هَوْرَتِيَا مَشْبِكَة

Haworthia reticulata (S). *Haworthia réticulée* (F).

نوع من الهورثيا . اوراقها مشقعة ، اقية الارتكاز ، مقطعية الرؤوس ، تطول نحو ٢٥ سم . وتعرض نحو ٧ سم . نصلها محدودة الصفحات العليا ، محددة السفل . لونها الى الخضار الزاهي تملوه خطوط متشابكة سمراء اللون . ازهارها تبينة اللون يطولها موج اخضر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠١٢٤ - هَوْرَسِيَة (S) Rhacophorus

Rhacophorus (F). *Rhacophorus* (E). جنس حيوانات قاذبة شاحرة من الضفادع وفصيلة الهورسات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطائها تمتد من الهند الى الصين واليابان وجزيرة مدغشقر || اجسامها متباعدة اللد يكثر فيها الحجم البسيط . اثنائها ثمانين البيئة التي تعيش فيها . اصابع قوائمها مقبدة بحبل رسيه تمتد

حتى الاطراف المهذبة بلطب محببة تمكثها من تسلق السطوح المائلة ومن التفتز شلجياً من شجرة الى شجرة .

٣٠١٢٥ - هَوْرَسِيَات (S) Rhacophoridae

Rhacophoridae (F). *Rhacophoridae* (E).

فصيلة حيوانات ديداء قاذبة شاحرة من لمه الحديديات ورتبة السونيات ورتبة البترافات . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٨٠ مهدا البلاد الاسيوية والافريقية ومدغشقر . جميعها من الضفادع المعتدلة الحجم || اجسامها متصببة اللد . اثنائها مختلفة الالوان يكثر لها الاخضر . تتميز بمائة البيئة التي تعيش فيها وتتميز ايضا بمساحة سطح خشن قوسها الصدري في مركز تلافيفها ، وبجلو فقرة العجز من التواءات النطية الجانبية . فكلها العليا مسنة . اصابع قوائمها مقبدة بحبل متباعدة الرحابة والانداد . اطراف اصابعها مزينة بلطب محببة تمكثها من تسلق السطوح المائلة || تعيش معظم حياتها على الاشجار وتختلف النباتات || اثنائها تنسأ في مخاض خاصة تخلطها بمزوجة الذكور على خضاف المتعلق والتدافع فوق مستوى الماء ينمو ١٠ سم . ثم تحلل نغماً ثانياً متحدرًا من المخضن الى سطح الماء . الاثان عند التفرقة تقرر اولاً مادة رقيقة قوارة تمقها ثلة الدليل المثلثة من ٤ الى ٦ ديلة . ويقيم للدليل ضمن هذه الرقعة التي تكون له الرطوبة حتى التفت فيزلزل اذ ذاك على سطح الشجر وينفوس في الماء .

٣٠١٢٦ - هَوْرَسِيَة (S) Aphomia sociella

Aphomia sociella (R).

فراشة من فصيلة التاربات ورتبة حرشيات الاجنحة . الاثان اكبر قدماً من الذكر . يسطها نحو ٣٥ سم . وبطة الذكر ٢٦ سم . جميعها الى البياض الخشن الموج . ريشها الاماميان الى الثيرة الشهاب في اقزوين الاولين ثم الى الطحلة الخضراء تدرجها خطوط سمرة ونقط سود تتناهم الاصاب . ريشها الخلفيان الى البياض الاخير . اهداب ورائتها فضية تركن على جده سوداء قليلة العرض || يربطها الى الطحلة الصفراء تملوها ثمل سمرة . رأسها جفوي اللون || تعيش في غشاء بعض الحشرات من غشائيات الاجنحة وقد تدخل المنازل والمكاتب ويستودعات الورق فترض الورق والكذب والقليل ...

٣٠١٢٧ - هَوْرَسِيَة (F) Falaise

Falaise (F). *Chiff* (E). جنور مجدلي مطلف من اقراط امواج البحر . ج هوراع ولواجر .

٣٠١٢٨ - هَوْرَن (F) Huron

حيوان لاحم مفترس يدعى فرزون ، اطلبه .

٣٠١٢٩ - هَوْرَة (S) Hura

Hura, *Sablier* (F). *Sandbox*, *Poosumwood* (E). *Sandbückenbaum* (D). *Sablier* (I).

جنس اشجار برية وحرجية من فصيلة القريونيات . انواعها المعروفة ٥ اعطائها البلاد الاستوائية والحارة . اوراقها متفكة متتالية نغيفة . نصلها قليلة الشكل ، مدبية القصبة . ثملها مجموعة من الفصوص الثنائية اللغلة تحسن بزوراً لياها جعالي المادة الفعالة . والثار عند انفلاقها يند الاذراك التام تحدث دورياً يشبه دوري الانفجار . يستخرج من عصارة سوقها ومن لباب ثملها مادة قلوية جسمية شديدة التلشط .



هورس



هورة

٣٠١٣٦ - هُورِيَا مُدَمِيَّةٌ

Heuchera sanguinea (S). *Heuchère sanguine* (F). *Coral bells*, *Crimson bells* (E). *Alranwurz*, *Rote Alunwurz*, *Purpurglockchen* (D). *Eucera sanguinea* (I).

نوع من الهوريرا ، شاربيها تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها مدورة خماسية او سباعية الفصوص المسنة المهدبة. نصلها مائل البشرة على صفحتيه ، ازهارها متعدية التجميع ، لونها ال احمر الدامية || تنورها يستمر من ايار الى تموز .

٣٠١٣٧ - هُورِيَّةٌ
Hovenia dulcis (S). *Hovénie*, *Hovène sucré* (F). *Japanese raisin tree*, *Ground squirrel*, *Gopher* (E). *Hovanie*, *Zieseln* (I). *Ovenia* (I).

نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة البنيات . هذه الشرق الانسى من اليابان الى الصين . ثمرته تملو حتى ٢٠ م. اوراقها متعقة متعاقبة حاملة ؛ نصلها قلبي الشكل يطول ١٦ سم. ويعرض نحو ٩ سم. صفحته مائلة البشرة ، مسنة الحافة . ازهاره خشوية التركيب ، صغيرة القد ، رتيلاها وقناياتها لبابية المادة ، حمراء اللون ، مأكولة ، سكرية المذاق ، طعمها كالزبيب . ويستخرج منها ومن الاوراق عطر مرغوب فيه شائع الاستعمال || تنورها يستمر طول فصل الصيف .

٣٠١٣٨ - هُورَقْلٌ
Spermophilus (S). *Spermophile* (F).

جنس حيوانات لبونة قاعسة من فصيلة السنجابيات. انواعه نحو ٦٠، منها ١٥ موطنها العالم القديم و٥٥ موطنها امريكية الوسطى والجنوبية . جميعها صغيرة طولا يراوح بين ٢٠ و٢٥ سم. واذنانها من ٦ الى ٨ سم. || اجسامها مستطيلة رشقة . رؤوسها احسنية الشكل . حيوتها كبيرة . اذنانها مستديرة . جرمها الامامية رباعية الاصابع اما الخلفية فمخسبسة . اذنانها تقصّر جيليات الصوف . اذواها سوية اللون رؤوسها واطراف جرائزها الى الجفوة الصنابية . ظهورها الى الريد . بطونها الى الصفار الشبي . وفي بعض الانواع الامريكية الثوب غلظت وسها مؤذنة . تأكل الاامثال والحقول المزروعة . تنسلق الانجبار بشفة ، لكنها تقضي حياتها على الخفيض . ججورها حشرات فسيحة مستديرة عديدة الاتفاق تتركزها في الحوم على امثال تراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ سم. قوتها البزور والحبوب والجندور والفار والوزغ والطير . اناتها تنقع من ٣ الى ٦ اذناس تبهر وتكتسي بعد اسبوع .

٣٠١٣٩ - هُورِيَانٌ
Semnopithèque (F). نوع من القرود الخمسة يدهى هبار ، اطلبه .

٣٠١٤٠ - هُورِيَّاتٌ
Sphingidae (F). هي فصيلة الصليبات من حرشفيات الاجنحة .

٣٠١٤١ - هُورِيَّةٌ
Protoparce (S). *Protoparce*, *Sphinx d'Amérique* (F). *Horn worms*, *Horn blowers* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصليبات او الموريات . انواعه المعروفة خمسة . جميعها فراشات كبيرة القد لا يقل طولا عن ٦ سم. وبسطةا تراوح من ١٠ الى ١٢ سم. اذواها مستطيلة مائلة المواج يملوها بتجمع وتبيّج اسمر . رؤوسها الامامية والخلفية مزخرفة وزرشفة بالاسفر والاحضر

Horia (S). *Horie* (F). *Horia* (E).

جنس حشرات منطقة طيبة من همديات الاجنحة وفصيلة الذراحيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من الماين القديم والجديد . الجملانة منها خاضعة والشم ، اما البرقة فقاتنة وبشرها يظفل على غشائيات الاجنحة || اجسامها كبيرة طولها ٤٠ الى ٥٥ سم. رؤوسها كبيرة نافذة . ملاسها الشفوية قاعسة . قرونها الاستعمارية صرطانية مقوسة . كسلها اصقب من الرأس واطين . احمادها بجنية الشكل . اذواها متباينة الاالوان يكثر فيها الاحمر اخضرى والجذوي ، بعضها مطوق القدم بطبقين ، قاعدي وطرفي || جميعها نافعة تستعمل استئصال الزراع .

٣٠١٤١ - هُورَظٌ
Gyps des Indes (F). هو الغشام الهندي ، اطلبه .

٣٠١٤٢ - هُورَظٌ
جنس طير من البويات وحمارة البويات . انواعه المعروفة اربعة . موطنها يمتد من الصين الى الهند وبلاد فارس . جميعها كبيرة القد ، قريبة الشبه من الببو . طولا يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم. اذواها الى الطلعة يملوها رشفة سواد . تأكل الثبات الخفيفة القائعة على مجازي الماء . سرعها دجوي يمتد من النسق الى الفجر . قوتها المستحب الاسماك والقرشيات || تدن في تجاريف الانجبار . حضنتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات || اشهر انواعه هورظ جبارا وهورظ سرتيب .

٣٠١٤٣ - هُورُشِيْرَا
Heuchera (S). *Heuchère* (F). *Heuchera* (E). *Alunwurz* (D). *Eucera* (I).

نبات معقود التحريف على اسم الطبيب النساوي حوش (١٦٧٧-١٧٤٧) وهو جنس نباتات عشبية رية ورتينية من فصيلة القليات . انواعها نحو ٢٠، جميعها جلسورية معمرة . اوراقها جلعية الانتساب لا قياسية الاشكال والتفصيص . ازهارها صغيرة القد لا نظامية التجميع ، منها المتعدية والسلبية والشكلية . جميعها تركز على شاربيها منتسبة رطبة .

٣٠١٤٤ - هُورُشِيْرَا اَمْرِيْكِيَّةٌ
Heuchera americana (S). *Heuchère d'Amérique* (F).

نوع من الهوريرا . شاربيها تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها مدورة خالسة او سباعية الفصوص المسنة الحافة . نصلها خل الكوي على صفحتيه . ازهارها متشكولية التجميع ، صغيرة القد ، تهبو الى الخضار اليابات ثم تنحرف الى الحنطي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠١٤٥ - هُورُشِيْرَا صَمِيْرَةٌ الزَهْرُ
Heuchera micrantha (S). *Heuchère à petites fleurs* (F).

نوع من الهوريرا . شاربيها تملو نحو ٦٠ سم. اوراقها مدورة خالسة الفصوص المسنة . نصلها مائل البشرة على صفحتيه . ازهارها متشكولية التجميع يرض البتلات ، خضر الكوي ، من المابر || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .



هوري



هورظ



هشيرا



هشيرة



هورل



هورية

٣٠١١٩ - هوميروكولا المصطاب (S). *Homeria collina* Homérie des collines (F).

نوع من الميوية. منتبها المصطاب المشرقة على البحر. ساقها شراخية ترتفع من ٤٥ إلى ٦٠ سم. ورقها وسيعة مستطيلة النصل. أزهارها تطلق الشرعاف وهي إلى الحمرة السليمة أو الحمرة الموهجة بالبرقائي في تنويرها صفبي.



هوميروكولا

٣٠١٢٠ - هوميروكولا أنيقة (S). *Homeria elegans* Homérie élégante (F).

نوع من الميوية. ساقها شراخية ترتفع نحو ٣٠ سم. ورقها وسيعة مستطيلة. أزهارها تطلق الشرعاف وهي إلى الصفار الكبيرتي تعلو بقشة زرقاء. تنويرها صفبي.

٣٠١٢١ - هوميروكولا (S). *Humiriaceae* Humiriaceae (F).

نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستطلة القعاات رقيقة المبيض. اجناسها ثلاثة وأنواعها نحو ٤٥ اعطانا البلاد الاستوائية اخصها امريكا الجنوبية || نباتاتها شجيرات ونباتات. أوراقها بسيطة، متعاقبة، عادية الزوايا، جلدية النصال. أزهارها عشكوي التجميع، طرفي الاذنكاز. أزهارها عشوية، نظامية، خلبية الاجزاء. ثمارها نوية || اشهر اجناسها الميوي.

٣٠١٢٢ - هومرو، كوكبو مذهب

Chrysocoryx auratus (S).

Chalcid doré, Coucou doré (F). Gilded cuckoo (E). طائر من القوقليات وقصيلة القيقويات. اصنائه افريقية الشرقية من البحر الاحمر الى الموزنيك. يالئ الفلقات الكثيفة. جسمه الاخضار اللاتنية الاذنكاز في الانبجار الباقية || وهو من القوقليات التي تجوب الغابات في طلب الرزق. جسمه متوسط القد بطول نحو ٣.٥ سم. نوبه الى السمرة الخطيئة يملؤها مزاج اسفع في الجناحين ومابة ذهبية في ريش سائر الجسم || قوته الفشار والاساربع اثناء كاشي القوقل لا تحضن البيض بل تقعه في شاش غيرها من الطير اغصها عشاش العصافير الحارشة.



هوما

٣٠١٢٣ - هوميرو (S). *Hoya*

Hoya, Hoyer, Quadrille (F). *Fleshy leaved, Wax flower plant* (E). *Fleischige Hoya, Porzellanium* (D). *Flor di cara, Fiore della cara* (I).

جنس نباتات زينة معمرة من فصيلة الصقلابات. جميعها شجيرات مستطيلة عارشة فروع. أوراقها متعاقبة مستطية بيضة الشكل. نصلها جامد الصفة، قائم الخصار. أزهارها عيواني التجميع للنفسي الشكل ابيي الاذنكاز. أزهارها صغيرة القد عاجية اللون يتوسط بلباتها دائرة حمراء. تنويرها يستمر طوال الربيع والصيف.

٣٠١٢٤ - هوميرو (S). *Lophomyx d'Inhous*

حيوان لبون قاصم يدمي الدم، اطليه.



مباد

٣٠١٢٥ - هيبياد، هياص (S). *Hyas*

Hyade (F). *Hyas* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات شاربيات الاجرل قصيرات القليل الحركات ونصيلة المماحيات. انواعه المعروفة قليلة البد منتشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية || اجسامها محرمة، مستطيلة التبطيط، مثقلة الصفة العليا، تقطن من ٥ إلى ١٠ سم. ملاقطها نشطة، قوائمها

والاصغر والاخر الجفوي. || تظهر القراشات وهي وسيدة او ثنائية الجبل الحولي في اوائل حزيران فتضائل ثم تنبع مكبها على اوراق الصغ وسائر نباتات القصيلة الباذنجانية فينتفج بعد متحه بجسمه ايام ويكون ذلك عند اواخر الوتيرة الثانية من حزيران. ربقها لكسي اللبنة القرية || ربقها غفرار اللون، سماء اللب، كبيرة القد، جملة الجوانب، تحلل في اهل موعرها زائدة صفتي التركيب تشبه القرن، وهي تبلغ سجيها البهالي بعد نطقها بأربعة اسابيع فيابوح اذ ذلك طولا من ٨ الى ٩ سم. || اصغرها كبيرة لانها تلثم النصال مع موعرها ولا تبني الاكل الاصلاح الشخنة || تكافح تغيرا او نفسا باستعمال اخضر باريس او زوليخات الرساس او الكريوليت او الاندريد.

٣٠١٢٦ - هوم (F). *Sous-sol*

الهوم هو بطنان الارض لا يظاله حرث او نقب.

٣٠١٢٧ - هوم التجوس

« هجرة شبيبة باليايمن فيها بعض الحلاوة وأجود زهرها الاخير الذي يفلو صفرة ويكون سدينا وسيت هوم الحرس لان عبدة النار يستعملونها في صبادتهم ويسبون لها منافع عجيبة. || القاموس

٣٠١٢٨ - هوميات (S). *Humate*

ملح يتأتى من الحامض الدهالي.

٣٠١٢٩ - هومس (S). *Humus*

هو الدهال، اطليه.

٣٠١٣٠ - هوميرو أنيقة (S). *Humea elegans*

Humée élégante (F).

جملة سبروتية زينة معمرة من فصيلة المركبات. مهدا استرالية. ساقها فروع تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقها متعاقبة سافنة. نصلها اعليجي الشكل، جميل الخصار، خلي الصفة، بطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رائحته، عند اللس، حلوة العرف. أزهارها رؤسية التجميع، صغيرة القد، كثيرة العدد، تقطن من ٨ الى ١٠ سم. لونها يختلف مع القرب، منها القرمزي والياقوتي والاشقر الخطي والايض. أزهارها هرمي الترتيب. تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين. تنكاز بالبرق ويجود في جميع الاكمة المعتدلة الاندماج والرطوبة.

٣٠١٣١ - هوميرو (S). *Humirum*

Humiria, Humirita (F).

جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة الهوميرويات. انواعه المعروفة نحو ٢ مهدا امريكا الاستوائية. ساقها معتدلة التفنيد. أوراقها بسيطة، نظامية، متعاقبة، جامدة النصال. أزهارها عشكوي التجميع، طرفي الاذنكاز. أزهارها بيضاء اللون أو تنية أو وردية.

٣٠١٣٢ - هوميرو (S). *Homeria*

Homérie (F). *Homeria* (E).

جنس نباتات عشبية دوفعية برية وزراعية زينة معمرة التعريف على اسم هوميروس. منتبها بعض اصفاق الشرق الاذل وافريقية الشمالية. ساقها شراخية. أوراقها فردية غنية النصال الباقية. أزهارها جملة الشكل، متساوية البلات، ملتصقة الاسدية التي تصبح كالانبوب || وهي من فصيلة السوسليات. انواعها قليلة العدد اشهرها ثنائية.

السرة الحنطية يملؤها توسيع قاطب قليل السرة والدكانة .
يرغب في الأتربة القليلة الاندماج والرطوبة . يركب أكثر
القرنفلات فيقيم الأوراق ويذيقها .

٣٠١٦٣ - هَبَّارُ الْقَطَانِيَّاتِ * Hypera nigrirostris (S).

نوع من الحير، طوله يراوح من ٣ إلى ٤ م. ثوبه إلى
الخضرة الزاهية، عظمه أسود. يرغب في المواقع القليلة
الرطوبة. يركب القطانيات فيقيم الأوراق ويذيقها.
يرقاته تلهم البرام والأزهار تنفض عليها.

٣٠١٦٤ - هَبَّارُ مُتَوَنِّ * Hypera variabilis (S).

نوع من الحير. طوله نحو ٥ م. ثوبه إلى الصفار الحنطي
يملوه موج اسف. يركب أوراق البرسيم فيعضها كالغزال.
يرقاته صغيرة القد فستقية اللون تعيش على البرام والأوراق
الناشئة.

٣٠١٦٥ - هَبَّارُ سَبَكِيَّة Hibbertia (S). Hibbertia (F). Hibbertia (E).

جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة
الدلائيات. أنواعها المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع
جزر الزنجاب وأوقيانية وأستراليا ونهاية ١٠ نصف نباتاتنا
شجيرات صغيرة والنصف الآخر سرعي أو مستقيم وأغراض.
أوراقها متعاقبة، كبيرة النصال، معتقة أو حاضنة.
أزهارها محورية الارتكاز أو البغلة، كبيرة القد، خماسية
البتلات المنسطة، يسود فيها الأبيض اللبني الموج، ومنها
الصفراء والنادية والاديوانية والمزققة.

٣٠١٦٦ - هَبَّارُ سَبَكِيَّة * Hibbertia (S). Hibbertia (F). Hibbertia (E).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة الخشخاشيات. أوراقه
بحرية اللون كثيرة التفريش والتشريح. أزهاره فردية
التجميع، طرفية الارتكاز، رباعية البتلات المزدوجة
التركيب. ثماره قرون مستطيلة، منجيلة الشكل.

٣٠١٦٨ - هَبَّارُ سَبَكِيَّة * Hippopus (S). Hippopus (F). Hippopus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرضويات فصليجات النحاشم
وفصيلة الجربانيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطنا
بعض بحار البلاد الحارة أعصها البحر الأحمر والأبيض
الهندي ١١ أصدانها لاستنساخ المصارع والأضلع والتخديد
الطولي، ملونة ومبجعة بالأحمر والأسفر ١١ تعيش متنمة
في الرمال وفي الأسماك على أعماق تراوح من مترين إلى
خسة أمتار.

٣٠١٦٩ - هَبَّارُ سَبَكِيَّة * Hippidae (S). Hippidae (F). Hippidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأبريل،
طويلات الأذنان. أجسامها وأنواعها المعروفة نحو ٦٠ ١١
أعطنا بحار البلاد الحارة. تألف المواقع الكثيرة الامات
والتي لا يزيد عمقها من ٣٠ متراً ١١ دماغها قلبية
الجب دماغها السطحان إلا أن أذنانها عادة الحمة ١١
أعرف أجسامها المهي.

كبيرة. أنواطها إلى لفترة الصفراء الموج ١١ تألف المواقع
التي يكثر فيها الخث أو الانبثج أو الحيوانات الطليعية
حيث ترتب طرائعها بامتثال ١١ أشهر أنواعها الهيداد
النكبوتي (H. araneus).

٣٠١٥٦ - هَبَّار * Eboulis (F). Fallen rocks (E).

هي المواد المنهارة من محضرو وغيرها.

٣٠١٥٧ - هَبَّار * Marée montante (F). Flood-tide (E).

هو اندفاع مياه البحر ودونها من الشط. ويعدى المد
ذلك لأن المياحة عند ارتفاعها واندفاعها نحو اليابسة
تتشرب وتمتد وتقترب.

٣٠١٥٨ - هَبَّار * Hippa (S). Hippa (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الأبريل
طويلات الأذنان وفصيلة المهييات. أنواعها المعروفة
قليلة العدد جميعها من قشريات بحار المناطق الحارة ١١
أجسامها صغيرة القد، محبة الظهور، تطول من ٢ إلى
٤ م. تتميز بقرونها الاستشعارية المشاوية التركيب
المنطوية المحسنة ويمالقيها البنية المنطوية وباربطها
القصرية المتعرضة الأطراف التي تمكها من الاتصال
بسرعة. أنواطها تراوح بين الخزقة والرككة بطولها إلى
السرة.

٣٠١٥٩ - هَبَّار * Hybale (S). Hybale (F). Hybale (E).

جنس خنافس من غديات الاجنحة فصليجات القرون
وفصيلة البغليات. أنواعها المعروفة ١٢ أعطنا
بعض مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط والجزيرة
العربية ١١ أجسامها شبه بيضية الشوز تطول من ١٠
إلى ١٥ م. كولائها وأحاديها متدلة الاحدياد.
رؤوسها مخروطية. مناتها ناشئة مدبية. هيئاتها صغيرة
صاحبة. قرونها الاستشعارية مكورة الأطراف الصفيحية.
قرونها نشطة متكاثرة الحب الذي يطوق أيضاً الرأس
والجزء الاسامي من الكوسل. أنواطها تراوح من الشقة
السراه إلى الجفوة. أحاديها لاسفة، مستديرة الأطراف ١١
جميعها جامة تعيش على المواد العضوية والنباتية المنسطة.

٣٠١٦٠ - هَبَّار * Hypera (S).

جنس حشرات من السوسيات. أنواعها كثيرة العدد جميعها
صغيرة القد طولها يراوح من ٣ إلى ٧ م. أنواطها مختلفة
الألوان يكثر فيها الحنطي الاسفر. قرونها الاستشعارية
مرفقة منفرجة الزوايا ١١ أعطنا البلاد الممتدة الحرارة.
سمرها دجوي. أشهر أنواعها ما يتبع.

٣٠١٦١ - هَبَّارُ الْجَزَاب * Hypera fasciculata (S).

نوع من الحير. طوله يراوح من ٧ إلى ٤ م. ثوبه حنطي
اللون تملوه مشعة رمادية وتغطى قاطب أسود. تألف
الأتربة الرملية. يركب جميع أنواع الجزاب ومنظم النباتات
الزرقية التي يقيم أوراتها ١١ يرقاته مؤذية تنخر البرام
وقد تسبب تلفها.

٣٠١٦٢ - هَبَّارُ الْقَرْنَفَل * Hypera arazor (S).

نوع من الحير. طوله يراوح من ٥ إلى ٧ م. ثوبه إلى



هَبَّار



هَبَّارُ الْجَزَاب



هَبَّارُ الْقَرْنَفَل



هَبَّارُ الْقَطَانِيَّاتِ



هَبَّارُ مُتَوَنِّ



هَبَّارُ الْقَرْنَفَل



هيب

البرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٣٩ سم. جسمها اسطواني الشكل. نوها الى الحلقة القنبراء ملوفا بتدبير اسود وبخطوط قاطبة ومتزعة صفراء اللون وشعر جانبيه مهدية. رأسها شديد البسرة. تحمل في اهل عنها زائدة صغيرة مَيْبَة نارية اللون تنشر عند الانقضاض وتقلع منها رائحة حريفة مزجية، ورواجها وبها الى البسرة || ملور الاكامل يستمر نحو ٢٨ اسبوعا. تحضنها الحادة متدلية برباط المشنق تمضد الحاصفة.

٣٠١٧٦ - هَيْمَة Aglon (F). Eaglet (E).
هو فرخ العقاب لا يزال بحماية ابيه واه.

٣٠١٧٧ - هَيْمَة بقلة من النجيل (اللسان).

٣٠١٧٨ - هَيْمَة Etiolement (F). Etiolation (E).
اصفرار النبات وتحوله. راجع فضالة.

٣٠١٧٩ - هَيْمَة Nycticebus tardigradus (S).
Nycitæbe tardigrade, Loris cardigrade (F).
Kukang Loris, Slow-paced Loris (E).

حيوان لبين وحيد الجنس والجنس من فصيلة البوريات موطنه يمتد من الهند الى صينيا. يألف الفئان والارحاج الميتمرة الاشجار التي يتسلقها بصفة معددة. ملهته الحيواني جامعي. جماعته قليلة العدد التي يراوح من ٥ الى ٢٠ سره دجوي يستمر من نعمة الليل الى الفجر العميق. قوته اوراق الاشجار وزمناتها والارحاج البانئة واغشرات والمصافير ويضها || يصير من الحيوانات الشجرة لانه يغني معظم حياته على الاشجار. جسمه قصيف صغير بطول نحو ٣٨ سم. يتميز بالندام الذنب. رأسه شبه مكور الشكل صغير الحجم والانس. عيناه كبيرتان مستديرتان. اذناه صغيرتان، مستديرتان، كاسيتان. شعره جمل بالغ النعومة خالي للمس. نوبه الى الصبغة الصفراء المواج ملوفا بمشيع ادس في الاطيان ويملو خط قاطب كسني يمتد من الحاجبين الى قمة الرأس تنبع الظهر فالسرم. عيناه ملوحتان بالاسود الداس. قصبه انفه غبراء اللون. ولونه هذا يتنوع مع العمر اذ تلوو نمطة فضية تزداد مع مرور الايام || الاث تنحل بثوب الذكر الا انه اهدت ماجة وهي ثنائية الثدي. يحملها يستمر نحو سبعة اشهر تقع في تمامه جروا واحدا.

٣٠١٨٠ - هَيْدَب Cumulus
هو الصير، نوع من اليوم الماطرة المتوسطة الارتفاع.

٣٠١٨١ - هيدرات Hydrate
جزء ماء استبدلت منه ذرة الهيدروجين القاعدية بذرة اخرى موجبة الكهربائية.

٣٠١٨٢ - هيدرات الكربون، هيدروكربونيه Hydrate de carbone, Matières hydrocarbonées (F).
Hydrocarbon (E).

مركبات عضوية من الكربون والاكسجين والهيدروجين، منها الخلاصات غير الازوتية كالنشا والسكر ومنها المواد اللعنية وغيرها.

٣٠١٨٣ - هيدروبيكليات Hydroptilidae (S).
Hydroptilidés (F). Hydroptilidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة جملينات الاجنحة. اجناسها وانواعها الممرقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد



هيج

٣٠١٧٠ - هَيْمَة Fibigia (S).

Fibigia (F). Fibigia (E).
جنس نباتات نجمية او هشيبة معمرة بيرة من فصيلة الصليبيات. انواعها الممرقة قليلة العدد، جميعها من ثبوت حوضي البصر الابيض المتوسل || سوقها غبراء. اوراقها متناحية، سنانية النصال. ازهارها شبه منبلي التجميع. ازدهاء صغيرة صفراء اللون. ثمارها سفهاء، شبه يبيضة اللون، مبطلة الجرم، خلية النفاة، ثنائية البزور المفلطحة المستديرة || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية:

٣٠١٧١ - هَيْمَة جُوبِيَة Fibigia clypeata (S).
Fibigia à bouclier (F).

نوع من الهيمية، نجمة صغيرة. اوراقها الجلدية سنانية النصال المستطيلة. اوراقها العليا غيطية. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٢ - هَيْمَة صُليَة التمر Fibigia eriocarpa (S). Fibigia laineux (F).

نوع من الهيمية. شبة ممرقة. اوراقها الجلدية ريمية النصال المستطيلة المسنة الحطار. اوراقها العليا عصفية الشكل قصيرة. ثمارها مستطيلة الحمل الذي ييسر كالصوف تنويرها صيفي.

٣٠١٧٣ - هَيْمَة مَشَخِصِيَة Fibigia rostrata (S).
Fibigia éperonné (F).

نوع من الهيمية. شبة معمرة. اوراقها كدوك الجيوبية. ثمارها كثيفة الحمل المتوسط الطول، تنتهي بنمسا حادة. تنويرها صيفي.

٣٠١٧٤ - هَيْمَة * Zerynthia (S).

جنس حشرات فراشية من عمارة المذانيات. انواعه عديدة جميعها متوسطة القد، بسطها تراوح من ٤٦ الى ٥٢ سم. اجسامها اسطوانية الشكل، حنطية اللون. بطونها ملوكة يكثر فيها الاحمر والخطوط القاطبة. رواشها الى الصفرة تملووا زركشة سوداء وتبيح احمر وارزق || تظهر في اوائل الربيع، تمتع مكنتها على غشفت النباتات البرية. يتقشف من رقات غاشلة تعيش على اوراق النبات. يرقاتها اسطوانية الشكل غبراء اللون منشقة بالاسود.

٣٠١٧٥ - هَيْمَة الزَرَاوَنَة * Zerynthia polyxena - creusa (S).

Zerynthie du littoral, Thais, Cassandre (F).
Zerynthia polyxena - creusa (E).

حشرة من فصيلة الفراشيات رتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها البلاد الحارة وبعض اقالي حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها راضمة قوتها مغر الازدهار، سرعتها تعيش على اوراق النباتات البرية واغصانها الزرانة || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٩ سم. بسطها نحو ٤٨ سم. رأسها كسني اللون. صيها كيرتان ناشزتان. زباناها صرغياتان. جوشها كسني اللون. بطنها الى الخلفي العناني يملو تنقيط جانبي اصفر وبخطوط قاطبة ومتزعة كسنية || رواشها، عنه الشقن الى الصفرة تملووا زراکش وتزادق سود ويغ نقط حر وزرق || لما جيل واحد في الحول. تظهر القرائة في مطلع الربيع تسرح في النهار. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع ويمتد للكن مباحدا || نصل اوراق النباتات البرية واغصانها الزرانة ||

٣٠١٩٢ - هيدروبيسيكيات
Hydrologie (F).
Hydrology (E). علم خصائص المياه وتوزيعها .

٣٠١٩٣ - هيدروبيسيكيات *
Hydromys (S).
Hydromys (F). جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الفأريات . أنواعها قليلة موطنها أستراليا ، جميعها قازية . أجسامها مسطوية . طولها الكامل يراوح من ٤٥ إلى ٦٥ سم . رؤوسها مدوية الشكل . ذلقتها مقطوعة . أذنانها مستديرة . جرابها قصيرة ، أصابعها خاسية غشائية القاعدة || تألف شطوط البحر وغضاف الأنهر والبحيرات ، تسبح وتطفس بسهولة فائقة . فئتها المواد النباتية والأسماك الصغيرة والقشريات .

٣٠١٩٤ - هيدكة *
Nectria (S).
Nectria (F). جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة الفطريات . أنواعها عديدة بعضها شديد الأذى || يوهها الخاريجي اعطليبي الشكل ، صغير القند ، رمحي الارتفاع . أعصابها فضحة ، نولية السطح ، مرجانية اللون ، ترتكز على ونبية ناتئة || يورخ نكتاتيا ثنائي الجها تشطرو ونيرة متعرجة الى جزئين || ملاسوين العلوي اكبر من السفلي || اعرف انواعها واضرها البتة التالية .

٣٠١٩٥ - هيدكة حمراء *
Nectria cinnabarina, Tubercularia vulgaris (S). Nécrose du bois (F). Coral spot (E). Rotpustelkrankheit (D). فطر مجهرى يمتري بعض الانجبار المشمرة والحرجية انضخها الاجاص والبتلا والبنقد والتوت والجوز والحور والخلاف والخوان والحوخ والدردار والزان واليزوديق والثرم والصنوبر والصنوبر والعرب والفيبراء والقرون والتيقب والكتيب والبلابل والمران والمغث واليق والمعدل الخ ... فيغطها وقد يسبب يسهها || مظهرها الخاريجي يشور جزئية اللون لا قياسية البعثة تركب الاغصان والافنان من الربيع الى الشتاء تنضبط البشرة واللحاء وتقضي على الشكير عند انتشاب البراعم فينبو الخشب حاريا من التفشور تملو كسفة حمراء || يكالغ في الانجبار المشمرة مكافئة الهيدكة الخنطية .

٣٠١٩٦ - هيدكة حنطية * ، آكلة التفاح
Nectria galligena, Cylindrocarpum mali (S). Chancres du pommier, Ch. des arbres fruitiers à pépins (F). Apple canker (E). Apfelbaumkrebs, Nectriakrebs (D). فطر مجهرى يصيب التفاح والاجاص فيسبب اوامع المعروف بآكلة التفاح || مظهره الخاريجي يشور مقرسة لا قياسية الشكل والحجم تركب الاغصان والافناد والافنان والثار || ييبو على الافناد والافناد يقع جزئية تركب بشرة اللحاء ، عند انتشاب البرعمة ، فصيغها وتقضي عليها وعلى ما دونها من اللحاء حتى الشكير . وقد تمتد الى البرعمة فتنضبط || وهو على الثار يقع مدنية تركبها قبل الإدراك وعنده وقتل السوط ونمجه بعد البشرة والقشرة .

يأكل الثمر ويسقط او يفسد ويبقى كالمواد يتكتنفه طبقة غروية لزجة لا تخلو من بعض التجاويف الخملية . يتكافح اولاً بقتل الاغصان المسامة ويتبعثر الجروح إما بسلقات الحديده اخلول ٢٪ واما بالمركب التالي : سلفات النحاس ١ ، كلس يافض ٢ ، زيت كتان محرو ٢ . ثانياً باستعمال سائل بودو اخلول من ٢ الى ٣٪ او غيره من الفواطير الفعالة على ان تنضغ الانجبار في الخريف

المتعددة الحرارة || اجسامها شديدة الصفر ، حمراء اللون . بسطة اجنتحها تراوح من ٦ الى ٨ سم . اجنتحها الامامية كثيفة الخمد مبيجة || ملجها الحياتي جاعي . افواجها كثيرة الخمد طراوتها سريع الحركة . تخلق فوق مجاري الماء من العصر الى فحة الليل || اساريمها تمش في المياه الزائكة ملحوة بمجاليب بسطة او قعية الشكل ، حريرة النسيج || اشهر اجنتحها :

Hydroptila (S).
Agryta (S).
Oxyethira (S).

الهيدروبتلا
الآغريلا
الأكسيثيرا

٣٠١٨١ - هيدروبيسيكيات *

Hydropsychidae (S). Hydropsychidés (F).
Hydropsychidae (E). فصيلة حشرات من رتبة جملوزيات الاجنحة . اجنتحها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القند ، وبداء اللون . بسطة اجنتحها تراوح من ٢٥ الى ٣٢ سم . اجنتحها قليلة الزاويين ، شبه شفافة ، مهدبة الحواف الخلفية . ملاسها الفكية مسطوية عند الشقين || اساريمها طليقة ، تمش في المياه الجارية بين الاعشاب المائية والصخور . بعض اجنتحها مفرس يصنع شباك يحبكها بين الاعشاب فيقتس ما يقطن من حويئات || اشهر اجنتحها :

Hydropsyche (S).

الهيدروبيك

٣٠١٨٥ - هيدروبيجين ، هيدروجين ، هيدروجين
Hydrogène (F). Hydrogen (E). غاز شديد الاحتراق عادم اللون والشم والرائحة يورب في الماء وفي جميع المواد القسوية . رمزه (H-٢) . وزنه الاتمي ١.٠٠٨ - راجع ايدروجين .

Hydrographe (F).

٣٠١٨٦ - هيدروغراف

Hydrographer (E).

العالم بالمياه السطحية ويسأولها .

Hydrographie (F).

٣٠١٨٧ - هيدروغرافية

Hydrography (E).

علم المياه السطحية ووصفها .

Hydrophidae (S).

٣٠١٨٨ - هيدروبيات *

Hydrophidés (F). Hydrophidae (E).

فصيلة حيات مائية سامة من امانيات الاحاديد . اجنتحها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم عمار البلاد الحارة . جميعها تقرب الشطوط في زمن التساقط لانها تفسد يعضها في الرمل . ونبها انواع تقسم الاغوار وتسير بعيداً في الأنهر || اعرف اجنتحها واشهرها الهيدروبيس المعروف بحية الماء والغنام والبرداس والتجافة .

Hydrophilis (F).

٣٠١٨٩ - هيدروبيس

Hydrocarbons (F).

٣٠١٩٠ - هيدروكربون

Hydrocarbon (E).

الهيدروكربور تألف كيميائي يتركب من الكربون والهيدروجين .

Hydrocotyle (F).

٣٠١٩١ - هيدروكوتيل

Pennywort (E).

هي قصعة الماء ، اطلها .



هيدروبيس



هيدكة حمراء



هيدكة حنطية

اصقاع العالم . سوقها فردية تنشعب عند القمة . اورثاتها جذرية الانتشاب . ازهارها وريسية صغيرة ملونة || أعرف انواعها وأشهرها ما يلي .

٣٠٢٠٤ - هيراسيوم أزغب ، عطفوة

Hieracium pilosella (S). Pileoselle, Vélouette, Oreille de rat (F). Mousse ear hawkweed, Mousse ear (E). Kleines Habichtskraut, Maudschrän (D). Pelosella, Pileosella (I).
نوع من الهيراسيوم البري . جلوده طيبة يقال أنها تستعمل في بعض العلاجات الصدرية . ساقه مزينة بطلع نحو ٣٠ سم . اورثاته جذرية الانتشاب ، بيضية الشكل ، نصلها أزغب البشرة على سطحه . ازهارها فردية ، صفراء اللون . ذهبية اللون .

هيدكة سوداء



هيدكة صئوبية



هيدكة قمرزية



هيدكة مرجانية



هيراسيوم



هيردان



هيمية

بمد الإعياء || هذا مع العلم أن القفاح أو الاجاص المرص لهذا الوسم هو الموجود في الموانع الرطبة والمربوس على إحماق تقود ٥٠٠ سم . وفي تربة كثوم أو تربة كثرت فيها نسبة المادة الكلسية .

٣٠١٩٧ - هيدكة سوداء* ، أكيلة الزان

Nectria ditissima, Cylindrocarpon wilkommii, Fusidium candidum (S). Chancro du hêtre (F).
فطر مجهري يصيب الزان بأفاته اللغنية فيطبخها . مظهره الخارجي لطلع قديمة الشكل سوداء اللون دائرية الانتشار رايوح طويلا من ١ إلى ٢ سم . تصيب بشرة الإنسان وتنتشر عرضا إلى أن تطبقها تغطي على اللحم وعلى التبادل النسي . وقد تسبب قروصا ثلاثة تسلب الخشب كما في القفاح والاجاص والحور .

٣٠١٩٨ - هيدكة صئوبية* ، أكيلة الصئوبيات

Nectria cucurbitula, Cylindrocarpon cylindroides tenue (S). Chancro des conifères (F).
فطر مجهري يركب بعض الاشجار الصئوبية انحصا الصئوب والنبوب || مظهره الخارجي بقع مبهية الخار لا قياسية الشكل والحجم لونها إلى الحمرة الغراء . لهدنها ينش قصار لا متسارية الانتشار والكثافة ، تسري الانثان المجروسة وتكثر في الاغصان المقطوعة المطروسة حل التربة الرطبة || اضرارها زهيدة لا تستلزم المكافئة .

٣٠١٩٩ - هيدكة قمرزية* ، أكيلة الحور

Nectria coccinea, Cylindrocarpon candidum (S). Chancro du peuplier (F).
فطر مجهري يصيب الحور فيصيب الوسم المعروف بأكلة الحور وقد يصيب القيقب والاسفندان والزان والسندباد . مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم ، قمرزية اللون . تتركب بشرة القيقب والانثان نصلها يد أن تقرح اللحم والشكر . ويصيب الخشب || يكافح في الحور مكافئة الهيدكة الخطيفة ومن المستحسن تخفيض التربة لتخفيف رطوبتها .

٣٠٢٠٠ - هيدكة مرجانية* ، هيراسيوم

Nectria ribis, Tubercularia confluens (S).
فطر مجهري يركب الكشيش والاجاص والزيزون والوردار . مظهره الخارجي لباس فضائي يحمل بعض افاد الشجرة ثم يعقب ظهور بطور متستفحة لا قياسية الحجم لونها إلى الوردي ثم يتعرف إلى المرجاني || يكافح بقطع الاغصان المصابة عند ظهور اللباس ويستعمل الطرق المذكورة في مكافئة الهيدكة الخطيفة .

٣٠٢٠١ - هيراسيوم

حيوان لاسم مقترن يدهى فريزون ، اطليه .

٣٠٢٠٢ - هيرازماج

هو التمتع الجمعي ، اطليه .

٣٠٢٠٣ - هيراسيوم* ، حشيشة الغرب

Hieracium (S). Epervière, Oreille de souris (F). Hawkweed, Hawk's eye (E). Habichtskraut, Distelkraut (D). Ieracio, Orecchio di topo (I).
جنس نباتات عشبية معمرة برية ويزينة من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة زهاء ٣٠٠ منتشرة في معظم

٣٠٢٠٩ - هيس

هو السلب أي الجزء الجالس لآثار اجزاء الحراث .

Choléra des poules (F). **هَيْسَمَةُ الطير** ٣٠٢٢٠ -
هي كوليرا الدجاج ، اطليه .

٣٠٢٢١ - **هَيْسَمَان * ، فِجَل انخيل**

Cochlearia armoracia (S). Ralfort, Grand ralfort, Ravenelle, Cran des Anglais, Cranson, Radis à cheval, Moutarde des Allemands, Armoracia(F). Common horse-radisch (E). Meerrettich Löffelkraut, Meer-Rettig (D). Ramolaccio, Armoraccia, Erba forte, Barba forte, Rafano (I).

جلس نباتات عشبية طيبة برية ممررة من الهيفانيات
وفصيلة الصليبيات . جلورها غليظة مسطيلة يضاء اللون
خردلية الطعم . اوراقها خضاتية متفتحة سنانية الشكل ،
ازهارها صغيرة القد ، يضاء اللون ، سنطيلة التجميع ،
هامية الازتكاز . ثمارها خريشبات دقيقة مسطيلة . بزورها
مستدرة حمراء اللون ، يتحصر منها زيت طيار يشبه زيت
الخرود ، يدهي زيت خردل الزويان او الخردل الألماني .
وهو مضاد لداء الحفر ، يدر اللسان والبول . ويهيد
الامراض العصبية المزمنة .

Raphanées (F). **هَيْسَمَانِيَّات** ٣٠٢٢٢ -
سبط من فصيلة الصليبيات يشمل بعض الاجناس اشهرها
الهيفان والفجل .

Oryx de Nubie (F). **هَيْطَلَة** ٣٠٢٢٣ -
هي الاربع السديلي ، اطليه .

Molossinés (F). **هَيْعَرَات *** ٣٠٢٢٤ -
عمارة من فصيلة الرمسيات . اجناسها اربعة ، تتميز باذانها
المنفصلة عن الفشاء الجلد ، || أما اجناسها الاربعه فهي :
الترشادب والصفوح والفورب والميربة .

Molosse (F). Molossus (E). **هَيْعَرَة *** ٣٠٢٢٥ -
جلس غفاش من عسارة الحيرات . موطنه البرازيل
والانجيل . انواعه عديدة . اجسامها صغيرة القد ربة .
رؤوسها غليظة . فرائسها مستعرضة رافعة . اذانها كبيرة ،
قلبية الشكل || يعيش جماعات متوسطة العدد . يسرح
في اوائل الليل واواخره . قوته الحشرات . يألف تجاوبف
الاشجار الحرجية والمغاور والكهوف .

Vent du Nord-Est (F). **هَيْف** ٣٠٢٢٦ -
North-East wind (E).
رياح مهبأ بين الشمال والشرق وجهتها بين الجنوب والغرب .
وهي رياح حارة نكباء تهيج النبات وتؤذي به .

Hyphales (F). **هَيْفَانِيَّات *** ٣٠٢٢٧ -
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزويات . تتميز بهيئتها
السطحي الارتكاز ، التندلي الشكل . كنانها تملو كرمياتها
الثؤادية || فصالها اربع : الكنتيات والكنتيات
والطحيات والوطحيات .

Hypha (F). Hypha (E). **هَيْفَلَة *** ٣٠٢٢٨ -
ج . هيف . مجموعة خيوط نباتية صاعدة الخيطية يتألف
سها ميكل القطر والحزاز .

٣٠٢٢٩ - **هَيْفَل ، جَرِيَع**

Forsythia (S). Forsythie (F). Golden bells (E). Glock-
chenstrauch, Forsythie (D). Forsythia (I).

جلس جنبات برية ورزيتية من فصيلة الزيتونيات . انواعه

Histogenés, **هَيْسْتُوجِنِيَة** ٣٠٢١٠ -
Histogénie (F). Histogeny (E).

الهيستوجنية علم يبحث في تكوين الانسجة العضوية .

Histographie (F). **هَيْسْتُوجْرَافِيَة** ٣٠٢١١ -
Histography (E).

الهيستوجرافية وصف الانسجة العضوية .

Histon **هَيْسْتُون ، هَيْسْتُون** ٣٠٢١٢ -
عصر فريقي يقال انه اساس المواد النووية الخلية .

Roncraie (F). **هَيْشَة** ٣٠٢١٣ -
Brake, Brambly ground (E).
هي دخل السايك او منته وكل ارض كثر فيها هذا
النبات .

٣٠٢١٤ - **هَيْشَر** هو الحرف ، اطليه .

٣٠٢١٥ - **هَيْشَرِيَّات**

Carducées, Carduinées, Cynarées, Cynaroc-
phales, Flosculeuses (F).

سبط من فصيلة المركبات ، اجناسه وانواعه كثيرة العدد
معظمها بري ويضها زراعي || اشهر اجناسه : الارضي
شوكي والقرطم والتنترين والضمياء والكارارين والارنطين
ورعي الايل والورلة .

٣٠٢١٦ - **هَيْشَمَ هَرَمِي ، كُوشِيَة هَرَمِيَة ،**
مَكْنَسَة الحنكة

Kochia trichophylla (S). Kochia-cyprás (F). Mock-
cypress, Summer-cypress (E). Sommer-Cypresse
(D). Cipresso d'estate (I).

نوع من الميثم وهو عشبة سولية رزيتية هريية الشكل .
ساقها فروع نساء . اوراقها مشرفة خلية ليدة تبلو جملة
الخضار الاصفر الزاهي ثم تنحرف الى الصنابي وتستقر
على الاحمر الى ان تلوي في اواسط الخريف .

٣٠٢١٧ - **هَيْشُور**

الميشور والميشوم واسد . قيل ه تيات رغو فيه طول على
رأه برصوة كأنه عتق الرأل ه . وقال ابو حنيفة : ومن
الشرب وله ورقة شاكه منها شوك غسقي وهو يسقي ،
وزهره صفراء وتغلط ، له قصبه في وسطه حتى تكون اطول
من الرجل ه (اللسان) .

٣٠٢١٨ - **هَيْسُ ، هَيْسُ ، ذَنْقِي** ٣٠٢١٨ -
Fiente (F). **هَيْسُ ، هَيْسُ ، ذَنْقِي** ٣٠٢١٨ -
Dung, Droppings (E).

هو رجيع الطير من اي جنس كان وهو من الاسدة
العضوية الشيطنة بالمادة الاثرية || يقال حاص
وهاض وفاق واذق الطائر : ربي برجيحه .

٣٠٢١٩ - **هَيْسُور ***

Sisor
سمكة بحرية مستطيلة وصيدة الجنس والجنس والجنس
الخانة وفصيلة السليوريات . اصطناعها المياه الخفية . تتميز
بغرابية جسمها المزدني الشكل النقيط الطرف . رأسها مقنوم
الحلم . تحمل في فكها عذبات مستطيلتان ، زعانفها
كبيرة القد . زعنفتها الخشبية تنتهي بأيل فتيق كالأص
طولها يعادل طول الجسم .



هيسور



هيفان



هيرة



مِفْلُومِ اسط



مِفْلُومِ تَوَحِي



مِفْلُومِ حَرَمِي



مِفْلُومِ رِيحَارِي



مِفْلُومِ قَرِيدِي



هَيْفَة

ساقه مستدلة الجرم ، ناشرة الطوق بيشاء اللون . نكته كالتوبج قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار الاسمع اللامع . اطراسه الى الوردي المايق .

٣٠٢٣٦ - هَيْفَلُومُ حَرَمِي *

Hypholoma fasciculare (S).
Hypholoma fasciculé (F).

نوع من الميفلوم . يعيش على خاء الجلولع المنطوية . ساقه رفيعة ، خفيفة ، موصية ، صفراء اللون . نكته قطنسوية الشكل ، رطلة ، قطرها نحو ٤ سم . لونها لون الساق . اطراسه خفيفة ، نحولة ، زيتونية اللون . لحيته صفراء اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٣٧ - هَيْفَلُومُ زَنْجَارِي *

Hypholoma seargentianum (S).
Hypholome vert de gris (F).

نوع من الميفلوم . يوجد في غابات السديان والمليل . ساقه لزنية ، مستطيلة ، ربادية اللون ، رقيقة الطوق . نكته دقيقة ، مظلية الشكل ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الرمادي الزنجاري المواج . اطراسه الى البني الزنجاري .

٣٠٢٣٨ - هَيْفَلُومُ قَرِيدِي *

Hypholoma sublateritium (S).
Hypholome brique (F).

نوع من الميفلوم . يعيش على الارويات والجلولع النشرة . ساقه موصية مستدلة الارتفاع والطلاقة ، قليلة الاستدارة ، شبه مبطلة . نكته صينائية الشكل ، قزبنية اللون ، قطرها نحو ٨ سم . لحيته بيشاء اللون ، مرة المذاق .

٣٠٢٣٩ - هَيْفَات *

Hyphomycetes (F).

Hyphomycetes (E).

ظهور مجهرية غزلية ، عارية البزور ، ظاهرة الخيط الكفيتية التجميع ، تنمى على الخاء الاشجار والجلود والورق وفيها ... قشيب نوعاً من العفن القشار .

٣٠٢٤٠ - هَيْفِيَّة * ، شَجَرَةُ الْمَطَاطِ ، مَطَاط

Hevea (S). *Hévéa*, *Arbre à caoutchouc* (F). *Caoutchouc tree* (E). *Kautschukbaum* (D). *Evea* (I).
جنس اشجار حرجية وزراعية من التينويات السوسيات . انواعه قليلة العدد . اوراقها مستطيلة ، منتنة ، امليجية ، مستطيلة النصل الجانبة . يستخرج من سقيها بالخر مصارة لزجة مطاطة لها استعمالها الصناعي || اشهر انواعه هيفية البرازيلي وهيفية الفريزان .

٣٠٢٤١ - هَيْقُ ، هَيْقَمُ ، هَيْكَل

الحق واليقم : ذكر النعام . يقال أشم من هيق واهدى من هكل .

٣٠٢٤٢ - هَيْكَل

Ossature (F). *Framework* (E).
مجموعة الاعضاء الجاندة الصلبة الرضية التي يرتكز عليها الجسم والتي .

٣٠٢٤٣ - هَيْكَلْ عَظَمِي

Squelette (F).

Skeleton (E).

مجموعة العظام التي يرتكز عليها الجسم الحيواني .

المعروفة ، مهدبا عند من اليابان الى اوروبية . سقيها فروع . اوراقها متعابلة مابلة . ازهارها رباعية الفصل ، لجاسية البلات المتندمة القاعدة ، ثنائية السداة ، جملة الشكل ، ذهبية اللون ، تنور قبل انبلاج الورق .

٣٠٢٣٠ - هَيْفَلُومُ الْفُرُوعِ

Forsythia viridissima (S). *Forsythie vert franc* (F).
نوع من الميفل التزييني ، جنه تملو من مرتين الى ثلاثة اعمار . ساقه فروع . فروعها مجوفة السلايات ، متحصية ، عسراء اللون . اوراقها منتنة سنائية الشكل ، نصلها جامدة الصفحة يطول من ٦ الى ١٥ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ . ازهارها لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، لونها الى الصفرة الباهتة || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

٣٠٢٣١ - هَيْفَلُومُ اُرُوبِيَّة

Forsythia europaea (S).

Forsythie d'Europe (F).

نوع من الميفل التزييني ، جنه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . ساقه فروع . فروعها متحصية عسراء اللون . اوراقها منتنة بيشية الشكل ، نصلها جامدة الصفحة متبادلة التسين يطول من ٤ الى ٨ سم ، ويعرض من ١ الى ٤ سم . ازهارها لا قياسية التجميع الذي يراوح من ١ الى ٣ ، يتلاها ملتفة الاطراف ذهبية اللون || تنوره يستمر من اذار الى نيسان .

٣٠٢٣٢ - هَيْفَلُومُ مَدَّتِي الْاَزْهَار

Forsythia suspensa (S). *Forsythie à fleurs pendantes* (F).

نوع من الميفل التزييني ، جنه تملو من ٢ الى ٤ م . ساقه فروع . فروعها مجوفة السلايات ، نحيلة اللون ، قشيب مستقيمة متحصية ثم تنطفت وتتل . اوراقها مركبة ثلاثية التخرم ، وريقاتها جامدة النصل مشارية الحافة . ازهارها مستدلة ، لونها الى الصفار المذهب المايق . تنوره يستمر من شباط الى اذار .

٣٠٢٣٣ - هَيْفَلُومُ *

Hypholoma (S).

Hypholome (F).

جنس ظفور من فصيلة الفاريقونيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض غابات المناطق المعتدلة الحرارة والحارة . تنمى على جذوع الاشجار واروماتها وعلى التريل والدبال . معظم انواعه كاعن الصنف غير معروف فيه . اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية :

٣٠٢٣٤ - هَيْفَلُومُ اَمْعَط *

Hypholoma depilectum (S). *Hypholoma pelé* (F).
نوع من الميفلوم . يوجد في حراج الصنوبر . ساقه خفيفة ، صفعة ، دقيقة ، تنتهي بطوق مستعرض الحاشية ، لونها الى الطحلة يطولها تمسح اذرة . نكته كبيرة ، شبه مستديرة ، لزجة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى الطحلة الصفراء . اطراسه تندر ليلكية ثم تتحرف نحو الحمرة الابوانية .

٣٠٢٣٥ - هَيْفَلُومُ ثَوْنَجِي *

Hypholoma coronillum (S).

Hypholome petite couronne (F).

نوع من الميفلوم . يوجد على التريل في المواقع الرطبة .

٣٠٢٤٤ - مَيْكَلَة °

Scaléographie (F).
Sculptography (E).

الميكلة علم يبحث في المياكل النطقية ، من حيث التركيب والشكل ، عند الانسان والحيوان .

٣٠٢٤٥ - مَيْل ، أَبْقُوْد ، نَكِير

Hille (F).
Hilum (E).

نقرة صغيرة في الزرة لا قياسية الشكل والموقع تكون عادة نقطة الاتصال بأغشية الثمرة .

٣٠٢٤٦ - مَيْلَانِيُوم ° ، هِيلَانِيَة

Helenium (S). Hélénie (F).

جنس نباتات عشبية سريرية من فصيلة المركبات . انواعه عديدة معظمها امريكي المنيث . اوراقها مضاعفة ساعدة . ازهارها وريسية مستعرضة السينات المسنة . تحمها بضية الشكل . بلورها خماسية البلور الهديئة او المسنة . اعراف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٢٤٧ - مَيْلَانِيُوم اَمْرِيْكي

Helenium nudiflorum (S). Hélénie nudiflore (F).
نوع من الميلانيوم المعمر . ساقه مزينة فروع تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه حاضنة ساعدة سنانية النصل . رؤوساته الزهرية جوية اللون عادمة السينات || تنوره يستمر من تموز الى ايلول .

٣٠٢٤٨ - مَيْلَانِيُوم خَرِيفِي

Helenium autumnale (S). Hélénie d'automne (F).
نوع من الميلانيوم المعمر . ساقه سرحة فروع تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ساعدة ساعدة سنانية النصل النمن الحار . رؤوساته الزهرية مذهبة القروس ، كبيرة السينات الثلاثية او الخماسية التفريضة || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٤٩ - مَيْلَانِيُوم نَحِيلُ اللُّوْرِك

Helenium tenuifolium (S). Hélénie à feuilles grêles (F).

نوع من الميلانيوم الحولي او المحول . ساقه فروع تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراقه خيطية النصل الذي يمرض نحو ١ م . رؤوساته الزهرية حركوية التجميع ، صفر الاقراص ، يرض السينات الشارفة المفرضة || تنوره يستمر من آب الى تشرين الاول .

٣٠٢٥٠ - مَيْلَسْت الصَّنَوْبَر ° ، هَيْلَسْت اَسْوَد °

Hyastes ater (S).

Hyaste des pins (F).

حشرة من الكراشيات ، طولها نحو ٤ م . جسمها مستطيل الشكل اسود اللون ، تركب مع ريقاتها بطور الصنوبر فضلتها وتقيها .

٣٠٢٥١ - مَيْلَسْت النَقْل °

Hyastinus obscurus (S). Hyaste du trèfle (F).

حشرة صغيرة من الكراشيات ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م . قوبها الى السمة النحمة يطولها خل الحمل . مرتها يختلف من مرتع سائر انواع جنسها لانها تعيش على النباتات النحمة بدلا من الاثمار . يرض مع ريقاتها تركب النفل في جلوره تفلنها وتقضي عليها .



ميلانيوم



هيلست الصنوبر



هيلست النفل



هيلوت سداسي الخطوط



هيلود

٣٠٢٥٢ - هَيْلَسْمَة الصَّنَع °

Hylemyia coarctata (S). هي ذبابة الحنطة ، اطليا .

٣٠٢٥٣ - هَيْلَسْمَة المَلْفُوف °

Hylemyia brassicae (S). هي ذبابة الملفوف ، اطليا .

Hylemyia cana (S). هي ذبابة البزلاء ، اطليا .

٣٠٢٥٥ - هَيْلَسْمَة رَصَاعِيَة °

Hylemyia brunescens (S). هي ذبابة القرنفل ، اطليا .

Anthomyidae (S). هَيْلَسْمِيَّات °

عمارة حشرات من فصيلة الذبابيات وريبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها ضارة تؤذي النبات . رابع ذبابيات .

Hylobate (F). هَيْلُوبَات °

هو الجبين ، اطليه .

٣٠٢٥٨ - هَيْلُوت سُدَّاسِي انْخُطُوط °

Melotes sexlineatus (S). Héloé à six lignes (F).

سمكة بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة القرشيات . اعطانها تمتد من الحنك الى اسرالية جسمها شبه وشي الشكل ، مستدل التبطيط ، يطول نحو ١٧ سم . قوبها الى الربة الزرقاء المواج ، تشتت زرقته عند الظهر وتقلص في البطن القضي المواج ويطولها ستة خطوط سود قاطبة تمتد من الرأس الى القنب . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، القسم الاول منها هربي الشكل ، ذرب المناعس ، القسم الثاني حاد المناعس . زعنفتها الذيلية مقعرة || لحها جيد الصفت ، مرغوب فيه .

Hylotrupe (F). هَيْلُوتْرُوب °

هو زعنوق الاعدة ، اطليه .

Hyloides (S). هَيْلُود °

Hyloide (F). Hyloides (E).

جنس صفاد شجرة من فصيلة الكدمايات . انواعها المعروفة قليلة البدن مهدا امريكية الاستوائية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٤ الى ٥ سم . عند الذكور وين ٥ الى ٦ سم . عند الاناث . رؤوسها مستدلة الطول والعرض . عينها مستديرة جاحظة . فكوكها السفلى عادمة الانسان اصابع قواقمها الامامية والخلفية عادمة الخطاب مجوز يطايب محببة تتكلم من تسلق السطوح المائلة || تعيش كامل حياتها التي لا تقل عن عشر سنوات منتقلة من نبات الى نبات وبين شجرة الى شجرة . قوتها الحشرات والاساريع والحوام || الانثى تقرأ ديلها احاديلا ولا تطرحه في الماء بل في المواقع الرطبة تحت النباتات المسطحة وتحت الاوراق وبين الحجارة . صغارها عند التقف لا تغلو من القوام البقية النحيلة ولكنها تتدبر بوجوه الذهب الذي لا ينضم قبل مرور اربعة اسابيع .

٣٠٢٦١ - هَيْلُوفِيَة ثَانِيَة اللُّوْن °

Hytophila bicolora (S). Hylophile bicolora (F).

Hytophila bicolora (E).

حشرة من فصيلة النسيقيات وريبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا . فراشها واسعة

الجنس والنوع من فصيلة القرشيات . منته بعض مناطق
حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه مزينة الباه ،
متنصبة ، قليلة الفروع ، تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه مركبة ، وقرية التجميع ، متناحية النصال . انهاره
صفراء اللون ، زنادية ، مستطيلة المالحق المزينة || ثوريه
ريبي .

Spirillaceae

٣٠٢٦٥ - هَيْتَمِيَّات ٥

نصيلة من البكتيريات تتميز بشكلها الحزوني . خلاياها
وحيدة الاتجاه عمودية الانقسام .

Millepertuis (F).

٣٠٢٦٦ - هَيْتَمِيَّاتِيُون

هو الناذي ، اطليه .

Hypéracées (F).

٣٠٢٦٧ - هَيْتَمِيَّاتِيَّات

نصيلة نباتية جاء وصفها في داذيات .

Protides (F). Procid (E).

٣٠٢٦٨ - هَيْتَمِيَّات

هي الاجسام التي تدخل في تركيب وذف حبيرات الانسجة
الحيوانية والخلايا النباتية . وتقسّم الهيتليات الى :

Protéides (F). Proteid (E).

هيتليات

Protéines (F). Protein (E).

هيتليات

Configuration

٣٠٢٦٩ - هَيْتَة

هي الشكل الخارجي .

قوتها رقيق الانهار . سرقها تعيش على نصل اوراق
الستديان || جسمها معتدل القه يطول نحو ١٥ م . يستطها
نحو ٢٢ م . رأسها يرمي الشكل ، اعطس اللون . عينها
كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشنها اخضر . يعلها الى
الطحلة الغبراء المواج || روشنها الاماميان الى الخفيرة
الجميلة يطوقها حطار ابيض ويملها غطان ابيضان
مترفان يقنجان الصفحة الى ثلاثة انسام شبه متساوية .
روشنها الخلفيان الى الطحلة الغبراء تديق عند الاكر
وتيت عند الاثنى || لها جيل واحد في الجيل . تظهر
الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل .
تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتص المكن لطفاً
مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة
عند بلوغها الكمال تعطي نحو ٣٠ م . جسمها شبه اسطواني
الشكل ، ماس القشار . ثوبا الى الطحلة الخفراء المواج .
رأسها اسود . مدنها وزواجها الى الطحلة الصفراء || طور
الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في الجلالة
او في التربة حيث تنفن السرعة ملتصقة بمجلباب من الطين .

Spirochætes aviaire (F).

٣٠٢٦٢ - هَيْم

هو زهرى الطير ، اطليه .

٣٠٢٦٣ - هَيْمِيَّات شجرة المند (السان) .

Hymenocarpus (S).


٣٠٢٦٤ - هَيْمِيَّاتِيَّاتِيَّات

Hyménocarpe, (F).

ويسمى ايضاً شردس . نبات عشبي برقي حولي وحيد



هيتلية ثالثة اللون



Dressé (F). Erect (E).

٣٠٢٧٥ - وَاكْد

هو الشيء القائم المودي الانتصاب ، يقال قرن وَاكْد وساق وَاكْد .

٣٠٢٧٦ - وَاثْسُونِيَّة ، وَطْشُونِيَّة Watsonia (S). Watsonia (F). Bugle lily, Watsonia (E). Watsonia (D). Watsonia (I).

جنس نباتات معقودة التعريف هل اسم الطبيب البريطاني وَاثْسُون (١٧١٥-١٧٨٧) وهي عشبية دوفسية من فصيلة السوليتات . انزاعها المعروفة نحو ٢٥ مهدا افريقية الجنوبية . سوطها قرصية الانتشاب . اوراقها عصفية النصل . ازهارها جميلة الشكل متعددة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٢٧٧ - وَاثْسُونِيَّة اَرْجَوَانِيَّة

Watsonia coccinea (S). Watsonia ecarlate (F).

نوع من الواتسونية البرية ، شراخها الزهري يملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها عصفية النصل . ازهارها سليل التجميع يمد من ١٥ الى ١٦ زهرة . ازهارها ناشرة القصباب المستنقة ، لوئها الى الارجواني الزاهي || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٢٧٨ - وَاثْسُونِيَّة قَصِيرَة الْوَرَق

Watsonia brevifolia (S). Watsonia à courtes feuilles (F).

نوع من الواتسونية البرية ، شراخها الزهري يملو من ٢٥ الى ٣٥ سم . اوراقها عصفية الشكل قصيرة النصل . ازهارها سليل التجميع يمد من ٨ الى ١٢ زهرة . ازهارها محبنة القصباب القمية الاطراف . لوئها الى البياض الموشع || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

Descendant (F).

٣٠٢٧٠ - وَايْط ، هَايْط

هو نفيس الصاعد . Descendant, Deascending (E).

٣٠٢٧١ - وَايْل

هو المطر الشديد الغشم القطر ، والويل ايضاً .

٣٠٢٧٢ - وَاٲ

Watt

وحدة مقياس قوة التيار الكهربائي .

Xylopie (S).

٣٠٢٧٣ - وَاٲ ، جَوَزَة الشَّرَاك

Xylopie (F).

جنس الشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة القشديات . انواعه المعروفة قليلة، مهدا الخبشة، وقد انتشرت في اكثر المناطق الافريقية . اوراقها متعاقبة ممتدة كاملة ، نصلها جامد الصلصة قصير الزناد . ازهاره ابطية او محورية الانكاز عذبة البتلات البيضاء . ثماره عتية . يزود حريقة السطم فكهة مقوية تستعمل استعمال البهارات . اشهر انواعه وات الخبشة .

٣٠٢٧٤ - وَاٲ الْخَبَشَة * ، فِلْغِل السُّودَان

Xylopie aethiopica (S). Xylopie d'Ethiopie, Poivre d'Ethiopie (F). African pepper tree (E). Athiopischer Pfefferbaum, Mohranpfeffer (D). Pepe d'Ethiopie (I).

نوع من الواٲ الزراعي يكثر في الخبشة وقد تمت زراعته معظم الاقطار الافريقية الحارة . شجرته متوسطة القد . اوراقها متعاقبة ممتدة . نصلها اهليلجي الشكل جامد الصلصة . ازهاره فردية التجميع ، ابطية الانكاز . ثماره عتية مستطيلة تلتف صفاً واحداً من البزور الاجانية الشكل || ثماره وبزود من التوابل المنشطة الشامة الاستعمال .



وات الخبشة

٣٠٢٧٩ - وَأَسْطُولِيَّةٌ كَثِيفَةُ الزَّهْرِ

Watsonia densiflora (S). *Watsonie à épi dense* (F).
نوع من الواسطونية الزيبينية البريوتية . شراخها الزهري
يعلم من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها صفية متصل تطول
من ٤٥ إلى ٦٠ سم . وترى نحو ١٢ م . حناها سيمك
الحاشية تبي اللون . أزهارها سبلي التجميع كثيف الترتيب
يعد من ٤٠ إلى ٥٠ زهرة . أزهارها محجنة القصالب
المستطيلة ، قصيرة البلات ، لونها إلى الوردي ومنها
فروب يفس || تنورها يستمر من أواسط أيار إلى
أواسط حزيران .

٣٠٢٨٠ - وَأَسْطُولِيَّةٌ مَرِيَالِيَّةٌ

Watsonia meriana (S). *Watsonie mérianie* (F).
نوع من الواسطونية البريوتية . شراخها الزهري يعلم من
٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها سبيلة الشكل ترض نحو ٣ م .
أزهارها سبلي التجميع ، رمل الترتيب ، يعد من ١٢ إلى
٣٠ زهرة . أزهارها محجنة القصالب مستطيلة البلات . لونها
إلى البياض الناصع ومنها فروب وردية وموهجة || تنورها
يستمر طوال شهر أيار .

٣٠٢٨١ - وَأَسْطُولِيَّةٌ مُنْتَصِبَةٌ الزَّهْرِ

Watsonia strictiflora (S). *Watsonie à fleurs dressées* (F).
نوع من الواسطونية الزيبينية . شراخها الزهري يعلم من
٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها صفية متصل المستط . أزهارها
سبلي التجميع يعد من ١٢ إلى ١٨ زهرة . أزهارها مستقيمة
القصالب المنحصة التي تطول نحو ٤ سم . بتلاتها مستدلة لقد
جواء اللون تتوسط كل منها نجمة بتنجسية اللون قرمزية
المزاج || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٢٨٢ - وَأَسْطُولِيَّةٌ وَدِيَّةٌ

Watsonia rosea (S). *Watsonie rose* (F).
نوع من الواسطونية الزيبينية البريوتية . شراخها الزهري
متشعب الفروع يعلم من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقها
صفية متصل . أزهارها محجنة القصالب . قصالب وبتلاتها
متساوية في الطول ، لونها إلى الوردي الأزلي || تنورها
يستمر من تموز إلى أيلول .

٣٠٢٨٣ - وَالِينُ

Alizé (F). *Trade-winds* (E).
اسم يطلق على الرياح السائدة المختطة التي تهب بين دارتي
الانقلاب من الشرق إلى الغرب . وهما وإتان ، وأثن الشال
الذي يهب من الشمال الشرقي ويجه نحو الجنوب الغربي
ووائ الجنوب الذي يهب من الجنوب الشرقي ويجه نحو
الشمال الغربي . والوائ تستعمل أيضاً بمعنى الصفة أو
التمت .

٣٠٢٨٤ - وَالِجُ

Zoophage (F). *Zoophagous* (E).
الوالج ويدعى اللام - كان قوله اللحم سنواناً كان أم
دوية أم سفرة .

٣٠٢٨٥ - وَاجِبٌ

Débet (F). *Debit* (E).
هو ما يلزم دمه بعد الحامية .

٣٠٢٨٦ - وَاجِبُ الْأَدَامِ

Exigible (F).
هو ما كانت المطالبة به ممكنة .

٣٠٢٨٧ - وَاحِجٌ

Oasis
بقعة خضراء نظرة تفر لها الماء ومصب التربة في وسط
صحراء قاحلة .

٣٠٢٨٨ - وَاحِيفٌ

جناح كثير الريش .

٣٠٢٨٩ - وَاحِلٌ

Limicole (F).
تمت تعريفه يطلق على الديدان والحويوانات الدنيا الشاملة
التي تعيش في الطين والأوساخ .

٣٠٢٩٠ - وَارِثٌ

Héritier, Hoir (F). *Heir* (E).
هو أحد اقرباء الميت اللذين يحق لهم شراً أخذ نصيب
معيّن من تركته .

٣٠٢٩١ - وَارِشٌ

Hétérotrophe (F).
Heterotroph (E).
هو كل نبات يعيش طفلياً على المواد الغذائية التي يحورها
وعطها النبات الشاح .

٣٠٢٩٢ - وَارِفٌ

Verdoyant (F). *Verdant* (E).
ورف النبات : نسر واهزّ فهو وارِف أي ملجّج أو
ناصر .

٣٠٢٩٣ - وَارِقٌ

Frondicole (F).
الوارق ما كانت حياته مشبعة من الورقة أو أنه يعيش
عليها .

٣٠٢٩٤ - وَارِجٌ

Chien de berge (F).
Shepherd's dog (E).
الوارج هو كلب الراعي لانه يرعّ الوش من الثمن .

٣٠٢٩٥ - وَاشِعٌ ، وَاشِعَةٌ

Fioricole (F).
هي الجاشعة ، الحشرة التي تعيش على الأزهار .

٣٠٢٩٦ - وَاشِعٌ

Anthophage (F).
Anthophagus (E).
من يعيش على الأزهار ومنها ، راجع جامس .

٣٠٢٩٧ - وَاشِلٌ

Cryptandre (F).
لمت تعريفه يطلق على كل ذكر من الحيوان طلاس
أشوار الشقي .

٣٠٢٩٨ - وَأَسْطُولِيَّةٌ

Wachendorfia (S).
Wachendorfia (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المهادريات .
انواعها المعروفة أربعة . مهدها منطقة رأس الرجاء الصالح
في اطراف افريقية الجنوبية || جميعها تزيبينية . أوراقها
لأظفة ، كبيرة ، مستطيلة اتصال الحفدة المدببة الاطراف .
شراخها الزهرية تنتهي بمجموعات من الأبرار سبيلة
الترتيب . أزهارها سداسية البلات ، مستحبة الدرف
ألحافت ، حيلة الألوان الزاهية .

٣٠٢٩٩ - وَأَسْطُولِيَّةٌ

Washingtonia, *Pritchardia* (S). *Washingtonie*, *Pritchardie* (F).
جنس اشجار زيبينة من فصيلة النخلات معقودة التصريف
على اسم واشنطن رئيس الولايات المتحدة || انواعها



واشدرية



واشطنوية

٣٠٣٠٧ - وَاقِ الشَّجَرِ* ، هُرَابُ اللَّيْلِ

Nycticorax nycticorax (S). Bihoreau, Héron bihoreau (F). Night heron (E).

طائر من البشريات ، جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٦ سم. ثوبه متباين الألوان ، أسود الرأس والرق ، أخضر الظهر ، أخضر الصبر والذنب . يعمل على رأسه بعض الريش الطويل الشديد البياض .

٣٠٣٠٨ - وَاقٌ صَغِيرٌ* ، مِلْبَحِيَّةٌ

Ixobrychus minutus (S). Blongios nain (F). Little bittern (E).

طائر من البشريات ، جسمه صغير القد يطول نحو ٣٧ سم. ثوبه متراكب الألوان ، ظهره اسمر يلعب بالأخضر ، بطنه الى الصهبة ، باطن جناحه أبيض ، متفارع أصفر الجسم اسمر المثنى . ساقاه الى الخضار البحري .

٣٠٣٠٩ - وَاقِيَّةٌ

Événement (F).

الواقعة هي الحادث ، اطلبه .

٣٠٣١٠ - وَاقِلٌ

Balaena japonica (S).

Baleine du Japon (F). Whale of the Japan (E).

نوع من البال ، موطنه شمال المحيط الهادي وقد شوهد قرب كاليفورنيا وجزر ألوشيا . جسمه كبير القد ، رمعي الشكل ، يطول من ١٤ الى ١٨ م . ثوبه نفي اللون ، رصاصي الموج ، يميح مع اقترابه من ثوب الخضر ويغير عند البطن . انشاء تقعج جرواً واحداً رضعه نحو الحول .

٣٠٣١١ - وَاقِيَّةٌ

Talles (F). Suckers (E).

الواقية هي فراخ الزرع الناتجة من الاشطاء ، راجع شطه واشطاء .

٣٠٣١٢ - وَالْبَرِيَانُ آخَرُ

Valériane rouge (F).

هو الوشمة الحمراء ، اطلها .

٣٠٣١٣ - وَاقِمٌ

Sarre (F).

هو المصري ، اطلبه .

٣٠٣١٤ - وَاقِكٌ

الواقك والواقن : نمت تمريني يطلق على كل طائر حاضن .

٣٠٣١٥ - وَاقِيْفٌ

Verdoyant (F). Verdant (E).

النباتات الواظفة المهتزة من كثرة الأوراق الخضراء .

٣٠٣١٦ - وَاقِيَّاتُ الْمَتَاظِيرِ

Lévirostras (F).

Levirostrata (E).

مرتبة من الطيور الجوارث التي تتميز بصفتها متناظرة الكبيرة . فصائلها واجناسها عديدة . اشتهر فصائلها الخضاريات والشرقيات والاركوبيات .

٣٠٣١٧ - وَاقِيٌّ

Chacal (F).

هو ابن آوى ، اطلبه .

٣٠٣١٨ - وَتَاءٌ ، مَوْتَانٌ

Epidémie, Epiphytie, Epizootie (F). Epidemic, Epizooty (E).

كل مرض شديد العدوى سريع الانتشار يصيب الانسان او الحيوان او النبات وينتقل من مكان الى مكان ومن

المعرفة حمة جميعها اسطوانية السوق الليفية المائلة المنتصبة . اوراقها مروحية الشكل جميلة الخضار الفسقي ، كرهها مستطيل العمود دقيق شالك ، شوكة صدر القد محسن . ازهارها عكولي التجميع ، كبير القد ، كثير التشعب . ازهارها خشوية التركيب . ثمارها ثنوية جامدة اللب الماد المائلة . يزورها خشية صلبة لا تصلح لني || مهدها كاليفورني وجزر الايتيانوس الهادي . اشتهر انواعها ، الواشطونية القوية والواشطونية الليفانية .

٣٠٣١٠ - وَاشْطُوتِيَّةٌ قَوِيَّةٌ

Washingtonia robusta (S). Washingtonie robusta (F).

نوع من الواشطونية . جلدها عمودي الانتصاب ، غليظ القاعدة ، مستقيم الطرف ، يطول من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقها دنيئة مروحية قطرها نحو ٢٠٠ سم. ثوبها الى الخضار الفسقي الانس الموزج . كرهها شديد الخضار يطول نحو ١٠٠ سم. شوكة اصفر اللون صغير القد شديد التجميع || مهدها شواطئ نهر سكومتو في كاليفورنيا . تعيش ويحميها ايها زيمت شرط ان لا تنخفض الحرارة من ست درجات ستفتردا وان يمين لها الري الوافي عند الحاجة .

٣٠٣١١ - وَاشْطُوتِيَّةٌ لَيْفَانِيَّةٌ

Washingtonia filifera, Pritchardia filifera (S). Washingtonie filamenteuse (F).

نوع من الواشطونية . جلدها اسطوانى مستقيم يرتفع من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها دنيئة مروحية قطرها نحو ١٥٠ سم. ثوبها الى الخضار الفسقي الزاهي ويلوحها خيوط ليفية شقراء اللون تشبه الشعر . كرهها دقيق متين شالك طوله نحو المتر || مهدها كاليفورني ، تحصل الحرارة المنخفضة حتى الست درجات ولا تقشع العطش . تعيش في جميع الاربية لكنها تفضل الخوازة حيث تجود وتمتد بسرعة .

٣٠٣١٢ - وَاقِسٌ

Pathogène (F). Pathogen (E).

كل متعض او كائن حي يسبب مرضاً ما .

٣٠٣١٣ - وَاقِدَةٌ

Grippe (F). Influenza (E).

هي الانفلونزا ، مرض معد يصيب الحيوان ولا سيما الخيل .

٣٠٣١٤ - وَاقِيٌّ

Préventif (F). Preventive (E).

٣٠٣١٥ - وَاقِيٌّ*

Botaurus stellaris (S).

Butor étoilé (F). Bittern, Common bittern (E).

طائر من فصيلة البشريات ، طويل العنق والمنقار والرجلين والاذنار ، قصير الزنكي ، اصفر الريش المرقش الموشح . يجب الزولة فيختفي في النهار بين الاصل ويكثر الصباح في الليل . قال الشاعر مرقش السدوسي :

ولقد حدثت وكنت لا اعلم على واق رحام
فاذا الايام كالآيا من واليا من كالأفام
وكذلك لا خير ولا شر على احد بدائم

٣٠٣١٦ - وَاقِيٌّ أَبْيَضٌ ، سَيْبِيَّةٌ

Ardeola ralloides (S). Héron crabier (F). Boattbill (E).

طائر من البشريات ، صغير القد طوله نحو ٤٢ سم. ثوبه الى البياض الاخير يعمل على رأسه طرة من الريش المستطيل النقي الأبيض والاسود . متفارع الى الزرق ، اسود المثنى والقاعدة .



واق



واق الشجر



واق صغير

٣٠٣٣١ - وبيلة ٥ Calonectria (S).

جنس فطور مجهرية من الساعيات وفضيلة الشبوات .
أصنافها غشبية ، بحبة السطح ، مرجانية اللون ، تتركز
على رقيقة ناعمة . كانتها صفة الشكل . وبها عديد
الحلابة البثرية الانقسام المتوالي || أنواعها المؤذية قليلة
أعرقها وبلة الزرع .

٣٠٣٣٢ - وبيلة الزرع ٥

Calonectria graminicola, C. nivalis, Fusarium nivale, F. miniutulum, F. loliae (S). Moisissure nivale des céréales, Fusariose des céréales (F). Snow mould of cereals (E). Schneeschimmel (D).

فطر مجهرى يركب الزرع وأصعبها الشيلم والحلطة والشربان
وبعض التجيليات البرية || مظهره الخارجي يكن على
شكلين : الأول عندما يصيب الزرع في أبان حبه فيقبلو
ككتلة من القطن المنفوش تلتصق بنواي الزرع ويصفه
كالخلقة || والشكل الثاني عندما يصيب الزرع بعد حبه
فيولد ذلك لمطعا خلية لا يقاسي الشكل والحجم ، لونها
الى التبرة تملو الصف والاحمار والسلايات || أعراضه
منطقة مبطونة التربة والعوامل الجوية الملائمة || يكافح
بتطهير البذار بواسطة احد الفطامير الناجمة ومنها املاح
الذئبق .

٣٠٣٣٣ - وبيرة ٥ Phacelia (S).

Phacelia (F), Phacelia (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « حنة » . جنس نباتات
عشبية ، حولية او محولة من فصيلة التيجيات . أنواعها
المعروفة عديدة منها المناطق الحارة من الملائن القديم
والجديد || بعض أنواعها الحولية مرغوبة لزراعة للاختبار
والانعام . سوقها خلية الصفاء ، فراء . أوراقها متعاقبة ،
ريشية . أزهارها سبلي التجميع . أزهارها رقيقة يحمرها
النمل وبها زرقاء اللون او بتسفيج او ليلكية او بيضاء ||
اشهر أنواعها التالية .

٣٠٣٣٤ - وبيرة جرسية ٥

Phacelia campanularia (S), Phacelia campanulée (F).

نوع من الويرة الزرقية . عشية حولية تملو من ١٥ الى
٣٥ سم . أوراقها اعليجية الشكل مغرفة وسطية . أزهارها
بيضاء اللون . توجعها مقعرة الشكل جرسية الشكل ، لونها الى
الزرق المايقة يطولها عند قواعدها خمس نقط سود ||
تنويرها يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٣٣٥ - وبيرة ليدك ٥ Phacelia congesta (S).

Phacelia dense (F).

نوع من الويرة الزرقية . عشية حولية تملو من ٣٥ الى
٥٥ سم . ساقها وفروعها مزينة الفراء . أوراقها ثلاثية
او خاسية او سباعية التفرع القوي . أزهارها كبيرة القند
قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الزرق المائلة . توجعها خلية
البشرة ، فصلها سنانية الشكل . اسديتها قليلة النشور ||
تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٠٣٣٦ - وبيرة لرجة ٥ Phacelia viscida (S).

Phacelia visqueuse (F).

نوع من الويرة . عشية حولية تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
أوراقها شبه قلبية الشكل ، طولها نحو ٦ سم . نساها
لزينة ، مسننة الحثار . أزهارها مستدة الحبر ، قطرها
نحو ٣ سم . لونها الى الزرق تتصلها بقبة ابروانية ||
تنويرها يستمر من تموز الى آب .

منطقة جغرافية الى اخرى . وهو بذلك يتبع من الامراض
المعدية التي لا تقتل من منطقة جغرافية الى اخرى .

٣٠٣٣٩ - وباء مؤضيء ٥ Enzootia (F), Enzooty (E).

هو الوباء المحدد الانتشار الذي لا يتجاوز المزرعة او
المنطقة الجغرافية .

٣٠٣٤٠ - وباء ٥ Epidémiologie (F).

Epidemiology (E).

الوباء علم يبحث في مائة الامراض الوبائية وفي اسبابها .

٣٠٣٤١ - وبات ٥ Adaptation

من وبات بالمكان : اقام . الوبات هو الالاء الموق
الناجم .

٣٠٣٤٢ - وبك ٥ Tridax (S), Tridace (F).

مجلسة عشية حولية برية من فصيلة المركبات . ساقها
مزينة الفروع تملو نحو ٩٠ سم . أوراقها متعاقبة مقلبة
انفصوص المدية الشائكة . أزهارها كثيف التجميع .
رؤسها الزهرية صفراء اللون ، شائكة السينات المقلبة
الحسك . بزورها ريشية التهذيب . تنويرها يستمر طوال
شهر حزيران .

٣٠٣٤٣ - وباط ٥ Rabourissement (F).

Stunted (E).

هي حالة كل حيوان او نبات شذ يبعثته وقلة نموه عن
معدل نموه || أما الحيوان او النبات الذي يشذ يصغر
جسمه عن معدل نموه فهو اضعف ويهي زباه .

٣٠٣٤٤ - وبك ٥ Disproportion

الوبد هو نقص الجسموري الغائب ، ج اوباد .

٣٠٣٤٥ - وبير ٥

هو الزلم ، حيوان من السمانيات ، اطلبه .

٣٠٣٤٦ - وبير ٥ Poil, Duvet (F), Hair, Down (E).

الوبر هو للابل وللالة والالان وبها كالصوف القتم .
وهو احدى خامات النسيج المشهورة يستخدم في صنع
للمنسوجات المختلفة ويصور اهركات التي تبرز فرطية .

٣٠٣٤٧ - وبير ٥ Cathcartia villosa (S).

Cathcartia velue (F).

نبات عشبي حولي بري وزرعي من فصيلة الحشاشيات .
ساقها فراء كثيفة الزغب المستطيل تملو نحو ٣٠ سم .
أوراقها بيضية الشكل مستعرجة . نصلها عشن الصلعة ،
خلى البشرة ، مهدب الاطراف . زغبها واعذابا جزوية
اللون . أزهارها ناجية فردية كبيرة القند ، قطرها نحو ٥ سم .
لونها الى الصفر الكبري الزاهي || تنويرها يستمر
طوال شهر حزيران .

٣٠٣٤٨ - وبيري ، زغب ٥ Tomentaux (F).

Tomentous, Downy (E).

نعت تعريفي يطلق على اجزاء النبات والحيوان المغطاة
وبر قصير نام .

٣٠٣٤٩ - وبس ٥ وبس الجرو : قنع عليه .

٣٠٣٥٠ - وبك ٥ Rut, Chaleurs (F), Rut, Heat (E).

طلب الضان او بالاعرى التاج للصفاد .

مفتول، أما إذا انبسط ليدس الصفاق كما في عضلات الظهر. أما وظيفته فهي التوسط بين أطراف العظام والمضلات أو بين المضلات نفسها.

٣٠٣٤٧ - **وَتْر** (F). Impair (F), Odd, Uneven (E).
الوتر ما لم يتقلف من العدد.

٣٠٣٤٨ - **وَتْر التماس** (F). Corde de contact (F).

٣٠٣٤٩ - **وَتْر الزوكية القليصة** (F). Hypoténuse (F).
Hypotenuse (E).

٣٠٣٥٠ - **وَتْرِيَة ، فَرْدِيَة** (F). Imparité (F).
Imparity (E).
كون الشيء غساً أو فرداً.

٣٠٣٥١ - **وَتْرِيَة التركيب** (F). Imparipennée (F).
نعت وسمي يطلق على الأوراق المركبة المنتهية بورقة فردية واحدة.

٣٠٣٥٢ - **وَتْر** (F). Waltzia (S). Waltzie (F).
جنس نباتات حولية برية وتربيتية من فصيلة المركبات. أنواعه المعروفة نحو ١٢ شكلها شكل السرخس. سويها فرعاه. أوراقها متعاقبة جامدة النصل. أزهارها رؤسية. بزورها مجزأة بامتداد متقادي الشكل || أحرف أنواعه وأشهرها ما يلي.

٣٠٣٥٣ - **وَتْرَة بَيْضَاء** (S). Waltzia nivea (S).
Waltzie blanche (F).

نوع من الوتر. عشبه تملو نحو ٥٠ سم. رؤسيها الزهرية كثيرة العدد. أزهارها إلى الصغار الكبريتي، قناباتها مدببة الأطراف || بيضاء اللون || تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٣٥٤ - **وَتْرَة عَشْكَرِيَة** (S). Waltzia corymbosa (S). Waltzie en corymbe (F).

نوع من الوتر، عشبه تملو نحو ٦٠ سم. أزهارها عشكورية التجميع، لبه الترتيب. رؤسيها الزهرية كثيرة العدد. أزهارها وريدية اللون قناباتها مستطيلة لسة بيضاء اللون. تنورها يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٣٥٥ - **وَتْرَة مُدْهَبَة** (S). Waltzia aurea (S).
Waltzie dorée (F).

نوع من الوتر، عشبه تملو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. أزهارها عشكورية التجميع، على الترتيب المتتابع. رؤسيها الزهرية كبيرة القليلة العدد. أزهارها وقناباتها ذهبية اللون || تنورها يستمر من آب إلى أيلول.

٣٠٣٥٦ - **وَتْلُوف** (S). Cichorium intybus (S).

Witloof, Chicorée à grosse racine (F). Witloof (E).
نوع من المهنداه الزراعية الخنزارية. وهي بقلة مأكولة الجذر والأوراق تكثر زراعتها في البلاد الأوروبية. ترطب في الأرضية الحارة المتوسطة الانسجام الفنية بالمواد العضوية. زراعتها تتطلب بعض العناية أخصها طعم الأوراق عند ازدياد الإبرمة الأولى منها || أما الوتلول فهو يحوي ما قدره :

من الماء	٩٣,٠٠ ٪
من المواد الأزوتية	١,٢٢ ٪
من المواد الدهنية	٠,٤٧ ٪
من المواد المستخلصة	٥,٣١ ٪

٣٠٣٥٧ - **وَبِيرَة مُهْدَبَة** (S). Phacelia purshii (S).
Phacelia frangée (F).

نوع من الوبرية. عشبة حولية تملو من ٢٥ إلى ٥٠ سم. أوراقها السفلى مدقة طول نحو ١٠ سم. وتتسم إلى ١٥ سكة. أوراقها العليا لاطئة، خاسية السك. أزهارها صغيرة القليلة قطرها نحو ١٥ سم. لونها يراوح بين الأزرق والبيكي. تلق توجيهاً مهدبة الأطراف || تنورها يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠٣٢٨ - **وَبِيلَة ، وَبِيل** (F). Fagot (F). Faggot (E).
سزنة الخطب الدقيق الميدان.

٣٠٣٢٩ - **وَت** (F). Cri du palombe (F).
الوت والوت : صياح الورشان.

٣٠٣٤٠ - **وَتَح ، كَبَشُونَة** (S). Capnodium (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الترحيات. أنواعه عديدة، منتشرة في معظم انظار العالم، تركب الحشويات والريثون والصمغيات والسنديان الخ... أعصابها مكررة ترتكز على أمن دقيقة تنشب في وثبات المشج. أبعادها الزقية مؤنثة التركيب قتيبة الشكل سمراء اللون || وهو ركب حلأ السرق والأضغان ويشرة الاقنان ولا يعترى الأوراق. منظره الخاصي وشاح كالصمام لا قياس الكثافة والسك، لزج للمس، اسمر اللون.

٣٠٣٤١ - **وَتَح المَهِلُون** (S). Zopfia rhtzophila (S).
فطر مجهرى يدى من الترحيات ركب جهور المهلون والسفدر فيؤخذها وقد يقضي عليها. أعصابه سيد كروية الشكل. زته يعنى مدبب الرأس والمغلب، مشعود الوسط يحسن ٨ أبواغ ثنائية البويضات المائلة.

٣٠٣٤٢ - **وَتَحِيَّات** (S). Capnodiaceae, Perisporiaceae (S). Périssporiacées, Capnodiaceae (F). Perisporiaceae, Capnodiaceae (E).
فصيلة فطور مجهرية تنسب إلى رتبة الزقيات. ألقاها محصورة متراكبة منفلقة سمراء اللون. يوهها يتحمر عند نضج الإنسان، من مرق رأسى لا نظاي الانشقاق وهو كثير العدد أسطواني الشكل أو يشبهه، غيراته لا قياسه العدد || اجناسها وأنواعها كثيرة أما التي تركب النبات وتطفل عليه فقليلة أشهرها الترح والشان.

٣٠٣٤٣ - **وَتَدَة** (F). Pilot (F). Pile, Stake (E).
عمود من عشب متوسط الالفة والطول يستعمل للرز في الملتح.

٣٠٣٤٤ - **وَتَدَة** (F). Tragus
هنة مثلفة الزوايا مركزها عند فوطة صمخ الأذن.

٣٠٣٤٥ - **وَتَر** (F). Chord (E).
جسم محيطي مرن يستعمل في بعض الآلات الموسيقية المعروفة بالآلات الوترية. تصنع الآلات عادة من أمعاء بعض الحيوانات ومن اسلاك معدنية. ويجب أن يكون الوتر منسوب الغداء والكثافة في كامل طوله.

٣٠٣٤٦ - **وَتَر** (F). Tendon (F). Tendón, Sinew (E).
الوتر صغيرة من الالياف تتكون من الحبيبات العضلية التي لم تتحول نهائياً إلى نسيج عضلي. وهو عادة مستدير



وتح المهلون



وتلوف



ونيش



ونفا



وثير

٣٠٣٧١ - وكلة * Ampullacera (S).

Ampullacera (F). Ampullacera (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الابريل .
انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من صنف زيلنغا الجديدة ||
تألف الخلدجان حيث تكثر التنبؤات البحرية التي تعيش
عليها || اصداؤها شبه اجاصية الثورن ، متباينة الحجم ،
كبيرة القوية ، ملونة ، يكثر فيها الجلوي والكتشي
المتالي الموج || جعلها مأكولة ، مرغوبة فيه .

٣٠٣٧٢ - وتكل Structure
الزكل هو البنية ، راجعها .٣٠٣٧٣ - وتكل Sélectionner (F). To improve (E).
وتكل الحيوان والنبات : أصله ويمكن فيه مبادئ الاستنخاب .٣٠٣٧٤ - وتكن Parenchyme (F). Parenchyma (E).
هي نسيج الاختفاء والخضيب في نصل الورقة من كل
نبات .

٣٠٣٧٥ - وكيم ، وكيم المكتنز لحماً من المواشي .

٣٠٣٧٦ - وكير * ، غططارية Gautheria (S).
Gauthérie (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الخنجيات . انواعه عديدة ،
مهدجا بلاد الشرق وأمريكا . معظمها جنبات صغيرة القند
متنوعة . اوراقها متناحية ، بيضيه ، حررة . ازهارها كروية
الشكل . ثمارها لحية ، مأكولة ، حبة القالب والتركيب ،
خلسية الخلود || أشهر انواعها ما يتبع .

٣٠٣٧٧ - وكير شلون Gautheria shallon (S).
Gauthéria Shallon (F).

نوع من الوثير وهو جنبية متصبغة قراء تعلم نحو ١٠٠٠م .
اوراقها كبيرة القند تطول من ٨ الى ١٠ سم . نصلها جلدي
الصفحة سنن الخمار . ازهارها عقنوي التجميع ، تاجي
الارتكاز . ازهارها صغيرة القند يضاء اللون أو وردية .
ثمارها ال صمرة الزرقاء الموج . كمايرها مأكولة .
تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٣٧٨ - وكير مدأد ، غططارية كندية ، عيب Gautheria procumbens (S).
القبط

Gauthérie couchée, Thé de Terre-Neuve, Thé
de montagne (F). Checker berry, Winter-green
(E). Canadischer Tee, Wintergrün (D). Tê di
Terranova, Tê del Brasile (I).

نوع من الوثير وهو نبات عارض مداد . اوراقه تلوح
سم . وتعرض نحو ٣ ، نصلها جلدي الصفحة سنن
الخمار . ازهارها فردية الترتيب ، ابطية الارتكاز ، نوباً الى
اللباس المشمش بالورد . اوراقه تشتمل امتثال الشاي
لانها عطرية الرائحة ولا تخلو من بعض المنافع الصحية وقد
يستخرج منها صنف « النطازن » || تنورها يستمر طوال
فصل الصيف .

٣٠٣٧٩ - وكير ونشي Gautheria vitchiana (S).
Gauthérie de Veitch (F).

نوع من الوثير وهو جنبية متصبغة قراء تعلم نحو ١٠٠٠م .
اوراقها اهلجية مدينة القاعدة تطول نحو ٨ سم . نصلها
جامد الصفحة ، سنن الخمار ، حلي التسين ، حلي المروق .
ازهارها عقنوي التجميع . ازهارها يضاء اللون ،
صغيرة القند ، ثمارها حنطية اللون يرتقالية الموج . كمايرها
لحية مأكولة || تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٣٨٠ - وتلمي Autocthone (F).

Autocthonous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل من كان مقيماً في وطن اسلافه .

٣٠٣٨١ - وتكن وزن الماء : دام ولم ينتفع .

٣٠٣٨٢ - وتكن الوتن هو بروز الخلود عند الولادة في وضع خاص
يختلف من الوضع الطبيعي .

٣٠٣٨٣ - وكينسة Més (F). Meatus (E).

الفجوة بين خلايا النسيج النباتية . ج وقع وثقالح .

٣٠٣٨٤ - وكيندة Pal, Pleu (F). Pale, Stake (E).

ما رز في الأرض أو الحائط من خشب .

٣٠٣٨٥ - وكير Rosier blanc (F).

هو الوردة الابيض ، اطليه .

٣٠٣٨٦ - وكيركة Décade (F). Decada (E).

اسم لعقد الطرة .

٣٠٣٨٧ - وتينسة * Mycetopus (S).

Mycétope (F). Mycetopus (E).
جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيفحات الخلدجان
وفصيلة التبادات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها
من صنف انهر وبحيرات امريكا الجنوبية || اصداؤها شبه
بيضية الشكل ، زغبية التعلديد ، تطول من ٦ الى ١٢ سم .
وهي متساوية المصاريع ، لاتساوية الاصلح . تتميز
بامتلاطلة الابريل المنجية بلقراض كتنكاف الطغور تنشب
في صخور الجبرات والانهرو وفي الحصى ايضا || تعيش
جمجموات كبيرة العدد . لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف .

٣٠٣٨٨ - وتكاجكة كثرة اللحم .

٣٠٣٨٩ - وتكاركة كثرة الشحم .

٣٠٣٩٠ - وتلقية هي الياس ، اطليه .

٣٠٣٩١ - وتلكة Tectologia (F). Tectology (E).

الوثالة البحث الشوزي الصرف للهيكلية الضوية .

٣٠٣٩٢ - وتلكة Colladonia (S).

Colladonia (F). Colladonia (E).
جنس نباتات حشوية معمرة برية من فصيلة الخنجيات .
انواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة || سفلها قراء متقاربة الارتفاع .
اوراقها متناحية ، لايابسية الشكل ، منها الرجمة المستطيلة
والقلبية والمقصصة والريشية . ازهارها صوبلي التجميع ،
طرني الارتكاز . ازهارها صفراء اللون . أشهر انواعها :

٣٠٣٩٣ - وثامة صغيرة الثمر M. microcarpa (S).

٣٠٣٩٤ - وثامة مجنحة M. alata (S).

٣٠٣٩٥ - وثامة مشرمة M. crenata (S).

٣٠٣٩٦ - وكثر الور : الذي خلا من الحويثات النوية .

٣٠٣٩٦ - **وَجِين** الوجين هو شط الوادي المزروع .

٣٠٣٩٧ - **وَحَاف** Banc (F). Layer bed (E).

هو الطبقة من الرمل أو الساف من الصخر أو الوصيف من المرجان الخ...

٣٠٣٩٨ - **وَحَال** Terrivome (F).

الرحال قاذف الرمل أو التراب . بركان وحال .

٣٠٣٩٩ - **وَحْدَانِي** Sporadique (F). Sporadic (E).

هو من النبات من ألف النيش منفرداً .

٣٠٤٠٠ - **وَحْدَة** United (F). Unity, Unit (E).

اصطلاح يستخدم في العلوم الطبيعية أساساً لقياس . في النظام الفرنسي لمقاييس الأطوال والمساحات والاحجام ، يعتبر المتر والمتر المربع والمكعب وحدة هذه المقاييس وينجزها ومضاعفاته اشتقت المقاييس الأخرى . وفي الأوزان يعتبر الغرام وأجزاؤه ومضاعفاته وحدة القياس . وفي النظام الانكليزي يعتبر البرد وحدة لقياس الأطوال والمساحات والاحجام ، والباوند وحدة الأوزان || وفي الهندسة تعتبر الدرجة وحدة القياس وهي الزاوية الناتجة من تقسيم الدائرة الى ٣٦٠ قسماً متساوياً || وفي علم الحرارة تعتبر السرة وحدة القياس ويبر عنها بكمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة غرام واحد من الماء النقي من درجة ١٥ الى ١٦ مئوية || وفي الكهرباء يعتبر الأمبير وحدة التيار ويبر الأوم وحدة للمقاومة || وفي الضوء ، وحدة القياس هي الشعة . وفي علم الصوت فحدة القياس هي البرل .

٣٠٤٠١ - **وَحْدَة غِذَائِيَّة** Unité nutritive (F).

هو عنصر الغذاء الرئيسي أو القيمة الغذائية القابلة للتشيل الموجودة في مادة معينة أو شكك مقرر . لذلك نقول ان التشكيم الصحيح يجب ان يركز على محوى العناصر الغذائية وما ينتج عنه من وحدات . راجع جدول الملف .

٣٠٤٠٢ - **وَحْرَة** Nycteria (S). Nyctère (F).

جنس حيوان من فصيلة الحوريات . أنواعه سبعة ، تتميز بتجويف قصبة الأنف وبالزوائد الجلدية التي تملأ حناجر التجويف الأيمن والأيسر || اجسامها صغيرة القد . طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم . بما فيه الذنب الذي يطول من ٣ الى ٤ سم . انسابها الى الصفة الخطية المختلفة المواج ، بطونها زاهية || موطنها افرقية الشرقية والحبيشة والسودان ومصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش . تألف الكهوف والمغاور والبيوت الخربة . تعيش جماعات قليلة العدد . قوتها الحشرات والدوديات والمولوم .

٣٠٤٠٣ - **وَحْرِيَّات** Nycteridae (S).

فصيلة من الخفاشيات مركزها بين الخفاشيات والمأشيات . أنواعها ١١ ينتمي الى جنسين السرة والمطبات || من ميزاتها الخاصة زوائدها المنخرية المركبة وكبر آذانها الزائدة القاعدة الملموسة || انسابها تضع جرراً واحداً تحمله دائماً حتى يلوذه . موطنها افرقية الشرقية ويسلاد الحبيشة .

٣٠٣٨٠ - **وكيرة** Cloison (F).

هي الحاجز الخليوي .

٣٠٣٨١ - **وكيكة ، مَشْتَدَة** Document

هي في القانون التجاري كل معاملة خاصة بالبنائات المسافرة ان صادرة او واردة .

٣٠٣٨٢ - **وكيكة التأمين** Police d'assurance (F).

هي البقد الحرر الذي يثبت العقد التأمين وشروطه .

٣٠٣٨٣ - **وكيكة** Pierre à briquet (F). Flint (E).

حجر القداسة . لا والذي اخبر النار من الويرة .

٣٠٣٨٤ - **وكيكة مُحَدَّدة** Acilius sulcatus (S).

حشرة مائية قانصة من فصيلة المكنوزيات ورثة عذبات الاجنحة . موطنها بعض مناطق البلاد الممتدة الحارة . تألف المتاعق واللدنران . تعيش في الماء . تلتصق كل ما تيسر لها من الحفرات الدنيا والارابي ولا تترك الماء الا في زين الكوم والتمسكة لانها تمتص المكن على الصفحات السفلى من تفال الاوراق التي تلتصق سطح التربة || جسمها شبه بيضي الشكل بطول نحو ١٨ مم . ثوبها الى الخشن الاسمر المواج . ظهراتها مائس الصفحة عند الذكر ، ويقتها عند الانثى || لها جبل واحد في الحول . ويقتها تسمى الى الماء بعد التفت بنحو اربعة ايام وهي قانصة كاشطرة الجملة .

٣٠٣٨٥ - **وَج** هو عيد الوج ، اطلبه .

٣٠٣٨٦ - **وجار** Chenil (F). Dog-Kennel (E).

الويتار . ج. أوبرة ويرير . هو مأوى الكلب ويكون عادة من خشب . في الاصل هو سرب الفصيح والكلب والطلب ونحو ذلك .

٣٠٣٨٧ - **وَجَب** الوجب هو انعقاد البيا في الفرع .

٣٠٣٨٨ - **وَجْبَة** Cure, Fournée (F).

ما يستويجه الخفاف من قلع على دفعة واحدة .

٣٠٣٨٩ - **وَجَر ، وَكْر** Garanne (F). Warren (E).

هو مأوى القواقع .

٣٠٣٩٠ - **وَجَن** Morsine (F).

حضر على طانية جلدية .

٣٠٣٩١ - **وَجْه** Face (F).

٣٠٣٩٢ - **وَجْهِي** Facial (F).

٣٠٣٩٣ - **وَجُوب الأده** Exigibilité (F).

هو ان يصبح الدين واجباً ادائه الى الدائن .

٣٠٣٩٤ - **وَجَّيَات** Acorées (F).

سيط من فصيلة القنقليات .

٣٠٣٩٥ - **وَجِيد** Terrain plat (F). Level ground (E).

ما استوى من الارض . ج. وبيدان .



ويرة عذبة



وسرة

Monopétale (F). **وَحِيد البَتَلَة**
Monopetalous (E).
نعت تعريفي وصفي يدل على التوزيع الوحيد البتلة .

Monorchide (F). **وَحِيد الخَيْصَة**
Monorchid (E).
من الحيوان ما كان ذا خصية واحدة .

Monocellulaire, Unicellulaire (F). **وَحِيد الخَلِيَّة**
Monocellular, Unicellular (E).
مركب من خلية واحدة ، أو ذو خلية واحدة .

Monostomique (F). **وَحِيد اللِّدَوَة**
Monostomic (E).
مركب من خلية واحدة ، أو ذو خلية واحدة .

Uniflore (F). **وَحِيد الزَّهْرَة**
Uniflorous (E).
ذو زهرة واحدة .

Unicaula **وَحِيد السَّاق**

Monandre (F). **وَحِيد السَّدَاة**
Monandrous (E).
من النبات ما كان ذا عضو تدكير واحد .

Monostigmaté (F). **وَحِيد السِّمَة**
Monostigmatic (E).
ذو سيم واحد أو أطولية واحدة .

Unifabré (F). **وَحِيد الشِّفَة**
Unilabiate (E).
ذو شفة واحدة .

Unisexué (F). **وَحِيد الشَّخْص**
Unisexual (E).
ذو أعضاء تناسلية ذكورية أو أنثوية .

Monoploïd **وَحِيد المَعْرَة**
هو كل نبات قوام تركيبه الجاني عترة بسيطة .

Unilobé (F). **وَحِيد الفص**
Unilobate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل لصل ورقة وسيد الفص .

Monosépale (F). **وَحِيد المِصْلَة**
Monosepalous (E).

Monocotylédone (F). **وَحِيد التَّلَكَة**
Monocotyledonous (E).
اسم أو صفة كل نبات من ذوات الفلقة الواحدة .
والنباتات وسيدات الفلقة تولف أحد قسمي مستورات البزور .

Monocéros, Licorne (F). **وَحِيد القَرْن**

Monoceros (E).
كوكبة نجوم جنوبية المنع مركزها بين الكلب الأكبر والكلب الأصغر والجبار والشمس الأثني . وهي تمثل حيوان غرائي له جسم الفرس وبني رأسه قرن واحد ||
نجومها متفاوتة الأشكال والألوان وأقرب عددها ٢١ .

Unipolaire (F). **وَحِيد القُطْب**
Unipolar (E).

Bête sauvage (F). **وَحْش**
Wild animal (E).

Bête féroce (F). **وَحْش فَهَار ، سَبُع**
Carnivorous animal (E).

Férin (F). **وَحْشِيَّة**
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو متصل بالحيوانات الوحشية .

وَحْشِي
الوحشي الجانب الخارجي أو الأيمن من الرقبة ومن كل شيء يقابله الأثني أي الجانب الداخلي أو الأيسر .

Pustule (F). **وَخْمَة**
Pustule, Pimple, Blotch (E).
هي البثرة تركب اللسع الحيوانية والنباتية . ج وصفي .

وَخَف
الوصف : النبات الريان من أي فئة كان .

Terre noire (F). **وَخْمَاء**
Black soil (E).
التربة السوداء وتسمى بالبيجور .

Rocher noir (F). **وَخْمَكَة**
Black rock (E).
هي الصخرة السوداء .

Fange, Boue, Bourbe (F). **وَخِل**
Mud, Mire, Silt (E).

مزيج من الطين وبض المواد العضوية يربس في المنابع وعلى ضفاف مجاري الماء .

Loess **وَخْن ، لُؤْس**
رواسب طينية رملية عادمة الأحماض تغطي بعض الأتربة في مواقع معينة . أما كلمة لوس فن وضع الأمير مصطلق الشهائي .

Chalcopalis atra (S). **وَخْرَح ***
Chalcopalis africana (F).

طائر من الزُّرَّاء . أعطاه تيمت من أفريقية الشرقية إلى البالية || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٠ سم . رأسه إلى الصبهة الرمادية . ظهره وذنبه إلى السمرة الكستانية المورج . أنفكه أسود . جشته أحر . يعلو إلى البياض الأفيج . جناحه إلى السمرة السوداء . حلقة عينه كالقنوت . منقاده أسود . ويحلاه إلى الجوزة || ملجته الحياتي جمالي . سره يمد عطران الأزواج . يأنف البياض وضفاف مجاري الماء . قوته البزور وألحوب ||
يدلن حش في الأبدال الاليفة . الأثني تضع من يبعثن إلى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

Monocarpien (F). **وَحِيد الإِزْهَرَاك**
Monocarpous (E).

نعت تعريفي يوصف به النبات الذي يزهر ويثمر مرة واحدة .

Monobasique (F). **وَحِيد الأسَّاس**
Monobasic (E).



وَحْش

انواعها المعروفة نحو ١٥ اعطائها تمتد من الجزيرة العربية الى اوروبا الجنوبية وافريقية الشمالية || تأثت الرمال والفياني . قوتها اللباب والهرام والحشرات والديدان || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، رشيقة ، تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . انواطها بلون الرمال وقد تماثل البيئة التي تعيش فيها .

Osmia (S).

* ٣٠٤٤٩ - ونعاش *

Osmie (F). Osmia (E).

جنس حشرات جارية من الحمويات غشائيات الاجنحة وفصيلة المشطليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة والمنخفضة نحو البادية || اجسامها صغيرة ، قريبة الشبه من النحل ، تطول نحو ١٥ سم . انواطها قائمة تكثر فيها السمرة السوداء المواج والسمرة السفاد . قشورها كثيف الحلب اللينق الناعم اشعث اللون او اخضر || ملجئها الحياتي انزالي . تشيد عشوائها في جلود الاشجار النخرة وفي حيطان الخراب . قوتها رقيق الازهار واللعل وما تجتمع من حسل في تخاريجها المسددة الاصلع . الواحدة ورشاة .

Cerceris (S).

* ٣٠٤٥٠ - ونعاش *

Cerceris (F). Cerceris (E).

جنس حشرات قانصة وانجمه ناعمة من الحمويات غشائيات الاجنحة المصورة وفصيلة الاقليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها متوسطة القد معتدلة الحيات . انواطها ملونة يكثر فيها الاسود المجلع بالاصفر والاسود المجلع بالابخر || تصفر في المواقع الرملية . اصغافها رداء فضية متراكبة اخلايا المحجورة المتفصلة || قوتها بعض غدييات الاجنحة اغصها السوس والرقنوتس تقتنصها فتخندرها وتقلها الى اصغافها زادا لها وليرقاتها .

Fluctuation

٣٠٤٥١ - ونخط *

حالة علم الاستقرار الشوزي التي تتعرض لها الحنن في طور استنساخها .

٣٠٤٥٢ - ونحف ، ونحفيف ، نلغ

Macération (F). Maceration (E).

مرث التي . بالماء لاستخلاص مواده .

Ochina (S). Ochine (F).

* ٣٠٤٥٣ - ونخنة *

جنس حشرات غشائية من فصيلة الغفريات . انواعها قليلة جميعها صغيرة القد طويلا براوح من ٧ الى ٤ سم . انواطها غشائية اللون يملوها تجلجيع اسود || رقاتها حمة تركب لطاء وشكير مختلف النياتات المتسلقة العارضة احصها للابلاب .

Sphaerostilbe (S).

* ٣٠٤٥٤ - ونشيش *

جنس فطور مجهرية من السنانيات وفصيلة المشويات . يتنيز باعسانه النجامة الانتساب المركزة على ونبية مدلية لاجولية . يوفها نمالي المدد ، ثنائي الخلية ، تجسمه تكات صقية الشكل || له نوعان مؤذيان ونشيش الموز ونشيش مفاجي .

* ٣٠٤٥٥ - ونشيش الموز *

Sphaerostilbe musarum, Calostilbe calostilbe (S).

Unipétale (F).

٣٠٤٣٤ - ووحيد النعالة

Unipetalous (E).

اسم يطلق في علم النبات على كل زهرة توحيها وحيد البتلة او النعالة .

Monostylé (F).

٣٠٤٣٥ - ووحيد القلم

Monostylous (E).

احادي خيط عصر التأنيث .

Monochrome

٣٠٤٣٦ - ووحيد اللون

Homocentrique (F).

٣٠٤٣٧ - ووحيد المركز

Homocentric (E).

Monolique,

٣٠٤٣٨ - ووحيد المسكن

Uniloculaire (F). Monocleous, Unilocular (E).

كل نبات تكون ازهاره وحيدة الشق والحسل اي ان النبتة الواحدة لا تحمل سوى ازهار جلدية واحدة ان ذكرية او انثوية .

Univalve

٣٠٤٣٩ - ووحيد المصراع

ويدهي وحيد الصام . هو ما كان ذا مصراع او صام واحد .

Monovalent

٣٠٤٤٠ - ووحيد المكافاة

Monotocardes (F).

٣٠٤٤١ - ووحيديات الاجهزة

رتبة من الرغويات مديات الابل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . بعضها من متصبرات الازنة القابرة والبعض الآخر محاصر . جميعها من الرغويات الوحيدة الخيشوم والاذنية والكلية .

Monotogrades (F).

٣٠٤٤٢ - ووحيديات الازنين

رتبة حيوانات من الرغويات المدينة الاماميات الحياتية .

٣٠٤٤٣ - ووحيديات الاصداف

Monoplacophores (F).

شعبة من الرغويات صغيريات الخياشيم تتميز باصدافها الفردية . انواعها المعروفة قليلة المدد لا تتجاوز عشرة .

Monomyaires (F).

٣٠٤٤٤ - ووحيديات الفصائل

شعبة من الرغويات صغيريات الخياشيم . فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها وحيدة الفصيلة القافلة .

Monotremas (F).

٣٠٤٤٥ - ووحيديات التسليك

Monotremata (E).

رتبة من الثدييات الالاشمسيات ، تعتبر ادنى رتب اللبوانات منها غلة الماء والتفناض .

Monosperme (F).

٣٠٤٤٦ - ووحيدة البزوة

Monospermous (E).

صفة كل نبات تماره احادية البذرة .

Monogyns (F).

٣٠٤٤٧ - ووحيدة الخبياء

Monogynous (E).

اسم تعريفي يطلق على كل زهرة وحيدة الخياء او الكرييلة .

Eremias (S).

٣٠٤٤٨ - وحيركة *

Erémie (F). Eremias (E).

جنس حيوانات بويضة من العطاء وفصيلة الضبايات .



ونعاش



ونحاش



وخنة

خاصة بتحويل الزوايا واكثرها وباستنساخ الايلاع والشهوة الجنسية .

٣٠٤٦٢ - وَدَجِي، وَدَكَان، وَدُجِي

Rut des solipèdes (F). *Rut of the solipeds* (E).

شهوة أنثى ذات الحافر الالئ للسلح والزين الذي تطلب فيه الاناث فصولها السفاد .

٣٠٤٦٣ - وَدَج (F). *Mobile, Motif* (F).

هو السبب والوسيلة . *Mobile, Moving* (E).

٣٠٤٦٤ - وَدَج، قَانَايَا، قَوَيْكَة، عَرْدَالصليب

Pasania (S). *Pivoine, Peonia* (F). *Peony* (E). *Pasania* (D). *Peonia* (I).

جنس نباتات شبيهة معمرة من فصيلة الشفاريات. انواعها نحو ٢٠، معظمها بري وبهشها تزيين. جلودها حزبية، لحسية، خيلطة. اوراقها متعاقبة. ازهارها كبيرة القند، لحسية الفصّل، عديدة البتلات، لا قياسا للكرابل. اشهر انواعها ما يلي .

٣٠٤٦٥ - وَدَج جِلْدِي الْوَرَق

Pasania coriacea (S). *Pivoine à feuilles coriaces* (F).

نوع من الودج، ساقه شبيهة بجذوة اللوز تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقه قليلة التفريغ المستعرض، تصلها جلدي النصفمة، عابك العليا بحري السفل. زهرته حامية الارنكاز وسيدة، تعرض من ١٠ الى ١٢ سم. لونها الالويدي او الالبيض || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.



ودج صيني

٣٠٤٦٦ - وَدَج شَاذ

Pasania anomala (S). *Pivoine anomala* (F).

نوع من الودج التزييني، ساقه شبيهة تملو من ٦٠ الى ٧٠ سم. اوراقه كبيرة القند كثيرة التفريغ وللشريح والبرون والقرابين، عرقها وشرايينها خلية البشرة. زهرته حامية الارنكاز وسيدة، تعرض نحو ١٠ سم. لونها الالويدي . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٤٦٧ - وَدَج شَجَرِي

Pasania moutan (S). *Pivoine en arbre* (F).

نوع من الودج التزييني، ساقه خشبية تملو نحو ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القند ثلاثية او لحسية التفريغ، لحسية عابك النصفمة العليا بحري السفل. ازهارها كبيرة القند تعرض من ١٥ الى ٢٥ سم. لونها يختلف مع الضروب، منها الالبيض والوردي والاحمر والقرمزي || تنوره يستمر من اوائل ايار الى اواخر حزيران .

٣٠٤٦٨ - وَدَج صَغِير الْوَرَق

Pasania tenuifolia (S). *Pivoine à feuilles menues* (F).

نوع من الودج . اروعته ركوبية . ساقه شبيهة تملو نحو ٥٠ سم. اوراقه قليلة متعاقبة تملو من ١٠ الى ١٢ سم. جميعها صغيرة القند كثيرة التفريغ وللشريح . زهرته حامية الارنكاز وسيدة ، تعرض من ٨ الى ١٠ سم. لونها الالقرمزي الباقين المراجع || تنوره يستمر من اواسط ايار الى اواسط حزيران .

٣٠٤٦٩ - وَدَج صِينِي * ، وَدَج عَطِر

Pasania albillora (S). *Pivoine odorante, P. de Chine, P. à odeur de rose* (F).

نوع من الودج، فروبه الازينية عطيفة . ساقه شبيهة بجذوة اللوز تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه كبيرة القند

Maladie de Bonnygate du bananier (F).

نظر مجهري يصيب الموز من جلوره الى اوراقه فيعمله ويحيطه || يهدو على الاوراق عصابب شبيقة مستطيلة لونها الالسرّة الداكنة تملط التسج وتسبب يباسه . ويهدو على اتحاد الازوية لطبق عفنة لونها الالسرّة تحويها اهداب حر تحوي مشج القطر الذي ينخر التسج ويرقي انقياً من نحد الال نحد يسلطه حتى انقلب || وهو الالجلور عند انتشائها بؤرة حفن تقود التسج الى الانحلال . واذا اعترها عند اطرافها او بعيداً من زاوية انتشائها فهو بقمة سمراء اللين مهدبة بالاحمر || يكافح باقتلاع وطمر الموز المربوه بعد تخديره بالكلس الحراق ومن الواجب تطهير البيش ايشاً قبل طمره .

٣٠٤٦٩ - وَعِشِي مُفَاجِي

Sphaerostilbe repens, Stilbum (S).

نظر مجهري شديد الالذي يسبب حفن الجلور في بعض الانواع النباتية اعصها المطاط واليباية والرطلة والاهركاتية، وقد شرد على جلور البوم الحامس || مظهره الحامسي حفن خل الشكل ليد التسج لونه الالجلورة السراء وهو كثير المصحات القسحة الحجم || اغزاره جسيمة لانه يمت الاجمار بعد ان يقضي على جرادة جلورهما . يكافح باقتلاع وحرق الاجمار المربوه وتطهير موانعها وتخفيض التربة . ومن الالنب اجتناب التربة الرطبة الكثوم لانها تارده انتشار هذا الوسم .

٣٠٤٧٠ - وَدَا، قَدَن

Aplanir, Nivelor (F). *To smooth, To level* (E).

رداً الارض او فلتها : بسط سطحها وسواه انقياً .

٣٠٤٧١ - وَدَاب

Alcadium (S). *Alcadium* (F). *Alcadium* (E).

الوداب فطر ينمو على جلور واعصان الاجمار اليابسة . النخرة : الحفنة .

٣٠٤٧٢ - وَدَج، وَدَج، شَرِيَان سَبَاي

Carotide (F). *Carotid* (E).

شريان في العنق وهما ودجان او ودجان : شريانان غليظان عريضان من بين ثفة النسر ويساها .

٣٠٤٧٣ - وَدَاس

Enoplateuthis (S). *Enoplateuthis* (F). *Enoplateuthis* (E).

جنس حيوانات بحرية مقرنة من الرشيوات ورأسيات الالابيل ، مزدوجيات الخياشيم ، مشاريات الجرامز وفصيلة العنودريسات . انواعها المرفوقة سة ، اعطائها معظم المناطق المستندة الحاررة من المحيط الهادي والمحيط الالطي والبحر الالبيض المتوسط || اجسامها اسطوانية متباينة الاستطالة التي تود الى النوع . اصفر الالانواع وهو وداس المتوسط يطول نحو ثلاثة امتار . اما الالانواع الكبيرة كوداس اقيانية فيطول نحو عشرة امتار . ودواس جزر الزانج يطول نحو ١٢ متراً || رؤوسها كبيرة وعيونها كذلك . زعانفها طرفية الارنكاز ، منها قليلة الشكل ومنها -زوانية . جرابها حبيصة ، متساوية الطول باستثناء الزوج القريب فانه شديد الطول ، ينتهي برسى ستانية الشكل تملوها الحامب الكبيرة والكلايب القرينية اللادة .

٣٠٤٧٤ - وَدَاقِي

Spermatopé (F).

نعت تعريفية توصف به الالغنية الخاصة او المزموم انها

Mouillage (F).
Soaking, Wetting (E).

٣٠٤٧٩ - وَدْن

٣٠٤٨٠ - وَدْن الْأَسَدِ

هو الصلج، نبات عشقولي من البرباريسيات .

٣٠٤٨١ - وَدْن الشَّيْلِ

شجيرة برية تدعى ككتولوب كينو، اطلبه .

Pousse (Jeune) (F).
Shoot (young) (E).

٣٠٤٨٢ - وَدِيَّة

هي القثيث جاز اقتلاعه . ج. ودي .

Ophiorhiza (S).
Ophiorhize (F).

٣٠٤٨٣ - وَدِيَّة

جنس نباتات عشبية من فصيلة الفويات . أنواعها المعروفة نحو ٥٠ منها المحلية أصلها والمعملة . أعطائها بعض مناطق البلاد الحارة مغطاة من نباتات آمنة وباليزية وبعضها الآخر من ثبوت أمريكا الجنوبية || سوقها متباينة : الارتفاع . أوراقها متطابقة ، متعقبة ، سنائية . النصال . أزهارها عسي التجميع ، محوري الارتكاز وطرفي . أزهارها مستطيلة الكؤوس خاصة البتلات ، مخططة الألوان يكثر فيها الاصفر ثم الوردى ثم الأبيض . ثمارها جراد ثنائية الخدر . بزورها سوداء اللون مكدرة تستعمل كدافعة الحمى . ومنها نوع هندي المنبت يدعى ودحة ترياقية (Ophiorhize mitréole) جلدها ترياقية تستعمل ضد سم الافاعي .

٣٠٤٨٤ - وَدَيْس يبيض المشب من أي جنس كان .

٣٠٤٨٥ - وَدِيَّة Triosteum (S). Triostée (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجانيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منها البرية والنباتية . سوقها غبراء تملو من ٣٠ الى ١٢٠ سم . أوراقها متطابقة ، سنائية النصال . أزهارها متباينة الأشكال . أزهارها عديدة الألوان || أشهر أنواعها التريونية الثلاثة التالية :

٣٠٤٨٦ - وَدِيَّة تَحَلِيَا

Triosteum Himalayanum (S).
Triostée de l'Himalaya (F).

نوع من الوديسة التريونية . ساقها كثيرة الفروع تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . أوراقها حاضرة ملتصقة الاذيات ، سنائية النصل ، تطول من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . || أزهارها سنبل التجميع . أزهارها صغيرة ، فسقية اللون . ثمارها عنبية صفراء || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٤٨٧ - وَدِيَّة شَيْبَةِ الْوَرَقِ

Triosteum angustifolium (S).
Triostée à feuilles étroites (F).

نوع من الوديسة التريونية . ساقها تملو من ٤٠ الى ٩٠ سم . أوراقها حاضرة ، سنائية النصل ، تطول من ٨ الى ١٤ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . أزهارها محورية الانتشاب ، فردية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من أيار الى آب .

قليلة التفريش المستعرض . نصلها متجميع الصفحة جبل الخضر الباقى ، خلي البشرة السفلى . أزهارها هامي الارتكاز يمد من ٣ الى ٥ أزهار . زهرته فواصة العرف المطري ، كبيرة القند ، يبيض اللون أو مخضبة || تنويره يستمر من أيار الى أواخر حزيران .

٣٠٤٧٠ - وَدَحْ مَخْزُونِي * Paeonia officinalis (S).
Pivoine officinale, P. des jardins, Rose de Sérae, R. de Notre-Dame (F).

نوع من الودح التريبي ، ساقه عشبية جلوية اللون تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . أوراقه كبيرة القند ثلاثية أو خماسية التلصيص ، نصلها مائل الصفحة المتجمعة مضرب العروق . أزهارها كبيرة القند تعرض نحو ١٥ سم . بتلاتها مهدبة الاطراف ، لونها الى الحمرة المختلفة المواج || تنويره يستمر من أيار الى حزيران .

٣٠٤٧١ - وَدَحْ مَرْجَانِي Paeonia corallina (S).
Pivoine corail (F).

نوع من الودح ، ساقه عشبية جلوية اللون تملو نحو ٧٠ سم . أوراقه قليلة التفريش المستعرض ، نصلها جامد الصفحة جبل الخضر . زهرته هامية الارتكاز وسيدة ، تعرض نحو ١٥ سم . لونها كالمرجان . كرايلها خلية القشور . بزورها تبدو قرمزية وتنتهي عند تمام الإدراك ، بالسواد اللامع . تنويره يستمر من نيسان الى حزيران .

٣٠٤٧٢ - وَدَرٍ Trier (F). To pick (E).
نحى ما لا يلجم مع غيره .

٣٠٤٧٣ - وَدَسِ Défaut (F). Flaw (E).
العيب البين أن في الحيوان أو في النبات .

٣٠٤٧٤ - وَدَعَّة ، مَسْفَكَة Porcelaine (F).
ج. ودع . الودع ، اصداق بحرية ونهرية من ذوات الصراع الواحد تكون لبعض الحيوانات الرضوة كالقواقع وغيرها . وهي صغيرة القند مختلفة الاشكال وألوانا يكثر فيها الشكل الحلزوني .

٣٠٤٧٥ - وَدَعِيَّات Cypridae (S).
Cypréides (E). Cypréide (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرضويات مبدات الأرجل أماميات الجناح المشطية . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة وبعض البلاد المتوسطة الحرارة || جميعها مفترسة ، يضيية الاصداق الصغيرة القامة . فوياتها مستطيلة مقعرة الجوانب اليسرى . محدبة البنى المسنة الخضر الداخلي ، المتشققة الخضر الخارجي || أشهر اجناسها الودع .

٣٠٤٧٦ - وَدَقْ Sperma (F). Sperm (E).
الودق والوداق هو من الحيوان .

٣٠٤٧٧ - وَدَكْ Lard (F). Bacon (E).
هو اللحم الذي يتكون تحت جلده بعض الحيوانات كالخنزير مثلاً ...

٣٠٤٧٨ - وَدَكْ Animaux ruminants (F).
Ruminant animals (E).

الودك ما يجتر من الحيوان الوشي ، وما لا يجتر فهو الزهم .



ودح مخزوني



ودحة



ودجة

٣٠٤٨٨ - وَدَيْعَةُ مَثْقُوبَةِ الزَّرْقِ ٥

Triosteum perfoliatum (S).

Triostée perfoliée (F).

نوع من الوديسة الزرقية. ساقها تعلو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقها حافسة ملتصقة الإزديتات تفسد كالشعيرة، ناصها بيضية الشكل تطول من ١٠ إلى ٢٢ سم. وتعرض من ٥ إلى ١٢ سم. أزهارها محورية الالتشاب، ضمية التجميع، صغيرة القند، أرجوانية اللون || تنويرها يستمر من أيار إلى تموز.

Dépôt (F). Deposit (E).

قد يتسلم به شخص متقلا يملكه شخص آخر ليحفظه حيناً كما يحفظ ماله الخاص ويرده متى طلبه صاحبه.

٣٠٤٩٠ - وَدَيْعَةُ عَيْدُولَةٍ ٥

Liparis noetris (S).

Liparis commun (F).

سكة بحرية من ثلاثات الزمائف وفصيلة الشحاريات موطنها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها شبه وشي الشكل، ضخم المقدم، دقيق الخنصر، بطول نحو ١٦ سم. مسكها حاد السهف، نزع. رأسها مستطيل الجرم، قصير الخط، كبير الشفق. حينها ماحتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة تمتد حتى قاعدة الذيلية. للزربية تقابل الظهرية وتماثلها. زعنفتها الصدرية والحوضية مدندغة قناع الرأس عند فكها. زعنفتها الذيلية صغيرة شبه مزاوية الشكل. ثوبها إلى السمرة الحنطية الملوحة بالأسود. يطنها إلى الغبرة الزرقاء المواج || لحها متوسط الصفت، مأكل.

٣٠٤٩١ - وَدَيْعَةُ ٥

Odontites (S). Odontite (F).

جنس نباتات شبيهة بيرة، حولية من فصيلة الخنازيريات. أنواعها الممروقة قليلة العدد منتبها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || سويها قليلة الفروع. أوراقها متعاقبة ناصها اهليلجية متجمعة. أزهارها صغيرة حراء اللون || تنويرها ربيعي.

٣٠٤٩٢ - وَدَيْعَةُ جَمَيْعِيَّةٍ ٥

Enidella speciosa (S).

Enidelle élégante (F).

حشرة من فصيلة الدلفاسيات ورتبة متجانسات الأجنحة. جسمها صغير القند بطول من ١ إلى ٧ مم. || ثوبها إلى الحنطى الاشقق المواج يطول تدبج في الظهران. رأسها معتدل العرض، نافر الفافوخ الذي يبدو كالقرن. حينها كبرتات. زباناها مستطيل الفصل الاول والثانية كوله قصير، حنطية محرسة. ظهرانها كامل الحنطية. شارب، بين المروق. ورشها خشايات، شفاغان. بطها معتدل التبطيط. الزوج الخلفي من قوائمها مجهز كسائر الدلفاسيات || سرها صفات مجاري الماء.

٣٠٤٩٣ - وَدَيْعُ ٥

Mouillable (F). Wetable (E).

٣٠٤٩٤ - وَدَيْعَةُ التَّوْبِ ٥

Glischrochilus quadripunctatus (S).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند بيضية الشكل، طولها براوح من ٥ إلى ٦ مم. ثوبها إلى السواد اللامع يطولها في كل من حديها تريمية ونقطة برتقالية اللون، زباناها وأرجلها شقر. تعيش تحت لحاء التنوب. قوتها ما تقتصره من الكراشيات.

٣٠٤٩٥ - وَدَيْعَةُ النَّيَّارِ الْجَلَّالَةِ ٥

Carpophilus hemipterus (S).

Carpophile des fruits secs (F).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند، تطول نحو ٣ مم. حدها لا يطينان كامل ظهرها. ثوبها إلى البني اللامع. تركيب الجار الناعبة الساطعة ثم الجافة اصمها البني والشمس.

٣٠٤٩٦ - وَدَيْعَةُ السَّلْبِجَمِ ٥

Meligethes viridescens (S).

Mélégèthe du coiza (F).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند، طولها براوح من ٢ إلى ٣ مم. ثوبها إلى الخضار الأزرق المواج. زباناها وأرجلها شقر. تركيب مع رقتها جميع النباتات الصليبية واصمها السلبج.

٣٠٤٩٧ - وَدَيْعَةُ المَلْفُوفِ ٥

Meligethes aeneus (S).

Mélégèthe du chou (F).

Pollen beetle (E). Rapskizkäfer (D).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند، طولها نحو ٣ مم. ثوبها إلى الخضار الزرجدي، زباناها وأرجلها سود. تركيب هي ورقتها معظم النباتات الصليبية اصمها الملقوف.

٣٠٤٩٨ - وَدَيْعَةُ حَنْطِيَّةٍ ٥

Carpophilus dimidiatus (S).

Carpophile brune (F).

حشرة من الوديسات، صغيرة القند، طولها نحو ٣ مم. ثوبها إلى الحنطى الاسمر المواج. تركيب الجار القاترها مع رقتها وتنطها.

٣٠٤٩٩ - وَدَيْعَةُ غَبَرَةٍ ٥

Soronia grisea (S).

Soronie grise (F).

حشرة من الوديسات، طولها براوح من ٢ إلى ٥ مم. ثوبها حنطى اللون يطول تقيج وتجميع اسمر. زباناها وأرجلها حنطية. تعيش تحت لحاء الاشجار الحرجية والشمرة.

٣٠٥٠٠ - وَدَيْعِيَّاتٌ ٥

Nitidulidae (S).

Nitidulidés (F).

Nitidulidae, Sap-feeding beetles, Sour bugs (E). Glanzkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة عذبات الأجنحة. اجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القند بيضية الشكل مغلطة. قرنها الاستثمارية صولجانية مركبة من ١١ قاسلة. ارسافها خالية أو مغلطة الأجزاء. تعيش على الانزاع وتحت لحاء الاشجار وعلى المواد العضوية الحيوانية والنباتية الجافة.

٣٠٥٠١ - وَدَيْعَةُ ٥

Protoplasme (F). Protoplasme (E).

هي البروتولازيا، المادة التي تتكون منها سميرة أو غلية الاجسام الحية.

٣٠٥٠٢ - وَدَيْعُ ٥

Protoplasmique (F).

Protoplasmic (E).

ما هو متعلق بالودعة أي بالمادة الأولية الحمرورية أو الخليلوية.

٣٠٥٠٣ - وَدَيْعَاءُ ٥

Bréhaigne (F). Barren (E).

الوذاء العاقر. نعت ترميى يطلق على كل انثى عاقر من الحيوان.

٣٠٥٠٤ - وَدَيْعَةُ ٥

Edème (F). Edema (E).

هي الاوذيا أي الاستسقاء الوضعي.



ودَيْعَةُ مِلْدَلَةٍ



ودَيْعَةُ التَّنَبِيبِ



ودَيْعَةُ النَّيَّارِ الْجَلَّالَةِ



ودَيْعَةُ السَّلْبِجَمِ



ودَيْعَةُ المَلْفُوفِ



ودَيْعَةُ حَنْطِيَّةٍ



ودَيْعَةُ غَبَرَةٍ

٣٠٥١٤ - وَرْدَة الصَّبَاغِين *

Serratula tinctoria (S). *Sarrette des teinturiers* (F). نوع من الورود، ساقها منتصبة سرحة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها لا قياسية التفريص. رؤيساتها الزهرية متشكيلة التجميع، كثيرة العدد، تطلو من ١٥ إلى ٢٠ سم. يتفرص من ١٥ إلى ٢٠ سم. أزهارها متساوية اللد قوزية اللون. قنابات قلائها خضر الصفحات الخارجية حر الموج. وهي نبات خصباتي يستخرج من أزهاره وسوقه وجذوره صبغات لثون مغروبو فيه || تنويرها يستمر من تموز إلى تشرين الأول.

٣٠٥١٥ - وَرْدَة خُحَايَةِ النَّفْسَجِين

Serratula quinquefolia (S). *Sarrette à 5 folioles* (F). نوع من الورود، بجلتها فروع الساق تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها منتصبة زباه اللحاء. أوراقها خماسية تفريص. فصوصها المتتالية سنانية الشكل صغيرة اللد، فصوصها الأخير كبير اللد مستطد القاعدة. نصلها مائل الصفحة سنن الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية || تنويرها يستمر من تموز إلى آب.

Serratula radiata (S). *Sarrette radiée* (F). نوع من الورود، بجلتها صغيرة اللد فروع تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم. فروعها منتصبة زباه اللحاء. أوراقها غليظة التفريص، فروعها تعد من ١٩ إلى ٢١، جميعها مسننة الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية التجميع، شعاعية التركيب والشكل. أزهارها حراء اللون قوزية الموج. تنويرها يستمر من تموز إلى آب.

٣٠٥١٧ - وَرْدَة عُرْطِيَّة

Serratula centauroides (S). *Sarrette centaurée* (F). نوع من الورود، بجلتها تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها فروع. فروعها سرحة. أوراقها كبيرة اللد عرطية الشكل، كثيرة التفريص. نصلها مسنن الحافة، أخضر الصفحة العليا للمالسة، أحمر السفلى المزغبة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز، فردية التجميع، كبيرة اللد، قطرها بأرجح من ٦ إلى ٧ سم. لونها إلى البياض الناصع. قنابات قلائها حنطية اللون مهدبة الحمار || تنويرها يستمر من تموز إلى أيلول.

٣٠٥١٨ - وَرْدَة مُتَوَجِّجَة

Serratula coronata (S). *Sarrette couronnée* (F). نوع من الورود، بجلتها منتصبة قليلة الفروع تملو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. فروعها سرحة. أوراقها مفصصة لا قياسية الترتيب. نصلها مائل الصفحة، مسنن الحافة. رؤيساتها الزهرية طرفية الارتكاز فردية التجميع. أزهارها قوزية اللون، الخارجية منها أطول من الوسطى والوسطى أطول من المركزية. قنابات قلائها زغبية البشرة على صفحاتها الخارجية || تنويرها يستمر من تموز إلى آب.

٣٠٥١٩ - وَرْد هو القطيع من الطير .

Lion du Guzerat (F). *ورد* هو اسد الهند، اعليه .

٣٠٥٢١ - وَرْد جُلِّي

Rosa (S). *Rosier* (F). *Rose-tree*, *Rose-bush* (E). *Rose* (D). *Rosa*, *Rosajo* (I). جنس نباتات جنينة معمرة من فصيلة الورديات. انواعه

Ultra-violet

٣٠٥٥٥ - وَرْد النَّفْسَجِي

Hérédité (F). *Heradity* (E). **وَرْدَة** هي انتقال صفات الآباء إلى النسل وصلالاتهم إلى الحيوان والنبات تبعاً لنظام خاص يعرف بقانوني الوراثة. وتعتبر الوراثة من العلوم الحديثة التي احتلت مكاناً هاماً في ديس الاحياء ويميز الفصل في لفت الانظار إليها إلى أبحاث العلامة مندل .

٣٠٥٥٧ - وَرْدَة

Bembex (S). *Bembex* (F). *Bembex* (E). جنس حشرات قانصة وانجبة قانصة من الحويوات غشائيات الاجنحة المنصورة وفضيلة الأقيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة الحجم، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة. اوراقها ملونة يكثر فيها الاصفر الملهج بالاسود ثم الاصفر الاخضر المبلج بالاسود || جميعها تصفن في التربة. اصنافها رداء متجمعة متراكبة الخلايا المسددة السطح تغور من ٣ إلى ٧ سم. ملغخلها انبوبية متحرفة نحو سطح التربة || قوتها الذباب والحوام والصغير من ذوات الجناحين تقتنصها فتخدها وتقلها إلى اصنافها زاءاً لها وليرقاتها .

٣٠٥٥٨ - وَرْدَاقِي

Feuillaison (F). *Foliation* (E). وقت خروج الورق .

٣٠٥٥٩ - وَرْدَان

Urania (S). *Uranie* (F). *Uranie* (E). جنس حشرات فراشية من حرشفيات الاجنحة وفضيلة الورديات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها يمتد من تهايم الهند إلى بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر || جميعها كبيرة اللد، ملونة الوراثن الخلفية من جملة الزخارف والاولوان للجهة المتداخلة || يرقاتها إلى البياض الكبيرتي الموج تملو نمشة سوداء. رؤوسها صفراء اللون أو حراء || اجسامها الحولية ثلاثة .

٣٠٥١٠ - وَرْدَالِيَّات

Uranidae (S). *Uranidés* (F). *Uranidés* (E). فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، منتشرة في بعض مناطق افريقية الشرقية وجزيرة مدغشقر || جميع انواعها كبيرة اللد، متراكبة الاولوان الزاهية اللامعة || اعرف اجناسها واشهرها الوران .

٣٠٥١١ - وَرْدَب

Trou de plantation (F). **وَرْدَة** الوردة: الحديقة الصغيرة المدة لاحتفال الفرس .

٣٠٥١٣ - وَرْدَج

Serratula (S). *Sarrette*, *Serrate*, *Serratule* (F). *Saw-wort*, *Dyer's savory* (E). *Färbescharte* (D). *Serratola*, *Sarretta*, *Serretta* (I). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة، معظمها بري وبعضها زرعيني. اوراقها شوكية لا قياسية التفريص. رؤيساتها اسطوانية. أزهارها انبوية. زهورها قوزية القطب. تعيش في جميع الاراضي الزراعية ولتكاثر بالبر. اعرف انواعه واشهرها ما يلي .



وردة الصباغين

الخضار الأزرق. أزهاره شكولي التجميع. أزهاره حادة العرف، حراء اللون، صغيرة القد، قطرها يراوح من ٣ إلى ٥ سم. || تنوره يستمر من حزيران إلى آب.

٣٠٥٢٦ - وَرْدْ أَصْفَرْ * ، وَعَاط

Rosa lutea (S). *Rosier jaune* (F). *Austrian briar* (E). *Gelbe Rose* (D). *Rosa canina lutea*, *R. c. fetida* (I). نوع من الورود البروتي. جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٤ أمتار. ساقه وفروعه متبادعة للمناخس الجالسة أو القليلة الإحديداب. أوراقه لا قياسية التركيب تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وريقات. وريقاته أهليجية الشكل. نصلها مستن الحافة بارز المرق. أزهاره صفراء اللون كرية الرائحة، قطرها نحو ٧ سم. || تنوره يستمر طوال شهر تموز.



ورد احمر

٣٠٥٢٧ - وَرْدْ الْبَيْتَجْجْ

Rosa Bankianae (S). *Rosier de Banks* (F). قرع من الورود الجاحد الذي يتطلب مياقم خاصة، ممرضا الجنوب. جنته تطول من ٣ إلى ١٠ أمتار، فروعه نحلة حادة الشوك. أوراقها خنسية أو سباعية التركيب غرزية الزينات. وريقاتها مائلة لامة. نصلها مستن الحافة خلي الصلع. أزهارها ضمي التجميع. أزهارها صغيرة القد، بنفسجية العرف، صفراء اللون || تنوره يستمر من حزيران إلى تموز.

٣٠٥٢٨ - وَرْدْ الْحَكْلُ ، وَرْدْ مَدَادْ

Rosa arvensis (S). *Rosier rampant*, *R. d'Ayrshire* (F). نوع من الورود الجاحد. جنته مدادة تطول من ٢ إلى ٤ أمتار. فروعه دقيقة مستطيلة، مناخسها متوسطة التصديق. أوراقها ثلاثية أو خنسية أو سباعية التركيب، وريقاتها أهليجية سنانية، نصلها مائل اللون، متوسط اللمة، خلي الصلع. أزهارها متوسطة القد، قليلة العرف، حراء اللون أو وردية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠٥٢٩ - وَرْدْ الْحَبَاوْ

Buphrasme fétide (F). هو الربد التّن، أطله.

٣٠٥٣٠ - وَرْدْ الزَّوَايْ

Kotmie de Syrie (F). هو الخطي السوري، أطله.

٣٠٥٣١ - وَرْدْ السَّيَّاهْ

هو اللخنس، أطله.

٣٠٥٣٢ - وَرْدْ السَّيَّاحْ

Rosa agrestis, *R. sepium* (S). *Rosier des haies* (F). نوع من الورود البروتي الميائل. جنته تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها وفروعها كثيفة للمناخس المتساوية القد، القليلة الإحديداب. أوراقها خنسية أو سباعية التركيب، وريقاتها ثنائية التسنين، نصلها مائل الصفحة مائل الخضار. أزهارها صغيرة القد، بيضاء اللون أو وردية، مستحبة العرف النظري || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٥٣٣ - وَرْدْ الشَّايْ

Rosier thé (F). هو الرد الهند، أطله.

٣٠٥٣٤ - وَرْدْ الشَّمْسْ

هو الينمان المستدير الورق.

المعروفة زهاء ٥٥٠، ضرورية وأصرامه وجهته لا تقل عن ١٧٠٠٠ سقها ثلاثية منصبة أو مدادة، شوكها أو مناخسها غروبية الشكل مدبية الحمة المنجته. أوراقها مركبة متبادعة. أزهارها طويلة الارتكاز، فردية أو شكولية التجميع. كلورسها لا قياسية التخصيص يكثر فيها الخميس. بيلات توجيحاتها لا نظامية العدد منها الرباعية والخامسة والكثيرة العدد. أسديتها عديدة. خضورها طليقة وسيدة المساكن. بزورها بيضيه صغيرة خلية البشرة. يستمر الورود من أشهر النباتات الآريينية وأسيها للانسان وارتفاعا. يحمي في جميع الأتربة القليلة الاندماج. رغب في الخنسية ولا يصر كبريا في الرمية. يتكاثر بالفسائل والمقل والبذور والتطعيم. يستخرج من زهر بعض أنواعه، بالتقطير، دهن الورود وياء أورد || أشهر أنواعه ما يتبع.

٣٠٥٢٢ - وَرْدْ أَيْدْ

Rosa sempervirens (S). *Rosier toujours vert* (F). نوع من الورود الرقة، جنته مدادة تطول من ٤ إلى ٦ أمتار. فروعه سرعية مستطيلة. أوراقها أيدة، خنسية أو سباعية التركيب. وريقاتها جلدية التصل اللامع العادم الخلل. أزهارها عطرية العرف، كبيرة القد، قصيرة التصل، بيضاء اللون أو قشدية || تنوره يستمر من أيار إلى حزيران.

٣٠٥٢٣ - وَرْدْ الْبَيْضْ ، وَكَبَر

Rosa alba (S). *Rosier blanc* (F). *White rose*, *Single white rose* (E). *Weisse Rose*, *W. Gartenrose* (D). *Rosa bianca*, *R. angola*, *R. carnicina* (I). نوع من الورود البروتي. جنته تملو من ٢ إلى ٤ أمتار. ساقها منصبة، فروعه متدلية. مناخسها لا قياسية التركيب والخميس والتجميع. أوراقها سباعية التركيب. وريقاتها بيضيه للشكل، نصلها أخضر اللون، مائل الصفحة العليا، خلي الصلع. أزهارها نوردي التجميع. أزهارها كبيرة القد، بيضاء اللون، مستحبة العرف || تنوره يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٥٢٤ - وَرْدْ أَحْمَرْ * ، حَوَّجَمْ

Rosa gallica (S). *Rosier de France*, *R. de provins*, *R. rouge* (F). *French rose*, *Common rose* (E). *Gallic Rose* (D). *Rosa domestica*, *R. incarnata*, *R. d'orto* (I). نوع من الورود البروتي. أصرامه وجهته كثيرة العدد. سقها وفروعها مستطيلة. مناخسها كثيفة التجميع لا قياسية الارتكاز، حادة الحمة المهدودة. أوراقها ثلاثية أو خنسية التركيب. وريقاتها كبيرة القد مستطيلة، نصلها خشن الملس مستن الحافة. أزهارها كبيرة القد، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. || تنوره يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٥٢٥ - وَرْدْ أَحْمَرْ الْوَرَقْ

Rosa rubrifolia (S). *Rosier à feuilles rouges* (F). نوع من الورود البروتي الميائل. ساقه تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. مناخسها متساوية القد، ميمرة التجميع. فروعه ضرورية اللون، خلية اللحاء، متبادعة المناخس الجالسة أو القليلة الإحديداب. أوراقها خنسية أو سباعية التركيب وريقاته حر الزينات والأخن والفسلوع، نصلها مائل الصفحة، خلي الصلع الناشزة، لونه أ



ورد اصفر

منها دهن الورد وياه الورد. || تنوره يستمر من الربيع الى اواخر الخريف .

٣٠٥٤٣ - وَرْدَ حَرَشْ * *Rosa rugosa* (S).

Rosier rugueux (F). نوع من الورد السبروتي. اصراعه كثيرة العدد ، ساقها منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. مناسها متباعدة ، ثنائية الترتيب ، قليلة التجميع . فروعهها زياء الصماء متقاربة المناسن اللانسياسية الحجم . اوراقها لا نظامية التركيب ، ورتية التجميع ، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات نصلها لا تتجمع الصفحة ، باث اللون ، خلي البشرة السفلى . ازهارها فردي او ثلاثي التجميع . ازهارها حطرة متفارة اللد تختلف باختلاف الاصرام ، قطرها يراوح من ٩ الى ٩ سم. ثمارها كروية الشكل كبيرة اللد لنها الى الحفرة الزاحية . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

٣٠٥٤٤ - وَرْدَ خَلِي *Rosa villosa*, *R. pomifera* (S). *Rosier velouté* (F).

نوع من الورد السبروتي المبلول . جنبته مدادة تملو نحو ٤ امتار ، ساقها وفروعه متباعدة المناسن المتساوية اللد القليلة الاحديداد . اوراقها مركبة تتألف من ٧ او ٩ او ١١ وريقة ؛ نصلها خلي البشرة على صفحته . ازهارها حطرية الرف حراء اللون ، قطرها يراوح من ٣ الى ٦ سم. نصلها ورمها حلبية البشرة || تنوره يستمر من حزيران الى آب .

٣٠٥٤٥ - وَرْدَ صَغِيرِ الْوَرْدِ *Rosa microphylla* (S). *Rosier à petites feuilles* (F).

نوع من الورد ، ساقه منتصبه تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. فروعه عادمة الزغب ، ثنائية المناسن المستقيمة السواء اللون . اوراقه ايدة ، مركبة ، تتألف من ١١ او ١٣ وريقة . نصلها جامد الصفحة اخضر اللون . ازهاره وردية اللون او بيضاء ، قطرها يراوح من ٦ الى ٧ سم. || تنوره يستمر من آب الى تشرين .

٣٠٥٤٦ - وَرْدَ عَجَسِي *Rosa persica* (S).

Rosier à feuilles d'épine-vinette (F). نوع من الورد السبروتي ، يمتلئ تملو نحو ٦٠ سم. ساقه وفروعه قليلة المناسن المتباعدة . اوراقه كاملة بسيطة ، نصلها مسن الحافة ، مجري اللون على صفحته ، يطول من ١٥ الى ٣٠ سم. ويرى من ٥ الى ١٥ . ازهاره طرفية فردية ، لنها الى الصغار المشع بالاحمر || تنوره يستمر طول شهر حزيران .

٣٠٥٤٧ - وَرْدَ فِيرْجِينِي *Rosa virginiana*, *R. fraxinifolia*, *R. blanda* (S). *Rosier de Virginie* (F).

نوع من الورد السبروتي . هذه البلاد الامريكية . جنبته تملو من ٢ الى ٣ امتار . ساقها وفروعه جزوية اللحاء ، مناسها لا قياسية الحجم والترتيب والتسجين . اوراقها خاسية او سباعية التركيب ، وريقاتها صغيرة اللد اهلجية الشكل ، نصلها جامد الصفحة ، متعاد السن ، قليل الزغب على الجهة السفلى . ازهارها كبيرة اللد حراء اللون لا نظامية التجميع || تنوره يستمر من حزيران الى تموز .

٣٠٥٤٨ - وَرْدَ فِينِي *Rosa phoenicia* (S).

Rosier de Phénicie (F). نوع من الورد البري المبلول في جبال لبنان والموليين .

Rose de Chine (F).

٣٠٥٣٥ - وَرْدَ الصين
هو الابجرة الهندية ، اطله .

Rosa setigera (S).

٣٠٥٣٦ - وَرْدَ التَّرَاحِي *Rosier de la prairie* (F).

نوع من الورد السبروتي . جنبته مدادة تملو من ١٠ الى ٩ امتار ، فروعه سريعة ، مناسه غليظة جالسة . اوراقه ثلاثية او خاسية التركيب . وريقاته اهلجية مسنة ؛ نصلها اخضر الصفحة اللدا ، خلي السفلى البراء اللون . زيات اوراقه واعناقه حلبية الحطار . ازهاره عثوكلي التجميع . ازهاره عادمة الرف بيضاء اللون او وردية . تنوره يستمر طول شهر تموز .

٣٠٥٣٧ - وَرْدَ الْفَيْسِل *Pastel des taincuriers* (F).

هو رسة الصباغين ، اطله .

٣٠٥٣٨ - وَرْدَ الْهِنْدِ، وَرْدَ الْشَّامِ، عُرْشِي *Rosa indica* (S). *Rosier de l'Inde*, *R. ché* (F).

نوع من الورد السبروتي الشام الزراعة . اصراعه وجهته كثيرة اللد . ساقه منتصبه تملو من ٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقه ثلاثية او خاسية او سباعية التركيب . وريقاته اهلجية مدبة ، نصلها لامع البشرة عايق الخصار . ازهاره متوسطة اللد قطرها يراوح من ٥ الى ٧ سم. اولها تختلف باختلاف الصرم والمسلج ، يكثر فيها الاصفر والبرتقال والاحمر ومشتقاتها . || تنوره يستمر طول فصل الربيع والصيف والخريف .

Eglantier (F).

٣٠٥٣٩ - وَرْدَ بَرِّي
هو الشرسين ، اطله .

Rosa pimpinellifolia (S).

Rosier pimpinelle (F). نوع من الورد السبروتي . جنبته تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقها وفروعه كثيرة المناسن والمطب . اوراقها لا قياسية التركيب تتألف من ٥ الى ٧ او ٩ وريقة . وريقاتها ثلاثية الشكل . نصلها خلي الصفحة السفلى ، فسي المراج . ازهاره صغيرة اللد قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. لنها يختلف باختلاف الصرم منه الابيض والوردي والاصفر . تنوره يستمر من ايار الى حزيران .

Rosa gigantea (S).

٣٠٥٤١ - وَرْدَ جَبَر *Rosier géant* (F).

نوع من الورد السبروتي العاشر . جنبته تملو من ١٠ الى ١٢ م. ساقه وفروعه عادمة الشوك . اوراقه خاسية او سباعية التركيب . وريقاته اهلجية الشكل نصلها مائل البشرة على صفحته . ازهاره كبيرة اللد قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم. لونسا الى البياض التني او الاصفر الباهت . تنوره يستمر طول شهر ايار .

٣٠٥٤٢ - وَرْدَ جُورِي، وَرْدَ بَلَدِي، وَرْدَ شَامِي *Rosa damascena* (S). *Rosier de Damas*, *R. des quatre saisons* (F). *Damask rose* (E). *Damaszenrose* (D).

Rosa damaschina, *R. della quattro stagioni* (I). نوع من الورد السبروتي المبلول . جنبته تملو من ٩٠ الى ١٨٠ سم. ساقها وفروعه كثيفة الشوك . مناسها حادة الحمة المنجدة . اوراقها خاسية او سباعية التركيب وريقاتها يضيئة الشكل ، جامدة النصل المسن الحافة . ازهارها وردية اللون ، كبيرة اللد ، فواسة الرف المطري ، يستعطر



ورد حرش

لونها الى الازرق او الوردي ؛ فصلها تليها بزواله وريته .
تنوره يستمر من ايار الى تموز .

٣٠٥٤ - **وَرْدٌ مَسْكِيٌّ** *
Rosa moschata (S).
Rosier musqué (F). *Muskatrose*,
Bismarose (D). *Rosa muschata* (I).
نوع من الورد . ساقه منتصبة تملو نحو ٣ أمتار ، فروعه
مستطيلة مثلية . اوراقه خنسية او سباعية او ثنائية
التركيب . وريقاته بيضه سائبة ؛ فصلها مائل للصفحة
العليا ، خلي السفلي . ازهارها متكوني التجميع . ازهاره
مسكية العرف ، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم . لونها الى
البياض الاصفر || تنوره يستمر من تموز الى تشرين .

٣٠٥٥ - **وَرْدٌ كَلْبِي**
Colombi-moineau (F).
جلس طير من فصيلة الحماميات . انواحه قليلة العدد جميعها
ربعة الجسم ، صغيرة الرأس ، قصيرة المنق ، مثلية
الجنات ، مستديرة الاذنك القصير ، نحلة المنقار ، مارية
الريش || أشهر انواحه الورداني المطوق .

٣٠٥٦ - **وَرْدٌ كَانِي مَطْوَرٌ**
Chamaepelia passerina (S). *Colombi-moineau* *passerina*,
Pigeon de terre (F). *White-throat* (E).
نوع من الورداني وهو طائر متوسط القد . طوله نحو ١٨ سم .
قوه الى الصهبة الزبادية . رأسه وفقرته وصفه زرق المراج .
صفه مطوق بالابيض . جنتاه أعمر الزرقاء تملو وشمه
سمراء صفاء المراج . قوادمه وابناه حر الاطار الخارجي .
بيض الداخل . عيناه برتقالية اللون ، منقاره وساقه حر .
يألف المراعي والسهول المزروعة والحدائق والبساتين . سريره
يعد من ١٠ الى ١٦ . قوته الحبوب والبزور على اختلافها .
يحدث في الجبال والادغال . انثاه تحضن ستويا من مرتين
الى ثلاث مرات ، حضنتها ييشان .

٣٠٥٧ - **وَرْدٌ كَالْبَتِ**
Blattopteroidea (F).
طير من الحشرات تنتمي الى شعبة البرفانيات ولفافنة
المنحنيات اصل . وتبها الحالية ثلاث : السرغانيات
والعفانيات والسرغانيات . اشكالها واحسانها عديدة ومختلفة .
تتميز بارسافها المركبة التي يلب فيها الشخص .

٣٠٥٨ - **وَرْدٌ**
Rosa (F).
زهرة الورد . اشكالها واسماها وعدد بتلاتها واورانها وعرفها
تختلف باختلاف النوع والصمم .

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ أُرْبَعَا** هي كف العلواء ، اطليا .
٣٠٥٩ - **وَرْدٌ التيل** هي لوس التيل ، اطليا .
٣٠٥٩ - **وَرْدٌ الحنيد** هي الحنيد المنقصة ، اطليا .
٣٠٥٩ - **وَرْدٌ السيان** هي السيان ، اطليا .

٣٠٥٩ - **وَرْدِيَّاتٍ**
Rosaceae (S).
Rosacées (F). *Rosaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مديدة القنامل . انواحه
المرفوعة زهاء ١٠٠٠ تنتمي الى ٧٠ جنسا جميعها عذ
اسباط . نباتاتها مجموعة كاملة من الاشباب والجنات
والشجيرات والاشجار . اوراقها متضاربة مختلفة الاشكال
والترتيب . ازهارها نوري التجميع . ازهارها غشوية
ثمريا متجانسة الاشكال والاحجام والالوان . وهي تشمل

ربط في المواقع الربطة . جنيتها منتصبة حزيمة الفروع
تطلو من ٨٠ الى ٢٥٠ سم . مناسها متينة مجنبة مجنبة
لا قياسية التجميع . اوراقها ثلاثية او خنسية التركيب .
وريقاتها احليلجية الشكل . فصلها اذنب البشرة على
صفحتيه . ازهارها متكوني التجميع . ازهارها صغيرة القد
بيضاء اللون عابطة العرف || تنوره يستمر من ايار الى
آب .

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ لَيْتَابِيٌّ**
Rosa bracteata (S).
Rosier bractéolé (F).
نوع من الورد المجاذب الذي يتطلب موقع معينة معرفها
الجنوب . جنيتها تطلو من ٣ الى ٤ أمتار . ساقه وفروعه
مزينة النعاء ، مبرقة المناسخ المهيبة . اوراقه تساعية
التركيب ، زعماتها مرفوعة مهدية الخمار . وريقاتها احليلجية
الشكل ، فصلها لاص الصفحة العلوية خلي السفلي الصفراء
اللون . ازهاره كبيرة القد ، مشمشية العرف ، بيضاء
اللون ، مطقة بقلادة من الشباب || تنوره يستمر طوال
شهر تموز .

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَثِيرُ الزَّهَرِ**
Rosa multiflora (S). *Rosier multiflore* (F).
نوع من الورد السبروتي الملهاد . جنيتها تطلو من ٤ الى
٦ أمتار . فروعه سرعية مستطيلة . اوراقه خنسية او
سباعية او ثنائية التركيب . وريقاتها احليلجية الشكل ؛
فصلها مائل للصفحة العلوية خلي السفلي . زعماتها مهدية
التسعين المشطي . ازهاره هومي المتقوية . ازهاره متوسطة
القد ، كثيرة العدد ، بيضاء اللون او وردية || تنوره
يستمر من اوائل حزيران الى اوائل تموز .

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ كَرْوَلِينِيٌّ**
Rosa carolina (S).
Rosier de la Caroline (F).
نوع من الورد السبروتي ، ربط في المواقع الربطة . جنيتها
منتصبة اساق تطلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه وفروعه
جزوية اللون ، ثنائية المناسخ المهيبة . اوراقه لا قياسية
التركيب منها الثلاثية والخنسية والسباعية والتساعية . وريقاتها
احليلجية الشكل ؛ فصلها مشاري الحافة خلي البشرة السفلي .
ازهاره فردية ، وردية اللون ، كثيرة العدد ، قطرها يراوح
من ٤ الى ٧ سم . || تنوره يستمر من تموز الى آب .

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ لَمَاعٌ**
Rosa nitida (S).
Rosier brillant (F).
نوع من الورد . جنيتها صغيرة القد ، ساقها تطلو من
٤٠ الى ٦٠ سم . مناسها ثنائية ، متقاربة ، جالسة
الانتصاب ، كثيرة الحلب . اوراقها لا قياسية التركيب ،
وردية التجميع ، تتألف من ٣ الى ٩ وريقات ؛ فصلها
مائل البشرة على صفحتيه ، شديد الزهارة واللحم ، مسن
الحافة . ازهارها عادمة العرف ، قطرها يراوح من ٣ الى
٦ سم . لونها الى الحمرة الزاهية البراقة || تنوره يستمر
طوال فصل الصيف .

٣٠٥٩ - **وَرْدٌ مَعْتَلٌّ الْأَوْزَاقِي**
Rosa laevigata (S). *Rosier trifoliolé* (F).
نوع من الورد المجاذب الذي يتطلب موقع خاصة معرفها
الجنوب . جنيتها مستطيلة تطلو نحو ٤ أمتار ساقها وفروعه
كثيرة الشوك ، غليظة المناسخ المهيبة . اوراقها ثلاثية
التركيب ، غززية الزنات . وريقاتها سائبة مستطيلة
الصفحة المدية . فصلها مسن الحافة لاص البشرة المنسرة
على صفحتيه . ازهارها قليلة القد قطرها نحو ٧ سم .



ورد كبير الزهر



ورد مسكي

des bois (F). Wood pigeon, Ring-dove (E). Ringeltaube (D).

نوع من الحمام البري ، كبير الحجم ، طوله نحو ٤٥ سم. رأسه وعنقه وزنجه إلى الرمادي الأزرق . ظهره وجناحه إلى الرمادي الأصفر . ذوره وصدره وبطنه متراكبة الألوان فيها الرصاصي والرمادي والأزرق والأحمر والبنفسجي . جميعها سلعاء المواج . صروبه حديثة معظمها من القواطع يحوي البلاد في طلب المصيف والمشي . أوبده قليلة أصطافها البلاد الحارة . وهو يألف الإصراع والثبات . يعيش أسراباً كبيرة العدد . قوته الثأر والحبوب والبزور . يذئن في إلتجار . يعيش ويبيض من مرة إلى مرتين في السنة . ج وراشين وورشان .

Epiaire de Germanie (F). **وَرْدِيَّةٌ** - ٣٠٥٧١
هي السطاس الجرماني ، اطلبه .

وَرَقٌ - ٣٠٥٧٢
ورق النبات : نسر واهتر فهو وارث أي ناسر راف شيد الخصرة .

Sideroxylon (S). **وَرَقٌ** *
Sideroxyle, Bois de fer blanc, Bois de sable (F). Iron wood (E). Eisenbaum (D). Bumella, Legno ferro (I).

جنس نباتات حرجية وزراعية من فصيلة الطليحات . أنواعه زهاء ٨٠ منها الأشجار الكبيرة الشائعة والمتوسطة القد والصغيرة . أوراقها متعاقبة مستطيلة جلدية النصل . أزهارها أبغية الارتكاز ، صغيرة القد ، قصيرة الأزناد ، صفراء اللون . ثمارها لوزية الشكل والتعدد ، بعضها مأكول أو دهي المصارة الصناعية وبعضها لا يصلح لثي . أخشابها شديدة الصلابة ، تلبه اللون ، يدعونها غشب الحديد الأبيض . قشورها طيبة مضادة للحميات .

Morceler, Partager (F). **وَرَقٌ** - ٣٠٥٧٤
To parcel out, To divide (E). ورق الأرض : قسمها .

Urvillea (S). **وَرْدِيَّةٌ** *
Urvillea (F). Urvillea (E).
جنس نباتات عارشة ، صمرة ، برية وتربيتية من فصيلة السابنديات . أنواعها المعروفة ثمانية ، مهدا بعض مناطق أمريكا الجنوبية الحارة . سوقها موزية اللحاء ، فراءه . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات الكتلية المفرفة . حوائطها مستطيلة ، متشعبة . أزهارها عنقودي التجميع ، أبلي الارتكاز . أزهارها صغيرة القد ، رباعية البتلات المستقلة ، متباينة الألوان ، منها الأبيض والأصفر والوردي والأحمر المختلط الماجات . ثوبورها ديبلي أو صيني .

Papiers (F). Papers (E). **وَرَقٌ** - ٣٠٥٧٦
صائف ورقية رقيقة مصقولة تصنع من مختلف المسواد النباتية ، أخشاب الخشب ، بعد تحويلها إلى عجينة يمكن مدها وتوطيدها وصقلها .

Effeuillage (F). **وَرَقٌ** - ٣٠٥٧٧
Stripping of the leaves (E). ورق الشجرة : انزع ورقها .

أكبر مجموعة من الأشجار الزراعية المثمرة وما لا يستأن به من النباتات العطرية والعلبية . أسباطها ما يتبع :

Pirées, Pomacées (F).
Chrysobalanées (F).
Potarées (F).
Rosées (F).
Dryadées (F).
Spirées (F).
Rubées (F).
Fragarées, Potentillées (F).
Quillagées (F).
Amygdalées, Prunées (F).
Neuradées (F).

وَرْدِيَّةٌ - ٣٠٥٦٤
هي النسل ، اطلبه .

وَرَسٌ - ٣٠٥٦٥
ورس النبات أخضر . وورس الصخرة في الماء : ركبها الخث .

وَرَسٌ * - ٣٠٥٦٦
Memecylon tinctorial (S). Mémecyle tinctorial (F). Caylon cornal tree (E). Safranbaum, Beerbaum (D). Corniolo (I).
شجرة برية وزراعية من القرسيات وفصيلة القرانيات . أوراقها متعاقبة متقابلة . نصلها سناني الشكل ، جامد الصلابة . أزهارها ضمية التجميع محورية الارتكاز متقابلة التصفيف . أوراقها غضائية مشهورة يستخرج منها صباغ أحمر اللون .

وَرَسٌ مَثْلُوٌّ - ٣٠٥٦٧
هو القنيل ، اطلبه .

Ptilopus (S). Ptilopo (F). **وَرَسِيٌّ** * - ٣٠٥٦٨
طائر من الحمام الوحي شبيه بالترفة . موطنه يمتد من الهند إلى جزر القباية . ينحدر من الضروب التي تجرب البلاد في طلب الرزق . ملجئه الحيائي جامي . جعاهاته مستطيلة العدد . قوته البهادر وبعض الحشرات . جسمه متدل القند يطول نحو ٣٢ سم. ثوبه أخضر الرأس وأرداء وألجاء والذنب ، صتالي الصدر المشوي بالأحمر ، أصفر البطن المشوي بالوردي . يذئن منه في الأشجار القليلة الارتفاع . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في الحب . حضنتها يبيضتان . الترخيم يستمر نحو ١٣ يوماً .

وَرَسِيَّاتٌ - ٣٠٥٦٩
Mémecylées (F).
سبط من فصيلة القرانيات . أجناسه وأنواعه عديدة منها الأشجار والشجيرات والجنات . جميعها من نباتات المناطق الحارة . أوراقها سنانية متعاقبة متقابلة . أزهارها عشكولية التجميع . محورية الارتكاز . متقابلة الترتيب ، صغيرة القد . ثمارها عنقية تتكون بعضها مأكول بعضها الطعم . ومنها أنواع صناعية صبغية الأرواق أشهرها الورس .

وَرَشَانٌ * - ٣٠٥٧٠
Columba palumbus (S).
Colombe ramier, Grand ramier, Palombe, Pigeon



ورس



ورس



ورشان



ورق



ورقة



ورقاً

Feuille crépue ورقة جعدة، مجعدة
Feuille alguée ورقة حادة، مدببة
Feuille auriculée ورقة حاشية
Feuille curvinervée ورقة حدهاء العروق
Feuille verticillée ورقة حلزونية
Feuille linéaire ورقة خطية
Feuille peltée ورقة دريئة
Feuille peltinervée ورقة دريئة العروق
Feuille acyclique ورقة دوارية
Feuille lyrée ورقة رباعية
Feuille mucronée ورقة رهاية
Feuille pennée ورقة ريشية
Feuille penninervée ورقة ريشية العروق
Feuille pennatifide ورقة ريشية مخزومة
Feuille pennatifidipartite ورقة ريشية مشرمة
Feuille pennatiséquée ورقة ريشية ملفلفة
Feuille lancéolée ورقة سنانية
Feuille sagittée ورقة سهمية
Feuille spinuleuse ورقة شوكية
Feuille entière ورقة صحيحة، كاملة
Feuille hastée ورقة طبرزينية
Feuille engainante ورقة غمدية
Feuille roncinée ورقة لأرية
Feuille décurrenente ورقة نقطاء
Feuille palmée ورقة كفية
Feuille palmatinervée ورقة كفية العروق
Feuille palmatifide ورقة كفية مخزومة
Feuille palmatifidipartite ورقة كفية مشرمة
Feuille palmatiséquée ورقة كفية ملفلفة
Feuille sessile ورقة لاطئة
Feuille spirale ورقة لولبية
Feuille connée ورقة متصلة
Feuille alterne ورقة متعاقبة
Feuille opposée ورقة متقابلة
Feuille déscussée ورقة متقاطعة
Feuille boursofflée ورقة متضخمة
Feuille perforlée ورقة مثقوبة
Feuille dentée ورقة مخزومة، مسننة
Feuille subulée ورقة مخزومة
Feuille composée ورقة مركبة
Feuille rectinervée ورقة مستقيمة العروق
Feuille laciniée ورقة مشرشرة
Feuille pétiolée ورقة متعقبة
Feuille crénelée ورقة مفهرقة
Feuille séquée ورقة ملفلفة
Feuille émarginée ورقة مفهوقية
Feuille tronquée ورقة مقطوعة

Billot de banque (F). ورقة النقد
Bank-note, Bank-bill (E).
هو من السندات التي تصدرها مصارف الإصدار وتلتزم بها أن تلغ نقدًا حاملها لدى الإطلاع مبلغًا معينًا فيها.
Papier filtre (F). ورقة شاشيل
Filter paper (E).
Chalcophaps (S). ورقة ٥٠
Chalcophaps (F).
طائر من الضواري ينتمي إلى فصيلة الحماميات. موطنه جند من الجزيرة العربية إلى الصين واليابان. ينتقل مع فصل السنة من مكان إلى مكان. ملجئه الحياتي زويبي الذي في زمن الرحيل. يألف الإحراج والبراري. يبدو على الأرض بطة ويظهر بسرعة فائقة. قوته الحبوب والبرور البرية وبهض المشرات || جسمه محتدل القد، وطول نحو ٤٢ سم. ثوبه متداخل الشبهة والريدة والكهبة، جميعها لسماء المروج، ويمطو في أواخر الظهر غطان أخضر، ذنبه محتدل الطول، مستدير الطرف. متقاده وثاقتهاد وأصابعه إلى الصرة الزيتية || يذئن حشه في الأشجار الرقيقة. الانثى تحضن بمناوبة الذكر من مرتين إلى ثلاث مرات في العام. حضنتها يبضغان فقط.
Chape (F). ورقة، إصدا، شيد
Cope (E). هو ما طلي به الحائط ونحوه.
Feuille (F). Leaf (E). ورقة
هي في النبات عضو التمثيل والتنفس والتي يستمد منها الطاقة من الضوء والهواء. تتتركب الورقة من ثلاثة أجزاء: النصل والمغلق والقاعدة. فالنصل هو الصحيفة الخضراء التي يملؤها الخشب، يتكون هيكله من ضلع وعروق وأعصاب تختلف وضعها وتوزيعها وشبكها باختلاف الفصيلة والجنس والنوع. أما المغلق فهو امتداد الضلع وهو صلة الوصل بين الساق والنصل أو الفرع والنصل. ومن الأوراق ما كانت عادمة البت وتعرف باللاطة والجالسة والحاضنة الخ... وأما القاعدة فهي موضع اتصال المغلق أو النصل بالساق أو الفروع وقد تكون هذه القاعدة لملوية كما في الكوبية أو لاحقة الساق كما في التيجليات أو قرصية مخزونة كما في الأبليل. وقد تنمو من القاعدة وريقة تدعى الإذنيات || وتنقسم الأوراق إلى أبيدة أو هرودة أي دائمة الخضرة وإلى عابدة أو نافضة وهي التي تسقط في الخريف. أما أشكال الأوراق وتوزيعاتها لمعددة تخص منها بالذكر اسمها وهي التالية:

ورقة إبرية
ورقة إسفينية
ورقة إهليلجية
ورقة زلنية
ورقة بسيطة
ورقة بيضبة
ورقة بيضية متعكسة
ورقة لولبية التصريم
ورقة لولبية التصريم
ورقة ثنائية التصريم
ورقة ثنائية التصريم
Feuille scissure
Feuille cunéiforme
Feuille oblongue
Feuille pédalée
Feuille simple
Feuille ovale
Feuille obovale
Feuille trifide
Feuille tripartite
Feuille bifide
Feuille bipartite

٣٠٦٥٦ - **وِستاريه**
Wistaria (F).
هي البيلة ، ثبات عايش زيمبي ، اطلبها .

٣٠٦٥٧ - **وِستيتي**
Oulstiti (F).
هو الحبال ، من القرد الذئبية ، اطلبه .

٣٠٦٥٨ - **وِستد**
Biffonner (F). To ridge (E).
وسد الثرة توصيداً : اقام فيها الاكلام .

٣٠٦٥٩ - **وِستطي**
Médius (F). Middle finger (E).
الوسطى من الاصابع ما بين السبابة والبصر .

٣٠٦٦٠ - **وِستف**
Décortiquer (F).
To decorticate (E).
قشر . الثمار الموصفة هي الثمار المششرة وقد يكثر استعمال التوصيف في اللوز والصنوبر والجوز .

٣٠٦٦١ - **وِستف**
Pelure (F).
Peel, Skin, Paring (E).
الوِستف القشرة الخارجية التي تلحف لب بعض الثمار كالجوز والوز والبطاطا والبندورة ... اما قشرة الدراق والتفاح واللاجاس والخوخ الخ ، فتدعى حشاة . اطلبها .

٣٠٦٦٢ - **وِستكي**
Whisky (F). Whisky (E).
مشروب كحولي مسكر يصنع من منتخل الشعير والخمير والشم . تكثر صناعته في بلاد الانكليز . يقال ان القليل منه يفيد الجسم البشري .

٣٠٦٦٣ - **وِستم**
Ferrade (F). Branding (E).
كَي الحيوان بعلامه فارقة منمناً للفرقة .

٣٠٦٦٤ - **وِستم**
Etiqueter (F).
To ticket, To label (E).
وسم الثبات : وضع له سمه من خشب او غيره من المواد كتب عليها التعريف المميز .

٣٠٦٦٥ - **وِستمة ، وِستمة ، وِستمة ، عِظليم**
Istis (S). Pastel (F).
جنس نباتات عشبية محولة من فصيلة السليبيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمتدلة . معظمها بري وبعضها صناعي وعلمي . اوراقها كاملة مستطيلة . ازهارها حامي . ازهارها صفراء اللون . ترفب في الاراضي الجصية . ازهارها وسمه الصباغين .

٣٠٦٦٦ - **وِستمة الصباغين ، وِستة الينيل**
Istis tinctoria (S). Pastel des teinturiers, Guède (F).
Wood, Ash of Jerusalem, Dyer's weed (E). Färber waid, Wilder Indigo (D). Pastello, Giastro, Guado (I).
لوع من الوِستمة ، يملحوه المرق ، يزرع لاستخراج مواد الصبغة المحمودة في اوراقه . اوراقه متعاقبة ، السفلى منها اهليلجية ولعلها سهمية ، نصلها جامد الصفحة عاكس الخضار || ينيل في اوائل الربيع . تنترج اوراقه تباعاً ، عند ازدياد نصالها ، وتجفث في الظل ثم تسحق وتبحر .

٣٠٦٦٧ - **وِستيات ، وِستيات عاكسة**
Myocla stellaris (S).
مرتبة تطور مجهرية من رتبة الزويديات . انواعها عديدة جميعها خمسة اجناس : الازويديوم ، الركونديوم ، الرزكونديوم ، السايروسيوم والمونيزيوسيس || معظمها

٣٠٦٦٧ - **وِزيم**
Gynécée (F). Gynaecium (E).
جهاز اخية الزهرة ، يشمل المبيض والسمة والقلم . راجع منفحة .

٣٠٦٦٨ - **وِزيمكة**
Botte (F). Bundle, Truss (E).
ما حزم من البقول والئن على اعطالها .

٣٠٦٦٩ - **وِزيم**
حب الخنظل المطحون .

٣٠٦٧٠ - **وِسابي**
Wasabi (F).
نبات يقل مشهور باسم يترابه ، اطلبها .

٣٠٦٧١ - **وِسابكة**
Pelor (S). Pélor (F).
سمكة من الجلاخ الثالكتات الزمائف . اصنافها تمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر . جسمها مخروطي الشكل صغير القد ، ينتهي زعنفة مستديرة مجذعة بالاسم الجؤوري . زعانفها كبيرة ملونة وسنفة كاللشار . الظهري منها تمتد من الرأس الى الذنب . رأسها مخروطي الكسم تملوه التزويق النافرة المستعيرة . عيناها ناشزتان مستديرتان متقاربتان . ثوبها الى السمرة الطصادة تعرضه بعض الخطوط الجؤورية وهو يقيق مع اقرباه من الظهور ويبيض منه البطن .

٣٠٦٧٢ - **وِسادكة**
Empodium

٣٠٦٧٣ - **وِسان**
Stenopis gracilis (S).
Loris grêle (F). Slender loris (E).

حيوان لين وحيد الجنس والنوع من فصيلة القيروديات . موطن سرنيديا والهند . يالغ الاجراع والنايات ويستلق الانجار بشفة . ملجته الحياتي جامي . جماعته قليلة العدد قلما يتجاوز خمسة . سرسه دجوي يستمر من النشفة الى الفير الميق . قوته الجنادب والجراد وجميع انواع الحشرات والثار السكرية والسمل والصافير الصغيرة وبعض الاعشاب وورق الاشجار || جسمه قصير مستدير بطول نحو ٢٢ سم . يتزين باستدارة الرأس وبصر الاثف وتجلو مؤخره من الذنب . عينا كبرتان مستديرتان . اذناه صغيرتان ، مستديرتان الاطراف المرءاء النادمة الوبر . شره نام ، لبد التجميع ، حريري الملمس . ثوبه الى الصمرة الشهباء يملحوه مواج ادس في الظهر وقفي في سائر اقسام الجسم . حياء مطوقتان بالاسود . قصبة انفه وتقدم سطحه الى البياض الاخضر . تحره واطراف قوائمه الى الربعة القراء || الاثنى ثنائية الكفي ، رباحية الحلمات الصغيرة الثقيلة . مجلها يستمر نحو سمية اشهر تقص في تمامه من جروين الى اربعة اجراء .

٣٠٦٧٤ - **وِساب**
Flaveria (S). Flavérie (F).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها احشاش حولية . سوقها سرسة اوراقها مفردة متتالية مائسة اليفرة . ازهارها رؤسية نورية التجميع || اشهر انواعه وسب الخش .

٣٠٦٧٥ - **وِساب الخش**
Flaveria contrayerba (S). Flavérie du Pérou (F).
Peruvian dyers weed (E). Flaverie (D). Flaveria (I).
نوع من السب وهو عشبة برية طلية يقال انها تستعمل كشادة لسم الاقاي . ساقها منتصبه قراء . اوراقها مفردة ، خطية التشرج ، بحرية اللون . رؤسية الزهرة كبيرة القد . ازهارها انبوبية الشكل يضاء اللون .



وسابة



وسان



وسب الخش



وسمة الصباغين



وسيم



وسيم



وشاعة



وشاعة



وشاعة

صغيرة ، ثلاثية الفصل . كورالها شبه اسطوانية . بطونها غرومية ، تنتهي بمرزات ذرية . كورالها و بطونها مبيطة الملب الاسمر . رواشها باضة الخفاب ، مجعدة بالاسمر || الحشرة الجملانة واثمة اما البرقة فذاتة او ثائلة او خاسلة || اشهر انجناسها الوسيمية .

٣٠١٦٥ - وسيمكة *

Anisophylla (S).

Anisophyllidae (F).

جنس اشجار وشجيرات حرجية من فصيلة القراصيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتبها بعض الاصناف الاستوائية الاسيوية والافريقية || اشجارها كبيرة ، ريفية ، متباعدة الفروع . اوراقها متعقة ، متضاربة ، سنانية الاتصال . ازهارها ابيض الازرقاز ، سبلي التجميع . ازهارها صغيرة بيضاء اللون او صفراء . ثمارها عتية ، بذورها عادمة الالح || اعشابها صناعية ، متوسطة الصلابة .

٣٠١٦٦ - وشاعة *

Radiolites (S).

Radiolites (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشيم وفصيلة الرشاخيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || اصنافها شبه مخروطية الشكل ، لامتساوية المصاريع ، الملوي منها صغير القد ، جلوني الشكل ، مسطحة الصفحة الخفدة ، اما السفلي فمخروطي موشح .

٣٠١٦٧ - وشاعات *

Radiolites (S).

Radiolites (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشيم ، عادات الروس . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من متحجرات الطبقة الطباشيرية || تتميز انواع هذه الفصيلة بالتباين القائم بين ممراري اصنافها اذ ان المصراع الاسمر سفاطي الشكل في حين ان الامين شبه مخروطي || اعرف اجناسها واشهرها وشاعة .

٣٠١٦٨ - وشاعة *

Asticot (F).

Maggot (E).

هي دوسمة ذبابة الدم . تركيب التسج الحية فتؤذي لها مقومة لاحة .

٣٠١٦٩ - وشاعة *

Exostemma (S).

Exostemma (F).

جنس اشجار وجنيتات برية ، طيبة ، من فصيلة القرويات . انواعها المعروفة ١٢ مهدا البلاد الاستوائية || اوراقها متعاقبة ، متعقة . فصالحا يضيء الشورن او اهليحيين او سنانية . ازهارها طرني او محوري الازرقاز ، عطقي التجميع . ازهارها انبوية التجميع ، بيضاء اللون او وردية . ثمارها حقة ، ثنائية الخدر . تحوي العديد من البذور الصغيرة المفلطحة || اشهر انواعها الاثنان التاليان :

٣٠١٦٩ - وشاعة كبيرة الزهر *

Exostemma grandiflora (S).

Exostemma à grandes fleurs (F).

نوع من الشاعة . منتبها فزويلا . ساقها ترتفع نحو عشرة امتار . قشورها مرة المالح دافعة للحس وسهلة المعلة .

من الفطور الزرية التي تعيش في التربة على المواد النباتية المتحللة وبعدها طفيلي يعيش على النباتات المائلة ينقلب التسج ويرفها دون ان يقع بها شديد الاذى .

٣٠١٦٨ - وسيم *

Catalyseur (F).

Catalyseur (E).

هو المسحال ، جسم يحدث التحليل باللماسة .

٣٠١٦٩ - وسيم *

Remisier (F).

Half-commission man (E).

هو من يتوسط في انعقاد صفقة بين المبيع والمشتري .

٣٠١٧٠ - وسيمكة *

Milieu de culture (F).

Medium culture (E).

الوسط الملائم لزراع الميكروبات والفطور .

٣٠١٧١ - وسيمكة *

Moyen (F).

Plea (E).

هي السب أو الرية القانوي أو القبطي تنب عليه للدعوى ويدل على امام المحكمة .

٣٠١٧٢ - وسيم *

Callista (S).

Callista (F).

جنس طير من فصيلة الترنيرات . انواعها المعروفة نحو ٦٠ جميعها من طيور امريكا الوسطى والجنوبية . تألف القذابات والحراج التي يكثر فيها الغل . نظامها الحياتي جاعي . اسرارها متفاوتة العدد ، تكثر فيها القلة || اجسامها صغيرة القد ، ريشة القوام ، تطول من ١٤ الى ١٧ سم . مناقيلها مخروطية الشكل تنتهي بمقاطع صغيرة ذرية . اجناسها متعقدة الحجم . اذناها متصلة القد ، مقطوعة الاطراف . اسرارها ريفية دقيقة . اصابعها متعقدة الحجم . اثوابها جميلة الالوان الساطعة فيها الازرق والاحمر والاصهب والاسود || جميعها تعيش على البلور وبعض الثار العتية || تدفن اشعاشها في الادلخال على ارتفاع بعض الاندام عن سطح التربة . اناتها تقص من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ١٤ يوما .

٣٠١٧٣ - وسيمكة *

Palioptera (S).

Palioptera (F).

جنس حشرات من فصيلة الوسيمات وذرية ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد اعشابها بعض مناطق البلاد الحارة والمتعقدة الحرارة || اجناسها صغيرة ، هيفاء ، هيفاء اللون او صفراء ، تطول من ٣ الى ٤ سم . رؤوسها شبه مكورة . عيونها صغيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل المتدفقة . اعظامها متعقدة الطول . ملامسها صغيرة . كورالها شبه اسطوانية بطونها مخروطية تنتهي بمرزات ذرية . رؤوسها وكورالها و بطونها والمخاذا مبيطة الملب الدقيق . رواشها باضة الخفاب مجعدة بالاسمر المخروي || جميعها واثمة تألف كل مكان تكثر فيه الازهار . يرقاتها خاسلة او دامة .

٣٠١٧٤ - وسيمات *

Paliopteridae (S).

Paliopteridae (F).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراعي والبراري والحراج || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول من ٣ الى ٦ سم . رؤوسها شبه مكورة ، عيونها فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية

٣٠٦٨٧ - وَشَعْمَةٌ عَظِيمَةُ الْوَرَقِ

Centranthus angustifolius (S). *Centranthe à feuilles étroites* (F).

بجيلة سبروتية معمرة تملو نحو ٨٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ضيقة، طويلاً يراوح من ٨ إلى ١٥ سم. وعرها من ٢ إلى ٥ سم. نصلها حبيك الصفحة بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع. أزهارها وردية زاهية، متوسطة الداجرة || تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٦٨٨ - وَشَعْمَةٌ عَظِيمَةُ السُّوقِ

Centranthus macrosiphon (S). *Centranthe à grosses tiges*, *Valériane à grosses tiges* (F).

شبة سبروتية حولية عديدة الاصرام. ساقها غمية غليظة مجوفة كثيرة الفروع تملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة لائثة، نصلها بحري اللون. أزهارها عتقودي التجميع، غارش القشة. أزهارها وردية اللون أو بيضاء أو موهجة في بعض الاصرام || تنورها يستمر من حزيران إلى آب.

٣٠٦٨٩ - وَشَعْمَةٌ نَحِيلَةٌ

Centranthus calcitrapa (S). *Centranthe chaussetrap* (F).

شبة سبروتية حولية نحيلة الساق تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها ساقية ملتصحة ريشية مخمرة. أزهارها عتق التجميع، هامي الاكناز. أزهارها وردية اللون قصيرة الداجرة. تنورها يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٦٩٠ - وَشَعْمَةٌ

Fusiforme (F). *Fusiform* (E). نمت وصني يندل على الشكل المغزلي المسكوب الجسم المذهب الطرف.

٣٠٦٩١ - وَشَقْ

الوشق كوكبة نجم شمالية الموقع مركزها بين الدب الأكبر والنمات || عدد نجومها ٤٦ معظمها من المراتب الخامسة والسادسة والسابعة ونها نجم من المراتب الرابعة مركزه في اواسط الدب.

٣٠٦٩٢ - وَشَقْ

جلس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات ودبة اللوام. انواعها عديدة بعضها اصفر قلدً من الفهد، بجيلة الشكل، متناسبة التكوين، قصيرة الذنب مخروطية الاذن، يملو طرف اذناها جم من الور الاسود. قوتها ما استطاعت اليه سبيلاً من الحيوان والطير || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع.

٣٠٦٩٣ - وَشَقْ أَخْمَر

Lynx rufus (S). *Lynx rousse* (F). *Red lynx* (E). نوع من الوشق الامريكي. جسمه متوسط القند يطول نحو ٨٥ سم. وذنبه ٣٠. ثوبه امفر اللون احمر يملو توشم امسح وتوشيع اسمر.

٣٠٦٩٤ - وَشَقْ أُرْوِي *

Lynx vulgaris (S). *Lynx vulgaire*, *L. d'Europe* (F). *Common lynx*, *European lynx* (E).

نوع من الوشق، كبير القنص، شديد الاذى موطنه اربعة. وهو كبير الجفطة طوله نحو ١٢٠ سم. وذنبه ٢٠ أما ارتفاعه فتحو ٦٥ سم. اطوار اطوار السنور، يتسلق الاشجار. قوته الطير وصغير الحيوان.

٣٠٦٩١ - وَشَاكَّةٌ كَثِيرَةُ الزُّهْرِ

Exostemma floribonda (S).

Exostème floribonde (F).

نوع من الوشاكَّة، منبتها الاثليل. ساقها ترتفع نحو خمسة امتار. غواصها الطبية كفواص الوشاكَّة الكبيرة الزهر.

٣٠٦٩٢ - وَشَاكَّةٌ *

Cynogale (S). *Cynogale* (F).

حيوان وحيد الجنس والذعر من فصيلة الزباديات. موطنه جزر التنايج. يملكه البيرات ويحاري الماء. يلاحقه الحيائي فردي لا يتجمع الذكر والاثني الا في زمن الوداق والكوم || جسمه مستطيل الشكل، صغير القد، قصير القوائم، يطول نحو ٧٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم. راسه شبه مخروطي الشكل، مسط الجرم. عيناه صغيرتان لوزيتان. اذناه صغيرتان مستديرتان. مخارجه مجهز بقلق ينطلق عند الحاجة. سباله كثيف الملبس الطويل الاشقر. قوائمه خاسية الاصابع. ذنبه واخر الورب اليه المجلل. ثوبه الى الكوبة السوداء يمتد في الرأس والظهر ويبدى في الصدر والبطن || يسبح ويغوص في الماء ويمدو على الارض بسرعة وينساق الاشجار. قوته الاسماك والسرطان وكل ما استطاع اليه سبيلاً من الطير والحيوان.

٣٠٦٩٣ - وَشَعْ

Fleurs des légumes (F). الوشع : زهر البقول.

٣٠٦٩٤ - وَشَعْ الْمَاءِ *، وَكَيْسَتَارِيَّة

Valisneria (S). *Valisnérie*, *Valisnérie*, *Valisnérie* (F). *Eel grass*, *Tape grass* (E). *Sumpfschraube* (D). *Valisneria* (I).

جنس نباتات عشبية ثديية مائية المسكن من فصيلة كلديات الماء. تعيش وتتكاثر في المياه العذبة الراكدة وفي الاحواض. أوراقها صفية تطول من ٣٠ إلى ٨٠ سم. وتعرض من ٦ إلى ١٢ سم. أزهارها صغيرة القد، الذكرية منها ثنائية السداة تنفصل من قاعدتها وتطفو على سطح الماء بانتظار الزهرة الاثني المرتكزة على زناد لولبي نابض يوجه الزهرة عند ادراكها التناسل باتجاه الريح العالم.

٣٠٦٩٥ - وَشَعْمَةٌ

Centranthus (S). *Centranthe* (F). جلس نباتات برية وزراعية من فصيلة النارديات. انواعها المعروفة ستة، موهدا حوض البحر المتوسط. سقها دسرة، أوراقها متعاقبة، أزهارها سوية اللون الاحمر او الالبيض، غواصها الطبية لا تختلف عن غواص ساتر النارديات لكنها اخضفت منها بالمناصر العاللة || اشهر انواعها واعماها زراعة ما يتبع.

٣٠٦٩٦ - وَشَعْمَةٌ حَمْرَةٌ *، وَالْيَرِيَّانُ أَخْمَر

Centranthus ruber (S). *Centranthe rouge*, *Valériane rouge*, *Behen rouge*, *Barbe du jupiter*, *Lilas d'Espagne* (F). *Red spur-valerian*, *Jupiter's beard*, *Fox's brush* (E). *Baldrian*, *Rota Spornblume* (D). *Valeriana rossa*, *Barba Giove* (I).

بجيلة سبروتية معمرة طيبة وزينية تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. اصرامها الزراعية عديدة. سقها موهدة. أوراقها بيضية ذرية، نصلها كامل الصفحة مسنن الحافة جميل انقشار يطول من ٨ إلى ١٢ سم. ويعرض من ٢ إلى ٤ سم. أزهارها عتقودي التجميع، صيواني القشة. أزهارها ملطرية السرف، مستطيلة الداجرة، ارجوانية اللون || تنورها يستمر من أيار إلى آب.



وشاكَّة



وشع الماء



وشع ماء



وشق أروبي

٣٠٦٩٥ - **وَشَقُّ الْفَقْرِ** هو عشاق الأرض ، اطلبه .

٣٠٦٩٦ - **وَشَقُّ الْمَنَاقِبِ * ، حَيْب**

Lynx chaus (S). Lynx des marais (F). Chaus (E).
نوع من الشق ، طوله نحو ٦٥ سم. وذنبه ٢٢. ثوبه
امسح اللون الاغبر ، ابيض البطن ، اكلع العين ، اسمر
المخاض . موطنه شاسع الاطراف يعم الحبيشة والنبوة
وبصر ولبنان وسورية والعراق وبلاد فارس حتى بحر
فردوس .

٣٠٦٩٧ - **وَشَقُّ حَيْبِي * ،**
Lynx caligatus (S). Lynx botté (F). Booted lynx (E).

نوع من الشق ، طوله نحو ٦٧ سم. وذنبه ٣٠. ثوبه
اغبر اللون ابيض المتق اسمر الخد . ريشة الذكر عاقبة
لامعة ويظهر زرقاء المواج . ريشة الانثى باهية وفيرتها وودية
المواج . موطنه افريقية الشرقية وبلاد فارس والهند . يكثر
في الحبيشة .

٣٠٦٩٨ - **وَشَقُّ قَهْدِي * ، نَهْ ، فَتَجَلْ**

Lynx pardinus (S). Lynx pardé (F). Pardine lynx,
Southern lynx, Spanish lynx (E).
نوع من الشق ، موطنه الشرق الاوسط وادوية الجنوبية .
وهو اصغر جثة من الشقن الادوي واغبر سلفاً . ثوبه
كثوب القهد لوناً وريشة . راجع نته .

٣٠٦٩٩ - **وَشَقُّ كَنْدِي * ،**

Lynx canadensis (S). Lynx du Canada (F). Canada lynx, Peeshoo (E).
نوع من الشقن الايربكي ، اصغر جثة من الادوي واكبر
من القهدي . طوله نحو ١٠٥ سم. وذنبه ٥١. موطنه كندا
وبعض ارجاع ايربكية الشمالية . ثوبه امسح اللون ،
حنطي المواج ، اسمر الريشة . ذنبه اغبر اللون آخر المواج
اسود الطرف .

٣٠٧٠٠ - **وَشَكْل**

Suint (F). Yolk (E).

هو نتوع او مصالة صوف الدم . راجع نص .

٣٠٧٠١ - **وَشَكْلِي * ،**

Ambulacraire (F). Ambulacrum (E).
الجهاز الرثلي بحجرة اقنية متشابكة تسمح بمرور الغذاء
عند الشوكيات .

٣٠٧٠٢ - **وَشَم**

اول ظهور النبات على سطح التربة . ج وشوم وشام .

٣٠٧٠٣ - **وَشَمِيَّة * ،**

Mastigosporium (S).
جنس فطور مجهرية من الرطحيات يتميز بجهرية الكنتيدية
الاسطوانية ، القصيرة ، المتنامية ، الشفافة التي تحمل في
اطرافها كنانة فردية ، مدنية ، ورية الانقسام الثوري .
بويضاته مستطيلة عليية || انواعه قليلة ، اعرفها وشية
التجبل ورشية الترس .

٣٠٧٠٤ - **وَشَمِيَّةُ الْفَرَسِ * ،**

Mastigosporium lupini (S).
فطر مجهرى يركب اوراق الفرس فيسبب ذبولاً واحمالاً
الباسك || مظهره الخارجي لطخ خفيفة مستطيلة سمراء
اللون ، زيتونية المواج ، تركب الاوراق فتذفها وتغدها
الى الذبول والاحمال || ينشط في الموامق الظليلة الرطبة .

٣٠٧٠٥ - **وَشَمِيَّةُ التَّجِيلِ * ،**

Mastigosporium calvum (S).
فطر مجهرى يصيب اكثر التجليات البرية في اوراقها

اطيلها ويلوحها || مظهره الخارجي لطخ مستطيلة مبشرة
لطفاً يراوح من ١ الى ٨ سم. لوناً الى الجزية العاقبة .
تركب نصل النصف فقرته وتلقوه || ينشط في الموامق
الرطبة وريته نشاطه المواميل الجوية الملائية .

٣٠٧٠٦ - **وَشَن**
Eclage (F). Low-water mark (E).
وشن وشنن الماء : قل . زين الشين هو زين البروس اي
قلة المياه النابتة او الجارية .

٣٠٧٠٧ - **وَشَنَّة**
Griotte (F). Morello cherry (E).
اسم شامل يطلق على مختلف ثمار غروب الكرز العادي
التي تتميز بصفرها وحوضها .

٣٠٧٠٨ - **وَشَن**

طائر من الصقور وهو غريب من الشامين او عرق منه .
كل ما قيل فيه : « طائر شبه الشامين وليس به » .

٣٠٧٠٩ - **وَشَبِج ، هَلِكُونِيَا**

Heliconia (S). Héliconie (F).
جنس نباتات عشبية مسرة من فصيلة الموزيات . انواعه
المعروفة ٩ ، اصلها البلاد الاستوائية والحارة . تزود
لازئين وهي قريبة الشبه من الموز تنمو من ١٠٥ الى
٤٥٠ سم. اوراقها كبيرة القد ، نصلها اعليها على الشكل
مالس الصفحة الجامدة الزاهية الخضار . كسانها كبيرة
القد تنمو من ٤٠ الى ٨٠ سم. انواعها متراكبة ، كثيرة
البعد ، مختلفة الالوان الهية .

٣٠٧١٠ - **وَشَبِجَة**

Racine secondaire (F). Secondary root (E).
من الجذور الثانوية التي تنشعب عن الرئيسة . ج وشائج .

٣٠٧١١ - **وَشَبِج**

Palissade, Hais (F). Palissade, Hedge (E).
سياج من قصب او قضبان متشابكة وكل ما غرس او
وضع حول الحديقة من الشجر والشوك والاسلاك متسا
لباحة الدخول .

٣٠٧١٢ - **وَشَبِج**

هو سقف البيت وهو ما يمس وسقط من ورق الشجر .
ج وشائج .

٣٠٧١٣ - **وَشَبِيَّة**

Fuseau (F). Spindle (E).
شكل تشدوب هيكلي شائع الاستعمال في بعض انواع الانجار
المشجرة . والشكل الرشي يكون عادة ابيض قاعدة من لثري
واقل ارتفاعاً منه .

٣٠٧١٤ - **وَشَبِيَّة**

Allantoida (F). Allantoid, Allantolic (E).
ملحق جنسي يظهر في اول الحمل ويستمر حتى تحقن يوا
ثم يتلاشى .

٣٠٧١٥ - **وَصَامَةُ * ،**

Pathologie (F). Pathology (E).
علم يبحث في اسباب الامراض واعراضها .

٣٠٧١٦ - **وَصَامَةُ نَبَاتِيَّة * ،**

Pathologie végétale (F). Vegetable pathology (E).
علم يبحث في اسباب الامراض النباتية واعراضها .



وشق المناقب



وشق جنسي



وشق جنسي



وشق كندي

Tuteur de fait وصي خاص
Tuteur légal وصي شرعي
Tuteur ad hoc وصي فعلي
Cotuteur وصي مع غيره

٣٠٧٢٧ - وصية ، موصى به
Legs, Testament (F), Legacy, Will (E).
هو كل موقوف في وصية مكتوبة .

٣٠٧٢٨ - وصية عهدية ، وصية إستثنائية
Fidécummiss (F), Fidel-commissus (E).
هي الوصية التي يشترط فيها دفع المال الموقوف الى شخص
ثان بعد مدة معينة . فالوصي له الاول يدعى المهدى أو
المكلف والموصى له الثاني يدعى المستحق المهدى .

٣٠٧٢٩ - وصيد ٥
Athermane, Athermique (F), Athermanous (E).
نمت تعيش فيطلق على كل مادة لا تحتفظها الحرارة المشعة .

٣٠٧٣٠ - وصيد
Dru (F), Thick (E).
الزروع الوصيد هو الزروع المتقارب الاصول . والزراعة
الوصيدة : المقاربة النبات .

٣٠٧٣١ - وصيدة
حظيرة من الهجرة تتخذ المال بيتا المظيرة تكون من
التصيدة .

٣٠٧٣٢ - وصينغ
Crie des oiseaux (F), Cry of the birds (E).
صوت الصائير . راجع صقب .

٣٠٧٣٣ - وصيف
هو كريمة البر ، اطلها .

٣٠٧٣٤ - وضاء
Radiation nocturne, Rayonnement nocturne (F).
Nocturnal radiation, N. radiance (E).
ونهم من قال الرضاء الليلي ، هو اطلاق الحرارة التي كانت
قد تجتمعت في النهار .

٣٠٧٣٥ - وضام
Rémanence (F), Remanence (E).
خاصة تتميز بها بعض المشاعر التي يستمر انفعالها برعة
من الزين بعد زوال السبب الباعث .

٣٠٧٣٦ - وضع ، ولادة
Mise bas, Part, Parturition (F), Parturition (E).
غروج الجنين من رحم الانثى في نهاية مدة الحمل .

٣٠٧٣٧ - وضع الحدود
Abornement, Bornage (F), Delimitation, Fixing
limits (E).
وضع علامات بين ارضين للادلة على الخط الذي يفصلها .

٣٠٧٣٨ - وضع اليد
Mainmise, Occupation, Possession (F), Seizure,
Possession (E).
الملك في المباح انما يثبت بالاستيلاء عليه . والاخذ هو
الاستولي أو الشغل . راجع استيلاء .

٣٠٧٣٩ - وضعية
Assiette (F), Posture, Seat (E).
هي حالة الانس التي تقوم عليها بعض الامور .

٣٠٧٤٠ - كوصية الحق
Assiette de droit (F).

٣٠٧١٧ - وصاية
Tutelle (F), Tutelage (E).
نظام قانوني لحماية القمتر .

٣٠٧١٨ - وصع ، وصع
Troglodytes parvulus (S), Troglodytes mignon (F).
Wren (E).

عصفور ابد من الجوارح . جسمه صغير القد يطول نحو
١٠ سم . مقامه دقيق حاد الطرف . جناحه قصيران .
ذهبه متوسط الطول . ثوبه الى الرتبة السوداء يعلوها تيجع
معرض اسود . يأنف الحداثق والادفال والوسج والسماجات .
قوته الديدان والناكب والذباب والحوام . يدخن في الادفال
والاجنات الكثيفة . اثناء تحنن مرتان في السنة . حفتها
تراوح من ٦ الى ٨ بيضات وتستمر ١٢ يوما .

٣٠٧١٩ - وصعيات
Troglodytidae (S), Troglodytidae (E).

لصيلة طير من الجوارح لاقتات التمل سنيات المناخير .
اجناسها وافواها المعروفة نحو ٦٠٠ صنفها يشمل معظم
سناطق القاروين القديمة والجديدة || معظم طيورها صغيرة
القد ، نحيلة اناثايد القليلة الانعطاف . قصيرة الاجنحة
والاذناب المستديرة الاطراف . دقيقة الارباع الرفيعة ||
تألف الادفال . طيراتها قصيرة الشوط كثير التصعيد
والتهبيط . تسرح على الارض تحفة وتسلو بسرعة . قوتها
التمل والحشرات الصغيرة والدويبات || اشهر اجناسها
اطلافا الوصع .

٣٠٧٢٠ - وصف ، تعريف
Signalement (F), Description (E).
تحديد اشكال الحيوان وعلاماته الفارقة بعد ذكر اسمه
او رقه وتحدده وسلالة وعمره .

٣٠٧٢١ - وصف ، تحت
Qualification (F), Qualification, Title (E).
هو في القانون المدني تحديد طبيعة العلاقة القانونية . وهو
في القانون الجنائي تعيين وضع الجريمة في نطاق النطاق
وموجبات القانون .

٣٠٧٢٢ - وصل
Récépissé (F), Receipt (E).
محرد يدون فيه تسلم اوراق او اشياء للاطلاع او الحفظ .

٣٠٧٢٣ - وصم
Maladie (F), Disease (E).
الوصم هو المرض . ج . وصوم ووصام .

٣٠٧٢٤ - وصم سكو
Mal secco
هو سنادارية الحمضيات ، اطلها .

٣٠٧٢٥ - وصصيات ٥
Périnosporées (F), Peronosporae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصنانيات . تتميز بمشيجها
المريضي الفطري الدائلي الذي لا يخرج من دعاماته .
تكاثرها بيئي خارجي || اجناسها ستة . اربعة منها
تركب النبات فتؤذي به في التسنه والصنائه والصنيل والذئبة .
واثنان لا يؤذيان .

٣٠٧٢٦ - وصي
Tuteur (F), Guardian (E).
هو الذي صار قيمته السهر على مصلحة القاصر وادارة
اموله وتقبله امام القضاء وهو قد يكون :

وصي بالوصية
Tuteur testamentaire



وصع

وضعية الرهن
وضعية الضريبة
وضعية العقار
٣٠٧٤٠ - وَصَمَ
خشفة الجزار يقطع عليها اللحم .

٣٠٧٤١ - وَصِيحِي
هو أرغ الجزيرة ، اطلاله .

٣٠٧٤٢ - وَطَ
هو صوت مجنحات الايدي من وطواط وخفاش وسحابة الخ .

٣٠٧٤٣ - وَطَارَ *
طائر وحيد الجلس والوتر من كثبات القدم وفضيلة مصيحات الخناير || ملجته الحياتي جماعي . يكثر وجوده في جزر المحيط الهادي . جسمه متوسط القد . جسمه سميك البطة الصغيرة . راسه معتدل الجرم . يتميز برسابة الزند الذي يلفظ الصفحة العليا من المنقاد . عتقه معتدل الطول . جناحه كبيران لاسفان . ذنبه قصير مقطوع الطرف || ثوبه الى الزبدة تعلوها ماجات بنفسجية وزرقاء بطنه الى البياض الاخير .

٣٠٧٤٤ - وَطَالَفَ حَرْبَاءَ *
Stratiomyia chamaeleon (S).
Stratiome caméléon, Mouche armée (F).

حشرة من فصيلة البطافيات . تألف الموطن الرطبة . جسمها متوسط القد ، بطول من ١٤ الى ١٦ سم . رأسها كبير الجرم ، قليل التشوؤ . عينها فارتقتان . زباناها مرققاني . صدرها كثيف الحمل . حبيبتها صفراء اللون ، ثنائية المناقص الحادة . ثوبها الى الزرقاء السمره يملوها في بطنها يتجصص اصفر هندسي الشكل || يرقبها دودية ، غبراء اللون ، سمره الرأس .

٣٠٧٤٥ - وَطَالَفَاتِيَّات *
Stratiomyidae (F). Stratiomyidae (E).

فصيلة حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، منتشرة في جميع اصقاع العالم || اجسامها لحمية ، متوسطة القد او صغيرة ، شبيهة بالذباب . رؤوسها شبيهة مستديرة . عينها لقياسية الاثنا عشر متاكها حشة لا تصلح للسم . قرونها الاستشارية متجانبة الاشكال ، تكثر فيها الاستقامة ، حدد فصلها يراوح من ٤ الى ٨ . صفورها ملحومة بضمل قصير ملهب اللون او لفي . حبياتها شاذكة او سرسة . قوائمها حريافة . بطونها خاسية او مداسية السكم الواضحة . رواشتها نسيطة ، شفاقة ، مطيعة الاسترسل عند الزحاة || اناثها اكبر من ذكورها . يرقابها دودية الشكل ، غبراء اللون ، فسيمة الرؤوس التي تنقبض في مقدم الجوشن . جميعها ناعمة تعيش على المواد النباتية والمضوية || اشهر اجناسها الوطافة والبرية والسمننة .

٣٠٧٤٦ - وَطَامَاكَه *
Monotoma (S).
Monotome (F). Monotome (E).

جلس حشرات من فصيلة البطافيات ورثبة عذبات الاجنحة . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض اصقاع البلاد الباردة والمتدلة الحرارة || اجسامها صغرة تطول من ٢ الى ٣ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عينها

صغرة ، ناعمة . تأثيرها وتكونها نظامية . قرونها الاستشارية دويسية الاطراف . كواسلها مستطيلة الشكل ، مسنة الخثار . الحامدا وشمية ، لا تلتف كامل البطن . اثوابها وحيطة اللون ، يكثر فيها الاسمر والاصفر || جميعها دامة تعيش على المواد النباتية المنحلة والساخرة الى الانحلال .

٣٠٧٤٧ - وَطَامَاتِيَّات *
Monotomidae (S).
Monotomidés (F). Monotomidae (E).

فصيلة حشرات من عذبات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغرة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها صغرة ، مخروطية الشكل . عينها بارزة . تأثيرها وبلاسها نظامية . قرونها الاستشارية دويسية الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها مسنة الخثار . الحامدا شبيهة بمجنبة الشكل ، لا تلتف كامل البطن . قوائمها نسيطة . ارجاسها رباعية العقل . اثوابها ملونة || جميعها دامة . بعضها يعيش في قري التلل اعصها النمل الاكثف || اشهر اجناسها الوطامة .

٣٠٧٤٨ - وَطَاوِيط *
Mégachiroptères, Grandes chauves-souris (F). Megachiroptères (E).

مرئية حيوانات من مجنحات الايدي ، تشمل فصيلة البطافيات والعديد من الاجناس والانواع . تتميز بأذنانها الارثدية ، بأنوثها الارثرفية وبأذنانها ، عند وجودها ، المتكررة تحت الشفاء الجلد ، والقاعدة النخذية .

٣٠٧٤٩ - وَطَبَ *
هو الفصر العظيم في البقر والدنم والماضر .

٣٠٧٥٠ - وَطَبَاءَ *
الطباء : المنظمة الفصر كدوك بقرة ولطباء او عز وطباء .

٣٠٧٥١ - وَطَحَاتِيَّات *
Mucédinées (F). Mucedinas (E).

عارية فطور مجهرية من فصيلة الكنتيات . تتميز ببوطها الشفاف او القليل التلون || اجناسها عديدة ، فوارقها مركزة على تركيب شكل الكنتيات . امرها من الرسبة الاقتصادية الزراعية حسة : الحودن ، اللندام ، السلمية ، الكتن والكنتية .

٣٠٧٥٢ - وَطَحَاتِيَّات *
Mucedinaceae (S).
Mucedinacées (F). Mucedinaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من مرئية الحياتيات ودبة الزوحيات . تتميز ببوطها اللاتياشي الترتيب والتضبيب فهو غشي التجميع او ميسر وهو عادم اللون شفاف او مشع التضبيب الزاوي . كئالها متعددة الاشكال والاولون . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها غش حمارات ، الزيكيات والبطيات والفيتيتيات والمماصيات والقيسيات والمهريبات .

٣٠٧٥٣ - وَطَدَ *
Tasser (F). To compress (E).
وطد الارض شرجيا بالبطلة لتصلب لاساس بناء او غيره .

٣٠٧٥٤ - وَطَمُونِيَّة *
هي الواسونية ، اطلها .

٣٠٧٥٥ - وَطَنَ *
راجع بده .



وطار



وطانة

٣٠٧٥٦ - وَطواط

Chauve-souris (F).

Bat, Fliettermouse (E).

اسم شامل عام يطلق على جميع حيوانات رتبة عثحات الالدي .

٣٠٧٥٧ - وَطواط

سمكة بحرية تسمى شفين العمق ، اطبا .

٣٠٧٥٨ - وَطواطيات

Pteropodidae (S).

Pteropodidae (F). Pteropodidae (E).

فصيلة من الرطرايط . اجناسها ٨ وانواعها ١١٠ جميعها ثامرة ، كبيرة ومتوسطة القد . تتميز بوقوف أذنبا البوقي الشكل . انثاها تضع جرراً واحداً تحمله دائماً وترضعه في انثاء طيراتها . اما اجناسها الثانية فهي : الحيت ، الحويش ، الرناسة ، السرماب ، السطوم ، الشقاسة ، الثلاثة والساعة . (اطبا في مواضعها) .

٣٠٧٥٩ - وَطِيب *

Isocardia (S).

Isocardia (F). Isocardia (E).

جنس حيوانات بحرية من فصيلة الطيريات ورتبة الرغويات صفيحات الخياشيم والارجل . انواعها المعروفة حديثة اصطلحها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . اصداها شبه قلبية الشكل معتدلة الحجم او صغيرة ، مائسة الصفة او خافتة التخليد التحيل يلصقها غشاء ليفي المادة دقيق تعيش في رمال واسحال مصبات الانهر .

٣٠٧٦٠ - وَطِيبَة

Utricule (F). Utricule (E).

تجويف كالنقرة يوجد في جدار الطلع يستوعب المادة الغضبية .

٣٠٧٦١ - وَطِيبَة

Assise du mur (F).

وطيبة ج : طلاء : هي قواعد البنيان أي اساسه .

٣٠٧٦٢ - وَطِيبَة

حياء الاثنى من ذوات الحافر .

٣٠٧٦٣ - وَطِيب

Canon (F). Shin (E).

عضو من قوائم أخيل وهو في الفرس بين الركبة والحوش في القانتين الاماميتين ، وبين المرقوب والحوش في القانتين الخلفيتين .

٣٠٧٦٤ - وَهَاء

Vaisseau (F). Duct (E).

هو الانبوب الكائن في نسج النباتات الزهرانية ، وهو يتبع على اشكال مختلفة اشيعها الحلزوني والشبكي والمفقط .

وهاء حلزوني

Vaisseau spirale (F).

Spirally duct (E).

وهاء شبكي

Vaisseau réticulé (F).

Reticulated duct (E).

وهاء منقط

Vaisseau ponctué (F).

Punctuated duct (E).

٣٠٧٦٥ - وَهَات *٥

Melyris (S).

Mélyris (F). Melyris (E).

جنس حشرات من فصيلة الوريثيات ورتبة غديات الاجنحة اتواها المعروفة نحو ٣٠ اصطلحها مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اجناسها شبه اعليجية الشكل ، معتدلة الاسدياب ، طولها من ٨ الى ١٦ م . رؤوسها مستترضة ، قليلة التشوؤ . عيونها صغيرة ، بارزة .



رطب



وهات

تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعالية قلادية . كواسلها مقيمة الشكل . احماها لاسفة ، ثنائية الفلوح الناشرة القاطية . قوائمها نشيطة . اوثابها ملونة تكثر فيها الحفرة والصمحة . جميعها واثمة ومفترسة تعيش على رقيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات . يرقاتها مفترسة .

٣٠٧٦٦ - وَهَاتِيَّات *

Melyridae (S).

Mélyridae (F). Melyridae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اصطلحها بعض مناطق افريقية الشالية وحوض البحر الابيض المتوسط . اجناسها شبه اعليجية الشكل ، طولها من ٩ الى ١٨ م . رؤوسها مستترضة ، قليلة التشوؤ . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعالية قلادية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مقيمة . احماها لاسفة ، ثنائية الفلوح القاطية ، قليلة الرخافة ، معتدلة الصلابة . قوائمها نشيطة . ارسافها خماسية المعقل . اوثابها ملونة . جميعها واثمة ومفترسة ، تعيش على رقيق الازهار وما تقتنصه من صغير الحشرات . يرقاتها مفترسة . اشهر اجناسها الوصات .

٣٠٧٦٧ - وَهَات

Rosier jaune (F).

هو الوردة الاصفر ، اطبه .

٣٠٧٦٨ - وَهَاتِيَّات البُذُور

Angiospermes (F).

Angiospermes (E).

وهاتيات البذور او مستورات البذور او النباتات مغطاة البذور هي احد قسمي باديات الزهر . وهذا القسم يشعل النباتات التي تكون بيضها في مبيض وبزرها في ثمرة .

٣٠٧٦٩ - وَهَاتِيَّ

Vascularisation (F).

تغير فيزيولوجي ، راجع قَسَوِيَّة .

٣٠٧٧٠ - وَهَب

Terrain plat et vaste (F).

الموضع الواسع المستقر من الارض ، ج : وخاب .

٣٠٧٧١ - وَهَتْ

Epiphytis (F). Epiphyty (E).

وهوت النبات : علها واصحابها في منطقة معينة .

٣٠٧٧٢ - وَهَتْة

Colcoasporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الوشيات يتميز بانثاده المتراكبة المتشابهة وبدعاماته الاسطوانية المستطيلة الدقيقة القاعدة . انواعها قليلة تنطفل على نباتات الفصيلة الصنوبرية فتركب الاهداب وكؤفا . مظهرها الخارجي بطور مستدرة مبرزة متفرقة لونها الى الجوزة يفسحها اطار بنسجي ، تثبت على التصل نحو السنة ثم تتطور بعد ذلك الى حويصلات ملطحة القاعدة العريضة ، مستديرة القمة ، طولها من ١ الى ٢ م . لونها الى البياض التي يرشح منها عند اكمال دورها الفطري وبعد انفجارها نقطة من الراتنج . اغزارها زهيدة لا تستوجب للمكافسة .

٣٠٧٧٣ - وَهَاتِيَّات *

Colcoasporiaceae (S).

Colcoasporiaceae (F). Colcoasporiaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات تتميز بركباتها التي تحضن الدعامات ، دعائتها عمودية الانغلاق ، رباعية الانحية ، شمعية الانقسام ، غليظة الجراب البوقي . اجناسها قليلة ، اعرفها الوهة والسبع .

٣٠٧٨٣ - وَحْلُ الْمَصْرِيِّ الْحَارِي*

Dactylopius adonidum (S). Pou blanc des serres (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات. محارية الشكل، صفراء اللون، مركزية السرة، غبرار الرأس الشمعي. تركيب نباتات المصاري وقنفذ بها.



وَحْلُ التين

٣٠٧٨٤ - وَحْلُ صَيْتِي

هو قرمزية فوريوزا، اطلبها.

٣٠٧٨٥ - وَحْلُ مَعَارِي

هو قرمزية التفاح، اطلبها.

٣٠٧٨٦ - وَحْلٌ، وَحْلٌ، وَحْلٌ، وَحْلٌ، وَحْلٌ

Bouquetin (F). *Steinbok* (E).
جنس حيوان بري جبل. يجتر من فصيلة التلييات. قريب الشبه من الماعز التي تحدثت عنه. أنواعه عديدة، جميعها ريمة الجثة، كبيرة القرون الفليطة المنحنية القوية. الانثى تنال الاختلاف تضع جدياً واحداً في أواخر حزيران يتبع أمه بعد الوضع بثلاث أو أربع ساعات || اعرف أنواعه وأشهرها: | أوبل واليند والثيتيل والملاخور والميرز. ج أوماو وويل.



وَحْلُ الْمَصْرِيِّ الْبِلَط

٣٠٧٨٧ - وَحْلٌ أُرُوْبِي *، وَحْلُ الْأَلْب

Capra ibex (S). *Bouquetin des Alpes* (F). *Steinbok of the Alps* (E).

نوع من الوحل. موطنه جبال الألب. جسمه ربع الجثة مسنوب القالب يطول ١٥٠ سم. يطو نحو ١٠٠ وزن ٧٥ من ١٠٠ كيلو. لونه سوي اللون يخطف مع العمر ربع ضلي الصيف والشتاء. وهو يواحد بين الشبهة الصنابية والصمرة. خط ثيابه أكهف اللون. ابتلاء وبطنه أبيض من ظهره. قرواه ضليخان منحنيان كسيفين أحدين. الأنثى أصغر قرناً من الذكر.

٣٠٧٨٨ - وَحْلُ الْهَقْفَقَس *، ثُرُ

Capra cylindricornis (S). *Bouquetin du Caucase, B. à cornes cylindriques, Tur* (F).

نوع من الوحل قريب الشبه من الغنم. موطنه جبال القفقاس. طولك يراوح من ٦٥ إلى ٦٥ سم. وأرقلاته كذلك. قرنه يطول نحو ٦٠ سم. وهو يشبه قرن الكباش شكلاً وانسلاطاً. ثوبه إلى الكهبة، لحته قليلة الشعر سواد اللون. إجله يعد من ٦ إلى ١٠ أزواج.



وَحْلُ الْمَصْرِيِّ الْحَارِي

٣٠٧٨٩ - وَحْلُ حَبْتِي

Capra wali (S). *Bouquetin d'Abysinie* (F).
نوع من الوحل. موطنه جبال بلاد الحبشة من ارتفاع ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ م. وهو صلب الجثة أحسن القرن محدب الجبهة. إجله يعد من ٧ إلى ١٥ زوجاً.

٣٠٧٩٠ - وَحْلُ سِيْبَرِيَّة

Capra sibirica (S). *Bouquetin de Sibirie* (F).
نوع من الوحل. موطنه شاسع الأطراف يمتد من حلايا إلى شرقي سيبيريا. جسمه كبير القند قدره قدر الوحل الآروي. إلا أنه أفتح لوناً وهو كحيث اللحية مستطيل القرن. إجله يعد من ١٢ إلى ٢٠ زوجاً.



وَحْلُ أُرُوْبِي

٣٠٧٩١ - وَحْلُ عَرَكِي

ويُدعى أيضاً وَحْلُ التوبة، هو البذن، اطلبه.

٣٠٧٩٢ - وَحْلُ قَارِصِي

هو البزل، اطلبه.

٣٠٧٧٤ - وَحْش - وَحْلُ (F). *Dryandra* (S).

جنس جنيات أليفة معمرة من فصيلة القضييات. أوراقها لا نظامية الترتيب بها المتعاقبة والفصية والبمترية. أزهارها رويسية الجميع تحفظها قاذلة من القناب الخروطي الشكل. اعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع.

٣٠٧٧٥ - وَحْش لَشْجِي

Dryandra nivea (S). *Dryandre blanc de neige* (F).
نوع من الوص، جنيته تملو نحو ١٠٠ سم. أرونها مادة. فرووها قصيرة عقدة. أوراقها مفصصة، نصلها يطول من ١٠ إلى ٢٠ سم. مسحة السفل خلية البشرة فضية اللون. رؤوساتها الزهرية بيضيه الشكل. أزهارها بيضاء اللون، قناتها خلية البشرة حنطية اللون والمواج. ثمره يستمر من آذار إلى أيار.

٣٠٧٧٦ - وَحْش فَخَايِر

Dryandra formosa (S). *Dryandre magnifique* (F).
نوع من الوص، جنيته تملو نحو أربعة أمتار، ساقها عقدة. فرووها أطروعية منتصبة مستطيلة. أوراقها صلبة متراكبة، نصلها ضيق الصفحة يطول من ١٢ إلى ٢٠ سم. ويعرض من ٦ إلى ٨ سم. رؤوساتها الزهرية بيضيه الشكل. أزهارها برتقالية اللون، قناتها حر || ثمره يستمر من أيار إلى تموز.

٣٠٧٧٧ - وَحْش كَثِيرُ الزَّهَر

Dryandra floribunda (S). *Dryandre multiflore* (F).
نوع من الوص، جنيته تملو من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. ساقها قرءة. فرووها لينة العود الخشن. أوراقها متعاقبة؛ نصلها اهليلجي الشكل، مسن الحافة، مائل البشرة على مسطحه. أزهارها صفراء اللون، قناتها حنطية. ثمره يستمر طوال فصل الصيف.

٣٠٧٧٨ - وَحْشَاء

الرملة البنية يصعب فيها المشي. ج وحاش وأوعاش.

٣٠٧٧٩ - وَحْلُ أُرُوْبَانِي

هو قرمزية الحمضيات، اطلبها.

٣٠٧٨٠ - وَحْلُ التَيْن *

Lepidosaphes minima, *L. conchyiformis*, *Mytilaspis minima* (S). *Cochenille virgule du figuier* (F).
حشرة صغيرة من القرمزيات، جسمها كروي الشكل تملو يراوح من ٢ إلى ٣ سم. ثوبها أبيض اللون، رتمها الشمسي قليل المادة والانتشار. جملها الحولي واحد. تمتع مكثها تدريجياً فلول غير نيهان ينفذ من يرقات تبني انسلخاتها في أواخر الصيف. ألقبها سوس البحر المتوسط. تركيب اثنين دين سواء تنقذه إذا كثرت لأنها تفتي الساق والأغصان.

٣٠٧٨١ - وَحْلُ الْحُمْضِيَّات

هو قرمزية الحمضيات، اطلبها.

٣٠٧٨٢ - وَحْلُ الْمَصْرِيِّ الْبِلَط*

Eucalymnatus tessellatus, *Locanum tessellatum* (S). *Cochenille plate des serres* (F).

حشرة صغيرة من القرمزيات، جسمها بيضي الشكل يطول من ٣ إلى ٤ سم. ويعرض نحو ٢. ثوبها إلى البني الاسمر. أطرافها غبرار اللون مسنة، جانباها شامغان. تركيب مسطع نباتات المصاري اعصها التخليلات والسحليات.

Engraissement (F). **وَعْنَنٌ**، **وَعْنَنٌ** ٣٠٨٠٢
Fattening (E).

توسعت اللحم ولايقار : بلغت غاية السمن .

Lacérîte (F). **وَعْنَكَة** ٣٠٨٠٣
شكل من التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Lacérítique (F). **وَعْنِيَّة** ٣٠٨٠٤
صفة اقوية وهي التراب الصلصالي الاحمر اللون .

Chacal du Sénégal (F). **وَعْوَع** ٣٠٨٠٥
رابع ابن آوى الافريقى .

٣٠٨٠٦ - **وَعَال** البقال وكل بائع يغفل ثمن الاشياء .

Aubergine (F). **وَعْد** ٣٠٨٠٧
هو الباذنجان ، اطليه .

Imperméable (F). **وَقَاص** ٣٠٨٠٨
Impermeable, Impervious (E).
الوقاص : المكان يحسك الماء . والترية الوقاص هي التي تحفظ الماء ولا تسرب .

Eplucher (F). To pick (E). **وَقَل**، **وَقَل** ٣٠٨٠٩
وقل وقول الشيء قشره فهو واقل .

Philodendron (S). **وَقِيل** ٣٠٨١٠
Philodendron (F).

الواحدة وقيلة . جنس نباتات جلدورية مادة معمرة من فصيلة التوتليات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠٠ منها نباتات بعض مناطق البلاد الاستوائية اغصانها امريكة الجنوبية || بعضها جلدورية معمرة . اوراقها متعاقبة ، متفكة ، كبيرة القذ ، شبه قلبية الشوزن ، جامدة التصل الغرض والمشرم . ازهارها ملطمة كما في النخل . ازهارها شديدة الصفرة ، عريفة ، مستحبة الازرع || تزروع التزين في المراكن داخل المساكن .

Exatbuminé (F). **وَقِين** ٣٠٨١١
نعت تعريفي يطلق على كل بذرة او ثفلط عادم الراح اي الابوين .

Cri de la pie-grièche (F). **وَقِيَّ** ٣٠٨١٢
الوق هو صباح الصرد .

Chronomètre (F). **وَقَات** ٣٠٨١٣
Chronometer (E).
جهاز بسيط دقيق الصنع يستعمل لتحديد الوقت الذي استرجيه العمل المطلوب .

Chronométrie (F). **وَقَاتَة** ٣٠٨١٤
Chronometry (E).

Combustible **وَقَاد** ٣٠٨١٥
ما توقد به النار ، اطلب وقود .

Certhiola (S). Certhiola (F). **وَقَال** ٣٠٨١٦
جنس طير من الجولثم ريقات الخناير وفصيلة المغرثيات . انواعها المعروفة نحو عشرة منتشرة في معظم المناطق الحارة . اغصانها امريكة الجنوبية || اجسامها مخططة القذ .

Commelina (S). **وَعَلَّانٌ** ٣٠٧٩٣
Commeline, Commelyne (F). Blue spiderwort (E).
Commeline (D).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوردانيات . انواعها زهاء ٨٠ معظمها بري وبضها طيب وزيتي . سوقها منتصبة او مدادة . اوراقها لا قياسية الشكل تكثر فيها الاستطالة . ازهارها لا نظامية التجميع ، سوية الالوان تلب فيها الزرقاء || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣٠٧٩٤ - **وَعَلَّانُ الْبَنْجَال**
Commelina banghalensis (S). Commeline du Bengale (F).

نوع من الوردان ، ساقه وفروعها مدادة تنصب عند اطرافها . اوراقه بيضيه مقطوعة ، تصلها الى الخضار الزاهي ، اعوادها موحدة بالاخر . ازهارها كثيرة العدد ، بتسجية اللون ، صغرة القذ || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٧٩٥ - **وَعَلَّانُ سَيَاوِيَّ**
Commelina coelestis (S). Commeline céleste (F).
نوع من الوردان ، قاعدة ساقه دوفسية الجث السطيل . ساقه فراء زياء تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه لاطة اهليجية الشكل . تصلها خلى الصفحة العليا ، امط السطل . ازهارها الى الزرقاء السابحية ، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٥ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٦ - **وَعَلَّانُ فِيرَجِينَة**
Commelina virginica (S). Commeline de Virginie (F).
نوع من الوردان ، ساقه منتصبة فراء تملو من ٥٠ الى ٩٠ سم . اوراقه سنائية الشكل ، تصلها جامد الصفحة يطول من ٧ الى ١٣ سم . ازهارها الى الزرقاء السابية الزاهية ، قطرها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ م || تنوره يستمر من حزيران الى ايلول .

٣٠٧٩٧ - **وَعَلَّانُ مُنْتَصِب**
Commelina erecta (S). Commeline dressée (F).
نوع من الوردان ، ساقه منتصبة قليلة الفروع تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقه محدبة ضيقة التصل تطول من ٨ الى ١٥ سم . وكعروض من ١٠ الى ٢٥ سم . تحملها خلى البشرة يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ازهارها الى الزرقاء الجسيلة ، قطرها يراوح من ١٥ الى ٢٠ م . || تنوره يستمر من آب الى تشرين .

٣٠٧٩٨ - **وَعَلَّانِيَّات**
Commelinaceae (S).
Commelinacées (F). Commelinacées (E).
فصيلة نباتية من رسيديات الفلق . اجناسها وانواعها عديدة مجمها من نباتات المناطق الحارة . اشهر اجناسها الوردان والمكايبة والزبرية والطينسية .

٣٠٧٩٩ - **وَعِلَة**
Bouquetin femelle (F).
Cow-bouquetin (E).
الوعلة اثنى الودل .

٣٠٨٠٠ - **وَعْنَة**
Gazelle femelle (F).
Cow-gazelle (E).
الوعنة اثنى الغزال .

٣٠٨٠١ - **وَعْن**
Fourmillière délaissée (F).
الوعن قرية النمل المهجورة . ج وعنان .



وردان



دليل



وقل

٣٠٨٢٧ - **وتسيتات** °
Gymnoscaecae (S).
Gymnoscaécés (F).
فصيلة ظلود مجهرية تنتمي إلى مرتبة التسيتات ورتبة الزقيات . تتميز بأوراق مريضة تلحمها خلفة السن البين الموجه || أجناسها وأنواعها عديدة تصبها ثلاث عمارات: الترفيزات والظليات والمجويات .

٣٠٨٢٨ - **وتف**
Wakf
هو سبب العين ورصد ريعها على الوقف وذريه أو من يوصيه .

٣٠٨٢٩ - **وتف**
Suspension
٣٠٨٣٠ - **وتف الأثر**
Surannation (F).
وقت أثر العقد المؤقت المفسوخ عند أجل ما إذا هو لم يحدد في حينه .

٣٠٨٣١ - **وتفيل** ° ، **كثيريوس**
Chamaerops (S).
Chamérops (F).
جس اشجار ليفية برية ورتبية من فصيلة النخلات . منها البلاد الحارة . أنواعها عديدة بعضها أسوي المنبت ومنها الأفرني والأمريكي . سوقها جالسة تملو من متر إلى عشرة أمتار . أوراقها مدوارة ، كبيرة القد ، جميلة الخضار ، مستطيلة الزناد || أشهر أنواعه التريينة ما يلي .

الوقل الخافض
Chamaerops humilis (S).
الوقل الشائك
Chamaerops hystrix (S).
الوقل الصلب
Chamaerops mardiana (S).
الوقل الفاخر
Chamaerops excelsa (S).
الوقل الكونشيني
Chamaerops cochinchinensis (S).
الوقل المنفوط
Chamaerops forsteri (S).
الوقل المنشاري
Chamaerops serrulata (S).

٣٠٨٣٢ - **وتفيل خاشع** ، **مروحة**
Chamaerops humilis (S). Chamérops humble, Palmier éventail, P. nain (F). Dwarf palm, European fan-palm (E). Manpalm, Schirmpalm, Europäische Zwergpalme (D). Palma camerops, P. minore, P. femina (I).
نوع من الوقل لا ينش البرد العادي يعيش مثل معظم شطوط المتوسط . ساقه قصيرة . أوراقه مروحية جميلة الخضار الزهني المروج . يزود الثوبين ويخرج من أوراقه الياف قوية تصلح لصناعة الحبال . يتكاثر بالبذر .

٣٠٨٣٣ - **وتفن**
Dénicher (F).
To take out of the nest (E).
وقن وأوقن : أخذ الطير من محاضبه .

٣٠٨٣٤ - **وتفنة**
Nid (F). Nest (E).
الوقنة : حفن الطائر دثن في الشجرة .

٣٠٨٣٥ - **وتقوق** ° ، **تقبق**
Cuculus (S).
Cucou (F). Cuckoo (E).
جس طير من عمارة الوققيات وفصيلة الوققيات . أنواعه نحو ٧٥ منها متوسط القد قدوة قدر الحماة . أنواعها قريبة الشبه من ثوب الباشق مع ابدانه ورتبية وحسن تبيجه . تألف الإحراج . قن الحشرات . لا تحسن بيضها ولا ترق فراشها بل تضع بيضها غلطة في أوكان

مناديهما مستطيلة . أغانها مستطيرة الأطراف . أنواعها جميلة الألوان الزاهية يكثر فيها الأحمر والأزرق البنفسجي المروج || قن الحشرات وبعض الثار الباقية .

٣٠٨١٧ - **وقائد**
Tablettes en pierre (F).
الوقائد : الحجارة المفرشة في الخدائق والممرات ؛ وأسمها وقيد وقيدة .

٣٠٨١٨ - **وقائع الدعوى**
Points de fait (F).
في البيان بأحوال المتقاضين والحوادث التي نشأت عنها الدعوى .

٣٠٨١٩ - **وقاية**
Prophylaxie (F). Prophylaxis (E).
في جماع وسائل الحيلة والعناية الممكنة اتخاذها لتفادي الأمراض . راجع انتقاء واستعزاز .

٣٠٨٢٠ - **وقب** ، **حجاج العين**
Orbise (F).
Orbit, Socket (E).
في نقرة العين شبه هرية الشكل ريادية السطح . وما الثبات .

٣٠٨٢١ - **وقبة**
Orbitale (F). Orbital (E).
راجع مدارة .

٣٠٨٢٢ - **وقبي**
Orbital (F). Orbital (E).
راجع مداري .

٣٠٨٢٣ - **وقبيات** °
Arcifères (F). Arciferous (E).
لغة من مرتبة السويات عديمات الذنب سليات الأسنان . أنواعها الممرقة كثيرة المدد جميعها خمس فصائل : الشرفيات والمجويات والصفاجيات والكدياميات والكسريات || تتميز جميع صفاد هذه اللمة بدم مسالوة سطح غليظ قويمها الصلدي في مركز تلافيا || أشهر صفاد هذه اللمة المعلوم والشرف .

٣٠٨٢٤ - **وقر**
Charge (F). Load (E).
هو ثقل الحمل الذي يقع على أحمدة وقوف وجدران المباني . وهو يقسم إلى ثقل ميت مستقر وثقل حي متروك . ونظراً لكثرة الدوامل التي تدخل في حسابه فالقر قد يكون :

وقر الكسر
Charge de rupture (F).
Breaking load (E).

وقر متحرك
Charge mobile (F).
Travelling load (E).

وقر مستديم
Charge permanente (F).
Permanent load (E).

وقر لامركزي
Charge excentrique (F).
Essentric load (E).

وقر منطرد
Charge isolée (F).
Concentrated load (E).

وقر موزع بالتساوي
Charge uniformément répartie (F). Uniformly distributed load (E).

٣٠٨٢٥ - **وقركة**
Cicatrice (F). Scar (E).
هي الأثر في الجسم من أي سبب كان . ج. وقرات .

٣٠٨٢٦ - **وقس**
Gale (F). Scarf (E).
اسم شامل يطلق على جميع أنواع الجرب التي تتركب الحيوان والنبات . ومن قارة الجرب نهو مقوس وهي مقوسة .



وقل



وقواق

بالاسود الابيض وبالباليض . دواربه ، من الحوافر الى
الركب ، تينبة اللون . حوافره الى الاسود الاحمر اللامع .
ذنبه ذنب الزرافة وابلجلى الى الانش اصفر قدماً من الذكر
والنخل جسماً ، اما الذنب بنفسه .

٣٠٨٤٢ - وَكَاعَة حَرْجِيَّة * ٥

Drassus silvestris (S). *Drassode sylvestre* (E).
Syla drassus (E).

نوع من العناكب الساعية الفانصة ثنائية الروايب سداسية
المشاقن تنتمي الى فصيلة الكواحيات || جسدها مقوس
القد يطول عند الذنك نحو ١٣ م . وعند العنكة نحو
١٧ م . صدراسها زواوي الشكل ، اشجع اللون حطفي
المزاج . عينها زرقاوتان ، شمسها غليظتان . فكاهما
مستطيلتان نبطان . جزامها كبيرة ، كثيرة الحلب .
بطنها يبيض الشكل ، حطفي اللون ، احمر المزاج ، اسود
التنقيط المبرح ، ينتهي بشلولة دقيقة فارقة || تألف
الحراج والبراري . صكبتها وطاق تنسجه تحت الحجارة
والجفوع المستطبة . مسرعا جدوي يسمر من الغروب
الى الفجر . قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع . تسمى
الى قصها ركضا وتسمى بالمرافضة والخذاع || يبيتها
الشعوي يسمر من ١٦ الى ١٨ اسبوعا . تعيش نحو
ثلاث سنوات . والاشي تمتع المكان على دفعة واحدة في
غشاء من التماس متين الحيك تلفه وتحمله لاصفا بمشاتها
الى ان يم التفت . ثم تحفر الصغار على سطح بطنها نحو
اربعة اسابيع || تصبر من العويبات النافعة للاشوية .

٣٠٨٤٤ - وَكَاحِيَّات * ٥

Drassidae (S). *Drassidae* (E).
فصيلة عناكب من رتبة الزيلولات . اجناسها وانواعها
المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع اقطار العالم . جميعها
مفترسة ، متوسطة القد او صغيرة . تتميز بصدرها
البيضي اللون ، المبطلة الجرم وباستقامة اجزائها
الشعوية || األوانها متباينة الالوان . شعها وطاقت تقريبا
تحت الحجارة والجفوع المستطبة ولها الاجزاء والجلالة ||
اشهر انواعها الكواحة .

٣٠٨٤٥ - وَكَار * ٥

Coureur (F). *Runner* (E).
هو الداء ، اطلبه .

٣٠٨٤٦ - وَكَالَة * ٥

Coloré (F). *Coloured* (E).
وكب الشعر : لون وزعي وقد يكون ذلك عند الادراك .

٣٠٨٤٨ - وَكَب * ٥

Coloris (F). *Colouring* (E).
هو زعاج ماجة لون الشعر او اي لون كان .

٣٠٨٤٩ - وَكْسَة * ٥

Point (noir ou rouge) (F).
Point (black or red) (E).
نقطة سوداء او حمراء . اوراق موكوة : ظهر فيها نقط .

٣٠٨٥٠ - وَكُج * ٥

الوكج : هو المكان الصلب . يقال بلغ في سفره الوكج
اي بلغ الصخر .

٣٠٨٥١ - وَكُر * ٥

Nid (F). *Nest* (E).
الوكر : عش الطائر وان لم يكن فيه .

بعض الطيور ولا تلي في العش الولد أكثر من بيضة
واحدة . ذكرها أكثر جدداً من انثاها . وهي من الطيور
شبه القواطع تير في الليل . تحضي الرقيم والصيف في
الاناث الممتدة والحرب والشفاء في الاناث الدافئة || اشهر
انواعها : البوق المألوف والبوق المطوق والبوق المرتبط
والبوق الكبير الدارة والمقبس والفيب والقبوية والكوكو
والكركر والكركر والكلوك والفوق والحمام القوال والهوهر
والطالوطى .

٣٠٨٣٦ - وَفَوَائِيَّات * ٥

Cuculinæ (F).
عارة طير من فصيلة البقوييات . اجناسها اربعة وانواعها
المعروفة ١٤٥ موطنها اسراج العالم القديم . وهي باكريتها
من الطيور النافعة التي تلهم الحشرات . من ميزاتها الخاصة
انها لا تحسن بيضها ولا ترق فراخها وصوتها يشبه الوقوة .

٣٠٨٣٧ - وَفُود * ٥

Combustible
هي المواد التي تستعمل لتوليد الحرارة باستراحتها في الهواء .
تقسم الوقود من حيث حالتها الطبيعية الى ثلاثة اقسام
تدرف بالصلبة كاللحم والسائلة كالفحم والغازية كغاز
الاستيلاج . وتقسم ايضا من حيث مصدرها الى طبيعية
كالنفت والفحم وعشيرة الكوكمبول .

٣٠٨٣٨ - وَكِيد * ٥

Brûlis (F).
Denshered, Patch of burnt (E).
ما يقيد به النار من حطب ونحوه و الارض التي استرق
نبتها .

٣٠٨٣٩ - وَكَيْعَة * ٥

المقيد الذي اعتاد الطائر اتيانه والوقوف عليه .

٣٠٨٤٠ - وَكَيْعَة * ٥

Lamelle (F). *Lamella* (E).
الوكية والملازة ، راية صغيرة من الزنجاج متناهية في البقة
تستعمل لتغطية القطعة المطلوب مسحها تحت الحجر .

٣٠٨٤١ - وَكَاب * ٥

Dichroisme (F). *Dichroism* (E).
الركاب غشاء تتميز بها بعض الاجسام فتظهر لظاهر
البا كاتها غشية بلونين وذلك بالنسبة الى انعكاس النور
او انكساره .

٣٠٨٤٢ - وَكَاب * ٥ ، وَكِي * ٥

Okapia johnstoni (S). *Okapi de Johnston* (F).
حيوان يون مشاب يجر اكتشفه الرحالة الانكليزي السير
جونستون عام ١٩٠٠ في غابات الكونغو المناخلة لفضة
النشالية من نهر « سيمليكي » . يمشي من الحيكول والشكل
الحاربي ، كانه يتحدر من الزرافة ولهاها وحار الزرد .
يألف الغابات المصصية . مناطق مرتبة ترتفع عن سطح
البحر نحو ٤٠٠٠ م . ملجئه الحيائي زويبي || جسده
يطول نحو ٢٥٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٤٠ سم .
ارتفاعه الى الحاروك ١٥٠ سم . محادلاته السنية ٢٢ كفا
هي الحال عند الزرافة . رأسه معتدل الجرم . قصبة انفه
محدبة . خطمه وشي الشكل . حاروكه ارفع من الظهر .
عقه حلق الهامة . كلفه ككل حار الزرد ودواربه
متساوية كدواربه || ثوبه الى الجفوة القرمزية المزاج .
محراء الى البياض الاصفر . خطمه الى السرة القامحة .
جبهته الى الحرة النعومة . سبالته سوداء تمتد حتى الجحيلة .
اذناه اكبر من اذني الحار وهما كاسيتان جلويوتا اللون .
عقه وشكها الى الجفوة السوداء المزاج . فضلاء يجتمعان



زَنَاب



وَكَاعَة حَرْجِيَّة

Curatelle (F). **ولاية** ، **قائمة** ٣٠٨٦٤ -
Guardianship, Trusteeship (E).
هي إدارة شؤون وأموال المجهور عليه .

٣٠٨٦٥ - **وَلْت** الولت هو القليل من المطر .

Herbes effluées (F). **وَلَع** ٣٠٨٦٦ -
الولع هو التعب المستطيل .

Lapement (F). **وَلَع** ، **وَلْعَان** ، **وَلْعُوع** ٣٠٨٦٧ -
Lapping (E). شرب السباح بالسنتها .

Vivipara (F). Viviparous (E). **وَلَوْد** ٣٠٨٦٨ -
مدلول التكاثر التسلل بالولادة ، بماكسها يبيض .

٣٠٨٦٩ - **وَلَوَل** ، **بُؤْسَةُ الْأَطْطَال**

Otus ascalaphus (S). Hibou ascalaphe (F).
طائر من البوم ينتمي إلى عائلة البوميات ، موطنه إفريقية
الشالية ويبيض مناطق حوض البحر المتوسط . جسمه
صغير فقد يطول نحو ٣٠ سم - ثوبه أبيض من ثوب البومة
وأكتف برفقة . يألف الأطفال والاحراج ولا يقرب إلا ما كان
الأهله إلا عند سبب الحاجة . ينس قوته في الليل . يصيد
جميع أنواع القوارض والحشرات .

٣٠٨٧٠ - **وَلِسْتَكْرِيَّة** هي رشع الماء ، اطلبه .

Pollen **وَلِغ** ٣٠٨٧١ -
هو الصلح ، اطلبه .

Pollinique (F). Pollinic (E). **وَلِغِي** ٣٠٨٧٢ -
اطلب طلي .

Braula coeca (S). **وَلِغَشَةُ النَّحْلِ** ٣٠٨٧٣ -
حشرة راشنة مؤذية من فصيلة البليثيات ورقة ذوات
الجناسين || جسمها شديدة الصغر يطول نحو ١ سم . تعيش
كامل حياتها الحشرية معلقة بالنحل || مكثها شديدة
الصغر تحتمل الاثنى فرداً في الخلاء فيقتف من يرقات
متناحية الصغر والذقة تعيش على السكر الفزون والتخاروب .

Braulidae (S). **وَلِغَشِيَّات** ٣٠٨٧٤ -
Braulidae (F). Braulidae (E).

فصيلة حشرات راشنة مؤذية من رتبة ذوات الجناسين .
لها ثوبان يصعبها جنس واحد || اجسامها صغيرة ، صلبة ،
شبه بيضيه الشكل ، تطول من ١ إلى ١٥ سم . رؤوسها
صغيرة ، مبطلة . حيرتها دقيقة فائقة . قربها الاستعمارية
صغيرة ، صغيرة ، ثلاثية الفصل . كوالسها وبطنها
متناسقة . وهي عادمة الجناح والزرازان . قوائمها قوية ،
مشعبة الأطراف || اشهرها وباشة النحل .

Asterocystis (S). **وَلِغَشَة** ٣٠٨٧٥ -
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصمغيات . تكاثرها
لاشي . تتميز بنمطها البيضي المستطير الشكل المدمر للرباط .
تنقل على عدة نباتات زراعية فتركب جلودها وتؤذيها
وقد تميتها .

Asterocystis radialis **وَلِغَشَةُ الْجُدُور** ٣٠٨٧٦ -
نوع من الفطيرة تركب جلود بعض النباتات اخسها
الكتان والسلمج واللفت والنس والكرات والشوان والفتن

Partido (F). Pairing (E). **وَلِغ** ٣٠٨٥٧ -
الولع هو مفاد الطيور الالهية . واكم انديك السباحة :
سلفها . وكمت الهامة والباطة : خضمت لسفاد الذكر .

Vice (F). Defect, Viciousness (E). **وَلِغَف** ٣٠٨٥٣ -
هو العيب الظاهر في الشيء . ج لوكاف .

٣٠٨٥٤ - **وَلِغَن**
الوكن والوكنة : هي محسن الطائر في حضر او جبار .

Menon (F). **وَلِغِن** ٣٠٨٥٥ -
الكيش او الشاة تلبها النعم .

Mandataire (F). Mandatory (E). **وَلِغِيل** ٣٠٨٥٦ -
هو من استأنت اليه الوكالة .

Régisseur (F). **وَلِغِيل** ، **جَرِي** ٣٠٨٥٧ -
Manager, Bailiff (E).
هو الذي يدير المزرعة ويقدم بشؤونها بدلاً من صاحبها .

Contramaître (F). **وَلِغِيل** ، **مَحْوَلِي** ٣٠٨٥٨ -
Overseer, Foreman (E).
هو رئيس العمال في ورشة مينة .

٣٠٨٥٩ - **وَلِغِيلُ التَّحْلِيَّةِ** ، **مَسْتَدِيك**
Syndic de faillite (F). Syndic of bankruptcy (E).
هو الوكيل القانوني من كلمة الدائنين ويصيره القانون
وكيلاً ايضاً عن للمفسر ليدبر امواله ويصلحها .

Macropus (S). Wallabee (F). **وَلَاب** ٣٠٨٦٠ -
جنس حيوانات لبونة عاشية من فصيلة القنقرات .
انواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها استرالية وتبانية . تألف
الاجام واللبايض والادخال . ملجئها الحيائي جماعي ||
اجسامها مستدلة فقد تطول من ١٦٠ الى ١٨٠ سم .
في الذنب الذي يطول من ٦٠ الى ٧٠ سم . انثواها الى
الطحلة المتفاوتة السمرة . انثاها رباعية الاغلاف ||
اعرف انواعه واشهرها :

Wallabee à cou rouge (F). **وَلَاب احر العنق**
Wallabee à queue noire (F). **وَلَاب اسود الذنب**
Wallabee agile (F). **وَلَاب رشيق**

Mise bas (F). **وَلَادَة** ٣٠٨٦١ -
هي الوضع أي خروج الجنين من رحم الانثى في نهاية
مدة الحمل .

Parthenogénèse (F). **وَلَادَة العَذَكْرِي** ٣٠٨٦٢ -
Parthenogenesis (E).
هي الولادة التي لم يستيقها كرم ؛ فقد تحصل في بعض
الحشرات منها الارق .

٣٠٨٦٣ - **وَلَانَة**
Aveliata (S).
Aveliata (F). Aveliata (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مليات الادلجل
وفصيلة الجبيديات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد
منتشرة في بعض بحار البلاد المحتلة احرارة واحصها البحر
الابيض المتوسط . تألف الشطوط الحسبة والربلية .
اصداؤها بتدقيق الشكل واللقد ، مستديرة الفوهة الثلاثية
الاستان . ماله الصفة المحتلة الساكنة ، الجسدية
الالوان الزاهية ، يكثر فيها الجلوي .



ول

للاستعمال إلا بعد مرورها بعدة مراحل تحضيرية وتغييرية تستلزم الوقت الطويل الذي يراوح من ٨ إلى ٩ أشهر .

٣٠٨٨٩ - وَكِيلِيْن Vanilline (F). Vanillin (E).
عطر الزبيلية يستخرج من الثَّار التي تحوي ما يقارب ٢٪ من وزنها .

٣٠٨٩٠ - وَكِيْمَكَة Sclérote, Stroma (F).
مشيمة نباتية سلبة المادة تتكون من بعض الفطور فتضخمها وتقرنها . ج . وثم .

٣٠٨٩١ - وَهَاجَة Photomorphose (F).
Photomorphosis (E).
الوهاجة تأثير الضوء على النمو والانتشار عند الكائنات الحية .

٣٠٨٩٢ - وَهَانَة Sénescence (F). Senescence (E).
هو التور الذي يسبق الذبول في النج الحية أن سيوانية أو نباتية .

٣٠٨٩٣ - وَهَجَنَة Photologie (F).
Photology (E).
الوهجنة علم يبحث في وهج الضوء وتأثيره ومطابقته .

٣٠٨٩٤ - وَهْد Terrain bas, encaissé (F).
الوهد والويدة : الأرض المنخفضة أينما كان مؤدها . ج . الوهد ووهدان يوهدان .

٣٠٨٩٥ - وَهْر
الوهر : توهج وقع الشمس على الأرض حتى ترى له اضطراباً كالخباز .

٣٠٨٩٦ - وَهْص Emasculation
هو انتزاع الخصيتين لانسداد عمل التناسل في ذكر الحيوان .
الناهية منه حث الحيوان على التوطين .

٣٠٨٩٧ - وَهْط Bocage (F). Copse, Basket (E).
غابة صغيرة ظليلة وكل حرجية من عشر .

٣٠٨٩٨ - وَهْف Feuillage (F). Foliage, Leafage (E).
جاء أوراق الشجرة .

٣٠٨٩٩ - وَهَق Lasso
هو حبل في طرفه انشطة يطرح في حقل الناهية للقبض عليها . يقال صاده بالوق . ج . أرقاق .

٣٠٩٠٠ - وَهْلِبَرْجِيَّة Wahlenbergia (S).
Wahlenbergia (F). Wahlenbergia (E).
جنس نباتات عشبية حولية أو معمرة من فصيلة الجريسيات .
كسما وأوراقها متباينة الأشكال والأحجام . أزهارها مختلفة الألوان ، يكثر فيها الأزرق || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

٣٠٩٠١ - وَهْلِبَرْجِيَّة صَعْبَرِيَّة الزَّوْق Wahlenbergia serpyllifolia (S).
Wahlenbergia à feuilles de serpolet (F).
مهدا البلقان . ساقها قصيرة تملو نحو ١٠ سم . أوراقها

والفصاة || مظهرها الخارجي يقع كستنية اللون مستطيلة الشكل تنشق الجلود عند انتشارها . وعند تفتح شراها تعطب الأوراق وتسبب يباسها .

٣٠٨٧٧ - وَمَكَة
الوهد والويدة : شدة حر الليل .
٣٠٨٧٨ - وَمَسَّ
ويس وأويس المسب : لأن وقرب النضج

٣٠٨٧٩ - وَمِيْش Fulguration (F). Fulguration (E).
لثمان كالبرق يظهر في الطبقات العليا من السحاب لا يعقبه رعد .

٣٠٨٨٠ - وَنْشِير * Winters (S). Wintère (F).
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة النوترييات .
أنواعها المعروفة خمسة . جميعها جنات معمرة فراء .
أوراقها معتقة ، جامدة اتصال الساندية الشكل ، الجسيلة الخضراء اللامس . أزهارها صيلة ، كبيرة ، خاسية أقبيلات الملوقة ، مهدية الأسدية الصفراء اللون || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٨٨١ - وَنْشِيرِيَّات * Winteraceae (S).
Wintéracées (F). Winteraceae (E).
فصيلة نباتية من فوات الفلفتين مستقلة الفصالات .
اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة الممد أعطائها جزر الزوايح ||
جميع نباتاتها شجيرات ونباتات فراء . أوراقها معتقة ، متعاقبة ، نصالها سانية جامدة . أزهارها عشكولي التجميع ، طرفي الارتكاز . أزهارها كبيرة جميلة القالب ملونة || أشهر اجناسها الوشير .

٣٠٨٨٢ - وَنْس هو النفاس للتعرج ، أطله .

٣٠٨٨٣ - وَنْكَ وَنْكَ حَضَنَ Couver (F).
ونك الطائر : حضن الأبيض . To incubate (E).

٣٠٨٨٤ - وَنْكَا هي القضاة ، أطله .

٣٠٨٨٥ - وَنْكَه وَكِيم سلح الذباب .

٣٠٨٨٦ - وَنْكَه وَنْكَه Vanille (F). Vanille (E).
ثمرة الزبيلية وهي حل شكل سفة مستطيلة يستخرج منها عطرها المشهور الشائع الاستعمال .

٣٠٨٨٧ - وَنْكَه وَنْكَه Vanilla (S).
Vanilla (F). Vanilla-plant (E).
جنس نباتات مدادة عارضة من فصيلة السعليات .
أنواعها عديدة ، أعطائها المناطق الحارة ، معظمها بري وبعضها زرعني وصناعي || أشهر أنواعها الزراعية الزبيلية المنسطة الورق .

٣٠٨٨٨ - وَنْكَه وَنْكَه * Vanilla planifolia (S).
Vanillier commun (F). Common vanilla-plant (E).
Echter Vanille (D). Vaniglia, Vanigliero (I).
أشهر أنواع الزبيلية وأهمها زراعة . جنيتها قصفة عارضة متقلبة .
أوراقها معتقة متعاقبة منسطة الصفحة قليلة النصل .
سواقلها دقيقة مستطيلة تقابل الأوراق .
أزهارها متفردية التجميع محوري الارتكاز .
أزهارها كبيرة القند عطرية العرف . ثمارها سقية الشكل مستطيلة لا تصلح



ونشير



زبيلية منسطة الورق



وهلبرجية

Faculaire (F). ٣٠٩٠٦ - وَهَيْجِيَّةٌ ٥
نمت منسوب الى وهيجة الشمس .

Carrière de terre glaise (F). ٣٠٩٠٧ - وَئِكْلَر

Quarry of clay (E).
هو محفر الطين الذي تلاحظ به الحياض وغيرها منها
لرشح الماء .

٣٠٩٠٨ - وَجِيَّةٌ ٥
الويه طائر يعرف بالطيطوى الخيسال ، اطيه . وهي
ايضاً نبات غزام الصباغين .

Age de la charrue (F). ٣٠٩٠٩ - وَئِج
Plough-beam (E).
هو سلب المحراث الجامع لسائر اجزائه .

Vérastine (F). ٣٠٩١٠ - وَيرَستِين ، وَحَرَبَكِين ٥
Verastine, Verastria (E).

مادة نباتية شبه قلوية تستخرج من بلور الحريق
الابيض . تستعمل طبياً ضد الحيات والانهابات .

Wigandia (S). ٣٠٩١١ - وَيْغَنْدِيَّةٌ ٥
Wigandie (F). Wigandia (E).

نبات معقود الثريف عل اسم الطبيب « ويغند » . بجلة
معمرة وسيدة الجنس والنوع من فصيلة التجميات . مهددا
بعض مناطق يوليوية || بجلتها تملو نحو ثلاثة امتار .
ساقها قليلة الفروع متكاثفة الغماء الجماء الشائك . اوراقها
متعاقبة ، معتقة ، متعوجة النصال الكبيرة التي يبلغ طولها
نحو ٩٠ سم . ويرضها نحو ٥٠ سم . صفحتها العليا الى
الخضار البحري . صفحتها السفلى كثيفة الحمل ، فضية
المواج || ازهارها مستقيمة قرق . ازهارها كبيرة ، عقرية
الشكل ، بنفسجية اللون ، خليسة التويج || تنويرها
يستمر طوال شهر نيسان .

Raisin noir (F). Black grapes (E). ٣٠٩١٢ - وَئِنْ ٥
هو العنب الاسود اللون من اي ضرب كان .

كأوراق الصنوبر تملو نحو ٢ سم . نصالها خالية فضية
المواج . ازهارها بنفسجية التويجات ، حر الكلوس ،
قطرها يراوح من ٢ الى ٣ سم . || تنويرها يستمر طوال
فصل الصيف .

٣٠٩٠٢ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَشَقِيَّةُ الْوَرَقِ ٥

Wahlenbergia hederacea (S).
Wahlenbergia à feuilles de Herre (F).
منبتها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا ، يكثر وجودها
في المناطق وعلى الصفات الرملية . ساقها نجيلية مستقيمة
تطول نحو ٣٠ سم . اوراقها كأوراق المشقة شكلها وقعا .
ازهارها فردية ، مستقيمة الممايق ، زرقاء اللون ، قطرها
من ٢ الى ٤ سم . || تنويرها يستمر من حزيران الى
تشرين الاول .

٣٠٩٠٣ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ عَصَلِيَّةٌ ٥

Wahlenbergia graminifolia (S).
Wahlenbergia à feuilles de graminées (F).
مهددا يمتد من البلقان الى حوض البحر الابيض المتوسط .
ساقها تملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها صفحية الشكل
كأوراق النجيليات وتطول نحو ١٦ سم . ازهارها زرقاء
اللون ، قطرها نحو ٣ سم . || تنويرها يستمر من حزيران
الى آب .

٣٠٩٠٤ - وَهْلَنْبَرْجِيَّةٌ كرواتِيَّةٌ ٥

Wahlenbergia croatica (S).
Wahlenbergie de Croatie (F).
مهددا كرواتية ودلاسيه . ساقها تملو نحو ١٠ سم .
اوراقها سنانية خفيفة تملو من ٣ الى ٥ سم . ازهارها
بنفسجية التويجات والكلوس ، صغيرة القد ، قطرها نحو
٢ سم . || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٩٠٥ - وَهَيْجِيَّةٌ ٥

Facule (F). Facula (E).
الويجة بقعة اكثر تأجباً ولعناً من غيرها في القراص
الشمسي . ج وهائج .



ويغندية



ي

٣٠٩١٨ - يَاسَم ، قَعُو ، وَنَافِيَّة ، نَوَّار أَبْيَض

Ligustrum (S). Troène, Prûne, Bois noir (F). Privet, Priry, Prim (E). Gemeiner Liguster, Liguster, Gewöhnliche rainweide (D). Ardivela, Baclare, Ligustro, Lamitra, Rovistca, Olivella, Mimolo (I).

جلس نباتات برية وزيينية من فصيلة الزيتونيات . أنواعه نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها زينة . نباتاتها مختلفة الاحجام منها الشجيرات والجنبايات والجنبايات . سوقها فراء فناء . اوراقها ممتدة متقابلة ابيدة صغيرة النصل اهليلجية الشكل . ازهارها مستحبة العرف صغيرة القذ متكررة التجميع تاجية الارتكاز او هامة || تزور في الحداث والساتين لتسييج وحل جوانب الممرات . وهي سهلة الانقياد تأخذ جميع الاشكال المطلوبة وتصلح لصد الرياح حتى ارتفاع ثلاثة اشر || اشهر انواعه الزيدنية ما يتبع .

٣٠٩١٩ - يَاسَم بَيْضِي الْوَرَق

Ligustrum ovalifolium (S). Troène à feuilles ovales (F).

جنية صغيرة القذ فناء . اوراقها بيضية الشكل عابلة ، نصلها جميل الخضار الاصفر المواج . تكثر زراعتها في المراكن وفي الحداث المرتبة المصمة الاشكال والالوان . تتكاثر بالتعجيل .

٣٠٩٢٠ - يَاسَم صِيحِي

Ligustrum sinensis (S). Troène de Chine (F).

شجيرة سريضة فناء تملو نحو ٤ اشر . تصلح للزينة ولصد الرياح . اوراقها ابيدة ، نصلها سناني الزام الاخير ، جميل الخضار المايق || تتكاثر بالتعجيل وبالزورور .

٣٠٩٢١ - يَاسَم صِيحِي الْوَرَق

Ligustrum angustifolium (S). Troène à feuilles étroites (F).

جنية متوسطة القذ تملو نحو ٢٥٠ سم . ساقتها فناء . اوراقها

Hortensia (F).

٣٠٩١٣ - يَابَانِيَّة

نبات زينة يدعى ايرلسيا ، اطلبه .

Baoris zelleri (S).

٣٠٩١٤ - يَارُوُز الْأَوْرَ *

حشرة من الحسيريات ، فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٣٠ م . لونها الالبى الزيتي المواج . وراشها الامامية مبقعة بالابيض . وراشها الخلفية خطية اللون برتقالية المواج || يكثر وجودها في الربيع والصيف . رقاتها تنقف حل صف الازرق فتلهم النصال وتؤدي النبات .

Adopaea ectaeana (S).

٣٠٩١٥ - يَارُوُز الْمَرَامِي *

حشرة من الحسيريات ، فراشها تطول نحو ٢٨ م . جسمها مردي الشكل كسني الثوب . وراشها خطية اللون زيتية المواج زهوه في الذكور وتبقى في الاناث || يكثر وجودها من حموز الى آب . رقاتها تركيب الزورع والمرامي فتؤذيها اذا كثر عددها .

Adopaea lineola (S).

٣٠٩١٦ - يَارُوُز التَّجِيلِيَّات *

حشرة من الحسيريات فراشها صغيرة القذ تطول نحو ٢٦ م . في الذكور والاناث . جسمها مردي الشكل كسني الثوب . وراشها برتقالية اللون خطية الحثار والتسليج . يكثر وجودها من حموز الى آب . رقاتها تركيب صف التجيليات فتؤذيها .

Termite famella (F).

٣٠٩١٧ - يَارُوُش

She termite (E).

هي الارضة الانثى الكاملة الاعضاء التهامية . وظيفتها منع المازن لاستمرار وجود الرمية .



يَارُوُز الْأَوْرَ



يَارُوُز الْمَرَامِي



يَارُوُز التَّجِيلِيَّات

عروة. نصلها ضيق الصفحة، أخضر اللون، جوي الملمح. تتكاثر بالتعقل وبالزبور.

٣٠٩٢٢ - ياسم ككثيف الورق

Ligustrum compactum (S). *Troëne compact* (F).
جنية زنبقية صغيرة القد كثيفة الأوراق. أوراقها دائمة
أهليلجية الشكل، نصلها جبل الخضار المباني || تتكاثر
بالتعقل وبالزبور.

٣٠٩٢٣ - ياسم معروف

Ligustrum vulgare (S). *Troëne commun* (F).
جنية سبروتية شامة الاستعمال التزييني. ساقها فرعاء فناء.
أوراقها أبيضه أهليلجية الشكل مدهبة الطرف، جميلة الخضار
القائم الجوي الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالزبور.

٣٠٩٢٤ - ياسم ياباني

Ligustrum japonicum (S). *Troëne du Japon* (F).
جنية سبروتية شامة الاستعمال التزييني ولصده الرياح.
ساقها فرعاء فناء تملو نحو ثلاثة أمتار. أوراقها أبيضه
نصلها أهليلجي الشكل، لسن الزام الأخير، أخضر اللون.
فستني الملمح || تتكاثر بالتعقل وبالزبور.

٣٠٩٢٥ - ياسمين

هو الياسمين، اطلبه.

٣٠٩٢٦ - ياسمين * ياسمين

Jasminum (S). *ياسمين* (S). *Jasmin* (D). *Gelsomino* (I).
جنى نباتات ممرية وزراعية من سبط الياسينيات
وفصيلة الزيتونيات. أنماؤه زهاء ١٠٠ منظرها بري
وبعضها زراعي تزييني وصناعي || ساقها فرعاء عارضة.
أفانها جالسة الالتئاب. أوراقها متقابلة مركبة، وريقاتها
لا قياسية التجميع والشكل. أزهارها جميلة المنظر خفيفة
اللون يكثر فيها الأبيض ثم الأصفر والآخر. بعضها
فولح العرف المعطري يستخرج منه دهن فاخر الصفت
مرفوف فيه || يتكاثر الياسمين بالتعقل والترقيد. يجيد
في جميع الأتربة أعصها الخفيفة المتوسطة الاندماج لانه
يغنى الرطوبة المستحكة || أشهر أنماؤه ما يتبع.

٣٠٩٢٧ - ياسمين أبيض، ياسمين مخنوق

Jasminum officinale (S). *Jasmin commun*. *J. blanc* (F).
Jasmin of poetry. White flowered *Jasmin* (E).
Echter Jasmin, *Weisser Jasmin* (D). *Gelsomino*
bianco (I).

نوع من الياسمين السبروتي الملبول. أقلية البلاد المختلة
الحرارة المنحرفة نحو المطار. جنته متقلبة تملو نحو
الحرارة المتقلبة مضلفة المقطع والزاويا. أوراقه
متقابلة، وريقاته وريته الترتيب لا قياسية التجميع والعدد
مها الخامسة والسابعة والثمانية. لونها الى الخضار المباني.
نصلها دلي الصفحة || أزهاره عذولي التجميع محوري
الارتكاز. أزهاره متضوقة العرف المعطري المنصب، لونها
أبيض بلق || تنوره يستمر من أيار الى أيلول.

٣٠٩٢٨ - ياسمين أذغب

Jasminum pubigerum (S). *Jasmin à duvet* (F).
نوع من الياسمين السبروتي. يعيش في جميع الأقاليم المختلة.
بجته منتصبة تملو نحو ١٥٠ سم. أفانها مغلفة الزوايا.
أوراقها متقابلة، مركبة، وريته الترتيب، خماسية أو سباعية
أو تساعية الوريقات. وريقاتها أهليلجية الشكل، نصلها
أزغب الصفحة السفلى، غلي العليا. أزهارها عذولي

التجميع. عذولها يد من ٥ الى ١٥ زهرة. زهرتها صغيرة
القد، صفراء اللون، خاتمة العرف || تنورها يستمر من
أذار الى تشرين الأول.

٣٠٩٢٩ - ياسمين إسباني، ياسمين كبير الزهر

Jasminum grandiflorum (S). *Jasmin d'Espagne*, *J. à*
grandes fleurs (F).
نوع من الياسمين السبروتي. زراعته الصناعية شامة
لاستخراج دهنه المعطري. جنته تملو نحو ٣ أمتار أوراقه
متقابلة، وريقاته وريته التجميع لا قياسية العدد. لونها
الى الخضار اللامع. نصلها جامد الصفحة. أزهارها
عذولي التجميع، محوري الارتكاز. أزهارها كبيرة القد،
لونها الى الأبيض الموشح بالوردي، عريها فولح الرائحة
العاذلة || تنوره يستمر من حزيران الى تشرين.

٣٠٩٣٠ - ياسمين أصفر، ياسمين البر

Jasminum frutescens (S). *Jasmin à feuilles de cyprès*,
J. frutescent (F).
نوع من الياسمين الملبول. جنته تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقها
متقابلة مركبة، وريقاتها زراعية الشكل صفيرة القد تملو
نحو ٢ سم. نصلها جامد الصفحة || أزهارها صفراء اللون،
شفمية الترتيب، ثنائية أو رباعية التجميع || تنوره
يستمر من أيار الى حزيران.

٣٠٩٣١ - ياسمين آسوري

Jasminum azoricum (S). *Jasmin des Açores* (F).
نوع من الياسمين، أقلية البلاد المختلة المشجرة نحو
الحارة. جنته عارضة. فروعها متقابلة أسطوانية للقطع.
أوراقه مركبة ثلاثية. وريقاته شبه قلبية الشكل. نصلها
جامد الصفحة الامعة. أزهاره عذولي التجميع محوري
الارتكاز. أزهاره بيضاء اللون، متوسطة القد، فواحة
العرف المنصب || تنوره يستمر من حزيران الى آب.

٣٠٩٣٢ - ياسمين صيني

Jasminum beesianum (S). *Jasmin de Boes*, *J. de*
Chine (F).
نوع من الياسمين السبروتي وهو جملة ممرية صغيرة القد
تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. أوراقها بيضيه الشكل،
ثنائية الزام الأخير؛ نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم.
وهو جامد الصفحة فستني اللون. أزهارها عطرية العرف،
حراء اللون، متوسطة القد، ثلاثية التجميع أو فردية.
تنورها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٩٣٣ - ياسمين عطري

Jasminum odoratissimum, *J. suavisolens* (S). *Jasmin*
suave, *J. jonquille* (F).
نوع من الياسمين السبروتي. منته جزر كناري وبادريا.
جنته تملو من ٢٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها وفانها
أسطوانية المقطع. أوراقها متقابلة، مركبة، وريته الترتيب،
ثلاثية أو خماسية التجميع، وريقاتها أبيضه، نصلها
بيض الشكل المقطوع القاعدة. أزهارها ثلاثية التجميع،
صفراء اللون، فواحة العرف المنصب || تنورها يستمر
من نيسان الى تشرين الثاني.

٣٠٩٣٤ - ياسمين آخر

هو الكبركليت، اطلبه.

٣٠٩٣٥ - ياسمين الليل

هو شرخات الليل، اطلبه.

٣٠٩٣٦ - ياسمين زنبقي

هو القل، جملة زنبقية عطرية، اطلبها.



ياسم صيني



ياسم معروف



ياسمين

٣٠٩٣٧ - ياسمين عزائلي

هو صريمة الجدي الشائعة ، اطلبها .

٣٠٩٣٨ - ياسمين هندي

هو الفتة ، اطلبها .

٣٠٩٣٩ - ياسمينيات

Jasminacées, Jasmindées, Jasmindariées, Jasmindariées (F).

سبط من فصيلة الزيتونيات ، اجناسه وانواعه عديدة اشهرها آليامين . نباتاته جنبات وجنوبيات قرع السوك . ازهاره جميلة الشكل ثنائية السداة ، خاصة التركيب ، بعضها عطر فروع العرف المستحب .

٣٠٩٤٠ - ياستفوس

Jacinthe (F).

هو الجاسنت ، اطلبه .

٣٠٩٤١ - ياشكيد

Azoon (F).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الظهوريات مشهور باسم حنظل ، اطلبه .

٣٠٩٤٢ - ياعزال دوزر

Erodium cicutin (F) دوزر

هو ابرة السوز ، اطلبها .

٣٠٩٤٣ - يالبع

Adulte (F). Adult (E).

ياقم ، بالغ ، ملك ، شوب ، نفوت تريفية لمق واحد يوصف به طور الاستقرار الحياتي القائم بين طوري الفتوة والشيوخة .

٣٠٩٤٤ - يالغوش

Fontanelle (F).

فرجة غشائية في الجسم .

٣٠٩٤٥ - يالغوش

Fontanel, Fontanelle (E).

هو قة الرأس يقابله الفتق .

٣٠٩٤٦ - يالغوش

Sinclut

هو قة الرأس يقابله الفتق .

٣٠٩٤٧ - يالغوش

Ephémère (F).

سحرة تعرف بأبنة يوم ، اطلبها .

٣٠٩٤٨ - يالغوش

Procephemera (E).

رتبة سحرات صلبة القذ تحمله الجسم من طبقة البيويات .

٣٠٩٤٩ - يالغوش

Procéphémères (F).

رتبة سحرات صلبة القذ تحمله الجسم من طبقة البيويات .

٣٠٩٥٠ - يالغوش

Corindon (F). Corundum (E).

حجر كريم غشاف ، صلب الجسم رزينة ، اجوده اصفر . وهو مختلف الالوان فيه الاحمر والاصفر والاحمر والازرق .

٣٠٩٥١ - يالغوش

Hyacinthe (F).

عرب من سيليكات الزئبق ، وهو حجر كريم زعفراني اللون يوبه عادة في بعض قطع الكراكين .

٣٠٩٥٢ - يالغوش

Polymnia edulis (S).

Yacon (Poire de terre) (F).

نبات حولي من فصيلة المركبات قريب الشبه من اللؤلؤ .

منبت البلاد الخالية الامريكية . جذوره سحولية . ساقه

فرداء . اوراقه متعابلة ممتدة سنائية النصل المزواني الحافة .

يستخرج من مسالقه مادة نشوية مأكولة وصناعية يستعمل

منها بعد تحميرها بعض الكمون الشائعة الاستعمال .



ياقون



يامور



ياقون



ياقون النجيليات

٣٠٩٥٢ - يالغوش

Dextrose (F). Dextrose (E).

يامن م . يامنة . تمت تعريفه يطلق حل كل ساق نباتية متسلقة دورتها الاولى من اليسار الى اليمين .

٣٠٩٥٣ - يالغوش

Capreolus capra, Cervus capreolus (S). Chevreuil (F). Roebuck, Roaddeer (E). Rahwid (D).

حيوان لبرن يجير من فصيلة الابلديات . جسمه يطول نحو ١١٥ سم . ويصلو ٧٤ سم . أما ذنبه فهو ٢٠ سم . ثوبه الى الحمرة الخطفية المواج وهو اغمر البطن ، ابيض العنبر . قرنه مثلث الشبب ينصله كالأليل . موطنه ارجاع الشرق الاوسط وأرويه الغربية والوسطى . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من ذكر وثلاث او اربع اناث . الاثني تسمى ه اشهر وتضع من يصفور الى ثلاثة .

٣٠٩٥٤ - يالغوش

Anis (F).

هو الاليسون ، اطلبه .

٣٠٩٥٥ - يالغوش

هو الكمين الحيشي ، اطلبه .

٣٠٩٥٦ - يالغوش

Mature, Mûr (F). Mature (E).

تمت تعريفه توصف به جميع المحاصيل الزراعية التي اجازت دور الاذراع وبشكل في دور الانباج .

٣٠٩٥٧ - يالغوش

Pamphila (S).

جنس سحرات فراشية من فصيلة المسيريات . انواعه الموزنية قليلة . اجسامها نحيلة القذ تطول نحو ٢٨ مم . في الذكور والاناث . رواشن ذكورها خطية اللون يبيض التبييض والزرقة . رواشن اناثها بنية اللون هو التبييض والتبييض || يكثر وجودها من ايار الى حزيران . رفاقها تركيب النجيليات دون أن تقتضي شديدة الاذى .

٣٠٩٥٨ - يالغوش

Pamphila sidas (S). Pamphile des graminées (F).

Pamphila sidas (E).

سحرة من فصيلة المسيريات ورتبة سحرات الاجنحة . موطنها الشرق الاقصى وينتشر الاصقاع الاروبية . فراشتها جارية قوتها رقيق الازداد . سرقتها تميش على عصف النجيليات || جسمها متوسط القذ ، مدني الشكل يطول نحو ١٤ مم . بسطها نحو ٢٩ مم . رأسها كبير اطيرم ، بني اللون . عيناها كبيرتان نافرتان . زبانها صولجانيان . جوشنها وبطنها الى الخطي الشديد السرة . زيب طرفها السري الى الشقعة || رواشن الذكر الى الخطي يطول تقييق وزرقة صباية . الزوج الاسامي اكثر زرقة من الخلفي الذي يتميز بنقطة كبيرة تطوقها نقط صلبة

جميعها الى السرة القامة . رواشن الاثني الى البني يطول تقييق احمر وتقييق اشقر اكلس وبعض نقط صلبة

شراء اللون || لها جبل واحد في الحبل . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تماثل بعد ظهورها بنحو سمة اسابع وتفتح المكان مبداء على الصفحات السفلى من

تصال الارواح || السرفة عنه بلونها الكمال تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستقيم الوسط ،

يسمر الهبط ، اريك اللون يطول تمشيح اسم . رأسها ونديها ودواجها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو خمسة اشهر ينقضي داخل صلجة تحببها السرفة بين اوراق

الاشجار الابيدة .

الاشجار الابيدة .

الاشجار الابيدة .

الاشجار الابيدة .

الاشجار الابيدة .

الاشجار الابيدة .

الاشجار الابيدة .

الاشجار الابيدة .

٣٠٩٦٦ - بَيْرُوح، لَفَّاح، مَسَد رَجُورًا، مَسَد رَاك لَفَّاح المَجْنُون، لَفَّاح المَجْنُون



نباتية

Mandrora (S). *Mandrora* (F). *Mandrake*, *Devil's apple* (E). *Alraun*, *Hundspfel* (D). *Mandrora*, *Mano di gloria* (I).

البَيْرُوح هو التاريخ : أصل الاسم العلمي من لغز واطلي ويطلق مندراغور . أما لفظة بَيْرُوح فهي مرابانية ومعناها ناقص الروح وذلك لأن شكل جلد هذا النبات يشبه جسم الإنسان . وقد ورد ذكر البَيْرُوح كسكن في بعض الأساطير القروسية المألفة إلى نحو ٢٠٠٠ سنة قبل الميلاد . وقد استعمل منبأ عند الآشوريين وصنعت منه مرهم مخدرة في عصر الولادة وآلام الإنسان . وكان القدماء يستعملون الجذور والأوراق كمخدرة للاصصاب في العمليات الجراحية وفي بعض جبر الكسور المكسرة . ويطلق أن جذره المخدرة إذا نقتت في الحبل كانت مقوداً جنسياً عظيماً . وكان أيضاً شائع الاستعمال في السرور وفي طقوس الفريديت .

تعلية العلمية : جنس نباتات مقربة ، عشية ، طيبة ، مرة ، برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات . أنواعه خمسة جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط . سيقانها جلور لينة لينة تطلب فيها الأزواجية . شكلها شكل مجر الإنسان . أوراقها قرصية الأرنكاز ، كبيرة القند ، معقنة . نصلها رافعة الصفصصة ، متباعدة الحافة . أزهارها متصلة القند ، كبيرة المدد ، فردية التجميع تقوم على مائلين قرصية الانتشاب . البؤتها غلظة مبيد الأبيض والأزرق والآخر والبنيضجي . ثمارها باذنجانية مستديرة . جلورها وثمارها وأوراقها بحوى مادة مخدرة عنصرها كمحصر الأرويين أن لا يمكن أكله || اعرف أنواعه وأشهرها البَيْرُوح المخزني .



بيد

٣٠٩٦٧ - بَيْرُوح مَخْزُون

Mandrora officinarum (S). *Mandrora officinalis* (F).

نوع من البَيْرُوح وهو نبات مقري طيب بري وزراعي . مهده المقدد الشرق الأوسط . ساقها جلورية ، حزنانية الشكل ، قرقة ، لوناً إلى الأخضر الاسمر . أوراقها قرصية الانتشاب ، معقنة ، كاملة ، مستطيلة . نصلها مبيك الصفصصة متباعدة الاطراف . أزهار فردية التجميع ، قصيرة المائلين للخشبة . بيضاء اللون ، خضراء الملوحة . ثمار مستديرة ، كبيرة القند . راجع خواصه الطبية في المادة السابقة .



بَيْرُوح مخزني

٣٠٩٦٨ - بَيْرُوحِي

Picrasma (S). *Picrasma* (F). *Picrasma* (E).

جنس اشجار حرجية طيبة وتزيينية من فصيلة السوربيات . مهده الشرق الأقصى . ساقها ملساء الباه حراء اللون . ميقينة بالأصفر ، ترتفع نحو عشرة امتار . أوراقها مركبة . وريقاتها تطول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . أزهارها علق التجميع . أزهارها الذكرية رباعية الفصل والنباتات والإسدية . أزهارها الانثوية خماسية الياصم . اعفاها صلبة صفراء اللون . لحاء السوق والاصنام مرة الطعم طيبة .



يترومه

٣٠٩٦٩ - بَيْرُومَة ، وسَبِيَة

Eutrema wasabi (S). *Wasabi* (F).

نبات يلقى معمر من فصيلة الصليبيات . مهده اليابان . ساقه حزنانية مستطيلة . أوراقها قرصية الانتشاب ، غلظية الإصلاح ، كبيرة النصال القلبية الشكل . شراخه الزهري يملو نحو ١٠٠ سم . أزهاره عشقودي منتصب . أزهاره

٣٠٩٦٩ - بَيْسَابِيَة

Potamogeton velox (S). *Potamogeton velox* (F).

حيوان وحيد الجلس والنوع من فصيلة البيايات . اصطناعه بعض مناطق افريقية الشالية || جسمها كثيف البربر النام ، يطول نحو ٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٣٠ سم . رأسها شبه مخروطي الشكل ، مستدير الخيط . اسنانها صغيرة ، متباعدة ، حادة الاطراف ، عددها ٤٠ . ساقها متباعدة الكثافة واللطف . عينها كيزتان لوزيتان . أذناها مستديرتان صغيرتان . ذليها شبه مردي الشكل جلل البربر . قوائمها قصيرة . ثوبها إلى السرة يطولها في الرأس والظهر موالج ارجواني . ابطاها ويطولها إلى البياض التي تميز بجلد هيكلا العظمي من الترقوة || تألف صفاف مجاري الماء . قوتها الاسماك والظاء والافاعي والغشرات الكبيرة .

٣٠٩٦٩ - بَيْسَابِيَات

Potamogetonidae (S). *Potamogetonidae* (F). *Potamogetonidae* (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة وسيدة الجلس والنوع تشبه القفصاة تعيش على صفاف مجاري الماء || نوعها الوحيد البياية .

٣٠٩٦٩ - بَيْسَابِيَات

Dothideaceae (F). *Dothideaceae* (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الشوفيات ودية الزئيات . تتميز بأساقها المركبة المحبقة القائمة على زينة لا جلوية . انفلاتها يحصل في من ساقها المستديرة || اجناسها التي تم الاقتصاد الزراعي قليلة وهي التبيكة والديوبيريون والنبينة .

٣٠٩٦٩ - بَيْسَابِيَة

Sesleria (S). *Sesleria* (F).

جنس نباتات عشية مفعوة من فصيلة النجيليات . أنواعه قليلة المدد . سيقانها خماسية أو سداسية الاشطاء ، دقيقة القصب ، ثنائية أو ثلاثية السلايات . صفافها فريد النصل المستطيل . ساقها اسطوانية الشكل ، صغيرة القند . ويوجد في الاراضي الجبلية الكلسية للملحاحة . أشهر أنواعها ما يتبع .

٣٠٩٦٩ - بَيْسَابِيَة لُزُوقِي

Sesleria coerules (S). *Sesleria bleue* (F).

نوع من البليد البروتي المبلول . صفص سداسية الاشطاء تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . صفافها مستطيل النصل المخبين يمرض نحو ٤ م . ساقها قصيرة القند اسطوانية الشكل تطول نحو ٣ م . قطرها ٧ م . ساقها إلى الزرقاة الجميلة . يوجد في الارربة الكلسية القليلة أو المتوسطة الرطوبة .

٣٠٩٦٩ - بَيْسَابِيَة فُضِي

Sesleria argentea, *S. nitida* (S). *Sesleria brillante* (F).

نوع من البليد البروتي المبلول . عشية خماسية الاشطاء تملو من ٣٠ إلى ٨٠ سم . صفافها مستطيل النصل المخبين يمرض نحو ٢ م . ساقها تطول نحو ٥ م . قطرها ١٢ م . ساقها مستطيلة لوناً إلى الزرقاة الداكنة يطولها موالج فضي .

٣٠٩٦٩ - بَيْرُومَة

Feuille de vigne (F).

البيرقة ورقة البكرمة . ج يرق . وتدعى أيضاً الخليلب .

الارتكاز. ازهارها وردية اللون مشبعة بالاريجاني. بتلاتها مهدبة الخمار || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٩٨٠ - **يَحْمُومٌ عَطِرٌ** (S). *Adenandra fragrans*
٣٠٩٨١ - **يَحْمُومٌ عَطِرٌ** (F). *Adenandra odorante*

نوع من اليشوم الزيني. ساقه تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه اعليجية مستطيلة. نصالها منبسطة مرطاة جميلة الخضار الزاهي. ازهارها عتيق الجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها مستطيلة المالحق، وردية اللون، مفرسة الفصل والتلات، عطرية العرف المستحب || تنويره يستمر طوال شهر ايار.

٣٠٩٨١ - **يَحْمُومٌ قَرْدِيّ الزَهْرَة**

(S). *Adenandra uniflora*
(F). *Adenandra à fleurs solitaires*

نوع من اليشوم الزيني. ساقه ترتفع نحو ٤٠ سم. اوراقه سنائية الشكل، مهبية، شاذكة. نصالها ملتفة الاطراف. ازهارها فردية الجميع، طرفي الارتكاز. يضاء اللون من الداخل، وردية من الخارج || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

٣٠٩٨٢ - **يَحْمُومٌ** (F). *Halophile*
نمت تمرني يطلق على النباتات التي تعيش وتتكاثر تلقائياً في الارربة المالحة.

٣٠٩٨٣ - **يَحْمُومٌ** (F). *Outarde (mille)*
ذكر الحبارى.

٣٠٩٨٤ - **يَحْمُومٌ**
قد يكون اليامور. قال الجاحظ في وصفه: وداية وحشية نافرة لما قران طولان كأنهما مشاران. وقرونه كقرون الأيل وفي صماته لا تجويف فيها وهو اسرع من الأيل.

٣٠٩٨٥ - **يَحْمُومٌ** (F). *Hémoglobine*
(E). *Hemoglobin*
مادة آسية يتألف منها خضاب دم الفقريات.

٣٠٩٨٦ - **يَحْمُومٌ**
طائر من اللقن، يلد القيق المدى، اطلبه.

٣٠٩٨٧ - **يَحْمُومٌ** (F). *Oena*
هو الحنسة، طائر من الحاميات، اطلبه.

٣٠٩٨٨ - **يَحْمُومٌ** (S). *Erythrinus*
(F). *Erythrin*

الواحدة عيشية. جلس اسماك نهرية من مفتوحات المانة وفصيلة القرصانيات. انواعها المعروفة اربعة موطنها انهر وبحيرات امريكة الاستوائية || اجسامها مستطيلة، شبه اسطوانية الشكل، تطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. رؤوسها مستطيلة مقطوعة كبيرة الاشداق. زعانفها الظهرية كبيرة متباعدة بزعيميات ضخمة صغيرة. زعانفها الذيلية مستديرة الاطراف. ازواجها تتراوح من الخضار الالاس الى الخضار الاسفح. بطونها فضية || لحمها مأكولة، متوسطة الصنف.

٣٠٩٨٩ - **يَحْمُومٌ** (F). *Gazon*
هو الخضير والخضرة. ج. يخاضير.

صغيرة القند، يضاء اللون. ساقه واوراقه مأكولة || يتكاثر بالزهر والفصال. يرغب في المواتع الرملية التليية وفي الارربة الصصلالية الرملية الوارفة العناصر الغذائية.

٣٠٩٧٠ - **يَحْمُومٌ** هو الفريون، اطلبه.

٣٠٩٧١ - **يَحْمُومٌ السَحُور**
هو فريون الفجر، اطلبه.

٣٠٩٧٢ - **يَحْمُومٌ المَحْسِك**
هو الفريون الاربيكي، اطلبه.

٣٠٩٧٣ - **يَحْمُومٌ هِنْدِيّ**
هو فريون الاقديمن، اطلبه.

٣٠٩٧٤ - **يَحْمُومِيَّات** (Euphorbiaceae)
فصيلة نباتية تعرف بالفريونيات. اطلها.

٣٠٩٧٥ - **يَحْمُومِيّ** (S). *Michauxia*
(F). *Michauxie*
جلس نباتات عشية برية وزراعية محولة ومعمرة من فصيلة الجريسيات. انواعها المعروفة قليلة متبها الشرق الادق. ساقها متعصية. اوراقها متعاقبة متباعدة قليلة العدد. ازهارها ابيلة الارتكاز، كبيرة القند ملتفة التلات. اعرف انواعها واشهرها ما يبع.

٣٠٩٧٦ - **يَحْمُومِيّ لَوْرَانِيّ** (S). *Michauxia levigata*
(F). *Michauxie à tige lisse*

نوع من اليشة المحولة. مهدبا بلاد ايران، ساقها مرطاة غرماء تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها جامدة النصل الازبي. ازهارها يضاء اللون، فردية الجميع، ابيلة الارتكاز تملو الساق والفروع. تنويرها يستمر من تموز الى آب.

٣٠٩٧٧ - **يَحْمُومِيّ سُوْرِيّ** (S). *Michauxia campanuloides*
(F). *Michauxie fausse-campanule*

نوع من اليشة المحولة، مهدبا الجبال السورية واللبنانية. ساقها غرماء تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. بشرتها حلوية الزغب الشاذك. اوراقها جامدة النصل الازبي. ازهارها وردية او بنفسجية اللون، فردية الجميع، ابيلة الارتكاز، مبيضة على الساق والفروع. لتويرها يستمر من حزيران الى آب.

٣٠٩٧٨ - **يَحْمُومٌ** (S). *Adenandra*
(E). *Adenandra*

جنس جنبات برية وتزيينية معمرة من فصيلة السذابيات. موطنها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشمالية. ساقها غرماء قصيرة تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها ابيلة متباينة الاشكال. ازهارها خاسية النصل والتلات، عشارية الالابدة || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التلاتة التالية.

٣٠٩٧٩ - **يَحْمُومٌ صِيْرَانِيّ** (S). *Adenandra umbellata*
(F). *Adenandra en ombelle*

نوع من اليشوم الزيني. ساقه تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقه سنائية الشكل صغيرة القند تطول من ٢ الى ٣ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصالها مهدبة الاطراف، حلبة الصفحات السفلى. ازهارها سيواني الجميع، طرفي



بَشْوُش



بُذُّ حُورِ الحُورِ



بُذُّ حُورِ المَصْفَافِ



بُزَاة



رَبُود

الاجنحة . تألف الاماكن التي يكثر فيها الحلزون والبزاق والبريط . تتميز بلين القشار وبالنضياء في الظلام وبفارق الشكل الخارجي بين الذكر والانثى ، ذكرها بجنية ، انثاها ماري || جسمها متوسط القد ، يطول عند الذكر من ١١ الى ١٣ م . ويطول عند الانثى من ١٤ الى ١٦ م . نوبها الى البني الاسمر ، ينصرف الى الجزوي عند الذكر ويجهت عند الانثى . رأسها صغير الحجم كالحمار ذرياب . عينها صغيرتان . زباناها خطيان صغيران . ظهورها عند الذكر مستطيل القصد وهو عند الانثى جعدة تركيز على الترتبة الاولى . ارسافها خماسية الشكل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتمتدح حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تساقط في اوائل حزيران تمتدح المكن مباحدا تحت الجلالة والحجارة || البرقة مبطلة الشكل ، سداسية الزواجب ممرءة اللون ، تمتدح في اول عهدا على المواد الضوية ثم ثم ما تقترسه من البزاق والحلزون .

٣٠٩١٧ - بُزَاة شَرْبِيَّة ، حُبَابِ شَرْبِيَّة ، بَصْبُوسُ اللَّيْلِ الشَّرْبِيَّة

Luciola orientalis (S). *Luciola orientalis* (F).
Orient Fire-fly, Orient Glow-worm (E).

حشرة مفترسة نافعة من فصيلة البرايعات وربية مندقات الاجنحة . تألف الاماكن التي تترادها البرقة الدجوية وهي اكثر انتشاراً منها واثمة بصيصاً في الظلام وانثاها بجنية كالذكر || جسمها متوسط القد يطول عند الذكر نحو ١٤ م . ويطول عند الانثى نحو ١٦ م . نوبها ثنائي اللون ، جزوي الرأس والظهران ، حنطلي الكورل والجانحة والجرازم . رأسها صغير الحجم مملوء بالكمول . زباناها مستطيلان . عينها صغيرتان بارتان . ظهورها يلعب كامل البطن . بطنها مبطط . اسمر اللون . ارسافها خماسية الشكل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر آذار وتمتدح حتى اواخر آب . تسرح في الليل . قوتها البزاق والحلزون والبريط . وهي كالبزعة الدجوية تحارس الحفص الاستباتي فتسحق فضيتها برضاب ذفاقي للمادة ثم تعقبه بسائل ليزني يحل النسيج ويدبها لتشفها بفكها الاجنوبي || البرقة مبطلة الشكل ، سداسية الزواجب ، ممرءة اللون ، طحالب المزاج وهي كالحشرة الجملانة لا تخلو من الجهاز الضوئي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٦٥ يوماً ينقضي في القربة تحت الحجارة .

Lampyridae (S).
Lampyridae (F). *Lampyridae*, Fireflies, Glowworms, Lightning beetles (E). *Leuchtkäfer* (D).

فصيلة حشرات مفترسة من حشرات الاجنحة ، ليات البشرة ، صليات القد ، مستطيلة الشكل ، تنشق في الظلام لان تراجتهن الطرية تحصل دغداً لمفورية بصيصها يشع في الظلمة . اجناسها للمفوعة نحو ٥٠ أما اوزانها فعدة مئات . معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز بذكرها الحنية وانثاها للمباري . وهي تتميز من الحشرات النافعة لانها تعطي على بعض البزويات الفارة بالزراعة .

٣٠٩٩٩ - بُزَيْع
هو السكع ، الحلبه .

Rhizothorus (S).
Rhizothorus (F). *Rhizothorus* (E).
مطار من العجايبات وفصيلة التذريجات . موطنه ماليزية .

Baudrier d'Orion (F).
٣٠٩٩٠ - بُذَّ الجُزَوَاء
بذ الجوزاء ثلاثة كواكب وباصة من كوكبة الجوزاء .
راجع فغار الجوزاء .

٣٠٩٩١ - بُذَّ حُورِ الحُورِ
Idiocerus tremulae (S).

حشرة من فصيلة الزويديات ، طولها يراوح من ٥ الى ٦ م . جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها شبيطة قصيرة . نوبها حنطلي اللون . رأسها واخراف جناحها الى الخضار الاطحل البات . مدنها حنطلي اللون اسمر الحار والظرف . تركب الحور من اذار الى تشرين .

٣٠٩٩٢ - بُذَّ حُورِ المَصْفَافِ
Idiocerus ustulatus (S).

حشرة من فصيلة الزويديات طولها يراوح من ٤ الى ٦ م . جسمها مخروطي الشكل . رأسها مستعرض . زباناها شبيطة قصيرة . نوبها الى الخضار الاسعم الموج . مدنها اسمر تركب المصفاف دون ان تؤذيه .

٣٠٩٩٣ - بُذَّ حُورِ اللَّيْلِ
Idiocerus socialis (S).
Idiocera socialis (F).

حشرة من فصيلة الزويديات وربية متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول نحو ٥ م . رأسها مستعرض ، قليل النتوء اسفر اللون . خطمها معتدل الطول . عينها كبيرتان . زباناها صغيران ، نحيلان . كورلها قليل الاحتداد اسفر . حنطتها حمرة صفراء . ظهورها كامل الحنطية ، لاسف ، حنطلي اللون يطولو موج اسمر . وثنها غشائيات ، شفائان . بطنها اسفر اللون على صفحته . قوائمها كيفية الملب الشائك || تألف جميع المواقع التي يكثر فيها الاصاب والاشجار . قوتها التسع تحصه من الاوراق .

٣٠٩٩٤ - بُذَّ يَرْبِيَّة ، بُذَّ يَرْبِيَّة
Idesia (S). *Idésie* (F).

شجرة برية وريبيتين من فصيلة النضيات . مهدا الصين واليابان . ساقها منتصبة تملو من ١٢ الى ١٧ م . افسانها فائرة نظمية الارتكاز . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، معتقة ، رعية الشكل ، مستطيلة المنق . نصلها جامد الصفحة بحري اللون . ازهارها وسيدة الشق ، عادية القلمة ، صغيرة القد ، خضراء اللون . ازهارها عشكولي التجميع ، بحوري الارتكاز . عثاكلها متدلية . ثمارها حنية الشكل والقد برتقالية اللون || تنورها يستمر طوال شهر ايار .

٣٠٩٩٥ - بُزَاة * ، حُبَابِ
Lampyrus (S).
Lampyre, *Ver luisant* (F). *Firefly* (E).

جنس حشرات مفيدة ، صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، مبطلة الجسم ، من فصيلة البرايعات . انواعها المعروفة نحو ٩٠ جميعها من ليات البشرة يفسق في الظلام . معظمها من حشرات المناطق الحارة . ذكرها تسرح في الليل للاعتداه الى انثاها للمباري . اوزانها مختلفة الالوان يكثر ليسا الرادي والبي .

٣٠٩٩٦ - بُزَاة دُجُوبِيَّة ، حُبَابِ دُجُوبِيَّة ، بَصْبُوسُ اللَّيْلِ
Lampyrus noctiluca (S).
Lampyre nocturne, *Ver-luisant* (F).
Fire-fly, *Glow-worm* (E).

حشرة مفترسة نافعة من فصيلة البرايعات وربية مندقات

جوري الرقطة الصنائية التديب . رقطة له لقياسة الحجم والشكل صدره ويطه الى البياض الناصع || موطنه عند ايران والانفان واخذت الى التيت . يالغ الجبال العالية من ارتفاع ٣٠٠٠ الى ٦٠٠٠ م .

٣١٠٠٧ - **يرعونم**
Parcnoptère mâle (F).
Ha parcnopterus (E).
اليرعونم واليرشم واليرعونم هو الذكر من اليرشم .

٣١٠٠٨ - **يرد**
Yard
وسدة قياس الكايزية تساوي ٠٩١٤٣٨٣ م . يقال اخذت من طول سيف الملك هنري الاول || كسور البرد القدم واليوسه . القدم او الفوت يساوي ٣٠٨ سم . واليوسه او اللانش تساوي ٢٥٨٤ م . فاليرد يساوي اذا ثلاثة اقدام او ٣٦ بوصة .

٣١٠٠٩ - **يردوروم**
Monstera (S). Monstère (F). Ceriman (E). Kœstlicher, Kolbenriesse (D). Monstera (I).
جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة القلبيات . انواعه المعروفة ١٢ ، مهدا البلاد الامريكية . منظرها حول وبضها معمر . اوراقها مزججة الصنفيت . ازهارها سربة . ازهارها صغيرة لائقة وسيدة الشق . ثمارها لوزية مأكولة القشوري في بعض الانواع .

٣١٠١٠ - **يرد**
Pinasse (F).
هو الصنوبر البري ، اطلبه .

٣١٠١١ - **يرسون**
Erycina (S).
Erycène (F). Erycina (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم وفصيلة الرخويات . انواعه المعروفة كثيرة العدد ، جميعها من متحجرات الطليقات المسانية واليسانية . اصداها يضيئة الشوزن او عرسمة ، معتدلة التبطيط ، رقيقة ، مالة .

٣١٠١٢ - **يرسونيات**
Erycinidae (S).
Erycinidés (F). Erycinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم . اجناسها وانواعها عديدة ، منها الماهرة وهي من متحجرات الاراضي الثلاثية . ومنها الماهرة || تتميز باصداها الصغيرة الرقيقة الشافة . جميعها ثنائية المصارع ، مستطيلة الارجل القابضة الانحناء || اعرف اجناسها واشهرها اليرسون واليتين والقلبية والمطوة .

٣١٠١٣ - **يرع**
Tragelaphus scriptus (S). Tragelaphe écrite, Guib (F). Bush buck, Hornessed antelope (E).
نوع من الجبل صغير القد حجمة حجم الماعز . اصفاه البلاد الافريقية من جنوب الصحراء الكبيرة الى الحيفة . ثوبه امركيت يعلو بخطوط ابيض وتبقيج اسمر لا نظامي الترتيب ولا قياسي الشكل . راجع نباح .

٣١٠١٤ - **يرعون**
Eriogonum (S). Eriogone (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الطيليات . انواعه عديدة ، منظرها بري وبضها تريبي . ثوبها متصبغة عادة الفروع . اوراقها غمية التجمع لقياسة الارتكاز يكثر وجودها عند قاعدة الساق . ازهارها صغيرة القد شذوية الانقسام ثنائية او رباعية التجمع متلفها قاذفة جبرية الشكل او اسطوانية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

يألف البراري والادغال . ملجئه الحياتي حامي ، جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والقمل والذبور البرية || جسمه معتدل القد قريب الشبه بالجمال الا انه اطول عنقا ومنقادا واصفر رأسا . جناحه مستدير الاطراف . ذنبه صغير القد ، مخروطي الشكل . ثوبه الى البردة الزرقاء المزاج يعلو قشتم ابيض واسمر . زوره وسندره ويطه الى البردة السمره يعلو مزاج وردي || يثن اضموصه الى البرة بين النباتات للشباكة . الاثم تحسن وحدها من ١٤ الى ١٦ بوصة . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع . الذكر يثن الفداء والحماية .

٣١٠٠١ - **يربوع** * **اودع**
Dipus (S). Gerboise (F). Jerboa, Jaculus (E).
جنس حيوانات لينة قاضية جاسة من فصيلة اليربيات . انواعه عديدة موطنها جميع الاساقع الصحراوية الحارة والمتعددة الحرارة || شكله ككل فارة كبيرة . طوله نحو ١٧ سم . وذنبه ٢٠ . حيتاه جاحظان . اذناه كبيرتان متضربان وهو طويل اليربين قصير اليربين جدا وذنب مستطيل ريمه صعدا يحمل في طوله خصلة صوف لونها بلون الرمل ، يطة ابيض || يالغ القفاني والناظر الحافة يتخذ جمره في نثر الارض . انثاه تحمل ثمانية اطباء وتضع اربع مرات في السنة في كل مرة من ٤ الى ٦ ادراس . قوته المواد النباتية عل اختلاف انواعها وصادها والحشرات والجراد || اعرف انواعه واعماها ما يتبع .

٣١٠١٢ - **يربوع تدعري**
Dipus macrotarsus (S). Gerboise macrotarse (F).
موطنه البلاد السورية . ثوبه بلون الرمل . طوله نحو ١٦ سم . وذنبه ١٩ || يكثر في البادية .

٣١٠١٣ - **يربوع ذو ريش**
Dipus sagitta (S).
Gerboise flèche (F).
موطنه العراق وركية واروبه . ثوبه بلون الرمل . ظهره عاين اللجج . ذنبه اسود الخصلة ، ابيض النورة .

٣١٠١٤ - **يربوع مصرى**
Dipus aegyptius (S).
Gerboise d'Egypte (F).
موطنه فسيح الاجزاء يمتد من الجزائر الى تونس وليبيا ومصر والنوبة وفلسطين وشمال الجزيرة البرية || ثوبه الى الصهية الصفراء . ظهره بلون الرمل الرطب . يطة ابيض . خصلة ذنبه سمراء ، طرفها اخبر .

٣١٠٠٥ - **يربوعيات**
Dipodidae (S).
Dipodidés (F). Dipodidae (E).
فصيلة حيوانات لينة قاضية جاسة من مرتبة قردنيات الشوزب ورتبة القوارض . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة جوامعها القلبية وقصر الامامية . رؤوسها غليظة . اذانها ملغية الشكل متصبغة . اعناقها قصيرة . اذنانها طويلة || موطنها العالم ، تألف القفاني والقيمان . قوتها الاشباب والجلود والثار || اعرف اجناسها اليربوع والزيبود والعولاة والمائل .

٣١٠٠٦ - **يربيس** * **فهر ابيس**
Fells uncia (S). Snow leopard, Irbis (E).
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات . يشبه النمر ككوتنا وغلقا . يقال انه ضرب منه . طوله نحو ٢٣٢ سم . بما فيه الذنب الذي يعلو نحو ١٠٠ سم . ثوبه ابيض الاساس



يربوع



يربيس



يردوروم



يرسون



يرع

٣١٠٢٢ - يَرْغُونُ تَاحِمُ الْهَلَبِ *

Ericulus setosus (S). *Ercule soyeux* (F).
حيوان لبني حاشر من فصيلة الذفاليات. موطنه جزيرة مدغشقر. يألف الحشبات والنباتات التي تكثر فيها الأعشاب سرسحة دجوي. قوته الحشرات والديدان || جسمه صغير القد، قريب الشبه بالفتند، يطول نحو ٢٤ سم. جلده مستطيل الخشونة، عديم الحبال. ثوبه إلى السمرة السوداء || الاثنى ثلثون تقص في كل دمن من ١٥ إلى ١٢ جرراً || يياته الشتوي يستمر نحو أربعة أشهر.

Larvale (F). Larval (E).

٣١٠٢٤ - يَرْبُ

راجع ديموي.

Pierre calcaire molle (F).

٣١٠٢٥ - يَرْعَمُ

هو كل حجر كلسي عديم الصلابة أو سريع الانفتاح.

Asperge (F).

٣١٠٢٦ - يَرْعَمُ

هو الحليون المعروف ج رابع، اطلبه.

Sparmannia (S).

٣١٠٢٧ - يَرْغُومُ

Sparmannia (F). *Sparmannia* (E).
جس جنات وشجيرات برية وزراعية تربيتية من فصيلة التريزوفيات. منبتها البلاد الافريقية. سطحها مستعصية تملو من متر إلى ستة أمتار. أوراقها شجائية الاشكال. انزهارها صيواني التجميع، طرفي الارتكاز. انزهارها صنيعة القند يبيض اللون || انواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية:

٣١٠٢٨ - يَرْغُومُ اَلْأَفْرِيقِيّ

Sparmannia africana (S). *Sparmannie d'Afrique* (F).
نوع من البريوم. ساقه تملو نحو ستة أمتار. أوراقه قليلة الشكل تطول من ١٢ إلى ١٥ سم. وترس من ٨ إلى ١٠ سم. تصلحها مسنة الحفاف، مزينة البشرة على المفتحين العليا والسفل. انزهارها صنيعة الحجم، يبيض اللون || تنويرها يستمر طويلاً شهر أيار.

٣١٠٢٩ - يَرْغُومُ كَفِيّ الْوَرَقِ

Sparmannia palmata (S). *Sparmannie palmée* (F).
نوع من البريوم. ساقه تملو من متر إلى اثنين. أوراقه كفية الشكل، خماسية الفلق المستطيلة المختار. تصلحها عديم الزغب، بحري الخضار. انزهارها يبيض اللون، صنيعة الحجم || تنويرها يستمر من آذار إلى تموز.

Henné (F).

٣١٠٣٠ - يَرْكَاة

هي الحناء، اطلبه.

Pedates callier (S).

٣١٠٣١ - يَرْكَبُ *

Pédates café. *Lièvre sauteur* (F).

حيوان لبني قاضم وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدافيات. موطنه بعض الاسواق الافريقية. طوله نحو ٤٠ سم. يذيقه ٤٠. رأسه كراس الانب. عيناه كبيرتان جاحظتان. ذنبه جنل الصوت. جرائمه قصيرة، خماسية الاصابع، قوية الاظافر القوية. جرائمه الخلفية مستطيلة، رباعية الاصابع، قوية الاظافر القصيرة المستعصية || ثوبه إلى الصبغة السوداء. بطنه زخرفاني يفض. يعيش جماعات كثيرة العدد || جحره ردة فضية تكتنفها أربعة أنفاق مصالبة مستطيلة. قوته الاعشاب والجذور والحبوب.

٣١٠١٥ - يَرْغُونُ أَصْفَرُ *
Eriogonum flavum (S). *Eriogone jaune* (F).

نوع من اليرغون التريبي. ساقه زياة تملو نحو ٣٠ سم. أوراقه منقطة ملطية الشكل تطول من ٢ إلى ٨ سم. تصلحها خلية البشرة على صفحتها. انزهارها حامية الارتكاز، صنيعة التجميع، خلية البشرة، صفراء اللون || تنويره يستمر من حزيران إلى أيلول.

٣١٠١٦ - يَرْغُونُ خَمِيسِيّ *

Eriogonum umbellatum (S). *Eriogone en ombelle* (F).

نوع من اليرغون الجليلي المنبت. ساقه تملو من ١٥ إلى ١٥ سم. أوراقه منقطة ملطية الشكل. تصلحها بحري الصفة العليا، خلية السفلى. انزهارها حامية الارتكاز، خصية التجميع، صفراء اللون || تنويره يستمر من حزيران إلى أيلول.

٣١٠١٧ - يَرْغُونُ عَدَقِيّ *

Eriogonum corymbosum (S). *Eriogone en corymbe* (F).

نوع من اليرغون التريبي. ساقه مزينة تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أوراقه منقطة اهليلجية الشكل، تصلحها خلية البشرة، متصع الاطراف. انزهارها حامية الارتكاز، ملطية التجميع، لونها إلى البياض الموشح بالوردي || تنويره يستمر من تموز إلى أيلول.

٣١٠١٨ - يَرْغُونُ مَرْكَبِيّ *

Eriogonum compositum (S). *Eriogone composite* (F).

نوع من اليرغون التريبي. ساقه مرءاء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. أوراقه يبيضة الشكل، قليلة القاعدة، تصلحها اخضر الصفعة العليا خلية السفلى. انزهارها حامية الارتكاز، خصية الشكل، مركبة الصفوف المتراكبة. لونها إلى البياض الاغبر || تنويره يستمر من تموز إلى أيلول.

Pterostyrax

٣١٠١٩ - يَرْفِيلُ *

جس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الاصطركيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها الاشجار والشجيرات. سطحها منتعصية فراءه. أوراقها عابلة منقطة متصافية. تصلحها اهليلجية جامدة الثقل، مسنة الحوافي. صفحتها السفلى كشيعة الحبل الاطلل. انزهارها صورية الارتكاز، معتدوية التجميع. انزهارها ديموي. ثمارها جرد برصية الشكل، رباعية الاجنحة.

Ictère, jaunisse (F).

٣١٠٢٠ - يَرْكَاة

Icterus, jaunisse (E).

حال مرضية تمرى لسج الحيوان تنفسه، سببها العدائي تملو الصفراء من بلوغ المني بسهولة تختلط بالدم.

Chlorose (F).

٣١٠٢١ - يَرْكَاة - يَرْكَاة

Chlorosis (E).

ومنهم من قال أركان. حلة فيزيولوجية تصيب النبات فتسبب اصفرار الارواق وتنسجها من القيام بعملها التنشيطي على الزينة الاكلا كما يؤدي إلى تخسیر النسج والذبول الباكر. وينقال للارواق والنباتات المصابة باليرقان ميوقة.

Larve (F).

٣١٠٢٢ - يَرْكَاة - يَرْكَاة

هي الدعوص، اطلبه.



يرغول تاحم الهلب



يرلب

الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . أخطامها قصيرة . ملاسها دقيقة . كواسلها وبطنها شبه أسطوانية الشكل . رواشها معتدلة الحجم ، شفافة . قوائمها نشيطة || تألف المواقع الجافة والمنازل الريفية . قوتها المواد العضوية المنحلة . يرقاتها - عادمة البصر ، نائلة ودائمة .

٣١٠٤١ - يثوريكيات * Scenopinidae (S). Scénopinidae (F). Scénopinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . أجناسها وأولادها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المواقع الجافة وتفضي المسكن الريفية || أجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٨ مم . رؤوسها كبيرة . عيونها متقاربة ، مثائلة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثنائية الفصل . أخطامها صغيرة . كواسلها وبطنها شبه أسطوانية الشكل . رواشها شفافة ، قوائمها قوية || يرقاتها كومة ، دودية الشكل . بعضها وأشح والبعض الآخر دامن || أشهر أجناسها اليزكة .

٣١٠٤٢ - يثوروم * Georyssus (S). Géorysse (F). Georyssus (E).

جنس حشرات من فصيلة اليزوميديات ورتبة غدييات الاجنحة . أنواعه المعروفة نحو ٢٥ جميعها من حشرات المناطق الباردة والمعتدلة الحرارة || أجسامها عادمة الراشح صغيرة القدة ، بيضية الشكل ، تطول من ٢ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة ، مملوكة . عيونها بارزة . أخطامها مستطيلة . تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبوسية الاطراف . كواسلها شبه مخروطية . مقطوعة المقدم . الاحادها لاحقة قنقلها خلوطين من التفرقات الدقيقة . قوائمها نشيطة . اثوابها وحيدة اللون يكثر فيها الاسود وبشتقاته والجزوي والكسني || تألف غشقات المتاعق ويجاري الماء حيث تنعم في الوبال والامسال الرطبة . قوتها المواد العضوية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات وهوام .

٣١٠٤٣ - يثوروميديات * Georyssidae (S). Géoryssidés (F). Georyssidae (E).

فصيلة حشرات متفرقة من غدييات الاجنحة . أجناسها وأولادها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة || أجسامها عادمة الراشح صغيرة القدة ، بيضية الشكل ، تطول من ٢ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة ، مملوكة . عيونها بارزة . تأثيرها وملاسها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، كساعية الشكل ، تلحف الرأس . المالحدا لاحقة . قوائمها نشيطة ، اثوابها سوية الالوان || تألف الرياشح وصفات المتاعق ويجاري الماء . تميش على المواد العضوية المنحلة على ما تستطيع تنصه من دوبييات وهوام || أشهر أجناسها اليزوروم .

٣١٠٤٤ - يسكو - يسري Ben (F). ٣١٠٤٥ - يستعور

شجر تصنع منه المساويك ومساويكه اشد المساويك إنقاع لشجر ونابته بالبراة وفيها شيء من مرارة مع لين .

٣١٠٤٦ - يستوريك Ostryer (F). هي النابية للشهورة بصلابة خشبها .

يسرح في الليل ويبعث في النهار . انثاء تحمل اربعة اطياف وتضع اربعة ادراس مرة واحدة في السنة .

٣١٠٣٢ - يثريفلم ، ندفيك Eriophyllum (S). Eriophylle (F).

جنس نباتات عشبية مصرمة من فصيلة المركبات . انثاءه عديدة ، مغطاه بري وبعضها زبني . سطحها فروع مستطيلة الزغب الذي يشبه ندف القطن . اولادها متعاقبة وريشية غزيرة . انثاءها رؤوسية صفراء اللون . يزورها متوجة بقشبة || أشهر اولادها ما يتبع .

٣١٠٣٣ - يثريفلم عديك ، ندفيك عديك Eriophyllum confertiflorum (S). Eriophylle à corymbes (F).

نوع من البروتيفلم ، عشبته تطلو من ٣٥ الى ٦٥ سم . اولادها صغيرة القدة ثلاثية التفرخ او خماسية . رؤوسها الزهرية كثيفة التجميع ، قصيرة الالان ، هرية اللون . انثاءه يستمر من ابرائل حزران الى ايساط تموز .

٣١٠٣٤ - يثريفلم مخضوري ، ندفيك مخضوري Eriophyllum cuspidatum (S). Eriophylle gazouyant (F).

نوع من البروتيفلم ، عشبته تطلو من ٣٥ الى ٥٥ سم . اولادها السفل خماسية التفرخ . رؤوسها الزهرية كبيرة القدة ، متوسطة العدد ، مستطيلة الالان || انثاءه يستمر طوال شهر تموز .

٣١٠٣٥ - يثريبي * Yurumi (F). حيوان لبون اريد مشهور باسم تمشور اعرف ، اطلبه .

٣١٠٣٦ - يثرون Sperme des animaux féroces (F). البرون صعد الحيوانات المفترسة .

٣١٠٣٧ - يثرون دماغ الفيل .

٣١٠٣٨ - يثوريكيات Spermaphytes (F). تعريف يطلق على جميع النباتات التي تلتف بزور حقيقية من اي قسم كانت ان من المستورات أو المريانات أو التسميرات .

٣١٠٣٩ - يثرام * Bioplans (S). Bioplane (F).

جنس حشرات لافونية من فصيلة البشيات ورتبة مفدمات الاجنحة . انواعه المعروفة خمسة مهددا الترق الاذن يكثر وجودها في بعض مناطق سورية الداخلية || أجسامها صغيرة تطول من ٨ الى ١٢ مم . اثوابها وحيدة اللون منها الاسود والجزوي والاسفر والكسني والبي . رؤوسها صغيرة مستديرة . قرونها الاستشعارية دبوسية الشكل ، كواسلها معدودة ، ناشرة الاطراف الامامية . الاحادها غفدة ، مقطوعة الاطراف لا تلحف كامل الجسم || تألف المرح وزرائب البقر والنامز . تميش تحت الكش على المواد العضوية والنابية المنحلة .

٣١٠٤٠ - يثركة Scenopinus (S). Scénopine (F). Scénopine (E).

جنس حشرات من فصيلة اليزكيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || أجسامها مستطيلة تطول من ٣ الى ٦ مم . رؤوسها كبيرة . عيونها متقاربة عند الشقين . قرونها



يثام



يثام

تركب النباتات المرعوية والمتعمية || أشهر أنواعها أليف المزناز ويسف فرموزا .



يسف أليف



يسف ثنائي اللون



يسف فرموزا



يسف هزاز



يسف

Chenille (F).

٣١٠٤٧ - يسف سُرُوع
هو الاسرود ، اطلبه .

٣١٠٤٨ - يسف أليف *
Tritonia (S). Tritonie (F). Tritonia (E).

Ortalis formosa (S). Ortalide élégante, Otile elegant (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مغطاة الاريل غلفيات الخياشيم فصيلة البسويات . انواعه المرعوية كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على التنبوت البحرية || اجسامها عراطة اهلجية لشكل شبيه بالبراق . رؤوسها قصيرة مقبوضة ، ثنائية الافراس الجاحسة . خياشيمها طرية الانكاز ، ثنائية الصف ، متشعبة . افواهها ثنائية الفكوك القرنية المسنة الاطراف . الارباع ملونة بكث في الاحمر والازرق والاصفر .

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة البسويات . جسمها صغير القد بطول من ٧ الى ١١ م . رأسها كبير ، شبه مخروطي الشكل ، حطلي اللون ، اقفر المخرج . جبهتها برتقالية اللون . خطمها مستدل الطول ، صناعي اللون . عينها مكورقان ، فاشقان ، اربوالبصان ، صناعي مطويان بالفضي . زباناها قصيران . رؤسها كيران ، صناعيان ، مشجان بالاسمر المابق . قوائمها الى الحطلي . صدورها صناعي اللون ، فضي العمل ، تقطبه بعض الخطوط السمر . بطنها يرسمي الشكل ، صناعي الخصب ، اصفر المخرج ، وتلوو ستة اطواق سمر || تظهر الحشرة الجملانة من حزيران الى ايلول . مرتها المرامي والاعشاب المتعمية حيث تقترس مختلف انواع الارق والحوام || يرقاتها غاصلة تركب الارواق وتعيش عليها حتى الاكمال .

٣١٠٤٩ - يسف سُرُوع *
Triconilidae (S). Triconilidae (F).

٣١٠٤٩ - يسف ثنائي اللون *
Ortalis bicolor (S). Ortalide bicolor (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مغطاة الاريل غلفيات الخياشيم . اجسامها وانواعها المرعوية عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . اكثرا يبي وبعضها يقتر من الشطوط . اسرارها متفردة العدد || اجسامها مستطيلة عادمة الصف . رؤوسها ثنائية او رباعية اللامس . خياشيمها متشعبة ، مركزها فوق الرءاء على الظهر او على الجانبين || اعرف اجناسها واشهرها اليسوع والبرادة وغلوكس .

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين وفصيلة البسويات . جسمها صغير القد بطول من ٤ الى ٧ م . رأسها محبب الشكل ، صناعي اللون . خطمها مستدل الطول . زباناها صغيران ، متيقان . عينها كيرتان ، ذهبيتان . صدورها الى انخضار اللامس . بطنها يرسمي الشكل ، ازرق اللون ، اسف المخرج . مرزا الى السرة الخفية الباقية . رؤسها كيران ، مفاغان . قوائمها الى السرة الكتسية || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواسط تشرين الاول . مسرعا يشمل كل مكان حتى الاماكن للمحولة || قربها الحوام . يرقاتها نائلة .

٣١٠٥٠ - يسف فرموزا *
Pimpinella (S). Pimpinelle (F). Pimpinella (E).

٣١٠٥١ - يسف فرموزا *
Ortalis formosa (S). Ortalide élégante (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الخيميات . انواعه المرعوية عديدة منها الحولية والحرولة والعمرة والشمر الابيض || سواها متصبية فراء . اوراقها مركبة . ازهارها صرولة التجميع ، ابطي الانكاز او تاجية . ازهارها بيضاء اللون . غمارها يزود صغيرة || أشهر انواعها :

ذبابية من البسويات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٧ الى ١١ م . رأسها وقوائمها الى الحطلي الاقفر . حركتها فضية . جبهتها برتقالية . تسرح من حزيران الى ايلول . مرتها المرامي الزلطة والاعشاب المتعمية حيث تلتهم مختلف انواع الحوام || يرقاتها غاصلة تركب الارواق وتعيش عليها .

يسون انهي ، آنيون
P. anisum (S).
يسون اكرتي
P. cretica (S).
يسون اعسر
P. viridis (S).
يسون ذهبي
P. puberula (S).
يسون سرلي
P. anthriscoides (S).
يسون صدقي اللدر
P. eriocarpa (S).
يسون ملدي
P. corymbosa (S).

٣١٠٥٦ - يسف
Jaspe (F). Jasper (E).

٣١٠٥١ - يسف هزاز *
Seoptera vibrans (S). Ortalide vibrante (F).

حجر اليشب حجر صواني مختلف الانواع له من حجر الحك الاسود اي مصادق الصافة .

ذبابية من البسويات صغيرة القد ، طولها يراوح من ٥ الى ٧ م . جسمها ازرق اللون . رأسها الى الشقرة الباقية . قوائمها سود . اصافها حطلية كتنيو باستمرار اعتراز جناحها . تسرح من حزيران الى آب . مرتها الاقارب والمرامي حيث يكث الارق والحوام || يرقاتها حوكة مضاعفة عند الحاجة .

٣١٠٥٧ - يسف سُرُوع *
Agathes amelloides, Astar capensis (S). Agathée, Astar d'Afrique, A. du Cap, Marguerite bleue (F). Cape daisy, Cape aster (E). Afrikanischer Agath (D). Astar d'Africa (I).

٣١٠٥٢ - يسف سُرُوع *
Ortalididae (S). Ortalididae (F).

بجلة تربينية معمرة من فصيلة المركبات . مهدا افرقية الجنوبية وقد حمت زراعتها معظم حطائق العالم . ساقها فراء تملو من ٧٠ الى ١٢٠ م . اوراقها متعاقبة ، حافسة ، ملقة الاطراف . نصلها يضيي الشكل ، خلي الصفحة . ازهارها رؤوسية ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، زرقاء اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . انواعها المرعوية نعد ٤٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . حشرات ذبابية الشكل . انثاها مسلحة بأثرة حادة تستعملها لوضن افواهها عديدة الالوان الزاهية المتراكبة || يرقاتها دامت او غاصلة

Chevreau (F).

Small goat, Young roe (E).

٣١٠٦٤ - يَغْر

هو الجدي والحلام والراغلة .

٣١٠٦٥ - يَغْرُوس * Diplax, Sympetrum (S).

جنس حشرات من فصيلة اليسوييات، أنواعه عديدة جميعها مفترسة تقتضي على الحوام . طول اجسامها يراوح من ٣٠ إلى ٤٠ سم . وبسطة اجنحتها يراوح من ٤٢ إلى ٦٠ سم . ألوانها المتقلبة إلى الخشن الصنابي المالح . اجنحتها وردية الجسم ، صفر القواعد يطولها في أول زاماتها الاشيرة خطوط متفرعة صنابية اللون . برقاها عادية حامدة الهلب مستطيلة الاربعل تعيش في رسوئ المنائق ويحاري الماء .

٣١٠٦٦ - يَغْس * Orthetrum (S).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة اليسوييات ، أنواعه عديدة، طول اجسامها يراوح من ٣٥ إلى ٤٧ سم . وبسطة اجنحتها يراوح من ٥٥ إلى ٧٠ سم . ألوانها إلى الزرق . روضها خضر . اناثها ابيض ثوبها وجعنا . برقاها زياه الجسم تعيش في الاسمان .

٣١٠٦٧ - يَغْسُولِب * Libellula (S).

Libellule (F). Dragon fly (E). جنس حشرات من فصيلة اليسوييات، أنواعه عديدة، اجسامها مستطيلة ، طولها يراوح من ٣ إلى ٤٦ سم . وبسطة يراوح من ٥٥ إلى ٧٦ سم . ألوانها حضية أو مكتنية اللون . اجنحتها شفافة شرجية التزاويق . جميعها مفترسة، بعضها يحمل على النمل .

٣١٠٦٨ - يَغْسُولِيَّات Libellulidae (S).

Libellulidés (F). Libellulidae, Dragon flies (E). فصيلة حشرات من رتبة العراشات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد، جميعها مفترسة تألف المنائق ويحاري الماء . كدوكوا اصفر قدا من اناثها وازن لونا منها . اناثها تقتف بمكنها فرديا على سطح المنائق وعلى صفحة الماء . تنقث عن دمايص جاسة تعيش كامل حياتها البرقية في الماء او في الرسل . حشراتها الكاملة تتميز بعدم الطلاق اجنحتها في الاستراحة والرقاد || اشهر اجناسها اليمسوب واليسس واليعروس والكركولون .

٣١٠٦٩ - يَغْشِيل Stachyurus (S).

Stachyure (F). Stachyurus (E). جنس جنات ممررة برية وزراعية تربيتية من فصيلة اليسوييات . سيقها تملو من مرتين إلى اربعة امتار . اوراقها عايلة متعاقبة ، مسنة الحصار ، تظهر بعد الازهار . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها صغيرة يضاء اللون أو صفراء ، رباعية الفصل والبتلات واللياسم و ثمانية الاسدية . ثمارها متينة صغيرة || اعرف ألوانها واشهرها التالية :

٣١٠٧٠ - يَغْشِيل بِكُورِي Stachyurus praecox (S). Stachyurus praecox (F).

نوع من اليغشيل . جنته تربيتية تملو نحو ثلاثة امتار . ساقها متصبية . افاندها قضيفة مرنة . اوراقها اليليجية طولها نحو ١٨ سم . وثمره نحو ٩ سم . تصالحا رقيقة ، مسنة الحصار ، جميلة الحصار الزاهي . ازهارها سنبلية التجميع ، متدلية ، صفراء اللون || تنويرها يستمر من شباط إلى نيسان .

Jade (F).

٣١٠٥٨ - يَسْم

حجر صواني التركيب شديد الصلابة .

٣١٠٥٩ - يَسْمِيَّت * Echten (S). Echtèa (F).

جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الخليات . انواعها المعروفة قليلة . جميعها امريكية المبت . معظمها لولبي متسلق وبعضها جبني . سيقها سرسة مائلة . اوراقها متعقة ، يصفية ، متعاقبة . ازهارها كبيرة القند زامية الالوان منها الالبيص والاصفر والاحمر . ثمارها جرابية الشكل نجيله القند || يستخرج من سيقها بالحرق عصارة لبنية يضاء اللون ، حريقة الطعم ، جمالية المادة لها استعمالها الطبي || اعرف انواعها واشهرها .

٣١٠٦٠ - يَسْمُورَةُ البَاذَنْجَان Euzophora osseatella (S). Euzophore de l'aubergine (F).

فراشة من الثنائيات ، صغيرة القند . بسطها نحو ١٧ سم . روضها الاماميان إلى السمرة يتوصلها تبيج اسود داكن . روضها الخلفيان مفوضان . رقتها مستعفة الجسم ، خبارة اللون ، مكتنية الرأس . تركب نباتات الفصيلة الباذنجانية اغصانها الباذنجان والبقليقة والبطاطا تنشب السوق وتدخلها مع جمام الثرية وتتابع نخرها وأذاها صمداً ما استطاعت .

٣١٠٦١ - يَسَمَار Raire (F). Trost of the deers (E).

صوت الأبل . واليثار شميرة في الصحراء تأكلها الأبل (السان) .

٣١٠٦٢ - يَسْمَحْمِيَّي * Psophia (S). Agami (F).

جنس طير من طوال الساق . أنواعه المعروفة قليلة العدد تجمع بين التفلق والتلق . اصطنها صفاق نهر الامازون . اجسامها ربة . اصطنها متوسطة الطول . روضها كبيرة . مناقبها غرولبية ذرية حادة الملاقط . اجنحتها قصيرة . انانيتها شديدة القصر . ارساغها جنيقية مستطيلة . ارياشها ناعمة رملة . روضها واعتاقها وطلونها خلية الريش والزنن || اعرف انواعها واشهرها اليمسبي اللجب .

٣١٠٦٣ - يَسْمَحْمِيَّيْ جَب * Psophia crepitans (S). Agami bruyant, Oiseau-trompette (F).

نوع من الياجيم صوته ككتلين البوق يردده أكثر من ٢٠٠ مرة في الثبار . وهو طائر كبير القند طوله يراوح من ٥٢ إلى ٦٥ سم . ثوبه شديد السمرة اللامعة . رأسه وصفته وظاهره وسدره ويطه وافنيكه سود . جناحه إلى الجلولية السمراء يطولها موج أزرق وأخضر . حلقه حبه غرولبية . زلفه وصفاه حمر . منقاره البس || اصطنها صفاق نهر الامازون اغصانها الصفاق الثالية . يعيش زمرأ واسرابا يراوح عدد افرادها من ٣٠ إلى ٢٠٠٠ وأكثر قوته البار والبلودر والحشرات والنبهان . يث في الخوص للفسوي الشكل يلفه بالحشاش الناعمة ويطويه بجوار القش والطين . أثناء تبيض من ١٥ إلى ١٢ بيضة تحضنها نحو ٣ اسابيع || يلبس بدن عناء وإذا عاش مع البيل والأرز والذجاج والحشش حافظ عليها كالحارس الأمين .



يشيت



يمسبي لجب



يعروس



يمس



يمسوب

٣١٠٧١ - يعقيل صيني *

Stachyurus chinensis (S). *Stachyura de Chine* (F).
نوع من اليعقيل ، جنسية تزيينية تملو نحو أربعة أمتار ،
ساقها متحركة الإفناد المنبسطة . أوراقها أحليجية ، ذلقة
إزاهم الأخير ، تطلو نحو ٢٠ سم ، تصالها جميلة الخضار
المالين ، مسنة الحار . أزهارها سبلي التجميع . أزهارها
بيضاء اللون ، صغيرة القد || تنويرها يستمر من أيار
إلى تموز .

٣١٠٧٢ - يعقليات *

Stachyuraceae (S). *Stachyuracées* (F). *Stachyuraceae* (E).
فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة مستقلة القامات
اجناسها وانواعها المروقة قليلة العدد مدهها بعض مناطق
الشرق الاقصى والجزر . جميع انواعها شجيرات وجنبات
معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || أشهر اجناسها
اليعقيل .

٣١٠٧٣ - يعموم التيجليات *

Isosoma graminicola (S). *Isosoma des graminées* (F).
حشرة خافضة من فصيلة السويليات ورتبة غشائيات
الاجنحة المفسورة . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة
الحارة والمنسفرة نحو الحارة || جسمها صغير القد يطول
نحو ٣ سم . رأسها مستعرض . جوشها مستطيل . يطنها
ضامر وقصير . زريقنها الاخيرة عحرائية الشكل . مرزها
مدبب وقصير || تتطفل على التيجليات ونها القمح
تؤذيها .

٣١٠٧٤ - يعقيد *

Leontodon (S). *Leontodon*, *Dent de lion* (F). *Hawkb-
bit*, *Lion's tooth* (E). *Löwenzahn*, *Kuhblume* (D).
Tarassaco, *Dente di leone* (I).
نبات طبي بري معمر من فصيلة المركبات . أوراقه
كبيرة مفرفة زهرها الماشية وتسن عليها . أزهار رؤسية ،
صغيرة القد ، كثيفة التجميع ، لونها إلى الصفار الكبريتي .
مصارتة لزجة ، مرة الطعم ، طبية .

٣١٠٧٥ - يعمور *

Hère (F). *Young deer* (E).
صغير الابل لا يزال يتبع أمه .

٣١٠٧٦ - يعقوب *

هو الحجل الرومي ، اعليه .

٣١٠٧٧ - يعقوبية *

Jacobaea (S). *Jacobaea*, *Herbe de St Jacques* (F). *Jacoby* (E).
Jacobabluem (D). *Giacobaea* (I).
نوع من الشروفة من فصيلة المركبات . وهو نبات عشبي
بري معمر يبدل في معظم المناطق المعتدلة من العالم القديم .
ساقه تملو نحو ٧٠ سم . أوراقه سافنة متعاقبة ، تصالها
مفرض الصفة المستطيلة . أزهار رؤسية صفراء اللون .
يقال انه من النباتات النافعة . مصارته تملد الجرح .
ونهم من قال انه يغيد القرعة .

٣١٠٧٨ - يعقالية *

Pragmatisme (F). *Pragmatism* (E).
البيعية مذهب فلسفي محوره معرفة الحقيقة في قدر
تأنيجه العملية .

٣١٠٧٩ - يعمور *

الجدي والصغير من الفأن . ج يماير .

٣١٠٨٠ - يعمية *

Rhubarbo grosselle (F).
هو الرأوند الرأيسي ، اعليه .

٣١٠٨١ - يعمس *

Callichromis (S). *Callichrome* (F). *Callichromis* (E).
جنس حشرات من عذبات الاجنحة طوال القرون وفصيلة
الزعنفيات . انواعها المروقة كثيرة العدد منتشرة في جميع
اصقاع البلاد الحارة . جميعها نائلة ودامت تعيش على
المواد العضوية والنباتية المنسطة || تتميز باستطالة الاجسام
والقرون الاستشعارية والقوائم الخلفية . اجسامها معتدلة
التطيل تطلو من ٢٥ الى ٤٥ سم . كولاسها مكورة
مخسورة . عيونها بارزة . اذنها حرة لاحقة . ألوانها
عديدة الالوان السوية ، يكثر فيها الاخضر الاسفج
والكسني الافتح المالح .

٣١٠٨٢ - يعمرة *

Coleonema (S). *Coléonème* (F). *Coleonema* (E).
جنس نباتات جنسية معمرة من فصيلة السذابيات . منها
بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية . سيقانها ترتفع
إلى ٣٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها ابيدة متعاقبة خيفة التصال
المسنة الاطراف الجامة . اذنها حرة خافية الفصل والنباتات ،
عشارية الاحدية ، ختلفة الالوان والتجميع || انواعها
المروقة قليلة العدد ، أشهرها التالية :

٣١٠٨٣ - يعمرة بيضاء *

Coleonema album (S). *Coléonème blanc* (F).
نوع من البيرة التزيينية . ساقها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
أوراقها تطلو نحو ١ سم . وعرض نحو ١ سم . اذنها
بيضاء اللون ، فردية التجميع ، طرفية الاينكاز ، مهدبة
التويج والفتابات ، مقطوعة البتلات || تنويرها يستمر
طوال فصل الربيع والصيف .

٣١٠٨٤ - يعمرة قاعرة *

Coleonema pulchrum (S). *Coléonème superbe* (F).
نوع من البيرة التزيينية . ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم .
أوراقها سنائية التصل تطلو من ٢ الى ٥ سم . مقصتها
مدنية شاذكة . أزهارها ثلاثية أو رباعية التجميع ، طرفية
الاينكاز ، حراء اللون ، خافضة العرف السطري || تنويرها
يستمر طوال فصل الخريف .

٣١٠٨٥ - يعمروب *

Hygrobia (S). *Hygrobie* (F). *Hygrobia* (E).
جنس حشرات مائية مقترنة من فصيلة البيريويتات ورتبة
غذيات الاجنحة . انواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في
بعض مناطق العالمين القديم والجديد || اجسامها صغيرة ،
شبه يضيئة الشكل ، تطلو من ٨ الى ١٠ سم . رؤوسها
صغيرة ، مستعرضة المؤخر . عيونها صغيرة ، بارزة .
قربها الاستشعارية عيطية . تأشيرها وفكوكها ولباسها
معصطة القد . كولاسها مستعرضة ، قليلة الطول . اذنها
مهدبة ، لاحقة . قوائمها شديدة اللطش . ألوانها وحيدة
اللون . تكثر فيها البصرة المحفدية للمالح || تألت المناطق
والاواور والياها الراكدة . تعيش على النباتات المائية وفي
الاصال ، قوتها كل ما تتصلح قنصه من دوبيات .

٣١٠٨٦ - يعمروبيات *

Hygrobiidae (S). *Hygrobiidés* (F). *Hygrobiidae* (E).
فصيلة حشرات مائية من عذبات الاجنحة . اجناسها



يعصم العجيات



يعقيد



يعقوية



يعوس



يعروب

٣١٠٩٣ - يَكْن

اليكن: هو البعل اذا اربع. ج. يكن.

٣١٠٩٤ - يَكْنَة

هي البقرة الحامل لأول مرة. ج. ينفات.

٣١٠٩٥ - يَكْطَاف

Scrapera

Scrapera, Réveilleur (F).

جنس طير من الجواثم وفصيلة الغرابيات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق استرالية. تألف الغابات وصفات الانهر. ملجئها الحياتي جماعي. افواجها تمتد من ٣٠ الى ٨٠ زوجاً. قوتها الثمار والبذور والخشرات والوديات || تتميز بكثرة تعيها المزيج الذي تردده عند الصباح الباكر || اجسامها شبيهة باجسام الشقوة او غراب الزرع. مناقبها غرورية جالسة. اجنحتها لاحقة. اذناها شبه غرورية. اطيها الى السواد الاسمر وبعضها الى السواد الازرق المزيج. اطفالها واجنحتها بيضاء وسطوة بالابيض || تدئن في الايام الباسقة. اناثها تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمفردها بينا الذكور توفن لها الغذاء.

٣١٠٩٦ - يَكْصُوم

جنس حشرات من فصيلة القيصويات ورتبة ذوات الجناحين انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٥ الى ٨ م. رؤوسها شبه مزوانية الشكل مستقلة. عيونها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة، ثلاثية القصل. تأشيرها صغيرة. ملابسها ثنائية العقل. كراسلها ضيقة. بطونها مستطيلة، صغيرة الممرات الخلفية شديدة رواشها تبتية الخضاب. اغخاذ قوائمها الخلفية شديدة الضخامة || تألف الحراج والغابات. قوتها طلع الازهار وصيقها. يرقاتها رائجة تفرس ما تستطيع من دويبات.

٣١٠٩٧ - يَكْصُومِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف الى ١٢ م. رؤوسها مزوانية. عيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية ثلاثية القصل. تأشيرها صغيرة. ملابسها ثنائية العقل. كراسلها شبه اسطوانية. بطونها مستطيلة. رواشها شائعة عند معظم الاجناس. الغذاء قوائمها الخلفية مستضخمة || يرقاتها رائجة، شبه دودية الشكل || اشهر اجناسها القيصوم.

٣١٠٩٨ - يَكْطِين اقْرَع

هو القرقع، اطلبه.

٣١٠٩٩ - يَكْطِين اقْرَع * قَاوُون المير

Cucumis melopepo (S). Pétisson, Mélépépon, Bonnet d'électeur (F). Squash (E). Melonen-Kürbis (D). Melopopeo (I).

نوع من القرقع وهو نبات عشبي قوامه زراعي شائع الاستعمال. ساقه مدادة لا قياسية الطول والبرقع والتساقط ثماره متوسطة قلنسوية الشكل مستضيضة اخضر الشقين المفروض. لياها جامد المكسر، متوسط الحلاوة، جيد الصنت يطيخ ويريب || زراعته لا تستوجب عناية خاصة.

وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المالحين القديم والجديد || اجسامها صغيرة، شبه يضيية الشكل، تطول من ٦ الى ١٥ م. رؤوسها مستقلة، مستقلة. عيونها ناشرة. قرونها الاستشعارية عيطية، مركبة من ١١ فصلة. كراسلها مسترسمة، قليلة الطول. اغمادها لاحقة. قوائمها شديدة النشط || جميعها مفترسة وداسة تعيش في ايمان المياه الزركدة || اشهر اجناسها القيرروب.

٣١٠٩٧ - يَكْطَاع

هو الققمحة، اطلبها.

٣١٠٨٨ - يَكْطُود

جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة الورديات. انواعه عديدة، اعطائها العالم، مرتمها اعشاب المراضي. اجسامها يضيية الشكل تطول من ٣ الى ٥ م. رؤوسها مثقلة الزوايا. القوائم ملونة يكثر فيها التلحجج للمرتمش. اضرارها زديدة لا تستوجب المكافحة.

٣١٠٨٩ - يَكْطُود الرِيَّاس

Aphrodes histronicus (S). Aphrode comédien (F). حشرة من فصيلة الورديات ورتبة متجانسات الاجنحة. جسمها صغير القند يطول من ٣ الى ٤ م. || رأسها كبير الجرم، لونه الى اخضر الالاس تملو زرققة يضيء. عظمها ممثل الطويل. عينها كبرتان. زبانا قصيران. كوسلها مستطيل الشكل، ابيض اللون، اخضر الحثار الذي يتناح الحبيبة. حبيبتها عرمية، بنية مجتمعة بالاسود. ظهورها كامل الحنجية، لاص، ابيض اللون، يني التلحجج والتدبيج. وشتاها غشائين شفافان. يلقها اسم. قوائمها كثيفة الملح الشاك || تألف الرِيَّاس والمروج. قوتها التسع.

٣١٠٩٠ - يَكْطَع

Raphiolepis (S). Raphiolepis (F). جنس شجيرات يرية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات. مهدا يعتد من الترق الاذن الى اليافان. سيقها فروع، مبيضة الاقتان، تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، اهليلجية الشكل او سنانية. نصلها جامدة، حيلة الخضار المايق. ازهارها عطرية العرف، عتقودية التجميع او متشككة، مختلفة الالوان. ثمارها حنينة سوداء اللون || انواعها المعروفة قليلة، اشهرها التالية.

٣١٠٩١ - يَكْطَع البَحْثَال

Raphiolepis indica (S). Raphiolepis du Bengale (F). نوع من اليفة التزيينية. ساقها تملو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، اهليلجية، مستطيلة القاعدة والعارف. نصلها جميل الخضار اللامع. ازهارها يضيء اللون يعلوا تمسح وردي واجر. اسديتها بنية اللون || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.

٣١٠٩٢ - يَكْطَع عُيْمِيَّة

Raphiolepis umbellata (S). Raphiolepis à ombelles (F). نوع من اليفة التزيينية. ساقها تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها ابيدة، يضيية متمكة تطول نحو ٩ م. وتعرض نحو ٥ م. نصلها جلدية التسج، مستديرة الاطراف تبدو كجسومة من الخيام. ازهارها يضيء اللون عطرية العرف، صغيرة القند، ظهرا من ١٥ الى ٢٠ م. || تنورها يستمر من ايار الى حزيران.



يَكْطُود



يَكْطَاف



يَقْطِين اقْرَع

إيطلي الأرتكاز أو طرقي. ازهارها قرمزية اللون ، قطرها نحو ٢٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

lochroma (S).

lochroma (F). lochroma (E).

جنس جنينات معمرة من فصيلة الباذنجانيات. مهدها بنفس مناطق امريكية الجنوبية. سفها تملو من متر الى ثلاثة امتار. اوراقها كاملة ، متعقبة . ازهارها زرقاء اللون أو حراء || تزروع للترين في الحدائق وهي من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الاثربة || انواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .



بَغْيَانَة

٣١١٠٩ - بَغْجُورِي أَنْبُوتِيَّة

lochroma tubulosum (S). lochroma tubuleux (F).

نوع من البكرورية . منبتها كولومبيا . ساقها تملو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها احليجية متعقبة . نصالها حلقة البشرة . ازهارها طوقى التجميع ، محوري الارتكاز. ازهارها مستطيلة المالحق ، متدلية ، لونها الى الزرقاء الجليدة . توريحاتها انبوتية الشكل تطلو من ٣ الى ٤ سم. || تنويرها يستمر طول شهر آب .

٣١١١٠ - بَغْجُورِي سَنَابِيَّة

lochroma lanceolatum (S). lochroma lancéolé (F).

نوع من البكرورية . منبتها بلاد الشيل . ساقها ترتفع من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها سنائية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٦ سم. نصالها كثيفة الخمل الاغبر اللون . ازهارها شبه صيولي التجميع ، محوري الارتكاز. ازهارها بنفسجية اللون ، توريحاتها تطلو نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١١ - بَغْجُورِي قِرْمِزِيَّة

lochroma coccineum (S). lochroma écarlate (F).

نوع من البكرورية . منبتها بعض مناطق امريكية الوسطى . ساقها مزينة العصا تملو من متر الى مترين . اوراقها سنائية الشكل مستطيلة الطرف . نصالها حلقة الصفحات السلس . ازهارها شبه صيولي التجميع ، محوري الارتكاز. ازهارها قرمزية اللون متوسطة القد ، قصيرة المالحق . توريحاتها تطلو نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١١٢ - بَغْجُورِي كَبِيرَة الزَهَر

lochroma grandiflorum (S).

lochroma à grandes fleurs (F).

نوع من البكرورية . منبتها جبال البرير . ساقها تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها احليجية الشكل تطلو من ١٥ الى ١٧ سم. وتعرض من ٧ الى ٩ سم. نصالها عادية التملو حل الصفحات العليا ، مزينة الصفحات السفلى . ازهارها كبيرة القد ، لونها الى الزرقاء الساليجينية . توريحاتها تطلو من ٥ الى ٦ سم. || تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف .



بَكَرِيَّة

٣١١١٣ - بَغْجُورِي

Camphorifère (F).

Camphoriferous (E).

نمت تحريفي يطلق حل كل ما يشج الكافور .

Citrouille, Courge (F).

Pumpkin, Gourd (E).

هي القرعة ثمرة القرع أو البقلين . اشكالها واحجامها عديدة متباينة . اوراقها متفارقة ترأص من كيلو واحد الى ٥٠ كيلو . لبها غلاطي يطبخ ويربب ، متوسط ما يحوي من مواد :

ماء	٩٥,٩٠ %
مواد ازوتية	٠,٢٨ %
مواد دهنية	٠,٢٥ %
مواد استخلاصية	٣,٨٧ %

٣١١١٤ - بَغْجُورِيَات

هي القرعيات ، فصيلة لبانية .

٣١١١٥ - بَغْجُورِي

البقي : جبار التمثل . القطعة منه يثقة .

Sphaeralcea (S).

Sphéralcée (F). Sphaeralcea (E).

جنس نباتات جنية أو عشبية من فصيلة الخيازيات. مهدها بعض اصقاع امريكية الجنوبية ، اقلها اقليم البرتقال . ساقها فراء تملو من ٥٠ الى ٣٠٠ سم. شكلها شكل الخيانة . اوراقها مهدبة النصال ، حراء اللون أو بنفسجية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، أشهرها التالية .

٣١١١٦ - بَغْجُورِي خَمْرَاء

Sphaeralcea miniata (S).

Sphéralcée rouge (F).

نوع من اليكاسة . جنية تزينية معمرة مهدها بلاد الاريبتين . ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق للتشارية المختار . نصالها حلقة البشرة ، بحرية الخصار . ازهارها فردية حراء اللون زنجفيرة الموحج || تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

٣١١١٧ - بَغْجُورِي صِيَالِيَّة

Sphaeralcea umbellata (S).

Sphéralcée en ombelle (F).

نوع من اليكاسة . جنية تزينية معمرة مهدها المكسيك . ساقها رفيعة تملو نحو ثلاثة امتار . اوراقها خاصة أو سباعية الفلق البامدة التستين . نصالها بحرية الخصار . ازهارها صيولي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها بنفسجية اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الخريف والشتاء .

٣١١١٨ - بَغْجُورِي قَبْجِيَّة الْوَرَق

Sphaeralcea acerifolia (S).

Sphéralcée à feuilles d'érable (F).

نوع من اليكاسة . جنية تزينية معمرة مهدها بعض مناطق كاليفورنيا . ساقها فراء تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها ثلاثية أو خاصة الفلق ، قريبة الشبه بوق القيقب . ازهارها فردية ليكية اللون أو بيضاء ، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف والخريف .

٣١١١٩ - بَغْجُورِي مَنُورُو

Sphaeralcea Munroana (S). Sphéralcée de Munro (F).

نوع من اليكاسة . شبة تزينية سبروتية مهدها بلاد كولومبيا . ساقها فراء تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها ثلاثية الفلق المستنة الاطراف . ازهارها متفودي التجميع ،

Ullucus tuberosus (S).

Ulluco, Ulluque (F).

نبات عشبي حولي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السرمقيات. اصطناعه البلاد الأمريكية يكثر في الأند وبوليفيا والبرو وفرانسه الجديدة. جذوره صفراء. ساقه عشبية خضراء اللون. أوراقها متعاقبة متعقبة، نصلها لتلي الشكل غليظ الصفعة. أزهاره صغيرة القند عقودية التصميم بحورية الارتكاز. || مسالكه تستعمل استهلاك البطاطا في اجاصية الشكل، جوزية الحجم، وردية اللون، صفراء اللون. يكثر بالبذور وبالنسائل.

Columba intermedia (S).

Biset, Bizet, Petit ramier (F). Rock-dove, Stock-

dove (E). Hohltaube (D).

نوع من الحمام البري الخفيف الطيران. يقال ان الحمام الداجن ينحدر منه ومن الحيدوان. طوله نحو ٣٠ سم. لونه الى الرمادي الخفيف. اجنته مغطاة بالاصفر، أقدامها بيضاء. رأسه شديد السمرة عايق الموج. صدره جوي. منقاره جانبي دقيق. افئدة امر الانتساب، حنطي الطرف. موطنه فسح الارياض يسم الشرق وأروية وأفريقية. يأنف المناطق البرية القليلة الانبهار. يعيش أرباباً صفيرة يروح عدد أفرادها من ٨ الى ٣٠. قوته الجيوب والبذور. يلدن عشه في تجاريف الاشجار وأقواب الصخور. اناته تحسن من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حشفتها بيضاء.

Phascolomys (S).

Phascoloma, Wombat (F). Wombat (E).

جنس حيوانات لبونة جاسنة من فصيلة السباعيات اي الجردان الجارية. || أنوعها المعروفة ثلاثة موطنها أستراليا والجزر المجاورة. اجسامها ربعة، قصيرة القوائم والذنب، تطول من ٦٥ الى ٧٥ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، قصيرة الاطراف المقعوية. حوزتها صغيرة. اذنانها قصيرة متصببة. اوبارها ناعمة. أنوارها تراوح من الصفرة الى السمرة السوداء. اخافيرها قوية تمكثها من حفر التربة || الاتي تحمل رضيعها في جراب رجب الب من مؤخر البطن || تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل افاق تخفروها في التربة || قوتها الاعشاب البرية والجذور. اما الانواع الثلاثة فهي :

Phascolomys ursinus (S).

Wombat ourson (F).

Phascolomys latifrons (S).

Wombat à front large (F).

Phascolomys vulgaris (S).

Wombat commun (F).

Phascolomyidés (F).

فصيلة حيوانات لبونة جاسنة قديمة جردان جارية، اعطيا.

٣١١٢٤ - بُمُخُور ، رُحُل Abeille mâle (F). Drone (E).

اليسفور او الرحل الذكر من النمل. وهو كاسل الشوار الشقي، عادم الشذام اللاس، أطول قدماً من النحلة العاملة واعطى جسماً منها. يحكم الملكية، اي الانثى الكاملة الاعضاء التناسلية والمعروفة ايضاً بالجم، مرة واحدة في حياتها وذلك قبل ان تهاجر متع المازن، ثم يموت على أثرها. ج يساخير ورسائل.

Ortalis (S).

Ortalide (F). Ortalis (E).

بُكُوس هو الاسم البرازيلي. جنس طير من رتبة الدجاجيات وفصيلة البترناتيات. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم مناطق أمريكا الاستوائية. تألف الغابات والاحراج الظليلة القريبة من الماء. ملجأها الحياتي جماعي. باعائها لامتدافية العدد الذي يراوح من عشرة أزواج الى مئة زوج وأكثر. قوتها التار والحبوب والبذور والخضراوات المختلفة والفصائل والافان || اجسامها مستطيلة رفيعة. رؤوسها صفيرة. مناليدها كبيرة، جالسة، مدنية الملاط. اعناقها مستطيلة. اجنتها مستديرة. اذناها كبيرة مزروية الاطراف || أنوارها تختلف مع الانواع، يكثر فيها الخضار الزيتي والشفية والشفقة || النانها أصفر قدماً من ذكورها وتصل بنفس الاثواب || قدتن امشاشها في الانجار الرقيقة. انانها تحسن وسعها من ٤ الى ٥ بيشات على مرتين في الخط. الترخيم يستمر نحو اربعة اسابيع. الذكور تزين الحماية والبقاء || تعتبر من الطرائد المزيمة. لحومها فاخرة الصنف، مرغوب فيها || أشهر انواعها وأمرتها:

Ortalis ruficeps (S).

Ortalis motmot (S).

Ortalis veluta (S).

Lantzia (S).

Lantzia (F). Lantzia (E).

جنس حيوانات متعينة من الرخويات مديات الارجل وفصيلة اللينيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطتها بعض جزر المحيط الهادي. تعيش في المناطق قوتها المواد النباتية والاشباب || اصداها صغيرة القند، محلزة، قصيرة القوائم الاشد. رؤوسها بيضية مقعوية. لواسها مبطلة سبانية الشكل، ارجلها وحيدة مستعرضة.

Fallenia (S).

Fallénie (F). Fallénie (E).

جنس حشرات من فصيلة الترسيمات ودية ذوات الجناحين انواعها المعروفة خمسة اصطناعها بعض المناطق الحارة والمدنعة الحارة || اجسامها ضخمة، شبه بيضية الشكل، كثيفة السلي، تطول من ٩ الى ١٦ م. رؤوسها مستعرضة، قليلة النشور، حوزتها كبيرة، فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية صغيرة، ثلاثية الفصل. ملابسها نحيلة. اصطناعها صغيرة. كواسلها محبوبة. يطونها مستعرضة، شبه مقعوية المؤخر. رؤوسها شبه شفافة، شفاها غضاب تني باحت. قوائمها متعددة الطول || جميعها وائمة تألف الغابات والمروج حيث تكثر الانذار. يرقاتها خاضلة ودائمة وبعضها نائل.

Unone odorant (F).

٣١١١٧ - بُكُوس ابو الينون، اعطيه.

٣١١١٨ - بُكُوس

اليلقة: الهمية البيضاء من عز ار بقرة. ج يلق.

Bots d'Aloès (F).

٣١١١٩ - بُكُوس

هو عود الد، اعطيه.



بُكُوس



يلوكو



يما



يماط

Source (F). Spring (E).

هو الماء الذي ينبع من الأرض. والنباتات حبيطة الاشكال تختلف باختلاف مصادرها واسرارها. منها الشجيرة والمتقطعة وللمستمر والوقتية والارثويزية، الخ.

Fontinal (F).

نمت تعريفي يطلق على ما يعيش في الينابيع أو على ما تحويه مياهها من املاح ورواد معدنية.

31135 - يَمُور

جنس طير من فصيلة الشقيانيات. انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة قمرها قدر الحية. رأسها كثري الريش المستطيل. منقارها صغير وضعيف. اجنتها عريضة مستديرة. ذنبها متوسط الطول. اسنانها قوية. اذنيها الى الزرقاة الزرقاء. اجنتها الى الزرقاة الباقية عليها تخطيط متعرج فيه الابيض والاريد والاسود. ريش عنقها وريشها ابيض الانتشاب اسود الجسم. ثألت السهل المنسقة الكثيرة الادخال، القليلة الشجر. تمويش ذكرها واثى كالحمام. اسرارها متوسطة المدد يراوح عددها من ١٢ الى ٢٠ زوجاً. قوتها الحبوب والخشرات من نصليات الاجنحة ويستقيها. اناثها لا تحضن البيض بل تضعه في حفن من الرمل والورق تحضره على شكل قلة صغيرة قطرها يراوح من ٤٠٠ الى ٥٠٠ سم. وعلاها من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. تصرف بيضها في القلة على عمق ٣ او ٤ سم. صفيراً متتابة ابتداء من الاسفل. وهي تبيض في موسمها الحولي الذي يستمر نحو خمسة اشهر من ١٠ الى ١٢ بيضة بحدل بيضة واحدة كل ١٣ يوماً. أما البيضة فتختلف بعد وضعها ياسويين من فرخ نشيط كاسي الريش يدر امر نفسه يدور عناء.

31136 - يَمُور

Onychiurus, Lipura (S).
Onychiure, Lipure (F).
جنس حشرات دامت من فصيلة النخوريات. انواعه المعروفة متوسطة المدد، منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. اجسامها صغيرة، مستطيلة الشكل، مبدرة الحلق، تطول من ٢ الى ٣ م. اذنيها تراوح من الرمكة السمراء الى البياض الاغبر المواج. رؤوسها مفلطحة متخرقة الى الاسفل. حيزها طامسة. بطونها مفلطحة، خفيفة المؤخر. قوتهاها قصيرة. اسرارها ثنائية الاظفار للزربة اللائساقية. مبدلة في المواقع الرطبة وتحت الحجارة وفي الجحالة.

31137 - يَمُوريات

Onychiuridae, Lipuridae (S).
Onychiuriées, Lipuriées (F).
فصيلة حشرات دامت من رتبة الكهكيات. اجنتها وانواعها المعروفة قليلة المدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة. اجسامها صغيرة، مبدرة الحلق، تطول من ٢ الى ٤ م. رؤوسها مفلطحة، مائلة. حيزها طامسة. قرنها الاستشعادية صغيرة رباعية القصل. صدورها ثلاثية المقلات اللائساقية، اصغرها الكليل. بطونها سداسية السكم. قوتهاها قصيرة. اسرارها ثنائية الاظفار للزربة اللائساقية القله. اشهر اجنتها النخور.

31138 - يَمُور

Triton (S).
Triton (F). Trumpe-shell (E).
جنس دويبات بحرية من الرغويات وفصيلة الينوسويات.

31125 - يَمُور

Hymenanthra (S). Hymenanthra (E).

جنية معمرة برية وزراعية تربيينة من فصيلة الينسجيات. شكلها قريب الشبه بالبرنج. ساقها تملو نحو ١٠٠ سم. افتادها مزينة الجمال. اوراقها صغيرة متعالية جلدية الاتصال الخروطية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. ازهارها محورية الارتكاز، قصيرة المالحق، خاسية التركيب، يفضاه اللون، يطولها موج اصفر. ثمارها جنية يصير الحمص، لونها الى البنفسجي الموشح بالابيض. تنويرها ربيعي.

31126 - يَمُور

Ormosis (S). Ormosie (F).
جنس اشجار حرجية من فصيلة القرنيات القراقية. انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها بعض المناطق الحارة والاستوائية من القارة الاسيوية والريكة الجنوبية. سيقانها منتصبة، فراء. فروصها شبه افقية الانتشاب. اوراقها مركبة، ريشية، ازهارها عنقودي التجميع. ازهارها كبيرة، جيلة اللولون المراكبة. مستحبة العرف الخافت.

31127 - يَمُور

Androme (F).
Andromous (E).
نمت تعريفي يطلق على الاسماك التي ترك البحر الى التهر في زمن التشرة.

31128 - يَمُور

Andromie (F).
Andromy (E).
اليمتورية فريزة الاسماك التي تهرس المياه البحرية الى الهيرة العذبة في زمن للتشرة.

31129 - يَمُور

Pélagique (F).
Pelagic (E).
نمت تعريفي يوصف به كل ما له علاقة مباشرة بالماء كقوك العظم والحيوت البحرية.

31130 - يَمُور

Pélagisme (F). Deep-sea life (E).
اليمية حياة الكائنات الضخامة في حضم الم.

31131 - يَمُور

Anagris (S).
Anagry (F).
جنس نباتات برية جنية ويصية من فصيلة القرنيات القراقية. ازهارها قليلة منها شواطي البحر المتوسط والبلاد العربية ويبرز كناربه. الواحدة ينيوت. اشهر انواعها اليبوت الثن.

31132 - يَمُور

أنابورس طيبي،
حزوب الخشور، جرد

Anagris foetida (S). Anagris fétide, Bole puant, Pudis (F). Bean-clover, Sinking wood (E). Sclinkbaum, Sinkholz (D). Anagride foetida, Fascolaria, Laburno foetido (I).

نوع من اليبوت وهو جنية برية طيبة تعلم من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقه مركبة عابلة، وريقاتها ثلاثية التجميع، لفصلها سنائي الصفصعة، خلى البشرة، يطول نحو ٨ سم ويعرض نحو ٢. ازهارها عنقودي الترتيب. ازهارها كبيرة القد صفراء اللون. سفاتها عنقوية تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض نحو ٢ سم. يزورها بفسفسيه اللون جسمية المادة. القليل من لقع ازهارها واوراقها ينشط الايلاج والياه، والكثير منه مقى.



يبوت ثن



ينح

أصنافها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أصنافها ببقية الشكل ، حلزونية ، ذرابة الأطراف ، جميلة الألوان المرششة والمجعدة || أشهر أجناسها اليسوع والفرودة .

٣١١٤٦ - يَنْطُوبَة شَهْبَاء *

Achroia grisella (S).

Petite teigne des ruches (F).

ولهى أيضاً حطوية شهباء || فراشة من فصيلة التاربات ودية حرشفيات الأجنحة . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٠ مم . روشاشا الاماميان رجوشها الى الصهباء الشهباء اغاليها من التنشيط والتجملع . روشاشا الخلفيان وربطها الى الذرة الحنطية المالح || الاثنى اكبر قدماً من الذكر || البرقة عاجية اللون ، سمراء الرأس ، تعيش في غلايا النحل من ايار الى تشرين وتقتل ما يلقعه حول النحل من اذى واصرار || وهي من الحشرات الناحية المؤذية لانها تدخل المنازل لتفترس الفراء والجلود والقرطاسية والقطن ...

٣١١٤٧ - يَتَّع ، يَتَّع (F). Maturité (E).

هو بلوغ الثمرة كالها الجسودي وقد يتم هذا اللور من حينها بعد الادراك وقبل النضج .

٣١١٤٨ - يَتَّع

ضرب من المقيق ، حركته جوية الموالج يطولها توشع اصفر .

٣١١٤٩ - يَتَّع Telopea (S). Télépée (F).

جنية برية وزينية معمرة من فصيلة القضييات . ساقها قرعاء تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها معتقة ، أصلها اهلبيجي الشكل ، غروبي الزام الاخير ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ويمرض من ٣ الى ٦ سم . ازهارها عقودية التجسيم ، طرفي الارتكاز . ازهارها أرجوانية اللون ، كبيرة القدة ، ثنائية الترتيب || تنورها يستمر من نيسان الى حزيران .

٣١١٥٠ - يَتَّك هو السط الصفي ، اطلبه .

٣١١٥١ - يَتَّك Podanthum (S). Podanthe (F).

جنس نباتات عشبية عولة او معمرة من فصيلة الجريسيات . انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من نباتات حوض البحر المتوسط . ساقها خشبية يكثر فيها التضيق . حزازية الشكل او لفتية . اوراقها مستطيلة النصل لا قياسية . ازهارها عقودية التجسيم او سلبية ، تاجية الارتكاز ، جريسية الشكل ، زرقاء اللون || اعراف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٥٢ - يَتَّك بِتَمَّه Podanthum canescens (S). Podanthe blanchâtre (F).

نوع من البينة الممطرة ، ساقها دقيقة خلية البشرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها لاطئة ، بيضية الشكل ، سنائية الزام الاخير . أصلها غلي البشرة حل صفحته السطلي . ازهارها عقودية التجسيم ، بيضاء اللون . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٣ - يَتَّك جَبَّارَة Podanthum giganteum (S). Podanthe géant (F).

نوع من البينة الحارة ، مهدا جزر اليونان . ساقها مسطحة قليلة الفروع تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . جلدها وتدي الشكل . اوراقها معتقة سنائية النصل جامدة الصلصة المسنة الختار . ازهارها سبلي التجسيم ، هامي الارتكاز .

انواعها المعروفة عديدة مشتركة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أصنافها ببقية حلزونية تطلو من ٨ الى ٥٠ سم . ألوانها جميلة مرششة ومجعدة || اعراف انواعها واشهرها اليسوع اليسوعي .

٣١١٤٩ - يَتَّسُوع Tritonia (S). Tritonie (F).

جلس نباتات دوفسية عشبية من فصيلة السوسنيات . انواعها عديدة برية وزراعية زينية . ساقها شراخية تنشيط بالازهار الالاناسي التجسيم . اوراقها صفة سيفة الشكل او عيطية . ازهارها صغيرة القدة او متوسطة ، ألوانها عديدة تختلف باختلاف النوع || زراعته لا تتطلب عناية خاصة وهو يربط في الاربة للمسوية التركيب ، للمعتدلة الانساج ، الغنية بالمواد الازوتية || أشهر انواعها ما يتبع .

٣١١٥٠ - يَتَّسُوع زَعْتَرَانِي Tritonia crocata (S). Tritonie safranée (F).

نوع من اليسوع الزيني . ضروبه الزراعية عديدة . شراخه الزهري يملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . صفة سبي الشكل مستطيل النصل يمرض من ١٢ الى ١٥ سم . ازهاره سبلي الترتيب . ازهاره رباعية التجسيم ، ثنائية التصنيف المتقابل لونها الى الصفار الزعفراني || تنوره يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٥١ - يَتَّسُوع عَصَلِي الزَهَر Tritonia scillaris (S). Tritonia à fleurs de scille (F).

نوع من اليسوع الزيني . شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم . صفة عيطي النصل محين الطرف . ازهاره سبلي التجسيم . ازهاره صغيرة القدة ، ودية اللون متراكبة البلات للفتة الاطراف || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

٣١١٥٢ - يَتَّسُوع مَدَّه Tritonia aurea (S). Tritonie dorée (F).

نوع من اليسوع الزيني السبروني الشائع الزراعة . شراخه الزهري يملو نحو ٦٠ سم . صفة سبي الشكل يمرض من ١٨ الى ٢٠ سم . ازهاره سبلي التجسيم . ازهاره كبيرة القدة لطرفا نحو ٦ سم . لونها الى البرتقالي الزاهي . تنوره يستمر من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

٣١١٥٣ - يَتَّسُوع مَقُوس Tritonia securigera (S). Tritonie arquée (F).

نوع من اليسوع الزيني . شراخه الزهري يملو نحو ٤٠ سم . صفة سبي الشكل يمرض نحو ١٦ سم . ازهاره سبلي التجسيم ، مقوس الشكل . ازهاره متوسطة القدة تطلو نحو ٣ سم . وطرفا ٤ سم . لونها الى البياض العاجي . تنوره يستمر طوال شهر ايار .

٣١١٥٤ - يَتَّسُوع يَتَّسُوع Triton tritonis (S).

أشهر انواع اليسوع . يملو طوله نحو ٥٠ سم . يكثر وجوده في المحيط الهندي .

٣١١٥٥ - يَتَّسُوعِيَات Tritonidae (S). Tritonides (F). Tritonidae (E).

فصيلة دويبات بحرية من الرضويات محيطات الارجل امانيات الهاشم . أجناسها وانواعها المعروفة عديدة .



يسوع زعفراني



يسوع يسوعي



ينطرية شهباء

ازهارها ضام متناهية لونها الى الزرقاء المائلة يعلوها مواج بنسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٤ - بَيْتَة خُمَيْلَة النَّاج

٣١١٦١ - بَيْتَة الْكُفْر *Antholyza ciffra* (S).

Antholysses cafre (F).

نوع من البقلة التريينية . شراعتها الزهري يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . شرافتها مستقيمة النصل المستطيل . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها ثنائية الارتكاز تمتد من ١٢ الى ٢٠ زوجاً . لونها الى الحمرة الارضوانية || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٣١١٦٢ - بَيْتَة عُنْكَوْبِيَّة

Antholyza paniculata (S). *Antholysses en panicule* (F).

نوع من البقلة التريينية . شراعتها الزهري يعلو نحو ٩٠ سم . شرافتها تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . وتقرض من ٦ الى ٨ سم . نصلها لا نظامي الانقسام والتسحين . ازهارها عشكولية التجميع . ازهارها كبيرة القذ فريدة الارتكاز . لونها متراكب الصفرة والحمرة البنفسجية || تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٦٣ - بَيْتَة كُونُو *Antholyza cunila* (S).

Antholysses de Cuno (F).

نوع من البقلة التريينية . شراعتها الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . شرافتها مستقيمة النصل المستطيل . ازهارها سنبلية الترتيب . ازهارها فريدة التجميع متعاقبة الارتكاز ، لا يفوق عندها ٦ ولا ينقص من ٤ . الوانها متراكبة ، انبساطها كبيرة الصفار ، بتلاتها الى الحمرة الزاهية . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٦٤ - بَيْتَق *Monsonia* (S). *Monsonia* (F).

Monsonia (E). *Monsonia* (D). *Monsonia* (I).

جنس نباتات عشبية مسمرة من فصيلة الفربيقيات . انبساطه عديدة ، مهدها بعض اكوار افريقية الجنوبية انحصار متقلبة رأس الرجاء الصالح . سطوها مفصلي مستطيلة . اورلقها متعاقبة ساجنة . ازهارها جملة الشكل ، ضغلفة الالوان ، ذكية الطرف الحامات || معظمها نبات بري وبعضها ترابي يزدهر في المزارك والحدائق . يتكاثر بالبذور وبالتعليل .

٣١١٦٥ - بَيْتَقِير * *Anomalurus* (S).

Anomalure (F).

جنس حيوانات قاضية من فصيلة البيريات . انواعها المعروفة تسعة موطنها البلاد الافريقية الحارة || اجسامها متوسطة الحجم ، طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . وذانها من ١٢ الى ١٦ سم . رؤوسها صغيرة القذ . اذنانها بيضبة الشكل . اذنانها جلطة الصف . جوارها قصير ، اطرافها حادة مستطيلة . روافلها الجانبية منحرفة . الارباع سوية اللون قراوح بين الصفرة والحمرة || تألف اللغات ، تتسلق الاشجار وتطير من واحدة الى اخرى . طيرانها دائم الانحراف نحو الارباع ، شوطها لا يفوق ٣٠٠ م . قوتها جميع المواد النباتية || احرف انواعها واشهرها :

٣١١٦٦ - بَيْتَقِير بِل * *Anomalurus pelei* (S).

Anomalure de Pele (F).

نوع من البير ، موطنه افريقية الشمالية . ثوبه الى السمرة تليق مع اقاربها من ثبج الظهر .

ازهارها ضام متناهية لونها الى الزرقاء المائلة يعلوها مواج بنسجي . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

Podanthum trichocalyctum (S). *Podanthe à calice velu* (F).

نوع من البقلة المصرة ، مهدها اليونان . ساقها فراء تعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم . جذرها لفي الشكل وللمادة اورلقها ضافية . نصلها لا قياسي التسنين المتبادل . ازهارها متقودية الشكل ، ثلاثية الترتيب ، طرفية الارتكاز ، زرقاء اللون ، خلية الناج ، قصبة الاذن . تنورها يستمر من حزيران الى تموز .

٣١١٥٥ - بَيْتَة عَرَبِيَّة

Podanthum virgetum (S). *Podanthe à cige nue* (F).

نوع من البقلة المحولة الطرية في جبال لبنان . ساقها عريانة ، غليظة ، مضطمة الزوايا ، فراء ، تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . قرعها قصيرة منتصب . اورلقها ضافية التجميع ، مركزها في أسفل الساق وفي سانية النصل ، جامدة الصفرة ، متبادعة التسنين . ازهارها بنفسجية اللون ، قصيرة الاذن ، فريدة او ثلاثية التجميع . تنورها يستمر من ايار الى حزيران .

٣١١٥٦ - بَيْتَة مَشْطِيَّة *Podanthum pinnatum* (S). *Podanthe penné* (F).

نوع من البقلة المصرة . مهدها الشرق الاذن . ساقها منتصب فراء . جذرها سنزاي الشكل ، مأكول المادة . اورلقها مشطية النصل ، ثلاثية او خلية التضامير الاقاياسي التفريض . عقابها الزهري رمل التجميع . ازهارها الى الزرقاء الزاهية . تنورها يستمر من حزيران الى آب .

٣١١٥٧ - بَيْتُونِيَّة ، بَيْتُونِيَّة ، دَمْبُوز

Inoeite, Dambos

مادة سكرية توجد في صفلات الجسم وفي اللويا المفردة وفي مسمار النبت وورق الجوز والفتح .

٣١١٥٨ - بَيْتُون * بَيْتُون *Cananga* (S).

Canang des Molluques, Unone odorant (F). *Ylang-ylang tree* (E). *Canangebaum* (D). *Cananga* (I).

جنية برية وزراعية من فصيلة القشديات . ساقها منتصب فراء تعلو نحو ٣ اذراع . اورلقها متعاقبة اهليلجية النصل . ازهارها جملة الشكل ، متوسطة القذ ، ثارية اللون ، فواحة العرف المسحب . يستخرج منها بالتعليل ادمان عطرية لاذعة الصنف شائعة الاستعمال . هاد ساقها وفروعها ليلي التركيب مثير البقلة الناعمة اللذيقية يستعمل في صناعة بعض الاوتار الموسيقية .

٣١١٥٩ - بَيْتَق *Antholyza* (S). *Antholysses* (F).

جنس نباتات دفيضة ضفية من فصيلة السولنات . انواعها عديدة ، برية وتريينية . ساقها شراعية تنهي بالازهار الاقاياسي الترتيب . اورلقها ثلثية الشكل . ازهارها قريبة الشبه من ازهار الدلبوث || زراعتها لا تتصلب متناهية غاصة لكنها تفقد الاربعة الدالية البازرة المتعصر الارزوي || احرف انواعها واشهرها ما يتبع .

٣١١٦٠ - بَيْتَة اَثْيُوبِيَّة *Antholyza aethiopica* (S). *Antholysses éthiopienne* (F).

نوع من البقلة التريينية . شراعتها الزهري يعلو من ١٠ الى ١٢٠ سم . شرافتها مستطيلة تعرض من ٢ الى ٣ م .



يشون



بير

٣١١٧٩ - **يُوكَا** *Yucca (S). Yucca, Yuque (F).*
Yucca, Bear grass (E). Palmetto (D). Iucca (I).
 جنس نباتات ممررة من فصيلة الزنبقيات. أنواعها عديدة
 بعضها عشوية تملأ مع العمر وتؤلف السنن. أزهارها
 جلدية ضمة التجميع. أزهارها متفردية يرتكز على شارب
 منتصبة مستطيلة. أزهارها كثيرة القد متدلية الزواكاز
 لا شياية الألوان تلبف فيها الغيرة ١١ أشهر انواصه
 الزنبقية المحكن غرسها في أقالم المتوسط ما يتبع .

٣١١٨٠ - **يُوكَا أَلُوِيَّة** *Yucca aloifolia (S).*
Yucca à feuilles d'aloès (F).
 نوع من اليوكا، منبتها البلاد الأمريكية. ساقها نخيلة
 مستنقة منتصبة تملأ نحو ٥ أمتار. أوراقها الوية الشكل
 تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم. وترعرع من ٣ إلى ٤، فصلها
 جلدي الصفحة، باحت الخضر البادي، يحمرى النقص،
 ينتهي بشوكه جفوية اللون سادة الطرف. أزهارها يضاء
 اللون تطول من ٤ إلى ٥ سم. أزهارها متفردية الشكل،
 كثيف التجميع، يملأ من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ثمارها حقة،
 لحسية السوقة، لا مأكولة. تنورها يستمر من أوائل آب
 إلى أواخر أيلول .

٣١١٨١ - **يُوكَا بَحْرِيَّة** *Yucca glauca (S).*
Yucca glauque (F).
 نوع من اليوكا، منبتها أمريكا الجنوبية. ساقها منتصبة
 قصيرة. أوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، جفوية
 الخنار، تمتد من ٢٥ إلى ٣٠، طولها من ٦٠ إلى ٩٠ سم.
 وعرضها من ٦ إلى ١٢ سم. أزهارها إلى البيضاء الأخضر
 المالح. أزهارها متفردية، كثيف التجميع، يملأ من ٦٠
 إلى ١٠٠ سم. ثمارها حقة جافة. تنورها يستمر من
 أيار إلى حزيران .

٣١١٨٢ - **يُوكَا رَجُلُ الْفِيل** *Yucca elephantipes, Y. guatemalensis (S).*
Yucca pied d'éléphant, Y. du Guatemala (F).
 نوع من اليوكا، منبتها الفواتيلا. ساقها منتصبة رافعة
 القاعدة الغليظة، طول من ٥ إلى ٦ أمتار. أوراقها
 جلدية الصفحة، حيلة الخضر، يضاء خنار المسنن.
 فصلها يطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ويعرض من ٥ إلى
 ٨ سم. أزهارها تطول من ٦ إلى ٨ سم. لونها إلى البيضاء
 المالح. أزهارها متفردية، هربي الشكل، يطول من ٧٠
 إلى ١٠٠ سم. ثمارها حقة لحسية السوقة لا مأكولة.
 تنورها يستمر من آب إلى أواخر أيلول .

٣١١٨٣ - **يُوكَا عَسِيَّة** *Yucca baccata (S).*
Yucca à baies (F).
 نوع من اليوكا، منبتها أمريكا الشمالية. ساقها منتصبة
 تملأ نحو ٣ أمتار. أوراقها جلدية النصل غليظة الصفحة
 تطول من ٥٥ إلى ١٠٠ سم. وترعرع نحو ٤ سم. أزهارها
 جرسية الشكل تطول من ٥ إلى ٨ سم. لونها إلى البيضاء
 المالح. أزهارها متفردية يملأ من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم
 ثمارها بلحية الشكل، قرمزية اللون، تطول من ٨ إلى ١٢ سم
 وهي مأكولة منتصبة الطعم. تنورها يستمر من نيسان
 إلى حزيران .

٣١١٨٤ - **يُوكَا لِيْفِيَّة** *Yucca filamenteux (F).*
 راجع ابرة آدم .

٣١١٧٧ - **يَهْر زَاهِر** *Anomalurus fulgens (S).*
Anomalurus éctant (F).
 نوع من الير، موطنه افريقية الوسطى ابتداء من الصحراء
 الكبرى. ثوبه يرتقالي اللون. حمره وبيته يفس .

٣١١٦٨ - **يَهْر فِرَازُو** *Anomalurus fraseri (S).*
Anomalurus de Fraser (F).
 نوع من الير، موطنه الفايون. ثوبه إلى الريدة الحمراء.
 صدره وبيته إلى الصهبة الصنابية .

٣١١٦٩ - **يَهْرِيَّات** *Anomaliuridae (S).*
Anomaliuridae (F).
 فصيلة حيوانات ليلية قاضية. أنواعها تسعة تنتمي إلى
 جنس واحد ١١ موطنها البلاد الإفريقية تتميز بزوالدها
 الجلدية الجناحية الشكل القائمة على كامل حوصها من
 ساعد الجرموز الامامي إلى مفصل رصع الجرموز الخلفي .

٣١١٧٠ - **يُود** *Iode (F). Iodine (E).*
 جسم بسيط من اشياء المعادن فالح الانتشار في مياه
 البحر وفي بعض النباتات البحرية اصعبا الفرع .
 صفائحها بلورية سريعة الملب. لونه إلى الجفوة الكتسية
 البنفسجية اللؤلؤ . أثره على الجلد اصفر الخضر . رمزه
 (I). وزنه الذاتي ١٢٦,٩٢. ثقله الذاتي ١٩٨,٤٨
 ينصهر في ١١٣°س ويغلي في ١٧٥°س. يذوب
 في الماء بمعدل ١ إلى ٧٠٠٠ ويذوب في الاثير والكحول .
 يستعمل في تطهير الجروح .

٣١١٧١ - **يُودَات** *Iodato (F).*
 هو ملح حفص البرديك .

٣١١٧٢ - **يُورُص** *Virus (F).*
 هو الفيروس، اطليه

٣١١٧٣ - **يُورِيْنَا** *في القريض، اطليه .*

٣١١٧٤ - **يُوزْبَاشِي** *Roi des rouges (F).*
 سكة بحرية تدعى ملح احمر، اطليه .

٣١١٧٥ - **يُوسْت أَفْتَنْدِي** *يُوسْتِي*
 هو اليومن الافندي، اطليه .

٣١١٧٦ - **يُوسِي** *Hieracidae (S). Ieracide (F).*
 جنس طير من حارة الصدور. انواعه المروفة اربعة.
 واحد افريقي وثلاثة امريكية واسترالية. جميعها من القواطع،
 اجسامها دبة. اثوابها نيرة لريش، فراء البطون. سواتها
 مستطيلة. مناسرها حادة البيرة الحدية. ارسافها دقيقة.
 خالبها قوية. تعيش جهاجات كبيرة سرها نحو المئة.
 قوتها صغير الحيوان والمغذ والافاعي. تدن اوكارها في
 اعلى الاشجار الشاخة. حشنتها من ٣ إلى ٤ رفقات
 ترصها الاناث دون الاكور .

٣١١٧٧ - **يُوسَا** *Yoga (F). Yoga (E).*
 اليوسا نخط جليدي هندي يرتكز على قواعد صوفية زهدية
 وتعارين عقلية وجسدية .

٣١١٧٨ - **يُوسِيَّة** *Yogisme (F). Yogism (E).*
 الوبية مجموعة المصلحات التقنية الصوفية الزهدية والتارين
 العقلية والجسدية التي يمارسها اليوسي .



٣١١٩ - يوكا

Dlaire (F). Dally (E).

تمت تعريف يوكا على كل ما لا يندرج أكثر من يوم واحد.

٣١١٩١ - يوكا

Ephéméroptères (F). Ephemeropara (E).

طبق حشرات صغيرة اللد تحية تعيش في المناطق وحلى غفاف الماء. اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها حدة فصائل تنتمي الى ريتين: الزنبقيات والياقوتيات. جميعها من الحشرات التي لا تطول حياتها الاقراية اكثر من بضعة ايام في حين ان مدة حياتها البقية تبلغ الثلاث سنوات. اجناسها دقيقة مستطيلة. قوتها الاستجمارية قصيرة، اجناسها الامامية كبيرة اللد والحللية صغيرة. مؤنثها ينتهي بخصيتين في الاكبر وبثلاثة خيوط في الاثلاث. اذواها الى الياض الاخير تشوبه غصرة او صفرة كبيرة.

٣١١٩٢ - يوكا

lonidium, Hybanthus (S).

lonide, lonidie, Hybanthe (F).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة البيلنجيات انواعها المعروفة عشرة، منها البلاد الاستوائية والحارة اخصها امريكة الجنوبية || بعضها اشباح نضادة والياض الآخر جنات فرعاء. مظهرها ينبت في رمال الشواطئ البعيدة عن مرض المروج || جميعها طيبة جلورها مهددة.

٣١١٩٣ - يوكا

Cystoderma (S).

Cystoderma (F). Cystoderma (E).

جنس فطور عشائية من فصيلة التاروقيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض سفوح جبال المناطق المعتدلة الحرارة || تعيش على الدبال وعلى المواد النباتية المتحللة. جميع انواعها صغيرة اللد، كاهنة الصنف، لأكولة || تتميز باخشيتها التي تلصق الساق كالاركان من القاعدة حتى اوائل الزمان الثالث || الوانها نباتية منها الاشجع والامفر والاصفر والاطمل.

٣١١٩٤ - يوكا

Wouwou

هو الجبلون الربادي، اطلبه.

٣١١٩٥ - يوكا

الجراد، أبو رباح، حيركاي، هكرو

Falco lithofalco, F. Gsalon (S). Faucon-émérillon, Emerillon, Rocher (F). Martin (E).

طائر من الكونج وفصيلة الصقريات. كنيه أبو رباح ويحكي الجمل جتناحه وسرعة انقضائه وهو سر المزاج، قوي الشكية، بطاش نباح. جسمه صغير اللد، وجيل القالب، قصير الذنب. ثوبه ابيض امير. صدره ويظهر الى الياض الاخير الصف المروج تلوقة وشدة قياسية الترتيب سرراء. رأسه مستعرض الشكل، عيناها كالياقوت يتكثفها اطار اصفر || وهو من القراطع محب البلاد في طلب القوت والمصيد والحق || قوته الطير والقواضم والنساء والجراد. يلدن وكه في ارباب الصخور وفي قن الاطهار اليابسة. اناته تفيض وتغصن من ه الى ٦ رفقات، ترعيبها يستمر نحو اربعة اسابيع.

٣١١٩٥ - يوكا مسجيدة *

Yucca gloriosa (S).

Yucca magnifica (F).

نوع من اليوكا السبرية الملبولة على خطوط المتوسط. ساقها منتصبة تملو نحو ٣ امتار. اوراقها جلدية النصل كثيرة العدد تطول من ٥ الى ١٥٠ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الخضار الباهت. حناها قليل العرض، جزوي اللون. ازهارها متوسطة اللد، يضاء اللون تلوها رقة حمراء. ازهارها لينة التجميع يطول من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. ثمارها حقية جافة. تنويرها يستمر من نحو الى اواخر ايلول. سرورها واصرامها عديدة اشهرها القلعة والمقرة والحرة، جميعها جميلة القالب تعيش في المراكن.

٣١١٩٦ - يوكا مسجيدة *

Yucca arborescens (S).

Yucca arborescent (F).

نوع من اليوكا، منها اريزونه وكليفرولي. ساقها غليظة منتصبة تملو من ٦ الى ٩ امتار. قطرها يراوح من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، شاذكة المعصنة تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ١٦ الى ١٥ سم. ازهارها الى الياض الاخير للموج. ثمارها حقية الشكل، جافة السويق، حمراء اللون، تطول من ٥ الى ٨ سم. تنويرها يستمر طوال الصيف.

٣١١٩٧ - يوكا مسجيدة *

Yucca radiosa (S).

Yucca ronnant (F).

نوع من اليوكا، منها بلاد الاريزونه. ساقها منتصبة تملو من ٥ الى ٧ امتار. اوراقها جلدية النصل، رادية اللون، تعد من ١٠٠ الى ٢٠٠ طولها يراوح من ٤٥ الى ٦٠ سم. عرضها من ٣ الى ١٠ سم. ازهارها بحرية الشكل خمر اللون، طولها نحو ٥ سم. يحمها شراخ يراوح طوله من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ثمارها حقية جافة. تنويرها يستمر طوال الصيف.

٣١١٩٨ - يوكا مسجيدة *

Yucca rostrata (S).

Yucca à bec (F).

نوع من اليوكا، منها المكسيك. ساقها منتصبة تملو نحو ٦ امتار. اوراقها جلدية النصل، بحرية اللون، صفراء الموج، مسلة الحمار، شاذكة المعصنة، تطول من ٥٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم. ازهارها خمر اللون غصن الموج. ثمارها حقية الشكل، جافة السويق، تنتهي بمشمار غشي المادة احسن الطرف.

٣١١٩٩ - يوكا

Jour (F). Day (E).

اليوم هو مدى اربع وعشرين ساعة تحسب من نصف الليل الى نصفه. وله يحسب اليوم من شروق الشمس الى غروبها فهو النهار ولا يجوز تنفيذ المهام او اعلان اكثر العبد الا خلاله. وفي اعتبار الايام يمكن تحديدها كما يتبع:

Jour de planche (F).

Jour utile (F).

Jour félicé (F).

Jour ouvrable (F).

Jour franc (F).

Jour fixe (F).

يوم العمل والفرج

يوم صريح

يوم عطلة، بطالة

يوم عمل

يوم كامل

يوم معين



يوكا مجيدة




يوكا



يوكا

مُلِحَقُ الْمَجَلَّاتِ الثَّلَاثَةِ
أ - ي

ملحق



عنصر معني نادر. يوجد في بعض الأثرية الخاصة. ومزه
(Er) وزنه الانومي ١٦٧,٢٠ املاحه ورنية اللون.

Synergides

٣١٢٠٣ - آزران
اطلب عومران.

Homozygotie (F).

٣١٢٠٤ - إسكالة

Homozygotity (E).

الاسالة هي تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات.
راجع جنيس.

Strophisme (F). Strophism (E). ٣١٢٠٥ - إسكاس

طسم خاص بعض النبات يقود نصال الاوراق في
الالتواء الكامل.

Mélotique (F).

٣١٢٠٦ - إنفدكري

راجع موزي.

Catabolisme (F).

٣١٢٠٧ - إنفهام، إنفاهض

Catabolism (E).

الانفهام تفاعل كيميائي يسمح بتحويل المواد السائلة في
الأسمية الحية الى طاقة جهد. وهو بذلك يشكل، في
معاوضات الايض، الطور المعاكس لالتواء.

Catabolique (F).

٣١٢٠٨ - إنفدكري، إنفاهض

Catabolic (E)

نعت تحريفي يطلق على كل ما له صلة بمنشع الانفهام او
الانقراض.

Anabolisme (F).

٣١١٩٦ - إنفاه، تشيد

Anabolism (E).

هو تحويل المواد المغذية الى نسج حية. وهو ما يشكل
الطور الرئيسي من معاوضات الايض.

Anabolique (F).

٣١١٩٧ - إنفاهسي، تشيدي

Anabolic (E).

نعت تحريفي يطلق على ما هو منحصص بالانفاه او التشيد.

Plasmogamie (F). Plasmogamy (E). ٣١١٩٨ - إنفالة

الانالة حالة تأهب اعصابي يكون نوى الوناف
شديد التقارب.

Plasmétique (F).

٣١١٩٩ - ألي، بلاسمي

Plasmatic (E).

كل ما هو مشتق من الالة او ناجم عنها.

Macroptère (F).

٣١٢٠٠ - أوني

نعت تحريفي يطلق على كل حشرة طويلة الجناح او
الروشن او الغد. م. دفواه.

Aragonite (F). Aragonite (E). ٣١٢٠١ - أرغونيت

الارغونيت في علم المعادن صخر متبلور من كربونات
الكلسيوم. تبلوره معني قائم. ثقله النوعي ٢,٩٥ وهو
ضرب من الكلسيت الثنائي الشكل المتبلور. يستعمل في
الزخرفة المعمارية والتزيينية.

Erbium (F). Erbium (E).

٣١٢٠٢ - إريوم

Protistologie (F). Protistology (E). [○] **بَرِيَّيَّة** ٣١٢١٦ -
البريئة علم يبحث في اول وبسط الكائنات الحيّة .

Exondation (F). Emergence (E) [○] **بَرَاغَة** ٣١٢١٧ -
البرازغة حصولها هي البروز فوق سطح الماء . وهي ظهور
الحضيض او التربة بعد تقلص مياه البحر .

Exondé (F) [○] **بَرِيع** ٣١٢١٨ -
نعت تعريفي يطلق على ما برز فوق سطح الماء . يقال
اراض بريزة وصخور بريزة .

Surrection (F). [○] **بُصُوق** ٣١٢١٩ -
هو الشخصوس ، اطلبه .

Paliopilus (S). [○] **بَسِيلَاف** ٣١٢٢٠ -
Paliopile (F) Paliopilus (E).
جنس طحالب صرخوية صغيرة القد تشتمل بحوائها
الحويّة الشكل | أنواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض
الاصقاع الباردة اعصها الشمالية .

Cerastophylaceae (S). [○] **بَرَقِيَّات** ٣١٢٢١ -
Cérastophylacées, Cérastophyllées (F).
Cerastophylacées (E)
فصيلة نباتات عشبية مائية من ثنائيات الفلقة . اجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها عشبية ، مائية ،
مسترة ، عامة الجذور ، ضمية الاوراق الحلقية .
ازهارها وحيدة المسكن | اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة
تميش في المنافع والاهوار والمغايض والتخفاف المادية
الماء | اعرفت أنواعها واشهرها بشت القرد المعروف ايضاً
بحامول الماء ونطوش الحوت .

[○] **بَعَالَة** ٣١٢٢٢ -
المعالة من الحشرات والنباتات هي الأشي التي تقضي
على بعلها فور الانتهاء من البال او الكوم كاسرودة
والعرب والرتيلةاء ...

Plasmétique (F). [○] **بَلَّاسَمِي** ٣١٢٢٣ -
راجع انلي

Béllidé (F). [○] **بَلْدُوس** ٣١٢٢٤ -
حيوان لون من الجرابيات الشاجرات يدعى بروس ،
اطله .

Hypopharynx (F). [○] **بَلْصَة** ٣١٢٢٥ -
Hypopharynx (E).
الجزء الداخلي من فم الكثير من الحشرات . وهي امتداد
للبلعوم . وعلى هذه البلعمة ، الناشزة عند غشيات
الاجنحة وتستقيمتها ، يوجد الكثير من العقد العصبية متما
يدلّ على انها مركز احساس خاص لا يزال مجهول الغاية
حتى الآن .

Mésozoïque (F). [○] **أُوسْتِيبِي** ٣١٢٠٩ -
Mesozoic, secondary stratum (E).
نعت تعريفي يطلق على ارضين الاباج الثاني المعروف
ايضاً بالوسط .

Blastoceros (S). [○] **أَيْل الْفَالِكِي** ٣١٢١٠ -
Blastocère (F).
حيوان لون مجزّ من فصيلة الابلات . موطنه فاني امريكة
الجنوبية . يعيش جماعات قليلة العدد . اجله مؤلف من
ذكر مانع وثلاث او اربع اناث . مع ارضها | جسمه
يطول نحو ١٢٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٥ سم .
ارتفاعه ٧٥ سم . ثوبه الى الشقعة السمره السفلى المواجه
- عينه مطوّنة بالابيض . قرنه مصمت ، ثلاثي الشعب
ينصله كل عام | الاثنى جسماء ، ضرعها ثنائي
الاختلاف ، تحمل نحو ٥ اشهر وتضع من بغير الى
يطورين .

Petsurus, Belideus (S). [○] **بَلْدُوس** ، [○] **بَلْدُوس** ٣١٢١١ -
Pétaure, Bâlidé (F).
جنس حيوانات لينة من الجرابيات الشاجرات وفصيلة
الفنجرجات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها استراليا
والجزر المجاورة . جميعها تنجوية المسرح . تألف
الغابات والحراج ، تنبت في النهار اما في تجاوب
الأشجار النخرة او على قننها | اجسامها صغيرة . آذانها
كبيرة . اذنانها مستقيمة منعقة الاطراف - قوائمها
الامامية أقصر من الخلفية - اصابعها خماسية حادة
الاطراف . اصرانها ناعمة ، لينة . اغشيها الاظلمة جلدية
تمتد من الايدي الى الارجل . اناثها مجهزة بجراب عدد
اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى الفطام | اما انواعها
الثلاثة فهي :

- بَلْدُوس أسترالي P. australis (S).
- بَلْدُوس سنجابي P. acireus (S).
- بَلْدُوس قصير الرأس P. breviceps (S).

Bathydrique (F). Bathydic (E). [○] **بَكِيد** ٣١٢١٢ -
نعت تعريفي يطلق على كل كائن يعيش في غور الماء |
تقول العلم الشدة والنبوت البنية .

Inné (F). Innée (E). [○] **بَحْثَوِي** ٣١٢١٣ -
نعت تعريفي يطلق على ما هو اثل في المنطوق . وهو
بذلك برأيت عقلي (Congenital) يقال صفة بجنية وعامة
بجنية .

Bathyblus (F). Bathyblus (E). [○] **بَحْدِيكَة** ٣١٢١٤ -
اسم يطلق على كتل ملامية توجد في قاع البحر . يقول
فيها العالم دوكسلي وبعض علماء الطبيعة انها الحالة
الاولى من المادة الحية .

Protiste (F). Protiste (E). [○] **بَوِي** ٣١٢١٥ -
كائن حي وحيد الخلية . مجمل وسومه المشتقة حتى الآن
تجعله متارجحاً بين النبات والحيوان . ومن العلماء من قال
انه اقرب الى النبات منه الى الحيوان .

٣١٢٣٨ - **تَاسَاوِيَّة** (F). Isostasy (E).
نظرية حصيلية ترتكز على تماثل القوى المحركة النابذة والمماسية.

٣١٢٣٩ - **بُوغَنَة** (F). Sporogony (E).
البوغنة، في علم الزوولوجية، طريقة تلقيح خاصة ببعض التوالبي.

٣١٢٣٩ - **تَكْيُس** (F). Enkystement (E).
التكيس، في علوم التاريخ الطبيعي والبيولوجية والطب، هو الالتصاق الكلي بشيء متهى يسمى كيساً.

٣١٢٣٧ - **بُوغِيَّة** (F). Sporophyte (E).
طور من أطوار التكوين التشوي عند النباتات اللاشعبيّة من نباتات البوغ وهي بذلك تكمّل النامية عند النباتات الشعبيّة.

٣١٢٤٠ - **تَائِي الْأَوَّلِي** (F). Mésozoone (F).
كان مركزه بين الأولي والتوالي، يرتكز من حجرة مركزية تغلفها حجرات مسطحة حلزانية. أمّا الرضيلة فلا وجود لها.

٣١٢٣٨ - **بُيَاغَة** (F). Sporose (E).
البياغة في علم النبات هي إبراز البوغ ونشره عند السراخس ولشامها.

٣١٢٤١ - **جَلِيم** (F). Loricata (E).
نمت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل حبة أو بذرة غلافها الخارجي جامدة ويطبق في علم الزوولوجية على كل جسم تغلفه صفيحة عظمية.

٣١٢٣٩ - **كَبَائِن مَشْرِي** (F). Hétérothallism (E).
التباين المشري، في علم النبات، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والأنثوية مثنائية من هيئات مختلفة الشعبيّة أيضاً.

٣١٢٤٢ - **جَوَز** (F). Troncature (F).
حالة الشيء المتطوع جزء منه.

٣١٢٣٠ - **كَبُك** (F). Autochtonie (E).
صفة الشيء الموجود طبيعياً وأساساً في مكان جنائياً محين.

٣١٢٤٣ - **جَزُونُوق** (F). Lithocranus Walleri (S).
جزونوق هو الاسم الصومالي. حيوان لبون من الغنم، وحيد الجنس والنوع. موطنه يمتد من الصومال إلى شرقي الكونغو. ملجئه الحياتي جماعي. أجله يمد من ١٧ إلى ١٥ يرسه ذكر مانع أو ذكراً وما تبقى ثالث وظلي. لونه الأشباح خضراء وباهية، وأوراق بعض الأشجار أحصاه السطحات | شوته يشبه الطرافة جسمه بطول نحو ١٦٥ سم. ارتفاعه ١٠٠ سم. قرنا الذكر منقفا الطرف المنحني. عناء كبيرتان، متوجتان بقبضة بيضاء. أذناه صغيرتان جالستان. عنقه شديدة الطول. حاروكه أرفع من كفه كما في الطرافة. ذنبه قصير ورفيق، ينتهي بخصلة من الشعر. الأثني جسماء، ثنائية الإخلاف، لرفية الطلي | ثوبه إلى العرة السوداء. رأسه وفقره شديدة السمرة. الأثني إلى السمرة السوداء باستثناء البطن الأبيض الأغبر.

٣١٢٣١ - **تَجْرِيم** (F). Accouage, Accouage (F).
التجريم هو نقل البضاعة من رصيف الميناء إلى السفينة أو من السفينة إلى رصيف الميناء. لذلك فالتجريم يعني الشحن ويعني التفريغ أيضاً.

٣١٢٣٢ - **تَرِيَّة** (F). Terrigène (E).
نمت تعريفي يطلق على الرسوب المتركمة في قعر البحار والمالحة إلى انحنات وانجحات الأتربة القارية.

٣١٢٣٣ - **تَسَاوِي مَشْرِي** (F). Homothallism (E).
التساوي المشري، في علم النبات، حالة تكون فيها الغامات الذكرية والأنثوية ناتجة عن غمامة واحدة.

٣١٢٣٤ - **تَسْمِيد** (F). Placentaion (F).
هي السخدة، أطلمها.

٣١٢٣٥ - **تَغْيِيد** (F). Anabolisme (F).
اطلب ابتناء

٣١٢٣٦ - **تَغْيِيدِي** (F). Anabolique (F).
راجع ابتنائي.

٣١٢٣٧ - **تَكَاوِلِي** (F). Isostatique (F).
نمت تعريفي يطلق، حصيلياً، على كل ما له صلة بالتعادلية الأرضية وهو ميكانيكياً الاتزان المتبادل في الخطوط والسطوح.

٣١٢٤٤ - **جَزُونُوق** (F). Adéphase (F).
نمت وصفي يطلق على كل مقرر يمتد بالشرامة إن حيوان أو حشرة.

٣١٢٤٥ - **جَزْرَانِي** (F). Caroténolide (F).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالكاروتين المعروف أيضاً بالجزرين. الشقاقات الجزرانية شفاحات صفراء وبرتقالية وحمرها اللون يكثر وجودها في النبات والحيوان. وهي غير قابلة الانحلال في الماء إنما تذوب في بعض الشحومات.



جزونوق

Abomasum (F). Abomasum (E). **٣١٢٥٣ - حَافِصَة**
الخاصة الجيب الرابع من معدة المجترات .

Cénozoïque (F). **٣١٢٥٤ - حَقِيبَة**
اطلب سنويزي

Monécle (F). **٣١٢٥٥ - حِصَاوَة**
الحصاة حالة فيزيولوجية عند المشرّيات تُسمّ بفرديّة الحليّة .

Pédologue (F). Pedologist (E). **٣١٢٥٦ - حِصَالَم**
هو صاحب الاختصاص في الحصلة اي في علم الاربة الزراعية من حيث تكوينها وطرق استثمارها .

Ovula (S). Ovule (F). **٣١٢٥٧ - حَيْدَاء**
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معيّات الارجل وفصيلة الدوصيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة | اصداؤها متوسطة القد ، شبه بيضية الشكل ، كظرة ، مقشرة الظهر ، صفيلة الصلحة الخارجية ، بيضاء اللون | اشهر انواعها حيداء الزابج Ovula ovum (S). طولها نحو ١٠ سم . لونها الى الباهس الحاجي الاسفع المواج .

Charophytes (F). Charophytes (E). **٣١٢٥٨ - حَيَاق**
فئة من النبات معظم انواعها يعيش في المياه العذبة الراكدة وبعضها في الماء الاجاج | خضائها الى الخضار القاتم ويخرج منها عند لمس صلبة كرهية | وهذه الفئة من النبات تشكل صلة الوصل بين المشرّيات والطحليّات .

Céramiste (F). Céramist (E). **٣١٢٥٩ - حَزَاف**
الحزاف من تعاطي صناعة الخزف من نَحَار ومطلي وصفي .

Céramique (F). Céramie (E). **٣١٢٦٠ - حَزَاف**
فن صناعة الآنية الخزّارية وشيها .

Ginglymostoma **٣١٢٦١ - حَفَاشَة سَوِيَّة اللّون**
concolor (S). Ginglymostome concolor (F).

Ginglymostome concolor (E).
سمكة بحرية من السفنقات الاشلاق . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي | جسمها وشي الشكل بطول نحو ٢٠٠ سم . تتميز بزغفتها الظهرية المتأخرة الاركانز والمتقابلة مع البطنية والشرجية . ثوبها سوي اللون الاصفر .

Cryptogènes (F). **٣١٢٦٢ - حَقِيبَات الجِين**
Cryptogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على الكائنات الحية ، من حيوان ونبات ، التي تتصف بالتنسل اللامتطور .

Caryogamie (F). Caryogamy (E). **٣١٢٦٣ - خِلَاط**
الحلاط هو اعادة نشاط الاخصاب اللاشقي عند

Dermoptera (S). **٣١٢٦٤ - خِلَاطَات القَوَامِ**
Dermoptères (F). Dermoptera (E).

مرتبة من الحشرّيات . تسبوا في الزمن الماضي الى المهوريات ثم الى مِحَمَات الادي . ووجدوا اخيرا انها اقرب الى الحشرّيات | وهذه المرتبة تضم فصيلة واحدة تدعى كوبنّيات وجسّ واحد يدعى كوبن .

Gymnura (S) Gymnure (F). **٣١٢٦٧ - جِمْنُور**
جنس حيوانات لينة من فصيلة الغنظنّيات ورتبة الحشرّيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر الزابج | اجسامها شبه اسطوانية الشكل تطول نحو ٦٥ سم . بها فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . عيونها صغيرة . اذنانها مستديرة . اعناقها قصيرة . قوائمها معكدة الطول . اصابعها معجّزة باظافر حادة . اذنيها الى النوبة الصنّائية المواج . ويرها ليد ناعم يتخلله حلب جامد شائك . اذنانها جرداء عارية | انثاها امزقاً من ذكورها وابنت نوباً منها ، توته الحشرّات والندجان والزحافات الصغيرة .

Paritéenne (F). **٣١٢٦٨ - جُولِي**
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينتمي الى فئة الجوليات .

Paritéales (F). **٣١٢٦٩ - جُولِيَّات**
فئة نباتات من ثنائيات الفلقة مشيمتها تأوي الى جدار المدقة كما هي الحال عند البنصجيات والالانيات وغيرها .

Gymnorhinus (S) **٣١٢٧٠ - جِمْنُورِين**
Gymnorhine (F). Gymnorhine (S).
جنس طير من الجوانم سيّات المناظر وفصيلة الغرابيات .
انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها استرالية وجزر الزابج | اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٠ الى ٤٥ سم . مناقيرها مخروطية الشكل . اجنتها لاحة ، زلقة . اذنيها مزعزعة | اشهر انواعها الجمنورين الزّبار G. floteur (F). طولها نحو ٤٥ سم . ثوبه اسود اللون يطوه تبيّج ابيض في القفن والجنّاح | يأنف حياة الاسر ويقلد جميع الانعام والاصوات .

Ginkgoes (E). **٣١٢٧١ - جِنْكَوَات ، مَكَايل**
قسم من عريانات البزور يعود ظهورها الى الحقبة الباليوينة من الاباح الاول | كانت ، في الماضي البعيد ، تعدّ الكثير من الانواع التي اضمحلت مع مرور الزمن ولم يبق منها في عصرنا الحاضر سوى النوع المعروف بشجرة المعبد او الجينكو وهي شجرة مقدّسة عند البوئين .

Actualisme (F). Actualien (E). **٣١٢٧٢ - حَافِيزِيَّة**
الحافيزية نظرية حصيلية تُعسر المناشع والتطورات الارضية الغابرة بالمناشع الحاضرة مع اعتبار هذه التطورات مستمرة العمل الطبيء | والحافيزية بمعناها الحصيلي تماكس النظرية الجليّة .



جمنور



جمنورين



خِلَاطَة سَوِيَّة اللّون

ولو كان جزئياً ، الحاصل في البلاد السكتانية منذ تَلَفَس السبك او هبوطه .

Ontogénétique, Ontogénique (F). **رَوْدَكِي** ٣١٢٨٩ -
Ontogenetic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالروضة اي بشوهِ الكائنات .

Glyptognosie (F). **رَوَقْشَة** ٣١٢٩٠ -
Glyptognosy (E).

الروقة هي معرفة وتمييز الحجارة المنقوشة القديمة العهد .

Cinérîtes (F). **رَوَمَد** ٣١٢٩١ -
الرومد رماد بركاني مُنْفَذ .

Sorculus (S). Soriculus (F). **رُزَيْبَة** ٣١٢٩٢ -
Sorculus (E).

جنس حيوانات لئونة من فصيلة الزبائيات وربة الحشرات . انواعها المعروفة خمسة اعطائها المناطق الجبلية الاسيوية اخصها الهند والصين || جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الذنب . قوتها الحشرات والديدان .

Abortif (F). Abortive (E). **رُجِين** ٣١٢٩٣ -
نعت تعريفي يطلق في علم المواليد والنبات على الاعضاء والثمار التي تسقط قبل اكتمال نموها .

Pyrrhocaris **رُخَّالَة** ٣١٢٩٤ -
جنس حشرات ناعمة من نصفيات الاجنحة وفصيلة الزخاليات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم قطار العالم || اجسامها اهليجية ، مبططة ، طولها ٧ الى ١٢ مم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ناشزة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصص المستطيلة . بطونها سوداء اللون او حمراء . اجنتها ملونة بكث فيهما التبقيع والتجذيع || تألف بمظهرها الحياة الجماعية . شراندها تذ بعض الحشرات . قوتها اوراق النبات وما تستطيع اقتراسه من حشرات وهوام .

Pyrrhocoridae (S). **رُخَّالِيَّات** ٣١٢٩٥ -
Pyrrhocorides (F).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة المختلفة | اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة .

اجسامها اهليجية او بيضية الشوزن ، معتدلة التنبيط ، طولها من ٧ الى ١٥ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصص . اعطائها مستطيلة ثلاثية الطل || اجنتها متقاوطة الطول ، معظمها نصفية وبعضها يلحف اكثر من زامين || قوائمها تضبط معتدلة القد || معظم انواعها ناهم قوته النبات وما يستطيع اقتراسه من حشرات || اشهر اجناسها الرخالة .

Dlécie (F) **رُكَوَاة** ٣١٢٩٦ -

الركواة حالة فيزيولوجية عند المشربات تسم بازنواجية الخلطة .

Mécatable (F). Metastable (E). **رُكَيْس** ٣١٢٨٠ -
نعت تعريفي يطلق فيزيائياً وكيمائياً على كل نظام او تركيب ثباته الظاهري يشكو من ندّة الوجود .

Lycopodiales (F). **رُصَيَّات** ٣١٢٨١ -
فئة من النبات عاشرت بانواعها العديدة المختلفة الاشكال جميع الازمنة الحصلية منذ الحقبة الديفونية || انواعها المنقرضة شملت الكثير من الاشجار التي كان ارتفاعها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م . والتي كانت تشكل معظم غابات مناطق الحقبة الكربونية || وما طبقات الفحم الحجري سوى بقايا هذه الاشجار المنصودة || اما الانواع المعاصرة فجسمها عشبية تجسمها فصيلة النضريات .

Batholite, Batholithe (F). **رُصَيْبَة** ٣١٢٨٢ -
اسم يطلق في علم الحصلية على كتلة كتل من الطح او الصخور الثؤارة لا تيسية الشكل انما مستعرضة القاعدة .

Périgyne (F). Périgynous (E). **رُغِيل** ٣١٢٨٣ -
نعت تعريفي يطلق على توج الزهرة واسديتها عندما تكون متجمعة في الكأس حيث تشكل طوقاً يحوق بالمبيض .

Périgynique (F). Périgynio (E). **رُغَيْلِي** ٣١٢٨٤ -
نعت تعريفي يطلق على شكل من اشكال امتزاج الاسمية في كمّ الزهرة او حول المبيض .

Enicurus (S). Enicure (F). **رُيْلَة** ٣١٢٨٥ -
Enicurus (E).

جنس طير من الجوائم سيات الناقير وفصيلة الذعريات . انواعها المعروفة عشرة اعطائها نعتاً من الهند الى ماليزية || اجسامها معتدلة القد ، طولها ٢٥ الى ٢٨ سم . بها فيه الذنب الفارق المستطيل الرفال || ثوبها سوداء اللون ، مبلقة بالابيض || تألف ضلف مجاري الماء . قوتها الحشرات والديدان || تتغنى لماحصرها في المواقع الوعرة المنيمة الشارسة على مجاري الماء . انثاها تبض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

Glyptographe (F). **رُفَّاش** ٣١٢٨٦ -
Glyptographer (E).

الرّفّاش من تماطي الرقاشة اي علم الحجارة المنقوشة القديمة العهد .

Glyptographie (F). **رُفَّاشَة** ٣١٢٨٧ -
Glyptography (E).

الرّقاشة هي علم الحجارة المنقوشة او المحفورة القديمة العهد .

Epirogénique (F). **رُكَاجِي** ، **رُكَاجِيَة** ٣١٢٨٨ -
Epirogenic (E).

نعت تعريفي يطلق على الحركة العمودية التي تصيب بعض اجزاء الكتل القارئة . مثالنا على ذلك الارتفاع المستمر .



ريلة



ريلة

٣١٣٠١ - سَوَّجَة [○] Estéens (F).

اسم يطلق على رباح خاصة تهب فوق البحر الأبيض المتوسط وصفات حوضه. مصدرها تلوبي من الشمال ومن الجنوب، يحركها التبريد الشديد فوق الماء ودرجة حرارة الصحاري، من الصحراء الكبرى إلى الجزيرة.

٣١٣٠٢ - سَحْلَدَة [○] Piscentation (F)

السحلبة في النبات هي كيفية الفراج السند داخل المبيض. وقد تكون على ثلاثة أشكال: محورية أو جولية أو مركزة.

٣١٣٠٣ - سَوَّي [○] Aboral (F). Aboral (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الزولوجية على ما هو كان في الناحية المقابلة للقدم عند الحيوانات النابتا.

٣١٣٠٤ - سَعَارَة [○] Géothermie (F). Geothermy (E).

السعارة هي حرارة الأرض.

٣١٣٠٥ - سَعَارِي [○] Géothermique (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحرارة الأرض.

٣١٣٠٦ - سَبِيلِي [○] Sphenophyllum (S).

جنس نباتات متحجرة من فئة السبيليات. جميع أنواعها جذمية، عشبية، موقرة. منبتها المنابع والغدران.

٣١٣٠٧ - سَبِيلِيَّات [○] Sphénophylées (F).

فئة نباتات متحجرة ظهرت في الحقبة البليونية وانقرضت في البرمية من الأماج الأول إلى آخره. ينال ان الانسوحات سوية البوغ تتحجر منها تلك لأن نقط الشبه بينها لا تقل عن ٨٥٪.

٣١٣٠٨ - سَلَّة [○] Pinnule (F). Pinnule (E).

السلة ورقة لا تيمس الشكل، غالباً مستطيلة.

٣١٣٠٩ - سَبِيل [○] Saproel, Saproèle (F).

السبيل حمأة تنبت تعود إلى بقايا حيوانات مجهرية رست في قعر البحار نفست عنها البكتيريا.

٣١٣١٠ - سَبِيلِي [○] Saproelique (F). Saproelico (E).

نعت تعريفي يطلق على المادة العضوية المائعة إلى العلم والنبت التي فسختها المياه الناعمة.

٣١٣١١ - سَبِيلَك [○] Cimbe (S). Cimbe (F).

جنس حشرات ماصة من غشائيات الأجنحة وصفلة السبيليات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠ إعطائها بعض مناطق البلاد المصقلة الحرارة. تألف الغابات والحراج الطويلة إلى أجسامها كبيرة، شديدة النشط. إعطائها ماصة، لزونها الاستعمارية صفة الأطراف. أنوابها

٣١٢٩٧ - زُمَّة [○] Melipona (S). Mélipone (F).

جنس حشرات عسالة من غشائيات الأجنحة وصفلة الزمعات. أنواعها المعروفة نحو ٦٠ إعطائها المناطق الاستوائية والحرارة إلى أجسامها معتدلة القد أو صغيرة، محببة البطون، خفيفة القشار، عاصمة الشذام. ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. لولها يتكون من ثلاث فئات: الأنثى ثم الذكور ثم فئة الماملات الماصة الشوار الشقي. أنثيا تطول، حسب الأنواع، من ١٢ إلى ٢٧ سم. ذكورها تطول من ١٠ إلى ١٤ سم. أمّا عاملاتها فتطول من ١١ إلى ١٥ سم. كوّراتها أو محاجرها محرسه، شبه هرمية الشكل، لواعدها سطوحها. نخاريها صفوف أفقية الارتكاز تستعملها الأنثى لمتح السرد. أمّا رحيق الأزهار التي تنجبه الماملات فتتخاربه اجرة بصفة الشكل مركّزها في الزام الأول أي الأسفل من الكوّارة. عسلها يختلف مع اختلاف الأنواع والمراعي. أمّا الإنتاج الحولي فيفروج من ٢ إلى ٦ كيلو. أعرف أنواعها وأشهرها الثلاثة التالية:

- زُمَّة التّرازيل [○] Melipona scutellaris (S).

أكبر أنواع الزُمع وأعماها انتشاراً. عسلها جيد الصنف، ضربي العرف، مستحب الطعم. إنتاجها الحولي نحو ٦ كيلو.

- زُمَّة البراغوي [○] Melipona fluvipes (S).

متوسطة القد والانتشار. عسلها جيد الصنف، عطري العرف، مستحب الطعم. إنتاجها الحولي نحو ٥ كيلو.

- زُمَّة أنكسوي [○] Melipona enxui (S).

متوسطة القد. ترى في كوّارات خاصة تعلق على الأشجار. عسلها طيب، مقو، ناعظ، مستحب الطعم. إنتاجها الحولي نحو ٣ كيلو.

٣١٢٩٨ - زُمِّيَّات [○] Meliponidae (S). Méliponidés (F).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة. إعطائها بعض المناطق الاستوائية والحرارة من المالمين القديم والجديد إلى أجسامها شبيهة بأجسام النحل لكنها اصغر قدراً ولا غشام لها. جميعها عسالة. معظمها يقيم كوّارته في جذوع الأشجار النخرة إلى ملجنها الحياتي جماعي كالنحل. لولها يتألف من اثني كاملة الشوار الشقي وظلقتها متح السرد. ومن بعض الذكور وظلقتها كود الأنثى المائلة. ومن عاملات عاصمة الشوار الشقي تنشد الكوّارات وتبني فيها النخاريب وتجنّي الرحيق والطلع إلى شهر إعطائها الزُمَّة والصوّاعة.

٣١٢٩٩ - زَبَلَف [○] Spermatie (F).

الزبلف اسم يطلقه علماء النبات على البوغ الخارجي، الخلوي الشكل، عند بعض الطيور والخفيات.

٣١٣٠٠ - سَبِيلَارِيَّات [○] Sigillariées (F).

مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالهشوميات. تميزت بسوقها الضخمة الكبيرة وأوراقها المركبة المنتظمة التصيق الطولي.

الزمنية عن رباطه الخفي في بعض الألفيات أحصاها المشطورات.

Stèle (F). Stèle (E).

٣١٣٢٠ - **سُطَاب** ◯
الشطاب، في علم النبات، هو الجزء الداخلي من الجذر أو الساق الذي يشمل الأوعية الخشبية وافية النجب.

٣١٣٢١ - **سُطَاخ** ◯
Aerogène (F). Aerogenous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل فطر نوحه سافه وأيسوسه رأسية الشماخ.

Hétérozygotie (F).

Heterozygosity (E).

٣١٣٢٢ - **سُطَاكِي** ◯
الشبابه هي عدم تماثل العوامل الوراثية عند الحيوان والنبات | ومنهم من قال اختلائية الأزواج. راجع اشيب.

Travertin (F).

٣١٣٢٣ - **سُطَاوَج** ◯
حجر من الفليس الجبسي يصلح للبناء.

Pétrographie (F).

Petrograph (E).

الصُّطَام من تماطي الصنامة أي علم الصخور.

Halietur (S). Halistur (F).

Halistur (E).

٣١٣٢٥ - **سُطَاوَر** ◯
جنس طيور من الكوليسر وفصيلة الصقريات. أنواعه المعروفة ثلاثة أعطانها الهند وآسية الشرقية وأستراليا | أجسامها شبيهة بأجسام الحبان إلا أنها أصغر قدًا. أطوالها تراوح من ٥٠ إلى ٦٠ سم. ثوابها نثائية اللون. رؤوسها واعتاقها وصورها بعض. أربيتها وسواطها وأطراف بطونها وانخادها وانذابها إلى الشقة السماء، مواجهها يختلف مع اختلاف الأنواع | تألف السطوط البحرية والموائي. تغطس في الماء كالنورس. قوتها الأسماك وكل ما تيسر لها من مواد عضوية.

Trigone (S). Trigone (F).

٣١٣٢٦ - **سُطَاوَعَة** ◯
جنس حشرات مسالة من غشائيات الأجنحة وفصيلة الزمغيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها المناطق الاستوائية | أجسامها شبيهة بأجسام النحل لكنها أصغر قدًا ولا شدام لها إنما تنحس وعضنها مؤنثة | ملجئها الحياتي جماعي كسائر أنواع الزمغيات. شديد كزارتها على الأشجار وعلى الصخور. تنهبها بالطين وتغلفها بمختلف المواد النباتية. مداخلها فريدة أنبوبية الشكل، تسمع بمرور صواعة واحدة. نشاربها ألغية الارتكاز. أجربة الصل بيضيه الشكل، صغيرة القد، تحتل الزمام الأول والثاني من الكوارة | عملها دون الوسط. اتانجا الحولي نحو ٠ كيلو.

Phylétique (F). Phyletic (E).

٣١٣٢٧ - **سُطَاوِي** ◯
نعت تعريفي يطلق على التسلسل الكينوني في الحيوان والنبات.

ملونة، يكثر فيها الأصاير | يرقاتها خاضعة ثلثهم أوراق معظم الأشجار الحرجية باستثناء الصنوبريات. وريقاتها هذه تختف، عند الذئاع عن النض، بسائل أخضر اللون كالو. طور الإكمال يقضي ضمن فليجة سمره اللون تحببها على الافئاد أو على الأوراق العروة.

Cimicidae (S).

Cimicidés (F).

٣١٣٢٨ - **سُطَاكِيَّات** ◯
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة الحد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة. يكثر وجودها في الغابات والحراج الجبلية | أجسامها متوسطة القد أو كبيرة، مغاطمها ماضة. قرونها الاستشعارية مسددة الطول، صلبة الأطراف | يرقاتها خاضعة، مؤنثة عند كثرتها | أشهر اجناسها السنبك.

Suncus (S).

Pachyure (F).

٣١٣٢٩ - **سُطَاوَس** ◯ ، **سُطَاوَر** ◯
جنس حيوانات لبونة جاسة من فصيلة الزبابيات ورتبة الحشرات. انواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطانها بعض مناطق العالم القديم أحصاها الهند وإريقية وجزيرة مدغسكر | أجسامها صغيرة القد تطول من ٧ إلى ١٢ سم. رؤوسها مخروطية الشكل. عيونها خزفية. إذ أنها صغيرة. جرامزها مسددة الطول. أصابعها مجهزة بأظافر حادة. أنفها طويلة. ثوابها متباينة الألوان السوية تكثر فيها البسة والسمرة القاتمة | أنفها أميز قدًا من ذكورها وأبهت ثوبًا منها | قوتها الحشرات والديدان.

Cénozoïque (F).

Cenozoic (E).

٣١٣٣٠ - **سُطَاوِي** ◯ ، **سُطَاوِي** ◯
نعت تعريفي يطلق، حصليًا، على برهة من الزمن تشمل الأحقاب التي توالى منذ الحقبة النيواليت إلى المعاصرة.

Concolore (F).

Self-coloured (E).

٣١٣٣١ - **سُطَاوِي** ◯
نعت وصفي يطلق على ما كان ثوبه متساوي اللون الواحد.

Isosepore (F).

Isoeporous (E).

٣١٣٣٢ - **سُطَاوِي** ◯
نعت تعريفي يطلق على كل نبات من مستورات الزهر الوعائية بوجه متجانس الشق والشكل.

Atypique (F). Atypic (E).

٣١٣٣٣ - **سُطَاوِي** ◯
نعت تعريفي يطلق، في علم النبات، على كل تسلسل علوي يشذ عن القش المثالي.

Surrection (F).

Upheaval (E).

٣١٣٣٤ - **سُطَاوِي** ◯ ، **سُطَاوِي** ◯
الشخص، حصليًا، هو الارتفاع الذي يطرأ على مكان معين من سطح الأرض.

Frustule (F). Frustule (E).

٣١٣٣٥ - **سُطَاوِي** ◯
جسم صواني التركيب. شديد الصغر، فصلته الموامل



سُطَاوَر

الاولان المزخرفة الجميلة | مسرحها بحار المناطق الحارة. | يكثر وجودها قرب وحاف وحشاف المرجان والريجان.

Blague (F). Tobacco-pouch (E). صَبْوَة
الصَبْوَة كيس من جلد يستعمل لحفظ التبن، التبغ المدروم، صغير اللد يوضع في الجيب.

Pangium (S). ٣١٣٣٦ - طَهَب
Pangie (F) Pangium (E)



فجرة

جنس اشجار حرجية من فصيلة الطيهية، منبتها البلاد الحارة، يكثر وجودها في جاوا | سونها فروع. | اورثتها متعاقبة، متباعدة، ازهارها ثنائية السكن. | ثمارها صلبة لينة | اشهر انواعها الطيهية المأكولة. P. edule (S). | منبتها اجزائها من خشب ولحاء وقشور واوراق وثمار جميعها | المائدة وافر الحامض السانديريكي | ثمارها مأكولة بحدتها ٨ ساعة في الماء. ويستخرج من بزرورها بعد تنمها ايضا مادة زيتية سهلة شائعة الاستعمال | اما اشجارها فشميدة الصلاة فاخرة الصنف.

Enicognathus (S). ٣١٣٣٩ - صَبْرَة
Enicognathe (F) Enicognathus (E)

جنس طير من المصنفات وفصيلة البغاوات، انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها البلاد الحارة اخصها الهند وامريكا الجنوبية | ملجنها الحياتي جماعي، قوتها الثمار البرية وبعض الحشرات | اجسامها معتلة اللد. تتميز بمنافرها المستطيلة الالاك العليا المخروطة الشكل | اشهرها فجرة الشيلي ثوبها الى الخضار الاسفغ الموج. قمت رؤسا واطراف قوائمها الى الزرق المابقة. محسوها وذنها الى الحرة القرمزية.

Pangiaceae (S). ٣١٣٣٧ - طَهَبَات
Pangiaceae (F) Pangiaceae (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة. | اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منبتها البلاد الحارة والاسوائية من العالم القديم | اعرف اجناسها واشهرها الطهبة والنصرة.

Delphinula (S). Delphinula (F). ٣١٣٣٨ - صَبْرَانِيَّة
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معبات الارجل

وفصيلة الصرسيات. انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار المناطق الحارة من العالم القديم | اصداؤها شبه مخروطية الشكل، لؤلؤلية الصنجات الداخلية، كثيرة التضاريس والتوتوات الشائكة من الخارج | اشهر انواعها الصرسيّة المعرّضة D. laciniata (S) التي يكثر وجودها في بحار الصين.

Andrena (S). Andrène (F). ٣١٣٣٨ - عَجْرِين

جنس حشرات حبوبية من فصيلة الخريبات. | انواعه المعروفة عديدة معظمها من عظم المناطق الشالية. | ملجنها الحياتي فردي. | اوكرها محاجر تحفرها في التربة | اجسامها صغيرة شبيهة باجسام النحل. | لؤلؤها ثنائية منها السوية اللون ومنها المنخضة والمجعدة | قوتها رحيق الازهار وطعمها تختزن بعض في تخاريف ورتبة المائدة | تنمها في محاجرها كغذاء لدها قبل ان تتحول الى حشرات جالسة سارحة | اشهر انواعها واعضاها انتشارا |
Andrena cineraria العنبرية الرمادية
Andrena fulva والعنبرية الصفراء

Delphinulidae (S) ٣١٣٣٩ - صَبْرَانِيَّات
Delphinulidés

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معبات الارجل اماميات الخياشيم الجحفية. | اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداؤها شبه مخروطية الشكل، كثيرة التضاريس والاطانات والتوتوات الشائكة. | نوحاتها مستديرة. | اجسامها صغيرة، راحة الاردية، معكلة الارجل | اشهر اجناسها الصرسيّة.

Andrenidae (S). ٣١٣٣٩ - عَجْرِينَات
Andrenidés (F)

فصيلة حشرات من الحبوبيات ورتبة غشائيات الاجنحة. | اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، اعطائها المناطق الشالية وبعض الاقاليم المشكلة المنرفة نحو الياردة | اجسامها صغيرة شبيهة بالنحل. | لؤلؤها ملونة تكثر فيها السمرة المتخلطة الماجة وبعضها اصفر او منخضب بالاصفر الاخضر | ملجنها الحياتي فردي. | الذكر يعيش حتى زمن السحاب فيكون الاش وبلاشي. | الانثى تنح مكثها في تخاريف غشاهها التي تنمها في محجر تحفرها في التربة | اعرف اجناسها واشهرها العنبرين والسكود.

Stationnel (F). ٣١٣٣٢ - طَائِي

نمت تعريفي يطلق، في علمي الحيوان والنبات، على كل هجين مستقر الصفات.

Paralique (F). Paralic (E). ٣١٣٣٣ - طَلِي

نمت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالشطوط البحرية.

Glyptogénée (F). ٣١٣٣٤ - طَلَسَاكَة
Glyptogenesis (E)

طور من اطوار المنافع الحصلية حيث العوامل الطبيعية الناقضة، اخصها الماء والرياح، قوتت معالم القشامة الاولى.

Pluricellulaire (F). ٣١٣٤٠ - عَلِيَمَاتِ الْخَلَايَا
Pluricellular (E).

نمت تعريفي يطلق على كل كائن حي مركب من تكتل الخلايا.

Aconuridae (S). ٣١٣٣٥ - طَلَرَات
Aconuridés (F). Aconuridae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزماعات، | اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة اللد، وراعي

Lipotyphle (S). ٣١٣٤١ - عَلِيَمَاتِ الْمَرْغَةِ
Lipotyphles (F). Lipotyphia (E).

مرتبة من الحشريات تتميز بخلو اسماها من المبرغة وشبه

طَرِيَّة. ثمارها عَنَبِيَّة لَوِيَّةٌ ۖ أشهر أنواعها العصرة السامة (S) *H. venenata* ثمارها سامة دافعة .

٣١٣٤٨ - عِنَاكَة °
Gonochloriame (F).
Gonochloriam (E).

العنَاكة هي الانفصال الشقي. وهي بيولوجيًا عكس العنثية.

٣١٣٤٩ - عَيْك °
Gonochlorique (F). Gonochloric (E)
تفت تعريفي يطلق، بيولوجيًا، على كل كائن وحيد الشق أن في الحيوان أم في النبات.

٣١٣٥٠ - عَوْس °
Eos (S). Eos (F). Eos (E).
جنس طير من المستقلات وفصيلة الببغاوات. أنواعه المعروفة نحو ١٠ موطنها يمتد من الهند الصينية إلى جزر الزاباج. ملجنها البهائي جماعي. أفواجها تراوح من ٢٠ إلى ١٠٠ زوج ۖ أجسامها معتدلة القد. أوائها تراوح من الحمرة الأرجوانية إلى البرتقالية ۖ اعرب أنواعها واشهرها :

المَوْسُ البَاوُوي
Eos rubra (S)
المَوْسُ الكوشنيني
Eos Cochinchinensis (S).

٣١٣٥١ - عَوْمَرَان، آوَرَان °
Synergides (F).
الموروان أو الآرران اسم يطلق على خنثين تَوْجَان نَصّ الملك أو ينتهي بهما جراب الطلع.

٣١٣٥٢ - عُشَارِيَات °
Pallophytales, Profilicales (F).
فئة من النبات تنتمي إلى مستورات الزهر الوعائية. مركزها التفصيلي يأتي بعد المشريات وبين الخثيات والطحليات ۖ وهي من النباتات البسطة التركيب العادة الجذور الحقيقية.

٣١٣٥٣ - عُشَّجَات °
Galeidae (S).
Galeidae (F) Galeidae (E).
فصيلة أسماك بحرية من السنفاقيات. أجسامها المعاصرة المعروفة ثلاثة، جميعها من الأشكال الوشعية الشكل ۖ تتميز بنمائها المغلوة بأغشية سادة متحركة. أشهر أجسامها وأعماها انتشارًا الطوروس.

٣١٣٥٤ - عُثْلِيدُون °
Glyptodon (F).
Glyptodon (E)

جنس حيوانات إسطورية من اللبونات البد. أحافيرها تعود إلى الأجاج الرباعي. جميعها من المفترسات الأمريكية المهة ۖ أجسامها ضخمة، كبيرة، مغطاة بذيال عظيمة سُمُة الزوايا، أطوالها بما فيه الرأس والذنب نحو ثلاثة أمتار ۖ يقال أنها كانت تعيش حياة التاتو أو المنزع.

٣١٣٥٥ - عُثْلِيل °
Dentalium (S) Dentale (F)
جنس حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات وفصيلة الغليليات. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم ۖ أصنافها بوقية الشكل أو مريدية. منها الجالسة والمنطلقة والمحسنة. صفحتها الخارجية مخدنة السطوح.

انعدام مرتقها الحوضي. وهي تضم سبع فصائل الزبابات والطيوريات واليابيات والفتقدات والمداليات والمكسبات والصربيات.

٣١٣٤٢ - عُشْرَب °
Chrysochloris (S).
Chrysochlore (F)

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الصربيات. أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع افريقية الشرقية والجنوبية ۖ شكله قريب الشبه بالخط. جسمه بطول من ١٢ إلى ١٦ سم. رأسه مخروطي الشكل، ذلق الخطم. عيناه صغيرتان مغلقتان بخشاة من الجلد متحركة. اذناه صغيرتان، ملستان، لاقوتية التركيب. عنقه شديدة القصر. ذنبه جعدة. جوارزه قصيرة، مسلحة بأظافر ضلعية، جلسته الامامية منها رباعية الأصابع. التطفية خصيتها. ثوبه قسطنطي اللون كثيف اللور الناعم القصير. الأثى ابرز قَدًا من الذكر ۖ قوته الحشرات والبدان والزحافات الصغيرة ۖ أشهر أنواعه :

العُشْرَبَةُ المُذْهَبَة
Chrysochloris aurea (S).
Chrysochlore doré, Taupe-dorée (S).
موطنه افريقية الجنوبية. ثوبه قسطنطي اللون، ذهبي المواجه.

٣١٣٤٣ - عُشْرِيَّات °
Chrysochloridae (S).
Chrysochloridés (F) Chrysochloridés (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة من عديمات المعرفة ورتبة الحشرات. أنواعها المعروفة عديدة جميعها جنس واحد الصرب ۖ أجسامها مكروسة، اسطوانية الشكل، صغيرة القد. رؤوسها مستغلطة، مخروطية، ذلقة الاخطام. عيونها صغيرة مغلقة بشده جلدي متحرك. اذناها صغيرة، ماسحة. جوارزها الامامية مسلحة بأظافر تشبلة، جلسته. الزوايا قسطنطي اللون، جميلة الماجات المتراكبة، كثيفة اللور الناعم القصير. اثنائها اكر قَدًا من ذكورها.

٣١٣٤٤ - عَصِيم °
Holometabole (F).
Holometaboleus (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة نامة التطور الاكمامي. م عسمة.

٣١٣٤٥ - عَصِيد °
Tractus (F). Tractus (E).
اسم يطلق على الخيوط والحزم اللبينة الموجودة في وثن النسيج النباتية والحيوانية.

٣١٣٤٦ - عَصْبُون °
Nevrax (F). Nevrax (E).
اسم يطلق على الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي.

٣١٣٤٧ - عَصْرَبَة °
Hydnocarpus (S). Hydnocarpe (F)
جنس اشجار حرجية من فصيلة الطهيبات. أنواعها المعروفة ستة. منهاها البلاد الحارة والاستوائية ۖ اشجارها كبيرة دائحة. اوراقها متعاقبة. ازهارها محورية الاركان،



عُشْرَب



عُشْرَب



غليبتودون

Gal. tigrinus (S).
فُطْرُوسٌ بَرِّيٌّ
يكثر وجوده في المحيط الهندي. طوله نحو ١٥٠ سم.
ثوبه بين الصبغة والشفقة المروشة بالسرعة المألوفة. يخلطه
الى الشبهة المألوفة.

Phyllite, Phyllithe (F)
Phyllite (E).
ورقة متحجرة او حجر عتقه الاوراق بوسوما.

Astrophysique (F).
Astrophysical (E).
الفيزياء الكوكبية علم يبحث في طبيعة الكواكب وفي
المنامح والاساليب التقنية الخاصة بها.



فطروس

Bathyal (F). *Bathyal* (E).
٣١٣٦٥ - قَائِي
نعت تعريفي يطلق في علم الخصبة (الجولوجية) على
المنطقة البحرية التي يراوح عمقها من ٢٠٠ الى ١٠٠٠ م
[من ميزات هذه المنطقة: عدم اضطراب المياه وتقلقلها.
استقرار الحرارة وتساويها. عدم تقاذ التور. قلّة وجود
النوت في الطبقة العليا وانحائها في الطبقتين الوسطى
والسفلى. عظمها مصورة بالرخويات رؤسيات الأرجل
والقشريات والاسماك المقترسة والسلمة التي تعيش على
المداد العضوية المائعة الى البحث الراسية] اما الاثرية
الكثائية او الشسئية المنتشرة على سطح الارض فهي
بمعظمها تنو الى الغبار او الصلصال القاعي الذي كان
رأساً على هذه الاعماق في الاباح الاول.

Xerophilie (F). *Xerophily* (E).
٣١٣٦٦ - قَائِي
القائمة منشع طبيعي يتولد النبات القن، الذي يرغب في
المناحات الجافة، الى تكاثف الائمة واغوار الخلايا
السفية في داخلها.

Dryopithecus (S).
Dryopithecus (E).
٣١٣٦٧ - قُرُودُ الطَّص
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قرد الطص. جنس قرد
مقرضة تعود احافيتها الى الزمن الميساني من الحقبة
البوجينية [حيكلها العظمي شبيه بهيكل القورلي وشبهه
البامة من حيث القد] وقد ثبت الآن ان لا صلة بينه وبين
السلالات البشرية.

Croceopus, Neomys (S)
Croceope (F).
٣١٣٦٨ - قُرُصُوب
حيوان ليون وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزبائيات
ورتبة الحفريات. اعطاه تيم من الصين الى ارضية.
يألف ضفلات الانهار، يوم وينس في الماء فيلتصق
الحشرات المائية واساريمها والارباب وسره الاسماك
وبلاعيها [جسمه صغير القد، شبه بالزبابة. طوله ما
فيه الذنب نحو ٢٠ سم. رأسه مخروطي الشكل، نلق
الحط، عنانه صغيرتان، مستديرتان، عتقه قصيرة.
توالله كعكة الاطراف، عاندة الاصابع، حناجره حلب لب
جامد. ذنبه الذي يبلغ طوله نحو ٨ سم. شبه بجناحي
الشكل، يطوقه حنار من الهلب القصير الجامد. ثوبه الى

اجسامها اسطوانية. ارنبتها قليلة الرحابة. ارجلها
قصيرة، ثلاثية الملق [تعيش منفردة في الرمال والاسمال.

Dentalidae (S). *Dentaliidae* (F).
٣١٣٦٩ - غِشَائِيَّات
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات الزورقيات.
اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع العالم.
اكبرها قدماً ابدها غوراً [اصداقها كلسية المائنة، متباينة
الاشكال والحجوم، منها المرنبة والوثقة والانوبية
والكبيرة والصغيرة. جميعها مفتوحة الطرفين. صحناتها
الخارجية مضطربة السطح او ملساء، الداخلية صقيلة
اشهر اجناسها الفليل.

Gametophyte (F).
Gametophyte (E).
٣١٣٧٠ - غِشَائِيَّات

الغاية، في علم النبات، طور من اطوار الانخاض
الشري، يبتدئ مع التحويل الكروماتيني وينتهي عند
الانخاض.

Anisotrope (F).
Anisotrope (E).
٣١٣٥٨ - غَيْرُ مُسَاوِيِ الْإِجَاهِ
نعت تعريفي يطلق، فيزيائياً، على كل مائنة صفتها
الحكمية او الميكانيكية لئلاساوية الاتجاه.

Chlamyde (F).
٣١٣٥٩ - قَحِيح
اسم يطلق على كل زهرة ثنائية الكم. ويطلق ايضاً على
كل عضو يشبهه غلات خارجي.

Tuniciers, Urochordés (F).
Urochordata (E).
٣١٣٦٠ - قُصَائِيَّات

صنف حيوانات بحرية ركنية او طوحيّة ملحوة يشبه
اللقفة [فصلها وانواعها المعاصرة متوسطة العدد.
اجسامها صغيرة القد، مستطيلة الشكل. تتميز بجهازها
العصبي الظهري الاركان وهو مؤلف من مكك شوكي
يمتد لتمداد الجسم. اما التنفس فتؤمنه فروع خيشومية
مركزها في جانبي البلعوم.

Interstellaire (F).
Interstellar (E).
٣١٣٦١ - قَبَابِ عَصَائِي
اسم يطلق على الفضاء القائم بين النجوم والمجرات.

Galeocardo (S).
Galeocarde (F). *Galeocardo* (E).
٣١٣٦٢ - فُطْرُوس
جنس اسماك بحرية من السفليات وفصيلة الطلجيات.
انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة اما المقرضة المتحجرة في
الاراضي الطباشيرية والثلاثية فاربعة [اجسامها وشبهه
الشكل تطلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. تتميز بانسانها
المحززة والتساوية العدد في التكنين [لشهر انواعها
المعاصرة فطروس الشمال والفطروس البوري

Gal. Arcticus (S)
فُطْرُوسُ الْغَلَالِ
يكثر وجوده في بحار الشمال. ثوبه الى الزرقة الخضراء.
طوله من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم.

٣١٣٧٣ - قنيسيات
 Bittacidae (S). Bittacidae (F).
 نصيلة حشرات قنصية من رتبة شارقيات الاجنحة
 عصيات الجناح. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة
 منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء المناطق الشمالية
 اجسامها قنصية متباينة الطول. قوائمها نقيقة مستطيلة.
 اجنحتها ضيقة، مستديرة الاطراف | قوتها كل ما
 استطاعة قصص من ذباب وهوام وحشرات. يرقاتها
 بأكثريتها دائمة نائلة ومنها الواجبة والفرضامة | اشهر
 اجناسها القنصية.

٣١٣٧٤ - قنيسية
 Xenophora (S). Xénophora (F).
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهنيات الأرجل
 اماميات الخياشيم ونصيلة القنيسيات. انواعها المعروفة
 قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداؤها
 شبه مظلة الشكل، كسبة المادة، متراكبة الاطراف
 المتباينة الاشكال والالوان | اعرف انواعها واشهرها :
 — القنيسية المحيطة
 X. lithophora (S).
 — القنيسية المصفاة
 X. corrugata (S).

٣١٣٧٥ - قنيسيات
 Xenophoridae (S). Xénophoridés (F).
 نصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مهنيات الأرجل
 اماميات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة
 العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة | اصداؤها
 صغيرة القد، مظلة الشكل او صوانية. صفحاتها
 الداخلية عاصمة المادة اللؤلؤية اما الخارجية فندبة
 بالزخارف والاطراف المتباينة الاشكال والالوان | اشهر
 اجناسها واعرفها القنيسية.

٣١٣٧٦ - قنراسية
 Nomade (S). Nomade (F).
 جنس حشرات حموكة من غشائيات الاجنحة وفصيلة
 القنراسيات. انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منتشرة في جميع
 اقطار العالم | اجسامها رشيقة هفافة متوسطة القد او
 صغيرة. اوائها متباينة تغلب فيها الشقبة فالصبة
 والتنجنج بالاصفر او الزنجفري | الحشرات الجملانة
 تعيش على رحيق الازهار وطلعمها. يرقاتها طفيلية تعيش في
 محاجر الصرغيات واللوزيات وغيرها.

٣١٣٧٧ - قنراسيات
 Nomadidae (S). Nomadidae (F).
 نصيلة حشرات حموكة من رتبة غشائيات الاجنحة.
 اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع
 العالم | نظامها الحياتي فريد. انثاهما تعيش المكن قرب
 مداخل محاجر غيرها من غشائيات الاجنحة اخصها
 الصرغيات والهكتراسيات واللوزيات، فصرح البرقات
 فور نفاها الى داخل المحاجر حيث تعيش كامل حياتها
 البرقية على ما تبنيه العوائل | اشهر اجناسها القنراسية.

٣١٣٧٨ - قنيسي
 Phénotypique (F). Phenotypic (E).
 ويدعى النمط الظاهري. نعت تعريفي يطلق على كل ما له
 صلة بالقنيس. التتلسل القنيسي لا وراثي.

الشبهة السمراء تشبه سموتها في الظهر وتغير في الصدر
 والطن | الانثى اميز قنًا من الذكر وتحتل باللوب نفسه.

٣١٣٦٩ - قنصامو
 Crocidura (S). Crocidura (F). Crocidura (E).
 جنس حيوانات لبونة من فصيلة الزبابيات ورتبة
 الحشرقيات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اعطانها البلاد
 الحارة والمنتقلة الحارة من العالم القديم. جميع انواعها
 جلدة قوتها الحشرات والديدان | اجسامها طول من ١٢
 الى ٢٦ سم. رؤوسها مخروطية، ذلقة الاضطام. عيونها
 صغيرة، مستديرة. اذنانها مسحة. جرامها معتدلة القد،
 خصاسية الاصابع، مستطيلة الاظفار الحادة. اوائها
 تزاح من السمرة الحديدية العواج الى السمرة العابقة |
 انثاهما اميز قنًا من ذكرها، يعتقد ان حملها يوم نحو
 ٢٠ يوما تضع في تمامه من ٣ الى ١٠ ايراص وذلك
 حسب الانواع.

٣١٣٧٠ - قنوط
 Embletonia (S). Emblétonie (F).
 جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهنيات الأرجل،
 غشائيات الخياشيم، غشائيات التنفس. انواعها المعروفة
 قليلة العدد منتشرة في بحار النصف الشمالي من الكرة
 الأرضية | اجسامها صغيرة، عريضة، عاتية
 الاصدا، مستطيلة الشكل | عديدة اللوامس القنوية
 الاميلجية، المبطلة | معظم انواعها يعيش على
 الصخور الميدة للغور.



قنصامو

٣١٣٧١ - قنوسيات
 Xyridaceae (S). Xyridacées (F).
 نصيلة نباتية من وحدة الفلقة. اجناسها وانواعها المعروفة
 متوسطة العدد. مهجها بعض الاصقاع الاسيوية
 والامريكية. جميعها من ثوب المناطق والمواقع الرطبة |
 نباتاتها جذمية معمرة. اولقاتها قرصية الانتشاب عصفية
 الشكل او منصلبة. تنويرها شعراعي. سننلي التجميع،
 هامى الارتكاز. ازهارها خضوية، كبيرة القد، ملونة.
 اكمامها منخضة الراسات. ثمارها جراء ثلاثية الفلق.
 بزورها آحية، نشوبة المادة.

٣١٣٧٢ - قنصية
 Bittacus (S). Bittaque (F).
 جنس حشرات قنصية عصبية الجناح من فصيلة
 القنصيات. انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم
 اقطار العالم | اجسامها قنصية مستطيلة القوائم والاجنحة.
 يكثر وجودها في المواقع الرطبة وقرب مجاري الماء |
 جميعها مفترسة قوتها الذباب والهوام. يرقاتها دائمة ونائلة
 تعيش في الجلالة وتحت المدر.

القنصية المقصية
 B. tipuloides (S).
 اعطانها شرقي حوض البحر الابيض المتوسط
القنصية الافريقية
 B. capensis (S).
 اعطانها معظم مناطق افريقية الجنوبية.
القنصية البرازيلية
 B. Blancheti (S).
 اعطانها البرازيل وخاصة حوض الامازون.

Colloïde (F). Colloid (E).

٣١٣٨٦ - كُولِيد

اسم يطلق في علم الكيمياء على كل جسم لا يذوب في الماء كاستيعاق شبه المتلورات.

Prothalla (F).

Prothallium, Prothallus (E).

٣١٣٨٧ - كُثَيْبَة

تتوه صغير ، صفحي الشكل غالباً ، بطو بويضة مستورات الزهر الوعائية ، تنمو عليه الأشيرة والسمن.

Condutrya (S). Condylure (F). ○

٣١٣٨٨ - كَنْدُل

حوان لون جاش وحيد الجنس والنوع من فصيلة الطوبينيات ورتبة الحشرات ، موطنه امريكا الشمالية | جسمه صغير القد ، اسطوانتي الشكل ، بطول نحو ٢٤ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١١ سم. رأسه مخروطي الشكل ينتهي بقنطرة صلبة بطولها اكمل من الشعاع اللامعة الغضروفية التركيب. عيانه خريزتان. اذناه طلسان. ذنبه مبطر الهلب القصير. جرابوه خنسية الاصابع المجهزة باظفار قوية ، مستطيلة. ثوبه ابيض اللون ، اشقق الموج | الاثنى ابرز قد من الذكر ولها ثوب منه. تحمل مرة واحدة في العام وتضع من يرصين الى خمسة افراد من قوته الحشرات واليدمان. يعيش في تقف يخطه على عمق يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم.

Terre non cultivée (F).

٣١٣٨٩ - كَنْكُث

الكثكث كل تربة غير مزروعة مستحالة كانت او غير مستحالة.

Exothermique (F).

Exothermic (E).

٣١٣٩٠ - لَاحِش

نعت تعريفي يطلق على كل غاغل كيميائي يند الحرارة الناجمة عن تفاعله او توكبه.

Bressolis (S). Bressolis (F).

٣١٣٩١ - لُجَائِيَة

جنس حشرات فراشية صولجانيات القرنون من فصيلة اللجائيات ورتبة حشرات الاجنحة | انواعها المروعة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة. اجسامها كبيرة القد. روافدها مقلقة جميلة التضبيب. قوتها الانتشارية صولجانية الشكل | اسارها خاضة. ملجها الحياتي جسامي. مجموعاتها تد بعض المات. تعيش في جراب واحد غشائي الماتة. ترحر في الليل وتعود الى جرابها في النهار. تلثم اوراق الكثير من النبات ومنها الموز فتؤذبه اشد الاذى.

Bressolidae (S).

Bressolidae (F).

٣١٣٩٢ - لُجَائِيَات

فصيلة حشرات من رتبة حرشنيات الاجنحة. اجسامها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها البلاد الحارة | الافريقية والامريكية | جميع انواعها كبيرة القد ، جميلة الالوان والتقيح والزخرفة | اسارها خاضة قوتها اوراق النبات. جميعها شرذمية الملج الحياتي تعيش مع بعضها البعض في اجرة كبيرة غشائية الماتة تبيت فيها من

Bathymétrique (F).

Bathymetric (E).

٣١٣٩٦ - قِيَاسِي

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالقياصة.

Castridae (S).

Castridae (F). Castridae (E).

٣١٣٩٠ - كَشَائِيَات

فصيلة حشرات فراشية من حرشنيات الاجنحة مختلفات القرون. اجسامها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الاستوائية اخصها الامريكية | جميع انواعها متوسطة القد او كبيرة. تتميز بجبال روافدها الخشيلة القشار الساطعة الالوان. وتتميز ايضا باسترسال روافدها عند الراحة ، على شكل جملون | اشهر اجسامها الكسنيانة.

Castria (S). Castrine (F). ○

٣١٣٩١ - كَشَائِيَة

جنس حشرات من حرشنيات الاجنحة وفصيلة الكسنيانات انواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم الاقاليم الاستوائية | اجسامها كبيرة القد بطول من ٣٥ الى ٤٥ سم. وبمساحتها تراوح بين ١٠٠ الى ١١٥ مم. روافدها خشيلة القشار جميلة الالوان الساطعة الموج يكثر فيها الاسمر الحنطي يطوه جميعه وتقيح يراوح ، حسب الانواع ، من الاصفر الكبريتي الى الاحمر القرميدي | اسارها مؤذية تخلك سوق الموز والانتاس والصابار وغيرها من النباتات اللينة.

Atta (S). Atta, Atte (F).

Atta (E).

٣١٣٩٢ - كُثَيْبَة

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة وفصيلة التمليات. انواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها امريكية المهد. ملجها الحياتي جسامي كسار انواع النمل | اجسامها معتدلة الجرم لكنها تتميز بكبر وبخلاطة رؤوسها ، فكوكها حادة فاضمة ، حماتها ذرية تهريق مائة مخترة.

Calamitidae (F).

٣١٣٩٣ - كَلَمَائِيَات

فئة نباتات متشجرة يهود ظهورها الى الحقبة الكربونية. نباتاتها قريبة الشبه بالكنائيات. سوقها ليفية ، مضفوشة ، مسجونة ، بطول من ٤ الى ١٠ امتار اوراقها حلقية الانتساب ، عصبية الشكل ، مستطيلة. اعرف نباتاتها الكليمات والبصرقيات.

Culm, Dinantien (F).

Culm, Oinan (E).

٣١٣٩٤ - كَلَمِي ، دِينَانِي

كلمي من دكولم اسم موقع في المانية. ودناني من دنيان اسم موقع في بلجيكية | سات او طبق من الحطب - الكربونية تتميز بشسها الكثير الماتة النباتية.

Calamite (F). Calamite (E).

٣١٣٩٥ - كَلَمِيَة

جنس نباتات متشجرة يكثر وجودها في الحقبة الكربونية من الاباح الاول | تتميز من الاسوسميات الجبارة المتقرضة. شكلها قريب الشبه باليوس. ارتفاعها يراوح من ٧ الى ٨ امتار.



كندل

٣١٣٩٧ - **لُورَنْتِيَّة** (E). Laurentien (E).
نمت تعريفي يطلق على الطبقة السفلى من الحبة السميكة
العائدة إلى الأجاج ما قبل الكمبري.

٣١٣٩٨ - **ليثوزيات** (S). Lithosidae (S).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة. أجناسها
وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جبال البلاد المعتدلة الحرارة
والأقاليم الباردة من العالم القديم | أجناسها كيفية العمل ،
شبه لسطوانية الشكل ، تطول من ٢٢ إلى ١٨ مم . سبطنها
تراوح من ٤٢ إلى ٥٢ مم . رؤوسها مزوانية الشكل .
عيونها صغيرة . ملابسها ومراسفها دقيقة . قرونها
الاستشعارية خيطية . رواشنها الأمامية ضيقة . اثوابها
عامة الزعرقة ، الوانها تختلف مع اختلاف الأنواع
| أشهر أجناسها الليتوزية .

٣١٣٩٩ - **ليثوزيه** (S). Lithosia (S).
جنس حشرات فراشية من فصيلة الليتوزيات . أنواعها
المعروفة نحو ٣٠ اعطائها جبال البلاد المعتدلة الحرارة
من العالم القديم | أجناسها متكافئة العمل الناعم تطول
من ١٥ إلى ١٨ مم . سبطنها تراوح من ٤٥ إلى ٥٢ مم .
رؤوسها معتدلة الجسم ، صغيرة العين ، دقيقة الملابس
والمراسف . أزيتها خيطية الشكل . رواشنها الأمامية
ضيقة . مقطوعة الأطراف . رواشنها الخلفية رحيه
الانفراج ، مستديرة الأطراف | أساريها تعيش على
الحزاز .

٣١٤٠٠ - **ماحيش** (F). Endothermique (F).
نمت تعريفي يطلق على كل تفاعل كيميائي يمتص الحرارة
الناجمة عن تفاعله | معظم المتفجرات من العناصر
الماحيشة .

٣١٤٠١ - **مكايان المصفر** (F). Hétérothallique (F).
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي
يجاري منشع النباتين المشري .

٣١٤٠٢ - **مساوي المصفر** (F). Homothallique (F).
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل جهاز عضوي
يجاري منشع التساوي المشري .

٣١٤٠٣ - **مكثوث** (F). Triquête (F).
نمت تعريفي يطلق في علم النبات على كل سطح مستدير
تلوه ثلاث زوايا ناشرة تتخللها ثلاث زوايا غائرة .

٣١٤٠٤ - **مصحاح** (F). Vitellogène (F).
مصحاح أو مصحاحة نمت تعريفي يطلق في علم الفيزيولوجية
على غنية تنشأ منها الخلايا المحيية المزودة بالمواد
الغذائية عند المنطقات والمنطقات .

الصباح إلى الغروب لانها تسرح في الليل سميا وراء الزاد
| أشهر أجناسها اللجاجة .

٣١٣٩٣ - **لَحَازَة** (S). Cuterabra (S).
جنس حشرات من رتبة نوات الجاحين وفصيلة
الحزازيات . أنواعها المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض
أقطار العالم أخصها أمريكا الجنوبية والشرق الأقصى |
أجناسها مكرمة ، شبه أسطوانية الشكل . رؤوسها وعيونها
ناشزة . أزيتها نحيلة ونصيرة . أخطامها صفيحة . اثوابها
ملونة ، مجذعة الكوسل والبلون | أناتها تمتع المكن على
جلود معظم الحيوانات الوحشية والداجنة فيقتف عن
يرقات دقيقة تنقب جلد المائل حيث تعيش كامل طورها
البرقي . طور الاكمال ينقضي في التربة وينتهي بظهور
الحشرة الجميلة .

٣١٣٩٤ - **لَحَازِيَّات** (S). Cuterebridae (S).
فصيلة حشرات من رتبة نوات الجاحين قصيرات
القرن . أجناسها وأنواعها المعروفة نحو ٦٠ تألف الحراج
والغابات والمراعي . مصطلها أمريكي المهد وبعضها
أسوي | أجناسها صغيرة مكرمة . رؤوسها معتدلة
الضخامة ، ناشزة . عيونها كبيرة . قرونها الاستشعارية
قصيرة ونحيلة . أخطامها صغيرة اللد ، صفيحة . اثوابها
مجزعة | أناتها تمتع المكن على جلود الحيوانات البرية
والأليفة فيقتف عن يرقات صغيرة ، دقيقة تنتمن في جلد
المائل تقصّب له قروح ودمامل وتبقى حتى يحين زمن
الاكمال فتخرج عواظها إلى التربة حيث تتحول إلى
حشرة جميلة | أشهر أجناسها اللحازة .

٣١٣٩٥ - **لَحَاسَة** (S). Gracilaria, Caloptilia (S).
جنس حشرات فراشية من حرشفيات الأجنحة وفصيلة
اللحاسيات . أنواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها معظم
أقاليم البلاد المعتدلة الحرارة | أجناسها صغيرة نحيلة
تطول من ٤ إلى ٦ مم . سبطنها تراوح من ١٠ إلى ١٤
مم . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . مراسفها
وملاسلها نشيطة . رواشنها جميلة التخضيب الزاهي ،
مستعرضة التهذيب المتحاري | أساريها تعيش على أوراق
الأشجار العائلة أخصها اللبك والحوور والميزونون
والنولا .

٣١٣٩٦ - **لَحَاسِيَّات** (S). Gracilariidae (S).
فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة . أجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطائها معظم مناطق
البلاد المعتدلة الحرارة | أجناسها صغيرة اللد ، مستطيلة
الزباني الخيطية الشكل ، مهذبة الرواشن الجميلة
التخضيب . تتميز برؤوسها المزوانية الشكل ومراسفها على
النشطة وبملابسها اللامعة القوية | أساريها تعيش على
أوراق الأشجار النفضية أخصها الحرجية والتزيينية |
أشهر أجناسها اللحاسة .

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفرغيات. انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة | اجسامها مستعرضة، مسطحة، تطول من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها صغيرة. عيونها مستعرة، جاحظة. اخطائها ناشزة الفك الاسفل. اثنائها فضية اللون يطولها تمصيص مخترق اسود. زعانفها الظهرية والشرجية شاكاة. زعانفها الذيلية فارقة | لحومها ماكولة.

Ginkgoles (F).

٣١٤١٣ - مَكَاثِمَة

اطلب جينكولات.

Bathomètre, Bathytmètre (F).

Bathometer, Bathytmeter (E).

٣١٤١٤ - مَقْيَاح

المقياس جهاز يتركز على الثقل النوعي يستعمل في سبر اغوار البحار.

Syngamie (F). Syngamy (E).

٣١٤١٥ - مَكَاثِمَة

المكاثمة في علم النبات هي اتحاد الاشجار في التتسلل الشقي.

Autochtonie (F).

٣١٤١٦ - مَكْوَد

راجع تيك.

Solenodon (S). Solénodon (F). مَكْيَس

Solenodon (E) جنس حيوان لبون من فصيلة المكيسات. له نوعان

يخشان في جزر الايتل. والمكيس هو اسمه في تلك البلاد | جسمه يطول نحو ٦٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٥ سم. شكله شكل الجوز الا انه اسفني الرأس الذي ينتهي بخرطوم قصير. وهو كيف الهلب الجاد، عري الذنب | ملجئه الحياتي فريدي. يسرح في الليل، قوته الحشرات والديدان والزحافات الصغيرة وبعض الفار البرية والجذور | اما نوعا فهما مكيس الايتل S. Cubanus و مكيس كوبا. S. Paradoxus (S). مكيس الايتل كان كثير الوجود في جزيرة مايني الى حين ادخلوا على الجزيرة بعض الثنوس للقضاء على الانواعي نقصت على الانواعي والمكيس.

Enkyaté (F). Encyaté (E).

٣١٤١٨ - مَكْيَس

المكيس، في علوم البيولوجية والطلب والنبات، هو ما كان موجودا ضمن كيس.

Solenodontidae (S).

٣١٤١٩ - مَكْيَسِيَّات

Solenodontidae (F). Solenodontidae (E). فصيلة حيوانات من الثدييات عمليات المرغة ورتبة الحشرات. المعاصر منها الآن جنس واحد يدعى مكيس يشتمل على نوعين مهدهما جزر الايتل الكبرى والصغرى.

Menotyphie (S)

٣١٤٢٠ - مَمْرُغِيَّات

Ménotyphie (F). Menotyphie (E). مرتبة من الحشرات تتميز حيواناتها بوجود المرغة

Endothermicité (F).

Endothermicity (E)

٣١٤٢٥ - مَمَّاكَاثِمَة

الممماكة، كيمياء، هي امتصاص الحرارة الناتجة عن تفاعل بعض الاجسام او العناصر.

Panspermie (F). Panspermy (E).

٣١٤٢٦ - مَمَّاكَاثِمَة

الممماكة، بيولوجيا، نظرية افتراضية تبحث عن اصل الحياة ومصدرها. ملخصها ان الحياة على الارض تعود الى جراثيم كونية انتقلت في الفضاء من بعض الكواكب | الثقافة العلمية الحديثة تنفي هذه النظرية ذلك لأن لشعة ما وراء البنفسجي التي تهين على الفضاء الخارجي لا تسمح بالحياة لأي جرثومة كانت.

Marattiaceae (S). Marattiaceae (E).

٣١٤٢٧ - مَمْرُغِيَّات

فئة نباتات من مستورات الزهر الوعائية تنتمي الى الشرنبات. انواعها المعروفة عديدة، معظمها من متحجرات الازمنة الغائرة. اما المعاصر منها فنحو ٥٠ جميعها من ثبوت المناطق الحارة | سوقها قصيرة، بونصية الشكل، منتصبه. اوراقها ضيقة الارتكاز، تاجية الانتساب، كبيرة اللد، تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. نصالها مستعرضة يغلب فيها التفرص الريشي ثم الكتي.

Cipolin (F). Cipolin (E).

٣١٤٢٨ - مَمْرُغِيَّات

جبر من الجنس المتطور تخترقه عروق من الطلق (ميك) مشتركة المركز. يستعمل استعمال الرخام وهو اصلب منه.

Tactisme (F). Tactism (E).

٣١٤٢٩ - مَمْرُغِيَّات

تفاعل او ارتكاس الخلقة الحية من جراء تأثيرات مختلفة المصادر، كيمائية، حرارية، كهربائية، الخ ... تأثيرات قد تكون جاذبة او دافعة تدعى ليجاتية او سلبية.

Thalloide (F). Thalloid (E).

٣١٤٣٠ - مَمْرُغِيَّات

هو في النبات ما كان تركيبه وشكله كالشعر.

Crossoptérygiens (F). Crossopterygii (E).

٣١٤٣١ - مَمْرُغِيَّات

فئة من الاسماك اللامعات يعود ظهورها الى الحقبة الباليوئية. اجسامها مسطيلة الشكل تتميز بزعانفها الموضعية والبطنية الشاذة عن الفتوس المألوفة وذلك بانتسابها عند مؤخر الصدر والبطن، وبارتكازها على مادة حريشها ناصلة. زعانفها الذيلية ممددة ومصلبة | فصالها واجنتاسها وانواعها المعروفة قليلة البد، معظمها من متحجرات الحقبة الباليوئية وما يليها. النوع الوحيد المعاصر والمعروف حتى الآن يدعى «لا نيمره» وهو من عظم ارخبيل الكومور في المحيط الهندي. يعيش بين منطقتان الصخري وفي تجاويلها على اعماق يراوح غورها بين ٣٠٠ و ١٢٠٠ م.

Glyphisodon (S).

٣١٤٣٢ - مَمَّاكَاثِمَة

Glyphisodon (F). Glyphisodon (E)



مَمَّاكَاثِمَة



مَكْيَس

3١٤٢٧ - **مُؤَزِّي** [○] ، **إِنْقِدَادِي** Méiotique (F)
Meiotic (E)
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالموزة أو الانقداد.

3١٤٢٨ - **نَاجِدٌ** [○] Propodite
اسم يطلق على النصلة قبل الأخيرة من قوائم القشرينات عشاريات الأرجل.

3١٤٢٩ - **نَاسِجٌ** [○] Allométrique (F) Allometric (E).
نمت تعريفي يطلق في علم البيولوجية على كل عضو يتميز بنوعة لا تتسجم مع نوعة سائر الأعضاء الأخرى.

3١٤٣٠ - **نَيْبٌ** [○] Cocolithe (F).
النبيث جسم مجوهر من كربونات الكالسيوم مشبع بالمواد العضوية يرسب في قاع البحر.

3١٤٣١ - **نَيْلُ البُوعِ** [○] Hétérosporé (F)
Heterosporous (E).
نمت تعريفي يطلق على كل نباتات من مستورات الزهر الوعائية كمختمه متباينة البوع المختلف الشق.

3١٤٣٢ - **نَظَائِدٌ** [○] Gamétangie (F). Gametangy (E).
الثاندة طريقة انخصاب شائعة عند الفطور وبعض العنقيات. قوامها التحام الثنائك الذكرية بالانثوية واتماجها قناتجها وانخصابها.

3١٤٣٣ - **نَظَائِدَةٌ** [○] Gamétange (F). Gametange (E).
النبتة في علم النبات هي الخلية الأم أي أم الغامات عند النباتات الدنيا ومنها الفطور وبعض العنقيات.

3١٤٣٤ - **نَسَاجٌ** [○] Histogène (F) Histogenous (E).
اسم يطلق على العناصر والمواد الحيوانية التي تتكون منها الانسجة الحية.

3١٤٣٥ - **نَسَاجَةٌ** [○] ، **هَيْسُوتُجِيَّةٌ** Histogénèse, Histogénie (F). Histogenesis, Histogeny (E).
قسم من النطارة، علم الاجنحة، يبحث في تكوين النسج الحية وفي تطورها.

3١٤٣٦ - **نَسَاجِيٌّ** [○] Histogénique (F). Histogenie (E).
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالنساجة.

3١٤٣٧ - **نُسُوجٌ** [○] Allométrie (F). Allometry (E).
خاصة جسمورية يتمتع بها عضو من الأعضاء ينسج نشاط نوعته أو بانفصافها بالنسبة إلى سائر أعضاء الجسم. وهو ما يميز عنه بالنسوج الإيجابي أو السلبي.

3١٤٣٨ - **نُسْجَةٌ** [○] Chète (F).
زائدة دقيقة إبرية الشكل تطلو زجان الحشرة في فصلته الأخيرة. يقال ان وظيفتها تماثل وظيفة الهلب الذي يعلو الفصل عند بعض الحشرات.

والمرتق المائي أو المحوسي. وهي تضم فصيلة الجناديات وفصيلة الطواجيات.

3١٤٢١ - **مُؤَدَّلَةٌ** [○] Monedula (S) Monédule (F).
جنس حشرات قانصة من الحواريات وفصيلة الوراقيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ معظمها أمريكية المهد | اجسامها متوسطة القد أو كبيرة، قربة الشبه بالزنابير. اثنائها ملونة تكثر فيها الصفرة المجذبة بالاسود أو الاسمر | تنهم اصفانها في مهاجر تحفرها في التربة الرملية على اعماق تراوح من ٥ الى ٧ سم | قوتها ما تستطيع اقتناصه من حشرات انحصها الذباب والهوم ولا تفت عن المناكب والنحل.

3١٤٢٢ - **مِيزُورُونٌ** [○] Mésozoire (F).
راجع ناتي الاوالي.

3١٤٢٣ - **مِيَكْرُوجَيْئِيَّةٌ** [○] Microénergétique (F)
Microenergetic (E).
علم من علوم الفيزياء يبحث في بُد (كوانتا) الطاقة أو الجهد.

3١٤٢٤ - **مِيَكْرُوفِيزِيَاءٌ** [○] Microphysique (F).
Microphysics (E).
قسم من علوم الفيزياء يبحث في الذرة.

3١٤٢٥ - **مِيَمَارٌ** [○] Mymar (S) Mymar (F).
Mymar (E)

جنس حشرات مطفلة من غشائيات الاجنحة وفصيلة الميماريات. انواعها المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة | اجسامها شديدة الصغر تطول نحو ٠,٦ مم. تتميز بانحضاها المتباينة الشكل والجسم، الامامية منها مجدافية مهيبة الاطراف، الخلفية ضيقة، معلقة الشكل، عادمة التزنين. زباني ذكورها محيطية، زباني ائنها صولجانية | جميع انواعها مطفلة تعيش على مكن الحشرات المختلفة الفصائل.

3١٤٢٦ - **مِيَمَارِيَّاتٌ** [○] Mymaridae (S).
Mymaridés (F) Mymaridae (E)

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المنصورة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة | اجسامها شديدة الصغر تطول من ٠,٥ الى ٠,٨ مم. رؤوسها مستعرضة، مقطوعة الاقنية. قرونها الاستشعارية مستطيلة، عديدة الفصل، دقيقة. اذناتها صولجانية الاطراف. اعناقها مهيبة. صورها شبه بيضية. نصوصها انبوبية، مستطيلة عند معظم الانواع. بطونها شبه مردنية. اجنحتها الامامية مجدافية الشكل، مهيبة الاطراف، مستطيلة الاهداب. اجنحتها الخلفية معلقة، ضيقة. قوامها مستطيلة | جميعها مطفلة تعيش على مكن الحشرات من مختلف الفصائل والرتب. ومنها التي تفوص في طلب مكن الحشرات المائية | يرقاتها مرقاة وعادمة الرؤوس والمنافذ القوية، تتنذى بالانتانز | اشهر اجناسها واعرضها الميمار.

جنس حشرات من الحويّات وفصيلة الهلكتوسيات. أنواعه المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة حتى في جبالها | أجسامها مستطيلة الشكل، متوسطة القد أو صغيرة، ذكورها أميز قدًا من إناثها. أوابها قليلة التباين بين الأنواع، تكثر فيها الشهية والشحّة والتزهر البطني بالأصفر أو الأطحلى أو الاسمر | جميعها تصفّ في محاجر تحفرها في التربة. قوتها رحيق الأزهار وطلّها | أشهر أنواعه الهلكتوس المداسي الزناتير H. exorditus. أتوبه إلى السمرة السوداء الموج، زناتيره البطنية طحلاء اللون، ثلاثية الأزواج.

٣١٤٤٨ - هَلِكُوسِيَّاتٌ (F) Helictidae (S) فصيلة حشرات من الحويّات ورتبة غشائيات الاجنحة. أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة | أجسامها متوسطة القد أو صغيرة. ذكورها اغلظ من إناثها وأطول منها. قوتها رحيق الأزهار وطلّها | تقيم أصفانها في محاجر تحفرها في التربة | أشهر أجناسها الهلكتوس.

٣١٤٤٩ - هَلِكُونِيَّاتٌ (F) Heliconiidae (S). فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. أجناسها وأنواعها المعروفة نحو ١٦٠ جميعها من عظم امريكا الجنوبية | أجسامها دقيقة مستطيلة أو معتدلة الطول. رواشنها كبيرة، مستعيرة الاطراف، جميلة الألوان الزاهية والزخرفة المنسقة | معظم أنواعها يفرز عند الدفاع عن النفس مادة سائلة صفراء اللون كريهة الرائحة | إسامريها تعيش على أوراق النبات | أشهر أجناسها الهلكتونوس.

٣١٤٥٠ - هَلِكُونِيُوسٌ (F) Heliconius (S). جنس حشرات من حرشفيات الاجنحة وفصيلة الهلكتونيات. أنواعه المعروفة نحو ٩٠ أعطانها امريكا الجنوبية | أجسامها دقيقة طول من ٢٢ إلى ٢٨ مم. بسطتها تراوح من ٣٤ إلى ٤٢ مم. رؤوسها شبه مكررة. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل. مخاطمها معتدلة الطول ثلاثية العقل. أجنحتها متباينة الاشكال والحجوم. قوائمها الخلفية مستقيمة الانحناء. الوابها ملوّنة | يكثر وجودها في المناطق والأهوار وعلى ضفاف مجاري الماء. جميعها قانصة تسرح على سطح الماء. قوتها الهوام وكل ما استطاعت اله سبلا من حشرات.

٣١٤٥١ - هَلَوَايِتٌ (E) Helioyidae (F). تسيليكيات الالومنيوم الطبيعي النمو.

٣١٤٥٢ - هَوْرِي (F) Lacustra (F). Lacustrine, Lacustrian (E). تمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو نبات يعيش في الأهوار والبحيرات والغدران | ويطلق حصليًا على تكوين خاص أو تربة خاصة فتقول كوين هوري وتربة هورية | ويطلق أركيولوجيًا على الساسكر والقرى التي كانت تشاد فوق الماء على ركائز وأوتاد مخروطية في القاع.

٣١٤٣٩ - نُشْ Bipertition (F). Bipartition (E). النشّ في علم النبات هو الانقسام إلى شطرين متساويين.

٣١٤٤٠ - نُشُوءٌ ذَاتِي Abiogenesis (F). Abiogenesis (E). النشوء الذاتي نظرية بيولوجية قديمة كانت تسلم بنشوء الحياة من مواد طبيعية خام.

٣١٤٤١ - نَقْلَةٌ Pénépaine (F). نقطة ج ثلث اسم يطلق على الجبال القديمة العهد التي قُضت عليها العوامل الأرضية السحقة فاصبحت منبسطة كالسهول | أشهر هذه القلاع وارحها أنساعًا سهل فنلندة في شمالي أروقة ونجد البحيرات الكبرى في كندا.

٣١٤٤٢ - نُكْلَةٌ Nucleus (F). Nucleus (E) اسم يطلق، في علم التشريح، على نواة الحجرة الحيوانية أو الخلية النباتية.

٣١٤٤٣ - نُيُوقٌ Infandae (F). Infandae (E). اسم يطلق على كُتّة الجليد التي تلحف الاراضي القطبية | النُبُوق الذي يلحف بعض اجزاء الغرولند يقدر بنحو مليون كيلومتر مربع | النبايق التي تلحف اراضي القطب الجنوبي تقدر بملايين الكيلومترات المربعة | أما سماكة هذه النبايق فتتراوح من متر واحد إلى ٣٠٠٠ متر وأكثر.

٣١٤٤٤ - هَوْرُوسٌ Vellie (S). Vellie (F). جنس حشرات قانصة من تصفّيات الاجنحة وفصيلة الهوروسيات. أنواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في جميع انظار العالم | أجسامها صغيرة تطول من ٧ إلى ٩ مم. رؤوسها مخروطية الشكل، قليلة البروز. عيونها صغيرة ناشزة. قرونها الاستشعارية ثلاثية الفصل. مخاطمها معتدلة الطول ثلاثية العقل. أجنحتها متباينة الاشكال والحجوم. قوائمها الخلفية مستقيمة الانحناء. الوابها ملوّنة | يكثر وجودها في المناطق والأهوار وعلى ضفاف مجاري الماء. جميعها قانصة تسرح على سطح الماء. قوتها الهوام وكل ما استطاعت اله سبلا من حشرات.

٣١٤٤٥ - هَوْرُوسِيَّاتٌ Vellidae (S). Vellidae (F). فصيلة حشرات من رتبة تصفّيات الاجنحة المختلفة. أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة الحد منتشرة في جميع اصقاع العالم | تألف النامق ومجاري الماء وضفاف الانهر. تسرح على سطح الماء برشاقة الشابرات. قوتها الهوام والحشرات الصغيرة | أشهر أجناسها الهوروسة.

٣١٤٤٦ - هَرُوسِيْنِي Hercynien (F). Hercynian (E). تمت تعريفي أو اسم يطلق على اقدم التضخينات التي حصلت في القشرة الأرضية وما نجم عنها من سلاسل جبلية.

٣١٤٤٧ - هَلِكُوسٌ Halictus (S). Helicte (F)

Enzoique (F). Enzoic (E). ٣١٤٦٠ - يُوُهْمِيَّات
نعت تعريفي يطلق على كل موقع أو ارض تذكر فيها
الاحافير الحيوانية أو النباتية.

Ammomanes (S) ٣١٤٦١ - يُوُهْمِيَّات
Ammomane (F).

جنس طير من الجوامث مخروطيات المنابر وفصيلة
القمريّات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الصحارى
والبلاد الحارة. تألف الواحات والمواقع المبعثرة الاشجار
وبعضها يرغب في البراري القاحلة || اجسامها شبيهة باجسام
القطر، تطول من ١٤ الى ١٨ سم. مناقيرها مخروطية نرية.
اجنحتها ممثلة الطول ذلقة. اذناها فارقة. اتواها الى
الصهبة المنمشة والمرفوشة بالاطحل والاسمر || ملجها
الحياتي جماعي. جميعها من الضواري التي تجوب البلاد
في طلب الرزق. قوتها الحشرات وبعض البزور والثمار ||
افواجها متوسّطة العدد إلا في زمن القطاع حيث يتألف
السرب من عدة مئات || اناها تلتد في التربة بين الاعشاب
المترامية. حضنتها تراوح من ٣ الى ٥ بيضات. ترخمها
يستمرّ نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || اعرف
انواعه واشهرها البرملة الاليتية

Am. dincture (S). Am. élégante (F).
اعطائها تمتد من الصحراء الكبرى الى جبال الاطلس،
تجوبها كل عام.

Cassia (S). Casque (F). ٣١٤٦٢ - يُوُهْمِيَّات
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معنات الارجل
مشطيات الخياشيم وفصيلة الخنوثيات. انواعها المعروفة
عديدة، معظمها من متحجرات الاراضي الثالثية،
المعاصرة منها الآن نحو ٥٠ متشعبة في بعض بحار البلاد
الحارة والمعتلة الحرارة. تتميز بشعانة اصدانها الخنوتية
الشكل المتراكبة الاطوانات والزخارف والالوان.

Lillales (F). ٣١٤٦٣ - يُوُهْمِيَّات
النباتات مجموعة نباتية من وحدات الفلقة تضم خمس
فصائل وهي الزنبقيات والزمراريات والوعلاتيات
والقصورسيات والزغليات.

Corynmethe Yohimba, ٣١٤٦٤ - يُوُهْمِيَّات
Pausinystalia Yohimba (S).
Yohimbé (F). Yohimbe (E).
شجرة حرجية طيبة، كبيرة الحجم، دائمة، من فصيلة
الفوفيات. منتبة بعض مناطق البلاد الاستوائية اعضها
الكامرون والغابون والكونغو || ساقها متنبية، رفيعة، عتية
الاغصان. اوراقها معنقة، متقابلة، اهليلجية النصال.
ازهارها عتكوئي التجميع، طرفي الارتكاز. ثمارها جراء
شبه بيضية الشكل تلتف العديد من البزور الصغيرة ||
يستخرج من لحاء ساقها واغصانها مادة اليوهيمين المشهورة
بخواصها الشابة.

Lépidodendrées (F). ٣١٤٥٣ - هَيُومِيَّات
مجموعة نباتات متحجرة قريبة الشبه بالخنثريات.
اجناسها المحققة متوسّطة العدد جميعها من نوات الحقبة
النفوسية والكربونية المعاصرة الى الاباج الاول || تميّزت هذه
النباتات بسخامة سوقها المستطيلة ان كان قطرها يراوح
من ٨٠ الى ١٢٠ سم. وارتفاعها من ١٠ الى ١٥ متراً.

Achlmydée (F) ٣١٤٥٤ - وَالِيَّة
اسم يطلق على كل زهرة عادمة التويج والكأس. جهازها
وزيم وعطيل.

Monodelphes (F). ٣١٤٥٥ - وَحِيدَات الرِّحْمِ
Monodelphie (E).
اسم يطلق على جميع الثدييات التي تضع اولادها كاملة
الخلقة بخلاف نوات الرحمين أو الجرابيات التي تنتقل
اولادها من الرحم الباطني الى الجيب الخارجي المعروف
ايضا بالجواب حيث تقيم فيه حتى الاكتمال فالظلام.

Bembecidae (S). ٣١٤٥٦ - وَرَاشِيَّات
Bembécides (F).
فصيلة حشرات من الحويّات ورتبة غشائيات الاجنحة
المختصرة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة متشعبة في
جميع اصقاع العالم خاصة في البلاد الحارة والمعتلة
الحرارة || اجسامها متباينة الحجم، منها الصغيرة
والوسطى والكبيرة، جميعها قريبة الشبه بالثعل
والزناوير. اتواها ملونة بكثر فيها الاسفر المجزع بالاسود
|| جميعها تصفّن في التربة. محاجرها رداء فضيحة تخور
نحو ١٠ سم. مناخها افاق انبوبية الشكل متحرفة نحو
السطح. اصغانتها متراكبة الخنازيب الممسّسة السطوح ||
قوتها الذباب والهوم والصخير من نوات الجناحين
تقتنصها فتتحررها وتنتقلها الى اصغانتها زائداً لها وليرقاتها ||
اعرف اجناسها واشهرها الورشة والمنقولة.

Achlmyde (F). ٣١٤٥٧ - وَالِيَّة
نعت تعريفي يطلق على كل نبات عتي من نوات الالباف
المحضونة بخلاف واحد بدلاً من غلائين.

Ytterbium (F). Ytterbium (E). ٣١٤٥٨ - يُوُهْمِيَّات
عنصر معدني بسيط. رمزه (Yb) وزنه الانومي ١٧٣,٠٤
رقمه الانومي ٧٠ يستخلص من الاثربة الاربية. اول من
اكتشفه مارينيك عام ١٨٧٨.

Yttrium (F). Yttrium (E). ٣١٤٥٩ - يُوُهْمِيَّات
عنصر معدني بسيط. رمزه (Y) وزنه الانومي ٨٨,٩٢
رقمه الانومي ٣٩ اول من اكتشفه غانولان عام ١٧٩٤.



يرمل

*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.*

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume III

2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

**ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**



Dar el-Machreq sarl
Boite Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



Librairie Orientale - Boite Postale 1986
Beyrouth, Liban



ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH